

LIBRARY
OF THE
UNIVERSITY
OF ILLINOIS
636.605
GE
v. 52-53

JUN 24 1949

Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Begründet

von

Dr. Karl Ruß.

Herausgegeben und illustriert von Karl Neunzig.

Zweiundfünfzigster Jahrgang.

Magdeburg 1923.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung
(M. Kretschmann).



Die neue Welt.

636.605
GF
v. 52-53

Inhalts-Übersicht.

(* bedeutet mit Abbildung.)

Größere Arbeiten.

Adlersparre, A.
Über Vogelhaltung und ihre Voraussetzungen. S. 73. 81.
Ein paar Worte über Alter und Alterserscheinungen einiger höherer Vögel. S. 129.
Aellen, Ernst.
Brutbeobachtungen von 1917. S. 133.
Bacmeister, Walther.
Ornithologisches in Goethes Dichtungen. S. 91. 98. 107.
Barth, Walter.
Noch etwas über Bastardzucht. S. 20.
Bilfinger, Dr.
Meine Rußköpfchen. S. 2.
Unerfreuliches von meinen Exoten. S. 27. 33.
Birk, J.
Sprosser und Nachtigall. S. 18. 26. 34. 43. 50. 59. 67.
Was und wie soll man füttern? S. 106. 113. 121.
Bischoff, A.
Eindrücke von der Jubiläumsausstellung in Leipzig am 17. und 18. Dezember 1923. S. 41. 49.
Boxberger, Dr. L. von.
Ein Wort zur Weichfresserfütterung. S. 1.
I. Große Vogelschau der Vereinigung der Liebhaber, Landesverband Preußen. S. 11.
Braun, Prof. Fritz.
Allerlei vom Starmatz. S. 100.
Braune, Dr.
Zur Farbenzucht der Wellensittiche. S. 57. 65.
Buschendorf, A.
*Zucht des Zebrafinken. S. 74.
Ehlers, H.
Eine Stadt ohne Sperlinge. S. 85.
Grasl, Norbert.
Wellensittiche in der Gartenvoliere. S. 89.
Hirsch, Linda.
Meine Stieglitzbastardzucht 1921 und 1922. S. 101.
Kaforke, Emil.
„Gedenket der hungernden Vögel!" S. 17.
Redet ein zahmer Vogel mit seinem Pfleger? S. 77.
Etwas über Papageien. S. 108.
Keidel, Leopold.
Vogelausstellung des Bayer. Vogelliebhabervereins, des Verbandes der deutschen Farben-, Gestalts-, Bastardkanarien- und Exotenzüchter und der Weltbundesgruppe Oberbayern der Kanarienzüchter und Vogelfreunde in München vom 24.—28. Dezember 1922. S. 60.
Krabbe, A.
Ein Zuruf an die Leser der „Gef. Welt". S. 25.
Kracht, Ingenieur.
*Von der unteren Wolga. S. 5. 13. 21. 29. 37. 45. 52.
Lichtenstaedt, S.
Aus meiner Vogelstube. S. 114. 123. 132.
Mansfeld, Dr. Karl.
Zur Winterfütterung der Vögel. S. 109.
Marquardt, Lehrer W.
Vom Verschwinden der Nachtigall. S. 9.
Müller, Viktor.
Frischgehaltene Ameisenpuppen. S. 69.
Neidhardt, Chas.
Meine Vögel und deren Behandlung. S. 116.
Passig, Hans.
Ornithologische Beobachtungen auf einer Eisenbahnfahrt. S. 117. 126.
Rüdiger, Wilhelm.
Fremde Eier im Neste. S. 44
Struder, Oskar.
*Etwas vom Gelbspötter. S. 76.
Szerbanowicz, Theodul.
Sprosser. S. 82.
Träber, G.
Vom Zaunkönig. S. 28.
Troschütz, Alfred.
*Der Innenflugraum. S. 4. 10. 19. 36. 43. 51. 60. 68. 84. 92.
Tschusi, Dr. Viktor Ritter von.
Ornithologisches, mit besonderer Berücksichtigung der Vogelwelt des Halleiner Tales. S. 97.
Wagner, Fritz.
Etwas über Heckenbraunellen. S. 131.

Kleine Mitteilungen.

Von der Wasseramsel. S. 14.
Leipziger Kornkäfer. S. 15.
Falco peregrinus. S. 22.
Zur Farbenzucht der Wellensittiche. S. 94.
Im Vogelparadies. S. 102.
Frühjahrsbeobachtungen (Biberich). S. 102.
" (Weizacker). S. 110.
Insektenfang. S. 118.
Wo siedeln sich die jungen Schwarzstörche an. S. 127.
Goldstirnblattvogel 9½ Jahre in Gefangenschaft. S. 127.
Horsten des Turmfalken in einem hohlen Baum. S. 134.

Aus den Vereinen.

A. Z. S. 6. 15. 23. 30. 38. 46. 54. 63. 71. 77. 87. 94. 102. 111. 119. 127. 135.
Vereinigung der Liebhaber einheim. Vögel zu Berlin. S. 7. 31. 46.
Vereinigung hannoverscher Vogelliebhaber. S. 7. 47. 95.
Verein für Vogelschutz und -pflege zu Jena. S. 7. 47. 54. 102.
Verein für Vogelschutz und -pflege zu Dresden. S. 15.
Verein für Vogelschutz und -liebhaberei zu Hamburg. S. 15.
Verein der Vogelfreunde Köln. S. 15.
Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig. 15. 23. 31. 39. 47. 55. 63. 71. 79. 87. 95. 102. 111. 119. 127. 135.
Bayerischer Vogelliebhaberverein, Sitz München. S. 31. 38.
Vogelschutzverein „Edelfinken", Düsseldorf. S. 31.
„Aegintha", Berlin. S. 38. 46. 54.
Alte Vereinigung der Vogelliebhaber zu Dresden. S. 39. 95.
Verein der Liebhaber einheim. Vögel, Leipzig-West. S. 39. 55.
Vereinigung der Vogelliebhaber von Dortmund und Umgebung. S. 95.
Verein für Vogelkunde und Liebhaberei zu Karlsbad. S. 103.
Verein der Vogelliebhaber zu Lübeck. S. 111.
Verein der Vogelfreunde in Leipzig-Plagwitz. S. 135.
Vereinigung der einheimischen Waldvogelliebhaber von Görlitz und Umgegend. S. 46.
Verein Oschatz. Erste Vogelausstellung. S. 62.
Verein für Vogelschutz und -pflege Seifhennersdorf. S. 63.
Vereinigung der Vogelliebhaber, Sitz Liegnitz. S. 71. 119.
Zoologische Gesellschaft, Wien. S. 71. 119.
Vereinigung der Vogelliebhaber, Landesverband Preußen. S. 14. 45. 53. 70. 78.
Vereinigung der Vogelliebhaber, Landesverband Sachsen. S. 37. 54. 62. 86. 94. 103.
Verband deutscher Farben-, Gestalts-, Bastardkanarien- und Exotenzüchter, Sitz München. S. 39.
Verband der Vogelschutz- und Finkenvereine für Rheinland und Westfalen (Sitz Düsseldorf). S. 39. 78.
Aufruf zur Gründung des Reichsverbandes. S. 62.

An die Leser. S. 86. 135.

Aufruf. S. 102.

Redaktionsbriefkasten. S. 7. 15. 33. 31. 39. 55. 71. 79. 87. 95. 103. 111. 119. 127. 135.

Berichtigung. S. 23.

Register.

Adlerbussard 6. 21. 30. 37.
Alexandersittich 78.
Alpenbraunelle 60.
„ lerche 30. 67*. 69.
„ strandläufer 84.
Amsel 9. 13. 30. 134.
Ara 108.
Austernfischer 45.

Bachstelze 13. 30. 53. 69. 118.
Bartmeise 68.
Baumpieper 30. 69. 118.
Bekassine 30.
Bergfink 69.
„ hänfling 84.
„ meise 69*.
Beutelmeise 6. 22. 27*. 37. 45. 52.
Bienenfresser 6. 22. 29. 37. 45*. 52.
Birkenzeisig 84.
Blaudrossel 60.
„ flügelsonnenvogel 8. 109*.
„ kehlchen 60. 122.
„ meise 5. 45. 69.
„ rake 6. 13. 21. 30. 37. 44.
„ schnäpper, braunbrüstiger 92.
Bluthänfling 20. 84. 118.
Brillenvogel, Jaksons 85.
Buchfink 13. 30. 45. 52. 69. 118.
Bussard 13.

Diamantfink 92.
Dohle 6. 13.
Doppelgelbkopf 117*.
Dorngrasmücke 21. 30. 37. 68. 118.
Drosselrohrsänger 68.

Eichelhäher 53*.
Elfenastrild 92.
Elster 6. 118.
Erlenzeisig 29. 84. 116.

Falco peregrinus 22.
Falken 6.
Feldlerche 29. 69. 118.
„ sperling 6. 45. 69.
Fichtenkreuzschnabel 123*.
Fischreiher 53.
Fitislaubsänger 68. 91*.
Fliegenschnäpper, grauer 21. 30. 37. 52. 118.
Flußregenpfeifer 84.
„ rohrsänger 35*.

Gänsesäger 45.
Gangesbrillenvogel 85.
Gartenammer 37.
„ grasmücke 21. 30. 37. 45. 52. 68. 121.
„ rotschwanz 13. 30. 37. 53. 59. 60. 118.
„ sänger 1. 68. 76. 77*.
Gebirgsbachstelze 5*. 69.
Gimpel 31. 84.
Girlitz 20. 21*. 84.
Goldammer 53. 118.
„ brüstchen 92.
„ hähnchen 68.
„ stirnblattvogel 92.
Gouldamandine 66.
Grasmücken 2. 44. 121.
Graugirlitz 92.
Grünling 20. 30. 84. 116.

Hakengimpel 84.
Hartlaubzeisig 92.
Haubenmeise 69.
„ taucher 45.
Hausrotschwanz 60. 98. 118.
„ schwalbe 117.
„ sperling 6.
Heckenbraunelle 30. 60.
Heidelerche 2. 64. 69. 118.
Helenafasänchen 92.
Heuschreckensänger 37*.
Hohltaube 44. 53.

Isabellsteinschmätzer 13.
Jungfernkranich 6. 21. 30.

Kalabülbül 92.
Kalanderlerche 13. 29. 53.
Kardinal 124.
Kiebitz 29. 53. 118.
Kirschkernbeißer 37. 52.
Kleiber 69.
Kohlmeise 6. 45. 52. 118.
Kolkrabe 53.
Kormoran 22. 30.
Kranich 13. 21. 30.
Kreuzschnabel 84. 103.
Krickente 118.
Kronenmeise 85.
„ fink, grauer 92.
„ schnepfe 29.
Kubafink 92.
Kuckuck 29. 37.
Kurzzehenlerche 13. 53.

Lachmöwe 45.
Lapplandmeise 68.
Laubvogel 53.
Lerchensporenammer 69.

Magellanzeisig 92.
Mamulabachstelze 92.
Mäusebussard 44. 53.
Mauersegler 45. 118.
Meise, japan. 116.
Merlin 22.
Milan 13. 21. 29.
Mischling Ringelastrild × Zebrafink 99*.
„ Stieglitz × Kanarie 101.
Misteldrossel 53.
Mönchgrasmücke 2. 23. 31. 68. 111. 121.
Möwchen, japan. 65. 116.
Mohrenkopf 114.
„ lerche 29.
Mossambikzeisig 92.

Nachtigall 2. 9. 18. 26. 34. 42. 50. 59. 60. 67. 77. 122.
Nebelkrähe 6. 53.
Nonnensteinschmätzer 14. 29. 37. 43*. 45. 53.
Nymphensittich 103.

Orangebäckchen 92.

Papageiamandine 116.
Paradieswitwe 92.
Pirol 21. 37. 45.

Rabenkrähe 118.
Rauchschwalbe 6. 13. 29. 117.
Rauhfußbussard 45. 53.
Rebhuhn 6. 84.
Reiherente 44.
Ringdrossel 51*.
Ringeltaube 53.
Rohrammer 53.
Rosenpapagei 114.
„ star 14. 21. 37.
Rostgans 14.
„ täubchen 101*.
Rötelfalk 14. 22. 45.
Rothalsgans 29.
„ taucher 45.
„ kehlchen 2. 53. 60.
„ kopfgirlitz 84.
„ ohrbülbül 92.
„ rückenwürger 21. 37. 98. 118.
„ schwanz, indischer 92.
Rußköpfchen 2. 33.

Saatkrähe 6. 30. 52.
Sammetköpfchen 52.
Schamadrossel 84. 116. 133*.
Schellente 44.
Schilfsänger 37.
Schönbürzel 92.
Schopfwachtel 124.
Schreiadler 44.
Schuppenwachtel 83*.
Schwanzmeise 68.
Schwarzgimpelfink 107*.
„ kehltrupial 85*.
„ kopfpirol 125*.
„ schwanzsteinschmätzer 92.
„ specht 44.
„ stirnwürger 35.
Seeadler 13. 29. 45. 53.
Seidenschwanz 53. 68.
Singdrossel 13. 30. 53. 134.
„ sittich 27. 33.
Sittich 87.
Sonnenvogel 124.
Sperber 53.
„ grasmücke 37. 68.
Sperling 85. 117.
„ spapagei 111. 115*.
Spiegellerche 29*. 53.
Sprosser 14. 18. 26. 29. 34. 37. 42. 50. 59. 60. 67. 82.
Star 6. 13. 21. 29. 44. 53. 98. 100. 117.
Steinrötel 60.
„ schmätzer 6. 22. 30. 60.
Steppenadler 6. 13. 21. 29. 37. 53.
„ brachschwalbe 6. 30.
„ kiebitz 6. 13. 29. 53.
„ weihe 6.
Stieglitz 29. 53. 84. 116.
Stockente 45. 118.
Storch 118.
Sumpfmeise 68.
„ rohrsänger 37. 68.

Tafelente 44.
Tannenmeise 69. 111.
Teichhuhn 118.
Tigerfink 92. 116.
Trauerfliegenschnäpper 45. 68.
Tüpfelsumpfhuhn 21.
Turmfalk 118. 134.
Turteltaube 37.

Uferläufer 53.
„ schwalbe 6. 29. 37. 118.

Viehstelze 13. 30. 37. 69.

Wacholderdrossel 30. 53.
Wachtel 14.
Waldkauz 44.
„ laubvogel 37. 68. 91*.
„ schnepfe 37.
Wanderfalk 22.
Wasseramsel 11*.
Weidenlaubvogel 30. 37. 53. 68. 91*.
Weißkopfschmätzer 60. 61*.
„ ohrbülbül 92.
Wellensittich 4. 27. 33. 57. 65. 89. 94. 114. 119. 123. 125. 132.
„ , blau 66. 94.
„ , gelb 66. 94.
„ , judefarben 66.
„ , satingrün 66.
„ , weiß 66.
Wiedehopf 6. 13. 22. 29. 53.
Wiesenpieper 3*. 69.
„ schmätzer, brannkehl. 37. 60. 98. 118.
Würgfalk 6. 14. 22.
Wüstensteinschmätzer 30. 37. 53.

Zaungrasmücke 30. 37. 52. 68.
„ könig 28. 60.
Zebrafink 74. 75*.
Ziegenmelker 22. 37.
Zitronstelze 21.
Zwergelsterchen 92. 93*.
„ fliegenschnäpper 30. 37. 52. 68.
„ rohrdommel 21.
„ taucher 22. 118.
„ timalie 85.
„ trappe 14. 21. 29. 37. 53.

Jahrgang LII.
Heft 1. 4. Januar 1923.

Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Die Gefiederte Welt gelangt am Donnerstag nach dem 1. u. 15. jedes Monats zur Ausgabe und kostet vierteljährlich 45.– Mark. Einzelpreis des Heftes 10.– Mark.
Inserate für die folgende Nummer müssen bis spätestens Freitag früh in Händen der Verlagsbuchhandlung sein. Die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 10.– Mark berechnet.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung (M. Kretschmann) in Magdeburg.

Postschließfach 148. Postscheckamt: Magdeburg 3148. Fernsprecher: 1323.

Ein Wort zur Weichfresserfütterung.

Von Dr. L. v. Boxberger.

(Nachdruck verboten.)

Fast in jedem Jahrgang dieser Zeitschrift ist dieses Thema einmal behandelt, so daß man meinen sollte, es sei erschöpfend, um nicht zu sagen, bis zum Überdruß erörtert. Trotzdem sehen wir zu unserer größten Betrübnis, daß alljährlich viele der zarten und ihres Gesanges wegen besonders hochgeschätzten Kerbtierfresser, wie namentlich der Gartensänger, aber auch Laubsänger, Heidelerchen, Blaukehlchen und selbst härtere Arten, wie Grasmücken und Nachtigallen, an unrichtiger Ernährung zugrunde gehen. Was ist unter diesen Umständen natürlicher, als daß wir die in Übung befindlichen Futtermethoden immer wieder kritisch nachprüfen, um vielleicht doch eine Quelle des Übels aufzufinden und dauernd zu verstopfen! Das Sorgenkind aller Liebhaber edler Weichfresser ist wohl unbestreitbar der Gartensänger alias Gelbspötter — vom Sumpfrohrsänger will ich schweigen, da ich ihn für einen Vogel halte, der sich für das Leben im Käfig nicht eignet, wenn es auch vielleicht hier und da einmal glückt, unter Hunderten einen durch die Mauser zu bringen. Die gewöhnlichsten Krankheitserscheinungen beim Gartensänger zeigen sich in einer mit dem Übergang zum Ersatzfutter einsetzenden pathologischen Abmagerung, die gewöhnlich im Laufe des ersten Winters zum Tode führt. Der bis dahin lebhafte, manchmal sogar recht scheue Vogel wird allmählich immer ruhiger und zutraulicher, sitzt mit leicht gesträubtem Gefieder lange still da und liegt eines Morgens tot im Käfig. Der äußere Befund zeigt einen erschreckenden Schwund der Brustmuskulatur, der den Brustbeinkamm weit und messerscharf hervortreten läßt. Dieses Krankheitsbild kann nur eine Folge unzweckmäßiger Ernährung sein; ein unterernährter Körper setzt natürlich auch der Tuberkulose, die wohl häufig beteiligt sein wird, keine Widerstandskraft entgegen. Die üblichen fertigen käuflichen Futtergemische, die in der Regel verabreicht werden, bestehen aus einem vegetabilischen Grundstoff, etwas Zwiebackmehl oder einer verwandten Substanz, der je nach Güte und Preis der Mischung animalische Stoffe, wie Weißwurm, Ameisenpuppen, Insektenschrot, Muska (eine tropische Hemipterenart, die jetzt nicht mehr eingeführt zu werden scheint) in größerer oder geringerer Menge zugesetzt sind. Dieses Gemisch wird nach individueller Anschauung und Bequemlichkeit mit Karottengries und Wasser oder auch nur mit Wasser, bisweilen auch mit Milch angefeuchtet, oder es wird die nötige Aufweichung durch Vermischung mit frisch geriebener Karotte erstrebt. Hierzu ist zunächst zu bemerken, daß der Gartensänger, wenn überhaupt (was ich trotz der Angaben in der Literatur bezweifle), so doch sicherlich nur in sehr geringem Grade vegetabilische Stoffe, insbesondere Früchte, zu sich nimmt, wie es so viele andere Insektenfresser tun. Die der Quantität nach überwiegenden Bestandteile dieses Futters werden also von ihm nicht angenommen, d. h. er sucht die einzelnen Weißwurmleiber und Ameisenpuppen heraus und verschleudert das übrige Futtergemisch oder läßt es liegen. Da diese kostspieligeren Bestandteile aber durchweg nur in sehr unzureichender Menge im Gemisch enthalten sind, übrigens auch trotz der Anfeuchtung nur unvollkommen aufquellen, sondern hart und welk bleiben, in welchem Zustand sie ihm nicht zusagen, so ist die natürliche Folge, daß er eine zur Erhaltung eines normalen Ernährungszustandes ganz ungenügende Nahrungsmenge aufnimmt, was nach einer gewissen Frist unvermeidlich zum Tode des physiologischen Verhungerns führt. Die geschilderten Erscheinungen habe ich lange genug einwandfrei beobachtet, so daß ich davon überzeugt bin, daß sie allein für den Verlust des Vogels verantwortlich zu machen sind. Wie ist dem zu begegnen?

Die Antwort liegt nahe. Wir vermindern die vegetabilischen Bestandteile des Futters oder lassen

sie ganz weg und verwenden statt ihrer stark nährende animalische Stoffe, die wir in einen Zustand bringen, der ihre möglichst vollkommene Ausnutzung gewährleistet. Dies erreichen wir, indem wir als Hauptbestandteil den sehr nahrhaften Weißwurm heranziehen, dem wir in geringer Menge Ameisenpuppen, evtl. auch noch etwas Insektenschrot zusetzen. Alle diese Stoffe — und das scheint mir sehr wichtig — werden fein gemahlen, am besten durch eine Kaffeemühle, alsdann mit einer reichlichen Portion Trockeneipulver vermengt, und das Futtergemisch für die zartesten Weichfresser, besonders unseren Spötter, ist fertig. Von diesem Gemisch feuchten wir die nötige Menge mit dem Saft einer frisch geriebenen Karotte an, setzen zur Vermeidung von Klumpenbildung etwas feinstes Zwiebackmehl zu (das am besten aus reinem Weizenmehl selbst gebacken wird) und erhalten nach gehöriger Durcheinandermengung ein feuchtes, weiches, lockeres und angenehm riechendes Futter, das von den Vögeln restlos gefressen wird, da ein Heraussuchen einzelner Teile infolge ihrer starken Zerkleinerung unmöglich ist. Neuerdings gebe ich diesem Gemisch auch eine Dosis Vollmilchpulver hinzu, habe mir aber über den Wert dieser Beigabe noch kein Urteil bilden können. In das fertige Futtergemisch gebe ich nach der Jahreszeit 5—12 Mehlwürmer, die ich mit der Schere mitten durchschneide, damit das weiche Innere hervortritt. Ich tue das nicht, weil ich dächte, daß der Mehlwurm dann besser verdaut wird, sondern weil ich bemerkt habe, daß alle Vögel dieses weiche Innere des Mehlwurms als Leckerbissen schätzen und ihm daher die wichtige Eigenschaft eines Appetitreizmittels innewohnt. Wenn der Spötter von diesem Futter noch einen guten Teil verschleudert, so ist dies nicht eine Folge des Herumsuchens im Futternapf, sondern wird durch seine Art zu fressen bedingt, wobei er häufig einen „Bissen" in die Schnabelspitze nimmt und sich mit aufwärts gerichtetem Kopf sozusagen in den Schlund wirft. Hierbei geht natürlich immer etwas verloren. Auch anderen zarten Weichfressern bekommt dieses Futter gut. So habe ich einen Fitis nun schon im dritten Jahre bei idealer Gefiederbeschaffenheit und Munterkeit, und eine Heidelerche, die im Spätsommer bei jedem Atemzug das bekannte Japsen bei geöffnetem Schnabel zeigte und die ich deshalb schon verloren gab, hat jetzt nach normal verlaufener Mauser tadellos glattes Gefieder und ist von jener unheimlichen Erscheinung seitdem ganz befreit. Sie erhält das Futter vermengt mit Mohn und Hirse. Andern Vögeln, die im Freileben viel Vegetabilien zu sich nehmen oder Vielfresser sind, wie Rotkehlchen und Nachtigall, setze ich entsprechend mehr geriebene Karotte und Zwiebackmehl zu. Grasmücken erhalten die [illegible]teren Stoffe als Hauptbestandteil ihres Futters [illegible] die animalischen Ingredienzien nur als Zusatz. [illegible] gesehen hiervon erhält jeder Vogel bei m[illegible] altersher eine Prise feinpulverisierter Ei[illegible] Futter. Ob dieser Zusatz von Vorte[illegible] auch unter den Sachverständigen n[illegible] macht zu sein, wie die interess[illegible] über diese Frage im Jahrgang 1[illegible] Z[illegible] schrift mir darzutun scheinen. Ich m[illegible], ohne diesen schwierigen ernährungsphysiologischen Frag[illegible] mir ein Urteil erlauben zu wollen, doch annehmen, daß so fein verteilter Kalk vom Verdauungsapparat resorbiert wird und in die Blutbahn gelangt, wo er vom Organismus ausgenutzt werden kann, wenn Bedürfnis danach vorhanden ist. Jedenfalls aber schadet diese Kalkbeigabe nichts und darum halte ich daran fest.

Ich nehme nicht für mich in Anspruch, ein Idealrezept entdeckt zu haben, das jeden Mißerfolg ausschließt, glaube aber, daß die besprochene Art der Fütterung einen Fortschritt bedeutet, dem nur die beiden Nachteile anhaften, daß er recht teuer ist und etwas mehr Mühe und Zeitaufwand verursacht, als das beliebte System: ein Griff in die Universalfutterbüchse — ein Schuß Wasser dazu — ein paarmal geknetet — und das Futter ist fertig, für alle, gleichgültig, ob Gartensänger, Mönchgrasmücke, Blaukehlchen oder Nachtigall! Der rechte Liebhaber wird sich lieber andere Ausgaben verkneifen, als an seinen Vögeln sparen und gern eine halbe Stunde früher aufstehen, um ihnen das Futter mit der Sorgfalt zuzubereiten, auf die sie als seine Schutzbefohlenen Anspruch haben.

Als gelegentliches, sehr kräftigendes und belebendes Futtermittel möchte ich zum Schluß rohes Fleisch dringend empfehlen, und man sollte deshalb die ja nicht gerade allzu häufigen Gelegenheiten, zu welchen heute Fleisch auf den Tisch des Hauses kommt, nie vorübergehen lassen, ohne seinen zarten Vögeln, besonders den Spöttern, kleinste Stückchen von höchstens Ameisenpuppengröße auf das Futtergemisch zu legen. Mindestens wird man ja des Sonntags genügende Muße zu dieser etwas zeitraubenden Manipulation finden. Ich bin davon überzeugt, ohne es selbst ausprobiert zu haben, daß man mit einem Futter, das zur Hauptsache aus frischem, feingeschabtem (aber nicht gekochtem) Fleisch bestände, die allerbesten Erfolge haben würde. Denn alle getrockneten und wieder aufgeweichten Futterstoffe können das frische tierische Eiweiß in seiner natürlichen Verbindung nicht ersetzen, da dieser wichtige Nährstoff bei der Trocknung verhornt und sich in seiner chemischen Zusammensetzung verändert. Darum halte ich auch den Mehlwurm für ein wichtiges und zu keiner Zeit des Jahres ganz zu entbehrendes Futtermittel, wenigstens soweit es sich um die Verpflegung reiner Kerbtierfresser, wie Gartensänger, Laubsänger, Rohrsänger, Blaukehlchen, handelt. Bei ihnen mußte selbst der in diesem [illegible] sehr radikale Rausch eine Ausnahme von [illegible] Dogma der Schädlichkeit der Mehlwur[illegible]rhalb der Gesangszeit gelten lassen

---

Meine Rußköpfchen.

Von Dr. Bilfinger.

(Nachdruck verboten.)

Am 29. Juli 1919 erwarb ich bei der Firma G. [illegible] Findeis, Wien, mein erstes Pärchen Rußköpfchen [illegible] ließ die Tiere sofort in eine Gartenvoliere [illegible]en. Dieselbe enthielt 1,1 Gürtelgrasfinken, 1,0 [illegible]phensittich, 1,0 Zebrafink und 3,2 Wellensittiche. [illegible] einigen hastigen Rundflügen verschwanden beide [illegible]geien in einem Futterkasten, um mir nur sehr

selten wieder vor Augen zu kommen. Schon nach acht Tagen bemerkte ich, daß aus einem großen Berlepschkasten ein noch belaubtes Birkenästchen herausragte, und meine hochgespannten Erwartungen, von den sehr scheuen Vögeln noch in diesem Jahre Nachzucht zu erzielen, sollten sich bald vollauf erfüllen. Am 15. August sah ich im Nistkasten nach und war wohl sehr überrascht über das interessante Nest, aber auch ebenso unangenehm davon berührt, daß ich das zweite Rußköpfchen in der ganzen Voliere nicht vorfinden konnte. Ich untersuchte sämtliche Nistkästen und griff sogar mit der Hand in das röhrenförmige, nach abwärts gebaute Nest der Rußköpfchen hinein, um das Weibchen eventuell zu tasten. Wohl oder übel fand ich mich mit dem Gedanken ab, daß der Vogel irgendwie aus der Gartenvoliere entschlüpft sein müsse, ohne daß ich es bemerkt habe, zumal ich tags vorher die Fütterung ausnahmsweise nicht selbst besorgen konnte. Wer beschreibt meine Überraschung, als ich drei Tage später aus einiger Entfernung beide Rußköpfchen in dem Flughaus quitschvergnügt herumfliegen sehe. Als ich an das Vogelhaus herantrete, ist wieder nur ein Rußköpfchen da. Jetzt untersuche ich natürlich sofort abermals den Nistkasten und tastete zu meiner Überraschung ein Ei und auch das Weibchen. Ich hatte trotz häufiger Beobachtung niemals einen Vogel an- oder abfliegen gesehen. Das Nest war aus groben, etwa 10—20 cm langen Birkenästchen errichtet, die die Vögel von den zum Benagen aufgestellten Birkenzweigen selbst abgebissen hatten. Der Nistkasten war bis oben mit diesem Reisig angefüllt. Nachdem der Deckel abgehoben worden war, mußte ich erst die Zweige entfernen, um in die Neströhre mit dem Arm hineinlangen zu können. Die Tiere erreichten diese Röhre natürlich durch das seitliche Schlupfloch des Nistkastens. Dieselbe war so lang, daß ich den Arm bis über den Ellbogen einführen mußte, um die eigentliche Nestmulde mit der Hand erreichen zu können. Hier war auch eine retortenförmige, mit verschlissener Rinde und Federchen sorgfältig ausgepolsterte Erweiterung, die es ermöglichte, daß ich das darin wahrscheinlich ängstlich an die Nestwandung gedrückte Tier, anläßlich meiner erstmaligen Untersuchung, nicht wahrnehmen konnte. Ein derartig sorgfältig erbautes Rußköpfchennest habe ich bisher nie wieder gesehen. Die Brut ging glatt vonstatten, Gelege 5 Eier, 4 Junge waren geschlüpft, 3 wurden flügge und noch im Herbst verkauft. Das alte Paar wurde wintersüber in einem nichtgeheizten Wohnraum in einem Käfig $110 \times 70 \times 65$ beherbergt und war auch hier sehr scheu. Bei einer Generalreinigung zu Weihnachten fand ich in dem an den Käfig angebrachten kleinen sechseckigen Nistkasten ein aus Holzwolle hergestelltes, primitives Nest, mit einem bereits sehenden Jungen. Letzteres war am Neujahrstage, als ich wieder nachsah, spurlos verschwunden. Da ich im Winter meine Vögel nicht gern zur Brut schreiten sehe, entzog ich jedes Nistmaterial.

Im selben Winter hatte ich mir aus Budapest ein zweites Paar Rußköpfchen mit einem von diesen erzielten jungen Männchen verschrieben. Trotz der Ende 1918 herrschenden mißlichen Postverhältnisse, kamen alle drei Vögel bei strenger Kälte hier gut an. Beim Einbringen in den für sie bestimmten Käfig entwischte mir das alte Männchen und starb, als ich es wieder eingefangen hatte, in meiner Hand. Das Weibchen, durch Fußring gekennzeichnet, erzielte mit ihrem Sohne im Sommer 1917 in zwei glücklichen Bruten 9 Junge.

Nachdem ich um diese Zeit auch noch ein drittes Paar erworben hatte, bezogen 3 Paare Rußköpfchen zu Ostern 1919 meine Gartenvoliere und erzeugten hier 28 Junge in einem Sommer.

Wiesenpieper.

Als Nistmaterial dienten wieder hauptsächlich Birkenzweige und deren Rinde. Weiden wurden seltener verwendet; allerdings standen letztere mir auch nicht so häufig zur Verfügung, so daß ich eigentlich nicht behaupten kann, daß die ersteren von den Vögeln bevorzugt wurden. Als Nistkasten dienten diesmal sowohl ganz große Berlepschkästen (für Eulen usw.) als auch längliche viereckige Holzkistchen, die einen sogenannten Vorraum hatten, d. h. wenn die Tiere in das Kästchen einschlüpfen, gelangen sie zuerst in einen kleinen Raum und von hier durch ein zweites Schlupfloch, das im rechten Winkel zu dem ersten steht, in den eigentlichen Nistraum.

Der Vorraum war ebenfalls mit Nistmaterial erfüllt, das eine Röhre freiläßt, durch die der Vogel, das zweite Schlupfloch benützend, in den eigentlichen Brutraum gelangt, der hier ein völlig überwölbtes Nest enthält, zu dessen Herstellung gelegentlich auch die mannigfaltigsten Niststoffe, wie Holzwolle, Schilfhalme, Samenrispen der Mohairhirse, sogar kleine Stückchen Tannenreisig usw. verwendet wurden. Man findet aber auch in diesen Kistchen die typischen Retortennester, nur daß die Lage eben der Form der Nisthöhle angepaßt ist.

Materiellen Sorgen Rechnung tragend, als auch deswegen, weil ich keinen Garten mehr zur Verfügung hatte, mußte ich im Herbst 1919 alle meine Tiere verkaufen. Die Jungen gelangten alle in die Hände Wiener Händler, die drei alten, bewährten Zuchtpaare kaufte einer unserer erfahrensten Liebhaber, Herr Rambausek, der schon vor dem Kriege das Glück hatte, sowohl Moschus- und Kapuzenlori als auch tarentinische Zwergpapageien zu züchten. Dem Genannten ist es aber bis heute nicht gelungen, auch nur ein junges Rußköpfchen zu erzielen.

Nun war ich gottlob schon im Vorjahre in der Lage, wieder eine Gartenvoliere errichten zu können, und Herr Rambausek stellte mir voriges Jahr ein Pärchen und heuer nacheinander auch die beiden anderen Paare zur Verfügung, ohne daß es mir gelungen wäre, Nachzucht zu erzielen. Die Tiere legten wohl Eier, brüteten wohl auch, die Nester aber waren bei weitem nicht mehr mit jener Sorgfalt hergestellt wie seinerzeit, nicht überwölbt, von einer Retortenform keine Spur.

Demnach glaube ich annehmen zu dürfen, daß diese Tiere alle noch aus dem großen Fockelmann-Import vom Jahre 1908 stammen und demnach alle mindestens 14jährig, zur Zucht zu alt sind. Was nützt es heute, den hier gezüchteten Jungen nachzuweinen. Sie sind zurzeit, als in Wien infolge der furchtbaren Geldentwertung alles aufgekauft wurde, sicher auch ins Ausland gewandert.

Jedenfalls halte ich das Rußköpfchen mit alleiniger Ausnahme des Wellensittichs, für den zur Zucht am besten geeigneten Papagei, hinter dem Nymphen- und Singsittich weit zurückbleiben.

Freilich mit den Wellensittichen können die Rußköpfchen nicht konkurrieren. Allerdings glückten im Sommer 1919 von meinem ältesten Paar drei Bruten. Nur ein einziges Mal gab es aber fünf flügge Junge. So etwas ist für meine Wellensittiche eine Kleinigkeit. Bedenkt man aber, daß die Rußköpfchen heute vielleicht die am meisten begehrten Papageien sind, die naturgemäß auch weitaus höher bewertet werden als Wellensittiche, so kann wohl behauptet werden, daß die wirtschaftliche Zucht des Rußköpfchens weitaus erträglicher sein kann, als die des Wellensittichs.

Die Rußköpfchen verdienen auch in jeder Hinsicht die ihnen seitens der Exotenliebhaber entgegengebrachten Sympathien. Das Familienleben ist hier auch ein viel innigeres, als das der Wellensittiche. Dies bedingt aber auch die geringere Anzahl der Bruten, denn obwohl die Zeit des Brütens etwa 18 Tage, sowie die des Nesthockens der Jungen ungefähr die gleiche ist, wie bei den Wellensittichen, so werden die Jungen doch noch mehrere Wochen von den Alten gefüttert und die Nacht verbringt die ganze Familie gemeinsam im Nest. Die jungen Rußköpfchen, die an Schönheit des Gefieders den Alten kaum nachstehen, sind wenig scheu und zu Spielerei und Spektakelmachen immer aufgelegt.

Ein Wort wäre noch über die Geschlechtsunterschiede zu erwähnen, nachdem darüber wiederholt geschrieben worden ist. Meiner Ansicht nach gibt es solche überhaupt nicht. Ich habe Männchen besessen, die größer und farbensatteres Gefieder hatten, als ihre Weibchen, während Herr Rambousek heute noch ein Männchen besitzt, das nicht nur bedeutend kleiner ist als das Weibchen, sondern auch weniger lebhaft gefärbt ist.

Im Hinblick auf die Verträglichkeit mit anderem Geflügel sei noch erwähnt, daß ich neben den Rußköpfchen wiederholt Wellensittiche gezüchtet habe. Daß sie die Nester anderer, schwächerer Vögel zerstören, wenn sie Nistmaterial brauchen, mag vorkommen, ich habe es aber nicht beobachtet. In ihrer Gesellschaft erbaute ein Dompfaffenpaar ein Nest und brütete, ohne behelligt zu werden. Im vergangenen Sommer flogen gemeinsam mit Rußköpfchen Tiger-, Schmetterlings- und Bandfinken und Sonnenvögel ohne Beachtung zu finden. Drei Kanarienweibchen bauten unbehelligt ihre liederlichen Nester, dagegen fand es heuer ein Rußköpfchenweibchen notwendig, in zwei Wellensittichnester einzudringen und dort die Jungen umzubringen, obwohl es das in früheren Jahren nie getan hatte.

Wenn ich zum Schlusse dem Wunsche Ausdruck gebe, daß wir doch recht bald wieder diese herrlichen, kleinen Papageien importiert bekommen möchten, so hoffe ich, im Namen vieler Liebhaber zu sprechen und es wird mich ebenso freuen, wenn meine heutigen Ausführungen von anderer Seite bestätigt werden, als es mich nicht verstimmen wird, gelegentlich lesen zu müssen, daß ich mich in diesem oder jenem Belangen geirrt habe.

Der Innenflugraum.

Von Alfred Troschütz, Hannover.

(Nachdruck verboten.)

Die Überschrift könnte auch „Das Fluggebauer“ oder „Die Zimmervoliere“ lauten. Die Worte sind aber unschön. Die „Vogelstube“ und das „Vogelhaus“ sind nicht gemeint. Beide setzen eigene, besondere Räumlichkeiten voraus. Ich will aber einen Wohnraum für Vögel schildern, der, zerlegbar, im Zimmer, im Geschäftsraum, auf dem Boden, oder wo sonst Platz ist, Aufstellung finden kann. und der seinen Bewohnern außer Schutz und Behaglichkeit größtmögliche Bewegungsfreiheit sichert.

Seit 12 Jahren Vogelpfleger, seit 8 Jahren im Besitz eines neuzeitlichen größeren Flugraums, habe ich mit der Veröffentlichung der damit gemachten Erfahrungen immer und immer wieder gewartet, weil ich hoffte, daß sich manches, was ich schildern will, im Laufe der Zeit sich noch verbessern ließe. A. E. Brehms Grundsatz: „Ein Liebhaber, welcher nicht fähig ist, eigene Wege zu gehen, ist auch nicht imstande, die Anderer zu begreifen. Prüfen, selbst tun, beobachten, erfinden muß er, will er sich und seiner Liebhaberei gerecht werden,“ war von jeher auch der meine. Praktische Anregungen aus Liebhaberkreisen sind selten. In langen Jahren sind mir erst zwei geworden, obgleich kaum ein Tag vergeht, an dem mein Flugraum im Kontor, durch das stete Zwitschern der Vögel darauf aufmerksam gemacht, nicht von Vogelfreunden besichtigt wird. Fachzeitschriften geben oft wertvolle Winke, aber unsere „Gef. Welt“ hat leider seit Jahren nichts Ausführliches über diesen Gegenstand gebracht.

Als ich an den Bau meines Flugraums ging, waren mir Literaturhinweise auf ähnliche Einrichtungen nicht bekannt. Ich wußte auch nichts von A. E. Brehms ungünstigem Urteil in seinem vorzüglichen, leider aber nie vollständig gewordenen und jetzt recht seltenen Werke: „Gefangene Vögel. I. Teil. Band 1—2. Leipzig 1872." Mit Absicht übertreibt Brehm dort stark in der Hervorhebung der Schattenseiten der Vogelstube, vielleicht um die Vorteile seines nie zur Ausführung gekommenen Vogelhauses in um so helleres Licht zu stellen. Welcher Vogelfreund wird 300 Vögel in einem Raume vereinigen, wird Papageien mit Starvögeln, Sittiche mit Drosseln, Körnerfresser mit Rallen, Tauben mit Kakadus zusammenhalten? Daß Schlinggewächse, frischer Rasen, Efeu und Blattpflanzen nicht zur Ausschmückung einer so dicht bevölkerten Vogelstube dienen können, ist einleuchtend. Wenn schließlich Brehm die Vogelstube nur zur Züchtung von Prachtfinken und Papageien, zur Bevölkerung mit Edelsängern für geeignet hält, sonst aber nur als Notbehelf erachtet, so muß ich diese Ansicht als überholt und veraltet bezeichnen. Manche seiner Einwände haben aber noch jetzt Geltung. Wer einen Flugraum einrichtet, darf auf nennenswerte Zuchtergebnisse nicht rechnen, kann dem Gesange einzelner Sängerfürsten nicht monatelang lauschen, muß davon absehen, besonders zärtliche Vögel halten zu können, muß in der Auswahl seiner Pfleglinge besonders sorgfältig sein. Anderseits kommen nur im Flugraum, in der Vogelstube der Charakter eines Vogels, sein Triebleben, seine Launen und Gewohnheiten zur vollen Kenntnis seines Pflegers, zu eingehender Beobachtung. „Nur diese Räume gestatten freie Bewegung, bewahren vor unerwünschtem Fettansatz und daraus folgender Trägheit, ermöglichen es dem Vogel, sein Gefieder in voller Schönheit und Ordnung zu erhalten, bringen ihm Zufriedenheit mit seinem Lose und dem Besitzer die Genugtuung, seinen Pfleglingen eine Wohltat erzeigt zu haben, den freudigen Stolz, jedem Besucher einen wirklich schönen und glücklichen Vogel zeigen zu können." (A. E. Brehm.) Daß der Vogel im Flugraum länger in voller Gesundheit, Kraft und Schönheit bleibt, werde ich später, bei der Beschreibung der Arten beweisen können. Zweifellos ist, daß, trotz Verwendung besten Futters, beim Füttern im Flugraum Ersparnisse erzielt werden. Das Reinigen und Versorgen der Vögel beansprucht weit weniger Zeit, als bei der Käfighaltung. Der schwerwiegendste Vorteil ist aber das stete Vor-Augen-haben, die reizvollsten Bilder aus dem Zusammenleben der Vögel, die vielen Beobachtungsmöglichkeiten. Der Flugraum ist eine Quelle der Unterhaltung und Ablenkung von dem oft freudlosen Alltagsleben.

Bei der Schilderung der Einzelheiten des Flugraums verhehle ich mir nicht, daß selbst mit Zeichnungen und Grundrissen eine gute Veranschaulichung kaum möglich ist. Wenige Aufnahmen sollen ein ungefähres Bild der Einrichtung geben. Schließlich sind die Angaben genauer Maße auch nicht das Notwendige, denn die Aufstellung eines neuen Flugraums wird sich immer nach dem vorhandenen Platze richten, wird bei den Materialpreisen und Arbeitslöhnen der Jetztzeit leider zu den Ausnahmen gehören. (Fortsetzung folgt.)

Von der unteren Wolga.

Von Ingenieur Kracht.

(Nachdruck verboten.)

Mein Aufenthalt während der Kriegszeit in einen kleinen Städtchen etwa 150 Werst unterhalb Zarizgus auf dem rechten Ufer der Wolga ermöglichte es mir, eingehenderen Einblick in das dortige Tierleben, insbesondere die Vogelwelt zu tun. Über meine Beobachtungen will ich im folgenden berichten.

Gebirgsstelze.

Vorausschicken möchte ich eine kurze Beschreibung des Geländes. Die Breite der Wolga ist hier zirka $1^1/_2$ Kilometer. Oberhalb des Städtchens teilt sich der Fluß und bildet eine große Insel. Das rechte Ufer (stark sandiger Lehmboden) fällt zirka 30 m hoch senkrecht ab. Auf der Anhöhe breitet sich unabsehbare Steppe aus, vollständig eben, ohne Baum und Strauch, nur mit niedrigem Kraut (meist Wermut) und an tiefer gelegenen Stellen, an denen im Frühjahr das Regenwasser sich ansammelt und lange Zeit stehen bleibt, auch mit Gras und allen möglichen Wiesenblumen bewachsen. Unweit von der Stadt befindet sich solch ein Frühjahrsgewässer von zirka 15 km Länge und 3—4 km Breite. An manchen Stellen finden sich auch Getreide- und Arbusenfelder; sie werden stets mit einem Graben umgeben, um ein Beweiden mit Vieh zu verhüten. Zirka 5 km unterhalb der Stadt liegen in einer Niederung einige Gärten, die Waldvögeln Gelegenheit zum Nisten geben. Das linke Ufer erhebt sich nur zirka 4 m

über den normalen Wasserstand, ist etwas hügelig, von mehreren mehr oder weniger breiten Wasserarmen durchzogen, und bewaldet. Stellenweise finden sich große Wiesen und Sümpfe. Der Sandboden kommt nur noch in den Betten der Wasserläufe zum Vorschein, sonst ist er mit einer schlammigen Erdschicht bedeckt. Artenreich sind weder Bäume noch Sträucher, noch Pflanzen. Der geschlossene Wald wird ausschließlich durch die Weide gebildet; haben die Stämme zirka 25 cm erreicht, so werden sie in zirka 40 cm Höhe vom Boden abgesägt. Der Stumpf schlägt wieder aus und bildet später ein ziemlich dichtes Unterholz, in welchem wieder neue Bäume herangezogen werden. An freieren Stellen — und an solchen fehlt es nicht — trifft man vereinzelte hohe russische Pappeln, Gruppen von Erlen, häufiger Ulmen, Silberpappeln und alte Trauerweiden. Ebenso erblicken wir hier aus dem Grasteppich sich erhebend Gruppen mannshoher Rohrhalme und üppige Gebüsche der Korbweide. Letztere verleiht mit ihren roten Schößlingen dem Landschaftsbild im Winter einen besonderen Reiz. Dieses ganze Terrain wird mit Ausnahme weniger Erhebungen von Anfang April bis Mitte Mai überschwemmt. An allen Bäumen ist der Stamm in Höhe des Wasserstandes (bis zu 3 m!) mit langen Luftwurzeln bedeckt.

Die Vogelwelt der beiden Ufer ist der großen Verschiedenheit des Geländes entsprechend auch grundverschieden. Auf dem rechten Ufer finden wir als normale Brutvögel: Star, Wiedehopf, Bienenfresser, Ufer- und Rauchschwalbe, Haus- und Feldsperling, in Höhlungen nistende Enten und Falken, Dohle, Blaurake und Steinschmätzer, sowie weiter in der Steppe den Steppenadler, einige andere Raubvögel (Adlerbussard, Würgfalk, Steppenweihe), Rebhühner, Trappen, Jungfernkraniche, den gewöhnlichen und Steppenkiebitz, Steppenbrachschwalbe und verschiedene Arten Lerchen. Ein besonderes Gebiet ist die zirka 130 km steppeneinwärts liegende Sarpa, ein ehemaliger Arm der Wolga. Sie besteht aus seichtem Wasser, großen Rohrwäldern und vereinzelten Weidenbäumen und Gebüschen, ist zirka 400 km lang und mehrere km breit, ein wahres Dorado für Vögel. An ihren Ufern tummeln sich Wasserläufer, Uferläufer, Stelzenläufer, gemeine, Silber- und Seidenreiher, Rohrdommeln, Löffler, gemeine Kraniche, alle möglichen Arten von Enten, Gänsen und Schwänen, Möwen und verschiedenes andere mehr. Zu gewissen Zeiten des Jahres und zur Zugzeit sind dort auch Flamingos, Pelikane und die geschätzte Rothalsgans anzutreffen.

Auf dem linken Ufer der Wolga finden wir als normale Brutvögel: Kohl-, Blau- und Beutelmeisen, Weißspecht, Nebel- und Saatkrähen, Elstern, alle möglichen Sumpf- und Wasservögel, sowie verschiedene Raubvögel (Eulen, Weihen, Falken, Fisch- und Seeadler). Vögel, die ihre Nester auf der Erde oder im niedrigen Gebüsch anlegen, finden hier kaum Niststätten, da im Mai und Juni fast dieses ganze Gebiet überschwemmt ist, so daß nur die Kronen der Bäume aus dem Wasser herausragen. Im Juli ist das Gelände ein wahres Paradies für Vögel, überall dichtes Weidengebüsch, in den Wäldern wachsen Kräuter und Gräser, die einem bis zur Brust reichen, überall grünt und blüht es. Aber trotzdem suchen wir die Kleinvogelwelt vergeblich; wenn uns das Glück hold ist, vernehmen wir den Schlag des Buchfinken, das Lied der Sperbergrasmücke, den Spottgesang des Schwarzstirnwürgers, den Ruf des Pirols, evtl. noch die bescheidene Strophe des Grünlings, damit ist die Reihe der Kleinvögel (außer den oben genannten Meisen und Specht) aber auch erschöpft. Zu sonderbar, daß nicht einmal Rohrsänger anzutreffen sind.

Im Winter begegnete ich im Städtchen am rechten Wolgaufer sehr vielen Nebelkrähen, sodann Dohlen und Sperlingen, sowie wenigen Saatkrähen; in den Wäldern am linken Ufer Elstern (zur Nachtruhe kommen die Krähen herüber), Kohl- und Blaumeisen, dann und wann dem Buntspecht, sowie dem mächtigen Seeadler. Famoser Anblick, wenn der stattliche Vogel in der Nähe der Fischer auf dem Eis sitzt, um evtl. zurückgelassene Fische zu verspeisen. Erfreulicherweise gibt es hier keine eifrigen Jäger, sonst hätte er längst seine Zutraulichkeit aufgegeben.

Besondere Gunst bezeugt man dem Star. Im Hof eines jeden Hauses ist eine Stange errichtet, die oben einen Ast oder eine Wetterfahne und ein paar Meter darunter einen Nistkasten trägt.

Ebenfalls beliebt ist die Nebelkrähe, die in sehr großer Zahl in die Stadt kommt und mit Ausnahme der Monate Mai bis August ihr ständiger Gast ist. Sie suchen auf den Düngerstätten der Höfe die Abfälle auf. Ihre Schwester, die Saatkrähe, kommt nie in die Höfe; ihr Besuch beschränkt sich auf die Straßen. Weit zahlreicher trifft man sie an flachen Stellen des Flußufers an, wo sie die Fischleichen verspeist. (Fortsetzung folgt.)

Aus den Vereinen.

A. Z. Angemeldet sind die Herren Oskar Lohmann, Magistratssekretär, Harzgerode, Oberstraße 20; Gustav Gagsteller, München, Verschaffelstraße 14 ptr.; Mohr, Oberpostsekretär a. D., Stralsund; Carl Otto, Magdeburg-S., Lutherstraße 22; Adolf Voigt, wissenschaftlicher Rechner, Jena, Feodorastraße 13; Friedr. v. Lukanus, Oberstleutnant a. D., Berlin W, Lessingstraße 32; Frau E. Pölz, Hamburg 24, Mühlendamm 12; Eberhard Stümke, Bankvorsteher, Vegesack b. Bremen, Gerhard Rolfstraße; Franz Kerscheit, Tilsit, Inselstraße 5; Emil Funck, Swinemünde, Gartenstraße 11/12, Vorderh. 3 Tr.; H. Unger (Chile), Santiago de Chile, Casilla 3576. — Aufgenommen sind die Herren Mitglieder Nr. 243 Martin Jansen, Oberkommissar, Marienberg (Westerwald); Mtgl. 244 Karl Ottinger, Gärtnereibesitzer, München, Fasanerie Nord, Lindenstraße 265; Mtgl. 245 Max Pfaller, Oberassistent, München, Auenstraße 78/I; Mtgl. 246 Adam Keilmann, Bensheim a. d. B., Liesengasse 7; Mtgl. 247 Fritz Pölz, Hamburg 24, Mühlendamm 12; Mtgl. 248 Wilhelm Müller, Bruchsal (Baden), Württemberger Straße 85; Mtgl. 249 Eugen Dreher, Bankbeamter, Tiefenstein (Birkenfeld), Rheinland; Mtgl. 250 F. Reck, Sulingen i. Hannover. Den neu aufgenommenen Mitgliedern wird vorerst das Rundschreiben vom 31. Dezember 1922 zugestellt, wonach Aufnahmegebühr und Beitrag zu bezahlen sind. Wird Mitlieferung des zweiten Jahrbuches (1922) gewünscht, so sind hierfür 50 M. besonders zu entrichten; entsprechende Mitteilung sind auf Zahlkartenabschnitt erwünscht. — Mtgl. 19 Porzelt, München, gibt 1,0 Rußköpfchen in Tausch gegen 1,0 Singsittich, 0,1 Amarant gegen Glanz. Mtgl. 22 Schulz, Stettin, gibt ab 1,1 Bandfink in Tausch gegen 1,0 oder 0,1 Grauedelsänger; kauft 1,0 Grauedelsänger. Mitglied 55 Saller (jetzt Planegg b. München, Christinestraße 7)

sucht Wellen- und größere Sittiche, Prachtfinken, besonders Mövchen und Zebras. Mtgl. 79 Neckermann, Ansbach, sucht dringend 0,2—0,3 grüne Wellensittiche 1921 oder 1922; 1,1 Farbenwellensittiche, Nymphen- und Singsittich. Mtgl. 82 Aumüller, Delitzsch, sucht zu kaufen oder zu tauschen: Alle selteneren Sittich- und Lorisarten, einzeln und in Paaren, insbesondere 0,1 Rotflügel, 1,0 Bulla-Bulla, 0,1 Kragensittich, 0,1 Gebirgslori, 0,1 Rotnackenlori, gibt evtl. in Tausch je 1,0 Rotflügel, Bulla-Bulla, Rotnackenlori, 3—4 Königssittiche, diesjährige Zucht. Die zum Tausch zur Verfügung gestellten Vögel sind nicht gegen Geld verkäuflich. Mtgl. 125 Lücke, Badbergen, sucht 4,4 grüne Wellensittiche, je 1,1 Mövchen, Zebrafink oder andere Exoten; gibt evtl. zwei- bis dreihundertjährige in Leder gebundene Bibeln oder große Romane in Tausch. Mtgl. 148 Lentze, Osnabrück, sucht 0,1 braunbunte oder gelbbunte Mövchen im Tausch gegen 0,1 braunbunte zwecks Blutwechsel. Mtgl. 165 Zehetner, München, sucht 1,0 Schmetterlingsfink, evtl. in Tausch gegen 0,1. Mtgl. 225 Dr. Amersberg, Heidelberg, sucht schnell 1,0 Grauedelsänger, 1,1 Dompfaffen. Mtgl. 233 Frl. Hirsch, Aubstedt, sucht je 0,1 Kanarie, orangefarben, satingrün, fuchsfarben, isabellfarben 22er Brut, gesund und fehlerlos. — Am 31. Dezember ist ein Versammlungsbericht ausgegeben worden; Mitglieder, die einen solchen nicht erhalten haben, wollen sich gefl. umgehend melden, da derselbe die neuen Beiträge enthält.

A. Krabbe.

Vereinigung der Liebhaber einheimischer Vögel zu Berlin. Generalversammlung am Dienstag, den 9. Januar 1923, abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Zum Alexandriner", Alexandrinenstraße 37a. Tagesordnung: 1. Verlesen des Protokolls; 2. Jahresbericht des Schriftführers; 3. Jahresbericht des Kassierers: 4. Jahresbericht des Bibliothekars; 5. Neuwahl des Vorstandes; 6. Prämiierung der Aussteller; 7. Anträge. In Anbetracht der wichtigen Tagesordnung ist das Erscheinen der Mitglieder besonders erwünscht. Gäste haben zu dieser Sitzung keinen Zutritt.

Der Vorstand. J. A.: P. Böhme, Schriftführer,
Berlin O 17, Rüdersdorfer Straße 69.

Vereinigung hannoverscher Vogelliebhaber. Die leidige Futterfrage kam auch in der Oktoberversammlung zur Erörterung. Die Aussichten für die Futterbeschaffung sind trübe. Es wäre recht wünschenswert, wenn in der „Ges. Welt" die Bekanntgabe von Ersatzfuttermitteln und deren Bezugsquellen öfter erfolgen würde. Mit der sogenannten Vogelkleie, die in Thüringen viel verfüttert wird, konnten sich die Hannoverschen Liebhaber nicht befreunden. Erbsen- und Mohnmehl, mit Schmalz angerührt, soll besonders als Schamafutter vorzüglich sein. Die so gefütterten Tiere, die ich zu Gesicht bekam, sahen, ohne Mehlwurmbeigabe, vorzüglich aus. (Genaues Rezept soll möglichst später bekanntgegeben werden.) Para- und Erdnüsse konnten wir preiswert abgeben. Die Körnerfresser bevorzugen die ersteren, die wie Haselnüsse schmecken. Zweckmäßige Mehlwurmkisten gelangten zur Ausstellung und fanden Abnehmer. Herr Veit unterhielt uns dann über die Dorngrasmücke. Sein schöner Pflegling konnte den Mitgliedern gezeigt werden, die das ruhige, tadellose Tier bewunderten. Pflege, Haltung, der Gesang und das Wesen dieses empfehlenswerten Vogels schilderte der Vortragende eingehend und sachlich. Herr Appel verlas dann mit gewohnter Kennerschaft den zweiten Teil von Prof. Wellmanns plattdeutschen Vogelgeschichten „Mal wat von use Vagels". Die warme, zu Herzen gehende Schreibweise fand viel Beifall, noch mehr aber der Vortrag selbst, den uns Prof. Wellmann, Bremen, in der Novemberversammlung hielt. Zur Jahresfeier der Gründung der Hannoverschen Vereinigung hatten wir Freunde und Bekannte eingeladen, und wir sahen zu meiner Freude ein volles Haus. „Unsere Vögel und ihre Gesänge" lautete das Thema. Prof. Wellmann wies zuerst auf die Schwierigkeiten hin, die die Bestimmung eines Vogels im Freien mit sich bringt. Er gab dann die Mittel an, die es auch dem nicht wissenschaftlich gebildeten Naturfreunde ermöglichen, seine Lieblinge draußen zu erkennen: Aufenthalt, Gestalt, Größe, Farbe, Gebaren und besonders die Stimme. Mit großem Geschick ahmte der Vortragende die Vogellieder nach und machte auf die Unterschiede und die charakteristischen Gesänge der einzelnen Arten aufmerksam. Ein kurzer Gang durch einen Park, einen Wald mit den gefiederten Sängern, die sich dort aufhalten, die man da erwarten kann, schloß sich dem an. Nach dem Vortrage ganz reizender plattdeutscher Dichtungen, die allgemein gefielen und hoffentlich in Buchform erscheinen werden, führte Prof. Wellmann die Reichschen Schallplatten vor. Der Gesang der Amsel, des Sprossers und der Nachtigall ertönte in überraschender Naturtreue an das Ohr der lautlos zuhörenden Besucher. Lebhaftester Beifall wurde dem Vortragenden für seine ungemein volkstümlichen, herzerfrischenden Ausführungen, die von wissenschaftlichem Ernst getragen, von sonnigem Humor durchflutet wurden. — Acht neue Mitglieder meldeten sich am gleichen Abende. Das erste Hundert werden wir bald erreicht haben. Der Mitgliederbeitrag mußte leider den Zeitverhältnissen entsprechend erhöht werden. In der Dezemberversammlung las Herr Braun aus drei neuen Vogelbüchern je eine besonders anziehende Erzählung, und zwar aus Meerwarth u. Soffel, „Von Spechten", Freiherr von Kapherr, „Kolk der Rabe", und Albin Rath, „Brunftkämpfe". Die Geschichten und die Art des Vortrags fanden Beifall. — Die Saalfrage, die Kosten für Getränke, die den Mitgliedern den Abend stark verteuern, kamen zur Besprechung. Es sollen Wege gesucht werden, unsere Vereinsabende trotz der Ungunst der Verhältnisse auch ferner allmonatlich abzuhalten.

Troschütz.

Verein für Vogelschutz und -pflege zu Jena. Der Vorstand besteht aus den Herren Herm. Jahn, Vorstand; Alfred Sack, Kassierer; Franz Borggreve, Schriftführer. Die Vereinsabende werden jetzt in den Räumen des Naturwissenschaftlichen Vereins im „Geleitshaus" abgehalten. Die nächste Versammlung findet Dienstag, den 9. Januar 1923 statt. 1. Vortrag des Herrn Borggreve über das Familienleben der Vögel; 2. Berichterstattung über die Vogelausstellungen zu Berlin und Leipzig. Die Hauptversammlung findet Dienstag, den 23. Januar 1923, und alle weiteren Zusammenkünfte in Abstand von 14 Tagen statt. Gäste sind stets herzlichst willkommen. Sämtliche Zuschriften sind an Herrn Herm. Jahn, Jena, Feodorastraße 7, zu richten. Borggreve, Schriftführer.



Herrn J. H., Brüssel. Die männlichen Vögel sind an sich schon widerstandsfähiger als die weiblichen, außerdem werden sie in den Züchtereien sorgfältiger behandelt. Die Weibchen werden häufig in größerer Anzahl in stark erwärmten Räumen gehalten und fühlen sich dabei sehr wohl, selbst die jungen und auch die schwächlichen Tiere. Sie sind dann aber für die schädlichen Einflüsse des Witterungswechsels sehr empfänglich und schon ein kürzerer Transport in der kalten Herbstluft wird ihnen gefährlich. Erkrankungen der Atmungs- und Verdauungsorgane sind die Folge, die nicht selten einen sehr schnellen tödlichen Verlauf haben.

Herrn G., Wiesbaden. Die „kleinen Tierchen" sind Mehlmilben. Um diese aus dem Mehlwurmtopf zu entfernen, stellt man den mit einem Tuch überdeckten Topf auf die mäßig heiße Herdplatte. Die von unten aufsteigende Wärme treibt die Milben in das Tuch. Hier können sie dann durch Übergießen mit kochendem Wasser getötet werden. Das Verfahren wird so lange wiederholt, bis sich Milben nicht mehr zeigen. Die kleinen braunen Käfer und die „Maden mit schwarzem Kopf" sind Pelzkäfer und deren Larven. Man sucht sie heraus und verfüttert sie. Mehlwürmer sind glatte, glänzend gelbe Larven des schwarzbraunen Mehlkäfers, der etwa 12—15 mm lang wird. — Besser als die ausschließliche Ernährung mit trockenen Ameisenpuppen ist die mit einem Futtergemisch. Man gewöhnt die Vögel daran, indem man 2 Teile Ameisenpuppen mit 1 Teil des Gemisches vermengt und die Menge des letzten ganz allmählich vermehrt, die der Puppen dementsprechend vermindert.

Vogelfutter

für **Kanarien, Waldvögel, Exoten, Papageien, Weichfresser.** Anfragen nur gegen Rückporto. Liste 13 über Vogelfutter 10 *M*, Liste 5 über Vogelkäfige, Zuchtgeräte usw. mit etwa 400 Abbildungen 50 *M*. [1

W. Göpel, Leipzig,
Tröndlinring 1 Telephon 14958.

Qualitätsfutter Sanitas

aus gar. nur erstkl. milbenfr. Ingred.
1 Kilo-Pak. 360 *M*, 5 Pak. à 350 *M*. [2
Sanitasverlag Heidelberg 46.

Ornis-Haus

Halle-Saale.
Gegründet 1912.

Reform-Normal-Weichfresserfutter und Körnermischfutter

Tagespreise.
Bei Anfrage Rückantwort.
Ornis-Buch M. 50.—. [3

[4]

Wir versenden zu Tagespreisen, soweit Vorrat reicht:

Mehlwürmer,
¼-pfund- und pfundweise,
Universalfutter für Weichfresser.
5] Anfragen ohne Rückporto keine Antwort.
D. Waschinski & Co.
Biesenthal b. Berlin.

Ameiseneier [6
auch ins Ausland liefert
H. Pullich
Bad Homburg 4
Anfragen Rückporto beilegen.

Reform-Käfige

Zerlegbar · Leichteste Reinigung · Einfachster sicherer Transport
1. Preis beim Käfig-Wettbewerb Leipzig 1919 (s. Ges. Welt 1920, Heft 14—16)
werden für alle Vogelarten hergestellt.
Goldene Medaille Leipzig 1921.

Ausführung: Hartholz, grünlackiert oder naturlackiert, Zinkschublade, Porzellannäpfe, Ledertuchdecke.
Keine Fabrikware, sondern beste Spezialarbeit!
Anfertigung als Kistenkäfig oder Wiener Form (halboffen) oder halboffen mit fester Rückwand. Ohne jedes Werkzeug in einer Minute zusammengestellt resp. zerlegt. Verpackung zum Selbstkostenpreis.
Fertigen auch jede Art Käfige u. Volieren n. Zeichnung od. Maßangabe.

Anfragen Rückporto beifügen
Katalog gegen Einsendung von 5 Mark in Briefmarken.

Schlagnetze ohne Mittelsteg
für schädliche Vögel, prima handgeknüpfte Ware.

Kühn & Muschter, Borna b. Leipzig, Kasernenstr. 4.
Spezialwerkstätte für Käfigbau.
Bank-Konto: Allgemeine Deutsche Credit-Anstalt Zweigstelle Borna.
Postscheck-Konto: Leipzig 92250. Fernsprecher 147. [7
Zahlreiche Anerkennungs- und Dankschreiben.

Papageien Kanarienhähne Bastarde

kauft höchstzahlend und tauscht auch auf Exoten

Willy Odenwald, Fulda.

Eigner Export und Import. [8

[9] **Suche zu kaufen** auch durch reelle Händler Ia Männchen Schamadrossel, amerik. Spottdrossel, je 3 Stück gut eingewöhnte Männchen Heide-, Feld- und Haubenlerche, Baumpieper, Gartenspötter, Mönch- und Gartengrasmücke sowie kleine Sumpf- und Wasservögel (nicht über Lerchengröße), z. B. Flußuferläufer und Halsbandregenpfeifer. Von allen Gattungen auch junge Männchen aus erster Brut. Suche jeden Posten Ameisenpuppen, Eintagsfliegen, Daphnien, Seidenwürmer, Mehlwürmer, Ia Weichfutter und etwa 1—3 Zentner reinen Bienenhonig. Suche ferner für eigene Bibliothek **Vogelliteratur** von Naumann, Brehm, Liebe und anderen Ornithologen. Angebote nur mit festem Preis freundlichst erbeten, möglichst nur per Postkarte **Peter Matzen, Göttingen.**

Im Interesse unserer verehrl. Abonnenten bitten wir das

Abonnement auf die „Gefiederte Welt"

rechtzeitig erneuern

zu wollen. Die Gefiederte Welt kann sowohl **durch den Buchhandel** als auch **beim Postamt für 45 Mk. für das Vierteljahr** bestellt werden.

Direkte Zusendung vom Verlage kann nur noch ausnahmsweise und **nur gegen vorherige Einsendung von 90.— Mk.** für das Vierteljahr — Postscheckkonto Magdeburg 3148 — erfolgen, **nach dem Ausland nur gegen Voreinsendung von 2 Schweizer Francs** (bezw. in entsprechender Umrechnung in anderer Währung).

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg
Postfach 148

Vögel

Kaufe zu höchstem Preise:
1,1 Schamadrossel,
1,1 Mövchen,
1,1 Zebrafinken,
1,1 Astrilde.
10] **Prof. Kinast,**
Ueberlingen am Bodensee.

Liebhaber sucht:

1 Blaudrossel, 1 Steindrossel, 1 Orpheusgrasmücke, 1 Sprosser, 1 Blaurake auch einzeln zu kaufen. Gefl. Offerten mit Preis an [11
W. Lücker, Görlitz, Mühlweg 15a.

Kaufe zwecks Einricht e Vogelstube nur Zuchtp. Orangebäckchen, Helenafasänchen, Goldbrüstchen, Amaranten, Aurora-Astrilde, Zebrafinken, Tigerfinken, gr. Astrilde, Spitzschwanzamand., kl. Kubafink, rotk. u. lauchgrüne Papageiamand., Wellensitt., Schamadrossel, Sprosser u. a. Prachtfinken. Gebe jg. Schmetterlingsfinken ab. **Ernst Petrich,**
Plauen i. V, Jößnitzer Str. 145. [12

Suche zu kaufen

♂ und ♀ Kirschkernbeißer, Zitronenfink, Schneefink, Hakengimpel, Fichtenkreuzschnabel und Karmingimpel. Angebote an [13
Franz Kerscheit, Tilsit.

Steinkauz

zu kaufen gesucht. Gefl. Offerten erbitte unter „Steinkauz" an die Geschäftsstelle d. „Gef. Welt". [14

Suche

3,3 grüne und 2,2 gelbe Wellensittiche oder auch einzelne Tiere für eigene Zucht zur Blutauffrischung und zahle höchsten Liebhaberpreis. Angebote mit Altersangabe erbittet
Paul Wisniewsky, Leipzig-Eu., Görlitzer Str. 8. [15

4000 Mark

zahle ich für 0,1 Wellensittich, grün, gesund und zuchtfähig, Alter ca. 1 Jahr. Umgehende Angebote erbeten an
W. Keidel, Hildesheim, Orleansstraße 37. [16

Gebe ab:

3,2 Tigerfinken,
1,1 Goldbrüstchen,
nur in Tausch gegen ausländ. Sänger, gelbe Wellensittiche usw. oder „Gefied. Welt" 1904—1913, gebd., kaufe auch solche. [17
Karl Durau, Duisburg,
Musfeldstraße 6a.

Kaufe

pa. tiefschall. nord. Sprosser, pa. Nachtigall, pa. Garten-, Sperber-, Dornschwarzköpfige Grasmücke, pa. Gelbspötter, pa. Stein- und Blaudrossel, pa. Feld- und Heidelerche, Baumpieper, Wachtel. Bitte nur pa. **pa. Sänger und garant. gesunde Vögel anzubieten.**
A. Kuntze, Chemikalienfabrik,
Calbe a. Saale. [18

Verkaufe 1 Dominik. Kardinal, fleißiger Sänger, Is im Gefieder, gegen Höchstgebot, tausch gegen andere Vögel. [1
N. Diwersy, Merzig a. Saar.

Suche zu kaufen 1 Schamadrosse (Männchen), zahle Franc oder Mark, tausche eotl. auch gege Anzugstoffe. [2
N. Diwersy, Merzig a. Saar.

Kaufe alle zuchtfähigen Zuchtpaar Zebrafinken, jap. Mövchen Wellensittiche und andere Exoten, ferne Bücher usw. Bezahle in Mark ode tsch. Kronen und kaufe alles. [2
R. Skaruda, Zabřeh a. Oder,
(Mähren, Č. S. R.).

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Hermsdorf bei Berlin; für den Anzeigenteil: Franz Wunderlich, Magdeburg, Postschließfach 148.
Verlag der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck: August Hopfer, Burg Bz. Mgdbg.

Jahrgang LII.
Heft 2. 18. Januar 1923.

Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Die Gefiederte Welt gelangt am Donnerstag nach dem 1. u. 15. jedes Monats zur Ausgabe und kostet vierteljährlich 45.– Mark. Einzelpreis des Heftes 10.– Mark.
Inserate für die folgende Nummer müssen bis spätestens Freitag früh in Händen der Verlagsbuchhandlung sein.
Die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 10.– Mark berechnet.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung (M. Kretschmann) in Magdeburg.

Postschließfach 148. Postscheckamt: Magdeburg 3148. Fernsprecher: 1323.

Vom Verschwinden der Nachtigall.

Von Lehrer W. Marquardt, Salzhausen.

(Nachdruck verboten.)

Zwei kleine Erlebnisse sollen vorweg erwähnt werden. Im vorigen Jahre ging ich mit einem Naturfreunde durch den Wald. Als plötzlich eine Nachtigall zu schlagen anfing, bemerkte mein Begleiter: „Da höre ich endlich einmal wieder eine Nachtigall. Wir hören sie heute leider selten." Auf meine Frage, worin wohl das Verschwinden der Nachtigallen seine Hauptursache fände, bemerkte er, daß die Schwarzdrossel die Nachtigall vertreibe. — Das zweite Erlebnis folgte ein halbes Jahr später, im Winter. Ein Bauer schoß auf Schwarzdrosseln, die alljährlich zur Winterszeit scharenweise ins Dorf kommen. Ich dachte, für die hungernden Drosseln Partei zu nehmen und bat ihn, das Schießen zu lassen. Er antwortete aber, daß es „zu viel Schwarzdrosseln" gäbe, und diese auch die lieblichen Nachtigallen aus den Gärten verjagten. Er müsse mithin den Schwächeren zu Hilfe kommen. — Diese beiden Erlebnisse gaben mir Anlaß zum Nachdenken. Es ist Tatsache, daß die Nachtigall immer mehr verschwindet, daß die Schwarzdrossel aber zunimmt. Sollte in dem Auftreten der einen das Verschwinden der andern Art begründet sein?

Der Nachtigall wird im besonderen auf dreifache Weise nachgestellt: Auf ihrem Fluge nach dem Winterquartier durch die Falle, während des Brütens durch Raubzeug und in ihrem ganzen Dasein bei uns durch die Schwarzdrossel, denn diese scheint der Nachtigall nicht den Platz zu gönnen. Daß ihnen mittels Fallen nachgestellt wird, und daß sie in der Brütezeit stark durch Katzen, es brauchen gar keine verwilderte zu sein, gefährdet sind, weiß jeder, der in das Leben der Vögel hineingeschaut hat. Daß das Verschwinden der Nachtsängerin aber auch im Zunehmen der Amsel zu suchen ist, scheint zunächst eine Täuschung, eine Einbildung, zu sein.

Jeder Vogelkenner weiß, daß die Nachtigall ein Bodenbrüter ist; ihr kleines Nest ist unmittelbar am Boden zu finden. Der Platz ist nicht gut gewählt, namentlich nicht, weil sie immer in der Nähe der Wohnungen blieb. Kiebitze, Lerchen sind in dieser Weise besser daran, obgleich auch sie Bodenbrüter sind. Unter den abgefallenen Blättern sind viele Insekten, Würmer und dergleichen zu finden, die der Nachtigall den Tisch immer decken. Sie ist es aber nicht allein, die das Laub auf der Suche nach Futter durchstöbert, auch die Drossel sucht in derselben Weise. Daß sich da diese beiden Arten häufig treffen, braucht nicht erwähnt zu werden. Die Nachtigall ist uns als ein scheuer, zurückhaltender Vogel bekannt, der gerne die Gesellschaft meidet, der andern Vögeln nie zu nahe kommt. Das Gegenteil von ihm ist die Schwarzdrossel im Laufe der Jahre geworden. Ich habe indes nie bemerken können, daß sie sich an die Bruten der Nachtigall oder an die anderer Vögel machte. Sie ist mir aber bekannt als ein kampfesmutiger Vogel, ja, sie ist oft geradezu frech. Das beobachtete ich im Winter 1920. Ich hatte den Amseln Apfelstücke auf ein Brett gelegt in dem Garten. Die Amseln lieben es, so gefüttert zu werden, und ich konnte in keinem Fall feststellen, daß es ihnen zum Schaden wurde. An einem Mittag sah ich, wie zwei Amseln, Männchen und Weibchen, heftig miteinander um ein Apfelstückchen kämpften. Zuerst regte sich ein Mitleid für das Männchen in mir, als ich sehen mußte, daß das Weibchen mit Schnabelhieben und Flügelschlägen nicht fackelte, daß das Männchen infolgedessen den Kampfplatz räumte; schließlich dachte ich aber an das alle Natur einschließende gewaltige Wort „Kampf ums Dasein". Dieses Beispiel zeigt, daß die Amsel nicht bange ist, wenngleich in diesem Falle auch die Not des Winters zu berücksichtigen ist. Daß unsere Turdus merula so leicht keine Gefahr scheut, geht auch daraus hervor, daß sie ihr zweites Nest dicht neben das erst

vor einigen Tagen zerstörte erste Nest baut. Daß sie anderen Vögeln die Bissen des winterlichen Futterplatzes streitig macht, auch ihren eigenen Artgenossen, hat mancher Vogelfreund beobachtet. Sollte sie nicht so mutig gegen die schwächliche Nachtigall sein, namentlich auch schon deshalb, daß sie so zahlreich auftritt? Die Nachtigall gibt unbedingt nach. Wo ihr Nest einmal zerstört wurde, dahin kommt sie nie zurück.

Wenn Prof. Voigt in seinem Buche „Unsere Singvögel“ (Quelle & Meyer, Leipzig) schreibt: „Die Amsel soll durch ihr wildes Wesen anderen Singvögeln die Gärten, wo sie dominiert, verleiden ....“, so muß ich die Möglichkeit des „Verleidens“ streichen und der Drossel einen wesentlichen Teil der Schuld an der Verdrängung der Nachtigall zusprechen. Wenn die Nester der Nachtigallen durch Raubzeug gestört werden, also darin der Grund des Verschwindens aus den Gärten zu suchen ist, so müssen wir doch dasselbe von den Nestern der Amseln auch sagen. Sie nistet zwar oft in Bäumen, meistens jedoch in Hecken. Da ist sie ebenso unsicher gegen Feinde wie die Nachtigall am Boden. Wenn wir nun auch der Schwarzdrossel nicht die ganze Schuld geben an dem Seltenerwerden der Nachtigallen, so fällt ihr aber doch ein Teil der Schuld zu. Übrigens hielten sich die Menschen vor Jahrzehnten, als es noch Nachtigallen in Menge gab, auch schon Katzen, die, genau wie die heutigen, den Vögeln nachstellten. Warum sollte nun, wo die Schwarzdrossel eindringt, die Katze die Schuld am Verschwinden der Nachtigall haben?

In der Natur haben wir bekanntlich mehr Beispiele, die uns anzeigen, daß, wenn ein Wesen in eine Lebensgemeinschaft eindringt, ein anderes verschwindet. Herr Krabbe, Anklam, schreibt von seiner Heimat („Gef. Welt“, Jahrg. 49, S. 119), daß dort die Nachtigall durch den Sprosser verdrängt wird. Die Wanderratte verscheuchte auf ihrem Eroberungszuge die Hausratte fast vollständig.

Es ist nicht meine Aufgabe, das Nähere zu untersuchen, warum die Amsel denn jetzt gerade sich in den Garten des Menschen gewöhnt. Aber ich will doch darauf hinweisen, daß unsere schönen, deutschen Laubwälder — der Laubwald ist Lebensbedingung für die Amsel — uns Norddeutschen zu allermeist, fast nur noch aus den Märchen bekannt sind.

Wenn Herr Krabbe nachfragt (49. Jahrg. S. 119), ob es beobachtet sei an anderen Orten, daß die Nachtigall vom Sprosser verdrängt wurde, so muß ich für unsere Gegend — Lüneburger Heide — von einer Verdrängung der Nachtigall durch die Schwarzdrossel Mitteilung machen.

Der Innenflugraum.

Von Alfred Troschütz, Hannover.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Für die Beherbergung von 60—70 Vögeln ist ein Raum von 3 m Länge, 2 m Breite und 2 m Höhe vollständig ausreichend, wenn größere Vögel, wie Drosseln u. a. nur in einzelnen Stücken gepflegt werden. Als Baustoff dienen Holz, Glas und Drahtgaze. Der Boden und eine Wand werden ganz aus Holz, eine Wand aus Glas (in kleinen oder größeren Scheiben in Holzfassungen), zwei Wände, darunter die mit der Eingangstür, aus engmaschiger Drahtgaze in Holzrahmen, die Decke aus Glas, wenn der Beherbergungsraum der Vogelstube Oberlicht besitzt, sonst aus Holz hergestellt. Abweichungen sind möglich, wenn nur für viel Helligkeit und gute Durchlüftung Sorge getragen wird. Die Verwendung von Mattglas für die Seitenwände, von Drahtglas für gefährdete Flächen, hat sich bewährt. Die Reinigung geht viel leichter vor sich. Wände, Boden und Decke werden durch Schrauben zusammengehalten und sind auseinandernehmbar. Um genügende Festigkeit zu erzielen, darf nicht zu schwaches Holz gewählt werden. Den Boden des Flugraums mit Zinkblech auszulegen empfiehlt sich auch dann, wenn auf Anlage größerer Wasserbecken und auf einen Springbrunnen verzichtet wird.

Alle Vogelstuben, die ich durch Augenschein, in Schrift und Bild kennen gelernt habe, waren mit dem Nachteil behaftet, daß der Boden des Flugraums auf dem Fußboden des Zimmers aufliegt, der Beschauer also auf die Vögel herabsieht. Es ist dies Raumverschwendung, abgesehen davon, daß eine gute Beobachtung, eine bequeme Fütterung und leichte Reinigung erschwert wird. Richtet man es so ein, daß der Boden des Flugraums in etwa 1.20 m Höhe zu liegen kommt, so bleiben nach oben noch mehr als 2 m Höhe des Wohnraums verfügbar. Der darunter bleibende Raum kann dann für Futterkästen, die mäusesicher sind, für Aufbewahrungsräume für Gerätschaften usw. Verwendung finden. Ich gebrauche sogar nur den vierten Teil des Unterbaus meiner Vogelstube und kann drei weitere Teile Geschäftszwecken dienstbar machen.

Den Zugang zum Flugraum bildet ein kleiner, völlig abgeschlossener Vorraum, dessen Türen durch Selbstschließer ein Entweichen der Vögel verhindern. Drahtgaze in Holzrahmen bildet den Baustoff. Diesen kleinen Raum so zweckmäßig wie möglich auszugestalten, hilft Fütterung und Versorgung der Vögel wesentlich erleichtern. Ein schmaler Klapptisch dient zum Anrichten des Futters, der Raum darunter zur Aufbewahrung der dazu benötigten Futterstoffe und Geräte. Darüber finden leere Kästen und Käfige Platz. Zur rechten Hand liegen unten die Kästen, die Ameisenpuppen, Weißwurm, Körnerfutter, trockene Vogelbeeren und alles sonstige Futter aufnehmen, auch solche, in die alle Vorräte von kleinen Gerätschaften, Näpfe, Sitzstangen u. a. verstaut werden. Mit einem Griff ist zur Hand, was gebraucht wird. In der Ecke lehnt noch eine Klappleiter zum Hineinsteigen in den Flugraum. Auf $1^1/_2$ □-m Raum ist alles untergebracht.

Nun zur inneren Einrichtung: Alle Holzteile sind mit weißem (Elfenbein-) Lack viermal gestrichen. Die weiße Farbe hat sich bestens bewährt, gibt dem Flugraum ein helles freundliches Aussehen, läßt sich mit Wischlappen, nassem Sand und etwas Salzsäure vorzüglich reinigen und sauber halten. Die „Verdauungsprodukte“ wirken an weißen Wänden am wenigsten auffallend.

Etwa einen halben Meter unterhalb der Decke läuft an zwei Seiten des Flugraums, der Eingangs-

tür und der Schauseite entgegengesetzt, ein 40 cm breites Laufbrett, mit Linoleum und dann mit Torfstücken belegt. Diese „Galerie" bildet für eine ganze Anzahl Vögel den bevorzugten Aufenthalt, für alle das „obere Stockwerk", zu dem es hinauf und herunter geht. Eine Feldlerche, die ich seit 4 Jahren pflege, hat dies Laufbrett noch nie verlassen. Da oben stehen natürlich auch Futter- und Trinknäpfe, schon um Drängeleien an der unteren Hauptfutterstelle zu vermeiden. Der ängstliche, vorsichtige Vogel sucht die oberen Futterstellen auf, der eingewöhnte die unteren. Die Beobachtungsmöglichkeiten sind bei der Schmalheit des Laufbretts trotzdem gewahrt.

Mit einem Blicke kann ich den ganzen Flugraum übersehen, kann ich die Bewohner auf ihren Gesundheitszustand hin beobachten. Alle Pflanzendickichte, verborgene Winkel und Ecken sind vom Übel. Unmittelbar unter dem Laufbrett sind verschiedene Harzer Bauer, kleine Käfige, nach der Schauseite zu auch ein auf drei Seiten offener größerer Drahtkäfig, angebracht, und zwar dicht an Wand und am Laufbrett anliegend. Zwischenräume müssen vermieden werden. Sie sind für junge Vögel und Neuankömmlinge gefährlich. Es erleichtert die Sauberhaltung, wenn die kleinen Käfige mit Zinkblechschubladen versehen sind. Harzer Bauer bekommen, wie auch die größeren Käfige im Flugraum, eine Torfmulleinlage, die besser ist, als Sand und Zeitungspapier.

In gut verteilten Abständen hängen an drei Wänden lange, schmale, viereckige, weiß oder grüngestrichene Blechgefäße, ähnlich den langen Blumenvasen. In diese mit Wasser gefüllten Behälter kommen die frischen Pflanzensträuße, die Feldblumen, die Zweige der Lärche, der Weißtanne, der Weimutskiefer, die Unkrautstengel, Büsche von Wasserminze, Vogelmiere, halbreifen Gräsern und all' das „Grüne", was Vögel lieben und fressen. Es ist gut, dem Wasser einige Körner übermangansaures Kali beizufügen, um dem zu raschen Fauligwerden vorzubeugen. Wird das Wasser sonst nicht alltäglich erneuert, riecht es bald abscheulich. Mit Beigabe von übermangansaurem Kali ist ein Wechsel nur alle zwei Wochen erforderlich. Heidekraut und Gräser halten sich besser in Gläsern ohne Wasser.

Unter, auch zwischen die Behälter, die die Pflanzensträuße aufnehmen, werden die „Sprunghölzer" angebracht. Zum Zwecke leichter Entfernung bei der Reinigung der Wände stecken die Äste in weißlackierten „Tüllen" aus Zinkblech. Mancherlei Holzarten sind verwendbar. Am geeignetsten ist der Weißdorn durch seine Zähigkeit, Härte und seine vielseitigen Veräftelungen. Beim Herausschneiden aus dem Gebüsch ist Schutz der Hände durch starke Handschuhe ratsam. Man wähle verschiedene starke Zweige, solche, die wagerecht, andere, die krumm und schief gewachsen sind. Immer muß ein „Decken" der Zweige, der unausbleiblichen Beschmutzung wegen, vermieden werden, müssen alle Dornen entfernt, alle Äste gut geglättet werden. Solche Zweige sind jahrelang benutzbar und sehen weit besser aus, als die langweilige „Treppe" aus Rundstäben. (Fortsetzung folgt.)

I. Große Vogelschau der Vereinigung der Vogelliebhaber, Landesverband Preußen, und XII. Allgemeine Ausstellung des Kanarienzüchter- und Vogelschutzverbandes e. V., Sitz Berlin, vom 15.—17. Dezember 1922.

Was Liebe zur Sache, Unternehmungsgeist und zähe Energie auch unter den ungünstigsten Umständen

Wasseramsel.

vermögen, davon war die Vogelschau ein sichtbares Zeugnis. Daß die gegenwärtigen Zeitumstände mit ihrem lähmenden politischen Druck und ihrer längst ins Unerträgliche gesteigerten Teuerung einer Veranstaltung, die auf rein idealen Interessen aufgebaut ist, besonders günstig seien, wird niemand behaupten wollen. Um so mehr Beachtung verdient daher, was hier geleistet worden ist. Man vergaß, daß man in dem unglücklichsten und ausgesogensten Lande der ganzen Welt und in der trostlosesten aller Zeiten lebt, und fühlte sich in die Zeit vor dem Krieg zurückversetzt — das allein deutet zur Genüge den Gesamteindruck an, den man beim Durchwandern der schönen, hellen und luftigen Ausstellungsräume empfing. Was gab es aber auch alles zu sehen! Alles, was zu der Welt unserer Lieblinge Beziehung

hat: Vogelkäfige, Vogelzucht- und Vogelschutzartikel, Vogelbilder und Vogelbücher, Vogelfutter, ausgestopfte Vögel, Nester und Eier und vor allen Dingen lebende Vögel in einer Fülle und Mannigfaltigkeit, daß man fast nicht imstande war, alles in sich aufzunehmen. Was uns am meisten in Erstaunen setzte, war der Reichtum an exotischen Stubenvögeln von den kleinen und gewöhnlicheren bis zu den größten, seltensten und kostbarsten Arten. Überraschend war vor allem die Zahl und Artenfülle der Papageien: Kakadus und Amazonen, Graupapageien, Keilschwanz- und andere Sittiche der verschiedensten Arten, von denen jeder heute eine Summe repräsentiert, die früher ein nettes kleines Vermögen bedeutet hätte, lenkten besonders die Aufmerksamkeit der nicht auf spezielle Gruppen eingeschworenen Besucher auf sich. Es ist selbstverständlich, daß mit solchen Kostbarkeiten nicht die privaten Liebhaber aufwarten konnten, sondern daß es dem Vogelhandel vorbehalten bleiben mußte, hiermit zu zeigen, daß trotz der unglaublichsten Schwierigkeiten in allen Verhältnissen der deutsche Tierhandel noch in Ehren bestehen kann. Neben diesen kostbarsten Stücken der Ausstellung fehlte es nicht an den mannigfaltigsten anderen exotischen Formen, die vielfach in ihrem Wert nur wenig hinter den Genannten zurückblieben. So fielen uns eine ganze Anzahl prächtiger Dominikanerkardinäle auf, ferner mehrere gleichfalls sehr gut gehaltene exotische Stare, Blauraben, Zwergtäubchen sowie ungezählte Prachtfinken der verschiedensten Arten. Auffallend war der gänzliche Mangel an Webervögeln, ein Memento der traurigen Zeiten auch das Fehlen gewisser heißbegehrter tropischer Sänger, wie der Schamadrossel und der amerikanischen Spottdrosseln.

Zu begrüßen war der Entschluß der Ausstellungsleitung, die Exoten nicht streng von den einheimischen Vögeln zu trennen, sondern sie in zwanglosem Übergang zu ihnen zu zeigen. Es liegt in der Natur der Verhältnisse, daß die heimischen Stubenvögel das Kernstück der Ausstellung bildeten. Die Fülle des hier Gezeigten war in der Tat bewundernswert, und wir müssen es uns versagen, auch nur in großen Umrissen eine Aufzählung zu geben. Nur soviel sei gesagt, daß sowohl die Liebhaber der Körnerfresser durch zahllose in vorzüglicher Verfassung befindliche Dompfaffen, Girlitze, Zeisige, Distelfinken, Buchfinken, Bergfinken, Hänflinge, Grünfinken, Kreuzschnäbel und Ammern auf ihre Rechnung kamen, als auch die Verehrer der edlen Weichfresser durch ein großes Material an Nachtigallen, Schwarzplättchen und anderen Grasmücken, Rotkehlchen, Blaukehlchen, Lerchen und Drosseln voll befriedigt sein konnten. Hier hatten sowohl Händler als Liebhaber das Beste aus ihren Beständen zur Anschauung gebracht. Da die edlen Sänger weniger dazu bestimmt sind, auf das Auge zu wirken, so durfte man an den vielen Schwanzlosigkeiten, durch welche Nachtigallen, Sperber- und Gartengrasmücken, Blaukehlchen u. a. glänzten, allerdings keinen Anstoß nehmen! Auffallend war das Fehlen des Sprossers (bis auf ein Exemplar, das besser nicht gezeigt worden wäre) und des Gartensängers, von welchem wir nur ein zwar gut befiedertes, aber etwas matt aussehendes Stück feststellen konnten. Auch vom Sumpfrohrsänger war nur ein allerdings kerngesund aussehendes Exemplar vorhanden, ein Beweis, wie zurückhaltend die Berliner Vogelliebhaberei den letztgenannten beiden Vögeln gegenüber ist. Dafür gab es aber eine ganze Reihe von recht interessanten und nicht gerade häufig in Gefangenschaft gehaltenen Formen zu sehen: Wiedehopf, Flußuferläufer, Baum- und Wiesenpieper in mehreren Stücken, Weiden- und Fitislaubvogel, Bachstelze, Schneeammer, Alpenlerche, Heckenbraunelle, Zaunkönig, Kernbeißer, Turmfalk, Pirol und mehrere Gesellschaftskäfige mit den Liliputanern unserer Ornis, von welchen besonders eine „Familie" äußerst munterer Goldhähnchen und ein Käfig mit Schwanz- und Haubenmeisen entzückende Schaustücke bildeten. Bemerkenswert war auch eine in sehr gutem Gefiederzustand befindliche (vermutlich aufgezogene?) Dorngrasmücke, die unbekümmert um die sie bewundernden Beschauer der winterlichen Jahreszeit zum Trotz unermüdlich ihr Liedchen vortrug. Endlich verdienen noch genannt zu werden eine merkwürdig große Zahl von Kreuzungen zwischen Kanarien und Finken verschiedener Arten und mehrere Farbenabnormitäten (Albinismen und Melanismen).

Als ein besonders begrüßenswerter Umstand ist hervorzuheben, daß der Kanarienzüchterverband sich zu brüderlichem Hand-in-Hand-Gehen mit der Vereinigung der Vogelliebhaber entschlossen hatte, durch welches schöne Zusammenwirken ohne Zweifel der Grund zu dem Erfolg der Ausstellung gelegt wurde. Die drei Räume, welche ausschließlich dem edlen Kanarienvogel gewidmet waren, bildeten eine besondere Abteilung der Ausstellung. Hier herrschte andächtige Stille trotz überaus starken Besuches. Betrat man diese Räume, so fühlte man sich von allen Seiten umfangen und eingelullt von den zartesten und doch aus gewaltigen Stimmitteln hervorquellenden Trillern, die aus Hunderten von geschlossenen Gesangskästen hervordrangen, in welchen die Fursten des gelben Edelsängergeschlechtes, streng abgeschlossen von den zerstreuenden Eindrücken der Umwelt, ihrer Kunst oblagen. Berufenere als wir mögen von dem, was die Ausstellung auf diesem Spezialgebiet darbot, eine sachverständige Schilderung geben.

Nicht unerwähnt bleiben darf die geschmackvolle Zusammenstellung, welche die Ausstellungsleitung dem vorhandenen Material gegeben hatte. Lebende Blattpflanzen und frisches Tannengrün umrahmten und verwoben in sehr diskreter und wohltuender Weise die Käfige, zwischen denen die übrigen Objekte zwanglos eingeordnet waren. In den Käfigen selbst waren alle erprobten Modelle in mustergültiger Ausführung zur Anschauung gebracht, vom schlichten Weichfresserkäfig reiner Zweckform bis zum prunkhaften Salonkäfig aus Messing, der, bewohnt von einem recht auffallend gefärbten Exoten, bestimmt ist, von den erfolgreichen Börsenspekulationen seines Herrn sichtbares Zeugnis abzulegen. Sauberkeit und Haltung der ausgestellten Vögel waren gleichfalls einwandfrei, Heizung und Lüftung vorzüglich. Der dauernd starke Besuch der Ausstellung beweist, daß mehr Interesse im Publikum vorhanden ist, als man anzunehmen geneigt ist. Wir beglückwünschen die Veranstalter zu dem schönen Erfolg.

Dr. L. v. Boxberger.

Von der unteren Wolga.

Von Ingenieur Kracht.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Der Vogelzug ist hier ein ziemlich starker, insbesondere kommen Sumpf- und Wasservögel in sehr großer Anzahl hierher. Meine Beobachtungen erstrecken sich nicht etwa auf den Vogelzug im allgemeinen an der Wolga, sondern nur auf denjenigen Teil der Zugvögel, der das rechte Ufer berührte. Ich bin überzeugt, daß in der Niederung und am linken Ufer der Zug ein viel stärkerer sein wird. Auch die weiter entfernt in der Niederung nistenden, größeren Vögel, wie Pelikane, Schwäne, Reiher usw., konnte ich der beschränkten Freiheit halber nicht näher beobachten.

In den nachstehenden Mitteilungen folge ich den Aufzeichnungen in meinem Tagebuch. Der freundliche Leser wird so am besten einen Überblick gewinnen, welche Zeitpunkte des Jahres für den beobachtenden und sammelnden Vogelliebhaber die interessantesten sind, und was man überhaupt an Vögeln durch Jäger, Fischer und Jungens unter die Hände bekommt.

1915. Februar (alle Daten alten Stils): 27.: Stare treffen ein. 28.: Mehrere große Schwärme (à zirka 200—300 Stück) Kalanderlerchen ziehen bei prächtigem, klarem Wetter, ziemlich hoch fliegend, von West nach Ost (ein Exemplar wurde mir gebracht).

März: Anfang dieses Monats stellen sich viele Raubvögel (Bussarde und Falken) ein. 7.: Beobachte 3 größere Flüge (25—50 Stück) Gänse. 10.: Eine Kurzzehenlerche vollführt fleißig singende Balzflüge. Feld- und Kalanderlerchen streichen in kleinen Flügen umher. Zirka 80 Kraniche ziehen in großer Höhe von SW. nach NO. Von Mitte März ab sieht man sehr viele Raubvögel, auch Adler; außerdem werden mir alle möglichen Entenarten gebracht. 16.: Steinschmätzer (S. isabellina) und weiße Bachstelzen. An der Uferwand sitzen überaus viele Stare. 20.: Amsel, Singdrossel, Wiedehopf und Buchfink, alle nur in einzelnen Exemplaren, außerdem 2 Schwärme Finken. 25.: Weihen (schwarze Milane) sind in großer Anzahl eingetroffen. Dohlen tragen eifrig Nistmaterial ein. Fast täglich beobachte ich ein Paar Seeadler; entzückender Anblick! Das Flugbild ist typisch: Die langen Flügel sind breit und stumpf (rechteckig), der Schwanz wird gespreizt.

April. 1.: Rauchschwalben sind zurückgekehrt. 3.: Ich finde einen Horst des Steppenadlers. Beobachtet werden mehrere Flüge von Laufvögeln, einige Steppenkiebitze, sowie je ein Laubvogel und Gartenrotschwanz, 4 gelbe Bachstelzen und viele Wiedehopfe. Ein paar schwarze Milane ist eifrig mit dem Nestbau auf einer Silberpappel beschäftigt. Steinschmätzer haben ihre Nester fertig, brüten jedoch noch nicht. Die Raubvögel scheinen ihre Beute ausschließlich der Steppe zu entnehmen, auch die Seeadler fliegen immer steppeneinwärts. Ziesel gibt es dort in unglaublicher Anzahl, aber auch an Lerchen, großen und kleinen Springmäusen, sowie Ottern, Nattern und Eidechsen fehlt es nicht.

7.: Die Steppe ist schon ziemlich grün geworden, diverse Blumen blühen. Auch der Wald jenseits der Wolga bedeckt sich mit zartem, grünem Schimmer. Die Wolga steigt mächtig.

10.: Der Jäger zeigt mir ein Paar des gemeinen Kranichs, die 130 km von hier in der Steppe nisten. Es befindet sich dort ein großer Sumpf mit mächtigen Rohrwäldern.

12.: Raubvögel (Weihen, Falken) bauen eifrig an ihren Horsten. Eier sind noch nicht vorhanden. Man bringt mir drei junge zirka acht Tage alte Seeadler, meine Freude ist groß. Über den Horst berichten die Fischer folgendes: „Derselbe steht auf



Blauracke.

einer alten Pappel in zirka 8 m Höhe, hat die Höhe eines Mannes und einen Flächenraum, daß zwei Mann bequem in demselben liegen können. Die Alten verteidigen die Jungen ziemlich und müssen durch blinde Schüsse vertrieben werden.“ Die drei kleinen Burschen tragen ein dichtes graubraunes Dunenkleid; die Schwingen und großen Deckfedern haben ein paar Zentimeter lange Fahnen. Das Kleeblatt wird in einen flachen Korb, der mit Heu und trockenem Pferdemist angefüllt ist, gesetzt. Gewöhnlich nehmen sie eine klägliche Haltung an; ungeschickt liegen sie da, Kopf und Hals hängen über den Korbrand hinaus nach unten, oder ein Kopf liegt innen an der Korbwand, den Unterschnabel nach oben gekehrt. Den Krallen fehlt noch die Kraft. Aufrichten können sie sich nicht, sie hocken vielmehr auf den Versen. — Ich will hier hinzufügen, daß die Adler prächtig gediehen und am 5. Mai die ersten Flugversuche unternahmen, also als erwachsen anzusehen waren. Ich kaufte im Laufe des April noch weitere zwei Seeadler. Unter den Fünfen waren 3 ♂ und 2 ♀. So zahm die Vögel auch anfangs waren, später wurden sie doch bösartiger, insbesondere die Männchen, sie griffen mit dem Schnabel energischer zu und schlugen auch manchmal mit den Fängen nach

den Schuhen. Streicheln ließ sich nur noch das eine Weibchen. Ende Juli verschenkte ich die Korona. Futter: Ziesel, rohes Fleisch, Fische und Tauben. Fütterung dreimal täglich. Der größte zerriß zum erstenmal selbständig ein Ziesel und einen Fisch am 30. April. Das Nest wurde vom großen zum erstenmal am 27. April auf einige Zeit verlassen; am 4. Mai wird es überhaupt entfernt. Es gibt hier sehr viele Seeadler, die Nester stehen oft in Abständen von nur einigen Kilometern.

19.: Man bringt mir 7 Eier der Rostgans, 5 werden im Nest belassen. Letzteres befindet sich in einer Höhle der Uferwand.

22.: Man bringt mir ein Kranichei. Der hier sehr gemeine Jungfernkranich nistet schon etwa 25 km steppeneinwärts. Ein Nest wird nicht aufgebaut, sondern die 2 Eier direkt auf den Boden gelegt.

24.: Hirten bringen mir 2 Eier der Zwergtrappe. Dieser typische Steppenvogel kommt schon etwa 15 km steppeneinwärts recht häufig vor. Die zwar bescheiden, aber doch ansprechend gefärbten Vögel machen durch ihre zierliche Gestalt und stolze Haltung einen hübschen Eindruck. Alle bisher erhaltenen Eier werden einer Bruthenne untergelegt (es fallen aber nur die Trappeneier aus).

25.: Sprosser sind angekommen und schlagen in den wenigen gebüschreichen Gärten des Städtchens. Ebenso verschiedene Laubvögel.

28.: Man bringt mir ein auf dem Nest gegriffenes Weibchen der Rostgans; dieselbe gewöhnt sich gut ein. Ich sehe die erste Blaurake.

30.: Uferschwalben sind angekommen, ebenso Nonnensteinschmätzer und Rosenstare. Eine Wachtel schlägt fleißig. Am Abend treibt sich eine Nachtschwalbe über unserem Viertel herum.

Mai. 2.: Eine große Anzahl Bienenfresser tummelt sich in zierlichen Flügen und laut rufend über dem Marktplatz.

Ich erwerbe ein altes Paar Rötelfalken und zwei ganz kleine Junge des Würgfalken. Letzterer nistet hier häufig auf großen Heuhaufen. Viele dieser Vögel werden von Kirgisen abgerichtet und zur Jagd benützt. (Fortsetzung folgt.)

Vereinigung der Vogelliebhaber Landesverband Preußen.

Allen verehrten Mitgliedern wünscht ein frohes neues Jahr Der Vorstand.

Die nächste Mitgliederversammlung findet am 30. Januar 1923, abends 7^{30} Uhr in dem Posthörsaale, Artilleriestraße 101, statt. Tagesordnung: 1. Verlesen des Protokolls der Mitgliederversammlung vom 14. September 1922; 2. Bericht des Vorsitzenden über die Vogelschau; 3. Bericht der Kassenprüfer und Mitteilung des aus der Schau erzielten Reingewinnes, welcher nach Abzug noch etwaiger Unkosten dem Landesverband überwiesen werden wird; 4. Anträge verschiedener Art. Gäste stets willkommen.

Unsere Vogelschau hat auf alle Besucher einen so günstigen Eindruck gemacht, daß wir gebeten worden sind, im nächsten Jahre wieder eine solche zu veranstalten. Soweit sich bis jetzt übersehen läßt, steht dem auch auch nichts im Wege, denn alle ausstellenden Mitglieder sind so begeistert worden, daß sie ihre Teilnahme schon jetzt wieder zugesagt haben. Auch Delegierte von uns angeschlossenen Vereinen, welche zur Besichtigung der Schau kamen, haben sich mit großer Befriedigung über das Gesehene geäußert und werden auch ihre Mitglieder zu bestimmen wissen, sich gleichfalls an der nächsten Schau zu beteiligen. Dieser Gedanke schwebte uns ja schon längst vor Augen, nun aber wird sich die Überzeugung in den Vereinen selbst Bahn brechen und um so größere Erfolge zeitigen. Wir sprechen hiermit nochmals allen Vereinen, deren Delegierte wir begrüßen durften, unsern ganz verbindlichsten Dank aus. Die Besucherzahl war bedeutend. Aus allen Teilen des Reiches sind die Liebhaber herbeigeströmt, darunter viele gute alte Bekannte, um endlich wieder einmal etwas Großes zu sehen und Neues zu erfahren. Und in der Tat ist es uns dank der außerordentlichen Beteiligung unserer Mitglieder gelungen, eine Schau zusammenzubringen, wie sie selbst in unserer Weltstadt in früheren glücklicheren Jahren noch nicht veranstaltet worden ist. Am Sonntag konnte des großes Andranges wegen nur mit Mühe das Publikum durch die Schau gelassen werden. Solche Erfolge ermutigen natürlich, sind aber auch ein Zeichen, wie notwendig heute solche Veranstaltungen sind. Diese Gelegenheiten müssen dazu dienen, immer wieder die Aufmerksamkeit der Besucher auf die Vogelliebhaberei zu lenken, dann werden auch neue Freunde und Gönner uns zugeführt werden. Eine Vogelschau in einer solchen großzügigen Form durchzuführen, konnte auch nur einem Landesverbande vorbehalten bleiben, der über eine große Mügliederzahl verfügt. Ein Referat über die Schau erscheint gleichzeitig in dieser Nummer der „Ges. Welt".

Franz Nyncke, 1. Vorsitzender,
Berlin O 34, Königsberger Straße 17.

Kleine Mitteilungen.

Von der Wasseramsel. Im Dezember 1918 beobachtete ich an den fischreichen Bächen des östlichen Vogelsberges die Wasseramsel und ihr anziehendes Treiben; sie ist dort, in der Gegend von Lauterbach, noch gerade so häufig wie sie vor drei Jahrzehnten war, als ich, noch ein Schuljunge, ihrem Gesang oft gelauscht und mich an ihrem fröhlichen Treiben erfreut habe. Bekanntlich verzehrt die Wasseramsel auch kleine Fischchen, namentlich zur Winterszeit; doch ist der von ihr angerichtete Schaden so unbedeutend, daß er auf keinen Fall ihre Verfolgung rechtfertigen würde. Grade beim Fischen beobachtete ich sie nun in den Dezembertagen 1818. Da sitzt der Vogel auf dem Rande eines steinernen Bachübergangs, träge und aufgeplustert, und nur das Köpfchen wendet sich hin und her. Plötzlich wird die Amsel erregt, sie macht sich schlank, läuft ein Stückchen über den Brückenrand hin und springt ins Wasser; nach 20—30 Sekunden taucht sie wieder auf, schwimmt lebhaft umher und taucht abwechselnd längere oder kürzere Zeit. Einmal bringt sie ein Fischchen in die Höhe, das sie, im Wasser schwimmend, verzehrt; dann taucht sie eifrig weiter und fängt ein zweites Fischchen, das sie zu ihrem Standplatz auf dem Bachsteg trägt und nach vielem Aufstoßen auf den Boden mit lebhaftem Knixen ihres Körpers hinunterschluckt. Dann sitzt sie wieder ruhig mit aufgeplustertem Gefieder, um sich nach einer Siesta von zirka 5 Minuten erneut auf die Jagd zu machen. In diesen fast gleichmäßigen Pausen von Jagd und Ruhe verbringt sie mehrere Stunden des Nachmittags. — Am übernächsten Tag bin ich wieder auf meinem Beobachtungsposten. Der Vogel sitzt auch diesmal auf seinem Standplatz; in der Zeit von 3^{10} Uhr bis 3^{57} Uhr nachmittags geht er fünfmal ins Wasser, hat aber nur in drei Fällen Erfolg auf seiner Jagd; die Beute bringt er jedesmal ans Ufer, bearbeitet sie sehr eingehend durch Aufschlagen und Aufstoßen — ich sah sie den Fang bis zu 4 Minuten Dauer „vorbereiten" — und schluckt sie je nach der Größe mit mehr oder weniger Anstrengung hinunter. Die Beobachtungen der folgenden Tage boten immer wieder dasselbe Bild; hie und da sah ich den Vogel aber auch ruhig im Wasser schwimmen und fortgesetzt irgend etwas Genießbares von der Wasseroberfläche aufnehmen; was es war, konnte ich trotz des von mir benutzten ausgezeichneten Artilleriebeobachtungsglases nicht feststellen. Im allgemeinen hielten sich die Vögel am liebsten an dem ruhig fließenden Mühlgraben oder an ruhigen Stellen des Hauptbaches auf. Der Flug der Wasseramsel ist herzlich schlecht;

wenn sie niedrig über das Wasser hinstreicht, fällt ihre Unbehilflichkeit nicht so sehr auf; sowie sie sich aber etwas höher erhebt und eine größere Strecke durchfliegt — was gar nicht so selten ist —, so macht sie mit ihren raschen zappelnden Flügelschlägen, die immer wieder durch Bogenflüge unterbrochen werden, einen sehr hilflosen Eindruck; und wenn sich gar noch zwei Männchen während ihres Fluges, der sie kaum von der Stelle fördert, bekämpfen wollen, so kann man sich ob ihrer Täppigkeit kaum des Lächelns erwehren. Wenn die Wasseramsel über das Wasser streicht und sich niederlassen will, dann stürzt sie sich gerne kurz vor dem Ruhepunkt ins Wasser, um es auf einer Strecke von 2—6 Meter, ich möchte sagen, zu durchfliegen und erst nach dem Wiederauftauchen auf dem erstrebten Sitz Fuß zu fassen. Ludwig Schuster.

Den Leipziger „Kornkäfer" betr. Gelegentlich der Ausstellung des Vereins für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig am 11. Dezember 1921 lernten die Vertreter der auswärtigen Vereine einen neuen „Mehlwurm" kennen, welchen die Mitglieder obigen Vereins „Kornwurm" und den Käfer „Kornkäfer" nannten. Die Leipziger Herren rühmten dessen leichte Zucht, große Vermehrung und die außerordentliche Verwendbarkeit als Futtermittel für zarte Weichfresser. Hiervon konnten wir uns auch an den ausgestellten munteren Vogelzwergen überzeugen. Die Leipziger Herren waren so freundlich, den anwesenden Vertretern der auswärtigen Vereine eine Anzahl Käfer und Larven für Zuchtversuche zu überreichen mit dem Wunsche, daß zunächst ein Mitglied sich eine Zucht anlegen und dann weiter an Vereinsmitglieder abgeben möchte. Zweck dieser Zeilen ist, den betr. Vereinen bekannt zu geben, daß es sich nicht um den Kornkäfer Calandra granaria handelt. Unser Mitglied Herr Henker bestimmte den Käfer als Alphitobius ovatus *Hrbst.* Wie Tenebrio molitor ist er ein Schwarzkäfer oder Tenebrionide. Die Larven sind kleiner als die bekannten Larven unseres Mehlkäfers Tenebrio molitor. Sie zeichnen sich durch kleine Dornen am Hinterleibsende und durch große Beweglichkeit aus. Wir schlagen vor, ihn als „kleinen Mehlkäfer" und seine Larven als „kleine Mehlwürmer" zu bezeichnen. Nach den Erfahrungen der Leipziger Herren besitzen wir in ihm eine wesentliche Bereicherung für den Tisch unserer Lieblinge.

Verein für Vogelkunde zu Chemnitz.
J. A.: W. Grund.

Aus den Vereinen.

A. Z. Angemeldet sind die Herren stud. zool. A. Bernhoft-Osa, Stuttgart, Obere Birkenwalderstr. 217; Th. Vanderhoff, Köln, Habsburgerring Nr. 4, I. Etage; Bernhard Regge, Lotzen, Ostpr., Bismarckstraße 20; Richard Zech, Friesen bei Reichenbach im Vogtland. — Aufgenommen sind die Mitglieder Nr. 251 Oskar Lohmann, Magistratssekretär, Harzgerode, Oberstraße 20; Mtgl. 252 Gustav Gagsteller, München, Verschaffelstraße 14 pt.; Mtgl. 253 Mohr, Oberpostsekretär a. D., Stralsund; Mtgl. 254 Carl Otto, Magdeburg-S., Lutherstraße 22; Mtgl. 255 Adolf Voigt, wissenschaftlicher Rechner, Jena, Feodorastraße 13; Mtgl. 256 Friedr. von Lukanus, Oberstleutnant a. D., Berlin W, Lessingstraße 32; Mtgl. 257 Frau E. Pölz, Hamburg 24, Mühlendamm 12; Mtgl. 258 Eberhard Stümcke, Bankvorsteher, Vegesack b. Bremen, Gerhard-Rolf-Straße; Mtgl. 259 Franz Kerscheit, Tilsit, Inselstraße 5; Mtgl. 260 Emil Funck, Swinemünde, Gartenstraße 11/12, Vorderh. 3 Tr.; Mtgl. 261 H. Unger (Chile), Santiago de Chile, Casilla 3576. — In Berichtigung der vorigen Bekanntmachung, betr. Abgabe des Jahrbuchs 1922 an neue Mitglieder, wird mitgeteilt, daß der Preis einschließlich Porto 100 Mark beträgt. Nichtmitglieder das doppelte. — Mtgl. 4 (Dukan, Duisburg) gibt 3,2 Tigerfinken, 1,1 Goldbrüstchen ab; sucht 1,1 gelbe Wellensittiche, „Gef. Welt" 1904—1913. Mtgl. 144 (Buschendorf, Großkochberg) gibt ab je 1,1 Bandfink, kl. Elsterchen, 2,0 Amarauten e. Z., 1,0 Mövchen, junge Mövchen und Zebrafinken; sucht 1,0 Schmetterlingsfink, 0,1 Mossambikzeisig Mtgl. 163 (Uhl, Hof) sucht 0,1 Schmetterlingsfink gegen 0,1 Mövchen zu tauschen. Mtgl. 179 (Kradisch, Mariaschein) bittet um Überlassung von Silberfasanhenne Brut 1921 oder älter (Bestand durch Fuchs vernichtet), sucht Braut- und Mandarinenten. Mtgl. 235 (Richter, Bernstadt) sucht Paare Wellensittiche, je 1,1 Elsterchen oder Zebrafinken, Bandfink, Tigerfink, Mövchen, gr. Kardinal, Jakarinifink, 1—2 Kanarienweibchen, Jahrgänge „Gef. Welt". A. Krabbe.

Verein für Vogelschutz und -pflege zu Dresden. Versammlung jeden Donnerstag, abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Schillers Restaurant", Ecke Stifts- und Ehrlichstraße. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. In der am 7. Dezember 1922 abgehaltenen Generalversammlung dankte der Vorsitzende, nachdem die Tagesordnung erledigt war, allen Mitgliedern für die allseitigen Unterstützungen im vergangenen Jahr, insbesondere den Herren Paul Burckhardt und Emil Schurig für die Anfertigung sowie Herren Hilscher, Franz, Wulke und Hans Korb für das gespendete Material zu den inzwischen auf dem Johannes- und Eliasfriedhof aufgestellten Winterfutterhäuschen, sodann den übrigen Herren der Vorstandschaft für ihre treue und aufopfernde Tätigkeit. Der Monatsbeitrag wurde von 3 auf 10 M. und das Eintrittsgeld von 10 auf 20 M. erhöht. Aus der Neuwahl ging hervor als 1. Vorsitzender Unterzeichneter, 2. Vorsitzender Herr Schreiber, Schriftführer und Bücherwart Herr Gottleuber und als Kassirer Herr Baudisch. Herr Heinrich, dessen letzter Vortrag „Beobachtungen und Streifzüge im Königswarther Teichgebiet" wohl allen Mitgliedern noch in Erinnerung ist, übernimmt die Leitung der ornithologischen Abende. Aufgenommen wurden die Herren Curt Köhler und Kurt Krause. Eine rege Debatte betreffs gemeinsamen Bezugs von Futter, welcher auch inzwischen erfolgt ist, beschloß den geschäftlichen Abend.

Bernhard Kühn, 1. Vorsitzender.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei zu Hamburg. In den Monaten Januar, Februar und März findet nur je eine Mitgliederversammlung an jedem dritten Mittwoch der genannten Monate statt.
R. Evers, Schriftführer, Hamburg, Friedrichsberger Str. 47.

Verein der Vogelfreunde Köln. In der Generalversammlung am 4. Januar 1923 wurde Herr Kremer als Vorstand, Herr Wollnitz als Kassierer wiedergewählt. Der frühere Schriftführer Bergmann verzichtete, dafür trat Unterzeichneter ein. Versammlungen werden in den Wintermonaten nur je einmal abgehalten, und zwar jeden ersten Mittwoch im Monat. Die Versammlungen finden nach wie vor bei Herrn Drewes, Siebenbürgen 57 II, statt. J. A.: Kaufmann, Schriftführer.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig. Nächste Vereinssitzungen am Donnerstag, den 18. Januar und Donnerstag, den 1. Februar d. J., in „Bauers Brauereirestaurant, Täubchenweg. Sitzungen jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat. Gäste stets willkommen. J. A.: Joh. Birk, 1. Vorsitzender,
Leipzig-Mockau, Beuthstraße 29.

Frau R., Berlin C. Der Kanarienvogel war vor einiger Zeit sehr fett. Er magerte dann ab, nur am Unterleib und in den Bauchhöhlen verblieben starke Fettpolster, welche die Eingeweide völlig einhüllten. Infolge dieses Umstandes und anscheinend auch unter den Einfluß starker strahlender Wärme ist der Vogel eingegangen. Für letztere Annahme spricht ein ziemlich umfangreicher Bluterguß ins Gehirn. Singende Kanarienweibchen kommen vor. Sie singen aber in der Regel leise und blasen beim Singen den oberen Kehlkopf nur wenig auf.

Herrn A. T. Die Alpenlerche war ein Männchen. Die stark fortgeschrittene Fäulnis des Kadavers, besonders der Verdauungsorgane, ließ eine genaue Feststellung nicht zu. Vermutlich aber ist der Vogel einer Erkrankung der Verdauungsorgane erlegen.

Käfige u. Gerätschaften

Schlagnetze

für große und kleine schädliche Vögel hat jedes Quantum abzugeben (Spezialarb.)

Christ. Denz, Köln a. Rh.

49] **Beyenstr. 19 II.**

Verkaufe

Badehaus 27×24×23 cm für Voliere, neu angefertigt, Zinkblech, grün gestrichen, 4 Füße, an drei Seiten und Dach eingeschobene Glasscheiben, vor dem Haus abnehmbare Sitzstange, zum Selbstkostenpreis von **2500 Mark** einschl. Verpackung.

G. Maercker, Mainz a. Rh.,
50] Rheinstraße 6 II.

Mehrere gebrauchte Käfige

für Körner- und Weichfresser billig zu
51] verkaufen.

Rud. Freischem, Düsseldorf,
Kirchfeldstraße 87.

Verkaufe Voliere

150×75 cm, tief 200 cm, zerlegbar, Holz und Drahtgeflecht, mit 10 Nistkästchen und Futterhaus, 30000 ℳ, **Schrankvoliere** 114×56 cm, tief 200 cm, zerlegbar, für 20000 ℳ und
52] mehrere alte Kistenkäfige.

Freiherr von Kittlitz,
Leutsförden (Holstein).

Tausche 1 Metallkäfig

mit Zinkblechsockel und Schieber, 60 cm lang, 40 cm tief, 50 cm hoch, noch sehr gut erhalten, und **1 Paar gr. Wellensittiche,** Männchen hat rechtes Bein gebrochen, sonst aber kerngesund, gegen

1 Zuchtpaar Nymphensittiche,

aber nur erstklassige Tiere erbeten. Zahle evtl. noch zu. Anfragen nur gegen Rückporto erbeten an [53

Oskar Gutsch, Großschönau i. Sa.,
Mühlwiese Nr. 16.

Futtermittel

Mehlwürmer

Geg. Einsend. von 900 ℳ 1/4 Pfd. franko.
54] Größere Posten zu Tagespreis.

Alle Futterartikel ausverkauft.

Anfragen Rückporto, sonst keine Antwort.

D. Waschinski & Co.
Biesenthal b. Berlin.
Postscheckkonto Berlin 34825.

Vogelfutter

für **Kanarien, Waldvögel, Exoten, Papageien, Weichfresser.** Anfragen nur gegen Rückporto. Liste 13 über Vogelfutter 10 ℳ, Liste 5 über Vogelkäfige, Zuchtgeräte usw. mit etwa 400 Abbildungen 50 ℳ. [55

W. Göpel, Leipzig,
Tröndlinring 1 Telephon 14868

Ornis-Haus

Halle-Saale.
Gegründet 1912.

Reform-Normal-Weichfresserfutter und Körnermischfutter

Tagespreise.
Bei Anfrage Rückantwort.
Ornis-Buch M. 50.—. [56

Reform-Käfige

Zerlegbar · Leichteste Reinigung · Einfachster sicherer Transport
1. Preis beim Käfig-Wettbewerb Leipzig 1919 (s. Ges. Welt 1920, Heft 14—16)
werden für alle Vogelarten hergestellt.
Goldene Medaille Leipzig 1921.

Ausführung: Hartholz, grünlackiert oder naturlackiert, Zinkschublade, Porzellannapfe, Ledertuchdecke.

Keine Fabrikware, sondern beste Spezialarbeit!

Anfertigung als Kistenkäfig oder Wiener Form (halboffen) oder halboffen mit fester Rückwand. Ohne jedes Werkzeug in einer Minute zusammengestellt resp. zerlegt. Verpackung zum Selbstkostenpreis.

Fertigen auch jede Art Käfige u. Volieren n. Zeichnung od. Maßangabe.

Anfragen Rückporto beifügen

Katalog gegen Einsendung von 50 Mark in Briefmarken.

Schlagnetze ohne Mittelsteg

für schädliche Vögel, prima handgeknüpfte Ware.

Kühn & Muschter, Borna b. Leipzig, Kasernenstr. 4.
Spezialwerkstätte für Käfigbau
Bank-Konto: Allgemeine Deutsche Credit-Anstalt Zweigstelle Borna.
Postscheck-Konto: Leipzig 92250 Fernsprecher 147. [57
Zahlreiche Anerkennungs- und Dankschreiben.

Bevor Sie verkaufen

verlangen Sie stets zu Ihrem Vorteil meine konkurrenzlos höchsten Preise.

Ich zahle heute für

Graupapageien 50—60000 M.
Amazonen 20—25000 M.

Dompfaff-Männchen	850 M.
Stieglitz-Männchen	650 M.
Zeisig-Männchen	350 M.

sowie die bekannt hohen Auslands-Preise

für

Kanarienhähne und -weibchen

Bastarde — Exoten — Affen

Wellensittiche

und alle sonstigen Tiere und Vögel aller Zonen.

Kaufbedingung: Vögel und Tiere müssen gesund und fehlerlos sein.

Papageien ohne Krallenfehler und mit schönem Gefieder können sofort per Nachnahme franko Hamburg gesandt werden.

Zoologischer Im- und Export
Carl Frank, Hamburg 27,
Billhorner Röhrendamm 52. [58

Zeisig, Stieglitze, Dompfaffen

(Männchen), gesunde schöne Vögel, bezahle per Stück 500 Mark. Angebote mit Stückzahl. [59

Beck, Tierimport, Stuttgart.

[60 **Suche zu kaufen** auch durch reelle Händler Ia Männchen Schamadrossel, amerik. Spottdrossel, je 3 Stück gut eingewöhnte Männchen Heide-, Feld- und Haubenlerche, Baumpieper, Gartenspötter, Mönch- und Gartengrasmücke sowie kleine Sumpf- und Wasservögel (nicht über Lerchengröße), z. B. Flußuferläufer und Halsbandregenpfeifer. Von allen Gattungen auch junge Männchen aus erster Brut. Suche jeden Posten Ameisenpuppen, Eintagsfliegen, Daphnien, Seidenwürmer, Mehlwürmer, Ia Weichfutter und etwa 1—3 Zentner reinen Bienenhonig. Suche ferner für eigene Bibliothek **Vogelliteratur** von Naumann, Brehm, Liebe und anderen Ornithologen. Angebote nur mit festem Preis freundlichst erbeten, möglichst nur per Postkarte **Peter Matzen, Göttingen.**

Qualitätsfutter Sanitas

aus gar. nur erstkl. milbenfr. Ingred.
1 Kilo-Pak. 675 ℳ, 5 Pak à 650 ℳ. [61

Sanitasverlag Heidelberg 46.

Wer gibt im Frühjahr **Sprosser** in Tausch gegen frische **Ameisenpuppen** und **Nachtigallen.** [62
Angeb. unt. Sprosser an die Ges. Welt.

Vögel

Kaufe

ein blutsfr. Zuchtpaar **gr. Wellensittiche, zahle 15000 M.**, ferner **suche** je 1 Zuchtpaar **Bandfinken, Elsterchen, Tigerfinken** oder and. Exoten, **zahle 5—7000 M.** od. mehr je nach Art, müssen aber gar. gesunde gute Zuchtpaare sein. Gebe auch in Tausch einen **Mönchsittich.** Preisangebote an **E. Richter,**
Bernstadt i. Sa., Eroggasse.
63] A. Z. Mitgl. 235.

Suche zu kaufen

♂ und ♀ Kirschkernbeißer, Zitronenfink, Schneefink, Hakengimpel, Fichtenkreuzschnabel und Karmingimpel. Angebote an [64

Franz Kerscheit, Tilsit.

Lebender Steinkauz

zu kaufen gesucht. [65

Severin Riegemann, Köln-Sülz,
Aegidiusstraße 52.

Nachtigall

Ia Sänger, zu kaufen gesucht.

Paul Schönfelder,
66] **Bertsdorf bei Zittau.**

Suche

1,0 Steinrötel, Ia Sänger mit Ia Gefied. Off. mit äußerstem Preis an
67] **Friedr. Weick,**
Mörstadt b. Worms (Rhein).

Kaufe zur Zucht

1,1 Schmetterlingsfinken
1,1 Diamantfinken
1,1 Zebrafinken
1,1 Reisfinken

müssen Ia vorjährige Tiere sein und bitte um Angebot.

Gebe ab [68

1,1 grüne Wellensittiche
(Zuchtpaar) gegen Gebot.

H. Hahn jr.,
Neuß am Rhein,
Krefelder Str. 60.

Kaufe

1,1 kleinen roten Dompfaffen, 1,0 Buchfinken, auch einzeln. Preisangebote inkl. Verpackung an [69

E. Weigelt,
Weigmannsdorf b. Lichtenberg i. Erzg.

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Hermsdorf bei Berlin; für den Anzeigenteil: Franz Wunderlich, Magdeburg, Postschließfach 148.
Verlag der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck: August Hopfer, Burg Bz. Mgdbg.

Jahrgang LII.
Heft 3. 1. Februar 1923.

Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Die Gefiederte Welt gelangt am Donnerstag nach dem 1. u. 15. jedes Monats zur Ausgabe und kostet vierteljährlich 750 Mark. Einzelpreis des Heftes 150 Mark.
Inserate für die folgende Nummer müssen bis spätestens Freitag früh in Händen der Verlagsbuchhandlung sein.
Die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 100 Mark berechnet.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung (M. Kretschmann) in Magdeburg.

Postschließfach 148. Postscheckamt: Magdeburg 3148. Fernsprecher: 1323.

„Gedenket der hungernden Vögel!"

Von Emil Kaforke, Berlin.

(Nachdruck verboten.)

Wenn Schnee und Eis die Fluren überziehen, wenn im brausenden Sturmwind die Eichen im deutschen Walde schwankend sich beugen, dann erwacht das menschliche Mitleid, um hungernden Vögeln zu helfen. Ein schöner Zug des Herzens, aber weder gerecht noch zweckmäßig.

Alle Lebewesen bilden eine große Familie, an deren Spitze der Mensch steht, dem die Nächstenliebe gebietet, soweit er vermag, sämtliche notleidende Angehörige zu unterstützen und nicht nur eine kleine Vogelgesellschaft zu berücksichtigen.

Mag eine hungernde, mit gesträubtem Gefieder auf dem unwirtlichen Felde sitzende Krähe die gefrorenen Erdschollen mit dem Schnabel vergeblich nach Nahrung bearbeiten, mag der Fuchs, eine Zierde unserer heimischen Fauna, bei 15 Grad Kälte mit traurigem Gesicht meilenweit traben, ohne eine Beute zu erhaschen, keinem Menschen dürfte es je einfallen, ihnen einen Bissen zu reichen, es sei denn einen Giftbrocken. Es sind Schädlinge, sagt man, indes nur für den, der sich noch nie die Mühe genommen, zu überlegen, daß jedes Tier Schaden und Nutzen bringt, daß sie alle im Kampf ums Dasein fortgesetzt Leben zerstören. Um die Wunder der Schöpfung kennen und verstehen zu lernen, muß man hinauswandern in Wald und Feld und mit gesunden Sinnen die Umwelt beobachten. Das immer geschützte Meisenvolk verzehrt in der Zeit, wo der Tisch reichlich gedeckt ist, nützliche und schädliche Insekten, Geschmack und Abwechslung allein entscheiden.

Nun, ein seltsames Spiel! Die eben gerügte Ungerechtigkeit wird zum Segen für die Allgemeinheit. Würde der Fuchs im Winter gefüttert, dann wäre sein Nutzen im Haushalt der Natur ein erheblich geringerer; aber vom Hunger getrieben, gräbt er durch Schnee und Eis die feisten Mäuschen aus und ist so der Wohltäter des Landmanns.

Jedoch auch den hurtigen Meisen müssen wir den Speck und andere Leckerbissen versagen, da sie allein durch Nahrungssorgen gezwungen, ihre Aufgabe im Winter erfüllen, Insektenbrut aus den Rissen der Rinde herausholen und verspeisen.

Jedes Tier ist seinem Platze in der Natur angepaßt. Werden Tiere in freier Wildbahn regelmäßig durch Menschenhand verpflegt, dann entwöhnen sie sich der Arbeit der Nahrungssuche und verfallen dem Schmarotzertum.

Kein schöneres Beispiel als unser Stadtspatz. Im Hochsommer: Fliegen, Mücken, Käfer, Raupen und Schmetterlinge massenhaft, der städtische Graurock läßt sie ungeschoren, weil er auf Promenaden, Straßen, Fenster- und Blumenbrett von jung und alt mit allerlei Gebäck regaliert und bei guter Laune erhalten wird. Zudringling, wie er ist, fliegt er den gütigen Gebern auf Schulter und Hand, trägt zur Unterhaltung bei und — verliert seinen eigentlichen Zweck, dem Überhandnehmen von Ungeziefer und Unkraut zu steuern.

Böse Beispiele verderben gute Sitten. In Berlin sind dem Sperling zwei Konkurrenten erstanden, Buchfink und Haubenlerche legen sich immer mehr und mehr auf die faule Seite. Nirgends kann man diesbezüglich bessere Studien machen, als in dem der heimgegangenen Kaiserin gewidmeten Rosengarten. Zu Pfingsten, wenn die Rosen blühen und jede Ruhebank besetzt ist, findet fast ununterbrochen Fütterung statt, In- und Ausländer wetteifern, die gefiederten Tagdiebe zu mästen. Im Tiergarten herrscht jedes Jahr große Raupenplage. Soll dieselbe wirksam bekämpft werden, dann muß in erster Linie jegliche Vogelfütterung grundsätzlich unterbleiben.

Nur da haben wir Menschen Hilfe zu leisten, wo die gefiederte Welt durch unser Eingreifen in eine Notlage geraten, wenn ihr durch eine allzu

saubere Forstwirtschaft die Plätzchen genommen werden, deren sie zum Schutze gegen rauhe Ost- und Nordwinde bedarf. Wie der Fisch im Teiche allseitig von Wasser umgeben, so umhüllt den Vogel die Luft, das glattanliegende Federkleid, einer der schlechtesten Wärmeleiter, schützt gegen Kälte und Wärme. Zerzaust aber ein eisiger Sturm des Vogels Rock, dann beginnt ein Frieren und Frösteln, Schwäche macht sich geltend, um bald durch den ewigen Schlaf ein junges Leben vorzeitig zu beenden.

Wollen wir unsere Lieblinge unterstützen, dann sind Schutzgehölze in Wald, Park und Gärten anzulegen. Wer solche Zufluchtsstätten besucht, hat seine helle Freude an dem munteren Treiben des kleinen Federvolkes.

Die Ernährung besorgt in der freien Natur der Vogel selbst, jede Futterspende erübrigt sich, die Zeit der Not dient zum Ausgleich der Zeit des Überflusses.

Zu Anfang meiner Bemerkungen erwähnte ich den Giftbrocken, der, obwohl dem Fuchs zugedacht, mancher Krähe das Leben kostet. Sind die Füchse ausgerottet, dann fressen die Mäuse die Saat und die Hasen gehen an Seuchen zugrunde. Der Fuchs erbeutet nur Lampes schwächste und kranke Genossen, die zur Erhaltung der Art doch nicht tauglich sind. In neuerer Zeit ist man auch gegen den Sperling mit Gift zu Felde gezogen.

Mensch, wie unmenschlich handelst du! Hast du jemals den Ausdruck von Angst und Schmerz bei einem mit dem Tode ringenden vergifteten Tiere gesehen und empfunden? Ich sah eine Nebelkrähe, wie sie würgte, bis Erbrechen eintrat, wie ihre Pupillen sich erweiterten, wie sie in Krämpfe verfiel und schließlich die Augen verdrehend ihr Dasein beschließen mußte. —

Erscheint im Interesse der Allgemeinheit die Verminderung einer Tiergattung geboten, dann muß sie schnell und schmerzlos geschehen, der Wege und Mittel gibt es viele.

Auerbach sagt: Der untrüglichste Gradmesser für die Herzensbildung eines Volkes und eines Menschen ist, wie sie Tiere betrachten und behandeln.

Sprosser und Nachtigall.

Von J. Birk, Leipzig.

(Nachdruck verboten.)

Sprosser und Nachtigall sind die edelsten und vom Liebhaber begehrtesten unserer einheimischen Singvögel. Gar manchem Liebhaber bleibt die Haltung beider Sänger ein unerfüllbarer Wunsch. Wenn auch die Beschaffung einer gesanglich wirklich guten Nachtigall dem Liebhaber schon Schwierigkeiten bereitet, so ist die Erlangung eines erstklassigen Sprossers fast gleichbedeutend mit einem Lotteriegewinn im Liebhaberleben. Wenn ich ständig von Sprosser und Nachtigall spreche und den Sprosser dabei an erster Stelle nenne, so soll keineswegs damit gesagt sein, daß ich ihn der Nachtigall vorziehe. Ich kann keinem der beiden Sänger den Vorrang geben, für mich ist der Sprosser der Sängerfürst, die Nachtigall die Sängerfürstin. So verwandt beide Vögel in der Biologie sowie im Gesang sind, so läßt sich bei letzteren doch nicht leicht ein Vergleich ziehen, es sind eben zwei verschiedene Gesänge der Schlag des Sprossers und der Nachtigall, ebenso wie der Tenor des Mannes und der Sopran des Weibes wohl Gesang ist, aber für den Zuhörer im Genuß von verschiedener Wirkung ist, bei dem der Geschmack wohl auch eine große Rolle mitspielt. Den wirklichen Liebhaber des Kunstgesanges werden beide Stimmen begeistern, ebenso ist's mit dem Schlag von Sprosser und Nachtigall. Der Gesangsliebhaber verpflegt seinen Sprosser, damit er Sprosserschlag, seine Nachtigall, damit er Nachtigallenschlag genießen kann. Es ist eben doch ein gewaltiger Unterschied in beiden Gesängen, so daß im Gesangswettstreit, vorausgesetzt, daß beide Konkurrenten erstklassige Sänger sind, keinem die Siegespalme zugesprochen werden kann. Der Sprosser, von allen Liebhabern am gesuchtesten, verdankt dies der schwierigen Beschaffung. Heute fehlt der Liebhaberei ein zuverlässiges Spezialgeschäft für edle Sänger, wie dies zu Zeiten unseres unvergeßlichen Rausch der Fall war, wenigstens in der Sprosserbesorgung. Um den Liebhabern vor Augen zu führen, daß selbst zu Rauschs Zeiten ein erstklassiger Vogel, wie ein nördlicher David-Weidensprosser oder ein Donausprosser, selbst ohne Scheuung der Kosten, zu beschaffen nicht leicht war, will ich erst zwei Briefe mit einflechten, die Rausch betreffs Anschaffung eines erstklassigen Vereinssprossers an mich richtete. Es wird die Leser interessieren, das Urteil eines unserer hervorragendsten Sprosserspezialisten zu hören, daß es schon vor 15 Jahren nicht leicht war, die Wünsche betr. der Sprosserlieferung zu erfüllen, wenigstens was Ia Schläger anbetraf. Was die sogenannten Durchschnittsvögel anbetrifft, so will ich nur bemerken, daß wir in früheren Zeiten die Sprosser ebenfalls zu Dutzenden im Versand erhielten, Herbstsprosser sogar für den billigen Preis von 3—4 M. Auch Herr Dietze, dem durch die Einführung von Frühjahrssprossern, sowohl nördlichen wie südlichen, für die Leipziger Liebhaber besonderer Dank gebührt, hatte zum Frühjahr stets auch gute Vögel auf Lager. Was nun Rausch zur Beschaffung eines erstklassigen Sprossers, es sollte das Beste sein, was er auftreiben konnte, sagt, soll durch folgende Briefe beleuchtet werden:

Brief I. Wien, den 2. Mai 1907.

Sehr geehrter Herr Birk!

Ihr wertes Schreiben vom 30. v. M. besitzend, teile ich Ihnen ergebenst mit, daß ich Ihnen bezüglich der Lieferung des angefragten Sprossers heute noch keine bestimmte Zusage machen kann, denn in den Sprossergebieten hat es die letzten Tage noch tüchtig geschneit und ich weiß daher nicht, wie viele Sprosser aus einem oder dem anderen Gebiete erhältlich sein werden, um auch spätere Bestellungen ausführen zu können.

Erhalte ich die Sprosser in genügender Zahl, so wird es mir selbstverständlich ein Vergnügen sein, Ihnen mit einem Ia Sprosser zu dienen und übernehme für einen hervorragenden Schläger auch die Gewähr, obwohl letzteres völlig überflüssig ist. Dagegen kann ich keine Garantie dafür leisten, daß der Vogel die von Ihnen gestellten Anforderungen auch erfüllen werde, da eine solche Erfüllung weder von mir, noch vom Vogel abhängt, sondern lediglich von der Anschauung, welche die dortigen Herren Vereinsmitglieder vom guten Sprosserschlag haben.

Es wäre dies eine viel zu vage Garantie, die mit der Geringfügigkeit der Sache in gar keinem Einklang stünde.

Die Preise für die nordischen Vögel sind Ihnen ja aus meinen Inseraten und den „Gefiederten Sängerfürsten" bekannt, und überlasse ich es daher Ihnen, zu erklären, wie viel Sie für einen guten Schläger anlegen.

Ob ein einziger Sprosser hinreicht, die Herren dort am Platze zu überzeugen, daß die Aunachtigall in gesanglicher Beziehung hoch über der gemeinen Nachtigall steht, möchte ich von vornherein bezweifeln, denn, um zu dieser Erkenntnis zu gelangen, bedarf es doch etwas mehr, als das zeitweilige vorübergehende Abhören eines Vereinssprossers. Um ein tüchtiger Sprosserkenner zu werden, muß man zuvor eifriger Sprosserliebhaber sein und diese Sangeskönige jahrelang warten und pflegen, aber nicht etwa ein Einzelexemplar, sondern in mehreren Köpfen und verschiedenen Herkommens, um den Unterschied kennen zu lernen.

Die hervorragendsten Vogelgesangskenner stellten schon vor 50 Jahren den echten Sprosserschlag hoch über den gewöhnlichen Nachtigallenschlag, und zwar nicht etwa bei uns in Österreich allein, sondern auch in Deutschland. So hat Freiherr v. Stengel in München, Baron v. Homeyer in Stolp und viele Andere, die schon vor 20 Jahren von mir seltene Sprosser erhielten, nur diese Vogelart gekäfigt ohne Nachtigall, weil diese die Sprosser verdirbt und deshalb auch gar nicht unter gute Sprosser taugt.

Gegenwärtig ist meines Wissens der hervorragendste Sprosserliebhaber Deutschlands Herr Eduard Heppe in Marburg a. L., welcher schon 15 Jahre seine Vögel von mir bezieht. Wenn Sie diesen Herrn jetzt im Mai besuchen könnten, so würden Sie Tag und Nacht hören, welch herrlichen, wunderbaren Schlag die Aunachtigallen oder sogenannten Sprosser eigentlich haben.

Hochachtungsvollst

Ihr ergebenster
Mathias Rausch.

(Fortsetzung folgt.)



Ansicht des Innenflugraums.
(Zu nebenstehender Arbeit.)

Der Innenflugraum.

Von Alfred Troschütz, Hannover.

(Fortsetzung und Schluß.) (Nachdruck verboten.)

Der Bepflanzung, richtiger der Ausschmückung mit lebenden Pflanzen, habe ich viele Versuche gewidmet. Viel Geld, Mühe und Zeit habe ich verwandt, zu ergründen, was sich für den Flugraum am besten eignet. Zu abschließendem Urteile bin ich noch nicht gekommen. Nun sind Licht- und Luftverhältnisse bei solchen Anlagen sehr verschieden. Dort sind frische Luft und Morgensonne reichlich zugänglich, da ist nur Oberlicht, wenig gutes Seitenlicht, Lüftung in Nebenräume möglich, dort schadet Gaslicht, hier die trockene Luft der Zentralheizung. Beides kann keine Pflanze dauernd vertragen. Noch größer sind die Schädigungen durch die Vögel. Körnerfresser und Meisen zerstören jeden jungen Trieb, fressen jedes zarte Blättchen ab. Habe ich doch einmal eine wunderbare „Kentia", jetzt kaum noch zu bezahlen, durch Stieglitze, Dompfaffen und Hänflinge eingebüßt. Damals hatte ich im Herbst mit dem Herbeischaffen von Unkraut, Disteln und Futterpflanzen aufgehört. Jenen fehlte die gewohnte Beschäftigung der Schnäbel, und so gingen sie daran, die herrlichen Wedel der Palme in Fetzen zu verwandeln, was ihnen zu meinem Mißvergnügen in überraschend schneller Zeit gelang. Gerade für Räume mit trockener Luft (Zentralheizung) sind einige Palmenarten gut geeignet. Sie zieren außerordentlich, haben aber außer den sehr hohen Preisen den Nachteil, den Vögeln keinen Unterschlupf zum Schutz und für die Nacht zu gewähren und zur Luftverbesserung nicht beizutragen. Das ist aber der Hauptzweck der Bepflanzung.

Bei der Auswahl müssen alle Pflanzen, die schädlich wirken können, wie Bocksdorn, Kirschlorbeer, Oleander, alle Beerensträucher, auch die Berberitze (Sauerdorn) ihrer Bedornung wegen ausscheiden. Eberesche, Flieder und Holunder sind für große sonnige Freilandräumlichkeiten geeignet. Mit dem sehr genügsamen Zwergholunder (Sambucus) und dem winterharten, immergrünen Rhododendron will ich noch Versuche anstellen, befürchte aber Beschädigungen durch die Körnerfresser. Stechpalme und Efeu verlieren in trockener Luft bald die Blätter.

Auch Lebensbaum (Thuja), Wacholder und Taxus dauern in geschlossenen Räumlichkeiten nicht lange, sind schwer zu reinigen, Taxus und Thuja in größeren Stücken auch recht teuer. Pampasgras (Gynerium argentum), den baumartigen Buxbaum (Buxus semp. arbor.), Liguster und die japanische Quitte (Cydonia jap.) habe ich zu Versuchen bis jetzt noch nicht erlangen können.

Noch etwas über Bastardzucht.

Von Walter Barth, Göttingen.

(Nachdruck verboten.)

In der ornithologischen Literatur gut bewandert, ist es mir immer aufgefallen, daß in allen Büchern stets die eine Angabe wiederkehrt, zu Bastardzüchtungen möglichst gelbe oder doch recht helle Weibchen zu nehmen. Wenn ich es nun wage, an diesem geheiligten Vorurteil zu rütteln, so sind es nicht Vermutungen, auf die ich mich stütze, sondern eigene Erfahrungen und die Angaben völlig zuverlässiger Züchter. Es ist nicht allein das Äußere, das den Wildling einen besseren Ersatz für das eigne Weibchen vortäuscht, sondern das sexuelle Temperament der grünen und gescheckten Weibchen ist lebhafter, daher die Möglichkeit einer erfolgreichen Begattung eine viel größere als bei den hochgelben. Dann habe ich die meisten schlechten Brüterinnen und Mütter ebenfalls unter den gelben gefunden. Kurz, es sind viele Nachteile, die gegen die Verwendung hochgelber Weibchen sprechen, daß die Vorteile der gescheckten und grünen um so mehr auffallen. Nun wird der Anfänger einwerfen, ich will doch gerade helle Bastarde erzielen! Die gibt es auch von nichtgelben Weibchen. Es ist bei der Bastardzucht etwas anderes, als beim Farbenmischen; hier bekomme ich, stets die richtigen Mengen angenommen, die Farbe, die ich wünsche. Gelb und Blau geben stets Grün. Dagegen kann ein gelbes Weibchen von einem gescheckten abstammen und umgekehrt. Der hellste Stieglitzbastard, den ich im Jahre 1922 zog, war von einem grünen Weibchen. Girlitzbastarde von hochgelben und grünen gezogen wiesen auch nicht den geringsten Unterschied in der Gefiederfärbung auf. Nun wird man sich die Frage vorlegen, wie ist die Angabe, daß die schönsten Bastarde stets von gelben Weibchen fallen, immer wieder in die Literatur gekommen? Nun, die Lösung ist sehr einfach und verblüffend. Viele, die über Bastardzucht schrieben, haben — — abgeschrieben. So brachte die „Gef. Welt" vor etwa 8—10 Jahren Beiträge einer Dame, die sich die Erfahrungen anderer so gründlich zunutze gemacht hatte, daß sie ganze Sätze aus einem Vogelzuchtbuch abgeschrieben hatte. Selbst Vater Ruß, dessen Verdienste auch nicht einmal angetastet werden sollen, schreibt in der mir vorliegenden Ausgabe seines Werkes „Der Kanarienvogel" fast in jedem Satze über die Bastardzucht „es sollen" gezüchtet sein. Das Tollste, was wohl je über Bastardzucht geschrieben wurde, ist das Buch von Walter. Vierfünftel des Buches ist angefüllt mit Reklame für Futterverkäufer und Käfigherstellter und die Gefiederbeschreibung der zur Zucht geeigneten Finkenvögel; wer Bastardzucht betreiben will, der wird doch keine Belehrungen mehr über das Gefieder benötigen! Doch ich bin etwas abgeschweift, vielleicht ist es gut, daß auch einmal dieser wunde Punkt berührt wurde. Dann wird stets die Zeisigbastardzucht als die leichteste in den Büchern angegeben; das ist nach meiner Ansicht nicht der Fall. Gewiß, wenn Käfige und Verpflegung einigermaßen sind, so wird diese Zucht sehr oft glücken. Doch viel leichter als diese ist die Zucht mit dem Girlitz, nur muß der Käfig genügend groß sein, denn die Bewegungslust und das Temperament dieses kleinen Kerls ist ein sehr großes. Wer Platz und Gelegenheit hat, diesem einen sehr großen Flugkäfig zur Verfügung zu stellen, wird seine helle Freude an den Liebesflügen haben. Noch anmutiger und auch erfolgreicher in der Zucht ist der Girlitz in einer, wenn auch sehr kleinen Vogelstube. Hier ist er in der Liebe ein unübertrefflicher Husar, dem es nicht darauf ankommt, daß er Nachkommen von drei, auch vier Frauen hat. Schließlich rede ich der Girlitzbastardzucht auch deshalb so warme Worte, da die Nachkömmlinge fast durchweg fruchtbar sind; diese Eigenschaft fehlt den anderen Bastarden und macht diese leider für diesen Zweck wertlos. Gewiß gebe ich zu, daß hin und wieder auch ein Stieglitzmischling usw. Nachkommen zeugen kann, doch dürfte sich dieses stets nur auf Einzelfälle beschränken. Bei den hohen Preisen der Ausländer und bei der geringen Möglichkeit, diesen im Winter stets einen warmen Raum zu geben, empfiehlt es sich, nicht bei den Girlitzmischlingen stehen zu bleiben, sondern diese wiederum weiter mit Girlitzen und Kanarien zu paaren. Schließlich stehen wir dann vor der Tatsache, daß es gelingen kann, hier eine neue Rasse herauszuzüchten. Wie die Wellensittiche in nicht allzulanger Zeit in den verschiedensten Farbenspielarten gezogen wurden, wie die Mövchen sich als konstante Vogelrassen gehalten haben, so bietet hier der kleine Girlitz Aussichten, die wir nur ahnen können. Schließlich wird einmal die Tatsache eintreten, da die Kanarien durch Inzucht, zu frühzeitiges Nisten so entartet sind, daß einmal neues Blut nötig ist. Hier kann meines Erachtens nur der Girlitz zur Auffrischung in Frage kommen, bei all den vielen Finken, die sich zur Mischlingszucht eignen, werden die wenigsten Arten fruchtbare Mischlinge bringen.

Dann noch einiges zur Nistmaterialfrage. Ich habe mit sehr gutem Erfolge bei der Mischlingszucht Moos benutzt. Es ist fast überall kostenlos zu haben, bietet den Vorteil, daß man auch, während Eier oder Junge im Neste sind, mit dem Zerstäuber Insektenpulver hineinbringen kann, ferner drückt es sich nicht so zusammen wie Scharpie. Wann bringt man nun die Nistgelegenheiten an? Fast immer werden diese zu früh gereicht; der Anfänger, der die Tage gezählt hat, an dem die Jungen auskommen müssen, ist enttäuscht. Hier rate ich, stets nie vor Mitte April Nistmaterial zu reichen, vielleicht mit Ausnahme beim Hänfling oder Grünling. Voraussetzung ist es jedoch in diesen beiden Fällen, daß die Zuchtpaare allein gehalten werden, da sonst alle Weibchen bauen werden.

Dann zum Schluß noch ein Wort über die Dompfaffenbastardzucht. Mir selbst ist diese noch nicht geglückt; doch rate ich jedem, der versuchen will, hier kein Kanarienweibchen zu nehmen, sondern ein Grünlingsweibchen. Diese sind im Zuchtfutter sehr bescheiden, benötigen keine Ameiseneier, gleich den Dompfaffen, und sind sehr fruchtbar. Sollte ich noch einen Kernbeißer bekommen, so werde ich versuchen, diesen mit einem Grünlingsweibchen zu paaren. Viele Wissenschaftler rechnen den Grünling zu den Kernbeißern, auch die Gestalt und der anatomische Bau der Geschlechtsorgane scheinen für eine nicht ungünstige Aussicht zu sprechen.

Von der unteren Wolga.

Von Ingenieur Kracht.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Mai. 4.: In den Gärten unterhalb der Stadt tummeln sich Garten- und Dorngrasmücken, kleiner und rotrückiger Würger, grauer Fliegenschnäpper sowie verschiedene Laubvögel. In der Steppe begegne ich großen Schwärmen von Rosenstaren. Dieselben erscheinen mir noch viel lebhafter als unser Star, fliegen fortwährend kurze Strecken und laufen sehr rasch. Die prächtige Färbung kommt im Freien nur wenig zur Geltung. Kurze Zeit darauf waren diese Stare wieder verschwunden; es würde mich sehr interessieren, zu wissen, ob dieselben wohl hier an der Wolga nisten.

5.: Ich kaufe ein Tüpfelsumpfhuhn; dasselbe gewöhnt sich rasch an Mehlwürmer und rohes Fleisch.

6.: Heute ist mir das Glück hold, ich bekomme in der Steppe eine Zitronenstelze (M. citreola) zu Gesicht. Obwohl ich Schlagnetze bei mir hatte, gelang es mir leider nicht, des schönen Vogels habhaft zu werden. Das Gelb der Unterseite und insbesondere des ganzen Kopfes ist leuchtend, wie beim Pirol.

Girlitz.

7.: Beobachtet ein Paar Pirole, viele Blauraken. Letztere sind recht zärtlich untereinander und dürfte bald mit dem Brutgeschäft begonnen werden. Interessant war mir ein weißschwänziger Adler, der, auf einer Telegraphenstange sitzend, sich aus nächster Nähe eingehend betrachten ließ.

8.: Man bringt mir eine Zwergrohrdommel. Es fallen zwei Zwergtrappen aus.

13.: Erworben werden drei junge Steppenadler und zwei ganz junge Jungfernkraniche; alle fünf niedliche Kerle. Die ersteren sind untereinander recht unverträglich, insbesondere bei der Fütterung. In der Freiheit können sich die Tiere bei dem großen, bodenständigen Nest wohl mehr ausweichen, und schützen ohne Frage die Alten das fressende Junge vor Angriffen seitens der Geschwister. Die Vögel entwickelten sich recht gut nnd waren am 6. Juli voll befiedert. Der jüngste wurde eines Tages von dem ältesten totgebissen. Den mittleren trennte ich vorsichtshalber von dem Brudermörder und ließ ihn auf dem Hof frei. Er gewöhnte sich prachtvoll und wurde ganz zahm, ein Hoftier, wie man es sich nicht besser wünschen kann. Seine Nachtruhe hielt er auf dem Hausdach. Die Färbung des jungen Steppenadlers ist eine recht ansprechende.

Die Kraniche waren im Anfang sehr wärmebedürftig und mußten tagsüber mehrmals einige Stunden und auch nachts in eine Wärmkiste gesetzt werden. Gefüttert wurde anfangs nur rohes Fleisch, später nahmen sie auch getrocknete Ameisenpuppen und gequellte, enthülste Hirse an. Die Wachstumsgeschwindigkeit war etwa folgende: Höhe am 13. Mai 20 cm; 26. Mai 30 cm; 11. Juni 50 cm. Anfang Juli sind dieselben ausgewachsen und voll befiedert.

14.: Erworben werden eine alte, weibliche Zwergtrappe und vier Junge des Adlerbussards. Erstere wird in einem verhängten, ruhigen Lattenverschlag untergebracht und nimmt bald Salat und rohes Fleisch als Futter an. Sie wird in zirka drei Wochen aufgedeckt und ist in sechs Wochen so gut eingewöhnt, daß sie rohes Fleisch aus der Hand nimmt. Die Adlerbussarde, deren Horst in der Steppe auf dem Boden steht, haben ein eigenartiges Dunenkleid, dunkelgrau mit weißem Fleck am Hinterkopf, das Ganze überragt von langen, seidenartigen, weißen Härchen. Die kleinen Kerle sind furchtbar bissig, so daß ich sie eine Zeitlang trennte. Am 16. Juni waren die Vögel voll befiedert und stellten auf dem Hof Flugübungen an. Zwei derselben ließ ich später in die Gärten bringen, zwei blieben noch bis Mitte August, dann sagten sie: „Auf Nimmerwiedersehn". Ich bin entzückt von diesen Raubvögeln: die aparte Gefiederfärbung, der schlanke Kopf mit den grauen Augen, der Mut, der den Kerlen innewohnt. Dabei waren meine Vögel mir gegenüber doch sanft, sie bissen nie. Vor ihren Fängen muß man sich beim Füttern und, wenn man sie greifen will, allerdings gehörig vorsehen.

18.: Ich erhalte zwei ganz junge schwarze Milane. Die Dinger schauen zu niedlich aus! Dies aparte Aussehen ist bedingt insbesondere durch den schwarzen Fleck in der Augengegend und die sehr langen, wie Seide glänzenden Haare, die hauptsächlich am Kopfe

aus dem dunkelgrauen Dunenkleid heraustreten. Am 11. Juni sind die Tiere voll befiedert. Sie sind äußerst zahm und sehr sanft. Man kann sie ohne weiteres auf die Hand nehmen, ohne vor ihren Krallen Furcht haben zu müssen. Der Ruf ist recht angenehm, lachend, und klingt etwa ĭĭŭ, ĭĭŭ. Sie werden bald recht fluggewandt und verschwinden Ende Juli. Aus Astrachan bringt man mir drei Sprosser, Wildfänge, mit, die alle in wenigen Tagen mit dem Schlag begannen.

21.: Die Würgfalken sind schon gut befiedert; ich muß sie aber töten, da Füße und Flügel verwachsen, wohl infolge ausschließlicher Fütterung mit rohem, magerem Fleisch. Sind übrigens arge Schreihälse. Als Ersatz erwerbe ich vier Junge des niedlichen Rötelfalken. Eigenartig ist der weißliche Schnabel und die grünliche Augengegend. Die Freude währte nicht lange, denn schon vier Tage später biß ein Ziesel alle vier tot.

Juni. 9. Man bringt mir einen Kormoran.

14.: Erworben werden drei junge Zwergtrappen, Höhe zirka 16 cm. Nachdem dieselben ein paar Tage lang mit rohem Fleisch gestopft wurden, nehmen sie solches und getrocknete Ameisenpuppen selbst an. Junge Wiedehopfe und Steinschmätzer werden mir verschiedentlich gebracht.

20.: Ich grabe ein Bienenfressernest aus; in demselben sind drei eben ausgeschlüpfte Junge und noch zwei Eier. Ich decke das Nest sorgfältig wieder zu. Die Niströhre von 5—6 cm Durchmesser ist wagerecht und 80 cm lang. Hinten steigt sie etwas an und mündet in einer Mulde von zirka 30 cm Durchmesser und 12 cm Höhe. Die Mulde enthält kein eigentliches Nistmaterial, die Eier und Jungen liegen vielmehr auf einem Gemisch von Sand und Ameisen. Erworben wird ein alter Schreiadler.

23.: Man offeriert mir einen flüggen Würgfalken, drei mittelgroße Jungfernkraniche und vier noch nackte Blauraken mit altem Weibchen.

Juli. In den ersten Tagen dieses Monats werden junge Enten — Krick-, Rost-, Spieß- und Löffelenten — zum Ankauf angeboten. Frühmorgens gegen 4 Uhr ziehen Krähen in unabsehbarem Zuge, von den Wolgawäldern kommend, der Steppe zu. Häufiger ziehen Flüge von Gänsen und anderen Wasservögeln über die Stadt hin.

7.: Junge Steppenadler, die sozusagen flügge sind, werden in diesen Tagen häufiger angeboten. Ich kaufe vier Bienenfresser, die ganz mit Federkielen bedeckt sind. In den Gewöllen finden sich Überreste von Ameisen und Heuschrecken, sowie viel Sand. Die Jungen sind sehr böse und stoßen heftig mit dem spitzen Schnabel nach ihren Gebrüdern und nach dem sich ihnen nähernden Finger. Nach der Nahrung schnappen sie von der Seite, schieben sich dann aber weit auf die Pinzette hinauf. Gibt man ihnen das Futter zu weit nach der Spitze zu in den Schnabel, so schleudern sie es oft heftig wieder fort. Die Zahl der Jungen beträgt meistens vier oder fünf, seltener sechs. Es ist eine meiner liebsten Zerstreuungen, den reizend anmutigen Flügen dieser so farbenprächtigen Vögel vom hohen Uferrand aus zuzusehen. Die Niströhren sind teils im steilen Wolgaufer, teils in den Ufern der Regenrinnen angelegt und sind im allgemeinen ziemlich leicht zugänglich. Demnächst erscheint eine besondere Abhandlung von mir über diesen Vogel.

31.: Ich kaufe zwei schon ziemlich befiederte Blauraken. Die eine geht ein, die andere entwickelt sich prächtig, wird recht zahm und ist sehr munter. Besonderen Genuß von ihr habe ich dann, wenn ich sie frei fliegen lasse, denn dann zeigt sie mir so recht ihre Farbenpracht und Fluggewandtheit. Weiter erhalte ich einen Zwergtaucher. Die leuchtend roten Augen verleihen dem kleinen Kerl ein recht apartes Aussehen.

August. 6. Man bringt mir ein Nest der Beutelmeise mit fünf gut befiederten Jungen. Diesem Vogel werde ich eine besondere Abhandlung widmen.

18.: Ein Ziegenmelker ist in das Schulzimmer geflogen; ich gebe ihm die Freiheit zurück.

22.: Erhalte wieder ein tadelloses gepunktetes Sumpfhuhn. Bei einem Bekannten sehe ich zwei Junge des niedlichen Merlinfalken. Wie ich von einem Herrn aus der Krim höre, wird dieser Falk dort ebenso, wie der Sperber, zum Wachtelfang abgerichtet. Ein guter Vogel schlägt bis 150 Wachteln an einem Tag. Man darf nicht übersehen, daß eine solche Anzahl natürlich nur zur Zugzeit angetroffen werden kann, und über die Krim eine der großen Vogelzugsstraßen führt. Überzählige abgerichtete Falken werden für 50 M. nach der Türkei verkauft.

(Fortsetzung folgt.)

Kleine Mitteilungen.

Falco peregrinus. Zu den „Notizen" des Herrn Max Garling, Berlin-Karlshorst, in Heft 7, Jahrg. LI. möchte ich mir einige Bemerkungen gestatten: Zunächst wundert es mich, daß der Wanderfalk um Berlin noch so häufig ist. Hier in der Oberlausitz, die ihm mit ihren ausgedehnten Wäldern doch äußerst günstige Lebensbedingungen bieten, ist dieser prächtige Falk recht selten. Im vorigen Jahre wurde in der großen Görlitzer Heide nur ein einziger Horst festgestellt. Nun aber zur Hauptsache! Herr Garling ist der Ansicht, daß der Wanderfalke sich nur von Vögeln nähre und diese ausschließlich in der Luft im Fluge schlage. Auch Neumann vertritt diesen Standpunkt und sucht ihn dadurch zu begründen, daß er hervorhebt, daß es dem Falken schon deshalb unmöglich sei, Beute von der Erde aufzunehmen, weil er sich infolge der Heftigkeit seines Stoßes selbst Schaden zufügen würde. Inzwischen sind nun eine Reihe von Beobachtungen gemacht worden, ich selbst konnte sie leider nicht bestätigen, die dartun, daß Falco peregrinus wohl in der Lage ist, Nahrung vom Boden aufzunehmen. Nagy (Aquila XIII) fand in vielen Gewöllen neben Federn und Knochen von Corvus cornix, Bonasa bonasia, Columba polumbus, Turdus musicus, auch Schädel und Haare des Ziesels. Später (Aquila XIV) wurden in den Gewöllen und im Magen eines erlegten Vogels außer Zieselresten noch Mäusehaare gefunden. Nagy gelang es dann im Jahre 1914 (Aquila XXII), den Wanderfalken bei der Mäusejagd zu beobachten. Der Vogel strich in geringer Höhe (0,5—1 m) über den Boden dahin, glitt plötzlich mit kaum wahrnehmbaren Stoße herab, griff die Maus mit beiden Fängen, blockte in einiger Entfernung und köpfte das Opfer. Daß der Falke auf dem Boden Beute schlagen kann, ist auch von Richard Biedermann (Ornithol. Monatsberichte 1898) beobachtet worden. Der Vogel flog nahe über dem Boden und stieß plötzlich senkrecht herab; B. hat sogar gesehen, wie der Peregrinus mit „überraschender Schnelligkeit auf dem Boden rennen konnte". Der Wanderfalk darf also heute nicht mehr als ein Raubvogel angesprochen werden, der nur fliegende Tiere erbeuten kann, „als der adlige Parforce-

Jäger, der sein Wild hetzt, weil ihm die Jagd Freude bereitet" (Wild und Hund XXVII, 44); er hat es vielmehr verstanden, auch auf dem Boden lebende Säugetiere in geschickter Weise zu fangen, ohne selbst dabei Schaden zu nehmen. Dr. O. Hen, Görlitz.

Aus den Vereinen.

A. Z. Angemeldet sind die Herren Ludwig Kriete, Kaufmann, Vegesack b. Bremen, Gartenstraße 19; Heinrich Kriete jr., Kaufmann, Vegesack, Nordstraße 13: Josef Lederer, Wien XVIII, Kreuzgasse 22; Louis Köther, Kaufmann, Hildesheim, Jakobistraße 111; Hans Helmut Werner, Hannover-Linden, Jakobsstraße 7; Dr. med. Arthur Braune, Taubenberg, Post Enzisweiler; Hermann Blumberg jr., Trachenberg i. Schl., Posener Straße 1; Albert Knauf, Kastellan, Coburg, Hofgarten Nr. 2; Fritz Leppert, Kaufmann, Schopfheim i. Baden, Steinstraße 10; M. Rusetzki, Beuthen OS., Hindenburgstraße 16/C; Heinrich Lang, München, Guldeinstraße 34/0; W. Böttcher, Eisenbahntechniker, Königsberg i. Pr., Allee 11; Joh. Koppensteiner, Groß-Schönau bei Weilra N.-Ö. (Österreich); Anton Prettner, Buchhalter, Wien XIII, Grünberggasse 7; Max Kasten, Kaufmann, Schwenningen a. N., Jahnstraße 47. — Aufnahmegebühr und Jahresbeitrag von insgesamt 700 M. bitte auf Postscheckkonto Berlin 80731 Anschrift A. Krabbe, Anklam, einzuzahlen; etwaige Adressenfehler sind freundlichst zu berichtigen. — Aufgenommen sind die Mitglieder Nr. 262 A. Bernhoft-Osa, stud. zool., Stuttgart, Obere Birkenwaldstraße 217; Mtgl. 263 Th. Vanderhoff, Köln a. Rh., Habsburgerring 4, I. Etage; Mtgl. 264 Bern. Regge, Lotzen, Ostpr., Bismarckstraße 20; Mtgl. 265 Richard Zeeh, Friesen bei Reichenbach im Vogtland. — Mtgl. 177 wohnt nicht Klützstraße 3, sondern 1a; Mtgl. 203 wohnt jetzt in Vogel b. St. Goarshausen a. Rh. — Mtgl. 24 (Steinhagen, Lübeck) sucht 1,0 Zebrafink, 2,0 Stieglitze. Mtgl. 58 (Trommer, Hannover) sucht dringend je 1,0 Möwchen und Goldbrüstchen und tauscht evtl. gegen weiße und gelbe Hirse. Mtgl. 88 (Becker, Danzig) kauft Prachtfinken, außer Zebra- und Bandfinken. (Jahrbuch 1921 nicht mehr vorrätig. Danzig rechnet nicht zum Ausland.) Mtgl. 94 (Berkenhoff, Münster) sucht dringend 0,1 jap. Reisfink. Mtgl. 147 (Wöhle, Westhofen) vert. 0,1 jap. Möwchen gegen 0,1 gr Wellensittich und 0,1 Flammenweber gegen 0,1 Elsterchen. Mtgl. 152 (Ganetzki, Eisleben) bittet Wellensittichzüchter um Überlassung von 1,1 gr. Wellensittich gegen Abzahlung (dringend befürwortet, Kr.). Mtgl. 163 (Uhl, Hof) sucht 1,1 oder 0,1 Möwchen. Mtgl. 157 (Gohles, Chemnitz) sucht 0,1 gelben, 0,2 grüne Wellensittiche, evtl. Tausch gegen Männchen, ferner größere Sittichart oder Webervögel. Als Gegenleistung a. W. selbstgefertigte Nistkästen und Käfige nach Maß. Mtgl. 162 (Zacher, Kamenz) kauft Zuchtpaar Schama. Mtgl. 200 (Lehmann, Seidenberg) sucht dringend 2,2 Wellensittiche. Mtgl. 201 (Rischow, Stralsund) sucht 0,1 Bluthänfling, 0,1 Stieglitz, 1,1 Grünfink, Erlenzeisig, Dompfaff, Gimpel und sechsteiliges Heckregal für Kanarien. Mtgl. 204 (Stepan, Bodenbach) sucht Nußköpfchen und Schamas Mtgl. 235 (Richter, Bernstadt) sucht 1,1 Wellensittiche oder Zwergpapagei. Mtgl. 236 (Sommer, Leipzig) tauscht 1,0 braunbuntes Möwchen gegen 0,1 gelbbuntes sowie Neunzig, „Einheim. Stubenvögel", 6. Aufl. gegen Neunzig, „Fremdl. Stubenvögel" oder Prachtfinken, kauft letztere. Mtgl 242 (Römer, Liegnitz) tauscht zur Blutauffrischung 1,1 gr. Wellensittich, 21er Zucht. Mtgl. 258 (Stümcke, Vegesack) sucht 0,1 Nymphensittich zu kaufen oder gegen 1,0 oder Wellensittich zu tauschen. — Soweit die Beiträge eingegangen sind, sind die Jahrbücher ausgegeben. Die mehr als eins erhaltenen, sind mit 400 M. das Stück zu vergüten. Der Portoerhöhung wegen beträgt die Aufnahmegebühr jetzt 200 M. — Es ist geplant, einen „Ring der Wellensittichzüchter" im Rahmen der A. Z. zu bilden. Zweck: gemeinsame Preisregelung, Sicherstellung des Bedarfs der Mitglieder, bestmöglichster gemeinsamer Absatz nach dem Ausland zwecks Erlangung hochwertigen Zuchtmaterials mit Hilfe der heimischen Importeure. Zuschriften mit Rückporto an Unterzeichneten. — Für die F.-Matz-Stiftung gingen ein: Schütze, Eystrup 945 M., Stepan, Bodenbach 3200 M., Rischow, Stralsund 100 M. Bereits abgeführt 10405, zusammen jetzt 14650 M. Den Spendern herzlichen Dank. A. Krabbe.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig. Sonnabend, den 10. Februar, abends 6 Uhr, im Gesellschaftshaus „Metropol", Gottschedstraße: Jubiläumsfeier anläßlich des 25jährigen Bestehens des Vereins, verbunden mit Festtafel, künstlerischen Darbietungen und Ball. Gäste nur durch Einführung zugelassen. — Donnerstag, den 15. Februar, abends 8 Uhr, Generalversammlung im Vereinslokal „Bauers Brauereirestaurant", Täubchenweg. Tagesordnung wird daselbst bekanntgegeben. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen.

J. A.: Joh. Birk, 1. Vorsitzender,
Leipzig-Mockau, Beuthstraße 29.



Herrn Dr. B. Die Züchtungseinrichtung ist zweckentsprechend. Besser wäre ein größerer Nistkasten, aber der vorhandene ist ausreichend, wenn er genügend Raum zum Bau des Nestes hat. Das Durchfeuchten der Sägemehlfüllung ist eher schädlich als nützlich. Die Temperatur ist kaum irgendwie schädlich. Das Eierlegen läßt sich nicht verhüten, wenn den Vögeln ein Nistkasten zum Übernachten zur Verfügung steht.

Hochwürden L. H., Salzburg. Daß der Anblick der Katze oder die Zimmerwärme, welche vollständig ausreicht, Einfluß auf die Einstellung des Gesanges haben, ist nicht anzunehmen. Es ist von hier aus schwer zu ermitteln, weshalb der Vogel, nachdem er schon wieder im leisen Gesang war, jetzt das Singen einstellt. Vielleicht ist er zu fett geworden. Es wäre zweckmäßig, vermittels einer Briefwage das Gewicht festzustellen. Das Normalgewicht ist 18—19 g. Sollte die Mönchgrasmücke schwerer sein, so wäre durch Futterveränderung, Zusatz von trockenen Ameisenpuppen, für Abmagerung zu sorgen. Dieser Zusatz ist in jedem Fall zu empfehlen. Vielleicht macht er aber auch nur eine Erholungspause von einigen Wochen. Mehlwürmer werden von vielen Mönchgrasmücken verschmäht. — Die Beschaffung eines guten Sängers ist zurzeit sehr schwer. Die Vogelhändler haben nur kleine Bestände, und eifrige Vogelliebhaber sind immer sehr schnell bei der Hand, um wirklich gute Sänger zu erwerben. Eine bestimmte Bezugsquelle kann unter den obwaltenden Umständen beim besten Willen nicht angegeben werden.

Herrn G. St., Reißig. Paragraph 5 des Vogelschutzgesetzes bestimmt im Absatz 3, daß die Landespolizeibehörden (in Preußen die Landratsämter) Ausnahmen von dem Verbote noch für Stubenvögel für eine bestimmte Zeit und für bestimmte Örtlichkeiten bewilligen können. Nähere Richtlinien hierfür bestehen nicht. Am zweckmäßigsten ist es, sich mit dem zuständigen Beamten des Landratsamts, das ist der Beamte, welcher Feld- und Forstpolizeisachen bearbeitet, in Verbindung zu setzen, um zu erfahren, welche Schritte zu unternehmen sind.

Herrn W. U., Hof i. B. Das Möwchen ist einem Herzschlag erlegen. Sonstige Krankheitskennzeichen konnten nicht festgestellt werden.

Herrn St., Reuß. Leider ist es mir unmöglich, bei der Beschaffung des gewünschten Vogels zurzeit behilflich zu sein. Ich werde Ihren Wunsch aber im Auge behalten.

Herrn K. K., Limburg Der gewünschte Bericht wird in der „Gef. Welt" erscheinen.

Herrn Jos B., Leipzig. Dem Bericht über die Leipziger Ausstellung sehe ich mit Interesse entgegen.

Berichtigung.

Der Verfasser der Arbeit „Meine Nußköpfchen" in Heft 1 dieses Jahrganges ist Herr Norbert Grasl, nicht Herr Dr. Bilfinger, was auf Wunsch der beiden Herren hiermit richtiggestellt wird.

Käfige u. Gerätschaften

Spezialkäfige
und
Vorsatzgitter
ganz aus Eisen u. Zink
in allen Teilen zerlegbar, sowie alle ins Fach einschlagenden Arbeiten übernimmt zu
konkurrenzlos billigen Preisen
105] **W. Märker, Monteur**
Ravensburg i. W., Unter Burach 68.

Metall-Voliere
möglichst groß, mit genauer Beschreibung kauft Karl Nutz. [106
Königsberg Pr., Vordere Vorstadt 33.

Schlagnetze
für große und kleine schädliche Vögel habe jedes Quantum abzugeben (Spezialarb.), desgleichen Kaninchenfangnetze.
Christ. Deuz, Köln-Sülz,
Beyenstr. 19 II. [107

Suche zirka 10 Stück gebrauchte Harzer Bauerchen.
Ed. Türck, Chemnitz,
108] Henriettenstraße 51.

Futtermittel

Ornis-Haus
Halle-Saale.
Gegründet 1912.
Reform-Normal-Weichfresserfutter und Körnermischfutter
Tagespreise.
Bei Anfrage Rückantwort.
Ornis-Buch M. 50.—. [109

Vogelfutter
für **Kanarien, Waldvögel, Exoten, Papageien, Weichfresser.** Anfragen nur gegen Rückporto. Liste 13 über Vogelfutter 25 ℳ, Liste 5 über Vogelkäfige, Zuchtgeräte usw. mit etwa 400 Abbildungen 75 ℳ. [110
W. Göpel, Leipzig,
Tröndlinring 1 Telephon 14958.

Qualitätsfutter Sanitas
aus gar. nur erstkl. milbenfr. Ingred. 1 Kilo-Pak. 1250 ℳ, 5 Pak. à 1200 ℳ. [111
Sanitasverlag Heidelberg 46.

Mehlwürmer
Geg. Einsend. von 1100 ℳ ¼ Pfd. franko
Größere Posten Tagespreise.
Weißwurm Ia Pfund 1200 ℳ exkl. Porto und Verpackung.
Anfragen Rückporto beifügen.
D. Waschinski & Co.
Biesenthal b. Berlin.
112] Postscheckkonto Berlin 34825.

„Die Gefiederte Welt ist viel zu billig!"

das wird uns nicht allein von vielen Seiten gesagt, das ist leider auch tatsächlich der Fall! Wir mußten den Postbestimmungen zufolge den Abonnementspreis schon im Laufe des Oktober auf Grund der damaligen Herstellungskosten festsetzen, inzwischen sind diese aber auf das Zwanzigfache gestiegen, so daß wir die „Gefiederte Welt" geradezu verschenken und dabei ganz katastrophal zusetzen.

Daß dies nicht so weiter gehen kann, werden unsere Leser selbst einsehen müssen! — Eine Abonnementserhöhung seitens der Post kann aus postalischen Gründen nicht erfolgen; wir müssen daher unsere verehrlichen Abonnenten, denen doch auch an einem Fortbestand ihrer „Gefiederten Welt" gelegen ist, um eine Nachzahlung von M. 700,— unter Benutzung des beiliegenden Postscheckformulares bitten, damit wir die Zeitschrift über Wasser halten können. Diese verhältnismäßig niedrige Nachzahlung — erhält man doch für M. 700.— noch nicht einmal ein Pfund Vogelfutter und noch nicht ein Brot — werden unsere verehrlichen Leser für die ihnen liebgewordene Fachzeitschrift wohl auch gern leisten! — Auch diese würde für uns noch keinen Nutzen in Aussicht stellen, aber doch den Verlust einigermaßen verringern. **Jedenfalls würde von dieser Bereitwilligkeit der Bestand der Zeitschrift abhängen!**

Wir bitten daher freundlichst den Verhältnissen Rechnung zu tragen und uns umgehend den erforderlichen Betrag einzusenden. Inserate kosten von jetzt ab M. 100.— die viergespaltene Nonpareillezeile.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung

Reform-Käfige
Zerlegbar · Leichteste Reinigung · Einfachster sicherer Transport
1. Preis beim Käfig-Wettbewerb Leipzig 1919 (s. Ges. Welt 1920, Heft 14—16)
werden für alle Vogelarten hergestellt.
Goldene Medaille Leipzig 1921.
Ausführung: Hartholz, grünlackiert oder naturlackiert, Zinkschublade, Porzellannapfe, Lederruchdecke.
Keine Fabrikware, sondern beste Spezialarbeit!
Anfertigung als Kistenkäfig oder Wiener Form (halboffen) oder halboffen mit fester Rückwand. Ohne jedes Werkzeug in einer Minute zusammengestellt resp zerlegt. Verpackung zum Selbstkostenpreis.
Fertigen auch jede Art Käfige u. Volieren n. Zeichnung od. Maßangabe.
Anfragen Rückporto beifügen
Katalog gegen Einsendung von 75 Mark in Briefmarken.
Schlagnetze ohne Mittelsteg
für schädliche Vögel, prima handgeknüpfte Ware.
Kühn & Muschter, Inh. Arthur Muschter,
Borna b. Leipzig, Kasernenstr. 4.
Spezialwerkstätte für Käfigbau.
Bank-Konto: Allgemeine Deutsche Credit-Anstalt Zweigstelle Borna. Stadt-Girokasse Borna b. Leipzig Nr. 1506.
Postscheck-Konto: Leipzig 92250. Fernsprecher 147. [113
Zahlreiche Anerkennungs- und Dankschreiben.

Von meinem bekannten erstklassigen tiefen Stamm habe ich noch einige prima
Kanarienhähne u. -Weibchen
sowie reingelbe Zuchthähne abzugeben.
Versand nach allen Ländern. Beste Referenzen des In- und Auslandes. Bei Anfragen erbitte Rückporto, vom Ausland in Geldscheinen. [114
A. Schellenberger, Leipzig-Neuschönefeld,
Melanchthonstr. 1.

Vögel

[redacted]

Suche
1a Schwarzplatte
zahle 6500.— M.
gar. 1a Sprosser
zahle 35000 M. u. mehr.
Vögel müssen I a im Gesang sein.
W. Voigt,
Jena, Feodorastr. 13.
A. Z. Mitgl. 255. [115

[redacted]

Lebender Steinkauz
zu kaufen gesucht. [116
Severin Riegemann, Köln-Sülz,
Aegidiusstraße 52.

Kaufe
1,1 kleinen roten Dompfaffen, 1,0 Bluthänfling, auch einzeln. Preisangebote inkl. Verpackung an [117
E. Weigelt,
Weigmannsdorf b. Lichtenberg i. Erzg.

Graupapagei
Für zahle 40000 ℳ, Amazonen 15000 ℳ, Wellensittiche 1500 ℳ per Stück, wenn fehlerlos, franko Stuttgart, ohne Anfrage sofort per Nachnahme senden. — Ferner zahle für Kanarienhähne 6000 ℳ, -weibchen 500 ℳ, Stieglitze, Zeisige, Dompfaffen, alle Arten exotische Vögel und Sittichearten. Anfrage gegen Marke.
Beck, Tierimport,
Stuttgart. [118

Kaufe zur Zucht
1,1 Schmetterlingsfinken
1,1 Reisfinken
1,1 Grauedelsänger
1,1 Jap. Mövchen
müssen Ia vorjährige Tiere sein und bitte um Angebote.
H. Hahn jr.
Neuß a. Rhein
Krefelder Str. 60. [11

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Hermsdorf bei Berlin; für den Anzeigenteil: Franz Wunderlich, Magdeburg, Postschließfach 148.
Verlag der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck: August Hopfer, Burg Bz. Mgdbg.

Jahrgang LII.
Heft 4. 15. Februar 1923.

Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Die Gefiederte Welt gelangt am Donnerstag nach dem 1. u. 15. jedes Monats zur Ausgabe und kostet vierteljährlich 750 Mark. Einzelpreis des Heftes 150 Mark.
Inserate für die folgende Nummer müssen bis spätestens Freitag früh in Händen der Verlagsbuchhandlung sein.
Die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 100 Mark berechnet.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung (M. Kretschmann) in Magdeburg.

Postschließfach 148. Postscheckamt: Magdeburg 3148. Fernsprecher: 1323.

Ein Zuruf an die Leser der „Gef. Welt".

Ob ich dazu berufen bin, an die Leser unserer Zeitschrift zu appellieren, weiß ich nicht, doch drängt es mich, dies zu tun in steter Sorge um den Fortbestand der „Gefiederten". Wir haben alle in Nr. 3 die Nachforderung gelesen, die der Verlag an uns stellt. Derjenige, welcher aus Geschäftsrücksichten gezwungen ist, Fach- und Tageszeitungen zu halten, ist Nachforderungen der Presse gewöhnt und sieht — wenn auch nicht ganz ohne Groll — dessen Notwendigkeit ein. Bei unserer „Ges. Welt" ist es die erste, und da kann ich mich nicht enthalten, einige Worte hierzu zu sagen. Daß ich bei der ganzen Entwicklung unserer verwickelten Verhältnisse etwas Ähnliches voraussah, darüber ließ ich in meiner kurzen Ausführung auf Seite 188 in Heft 24 des vorigen Jahrganges keinen Zweifel, nur ahnte ich nicht, daß die Lawine des wirtschaftlichen Niederganges und der Teuerung nach kurzem Stocken so schnell zu Tal sausen würde.

Die „Ges. Welt" wurde zu Anfang des Jahres 1872 von Dr. Karl Ruß gegründet und ging nach dessen Tode im Jahre 1899 nach einer kurzen Übergangszeit in die Hände des jetzigen Herausgebers, Herrn Karl Neunzig, über. Eingekleidet in ein geschmackvolles grünes Gewand, voll von belehrenden und unterhaltenden Aufsätzen, bedruckt mit den verlockendsten Angeboten unserer Großfirmen, war sie in den Vorkriegsjahren auf der Höhe ihres Daseins. Kein Blatt des Kontinents konnte sich mit ihr messen; ausschließlich der Stubenvogelliebhaberei gewidmet, nahm sie deren Interesse nachdrücklich wahr. Den bedeutendsten Männern unserer Zunft hat sie ihre Spalten geöffnet, Männern, deren Namen durch sie unauslöschlich eingegraben sind in der Geschichte unserer Liebhaberei und der Erforschung. Dann kam der Krieg. Die Leserschar zog zum Teil ins Feld, zum Teil sah sie sich zur zeitweisen Aufgabe der Vogelhaltung gezwungen. Nach tapferem Kampf um den Fortbestand mußte der Ungunst der Verhältnisse das erste Zugeständnis gemacht werden, indem der Umfang vermindert und die wöchentliche Erscheinungsweise auf die doppelte Zeit ausgedehnt wurde. Weiterhin fielen die Beigabe der Farbentafeln und auch der schützende Umschlag fort. So haben wir jetzt unser Leibblatt in der Gestalt, in welcher die letztjährigen Abonnenten es kennen.

Und soll nun als letztes auch das fallen? Nein, lieber Leser, jetzt heißt es Farbe bekennen, ob dir deine Liebhaberei und ihr Organ mehr gilt als wenige Papiermark. Von den Exotenliebhabern, die heute ohnehin „Valutapreise" gewöhnt sind, nehme ich ohne weiteres an, daß sie den Mehrbetrag wortlos erlegen. Aber auch dich, verehrter Liebhaber des herzigen Rotkehlchens, der Sängerfürstin Nachtigall, unserer heimischen Finken und die Liebhaberornithologen der Heimat bitte ich herzlich, helft alle, alle unser einziges Blatt durch diese schwere Zeit hindurch, bewahrt es vor dem Schicksal so vieler und meist der besten unserer Zeitschriften und bringt das Opfer, welches uns allen angesonnen wird. Bedenket, welchen Verlust für jeden Liebhaber der Fortfall bedeutet, ohne Zusammenhang, ohne Meinungsaustausch, ohne jede Möglichkeit Verkäufe und Kaufgesuche aufzugeben und ohne Wissen der Händlerangebote muß die einst so hoch entwickelte deutsche Stubenvogelliebhaberei, aller zusammenhaltenden Bande bar, dem Untergange geweiht sein und somit weiten Volkskreisen Belehrung, Anregung und damit reine Freude und Erholung vom Alltag des Lebens verschlossen bleiben.

Und was bedeuten 750 Mark Bezugspreis im Vierteljahr? Wenige Zigarren, einige Glas Bier oder siebenmal rasieren. Du lächelst vielleicht, aber es ist so. Die Mark hat heute noch $^1/_{10000}$ des früheren Wertes, was sich nur allzubald in horrenden Preisen und sinnverwirrenden Zahlenreihen zeigen wird.

Dies, verehrter Leser, ein Wort in letzter Stunde. Ich spreche wahrlich nicht für mich allein — Du glaubst doch nicht etwa, daß ich gar am Verlag interessiert bin? —, sondern weil mir von vielen Seiten, insbesondere aus dem Mitgliederkreise der A. Z., Befürchtungen über das Fortbestehen der Zeitschrift laut geworden sind, und ich bin sicher, daß die große Mehrzahl der Leser mir beipflichten wird. Darum: Haltet fest! Laßt nicht die deutsche Vogelliebhaberei untergehen und unterstützt die Zeitschrift, die deren Interessen vertritt. Auch ihr, Leser in Hochvalutanien, die ihr der deutschen Zeitschrift viel verdankt, zeigt euch zum Gegendienst verpflichtet!

Diese Gelegenheit benutze ich, um unsere altbekannten Importeure und Händler zu bitten, wieder Anzeigen aufzugeben, und sei es auch nur eine gedrungene Aufstellung dessen, was am Lager ist. Einer vermehrten Nachfrage könnten sie versichert sein. Der Händlerstand hat zweifellos schwer zu kämpfen, da er seine Auslandsware zumeist zurzeit mit Devisen kaufen und so den Weltmarktpreis bezahlen muß. Doch nicht einmal heimische Vögel werden angeboten, was mancher Liebhaber, der Ausländer nicht kaufen kann oder will, schmerzlich empfindet. Darum: Händler heraus!

Anklam, im Februar 1923. A. Krabbe.

Sprosser und Nachtigall.

Von J. Birk, Leipzig.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Brief II. Wien, den 3. Mai 1907.

Sehr geehrter Herr Birk!

Heute vormittag sandte ich Ihnen die Antwort auf Ihren werten Brief vom 30. v. M. an die Vereinsadresse, da ich eine genauere Adresse auf Ihrem werten Schreiben nicht vorgefunden habe. Nun entdeckte ich dieselbe aber auf dem Briefumschlage und verständige Sie so direkt von der Absendung meines Schreibens.

Bezüglich der Sprosser erlaube ich mir Ihnen noch mitzuteilen, daß die Beschaffung dieser Vögel heutzutage außerordentlich schwierig ist, und zwar aus dem Grunde, daß die Vögel aus den Sprossergebieten nirgends zum Versand gebracht werden können, sondern vielmehr durch Reisende geholt werden müssen, was unendlich viel Spesen macht und die Vögel erheblich verteuert.

Soeben schreibt mir ein Russe aus dem Moskauer Gouvernement, daß die Sprosser heuer kaum vor drei Wochen dort erhältlich sein werden, daß sie 10 Rubel pro Stück kosten und dort abgeholt werden müssen, weil es unmöglich ist, sie mittelst Spediteur oder auf andere Art zu senden. Kommt also der Sprosser schon an Ort und Stelle auf 10 Rubel = 25 M., so erhöht sich sein Anschaffungswert infolge der hohen Reisespesen auf mindestens 30 M., und ich frage nun, wie hoch man eigentlich so einen Vogel verkaufen soll, wenn man nicht dabei umsonst arbeiten, sondern die teueren Ameiseneier, welche die Vögel brauchen, ersetzt haben will.

Und so steht es in allen Gebieten. Wo einige halbwegs brauchbare Sprosser zu haben sind, kann man den Leuten gar nicht genug bezahlen, wenn man die Vögel an sich bringen will.

Angesichts solcher Tatsachen scheint es außerordentlich komisch, wenn manche Händler schon seit Wochen in den Fachblättern Donausprosser und alle anderen Sprosser mit angeblich vielfachem David, lieferbar schon Anfangs Mai, zu wahren Schleuderpreisen anbieten, als ob diese Herren über einen Überfluß dieser Vögel verfügen können. Aber gerade diese Inserate beweisen, daß die Betreffenden keine klare Vorstellung vom Sprosserbezug haben, sonst müßte ihnen unbedingt klar sein, daß sie unmöglich das halten können, was sie in den Inseraten versprechen. Ich z. B. zahle jederzeit recht gerne 15—20 Kr. für einen Donausprosser, da diese Vögel äußerst selten sind und erhalte trotzdem alljährig nur einige wenige Einzelvögel, obschon ich seit 20 Jahren in allen Donangebieten Verbindungen habe. Und doch werden immer wieder von neuem Donausprosser zu wahren Spottpreisen ausgeboten, als ob hier ein größter Überfluß herrschen würde!

Freilich bleibt es in allen solchen Fällen lediglich beim Anbieten, geliefert werden die Vögel fast nie, da es doch selten einem dieser Herren gelingt, Sprosser überhaupt im Verkehr zu setzen. Wie die Verhältnisse heute liegen, dürfte es heuer den Händlern auch dort am Platze schwer fallen, Sprosser an sich zu bringen und ich bin im voraus überzeugt, daß nur sehr wenige über die erforderliche Zahl Sprosser verfügen werden.

Es ist dies für die Gesamtliebhaberei um so bedauerlicher, als heuer eben das letzte Frühjahr ist, wo der Versand der Sprosser nach Deutschland durchgeführt werden kann, denn ist einmal das neue Reichsvogelschutzgesetz in Kraft, so ist die Einfuhr der Sprosser in Deutschland verboten und der Bezug dieser und aller anderen Weichfresser unmöglich.

Unter solchen Umständen glaube ich, hat es auch keinen rechten Zweck, die Vogelliebhaber für die Sprosser zu erwärmen, denn es wird ungemein schwierig sein, den früheren Liebhabern die Vögel zu beschaffen, ganz unmöglich aber, so viel Sprosser in den Handel zu bringen, um alle Herren Reflektanten damit befriedigen zu können.

Es zeigt sich also schon hier, daß das neue Reichsvogelschutzgesetz den größten Teil der Vogelliebhaberei geradezu auf den Kopf stellt und sie fast unmöglich macht.

Wenn Freiherr v. Berlepsch auch sagt, dem Vogelliebhaber soll es erlaubt sein, für sich und andere Liebhaber Vögel zu fangen, so ist das doch nur eine Redensart, die keinen praktischen Wert hat. Will z. B. ein Vogelliebhaber einen russischen David-Weidensprosser, so müßte er, vorausgesetzt, daß ihm der Ort, wo diese Spezies heimisch ist, bekannt wäre, selbst in das Gebiet reisen und sich einen Vogel fangen. Dies würde ihm aber nicht nur einen großen Zeitaufwand verursachen, sondern auch erhebliche Kosten, und der Sprosser käme ihm wenigstens 5—6 mal so hoch, als der allerteuerste bei einem sachkundigen Händler. Und ähnlich wäre es auch mit allen anderen Vogelarten.

Soll also die Vogelliebhaberei weiter bestehen und überhaupt lebensfähig bleiben, so kann sie das nur durch Vermittelung des Vogelhandels. Allerdings gibt es eine Zahl Vogelhändler, die den Bestand der Vogelliebhaberei nur schädigen, weil sie gar nicht die Fähigkeit haben, den Vogelliebhaber anständig zu bedienen, selbst wenn sie es wollten, und solche Elemente sollten eben unmöglich gemacht werden. Aber den Vogelhandel im allgemeinen beseitigen zu wollen, hat gar nichts Praktisches und für den Vogelschutz Förderndes an sich. Die Zahl der Vogelhändler hat doch auf den Vogelfang keinen Einfluß, wohl aber die Zahl der Vogelliebhaber, welche Vögel verlangen und zu kaufen wünschen, und diese Zahl wird sich nicht verringern, selbst wenn gar keine Vogelhändler mehr existieren werden.

Entschuldigen Sie gütigst diese Ausführungen, aber ich denke, daß dieselben für Sie als 1. Vorsitzender eines Liebhabervereins Interesse haben dürften, zumal ja nur die Wahrheit darin liegt, welche die diesfälligen Verhältnisse beleuchtet. Diese Verhältnisse sollte aber jeder Vogelliebhaber kennen —, es würde dann so manches Übel aufhören, das sich sonst zum Schaden der Vogelliebhaberei von Jahr zu Jahr fortpflanzt.

Bezüglich des Vereinssprossers wäre es mit Rücksicht auf den beabsichtigten Zweck vielleicht doch ratsamer, vorerst einen ausgewinterten zahmen Schläger zu erwerben. Vor 14 Tagen erstand ich einen solchen um 50 Kr., aber auf diesen hat sich bereits eine Dame das Bezugsrecht erkauft. Nun weiß ich noch einen zweiten, den ich gerne kaufen möchte, sofern ihn der Besitzer abgibt, was er allerdings nicht tun will. Das wäre ein Exemplar für Ihren Zweck, den könnte jeder hören zur beliebigen Tageszeit, nicht aber einen Frischfang, der Ruhe haben muß und in ein Vereinslokal gar nicht paßt.

Hochachtungsvollst mich bestens empfehlend, verbleibe ich

Ihr stets ergebener
Mathias Rausch.

Wie aus diesen Briefen zu ersehen, stellt Rausch den Sprosser weit über die gemeine Nachtigall, was ich nicht immer unterschreiben kann. Ein Ia Sprosser wird eine mittelmäßige Nachtigall stets in den Schatten stellen, hingegen eine erstklassige Nachtigall, die in allem den verwöhntesten Liebhaber befriedigt, muß einen mittelmäßigen Sprosser jederzeit verdrängen. Darum pflichte ich Rausch nur soweit bei, wenn es sich bei einem Vergleich um einen Ia Schläger handelt, dann will ich es gelten lassen, wenn der Sprosser vor die Nachtigall gestellt wird. Aber im Bausch und Bogen den Sprosser vor die Nachtigall stellen, dies wird wohl von keinem Liebhaber gebilligt werden, der Ia Nachtigallen und gleichfalls Mittelvögel oder gar Stümper von Sprossern gehört hat. Wollen wir daher Sprosser und Nachtigall als für den Liebhaber gesanglich gleichwertige Vögel gelten lassen, welcher Art der Vorrang gebührt, kann nur von Fall zu Fall, d. h. ein Individuum gegenüber dem anderen Individuum, gewertet werden. Wollen wir Liebhaber daher keiner Art den Wert ihres Gesanges streitig machen. Ich sehe in dem Sprosser den Sängerkönig, in der Nachtigall die Sängerkönigin, die mit ihrem unvergleichlichen Schlag im Heim des Liebhabers die erste Stelle erobert haben.

Nun will ich auf Einzelheiten der beiden Sänger eingehen, will aber gleich bemerken, daß ich nur das Hauptsächlichste streifen kann, denn es würde zu weit führen, zwei derartig vielseitige Sänger biologisch, gesanglich und im Wert als Stubenvogel so eingehend zu schildern, wie Sprosser und Nachtigall es wirklich verdienen. Schon im voraus möchte ich erwähnen, daß es sehr schwierig ist, den Schlag von Sprosser und Nachtigall theoretisch zu erläutern, in der Praxis können so vielseitige Sänger nur durch Käfigung von Vögeln aus verschiedenen Gebieten eingehend studiert werden, und nicht nur in einzelnen Exemplaren, sondern nur durch langjährige Pflege beider Vögel in vielen Exemplaren. Wer sich also über alles eingehend unterrichten will, dem empfehle ich die einschlägige Literatur, wie Rausch, „Sängerfürsten", Lazarus, „Der Sprosser", Ruß-Neunzig, „Einheimische Stubenvögel", sowie Fridrich, „Deutsche Vögel". Speziell Rausch hat sich Mühe gegeben, den Schlag von Sprosser und Nachtigall in menschlichen Stimmlauten zu veranschaulichen, was in Verbindung mit der Praxis des Gesanges von großem Wert ist für den Liebhaber. Auch über die Biologie beider Vögel etwas zu sagen, wäre nur eine Wiederholung des in den angeführten Werken darüber Gesagten. In meinen weiteren Ausführungen will ich mich deshalb hauptsächlich mit beiden Vögeln in ihrer Eigenschaft als Stubenvögel beschäftigen und anderes nur nebensächlich kurz streifen.

(Fortsetzung folgt.)

Unerfreuliches von meinen Exoten.

Von Dr. Bilfinger.

(Nachdruck verboten.)

In Anbetracht der fast unerschwinglichen Preise für seltenere und beliebte Sittichарten, ja der Unmöglichkeit, Verluste in absehbarer Zeit auszugleichen, ist es wohl angebracht, meine letztjährigen Erfahrungen hinsichtlich des Zusammenhaltens verschiedener Arten zu berichten. Vorweg sei betont, daß es sich um mehr oder weniger geräumige Zimmervolieren handelt im Gegensatz zur Haltung in großen Freiflugsvolieren. Über letzteres steht mir ein Urteil nicht zu; ich zweifele nicht, daß sich hier das Bild anders und wesentlich günstiger gestalten wird. Ich habe mich selbstverständlich in der einschlägigen Literatur Ruß-Neunzig genau umgesehen und besonders auch bei verschiedenen erfahrenen Züchtern und Händlern Umfragen vor dem Einsatz angestellt und zum Teil recht widersprechende Auskünfte erhalten, derart, daß ich mich wohl berechtigt glaubte, diesbezügliche Versuche anzustellen, überdies noch bestärkt durch

Beutelmeise.

gute Erfahrungen, die ich früher mit dem Zusammenhalten von Sing- und Wellensittichen im geräumigen Käfig gemacht hatte. Zweifellos wird sich immer wieder und wieder ein Liebhaber des gefälligen harmonischen Bildes, der Käfig- und Arbeitsspарnis halber verleiten lassen, verschiedene Sittichарten zusammenzuhalten zu Zuchtzwecken, zumal er auch ohne Zweifel da und dort günstige Auskünfte erhalten wird. Schematisieren läßt sich nun einmal nicht, da die individuellen Charaktere unserer Lieblinge großen Schwankungen unterliegen, ich möchte fast sagen, wie bei uns Menschen selbst. Immerhin läßt sich einigermaßen feststellen, was im allgemeinen als Regel zu betrachten ist — und heutzutage tun wir gut, uns allein danach zu richten und von Experimenten Abstand zu nehmen.

Das verflossene Jahr hat mir zum Überdruß gezeigt, daß gerade unsere geschätztesten und begehrtesten Sittiche im Käfig, sobald die Hecke in Frage kommt, ihre schlechten Eigenschaften in vollstem Maß entfalten, der Käfig mag noch so groß sein, wie er will.

I. Sing- und Wellensittiche: Käfig von 2 m Länge, 2 m Höhe, 90 cm Tiefe. Besetzt mit 1,1 Singsittichen, 2,2 Wellensittichen und später noch

mit 3,3 Wellensittichen und 1,1 Rußköpfchen; Kasten der Sing- und Wellensittiche möglichst weit voneinander entfernt.

Die ersten Tage nach Anhängen der Kasten im Januar v. J. allgemeine wüste Balgerei. Sing- und Wellensittichweibchen lagen oft als unerkennbarer Klumpen am Boden, jedoch bissen die Wellensittichweibchen derart wacker zu, daß die Singsittiche einigermaßen im Schach gehalten wurden und es zu einem Verlust nicht kam. Allmähliche Beruhigung, jedoch bis in den Herbst hinein, nie vollkommen. Die Singsittiche zeigten meist offene Feindschaft gegen die Wellensittiche, immer aber einen latenten Groll, der in ganz unerwarteten Überfällen zum Ausdruck kam.

Die Wellensittiche nisteten programmäßig und brachten ihre Bruten auf. Die Singsittiche kamen der argen Beißereien und Aufregungen wegen nicht über Begattungen und Rumoren im Kasten hinaus. Kein Ei wurde gelegt. Höchst kritisch wurde die Situation jedesmal, wenn junge Wellensittiche ausflogen; sie wurden stets von den Singsittichen überfallen und wären getötet worden, wenn die alten Wellensittiche nicht dazwischengetreten wären. Infolgedessen verkrochen sich auch meist die eben ausgeflogenen Wellensittiche in ihrem Schreck wieder auf Tage in ihre Kasten. Zu Verlusten kam es wohl deshalb nicht, weil die Wellensittiche den Angriffen der großen gewandt auswichen und namentlich durch überaus freche, tollkühne Gegenangriffe die Singsittiche einigermaßen im Schach hielten. Wenn die Not am größten war, stürzten die Wellensittichweibchen in ihre Kasten und traktierten dann den am Schlupfloch lauernden Singsittich mit wütenden Schnabelhieben. Einmal hatte ein Singsittich ein Wellensittichweibchen erwischt, und wie ein Raubvogel hielt er sein auf dem Rücken liegendes Opfer am Boden fest und hackte darauf los, dieses aber hieb dergestalt und wohlgezielt von unten nach dem Kopfe des Großen, daß er schließlich Reißaus nahm. Immer wieder, das ganze Jahr kam es vor, daß ein Wellensittichweibchen gelegentlich in den Singsittichkasten schlüpfte, worüber die rechtmäßigen Inhaber derart erregt wurden und spektakelten, daß ich Kämpfe fürchtete. Dieser Käfig war mir also eine Quelle steter Beunruhigung und Schererei, kostete mich viel Zeit wegen der Notwendigkeit dauernder Kontrolle.

Ergebnis der Zusammenhaltung: Die Singsittiche kamen zu keiner Brut, und sicher nur der Wellensittiche wegen. Verluste waren zufälligerweise nicht zu beklagen.

Bemerkt sei hierzu noch, daß ein anderes Singsittichpaar in einem helleren 1 Meter großen Käfig daneben schon im Februar 4 Eier hatte. Dieses Paar war allein gehalten. (Schluß folgt.)

Vom Zaunkönig.

Von G. Träber.

(Nachdruck verboten.)

Wenn man jetzt an schöneren Tagen des Morgens oder wenigstens in den Vormittagsstunden durch Gartenanlagen oder durch ein Dorf geht, so hört man trotz Kälte und kahlen Bäumen und Sträuchern sehr oft eine grelle Stimme zwitschern und pfeifen. Man sieht sich wohl danach um, doch ein Nichtkenner wird selten den Sangesmeister mit seinem schützenden braunen Federkleid erblicken. Mir ist es immer ein Genuß, wenn ich in der Natur so einen kleinen Knirps mit seinem aufgestülpten Schwänzchen von Strauch zu Strauch schlüpfen sehe und ihn ungestört beobachten kann. Bald singt er im dichten Holzhaufen, hier und dort ein verborgenes Lebewesen dabei mit erhaschend. Bald ertönt oben im nächsten Birnbaum seine lustige Weise. Von Sorgen um den Winter ist dem braunen Gesellen nichts anzumerken. Der Tisch ist aber auch im Winter immer noch reichlich gedeckt für den, der es zu suchen weiß. Folgen wir einmal so einem Stutzschwänzchen. Eben ist er über die Straße in den nahen Zaun in die Nähe des langsam fließenden Dorfbaches geschlüpft. Jetzt ein Sprünglein, er sitzt am Bachrand auf einem Hölzchen und pickt und pickt lustig aus dem Bachschlamm. Was mag es wohl sein? Schauen wir einmal nach dem Fleckchen hin, wo er gesessen hat. Ja, da ist nichts zu sehen als eingeweichter Schmutz und angeschwemmte Blätter. Doch halt, da regt es sich in dem Schlamm, ein rotes Würmchen kommt aus seiner kunstvoll gebauten Röhre. Es ist eine rote Mückenlarve. Beim näheren Beobachten sieht man, daß sich Häuschen an Häuschen reiht, alles Mückenlarvenwohnungen. Jetzt wissen wir, was unser Zaunschlüpfer so eifrig verspeist hat. So ist es nun leicht erklärlich, wie eben überall für den durch jede Ritze schlüpfenden König noch Nahrung in Masse vorhanden ist. Doch jetzt komme ich, am Wasser angelangt, wieder auf mein eigentliches Thema, worüber ich berichten wollte. Als Liebhaber unserer einheimischen Vogelwelt kam ich vor einigen Jahren in den Besitz eines der kleinsten unserer Sänger. Schon die Gefangennahme oder vielmehr das Sichselbstfangen dieses kleinen Kerlchens war tragisch. Ein mir befreundeter Gärtner brachte mir eines Morgens eine Mausefalle mit Inhalt. Doch was sah ich! Kein Nagetier, sondern einen Vogel, eben meinen Zaunkönig. Wahrscheinlich war das Kerlchen beim Schlüpfen durch die halbbedeckten Kastenbeete des Gärtners in die fängisch gestellte Mausefalle geschlüpft und hatte sich selbst gefangen. Nun gut, ich hatte ihn einmal, und wollte ich doch versuchen, ihn einzugewöhnen. Jetzt eine Behausung für denselben suchen und gut einrichten, war das Werk der nächsten halben Stunde. Fichtenreisig und zwei Nistkästchen mit Schlupfloch waren bald darin befestigt. Nun noch ein passendes Wassergefäß und einen übersichtlichen Futterkasten. Alles war fertig zur Aufnahme des neuen Bewohners. Glücklich schlüpfte er auch schleunigst aus dem Drahtgeflecht der Falle in das größere Gefängnis. Mit Futter war er gar bald versorgt. Die vorhergenannten roten Mückenlarven wurden unter aufgeweichtes Universalfutter gemengt, wo sie sich lange bewegen. Nun wurde der Neue sich selbst überlassen. Den nächsten Morgen konnte ich mich überzeugen, daß erstens der kleine Kerl noch im Käfig war und zweitens, was wohl das beste war, daß er gefressen hatte. Sämtliche Mückenlarven waren ausgesucht. Jedenfalls hatte er auch andere Teile des Futters dabei mit-

verzehrt. Doch damit es dem seiner Freiheit beraubten Sänger nicht zu eintönig ward, so gewöhnte ich denselben an das Aus- und Einfliegen aus seinem Käfig. Dies hatte er auch bald begriffen. Immer suchte er abends seinen Bauer zum Schlaf auf, wo er in eines der angebrachten Kästchen schlüpfte, um ungestört dort zu ruhen. Durch seinen lieblichen Gesang erfreute er mich vom frühen Morgen bis zum Abend. Nun hatte ich an einem Fenstertisch ein ziemlich großes Aquarium stehen. Oben bekrönte dasselbe ein Zimmerspargel (Asparagus sprengeri). Dieser bildete eine wunderbare grüne Laube. Hier war nun sein Lieblingsplätzchen. In der Mitte des Aquariums ragt eine Spitze der darin befindlichen Tuffsteingrotte ein wenig über das Wasser heraus. Hier saß er ziemlich oft und nippte vom Wasser, nahm auch zuweilen ein Bad. Daß aber sein Durst so gewaltig sein sollte, gab mir zu denken, ich glaubte erst, daß er nur zum Trinken dahin gehe. Endlich gewahrte ich, daß die Zahl meiner Fischchen geringer wurde, nun widmete ich der Sache mehr Aufmerksamkeit. Ich hatte unter anderen Fischen auch 60 Stück 2—3 cm große Ellritzen in diesem Aquarium. Es war ein herrlicher Anblick, wenn die kleinen Fischchen in dem klaren Wasser spielten. Wenn ich den Springbrunnen nicht arbeiten ließ, kam es sehr oft vor, daß die Fischchen sich an der Oberfläche des Wassers tummelten. Das war ihr Verderben. Sobald ein Fischchen in die Nähe des dort sitzenden Zaunkönigs kam, erhaschte er es mit Blitzesschnelle, flog davon und verspeiste es am nächsten Fenster zwischen den Blumentöpfen. Ich nahm vorher, ehe ich dies beobachtet hatte, an, daß mein kleiner Sänger um seine Freiheit trauerte, wenn er lange so ruhig auf dem Stein saß. Auf diesem Wege endeten gegen 50 Stück der kleinen Fischchen. Der Übeltäter war aber dabei sehr munter und fangeslustig. Im kommenden Frühjahr aber wurde der Sänger von Tag zu Tag trauriger. Es mag sein, daß ihm auch die Mückenlarven etwas fehlten. Selbige fangen um Mitte März bei schönem Wetter an, sich zu verwandeln. Kurz und gut, ich ließ dem Knirps ein Fenster offen, und gar bald hatte er sich seine Freiheit wieder gesucht. Jedenfalls hatte ich aber im Winter meine Freude daran, und es war mir neu, daß der Zaunkönig ohne Not auch kleine Fischchen verspeiste.

Von der unteren Wolga.

Von Ingenieur Kracht.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

September. 5. Gegen Abend beobachte ich einen Flug wilder Tauben (zirka 15 Stück) gen Süden fliegend. Viele Möven fliegen über die Stadt hin.

20.: Erwerbe drei angeschossene Zwergtrappen; bald dürften sich die Zwergtrappen auf die Wanderung begeben.

1916. (Im Juni erhalte ich Vogelfallen und fange eifrig teils in den Gärten südlich, teils in einem Garten in der Stadt.)

Februar. 6.: Große Schwärme von Mohren- und Spiegellerchen werden unweit der Stadt beobachtet.

März. 3.: Stare treffen ein.

8.: Feldlerchen fliegen trillernd über die Stadt weg, alte Zeisige und Stieglitze. See- und Steppenadler sind häufiger zu sehen.

11.: Ein prächtiger Frühlingstag! Kalanderlerche auf Kalanderlerche zieht von SW. nach NO., in zirka 50 m Höhe singend, vorüber. In gleicher Richtung ziehen Großtrappen.

15.: Sehe heute den ersten schwarzen Milan.

19.: Der Jäger schießt den ersten Steppenkiebitz.



Spiegellerche.

23.: Man bietet mir zum Kauf an Großtrappenweibchen, Zwergtrappemännchen, gemeinen Kiebitz und Kronschnepfe.

April. 2.: Schwalben (Rauch-) begrüßen uns. Ein Bekannter erwirbt eine Rothalsgans.

5.: Wiedehopf trifft ein. Dieser Vogel ist hier sehr häufig und erfreut sich desselben Rufes wie bei uns der Kuckuck.

15.: Man bringt mir Eier vom Turmfalk, Steppenadler, Steinschmätzer, Dohle, Elster und Star.

17.: Erhalte zwei geschossene Steppenbrachschwalben und ein Ei des Steppenkiebitz (angebrütet).

19.: Die ersten Bienenfresser führen ihre anmutigen Flüge über der Stadt aus. Ebenso trifft heute der schöne Nonnensteinschmätzer wieder ein. Dieser Vogel ist hier ziemlich häufig.

21.: Uferschwalben tummeln sich bei ihren Niströhren. Einige Sprosser schlagen fleißig in den wenigen Gebüschen der Stadt.

26.: Erhalte die ersten frischen Eier des Jungfernkranichs.

Mai. 5.: Erhalte das erste noch nicht vollzählige (4 Stück) Gelege des Bienenfressers.

7.: Erhalte einen eben ausgefallenen Steppenkiebitz.

19.: Man bringt mir die ersten Eier des Nonnensteinschmätzers.

24.: Blauraken haben Eier.

31. Erwerbe einen zirka zwei Wochen alten Adlerbussard.

Juni. 1.: Man offeriert mir einen flüggen Seeadler, ferner je einen zirka 10 Tage alten Steppenadler und Zwergtrappe, sowie einen etwa dreitägigen Jungfernkranich.

13.: Erhalte zwei alte und fünf junge Nonnensteinschmätzer, außerdem zwei junge Zwergtrappen.

Juli. 15.: Die Nonnensteinschmätzer verlassen uns.

28.: Zirka 150 Kormorane überfliegen in breiter Linie in geringer Höhe die Stadt.

29.: Zirka 400 Kraniche kreisen einige Zeit in sehr großer Höhe über der Stadt.

August. 1.: Die Bienenfresser verlassen den Brutort. Beutelmeisen fliegen aus.

18.: Ein anderes Beutelmeisennest fliegt aus.

27.: Feldlerchen streifen in Flügen umher. Kleine Falken liegen der Heuschreckenjagd in der Steppe ob. Auf dem Zuge sind Laubvögel, Rohrsänger, Dorn-, Zaun- und Gartengrasmücken, graue Fliegenschnäpper, Baumpieper und gelbe Bachstelzen, ferner graue Steinschmätzer.

September. 3.: Kleine Falken bekomme ich nicht mehr zu Gesicht, ebenso keine Steinschmätzer mehr. Von Kleinvögeln sind noch Laubvögel, Rohrsänger, Zaungrasmücken und gelbe Bachstelzen da. Sehe noch neun Bienenfresser.

6.: Es ist kühles Wetter eingetreten. Sehe einen Schwarm Stare. Die Rauchschwalben verlassen uns.

10.: Gartenrotschwänze sind auf dem Zuge.

15.: Beobachte noch eine größere Anzahl grauer Steinschmätzer und Stare sowie Feldlerchen. Die ersten Zwergfliegenschnäpper treffen ein.

25.: Das Laub ist schon gelb geworden und fängt an abzufallen. Beobachtet werden noch Laubvögel, Singdrosseln, eine Schwarzdrossel, außerdem zahlreiche Flüge von Feld- und Kalanderlerchen. Auf einer Sandbank in der Wolga sitzen über 500 Wildgänse.

Oktober. 11.: Die Bäume sind zum größten Teil entlaubt. Schwärme von Distel- und Grünfinken treiben sich auf Distelstauden, Buchfinken an den Wegrändern umher. Zahlreiche Wacholderdrosseln liegen auf der Wiese der Nahrungssuche ob.

1917. In diesem Jahre hatte ich Gelegenheit, den Frühjahrszug ziemlich genau beobachten zu können.

Januar. 23.: Erhalte die erste Mohrenlerche.

Februar. 16.: Bin in den Gärten unterhalb der Stadt. Auf dem nach Süden sanft abfallenden, hügeligen Gelände tummeln sich zirka 700 schwarze Mohrenlerchen, zirka 100 große Lerchen von gleicher Größe wie die vorerwähnten sowie zirka 100 Alpenlerchen. Leider gelang es mir nicht, einer der grauen Lerchen habhaft zu werden, ich halte sie jedoch eher für junge Mohren- als für Spiegellerchen.

März. 3.: Weile wieder in den vorerwähnten Gärten; es ist empfindlich kalt. Mohrenlerchen sind in überaus großer Zahl da, sie streichen. Ich schätze ihre Anzahl auf weit über 10000. Graue und Alpenlerchen bekomme ich heute nicht zu Gesicht, wohl aber größere Flüge Feldlerchen.

10.: Seit gestern Frühlingswetter. Die Stare treffen ein. Saatkrähen sieht man jetzt viele hier.

14.: Beobachte den ersten Flug Finken.

15.: Die Rückkehr der Feld- und Kalanderlerchen ist in vollem Zuge. Viele Großtrappen überfliegen die Stadt, und zwar in Gruppen von 2—20 Stück, Flughöhe zirka 50 m, Richtung SW. nach NO. Raubvögel haben sich in größerer Anzahl eingestellt. An der Wolga beobachtet man große Entenflüge.

17.: Sehe den ersten schwarzen Milan und fünf Buchfinken.

19.: Weiße Bachstelzen sind da. Beobachte große Flüge von Gänsen und die ersten Kraniche.

20.: Erhalte einen gemeinen Kiebitz.

23.: Sehe die ersten grauen und Wüstensteinschmätzer.

25.: Heute in den Gärten. Beobachte eine Steppenweihe, drei Singdrosseln, eine Amsel, ein Rotkehlchen (hier sehr selten), eine Zaungrasmücke, einen Laubvogel, einen Baumpieper, zwei Heckenbraunellen und sechs Wiedehopfe.

27.: Heute reger Kranichzug (Flüge bis 200 Stück) Der Jungfernkranich ist hier der gemeinere.

28.: Wieder in den Gärten. Überaus viele Wüstensteinschmätzer haben sich in diesem Jahr hier eingefunden. Überaus groß ist heute die Zahl der Raubvögel, unter ihnen viele Steppenadler. Die schwarzen Milane paaren sich bereits. Ein Nest der Nebelkrähe (sehr hübsch gebaut, dicht mit Ziegenhaaren ausgepolstert) enthält bereits sechs Eier. Beobachte zirka 20 Weidenlaubvögel, zirka 15 Rohrammern und die ersten Rauchschwalben. Im Weidengebüsch tummelt sich eine Bekassine.

(Fortsetzung folgt.)

Aus den Vereinen.

A. Z. Angemeldet sind die Herren Mathias Lang, Portier, München, Mittererstr. 41; Arthur Schiebe, Liegnitz i. Schl., Luisenstr. 24III; Gerhard Halm, Mühle Gohlsdorf, Post Brockendorf, Bez. Liegnitz; Julius Hauser, Freiburg i. Br., Friedrichstr. 2 (Kunsttempel); Hermann Boll, Postbeamter, Lörrach-Stetten i. Baden, Friedenstr. 12; Ernst Titze, stud. gym., Freiwaldau, Ring 64, i. Schles. (Tschechoslovakien); Hjalmar Anderzen, Eskilstunaoffären, Lidköping (Schweden); Hugo Keßler, Schauspieler, Berlin-Südende, Potsdamer Str. 23, Portal 9, 1 Tr. bei Schott. — Aufgenommen sind die Mtgl. Nr. 266 Ludwig Kriete, Kaufmann, Vegesack b. Bremen, Gartenstr. 19; Mtgl. 267 Heinrich Kriete jr., Kaufmann, Vegesack b. Bremen, Nordstraße 13; Mtgl. 268 Josef Lederer, Wien XVIII, Kreuzgasse 22; Mtgl. 269 Louis Köther, Kaufmann, Hildesheim, Jakobistraße 11I; Mtgl 270 Hans Helmut Werner, Hannover-Linden, Jakobsstraße 7; Mtgl. 271 Dr. med. Arthur Braune, Taubenberg, Post Enzisweiler; Mtgl. 272 Hermann Blumberg jr., Trachenberg i. Schl., Posener Str. 1; Mtgl. 273 Albert Knauf, Kastellan, Coburg, Hofgarten Nr. 2; Mtgl. 274 Fritz Leppert, Kaufmann, Schopfheim i. Baden, Steinstraße 10; Mtgl. 275 N. Rusetzki, Beuthen OS., Hindenburgstraße 16/C; Mtgl. 276 Heinrich Laug, München, Guldeinstr. 34/0; Mtgl. 277 W. Böttcher, Eisenbahntechniker, Königsberg i. Pr., Allee 11; Mtgl. 278 Joh. Koppensteiner, Groß-Schönau bei Weitra N.-Ö. (Österreich); Mtgl. 279 Anton Prettner, Buchhalter, Wien XIII

Grünberggasse 7; Mtgl. 280 Max Kasten, Kaufmann, Schwenningen a. N., Jahnstraße 47. — Mitglied 252 wohnt nicht in München, sondern in Mannheim, was hiermit berichtigt wird. — Mtgl. 26 (Sztachovics, Wien) sucht 0,1 kl. Kubafink, 0,1 brbt. Möwchen; gibt i. T. 1,1 gr. Kubafinken oder 1,0 Elfenastrild. Mtgl. 65 (Müller, Küllstedt) sucht je 1,1 Weber und Singsittich; gibt im Tausch dafür mit ab je 1,1 Nymphensittich, Zeisig, Bluthänfling, 1,0 Stieglitz. Mtgl. 155 (Diem, München) gibt ab i. T. gegen bessere Exoten: 1,0 Graukardinal, 2,1 Tigerfink, 2,1 Orangebäckchen, 1,0 Atlasfink, 1,1 Möwchen, 1,0 Paradieswidafink, 1,1 Grauastrild, 1,0 Mossambikzeisig, 1,0 Flammenweber. Mtgl. 73 (Schimang, München) gibt ab i. T. gegen bessere Exoten: 1,1 Zuchtp. Bandfink, 2,0 dito, je 1,1 Orangebäckchen, Schwarzkopfnonne, Tigerfink, 1,0 Wachtelastrild, 0,1 Weißkehlpfäffchen, 1,0 Grauastrild, 1,0 junges Möwchen, 1,0 Feuerweber, 0,1 Paradieswidafink. Sucht Hahnschweifwitwen zu kaufen. Mtgl. 79 (Neckermann, Ansbach) sucht Graupapagei, mögl. 1,0. Mtgl. 118 (Erdmann, Darmstadt) gibt guten Zeiß-Prismen-Feldstecher gegen Wellensittiche oder Kanarien, auch andere Exoten. Mtgl. 146 (Petzold, wohnt jetzt Mühlhausen i. Thür., Obermühle) vert. nur an Mitgl. Zuchtpaar gelbe Wellensittiche 21, 0,3 grüne 22 gegen andere Sittiche oder Seidenhühner. Mtgl. 163 (Uhl, Hof) sucht 0,2 Möwchen. Mtgl. 233 (Hirsch, Aubstadt) sucht je 0,1 Kanarie, orange, satin, isabell, fuchsfarben, gibt Stieglitzkanarienhahn i. T. Mtgl. 236 (Sommer, Leipzig) kauft 1,0 eingewöhnten Girlitz. Mtgl. 237 (Stoltze, Böblingen) sucht 1,1 winterharte Wellensittiche, auch einzeln, evtl. i. T. gegen Getreide. Mtgl. 241 (Landwehr, Dortmund) sucht 2 Wellensittichnistkasten. — Die wenigen noch ausstehenden Beiträge bitte ich nunmehr umgehend einzusenden. Für die freiwilligen Beiträge herzl. Dank. Quittung im nächsten Jahrbuch. A. Krabbe.

Bayerischer Vogelliebhaberverein (E. V.) Sitz München. Generalversammlung Samstag, den 27. Januar 1923, abends 8 Uhr, im Pschorrbräuhaus, Bayerstraße. Aus der Tagesordnung: Antrag des Vorstandes auf Erhöhung des Jahresbeitrages auf 150 M., Aufnahmegebühr 100 M. Die „Gef. Welt" ist Vereinsorgan und wird deren Halten obligatorisch; Einladungen zu Versammlungen usw. erfolgen künftig nur noch durch die „Gef. Welt". Der Bezugspreis für das 1. Vierteljahr wird vom Verein entrichtet. Der Vereinsbeitrag ist im voraus zu bezahlen. Das Erscheinen aller Mitglieder ist unbedingt nötig.

Rud. Engel, 1. Schriftführer, München, Baaderstraße 3 III.

NB. Anfragen an den Verein ist Rückporto beizufügen.

Die **Vereinigung der Liebhaber einheimischer Vögel zu Berlin** hielt am 9. Januar ihre Generalversammlung ab. Die sehr gut besuchte Sitzung eröffnete der Vorsitzende Geide um 9 Uhr und wünschte allen Mitgliedern ein gesundes neues Jahr. Aus dem nun folgenden Bericht des 1. Schriftführers ist folgendes zu entnehmen: Es fanden im Laufe des Jahres 1 Generalversammlung, 19 ordentliche Sitzungen, 1 Wintervergnügen, 1 Vorfrühlingspartie, 1 Nachtpartie und das 27. Stiftungsfest statt. In den Sitzungen wurden folgende Vorträge gehalten: Das Terrarium und seine Bewohner, Herr Kanthack; Die Bastardzucht, Herr Kirchner; Nordische Gäste, Herr Böhme; Tierschutz und Tierpflege, Herr Kanthack; Käfigung und Pflege unserer Vögel, Herr Rückert; Die Vermehrung der einzelnen Vogelarten, Herr Böhme; Verschiedene Fluttermethoden der bedeutendsten Vogelliebhaber, Herr Müller I. Zum erstenmal beteiligte sich die Vereinigung an einer Vogelschau. Die Vereinigung hat bei dieser in Ehren bestanden. Aus dem Bericht des Kassierers ist zu entnehmen, daß ein Bestand von 2235,05 M. vorhanden ist. Nach dem Bericht des Bibliothekars ist alles in bester Ordnung. Aus der stattgefundenen Neuwahl des Vorstandes ging der alte Vorstand als wiedergewählt hervor. Neugewählt zum 2. Vorsitzenden wurde Herr Merz. Der Vorstand setzt sich also aus folgenden Herren zusammen: P. Geide, 1. Vorsitzender; E. Merz, 2. Vorsitzender; P. Böhme, Schriftführer; C. Beutel, Kassierer; G. Scholz, Bibliothekar; Kassenrevisoren die Herren Müller II und Kanthack; Vergnügungsleiter die Herren Schulz, Bohwinkel, Krüger und Kirchner. Verschiedene Anträge auf Erhöhung der Beiträge lagen vor; der weitgehendste, den Beitrag von 18 M. jährlich auf 600 M. zu erhöhen, wurde angenommen. Zum Schluß der Versammlung fand die Prämiierung der Aussteller statt. Es erhielten die Herren Böhme 1. Preis, Scholz 2. Preis, Kirchner 2. Preis, Weiher 3. Preis, von Fischerz 3. Preis, Beutel 3. Preis.

P. Böhme, Schriftführer.

Vogelschutzverein „Edelfinken" in Düsseldorf hielt am 14. Januar seine Generalversammlung bei dem passiven Mitglied, dem Wirt Herrn Johann Bramstädt ab mit folgender Tagesordnung: 1. Zahlung der Beiträge; 2. Kassenbericht; 3. Geschäftsbericht; 4. Vorstandswahl; 5. Beitragserhöhung; 6. Verschiedenes. Anwesend waren sämtliche Mitglieder. Der 1. Punkt wurde glatt erledigt. Unter Punkt 2 gab unser 1. Kassierer den Kassenbericht vom Jahre 1922. Einnahme 5435 M. 22 Pf., Ausgabe 362 M. 60 Pf., verbleibt ein Kassenbestand von 5072 M. 62 Pf. Im Jahre 1922 wurden 2 Mitglieder gestrichen wegen Fehlen in der Versammlung, 2 traten so aus und 2 ließen sich passiv schreiben. Die Mitgliederzahl betrug am Schlusse des Jahres 12. 4. Punkt Vorstandswahl. Der altbewährte Vorstand wurde wiedergewählt: Johann Lautuer, 1. Vorsitzender; Fritz Rink, 2. Vorsitzender; Joseph Überlacker, 1. Kassierer; Adolf Schwarten, 2. Kassierer; Heinrich Grethe, 1. Schriftführer; Johann Möllmann, 2. Schriftführer. Zur Beitragserhöhung sprach unser 1. Vorsitzender. Ein Monatsbeitrag von 10 M. sei viel zu gering. Der Beitrag müsse unbedingt erhöht werden. Herr Heinr. Schmitz stellte den Antrag, den Monatsbeitrag auf 50 M. festzusetzen ab 1. Januar und den Beitrag der passiven Mitglieder auf 250 M. jährlich. Der Antrag wurde einstimmig angenommen. Im letzten Punkte wurde über die „Gef. Welt" gesprochen. Die Mitglieder waren sich darüber einig und erklärten, durch die Beitragserhöhung die „Gef. Welt" aus der Kasse zu bezahlen. Der Schriftführer wurde beauftragt, dem Verlag das mitzuteilen und den Generalversammlungsbericht mit einzusenden. Da somit die Tagesordnung erschöpft war, schloß der 1. Vorsitzende die gut besuchte Versammlung. — Die regelmäßigen Versammlungen finden jeden 2. Sonntag im Monat, morgens 10 Uhr beim Wirt Emil Könen, Nordstr. 58, statt. Heinrich Grehte, 1. Schriftführer.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig. Donnerstag, den 15. Februar d. J. im Vereinslokal: Generalversammlung. — Nächste Vereinssitzung am Donnerstag, dem 1. März d. J., im Vereinslokal „Bauers Brauereirestaurant", Täubchenweg. Sitzungen jeden 1. und 3. Donnerstag des Monats. Gäste sind stets willkommen.

J. A.: Joh. Birk, 1. Vorsitzender, Leipzig-Mockau, Beuthstraße 29.



Herrn E. F., Offenbach 1. Der Gimpel leidet an einer Erkrankung der Atmungsorgane. Es ist zu versuchen, ob das Übel durch Verabreichung erwärmten Getränkes (Wasser mit Zuckerkand oder Honig gesüßt) behoben wird. Aufenthalt in warmfeuchter Luft bringt auch bei solchen Erkrankungen Heilung. Man stellt den Käfig mit dem Vogel in die Nähe des Ofens und um den Käfig Blattpflanzen, die vermittels eines Zerstäubers wiederholt mit Wasser überbraust werden. 2. Bei dem Kreuzschnabel könnte es sich um eine Entzündung der Schleimhäute des Kropfes gehandelt haben.

Herrn F., Neckargartach. Gegen das nächtliche Stoben der Mönchgrasmücke gibt es kein Mittel. Der Vogel ist infolge der nächtlichen Unruhe bei Tage müde und sitzt ruhig. Die Zahl der gereichten Mehlwürmer ist zu groß. Sie muß ganz allmählich auf 2—3 täglich verringert werden.

Herrn H. G., Baden-Baden. Der Stieglitz ist infolge einer mit Abzehrung verbundenen Ernährungsstörung eingegangen.

Käfige u. Gerätschaften

Metall-Voliere

möglichst groß, mit genauer Beschreibung kauft **Karl Nuß,** [154
Königsberg Pr., Vordere Vorstadt 33.

Lerchenkäfig

zu kaufen gesucht.

Dr. Andreas, Hamburg,
156] Tornquiststr. 41.

Papageibauer

vertausche gegen 1,3 Kanarien.
156] **Regler, Dessau,** Bauhofstr. 11.

Lerchenkäfig

zu kaufen gesucht.

F. Zschau, Frankenberg (Sachsen),
Markt 14. [157

Guter Schindler-Lerchen-

käfig gesucht. **F. Vierenkemper,**
Münster i. W., Windhorststr. 7. [158

Futtermittel

Ornis-Näpfe in Porzellan

Mod. II $12\frac{1}{2} \cdot 4\frac{1}{2} \cdot 3\frac{1}{2}$ tief
Mod. I $15\frac{1}{2} \cdot 5\frac{1}{2} \cdot 3\frac{1}{2}$ tief

größere Mengen auch für den Export; auch einzeln als Beipack. (Siehe Ornis-Buch ℳ 250.— und Porto.) [159

Ornis-Haus, Halle-Saale.

Bei Anfragen Rückporto erbeten.

Mehlwürmer

Geg. Einsend. von 2000 ℳ ¼ Pfd. franko.
Größere Posten Tagespreise.
Weißwurm ausverkauft.
Anfragen Rückporto beifügen.

D. Waschinski & Co.
Biesenthal b. Berlin.
160] Postscheckkonto Berlin 34825.

Qualitätsfutter Sanitas

aus gar. nur erstkl. milbenfr. Ingred.
1 Kilo-Pak. 1250 ℳ, 5 Pak. à 1200 ℳ. [161
Sanitasverlag Heidelberg 46.

Vogelfutter

für **Kanarien, Waldvögel, Exoten, Papageien, Weichfresser.** Anfragen nur gegen Rückporto. Liste 13 über Vogelfutter 25 ℳ, Liste 5 über Vogelkäfige, Zuchtgeräte usw. mit etwa 400 Abbildungen 75 ℳ. [162

W. Göpel, Leipzig,
Tröndlinring 1 Telephon 14958.

Ornis-Haus
Halle-Saale.
163] Gegründet 1912.

Reform-Normal-Weichfresserfutter und Körnermischfutter
Tagespreise.
Bei Anfrage Rückantwort.
Ornis-Buch M. 250 — und Porto.

Reform-Käfige

Zerlegbar · Leichteste Reinigung · Einfachster sicherer Transport
1. Preis beim Käfig-Wettbewerb Leipzig 1919 (s. Ges. Welt 1920, Heft 14—16)
werden für alle Vogelarten hergestellt.
Goldene Medaille Leipzig 1921.

Ausführung: Hartholz, grünlackiert oder naturlackiert, Zinkschublade, Porzellannapfe, Lederrandeckel.

Keine Fabrikware, sondern beste Spezialarbeit!
Anfertigung als Kistenkäfig oder Wiener Form (halboffen) oder halboffen mit fester Rückwand. Ohne jedes Werkzeug in einer Minute zusammengestellt resp. zerlegt. Verpackung zum Selbstkostenpreis
Fertigen auch jede Art Käfige u. Volieren n. Zeichnung od. Maßangabe.

Anfragen Rückporto beifügen
Katalog gegen Einsendung von 75 Mark in Briefmarken.

Schlagnetze ohne Mittelsteg
für schädliche Vögel, prima handgeknüpfte Ware.

Kühn & Muschter, Inh. Arthur Muschter,
Borna b. Leipzig, Kasernenstr. 4.
Spezialwerkstätte für Käfigbau
Bank-Konto: Allgemeine Deutsche Credit-Anstalt Zweigstelle Borna.
Stadt-Girokasse Borna b. Leipzig Nr. 1506.
Postscheck-Konto: Leipzig 92250. Fernsprecher 147. [164
Zahlreiche Anerkennungs- und Dankschreiben.

Stubenvoliere!

Wegen Raummangels gebe von zwei gleichen **Volieren** eine ab. Größe: ca. 2,1 m lang, 1,0 m breit und 2,5 m hoch, auf eis. Gestell von 0,35 m Höhe stehend. Voliere ganz aus Eisen in leichter Konstr., mit engmasch. Drahtgefl. und 2 Schiebladen 0,14 m hoch aus starkem, im Vollbad verzinkt. Eisenblech. Voliere bes. Einrichtg. f. Baum u. hat 3 Türen, ist auseinandernehmbar, schwarz lackiert u. **wie neu.** Gute Schlosserarbeit. Gesamtgewicht ca. 140 kg. **Friedenspreis 360 ℳ.** [165
Genaue Kalkulation (Aufstellung d. verwendeten Materials und der Lohnstunden) zwecks Feststellung des Wertes steht ernsthaften Interessenten zur Verfügung. Besichtigung jederzeit.

Tausche auf zuchtfah. Exoten (bei. Sittiche, spez. Farbensittiche) aller Art, auch einheimische Körnerfresser, Farbenkanarien, gelbe Kanarienweibchen usw.

Hegemann, Betr.-Ing., **Hameln a. d. W.,**
A. Z. Nr. 177. **Klütstraße 1a.** A. Z. Nr. 177.

Suche zu kaufen zu höchstem Preise

(zahle in belgischen Franken. Voreinsendung des Betrages bei der Geschäftsstelle der „Gefiederten Welt"):

verschiedene ♂ und ♀ **Schneeammer, Spornammer, Zwergammer, Zipp- oder Bartammer, Zaun- oder Zirlammer, Grauammer, Schneefink, Linden-, Fichten- und Kiefernkreuzschnabel, Hakengimpel, Karmingimpel** (Carpodacus erythrinus), **Großer Gimpel, Girlitz, Berghänfling** (Acanthis flavirostris), **Zitronenzeisig, Kirschkernbeißer, Rosenstar, Ringdrossel, Stein- und Blaudrossel und Seidenschwanz.**

Genaue Angebote mit Preisangabe an [166

J. Van Baeten, 21, Rue Basse Ville, Courtrai (Belgien).

Aufbewahren!

Suche bessere Weichfresser ♂, mögl. Frühj.-Wildf. Gebe dafür 3 Sorten friedensmäß. Mischfutter für a) Erdsänger, b) Grasmücken, c) Drosseln. Gegen Angabe der Tauschvögel versende Probe des gewünschten Futters.
Angebote unter F. H. 26 an die „Ges. Welt". [167

Suche zu kaufen bis je ½ Dtz. Gartengrasmücken, Heide- u. Feldlerchen u. Bluthänflinge, ferner bis je 3 Stück Gartenspötter, Dorngrasmücken, Baumpieper u. Haubenlerchen; auch alle kl. Wasservögel nicht über Lerchengröße, z. B. Flußuferläufer, Halsbandregenpfeifer usw. Es muß volle Garantie für richtige **Männchen** gegeben werden, zahle dann jeden guten Preis. Angebote bitte nicht unter 3 Stück u. nur per Postkarte. Portoauslagen werden gern vergütet. Suche obige Vögel auch später, noch bis Mitte Mai zu kaufen. Kaufe auch von jedem reellen Händler. Einige Ia Männchen Schwarzplättchen und diverse seltene Exoten gebe evtl. in Tausch. **Peter Matzen, Göttingen.** [168

Vollständige Reihe Gefiederte Welt,

z. T. geb., einige Tafeln fehlen, gegen hohes Gebot zu verkaufen beauftragt. In 4 Wochen kann ich seltene Werke, wie Latham, Heuglin, Naumann I und and. anbieten. Kaufe gute Ameiseneier, Weißwurm, Mehlwürmer, ornith. Literatur zu angemessnen Preisen. Gebe lang. Jahre gepfl. Körnerfresser, gut im Ges., aber mit Mängeln, nur zusammen in Vogelstube preiswert ab. Anfrage Rückporto. [169

A. Troschütz, Hannover,
Große Aegidienstr. 4.

Vögel

Graue u. grüne Papageien 1,0 rottöpfig. Inseparables

sowie

Stieglitze, Dompfaffen, Häuflinge, Zeisige, Kreuzschnäbel [170

kauft zu höchsten Preisen

Zoologische Handlung Willy Klein,
Kiel, Muhliusstraße 96.

Auf

Weichfresser

wie:

Nachtigall, Gelbspötter, Schwarzplättchen, Sumpf-, Teich-, Schilfrohrsänger, Rohrammern, Garten-, Dorn-, Zaungrasmücken, Rotschwänze, Rot-, Weiß-, Blaukehlchen, Fliegenschnäpper, Fitis-, Wald-, Weidenlaubvogel, Bachstelzen, Pieper, Schwätzer und Würger

nehme schon Bestellungen entgegen.

Zoologische Handlung Willy Klein, Kiel,
Muhliusstraße 96. [171
Bei Anfrage bitte Rückporto beifügen.

Kanarienweibchen

Zahle für **helle 3200 ℳ,**
für dunkle 2800 ℳ,
rote Dompfaffen 3000 ℳ.

Joh. Becker, Aachen,
Roonstraße 23. [17

Kaufe und zahle für

Wellensittiche, Paar	**8500 ℳ**
Kanarienweibchen, je	**4000 ℳ**
Bastardhähne, je	**3500 ℳ**
Stieglitzhähne, je	**2500 ℳ**
Zeisighähne, je	**2000 ℳ**
Girlitzhähne, je	**1500 ℳ**
Hänflinghähne, je	**1500 ℳ**
Buchfinkhähne, je	**1300 ℳ**
Rotkehlchenhähne, je	**1500 ℳ**
Schwarzplättchenhäh., je	**3500 ℳ**

Kaufe Schamadrossel, Spottdrossel, Graupapagei und andere Vögel.

Dornbach, Köln-Sülz,
58 Aegidiusstr. 58 [17

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Hermsdorf bei Berlin; für den Anzeigenteil: Franz Wunderlich, Magdeburg, Postschließfach 148.
Verlag der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck: August Hopfer, Burg Bz. Mgdbg.

Jahrgang LII.
Heft 5. 1. März 1923.

Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Die Gefiederte Welt gelangt am Donnerstag nach dem 1. u. 15. jedes Monats zur Ausgabe und kostet vierteljährlich 750 Mark. Einzelpreis des Heftes 150 Mark.
Inserate für die folgende Nummer müssen bis spätestens Freitag früh in Händen der Verlagsbuchhandlung sein.
Die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 100 Mark berechnet.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung (M. Kretschmann) in Magdeburg.

Postschließfach 148. Postscheckkonto: Magdeburg 3148. Fernsprecher: 1323.

Unerfreuliches von meinen Exoten.

Von Dr. Bilfinger.

(Schluß.) (Nachdruck verboten.)

II. Singsittiche, Rußköpfchen und Wellensittiche. Hier gestaltete sich das Ergebnis viel trauriger. Die Rußköpfchen waren den Sing- und Wellensittichen gegenüber die Harmlosigkeit selbst; auch die Wellensittiche belästigten die Rußköpfchen in keiner Weise. Die Gewohnheit und Neugierde der Rußköpfchen, alle Kästen zu mustern, aus- und einzuschlüpfen, sollte ihnen zum Verderben werden. Eines Tages schlüpfte das 0,1 Rußköpfchen in den Singsittichkasten, beide Singsittiche stürzten nach und zerfleischten das arme Vögelchen im Kasteninnern fast zur Unkenntlichkeit. So war ich mein 0,1 Rußköpfchen los, habe heute noch keinen Ersatz und kann wohl lange warten; meine ganzen Bemühungen und Bemühungen anderer Sportsfreunde sind seither resultatlos verlaufen. November v. J. wurde die Hecke abgebrochen, in dem Käfig verblieben noch die Singsittiche, 1,0 Rußköpfchen und 2,0 grüne Wellensittiche. Die Vögel lebten im tiefsten Frieden miteinander; vor etwa drei Wochen bemerkte ich, daß die Singsittiche wieder sehr lebhaft wurden und sich nistlustig zeigten; ihre Kasten waren plombiert, ganz in der Höhe hing ein Schlafkasten (Wellensittichkasten) für das Rußköpfchen. Aufgefallen war mir, daß die Singsittiche abends sehr erregt wurden, wenn das Rußköpfchen in seinen Kasten ging. Da kürzlich, morgens auf Krankenbesuchen begriffen, wurde mir von Hause an meiner Telephonstelle mitgeteilt, daß die Singsittiche eben im Begriffe seien, das Rußköpfchen zu töten. Glücklicherweise hatte meine Bedienung bis zu meiner Ankunft das Rußköpfchen herausgefangen. Aber was fand ich vor, mein armer Rußkopf lag seitlich auf dem Boden, sozusagen in den letzten Zügen, der ganze Kopf war zerfleischt, einem kleinen Beefsteak vergleichbar. Ich gab den Vogel auf. Doch hat er sich merkwürdig rasch erholt und ist heute wieder ganz munter; nur die noch vorhandene „Glatze" zeugt von dem Mordversuch. Nur dem glücklichen Zufall, daß die Tat gerade noch im letzten Augenblicke rechtzeitig bemerkt wurde, hatte ich die Erhaltung des Vogels zu danken.

Resultat: Verlust eines Rußköpfchens und beinahe auch der Verlust des zweiten.

III. Wellensittiche untereinander. Da wir nun schon einmal bei der „Verträglichkeit" sind, sei mir gestattet, mich in möglichster Kürze über meine Wellensittiche in diesem Sinne zu berichten.

Bei Käfigbetrieb möglichst dünne Besetzung und auch dann fortgesetzte Überwachung. Für obigen Käfig rechne ich höchstens sechs Paare, für 1-Meterkäfige zwei Paare. Das dritte mußte ich fast immer entfernen. Trotz dünnster Besetzung ist es mir wiederholt, und zwar, nachdem die ersten Bruten im Frieden nebeneinander gemacht wurden, vorgekommen, daß urplötzlich, wie der Blitz aus heiterem Himmel, mörderische Überfälle der Weibchen miteinander erfolgten. Als besonders kritisch habe ich die Zeit des Brutwechsels feststellen können, da alsdann die Weibchen nicht selten vor dem Legen der Eier der folgenden Brut andere Kästen mustern, und da setzt es dann oft blutige Raufereien ab. Im obigen Käfig ging mir von der dritten Brut — eingesetzt waren zwei Paar grüne und ein Paar gelbe — beinahe die ganze gelbe Brut zugrunde; die beiden grünen Weibchen waren beim Legen und überfielen urplötzlich das gelbe gemeinsam mörderisch; dieses hatte sieben bald flügge Junge im Kasten. Ich fand es aus vielen Wunden blutend am Boden, ein grünes schlüpfte bei der gelben Brut aus und ein, ohne jedoch die Jungen zu schädigen. Die beiden grünen Megären mußten herausgefangen und in Einzelhaft gesetzt werden, die gelbe mit ihren Kleinen war gerettet. Und das alles in einem derart großen Käfig, nachdem die drei Paare zwei Bruten im tiefsten Frieden nebeneinander gemacht hatten. Ich könnte

noch mehr solcher ähnlicher Fälle anführen. Sehr gefährlich und störend ist nach meiner Erfahrung immer das Einwerfen eines neuen Paares in einen Käfig, in dem schon Bruten im Gange sind, ferner, wenn unter mehreren Paaren ein Paar erst nistlustig wird, wenn die anderen schon im Brutgeschäfte begriffen sind. Ich finde es auch vorteilhaft, möglichst gleich starke Weibchen zusammen einzuwerfen; ein entschieden schwächeres wird regelmäßig angegriffen und gelangt nicht zur Brut. Gelbe setze ich auch nicht gerne zu grünen, da sie meist weniger mehrhaft und zarter sind. In den Käfigen, woselbst ich nur zwei Paare hatte, gab es weder Streitereien noch sonstige Störungen, dort wurde am besten gebrütet und gefüttert, dort gab es die meisten Jungen.

Den Rat, möglichst nur zwei Paare in entsprechenden Käfigen zusammenzusetzen (1 Meter lang), verdanke ich Herrn J. Götz, Neu-Ulm, und ich kann dies nur unterschreiben. Von einem Händler in Stuttgart hörte ich unlängst, daß ein Herr geradezu fabelhafte Erfolge erzielt, der immer nur ein Paar in ganz kleinen Käfigen einwarf; es scheint mir dies durchaus glaubhaft. — Schematisieren läßt sich natürlich auch hier nicht. Die Charaktere der einzelnen Tiere sind sehr verschieden, und es mag wohl auch vorkommen, daß sich selbst im kleinen Käfig drei und mehr Paare gelegentlich vertragen. Doch dürften dies die selteneren Fälle sein. Jedes Wellensittichweibchen ist die Brutzeit über ungemein erregt, unberechenbar und kann urplötzlich zur Furie werden; dauerndes Aufpassen ist nötig. Der Ablenkung wegen kann man vorteilhaft auch einige überzählige Männchen zusetzen; Nistkästen immer zwei für jedes Paar und nicht zu nahe beieinander, möglichst in der Höhe, und möglichst zahlreich an den hellsten Stellen; denn um diese dreht sich hauptsächlich der Kampf; die dem Lichte abgekehrten Kästen werden kaum beachtet. Meine Ausführungen haben natürlich nur auf den Einsatz Bezug. Außerhalb der Hecke glaube ich, daß man schon in kleinem Käfig Singsittiche, Wellensittiche und Rußköpfchen zusammenstecken kann, so viel man will. Selten dürften da die Streitereien einen gefährlichen Charakter annehmen. Jedoch in dem Augenblicke, wo die Kasten hängen, ändert sich das Verhalten und Aussehen der Vögel vollkommen; die Schwänze fächern sich, die Kopffedern stellen sich auf und nieder, die Pupille wird klein, die Äuglein sprühen Kampfeslust und Wut, die mehr oder weniger ernsten Gefechte beginnen. Im übrigen macht mir so ein wütendes Wellensittichweibchen immer großen Spaß; man meint, einen kleinen Satanas vor sich zu haben, die Erbosung kann so groß werden, daß sich die beiden kämpfenden Megären mit der Hand greifen lassen, und doch weiter zubeißen, so daß nun auch noch etwas Abfall bestand.

Ich bin mit vollster Absicht vielleicht etwas zu sehr ins einzelne gegangen — und hätten wir noch die gute alte Zeit, so hätte ich es füglich unterlassen; da wurde man durch Schaden klug, bestellte den Verlust nach, und war kuriert für die Zukunft.

Heute kann sich solche Experimente eigentlich nur der Kriegsgewinnler gestatten, und auch er kann meist lange warten, bis er für schweres Geld Ersatz bekommt — oder überhaupt nicht. Wenn also meine Zeilen weitere Sportsfreunde, die nur auf Käfige angewiesen sind, vor Mißerfolgen und schweren unersetzlichen Verlusten bewahren sollten, so ist ihr Zweck erreicht.

Ich habe nun für dieses Jahr meine Einteilung und Besetzung so getroffen, daß meine Singsittiche jedes Paar für sich säuberlich allein, in geräumigen Käfigen gehalten sind, ebenso die Nymphen; die Wellensittichkäfige sind ganz dünn besetzt. Von großen Erfolgen träume ich trotzdem noch lange nicht deshalb, doch kann ich wenigstens nun ruhig die Gesellschaft sich selbst überlassen, brauche nicht dauernd aufzupassen und um schwere Störungen und Verluste bange zu sein.

An dieser Stelle sei zum Schluß noch erwähnt, daß man gut tut, den Erfolg nach Auskünften, die ich von den erfahrensten Züchtern erhalten hatte, wesentlich fördert, wenn man die großen Arten über die Hecke, gegenseitig, soweit als möglich unsichtbar macht. Nymphen, Singsittiche, Rosellas und wie sie alle heißen, sind die Brutzeit über ganz ungemein erregt und scheinbar unwesentliche Ursachen können jeden Erfolg vereiteln.

Sprosser und Nachtigall.

Von J. Birk, Leipzig.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Der Sprosser oder Aunachtigall bewohnt im Gegensatz zu der Nachtigall die östlichen Gebiete von Europa und kommt in Deutschland auch in Westpreußen und Pommern vor. In diesen Gebieten sowie seltener auch noch in anderen Gebieten Ostdeutschlands kommt er auch als Durchzugsvogel vor. Der Liebhaber unterscheidet den Sprosser in seinem Verbreitungsgebiet nach Örtlichkeitsrassen, nach ihrer gesanglichen Leistung. Nach dem Gesang unterscheidet man nördliche Vögel, die tieflautiger und daher auch am gesuchtesten sind, ihr Gesangswert variiert ebenfalls je nachdem, ob ein Sprosser aus der Bukowina, Rußland, Polen oder Galizien stammt. Der nördliche Sprosser ist wohl tieflautiger, aber lange nicht so tourenreich wie der südliche Sprosser, welcher wohl hochlautiger, aber auch tourenreicher ist, als der nördliche Vogel. Reinen Originalsprosserschlag findet man bei den nördlichen Vögeln, bei den südlichen wohl auch, aber vielfach Nachtigallentouren ähnliche Gesangsstrophen, zum Teil auch mit Originalnachtigalltouren untermischt. Dies sind meistens Vögel, deren Verbreitungsgebiet an Brutgebiete von Nachtigallen grenzt, sich mit diesen auch teilweise vermischen. Diese Sprosser, welche in ihrem Gesangsrepertoir neben dem Originalgesang auch Nachtigallentouren bringen, sind bei dem Liebhaber weniger beliebt, man bezeichnet sie im Gegensatz zum Originalschläger als Zweischaller. Unter den südlichen Sprossern gibt es auch sehr gute Vögel, die durch ihre weichen, mannigfaltigen Töne dem härteren, tourenärmeren nördlichen Sprosser keinesfalls nachstehen, es gibt sowohl unter nördlichen und südlichen Vögeln sehr gute Schläger. Am gesuchtesten sind von den nördlichen die sogenannten Davidsprosser, überhaupt

Flußrohrsänger.

Vögel, die speziell Rufe, wie David, Judith, Kulik usw. bringen. Am beliebtesten sind die nach ihrem Vorkommen in den Weidenpflanzungen der Ströme benannten Weidensprosser und unterscheiden sich gesanglich auffallend von den in den Auen und Waldungen vorkommenden Sprossern. Unter den südlichen Sprossern sind die aus den Weidendickungen der Donauniederung die beliebtesten. Gute und mittlere Schläger wird es wohl bei allen Örtlichkeitsrassen geben, mit dem Unterschied, daß bei einer die guten, bei einer anderen die mittleren und minderwertigen Vögel überwiegen. Mein Standpunkt geht dahin, daß eine mittlere Nachtigall einen schlechten Sprosser noch bei weitem übertrifft, denn es ist wirklich kein Genuß für das Ohr eines Liebhabers, das hart und abgerissen hervorgestümperte tourenarme Repertoir eines solchen Vogels dauernd über sich ergehen lassen zu müssen. Darum muß der Liebhaber all sein Trachten nach Erlangung eines guten Sprossers richten, ein minderwertiger Schläger wird niemals für dauernd seine Gunst gewinnen können. Ein richtiges Urteil kann sich der Liebhaber von der Verschiedenheit des Sprosserschlages nur machen, wenn er Vögel aus nördlichen und südlichen Gebieten, und darunter wiederum verschiedene Örtlichkeitsrassen zu hören Gelegenheit hat. Bei uns in Leipzig war in der Vorkriegszeit die Sprosserliebhaberei auf einer anderen Höhe, und man konnte Vögel hören, die einfach begeistern konnten und alle anderen Sänger in den Schatten stellten, aber auch Stümper, die wirklich nicht wert waren, den Käfig eines Gesangsliebhabers zu zieren. Die Nachtigall, auch gemeine Nachtigall genannt, zum Gegensatz zur Aunachtigall, ist uns gesanglich ein so wohl bekannter Vogel, daß es sich eigentlich erübrigen dürfte, näher auf den Schlag derselben einzugehen. Den Sprosser kennen wir in seinem Schlag nur in den zu uns gelangten Käfigvögeln und können wir uns daher kein endgültiges Urteil über die Höchstleistung des Sprosserschlages erlauben. Ich nehme wenigstens an, daß ich, trotzdem ich schon sehr gute Sprosser gehört habe, noch keinesfalls das Ideal des Sprosserschlages gehört habe, was unseren Sprosserspezialisten die zu Recht bestehende Begeisterung für den Sprosserschlag gebracht hat. Nur solche einwandfreie Kenner des Sprosserschlages können ein fachmännisches Urteil abgeben. Anders ist für uns die Sache mit unserer heimischen Nachtigall, da wir doch mitten in einem Nachtigalldorado wohnen. Rund um Leipzig finden wir sie, wo halbwegs die Bedingungen für ihr Fortkommen gegeben sind. Was wir an guten Nachtigallen im Käfig gehört haben, ist beachtenswert, aber immerhin verschwindend gegen die gewiß nicht geringe Anzahl in unseren Auwäldern. So wird wohl auch noch mancher Vogelliebhaber, der in keinem Nachtigallenbrutgebiet wohnt und die Kenntnis des Nachtigallenschlages auf wenige Käfigvögel in seiner Liebhaberpraxis aufgebaut hat, sich kein endgültiges Urteil über das Ideal des Nachtigallenschlages bilden können. Ein solcher Liebhaber wird wohl auch nicht recht begreifen können, wenn der wirkliche Kenner des Nachtigallenschlages in seiner Vielseitigkeit für sie selbst dem Sprosser gegenüber eine Lanze bricht. Man muß Gelegenheit gehabt haben, eine Ia Nachtigall im Freien und im vollen Feuer zu hören, gehoben durch die feierliche Stimmung einer maienwarmen Frühlingsmondscheinnacht; dann erst kann man verstehen, daß uns der für uns fremd klingende Schlag des Sängerkönigs aus dem Osten im Käfig nicht so begeistern kann, wie der von Heimatslüften durchwobene Schlag unserer Sängerkönigin. Es soll keinem unserer besten Sänger Unrecht geschehen, sie alle beide verdienen es an erster Stelle genannt zu werden, lassen wir daher dem Anhänger des Sprossers seine zu Recht bestehende Meinung, aber auch dem Nachtigallenliebhaber seine. Eine Vorliebe für einen der beiden Sänger würde jedes Urteil in dieser Hinsicht beeinflussen. Die Pflege von Sprosser und Nachtigall ist im Grunde genommen die gleiche, beide Sänger sollten nur im Heim eines erfahrenen Vogelliebhabers zu finden sein; denn ist die Haltung im Käfig gerade nicht zu schwierig, so erfordert sie doch gute Kenntnisse des Pflegers. Die Anschaffung für den Liebhaber ist nicht so leicht, das heißt, wenn er Gesangskenner ist und auf etwas Gutes reflektiert. Frühjahrsfänge sind daher die besten, denn der Liebhaber braucht nicht lange auf den Gesang zu warten, er weiß sofort, ob er beim Erwerb des Vogels eine glückliche Hand gehabt und einen Sänger nach Wunsch erhalten hat. Anders beim Herbstwildfang, ist dieser auch etwas billiger im Preis, so ist eine Garantie für das Geschlecht nicht immer stichhaltig, und gar mancher Liebhaber mußte im nächsten Jahre die Erfahrung machen, daß er einem Weibchen seine Pflege angedeihen ließ, oder war es doch ein Männchen, daß er sich mit einem Stümper im Gesange abgemüht hat, ganz abgesehen von dem materiellen Verlust bei den teueren Futterpreisen. Es bleibt ihm dann

nur die eine Wahl, sich von neuem nach einem Vogel umzusehen, der seine Liebhabersehnsucht befriedigt. Am besten und am idealsten ist es natürlich für den Liebhaber, wenn er den Vogel seiner Wahl erst in der Natur verhören kann, befriedigt er, so muß sich alles Weitere dann schon finden. Nun, Glück gehört zu allen Sachen, ebenso auch zur Vogelliebhaberei. Läßt sich ein Verhören des für den Käfig bestimmten Vogels wohl bei verschiedenen Sängern bewerkstelligen, bei manchen Liebhabern auch bei der Nachtigall, beim Sprosser ist dies ausgeschlossen, da er leider bei uns nicht vorkommt. (Fortsetzung folgt.)

Der Innenflugraum.

Von Alfred Troschütz, Hannover.

(Fortsetzung statt Schluß.) (Nachdruck verboten.)

Den Buxbaum halte ich für gut geeignet. Die beste Auswahl bieten die Nadelhölzer. Leider sind viele Fichtenarten, wie Rottanne (Picea excelsa), Sibirische Weißtanne (Abies sibirica), Nordamerikanische Fichte (Picea pungens *Engelm.*), Silberblaufichte (Picea pungens argent.) jetzt recht teuer und nur von großen Baumschulen zu beziehen. Ausdauerndere und preiswertere Pflanzen für den Flugraum sind unter den Kiefernarten (Pinus *L.*) zu finden. Schon der Charakterbaum der norddeutschen Heide, die Föhre (Fuhre, Pinus silvestris), schmückt das Vogelzimmer, ist anspruchslos, nicht teuer und leicht ersetzbar. Schöner ist die Weymouthskiefer (Pinus strobus *L.*). Weichbenadelt, mit weit auseinanderstehenden Ästen und Zweigen, ist sie der Beschmutzung durch die Vögel weniger ausgesetzt wie Picea excelsa, gewährt aber der Vogelschar weniger Zuflucht und Schutz. Nach langjährigen Erfahrungen ziehe ich beiden Arten die österreichische Schwarzkiefer (Pinus C. austriaca) vor. Die kräftigen, üppigen Bäume mit ihrer schwarzgrünen starren Benadelung, die auch nach dem Trockenwerden des Baumes nicht abfällt, bilden eine Zier des Flugraums, einen Lieblingsaufenthalt der Vögel. Zwei Meter hohe Bäume, die im Frieden 1 M. gekostet, sind jetzt schwer zu bekommen und müssen teuer bezahlt werden. Ich helfe mir nun dadurch, daß ich zwei kleine Blaufichten, die für die Kranzbinderei bereits einen Teil der Zweige abgeben mußten, daher billig sind, hintereinander in verschiedener Höhe aufstelle und dadurch den kostspieligen meterhohen Baum ersetze. Zweckmäßig ist es, die Kiefern rechtzeitig im Frühjahr oder im Herbst (von August an) in nicht zu kleine Pflanzenkübel (mit Henkel und Abflußloch) einzupflanzen. Dann können die Pflanzen im Freien gut anwachsen und, wenn ein Wechsel notwendig, durch einen neuen Baum ersetzt werden. Kann man öfter wechseln, bei gut besetzter Vogelstube alle vier Wochen, so erholen sich die Kiefern im Freien gut, werden durch Regen und Bespritzen gereinigt und sind lange brauchbar. Für größere Räume ist die Douglastanne (Abies Douglasii) mit ihrem kräftigen Wachstum, auch die Bankskiefer (Pinus Banksiana *Lamb.*) eines Versuches wert.

Es ist eigentlich verwunderlich, daß auf diesem, unserer Liebhaberei doch sicher nahestehenden Gebiete denn Vogel und Pflanze gehören zusammen, noch so wenig durch Erfahrungen Erprobtes veröffentlicht wurde. Ich möchte die Anregung geben, daß Herr Neunzig in dem in Bearbeitung befindlichen 3. Teile seines „Handbuches für Vogelliebhaber (Band 1 Fremdländische, Band 2 Einheimische Stubenvögel, Band 3 Vogelpflege) der „Pflanzenkunde für Vogelpfleger" einen besonderen Abschnitt widmet. Dahin gehören die Pflanzen zum Ausschmücken von Flugraum und Vogelstube, die Pflanzen, die als „Grünfutter" dienen, die, deren Samen in reifem oder unreifem Zustande geerntet wird. Gute Abbildungen dürften aber nicht fehlen.

Als Bodenbelag ist der Torf jedem anderen Streumittel vorzuziehen. Für Käfige genügt Zeitungspapier oder Sand. Auch die Nadelerde, die sich im Walde unter Weymouthskiefern ansammelt, ist verwendbar. Zweckentsprechender ist aber auch da Torfmull, die mittlere der Sorten der Torfherstellung. Die gröbere, die Torfstreu, muß erst zerkleinert werden, die feinste, das Torfmehl, ist, da zu sehr stäubend, ungeeignet. Zum Versand kommt der Torfmull in festen Ballen mit Holzleisten und Drahtverschnürung, meist in der Größe eines halben Raummeters, die je etwa $1^1/_8$ Raummeter losen Torfs ergeben. Der hellbraune Bleichmoos- oder Sphagnumtorf ist, da leicht, porös, elastisch und ohne Staub, dem schwarzbraunem Riedgras- oder Carextorf vorzuziehen. Zwar ist auch dieser, der Heiztorf, zu gebrauchen, aber die erdigen Bestandteile geben viel Staub. Auch das Aufsaugungsvermögen ist geringer. Gerade dieses ist aber der besondere Vorzug, den der Torf allen anderen Bodenbelagen gegenüber besitzt. Dazu kommt seine schlechte Leitfähigkeit für Wärme und Kälte, seine hemmende Wirkung auf die Bakterienentwicklung, sein Gehalt an Pflanzennährstoffen, sein Ammoniakbindungsvermögen und die Verwendbarkeit des verbrauchten Torfes als Heizmittel. Torf als Bodenbelag erhält die Füße der Vögel immer in gutem Zustande, ermöglicht den Spatzen, Lerchen, Wachteln u. a. das beliebte „Paddeln", die sich an der Oberschicht ansammelnden Futterreste, der Kot u. a., können bequem durch Abharken entfernt werden. Der Boden sieht immer sauber aus.

Fütterungsgeräte. Futter und Füttern. Die Preise aller Futtermittel bedingen sparsamste Verwendung der Vorräte. Praktische Geräte verhindern am ehesten Vergeudung. Leider ist die Auswahl von erprobten Futtergeräten für die Vogelstube sehr klein. Vor dem Kriege brachte Dr. Schramm in Karlstadt a. Main ein grün glasiertes Tongefäß für Körnerfutter in den Handel. Ich habe es viele Jahre lang benutzt, schließlich aber doch darauf verzichtet. Der blumentopfähnliche Napf mit den nach außen gebogenen Rändern nahm ein längeres hohles Gefäß auf. Die untere Hälfte davon diente als Sockel, die obere als Futterbehälter. In der Höhe der gebogenen Außenränder enthielt die Innensäule einen Wulst, in den aus Öffnungen die Körner aus dem Innern der Säule herausquollen. Finken und Meisen hatten sich bald an diesen Futtertopf gewöhnt. Mängel waren, daß das Futter dennoch

verstreut wurde, daß das Nachfallen der Körner oft stockte, daß der Deckel durch „Verdauungsprodukte" mehr als schön „verziert" wurde, und daß ein Tigerfink im Zwischenraum von Innen- und Außenbehälter verunglückte. (Fortsetzung folgt.)

Von der unteren Wolga.

Von Ingenieur Kracht.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

April. 3.: Starker Zug von Gartenrotschwänzen und Weidenlaubvögeln.

8.: Die Natur färbt sich mit Macht grün. Heute besonders viele Gartenrotschwänze, trotz des trüben windigen Wetters. Sehe den ersten Nonnensteinschmätzer.

9.: Bekomme den ersten Kirschkernbeißer und Braunkehlchen zu Gesicht.

10.: Stoße gegen Abend mitten in der Stadt auf einen Ziegenmelker.

11.: Heute trifft das Gros der Nonnensteinschmätzer ein.

12.: Sehe das erste Gartenrotschwanzweibchen, einen rotrückigen Würger und erhalte ein Zwergtrappenmännchen.

15.: Weidenlaubvögel und Gartenrotschwänze sind noch in ziemlicher Anzahl da. Erst vom 22. cr. ab verschwinden sie. Erhalte frische Gelege von Steppenadlern und dem Adlerbussard.

18.: Fange den ersten Sprosser. Braunkehlchen sind heute viele da. Beobachte die ersten Bienenfresser und Blauraken.

20.: Uferschwalben sind zurückgekehrt.

21.: Kuhstelzen sind auf dem Zuge.

23.: Außerordentlich starker Zug von Zaungrasmücken. Ebenso sind ziemlich viele Sprosser und Zwergfliegenschnäpper da. Beobachte sonst noch einen Kuckuck und eine Waldschnepfe.

24.: Sehe die erste Gartengrasmücke.

27.: Viele Waldlaubvögel sind da.

28.: In den Gärten tummeln sich sieben Kuckucke, deren erheblicher Größenunterschied recht auffallend ist, viele Garten- und Sperbergrasmücken, rotrückige Würger sowie Ziegenmelker. Bekomme ferner zu Gesicht die ersten kleinen Würger, grauen Fliegenschnäpper und drei Beutelmeisen, entzückend gefärbte Vögelchen.

30.: Beobachtet werden Turteltauben und Rosenstare sowie ein Sumpfrohrsänger.

Mai. 4.: In den Gärten werden heute außerordentlich viele Sprosser und Sumpfrohrsänger angetroffen. Letztere tummeln sich mit besonderer Vorliebe in den Kronen der Kirsch- und dicht belaubten Apfelbäume. Es sind ferner da eine ganze Anzahl Schilfrohrsänger, Garten- und Dorngrasmücken sowie ein großer Würger, ein Pirol und ein Heuschreckensänger. Die Stare haben Junge.

5.: Starker Zug von grauen Fliegenschnäppern und Gartenammern.

7.: In den Gärten trifft man viele Ziegenmelker an.

9.: Erhalte einen Flußrohrsänger. Die Wüstensteinschmätzer haben fast vollbefiederte Junge.

10.: Der Vogelzug geht mächtig zur Neige; außer ein paar grauen Fliegenschnäppern, Sprossern und Sperbergrasmücken, ein paar Würgern, zwei Laubvögeln, einem Heuschrecken- und Rohrsänger ist nichts zu sehen. Noch ein paar Tage und die Fallen treten in den Ruhestand.

13.: Eine Unmenge von grauen Fliegenfängern ist eingetroffen. Des weiteren sind stark vertreten Sumpfrohrsänger, Flußrohrsänger und Sperbergrasmücken. In geringerer Anzahl sind da Schilfrohrsänger, Garten-, Dorn- und Zaungrasmücken, kleine

Heuschreckensänger.

und rotrückige Würger. Die Ziegenmelker sind bis auf einige Stücke fort. Turteltauben paaren sich.

18.: Am zahlreichsten sind Sumpfrohrsänger. Heute sind besonders viele Sperber- und Dorngrasmücken auf dem Zuge. Turteltauben, kleine Würger und Feldlerchen haben Eier; Stare und Wüstensteinschmätzer Junge.

21.: Die Zahl der Sumpfrohrsänger, Sperber- und Dorngrasmücken hat bedeutend abgenommen. Rauchschwalben haben Eier, schwarze Milane Junge.

23.: Die Sumpfrohrsänger sind fast alle fort.

(Fortsetzung folgt.)

Vereinigung der Vogelliebhaber Landesverband Sachsen.

Zum Schutze unserer Vogelwelt hat die Reichsregierung das Vogelschutzgesetz geschaffen, das in den zum Reiche gehörenden Ländern entweder in der Fassung des Reichsgesetzes oder in verschärfter Form Geltung hat. Der Zweck des Gesetzes ist, wie der Name schon sagt, bestimmte Vogelarten zu schützen. Wenn nun etwas zu schützen ist, müssen auch bestimmende Gründe dafür vorhanden sein. Einer dieser Gründe ist zweifellos die Verminderung der Vogelarten. Alle die Gründe der Verminderung aufzuführen, soll nicht der Zweck dieser Zeilen sein, aber im Grunde verdient die Aufmerksamkeit der Liebhaber und Schützer, und das ist der Vogelfang zu Exportzwecken. Es ist für

den Liebhaber, sei er Vogelhälter oder Schützer, ohne Zweifel Tatsache, daß auch von Deutschland alljährlich eine außerordentlich große Anzahl unserer Lieblinge durch Exportfirmen ins Ausland wandern, und daß dadurch unter den geschützten Vögeln auch gehörig aufgeräumt wird. Nicht alle aus Deutschland zu exportierenden Vögel sind eingeführt und stammen aus Ländern, wo der Vogelfang ganz oder teilweise erlaubt ist, und daher dürfte für den Liebhaber die schwere, aber auch dankbare Aufgabe die sein, mit achtzuhaben, daß ein Vogelfang zu Exportzwecken, wie auch die Ausfuhr deutscher Vögel überhaupt auf das größtmöglichste eingeschränkt wird. Schon um der Gerechtigkeit die Ehre zu geben. Teilweise sind unsere Schutzbestimmungen so scharf, daß kaum dem einheimischen Liebhaber das Halten von Vögeln gestattet sein soll, während andererseits dem Deutschland auskaufenden Auslande für geringe Pfennige, nach der Valuta berechnet, unsere edelsten, besten und mitunter seltensten Sänger ausgeliefert werden. Das möchte sehr eingeschränkt werden, schon um den fortwährend den Liebhabern untergeschobenen Vorwurf, sie seien diejenigen, die an der Reduzierung unseres einheimischen Vogelbestandes sehr stark beteiligt seien, zu entkräften.

Der Landesverband Sachsen hat nun an alle Liebhaber, Vereine und Vereinigungen die Bitte gerichtet, uns in unseren Bestrebungen, wie vorhergesagt, recht tatkräftig zu unterstützen. Vor allem bitten wir um Mitteilung, ob auch anderwärts Wahrnehmungen in unserem Sinne gemacht worden sind, ferner auch um Mitteilung bekanntgewordener oder noch bekanntwerdender Tatsachen, insbesondere um Beweismaterial.

Aus den Vereinen.

A. Z. Angemeldet sind die Herren Kurt Hoffschild, Kaufmann, Breslau, Ohlauer Str. 23; Fr. Schmidt, Blechnermeister, Durlach i. Baden, Herrenstr. 27; Paul Beling, Kaufmann, Rudolstadt i. Thüringen, Roonstr. 91; Richard Huth, Herrenschneiderei, Perleberg, Wollweberstr. 3; M. Strotmann, Kaufmann, Godesberg a. Rhein, Burgstr. 52; Aage Lenchler, Nyborg (Dänemark); Carl Worm, Nyborg (Dänemark). — Aufgenommen sind die Mitglieder Nr. 281 Mathias Lang, Portier, München, Mittererstr. 41; Mtgl. 282 Arthur Schiebe, Liegnitz i. Schl., Luisenstr. 24 III; Mtgl. 283 Gerhard Halm, Mühle Gohlsdorf, Post Brockendorf, Bez. Liegnitz; Mtgl. 284 Julius Hanser, Freiburg i. Br., Friedrichstr. 2 (Kunsttempel); Mtgl. 285 Hermann Voll, Postbeamter, Lörrach-Stetten i. Baden, Friedenstr. 12; Mtgl. 286 Ernst Titze, stud. gym., Freiwaldau, Ring 64, i. Schles. (Tschechoslovakien); Mtgl. 287 Hjalmar Anderzen, Eskilstunaoffären, Lidköping (Schweden); Mtgl. 288 Hugo Keßler, Schauspieler, Berlin-Südende, Potsdamer Str. 23, Portal 9, 1 Tr. bei Schott. Mtgl. 170 wohnt jetzt Santiago de Chile, Casilla 1495. Mtgl 60 sucht 0,1 jav. Mövchen, tauscht auch auf Kanarienweibchen, sucht 10 St Kanarienfußringe. Mtgl. 74 gibt ab 1,1 Braunkopfstärlinge i. T. gegen Zebraf., Möwchen, Wellensf., Silberschn. u. a. in jungen Paaren. Mtgl. 222 sucht 1,1 Zebraf., 1,0 Girlitz, 0,1 Grünfink, 0,1 Zitronzeisig, letztere mögl. zahme Frischfänge. Mtgl. 235 vert. 1,1 Tigerfink gegen dito Wellensittich mit entspr. Zuzahlung. Mtgl. 258 gibt ab 0,1 gelb. Wellensittich, 0,1 Dompfaff, 3 junge Lachtauben. — Laut Beschluß des Ausschusses beträgt für alle Aufnahmen ab 1. März die Gebühr 1000 M., Jahresbeitrag wie bisher 500 Mark, zusammen also 1500 M., welchen Betrag die angemeldeten Herren gefl. einsenden wollen. Es werden dafür das zweite und dritte Jahrbuch mitgeliefert. Der Einzelpreis für Mitglieder beträgt 200 M. bzw 800 M, für Nichtmitglieder das Doppelte, für valutastarkes Ausland das Vierfache. Rückständige Mitgliederbeiträge für Eingang nach dem 1. März sind um 100 M. zu erhöhen.

Für die F.-Matz-Stiftung gingen ein: Halm, Mühle Gohlsdorf, 300 M.; Lenchler, Nyborg, 6380 M. Insgesamt jetzt 21330 M. Den Spendern herzl. Dank.

A. Krabbe.

„Aegintha", Verein der Vogelfreunde zu Berlin. Sitzung jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat, abends 8 Uhr im Aquarium. — Am 15. März Generalversammlung. 1. Verlesung des letzten Sitzungsberichts; 2. Erledigung wichtiger Punkte der üblichen Tagesordnung; 3. Beratung der eingegangenen Anträge; 4. Jahresbericht des Schriftführers; 5. Jahresbericht des Kassierers; 6. Bericht der Revisoren und Entlastung des Vorstandes; 7. Wahl des Vorstandes: a) des 1. Vorsitzenden; b) des 2. Vorsitzenden; c) des 1. Schriftführers; d) des 2. Schriftführers; e) des Kassierers; f) des Bücherwarts; g) der Revisoren h) der Kommissionen; 8. Verschiedenes.

J. A.: O. Vorbrodt, 1. Schriftführer,
Berlin O 112, Scharnweberstraße 18.

Bayerischer Vogelliebhaberverein (E. V.) Sitz München. Die am 27. Januar 1923 im „Pschorrbräu" tagende Generalversammlung erledigte, statutengemäß 14 Tage vorher eingeladen, folgende Tagesordnung: 1. Jahresbericht des 1. Vorsitzenden; 2. Jahresbericht des 1. Schatzmeisters und der Revisoren; 3. Neuwahl der Vorstandschaft; 4. Beitragserhöhung; 5. Vereinsangelegenheiten und sonstige Anträge und Wünsche. Zu Punkt Jahresbericht führte der 1. Vorsitzende, Herr Ingenieur F Flierl, die Versammlung zurück in das abgelaufene Vereinsjahr und markierte in kurzen Strichen alle wichtigen Begebenheiten. Besonders erwähnte er den Heimgang der Mitglieder Pichler und Hörbrand, die als treue Mitglieder einen ehrenden Nachruf verdienten. Auch das Stiftungsfest wurde rühmlich hervorgehoben und die überaus zahlreiche Beteiligung. Allen Vortragenden, Damen wie Herren, sei für den gelungenen Abend der beste Dank der Vereinsleitung ausgesprochen. Die Ausstellung wurde ebenfalls kurz gestreift und erledigte sich der Vorsitzende ihrer mit kurzen Dankesworten, die vom Weltbunde übermittelt. Der Mitgliederstand stieg, mit zirka 50 Neuaufnahmen und 1 Ehrenmitglied, auf 186. Leider mußten 6 Herren wegen Nichterfüllung der Beitragspflicht gestrichen werden. Der Kassenbericht unseres Schatzmeisters Rosenberger zeigte allerdings die Kehrseite all des Schönen. Wenig Einnahmen, aber desto mehr Ausgaben waren sein Kummer und konnten die beiden Revisoren, trotz der mustergültigen Kassenführung des Schatzmeisters, die gähnende Leere des Vereinsbeutels nur bestätigen. Die Neuwahl der Vorstandschaft lag in den besten Händen des Wahlkomitees, der Herren Schimaug, Dobler und Mader, und war die Wiederwahl des gesamten Ausschusses die reiche Frucht ihrer Tätigkeit. Es zeichnen als 1. Vorsitzender Herr Flierl, als 2. Herr Keidel, als 1. Schriftführer Herr Engel jun., als Protokollführer Herr John, als 1. Schatzmeister Herr Rosenberger, als 2 Herr Egger, als Bibliothekar Herr Zierer, als Revisoren die Herren Mader und Zipper und als Beisitzer die Herren Ziegler und Engel sen. Nach einer kurzen Ansprache unseres treubewährten Führers, Herrn Flierl, ging man sofort zum nächsten Tagesordnungspunkt: „Beitragserhöhung" über. Tempora mutantur, nos et mutamur in illis (die Zeiten ändern sich und wir ändern uns mit ihnen). Dies trifft auch für uns mit dem bisherigen lächerlichen Jahresbeitrag, den wir ebenfalls mit den jetzigen Zeitläuften der endlosen Nullen stabilisieren müssen, zu. 150 M. schlug der Vorsitzende vor, wenig genug, um uns nicht mit der Kategorie der Nimmersatten vergleichen zu müssen. 150 M. zum ersten, zum zweiten, zum dritten Male — und alles war einverstanden. Der Antrag Keidel, die „Gef. Welt" obligatorisch als Vereinsorgan zu erheben, kostete schon mehr Redeturniere. Man einigte sich doch mit dem Antragsteller insofern, daß der Verein für das 1. Vierteljahr in corpore bestellt und die hierfür fälligen Gelder, inkl. postalischer Zustellungsgebühr, mit dem Jahresbeitrag kassiert. Es treffen sonach 200 M., und sind die bereits erschienenen Nummern als Nachlieferung extra zu bezahlen. Dieselben werden durch den Verein bestellt und sind an einem der nächsten Versammlungsabende zu haben. Die Erfüllung der Beitragspflichten machten als nächstes die Augen unseres Schatzmeisters ergläuzend. Hierauf schloß Herr Flierl die gut besuchte, harmonisch verlaufene Versammlung. Die Vereinsanschrift ist: Fritz Flierl, München, Tengstraße 41 II, r. Bei Anfragen bittet man gefälligst das Rückporto beilegen zu wollen. Die nächste Versammlung ist terminsgemäß am 24. Februar 1823 im „Pschorrbräuhaus", Bayerstraße, und ersucht die Vereinsleitung um vollzähliges Erscheinen. Interessenten sind höflichst eingeladen.

Leopold Keidel, 2. Vorsitzender.

Alte Vereinigung der Vogelliebhaber zu Dresden. Die Vereinigung hielt am 5. Dezember 1922, 2. Januar und 6. Februar 1923 ihre Monatsversammlungen ab, in denen vom Herrn Vorsitzenden Ritschel zunächst Mitteilung über verschiedene Eingänge gemacht, vom Kassierer Kassenbericht erstattet, vom Schriftführer je die Protokolle von den vorausgegangenen Versammlungen verlesen und mehrere Herren als Mitglieder aufgenommen wurden. Vorsitzender Ritschel berichtete von seinem mit dem unterzeichneten Schriftführer ausgeführten Besuch der Leipziger Ausstellung, die ganz besonderes Erstaunen ausgelöst habe. Ferner gab er Kenntnis, daß die Vereinigung nunmehr in den Besitz des Vereinsschrankes und gleichzeitig einer von Herrn Fischer gestifteten Raubvogelgruppe gelangt sei. Eintrittsgeld und Monatsbeitrag mußten eine den Zeitverhältnissen entsprechende Erhöhung erfahren. Für den 4. März d. J. ist die erste Partie vorgesehen und weitere sind späterer Entschließung vorbehalten. Ein Vortrag des Unterzeichneten über „Unser Rotkehlchen" sowie seine Vorlesung über „Allgemeine Vogelliebhaberei" waren geeignet, die Mitglieder in 2 Versammlungen längere Zeit angenehm gefangen zu halten, und ein am 20. Januar im Hotel „Pirnaischer Hof" im engsten Kreise der Mitglieder veranstaltetes Weihnachtsvergnügen erbrachte der Vereinskasse anderweit einen ansehnlichen Ertrag, nicht zuletzt durch ein von Herrn Künne gestiftetes wertvolles Geschenk. Trotz aller Zeitnöte wird an den allwöchentlichen Dienstags abends 8 Uhr im Restaurant „Zur Bürgerwiese" stattfindenden Vereinsabenden festgehalten. Gäste sind stets willkommen. Paul Groß, Schriftführer.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig. Nächste Vereinssitzung Donnerstag, den 1. März, im Vereinslokal „Bauers Brauereirestaurant", Tänbchenweg. Gäste sind stets willkommen.

J. A.: Joh. Birk, 1. Vorsitzender,
Leipzig-Mockau, Beuthstraße 29.

Verein der Liebhaber einheimischer Vögel Leipzig-West. Sitzungen jeden 2. und 4. Montag im Vereinslokal „Erholung", Leipzig-Lind., Ecke Götzner- und Götzstraße. Gäste herzlich willkommen.

Wilh. Marefch, 1. Vorsitzender, Leipzig-Plagwitz,
Gleisstraße 26 II, r.

Verband deutscher Farben-, Gestalts- Bastardkanarien- und Exotenzüchter, Sitz München. Zum ersten Male erscheint unser Bericht wieder in der „Gefiederten Welt", die laut Generalversammlungsbeschluß obligatorisches Vereinsorgan geworden ist. Hoffen wir damit unser Bestes getan zu haben und kargen Sie bitte nicht mit Beiträgen züchterischer Natur, um die so beliebte „Gefiederte" auch für unsere Sparten zum unentbehrlichen Nachschlagewerk zu erheben. In kurzen Strichen den Verlauf der Generalversammlung zu berichten, wäre meine nächste Sache. Nach Bekanntgabe der Tagesordnung, die ja bereits 14 Tage vorher im bisherigen Organ, der „Allgemeinen Kanarien-Zeitung", bekanntgegeben war, eröffnete der 1. Vorsitzende L. Zimmermann die Versammlung mit der üblichen Begrüßung der erschienenen Herren. Der Jahresbericht brachte erfreuliche Dinge, aber auch umgekehrt sehr traurige Ereignisse. Verlor doch der Verband die Herren Josef Pichler, Josef Samereier und Ulrich Späth durch Tod. Ein warmer tiefempfundener Nachruf ehrte die Verstorbenen und richtete der Vorsitzende an die Mitglieder die ernste Mahnung, die lieben Toten nie zu vergessen, sondern weiterzubauen in deren Erinnerung zum Wohle und zur Ehre des deutschen Verbandes. Der Mitgliederbestand beträgt inkl. 5 Neuaufnahmen 54 Herren, hierzu ein Ehrenmitglied Herr Hebach, Kaiserslautern. Der Kassenbericht unseres Kassierers Pfaller, bestätigt durch die Revisoren, die die einwandfreie Führung der Bücher rühmlichst hervorhoben, ging mit einem Barbetrag von 15245 60 M. in das neue Vereinsjahr über und wurde unserm allbewährten Pfaller Entlastung erteilt. Der nächste Punkt Neuwahl der Vorstandschaft lag in den besten Händen des gebildeten Wahlbüros, bestehend aus den Herren Prof. Hacker, Schimang und Nebl, und gingen erfreulicherweise debattelos hervor: als 1. Vorsitzender Leopold Keidel, 2. Vorsitzender Benno Ziegler, als 1. Schriftführer A. Aschenbrenner, 2. Schriftführer Max Schimang, als 1. Kassierer Max Pfaller, 2. Kassierer Louis Heinemann, als Beisitzer die Herren Diem und Nedel und als Revisoren die Herren Kanethmüller und Hofmeister. Nach einer kleinen Pause ging man zum nächsten Programmpunkte „Vereinsangelegenheiten" über und brachte der Vorsitzende einen offenen Brief zur Verlesung, der neben einem herzlichen Dankeswort für unseren leider ausgeschiedenen, aber altbewährten Vorsitzenden L. Heinemann im wesentlichen eine grundlegende Reorganisation des Verbandes anführte. Weg vom Weltbund, waren die Schlußakkorde, und löste die sehr aktuelle Frage eine eingehende Diskussion aus. Nach langem Hin und Her, Für und Wider zur Abstimmung geschritten, waren alle Herren gegen 4 Stimmen (inkl. der auswärtigen Mitglieder, die durch Fragebogen unterrichtet waren) für eine Selbständigmachung des Verbandes. Weiterhin war auch die Zeitungsfrage schnell erledigt, noch dazu, da sich Herr Neunzig auf Anfrage bereit erklärte, in Zukunft auch Artikel über Figuren- und Farbenkanarienzucht usw. aufzunehmen. Das Abonnement ist Pflichtsache, eine Anregung, die ebenfalls von der Mehrzahl gebilligt wurde, da dadurch unnötige Portokosten vermieden und auch die auswärtigen Mitglieder auf dem laufenden bleiben. Die Aufnahmegebühr beträgt für Deutschland und Österreich 1000 M., der Jahresbeitrag 500 M., können aber auf Antrag auch ratenweise beglichen werden; für das übrige valutastarke Ausland wurden die Sätze verdoppelt vorgeschlagen und genehmigt. Inzwischen war die Zeit längst vorgeschritten und mußten die Punkte, wie Satzungsänderung, Exotenfußringfrage usw., für die nächste Monatsversammlung am 9. Februar 1923 zurückgestellt werden. Mit einem „Gut Zucht" für 1923 schloß der 1. Vorsitzende die harmonisch verlaufene Versammlung. Die Vereinsadresse ist: Leopold Keidel, München, Schraudolfstr. 44 III, r., und werden die auswärtigen Mitglieder gebeten, bei Anfragen gefälligst das Rückporto beilegen zu wollen.

Leopold Keidel, München.

Verband der Vogelschutz- und Finkenvereine für Rheinland und Westfalen (Sitz Düsseldorf). In Anbetracht der stets zunehmenden Teuerung bitte ich alle Sportsfreunde dringend, die Nachzahlung von 700 Mark für unser Fachorgan „Die Gefiederte Welt" dem Verlag einzusenden. Wenn wir haben wollen, daß unser Fachblatt bestehen bleibt, dann tue jeder seine Pflicht, denn auch diese jetzt immerhin geringe Summe wird jeder überzeugte Liebhaber und Sportsfreund entbehren können. Tagesordnung für die am 11. März, nachmittags 3 Uhr in Düsseldorf im Lokale des Sportsfreundes Wilh. Landwehr (Blücherhaus), Blücherplatz, stattfindende 8. Vertreterversammlung: 1. Aussprache über das Stimmrecht der auswärtigen Vertreter in Orten, in welchen kein Kreisverband besteht. 2. Wanderpreissingen 1923: a) Einteilen der Klassen im Schönheitssingen; b) Prämiierungssystem; c) Festsetzung des Datums; d) Satzgeld der Vögel; e) Preisrichter; f) Stiftungen von Preisen; 3. Beitragserhöhung; 4. Verschiedenes. In Erwartung, daß die Versammlung zahlreich besucht wird, zeichnet mit Sportsgruß

Albert Timmer, Verbandsvorsitzender,
Düsseldorf, Graveiottestraße 20 I.

Herrn B., Mülhausen i. Els. 1. Kanarienweibchen, junge wie alte, gewöhnt man an Weichfutter, indem man zerquetschten Rübsen und auch einige ganze Körner unter das Weichfutter mischt. 2. Ältere Kanarienweibchen und Bastardweibchen würden in der wärmeren Jahreszeit vielleicht genügend Futter im Freien finden. Sie sind aber allerlei Gefahren ausgesetzt und gehen zum Winter wohl ausnahmslos zugrunde.

Herrn P. G., Dresden, Elbberg 1. Die Beiträge sind mir sehr willkommen.

Käfige u. Gerätschaften

Lerchenkäfig
zu kaufen gesucht.
F. Zschau, Frankenberg (Sachsen), Markt 14. [209

Futtermittel

[redacted]

Spiegelpfau-Bruteier
gesucht, evtl. auch von gewöhnl. Pfau. [210

Kurt Lübcke,
Innsbruck (Tirol),
Maria-Theresien-Straße 47.

[redacted]

Ornis-Näpfe in Porzellan
Mod. II $12\frac{1}{2}$. $4\frac{1}{2}$. $3\frac{1}{2}$ tief
Mod. I $15\frac{1}{2}$. $5\frac{1}{2}$. $3\frac{1}{2}$ tief
größere Mengen auch für den Export; auch einzeln als Beipack. (Siehe Ornis-Buch ℳ 250.— und Porto.) [211
Ornis-Haus, Halle-Saale.
Bei Anfragen Rückporto erbeten.

Mehlwürmer
Geg. Einsend. von 2000 ℳ ¼ Pfd. franko.
Größere Posten Tagespreise.
Anfragen Rückporto beifügen.
D. Waschinski & Co.
Biesenthal b. Berlin.
212] Postscheckkonto Berlin 34825.

Suchen Sie
Wellensittiche!
dann wenden Sie sich gefl. an die anerkannten Züchter der „A.-Z.". Jahrbuch II 1922 ℳ 200.—; III 1923 ℳ 800.— franko. Hochval. Ausland dreifach. Inhalt: Zuchtberichte, Illust., sämtliche Verzeichnisse. Postscheckkonto Berlin 80731. [213
A. Krabbe, Anklam,
Demminer Str. 10.

Ornis-Haus
Halle-Saale.
214] Gegründet 1912.
Reform-Normal-Weichfresserfutter und Körnermischfutter
Tagespreise.
Bei Anfrage Rückantwort.
Ornis-Buch M. 250.— und Porto.

Reform-Käfige
Zerlegbar · Leichteste Reinigung · Einfachster sicherer Transport
1. Preis beim Käfig-Wettbewerb Leipzig 1919 (s. Ges. Welt 1920, Heft 14—16)
werden für alle Vogelarten hergestellt.
Goldene Medaille Leipzig 1921.
Ausführung: Hartholz, grünlackiert oder naturlackiert, Zinkschublade, Porzellannäpfe, Ledertuchdecke.
Keine Fabrikware, sondern beste Spezialarbeit!
Anfertigung als Kistenkäfig oder Wiener Form (halboffen) oder halboffen mit fester Rückwand. Ohne jedes Werkzeug in einer Minute zusammengestellt resp. zerlegt. Verpackung zum Selbstkostenpreis.
Fertigen auch jede Art Käfige u. Volieren n. Zeichnung od. Maßangabe.
Anfragen Rückporto beifügen
Katalog gegen Einsendung von 75 Mark in Briefmarken.
Schlagnetze ohne Mittelsteg
für schädliche Vögel, prima handgeknüpfte Ware.
Kühn & Muschter, Inh. Arthur Muschter,
Borna b. Leipzig, Kasernenstr. 4.
Spezialwerkstätte für Käfigbau
Bank-Konto: Allgemeine Deutsche Credit-Anstalt Zweigstelle Borna.
Stadt-Girokasse Borna b. Leipzig Nr. 1506.
Postscheck-Konto: Leipzig 92250 Fernsprecher 147. [215
Zahlreiche Anerkennungs- und Dankschreiben.

Papageien
Kanarienhähne
Bastarde
kauft höchstzahlend und tauscht auch auf Exoten
Willy Odenwald, Fulda.
Eigner Export und Import. [216

Kaufe laufend zu konkurrenzlos höchsten Preisen:
Kanarienhähne und -weibchen
sowie **Sing- und Ziervögel, Exoten aller Arten, Papageien, graue, grüne usw.**
Arthur Muschter, Borna b. Leipzig,
Käfigfabrik und Vogelhandel en gros und en detail
Import. **Export.**
Anfragen Rückporto beifügen. [217

Wir suchen laufend
nur vollständige Jahrgänge und ganze Reihen, gebunden oder in Heften mit Titel, Inhaltsverzeichnis u. Farbentafeln
Gefiederte Welt
Journal für Ornithologie
Blätter für Aquarien- u. Terrarienfreunde
zu angemessenen Preisen.
Angebote nur mit Preisen erbeten.
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg
Postschließfach 148. [218

Aufruf [219
laut Leitartikel Heft 4.
Welche Gönner der Sache sind bereit, einen nachweislich langjährig gründlich erfahrenen Vogelwirt und -Händler mit bestem Ruf und internationalen Beziehungen, im Besitz vieler feinster Anerkennungen und Auszeichnungen, durch Gewährung zeitgemäß höherer Betriebsmittel zu fördern? Gefl. Angebote mit Porto, vom Ausland Papiergeld, unter **„Einschreiben"**, zweiter Umschlag Aufschrift **E. M. 123** an „Ges. Welt, Magdeburg zu richten.

Qualitätsfutter Sanitas
aus gar. nur erstkl. milbenfr. Ingred.
1 Kilo-Pak. 2500 ℳ, 5 Pak. à 2400 ℳ. [220
Sanitasverlag Heidelberg 46.

Vögel

Gesucht
für gr. **Stubenvoliere** gegen **sehr gute** Preise in Paaren oder einzelnen Exemplaren
Wellensittiche
(grün und farbig) sowie verschiedene andere Sittiche und Zwergpapageien u. **Fremdländer.** Gefl. Angebote erbittet (auch von **Händlern**)
Hegemann, Betr.-Ing.,
Hameln a. d. W., Klütstraße 1a.
A. Z. 177. [221

Infolge Krankheitsfalles im Hause bin ich gezwungen,
1,1 junge Nymphen
(Märzbrut 1922)
da zu lärmend, abzugeben. Die Vögel stammen aus freier Voliere, sind blutsfremd und in bester Verfassung.
Es kommt in Betracht:
1. **Überlassung** an einen Liebhaber, möglichst der A. Z., zu Zuchtzwecken gegen Beteiligung am event. Brutergebnis nach näherer Vereinbarung.
2. **Tausch** auf andere gute „ruhige" Körnerfresser oder eine zerlegbare Zimmervoliere.
3. **Verkauf.**
Für alle drei Fälle erbitte ich eilige genaueste Angebote mit Preis. Anfragen mit Rückporto werden umgehend erledigt.
Dr. Stoltze, A. Z. 237
Böblingen (Württ.),
Waldburgstraße 36. [222

Suche
einige Weibchen **japan. Mövchen** und Männchen **Zebrafink** und zahle **pro Stück 10000 ℳ.** Evtl. tausche auch gegen Männchen Mövchen. [223
Wagner, Bruchmühle
(Niederbarnim), Lindenstraße 32.

Zahle frei Kopenhagen
inklusive Verpackung
für **Wellensittiche** 6,00 dän. Kronen pro Paar, für **Kanarienhähne** 5,00 dän. Kronen pro Stück, für **Kanarienweibchen** 1,00 dän. Krone pro Stück, für **Meerschweinchen** 0,75 dän. Kronen pro Stück, für **weiße Mäuse** 0,10 dän. Kronen pro Stück, für **Haselmäuse** 1,00 dän. Krone pro Stück. [224
H. Verner-Lassen,
Kopenhagen, Konsensvej 14, II.

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Hermsdorf bei Berlin; für den Anzeigenteil: Franz Wunderlich, Magdeburg, Postschließfach 148.
Verlag der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck: August Hopfer, Burg Bz. Mgdbg.

Jahrgang LII.

Heft 6. 15. März 1923.

Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Die Gefiederte Welt gelangt am Donnerstag nach dem 1. u. 15. jedes Monats zur Ausgabe und kostet für Monat April 750 Mark. Einzelpreis des Heftes 400 Mark.
Inserate für die folgende Nummer müssen bis spätestens Freitag früh in Händen der Verlagsbuchhandlung sein. Die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 10 Pfg. Grundpreis berechnet, der mit der vom „Börsenverein der Deutschen Buchhändler" von Zeit zu Zeit bestimmten Teuerungszahl zu multiplizieren ist. Die Teuerungszahl ist zurzeit „2000". — Auslandspreis für die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum —,10 Schweizer Franken.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung (M. Kretschmann) in Magdeburg.

Postschließfach 148. Postscheckamt: Magdeburg 3148. Fernsprecher: 1323.

Eindrücke von der Jubiläumsausstellung einheimischer Stubenvögel in Leipzig am 17. und 18. Dezember 1922.

Von A. Bischoff.

(Nachdruck verboten.)

Aus Veranlassung der 25. Wiederkehr des Gründungstages veranstaltete der Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig in Gemeinschaft mit dem Verein „Kanaria", welcher ebenfalls auf ein 25jähriges Bestehen zurückblicken konnte, am 17. und 18. Dezember 1922 eine Jubiläumsausstellung in den oberen Räumen des Leipziger Kristallpalastes. Es war bereits das dritte Mal, daß der Leipziger Verein, dessen rührige und erfolgreiche Tätigkeit besonders in Liebhaberkreisen in allen deutschen Gauen längst weithin bekannt ist, sich der schwierigen und doch auch so sehr dankbaren Aufgabe unterzog, eine Ausstellung einheimischer Stubenvögel in die Tat umzusetzen. Bereits vor zwei Jahren, am 19. und 20. Dezember 1920, hielt der genannte Verein seine erste Ausstellung auf dem Gebiete der Vogelkunde, des Vogelschutzes und der Vogelliebhaberei ab. Die zweite folgte um dieselbe Zeit vor Jahresfrist. Und in diesem Jahre hielt es der Verein für eine Ehrenpflicht aus Veranlassung seines 25jährigen Bestehens eine Jubiläumsausstellung ins Leben zu rufen. Und wahrlich, was damit geboten wurde, es war eine Jubiläumsausstellung im besten Sinne, ein Fest für jeden Teilnehmer und Besucher. Auch diesmal fand die Ausstellung wieder in den für diesen Zweck recht geeigneten oberen Räumen des in der Nähe des Hauptbahnhofes gelegenen Kristallpalastes statt.

Schon beim Eintritt in den großen Ausstellungssaal wurde man überrascht von einem geradezu überwältigenden Gesamteindrucke. In freudiger Überraschung bewunderte man die überaus wohlgelungene Aufmachung, und lieblicher Vogelgesang, der aus zahllosen sangesfreudigen Kehlen den Besucher jubelnd begrüßte, mußte einem jeden Naturfreunde das Herz höher schlagen lassen. Schön geordnet und stilvoll aufgebaut sah man längs der Hinterwand des Saales in zahlreichen Einzelheimen und Gesellschaftskäfigen unsere gefiederten Lieblinge, die Sänger aus Flur und Hain. Wohl an die 50 Arten in gewiß einigen Hunderten von Exemplaren konnte man hier zählen. Bruder Lustig, unser lieber Frühlingsbote, der Star, begrüßte mich als erster im schmucken Perlkleide mit zartem Flöten; ein ganz prächtiger Gesell! Daneben erblickte ich einen Stieglitz-Kanarien-Bastard von seltener Farbenschönheit und Körperform. Ja, um gleich den Gesamteindruck vorauszunehmen, muß ich gestehen, was uns die Leipziger Liebhaber gezeigt haben, waren mit verschwindend geringen Ausnahmen prachtvolle Vögel. Solch wunderbar gefärbte Stieglitze und Rotkehlchen, wie man sie dort sehen konnte, hatte ich noch nie zu Gesicht bekommen, und welch anmutigen Anblick boten auch die schlicht gefärbten Vertreter der Edelsänger in ihrem vollbrüstig glatten Federkleide! Wohltuend fürs Auge empfand ich, daß der ästhetische Gesamteindruck nicht durch gewollte Klassifizierung nach Ordnung, Familie und Art gestört würde. Vielmehr hatte man beim Aufbau und der Anordnung auf die Käfigform und -Größe Rücksicht genommen. Dadurch hatte man ein sich recht vorteilhaft ausnehmendes Gesamtbild erzielt. Auf mit weißem Papier bekleideten Tischen standen die Vogelheime terrassenartig angeordnet, aber immer so, daß der aufmerksame Beschauer nie Mühe hatte, jeden einzelnen Vogel genauer zu betrachten. Die Mitte zierten einige Zimmervolieren mit schmucken Bewohnern, unter denen ganz besonders eine von recht stattlichen Dimensionen, die sowohl ihrer überaus geschmackvollen Aufmachung und Innendekoration als auch ihrer durchweg prachtvoll gefiederten Bewohner wegen die allgemeine Bewunderung auf sich lenkte. Unter anderen konnte man in diesem Gesellschaftskäfige zwei Stieglitzmännchen von solcher Farbenschönheit schauen, wie man dazu wohl selten

Gelegenheit hat. Duftendes Tannengrün zierte die schlichten, aber durchaus zweckentsprechenden Einzelkäfige, in denen man, wie bereits erwähnt, fast ausschließlich in nur ganz ausgezeichneten Exemplaren unsere körner- und insektenfressenden einheimischen Singvögel in Muße betrachten konnte. So waren in mehr oder weniger Stücken vertreten von den Körnerfressern: Buch-, Grün- und Bergfink, Stieglitz, Hänfling, Erlenzeisig, Girlitz, Gimpel, Fichtenkreuzschnabel, Kirschkernbeißer und Berghänfling; an Insektenfressern: Wiesenpieper, Heckenbraunelle, Star, Amsel, Singdrossel, rotrückiger Würger, Nachtigall, Gartengrasmücke, Mönchgrasmücke, Dorngrasmücke, Zaungrasmücke, Sperbergrasmücke, Rotkehlchen, Blaukehlchen, Gartenrotschwanz und Zaunkönig. Eine besondere Erwähnung verdienen meines Erachtens in der Nachkriegszeit noch folgende zur Schau ausgestellte Vögel: der Sprosser, den man heute leider zu den größten Seltenheiten in unseren Vogelheimen zählen muß, besonders nachdem uns sein deutsches Heimatgebiet längs der Weichsel auf Grund schnöder Zwangsverträge entrissen worden ist. Neben zarten Gelbspöttern konnte man auch einen zierlichen Sumpfrohrsänger einmal aus unmittelbarer Nähe betrachten, jenen ausgezeichneten Spötter, der es ganz meisterhaft versteht, auch einmal den erfahrenen Vogelstimmenkenner durch seine Nachahmungskunst ein Schnippchen zu schlagen, besonders da man ihn draußen in der Natur nur höchst selten zu Gesicht bekommt. Besonders hervorgehoben zu werden verdient auch die ganz wunderhübsch gezeichnete Ringamsel, eine große Seltenheit im Heime des Liebhabers. Ich konnte feststellen, daß unter den Ausstellungsbesuchern gar mancher war, der den glücklichen Besitzer dieses Vogeljuwels geradezu beneidete ob solch kostbaren Schatzes. Es sei nicht versäumt, auch der ausgestellten Mischfresser zu gedenken, die durch Wachtel, Hauben-, Feld- und Heidelerche würdige Vertretung in der Ausstellung gefunden hatten. Recht ulkig nahm sich unter all den lustigen Sangesbrüdern ein gar stoisch dreinschauender Steinkauz aus. Ein vom Erzgebirge herbeigeeilter Liebhaber konnte sich gar nicht so leicht wieder trennen vom bewundernden Bestaunen jenes stummen Philosophen; schließlich meinte er zu mir: „Für den gebb'ch awer sofort meine Weichfresser hin!“ (Schluß folgt.)

Sprosser und Nachtigall.

Von J. Birk, Leipzig.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

In früheren Jahren wurden im Frühjahr zweimal im Freien Sprosserschlag gehört, und zwar von einwandfreien Kennern des Sprosserschlags, aber ich behaupte, daß es sich in den beiden Fällen um entflogene Vögel handelte, die ihrem Pfleger unversehens entschlüpften. Obwohl ich schon hörte, daß im Osten von Sachsen Sprosser auf dem Durchzuge vorgekommen sein sollen, was ich übrigens auch noch bezweifle, so kann von einem Sprosserdurchzug in der Leipziger Gegend wohl nicht die Rede sein. Die Eingewöhnung von Sprosser und Nachtigall ist bei beiden gleich, doch kommt für uns die Eingewöhnung von Sprossern ja nicht in Betracht, da ja die zu uns durch den Vogelhandel gelangenden Sprosser bereits eingewöhnt sind. Alle beide Vögel müssen, wenn sie als Frischfänge im ersten Jahre schlagen sollen, unbedingt in einem praktischen, verhüllten Käfig gehalten werden und nach der Eingewöhnung mit Mehlwürmern und frischen Ameisenpuppen, mit letzteren bis nach der Mauser, weitergefüttert werden. Haben die Vögel abgeschlagen, ich spreche, um Wiederholungen zu vermeiden, stets von Sprosser und Nachtigall und hebe eventuelle Abweichungen in der Pflege hervor, so kann die Umhüllung des Käfigs nach und nach mehr gelüftet, um endlich ganz entfernt zu werden. Dem Frischfang gebe man seinen bestimmten Platz und verändere denselben vor dem Abschlagen nicht. Wenn ich von einem praktischen Käfig spreche, so meine ich vor allem die dem Vogel zusagende Größe desselben, auch die Sprunggelegenheit lasse man dem Vogel so, wie er sich als Frischfang daran gewöhnt hat, entweder Drei- oder Kreuzsprung, denn je länger und demzufolge sicherer er sich an einen Sprung gewöhnt hat, um so mehr Gewähr ist für Erhaltung des Gefieders während der Zugzeit, wenn der Vogel des Nachts im Käfig zieht, gegeben. So sehr ich unsern Altmeister Rausch verehre und seine Kenntnisse hoch einschätze, so muß ich mich doch in manchen Fragen auf einen gegenteiligen Standpunkt stellen, so vor allem in der Käfigfrage. Hängt der Gesangserfolg auch nicht vom Käfig ab, denn ich habe gefunden, daß ein Vogel im kleinen sowie großen Käfig ebenso singt, wenn die anderen Bedingungen gegeben sind, so halte ich einen Sprosser- und Nachtigallkäfig von 45 cm Länge für so lebhafte Vögel denn doch unter Normal. Welche Augenweide bietet ein sich ungehindert hin und her bewegender Vogel für den Liebhaber, darum halte ich ein Längenmaß von mindestens 60 cm für Sprosser und Nachtigall als unbedingt vorteilhafter als 45 cm, das ich als Mindestmaß für einen Grasmückenkäfig noch gelten lasse. Rausch kann ich keinesfalls recht geben auf Grund meiner langjährigen Liebhaberpraxis, wenn er schreibt: Je mehr also der Vogel zum Herumflattern im Käfig Raum findet, desto fraglicher ist seine Eingewöhnung als Stubenvogel, desto fraglicher sein Gedeihen, desto unbestimmter seine dauernde Erhaltung und desto sicherer sein baldiges Ende. Ja, Rausch behauptet noch, ein größerer Käfig als das vorgeschriebene Maß sei auch bei eingewöhnten, mehrjährig gekäfigten Vögeln infolge des Herumflatterns im größeren Käfig zur Zugzeit die mittelbare Todesursache der meisten zugrunde gehenden edlen Stubenvögel. Auch hier lehren mich meine Erfahrungen eines anderen. Einen zu großen, mit keinem gleichmäßigen Sprung versehenen Käfig verwerfe ich ebenfalls für unsere edlen Sänger, aber bei einigen Zentimeter mehr schon von Todesursache zu sprechen, dürfte wohl selbst unserem geschätzten Rausch nicht voller Ernst gewesen sein. Gleichfalls kann ich Rausch nicht beipflichten, wenn er rät, bei Blankfütterung mit frischen Ameisenpuppen das Trinkwasser als schädlich für den Vogel wegzulassen. Trotzdem ich sehr viel mit frischen Ameisenpuppen blank füttere, kann ich in den langen

Jahren meiner Liebhaberpraxis nicht einen Fall nennen, wo ich der gleichzeitigen Beigabe von Trinkwasser nachteilige Folgen zuschreiben könnte. In scharfem Widerspruch mit Rausch stehe ich betreffs der Fütterung von eingewöhnten Vögeln mit lebenden Insekten, ja, wenn das Geltung haben sollte, dann darf ich doch auch keinen lebenden Mehlwurm meinen Vögeln geben, denn nach Rausch erweckte die Darreichung von allerlei lebenden Insekten die Lust nach lebendem Futter, und für das größere Wohlsein der Vögel wird nichts erreicht, sondern vielmehr das fernere Gedeihen dadurch erst recht in Frage gestellt. Sollte wirklich der Vogel den Mehlwurm nicht für ein lebendes Insekt halten, nun, dagegen spricht ja das ganze Benehmen der Vögel beim Anblick des zappelnden Mehlwurms und vor allem die Überlistung des Wildvogels mit dem fängisch gestellten Netz mit dem zappelnden Mehlwurm als Lockmittel. Da wir die lebenden Insekten doch nur als Abwechslung und in beschränktem Maße wegen deren leider schwierigen Beschaffung reichen können, so dürfen wir eine derartige willkommene Delikatesse unsern Vögeln nicht vorenthalten, da die Beifütterung von lebenden Insekten meiner Ansicht nach das Gegenteil von Rauschs Meinung bewirkt, indem damit das Wohlbefinden unserer Stubenvögel durch Zuführung natürlicher Stoffe nur erhöht und nicht in Frage gestellt wird. Diese Kritik an Rausch gehört ja nicht in das eigentliche Thema meines Vortrages, doch muß davon auch einmal gesprochen werden, da dies doch speziell mit in die Fragen der Verpflegung von Sprosser und Nachtigall gehört. (Fortsetzung folgt.)

Nonnensteinschmätzer.

Der Innenflugraum.

Von Alfred Troschütz, Hannover.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Selbsttätige Futtergefäße für die Vogelstube müssen 6—10 Körnerfressern Platz bieten. Nur ein Mischfutter kommt zur Verfütterung. Jeden Futterbehälter mit nur einer Futtersorte zu beschicken, ist unzweckmäßig. Dann wird nur der teure Hanf, Rübsamen oder Mohn gefressen und alles übrige billigere Futter bleibt liegen. Zu mischen ist schon deshalb nötig, weil sonst, nach der Beschickung, ein futterneidisches Girlitz-, Dompfaff- oder Zeisigweibchen den Betrieb eine Zeitlang lahmlegt. In der 5. Auflage von Ruß-Neunzig, „Einheimische Stubenvögel“ S. 527 (Abb. 192) ist ein automatisches Futtergefäß abgebildet, das benutzbar ist, aber weder Futterneid, Verstreuen und Beschmutzen verhindert. Fabrikant Erlley in Arnstedt in Th. lieferte früher einen Futternapf aus Blech für Käfige. Das patentierte Gefäß würde sich auch für die Vogelstube verwenden lassen, wenn eine Anzahl zu einem Randbehälter mit Sitzleisten und Untersatz zum Auffangen des Streufutters, auch mit gutsitzendem steilem Deckel, angefertigt würde. Die Herstellungskosten würden aber wohl zu groß, der Absatz zu klein sein. Näpfe, die an einer Seite einen runden Einschnitt haben, sind aus leeren Kond.-Milchbehältern leicht herzustellen (Rand umfalzen), und verhindern das Streuen. Recht gut sind die Geflügelschnattern, die Fabrikant M. Vieweg in Waldenburg i. Sachsen in den Handel bringt. Da wird das Beschmutzen und der Zank vermieden, das Streuen stark vermindert, wenn ein größerer Emaille- oder Blechteller als Unterlage benutzt wird. Völlig zu verhindern ist das Streuen des Körnerfutters nicht. Wenn man sieht, wie die Haubenlerche im Futter wühlt, wie die Bartmeisen scharren, sagt man sich, daß gegen solche angeborene Gewohnheiten anzukämpfen zwecklos ist.

Für Weichfutterfresser haben sich bei mir die runden Kaninchenfreßnäpfe aus Steingut bewährt. Sie sind haltbar und bequem zu reinigen. Die Größe wählt man nach dem Tagesfutterbedarf. Kleinere trogartige, besser runde Porzellannäpfe für Sonderfutter stelle ich in einer größeren Emailleentwicklerschale am Innenrande derselben auf. Beschmutzungen des Futters sind so seltener. Verstreutes bleibt in der Schale liegen und kommt am Abend den Lerchen, den „Allesfressern“ zugute. Hohe Näpfe (Kond.-Milchbüchsen) braucht man für Leckerbissen, wie Biskuit, getrocknete Ameiseneier u. a. Ein Vergeuden ist da ausgeschlossen.

Allen selbsttätigen Trinkgefäßen haftet der Nachteil an, daß das Wasser darin oft erneuert werden muß, sonst wird es leicht schlecht, riecht übel und ist den Vögeln nachteilig. Wenn man bedenkt, daß viele Weichfresser, wie Bachstelzen, Blaukehlchen, Pieper, Flußregenpfeifer, Alpenstrandläufer u. a. nach der Futteraufnahme das Wassergefäß benutzen und durch Abspülen des Schnabels beschmutzen, wird man zugeben müssen, daß eine Abhilfe nur durch öfteren

Wasserwechsel möglich ist. Die bekannten „Vogelpumpen", auch der selbsttätige „Tränkautomat" Nr. 800 der Fa. Vieweg in Waldenburg i. Sachsen sind für Käfige und kleinere Vogelstuben mit Körnerfressern sehr zu empfehlen, auch die „Geflügeltränke" derselben Firma ist recht brauchbar. Im Flugraum mit „gemischter" Besetzung wähle man das Trinkgefäß möglichst groß, um nicht zu oft wechseln zu müssen. Das Wasser verdirbt dann auch nicht zu rasch.

Das Körnerfutter und seine Mischung ist meist Sache und Geheimnis des Händlers. Ich halte es gar nicht einmal für vorteilhaft, die Futtersorten einzeln zu kaufen und zu verfüttern. Man kauft teurer und der Verbrauch ist größer. Gute Bezugsquellen für Futtermischungen kann jeder Vogelliebhaberverein angeben. Daß man in den Vereinen jetzt zu gemeinsamem zentnerweisem Einkauf übergeht, bringt die Preisentwicklung der Sämereien für Futterzwecke mit sich. Für Weichfutterfresser brauche ich zwei Mischungen. Die für die Grasmücken enthält als Hauptbestandteil das Primusfutter (Hirschmann, Augsburg), verstärkt durch eine Zugabe Ameiseneier, verbessert durch stark zerkleinerte getrocknete Vogelbeeren, oder Feigen- oder Dattelabfälle. Mit Wurzeln oder Äpfeln angefeuchtet, gut gemischt, bleibt das geriebene Futter, im Napf festgedrückt, ein bis zwei Stunden stehen, wird dann aufgelockert und verfüttert. Es darf nicht zu feucht sein, was bei Verwendung von Feigenabfällen leicht eintritt. Zugabe von trockenem Futter hilft dann die Mischung verbessern. Durch den starken Vogelbeerengehalt ist das Futter sehr bekömmlich und wird außer von den Grasmücken auch von den Seidenschwänzen, Lerchen, Alpenbraunellen und Meisen gern genommen. Die andere Mischung bilden in der Hauptsache Ameiseneier und Weißwurm. Als Zutaten werden das Hiltmannsche Futter, eine Messerspitze kondensiertes Eigelb, ein Löffel getrockneter Ameisen und hin und wieder etwas Normalin verwandt. Es ist ein Kraftfutter, aber recht kostspielig. Ameiseneier werden mit heißem, Weißwurm mit kaltem Wasser aufgequellt, beide im Sieb unter der Leitung von der überflüssigen Feuchtigkeit befreit, ohne dabei die nahrhafte gelbe Masse des Weißwurms zu entfernen. In dies Futter mische ich im Sommer die frischen Ameiseneier. Die Umgewöhnung im Herbst macht dann keinerlei Schwierigkeiten. Die getrockneten Ameisen sind für Rotschwänze, Fliegenschnäpper und Rotkehlchen von Nutzen. Leckerbissen als Sonderbeigaben verwende ich möglichst vielseitig und abwechslungsreich. Das Vielerlei an Futter verlockt freilich manchen Vogel, auch „Mal was anderes" zu versuchen. Ich sah das Schwarzplättchen Kopfsalat, das Rotkehlchen Nüsse, die Bachstelze Speck und Apfelsinen, die Schwanzmeisen Trauben, den Gangesbrillenvogel Kolbenhirse, die Haubenlerche Biskuit und den Alpenstrandläufer Körner verzehren.

Frisches Obst fehlt fast nie auf dem Futtertisch. Birnen, süße Äpfel, Kirschen, Feigen, Datteln (Abfälle), Hasel-, Wal- und Paranüsse, Kunsthonig, Biskuit, Korinthen, frische Holunder- und Vogelbeeren werden leidenschaftlich gern verzehrt. Auf Biskuit (in Pulverform, damit nicht ein Habgieriger mit dem ganzen Stück auf- und davongeht) und Korinthen muß meine Schar jetzt leider verzichten, den Kunsthonig gibt es immer seltener zum Leidwesen der Meisen, Grasmücken, Bachstelzen, Kreuzschnäbel und Seidenschwänze, deren Vorliebe für Süßigkeiten noch zu wenig bekannt ist. Die Dattel- und Feigenabfälle werden, zusammengeknetet, an die Sprunghölzer gesteckt. Um diese Klumpen entstehen lebhafte, aber ungefährliche Beißereien. Getrocknete Ameiseneier brauchen Schwanzmeisen, Schama, Blau- und Braunkehlchen und Bachstelzen. Den Körnerfressern ist mit „Grünkraut", wie Kopfsalat (nicht feucht, aber zum Frischhalten in eine Wasserschale gestellt), Doldenrische (Tradeskantia), Vogelmiere, Wasserminze, halbreifen Gräsern, Unkraut u. a. sehr gedient. Die Dompfaffen sind ganz versessen darauf, und das Rot des Gefieders leuchtet in ganzer Schönheit erst bei steter Grünfütterung. Daß die jungen Triebe, an Weidensträuchern auch im Herbst und Winter vorhanden, bevorzugt werden, ist bekannt.

(Fortsetzung folgt.)

Fremde Eier im Nest.

Von Wilhelm Rüdiger.

(Nachdruck verboten.)

Der Beobachter und Sammler findet ab und zu Nester, welche von zwei oder mehreren verschiedenen Vogelarten belegt sind. Aus meiner Eiersammlung möchte ich einige Fälle bekanntgeben:

1. Mai 1907. Schorfheide i. d. M., südöstlich des Werbellinsees: 1 Ei des Schreiadlers und 1 Ei des Mäusebussard.

29. März 1910. Heidewärterhaus Berkholz bei Boitzenburg i. d. Uckermark: 6 Eier des Haushuhns und 2 Eier vom Waldkauz! Die Frau des dort wohnenden Heidewärters Schulz fand in ihrer Scheune im Stroh ein Hühnernest, als wir beide Revierförster Beckmann, Forsthaus Zervelin, und ich gerade vorüberfuhren. Beim Öffnen des Heckens, wir wollten nach dem nahe gelegenen Dorfe Naugarten fahren, drückte die Frau ihre Freude darüber aus, daß die Hühner so gut legen. Unbeabsichtigt sah ich vom Wagen in die offen gehaltene Schürze und erkannte sofort die Kauzeier. Das Erstaunen meines Begleiters sowie das der Frau war natürlich recht groß und meine Worte wurden anfänglich stark angezweifelt.

11. Mai 1911. Eine vorjährig gezimmerte Schwarzspechthöhle in einer Kiefer am Großen Samithsee in der Oberförsterei Biesenthal i. d. Mark: 2 Eier der Schellente und 2 vom Star.

3. Juni 1911. In der Stadtforst Eberswalde ebenfalls in einer Schwarzspechthöhle in Kiefer: 2 Eier von der Blaurake und 1 Ei der Hohltaube.

4. Juni 1911. Großer See bei Fürstenwerder i. d. Uckermark: Auf einer Insel 10 Eier der Pfeifente, 4 der Reiherente und 1 Ei der Tafelente; am selben Fundort, Nest, welches unter einem Dornbusch an einem größeren Stein stand, enthielt 2 Eier der Tafelente und 2 der Reiherente.

30. März 1913. In einer hohlen Rotbuche, unmittelbar am Forsthaus Eisenhammer, Oberförsterei

Hochzeit i. d. Neumark: 8 Stück des großen Sägers und 1 Ei der Schellente.

14. Mai 1916. Zettitz bei Krossen a. Oder: 6 Eier der Löffelente und 1 Ei der Märzente; am selben Fundort, Besitzer von Wedel, in einem Nest 3 Eier der Tafel- und 3 Eier der Märzente.

21. Mai 1916. Ebenfalls Karpfenteiche bei Zettitz: in einem Nest 2 Eier der Lachmöwe und 1 Ei von der Tafelente; Zettlitz: 3 Eier vom Haubensteißfuß und 1 Ei vom Rothalstaucher.

21. April 1917. In einem Nistkasten in meinem Garten, Forsthaus Eisenhammer: 3 Eier vom großen Säger und 5 Eier der Schellente, von der letzteren Art ließ ich 10 Stück im Kasten liegen, sie wurden von der Ente ausgebrütet.

Bienenfresser.

19. April 1919. In der hohlen Buche am Forsthaus Eisenhammer, welche alljährlich abwechselnd vom großen Säger, der Schellente, dem Waldkauz benutzt ist, je nachdem wer sein Gelege zuerst zeitigt, vgl. Datum vom 30. März 1913 dieser Arbeit, lagen 6 Eier der Schellente und 4 des Waldkauz.

21. Mai 1920. In einer Nisthöhle, Eisenhammer: 6 Eier des schwarzrückigen Fliegenfängers und 4 der Blaumeise.

10. Mai 1921. Ebenfalls in einer Nisthöhle, Eisenhammer: vom Feldsperling 5 Eier und von der Kohlmeise 1 Ei.

Sämtliche hier aufgeführten Funde habe ich persönlich gemacht, die Fundorte liegen in der Mark Brandenburg. Großer Säger und Schellente sind auch nicht seltene Brutvögel in der Oberförsterei Hochzeit, beide Arten nehmen dort sehr gern künstliche Nisthöhlen an, selbst roh aus Brettern gezimmerte Kästen. Ein starker Brutbestand an großen Sägern war noch in den Jahren von 1860—1880 im Grunewald, namentlich auf dem Pichelswerder, viele alte hohle Eichen sind dort gefallen und somit wurden es weniger Brutgelegenheiten. Damals war dort die Ausbeute an Sägereiern so stark, daß diese zum Backen der Osterkuchen verwendet wurden. Im Winter sieht man dort auf der Havel stets auch den großen Säger. Dieser Vogel müßte durch Schaffung von Brutgelegenheiten wieder angesiedelt werden — wer tut es?

Von der unteren Wolga.

Von Ingenieur Kracht.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Juni. 3.: Mache eine Bootfahrt durch die überschwemmte Wolganiederung. Erhalte ein Beutelmeisennest mit fünf frischen Eiern. Ersteige einen Horst eines Seeadlers mit drei flüggen Jungen. Als ich mich dem Nistbaum näherte, kreiste das Adlerpaar, laut rufend, als ich denselben erkletterte, verschwand es, statt die Jungen zu verteidigen. Der Horst stand auf einer Pappel in zirka 8 m Höhe und war sehr leicht zu ersteigen. Das Nest war sehr groß, aus dicken Knüppeln erbaut und innen mit Lappen und Wolle belegt. Futtervorräte oder Reste lagen weder im Nest, noch unter dem Baum. Ein Junges flog ab, als ich an den Horst kam, die beiden andern duckten sich. Ein Grünfink singt sein bescheidenes Lied. Mehrere Austernfischer fliegen über unser Boot fort.

18.: Unternehme wieder eine größere Bootfahrt in die reizende Wolganiederung. Mache wieder einen Seeadlerhorst, der sehr hoch und ganz unzugänglich auf einer hohen Pappel steht, ausfindig. In ihm wurden drei Junge großgezogen; ich bekam nur noch eins zu Gesicht. Finde sieben Beutelmeisennester, und zwar vier Brut- und drei Spielnester. Aus einem Nest waren die Jungen bereits ausgeflogen, ein zweites war noch unbelegt, die beiden anderen enthielten ziemlich kleine Junge (fünf resp. sechs Stück). Eine ganze Anzahl Buchfinken schlug fleißig. Pirole ließen fortwährend ihren melodischen Ruf hören, dazu orgelten Gartengrasmücken ihre sanften Lieder.

25.: Erhalte ein weiteres Nest der Beutelmeise mit vier schon fast vollbefiederten Jungen.

Juli. 6.: Große Kranichflüge ziehen morgens und abends über die Stadt fort. Offenbar die Alten mit den Jungen.

12.: Beobachte zum erstenmal eine Anzahl Mauersegler über der Stadt.

22.: Nonnensteinschmätzer sind in voller Mauser. Sehe zum erstenmal einen Trauerfliegenschnäpper.

26.: Ueber einer überschwemmten Wiese tummeln sich viele alte und junge Bienenfresser und pflegen in den dichten Weidenbüschen der Ruhe. Schwarzstirnwürger sind gerade ausgeflogen. Auffallend groß ist die Zahl der Raubvögel; es kamen mir zu Gesicht ein Rötelfalkmännchen, ein Rauchfußbussard, zirka 15 Hühnerhabichte, wenigstens 40 Steppen- und acht Seeadler. (Schluß folgt.)

Vereinigung der Vogelliebhaber Landesverband Preußen.

Die am 30. Januar 1923 abgehaltene Mitgliederversammlung erfreute sich eines sehr regen Besuches. Als Gäste nahmen die Vorstände der an der Vogelschau beteiligt gewesenen Kanarienzüchtervereine teil. Das Protokoll der letzten Sitzung wurde verlesen und einstimmig angenommen. Zu Punkt 2 der Tagesordnung gab der Vorsitzende einen mit lebhaftem Beifall aufgenommenen Bericht über die Vogelschau. Er drückte darin nochmals allen Mitgliedern für die dargebrachten Mühen und Opfer und auch dem Ausstellungsleiter Herrn Gottschlag den wärmsten Dank

aus. Den Herren vom Kanariensport wurde gleichfalls für ihre kameradschaftliche Mitarbeit die volle Anerkennung ausgesprochen. Sodann erfolgte der Bericht der Herren Kassenprüfer Gottschlag und Westermayer. Mit einem endgültigen Abschlusse konnte uns noch nicht gedient werden, da noch nicht alle Rechnungen eingelaufen waren. Aus der vorliegenden Verrechnung läßt sich jedoch schon mit Sicherheit feststellen, daß ein Überschuß nicht erzielt worden ist. Die enormen Ausgaben hatten den Voranschlag im September, hervorgerufen durch das rapide Sinken unserer Mark, bei weitem überstiegen. Der billige Eintrittspreis von 25 Mark konnte trotz des lebhaften Besuches die Kosten gerade decken. Auch aus dem Verkauf des Katalogs, der eine Unsumme verschlang, war kein Gewinn zu erzielen. Das schadet aber nichts, wir wollten mit der Vogelschau keine Reichtümer erwerben, gewiß ist jedoch, daß der Landesverband Preußen mit seiner Vogelschau einen großen moralischen Erfolg gehabt hat, und das ist die Hauptsache. Zum Punkte „Verschiedenes" wurden vom Vorsitzenden nachstehende Anträge eingebracht:

Antrag 1. Mit Rücksicht auf die großartigen Erfolge unserer 1. Vogelschau stelle ich den Antrag, in diesem Jahre eine 2. Vogelschau im Namen des Landesverbandes zu veranstalten und den Vorstand zu ermächtigen alles Weitere dazu zu veranlassen.

Antrag 2. In Berücksichtigung der Verbreitung unseres Landesverbandes wird der Antrag gestellt, sämtliche angeschlossene Vereine und Einzelmitglieder zur Beteiligung an der Vogelschau auffordern zu dürfen, um so in jedem Jahre einen Konzentrationspunkt für alle Vogelliebhaber zu schaffen.

Antrag 3. Um den angeschlossenen Vereinen Gelegenheit zu geben, an der entscheidenden Generalversammlung mitwirken zu können, wird der Antrag gestellt, die Generalversammlung im April ds. Js. ausfallen zu lassen und auf einen Ausstellungstag zu verlegen.

Die Berliner Vereine haben die Anträge einstimmig angenommen. Nun bitten wir unsere verehrten auswärtigen Mitglieder gleichfalls zu den Anträgen Stellung zu nehmen. Sollten bis zum 15. April keine Einsprüche erhoben werden, so gelten die Anträge innerhalb des gesamten Landesverbandes als angenommen. Unser Führer durch die Vogelschau kann von mir noch für 50 M. das Stück bezogen werden.

Aufgenommen sind die Herren Karl Reich Bremen; A. Krabbe, Anklam; Franz Weise, Meppen; Hermann Bösel, Lübeck; Adolf Albrecht, Stendal; J. Heino, Nordhorn; C. Balser, Kreuzwertheim.

Franz Nyncke, 1. Vorsitzender,
Berlin O 34, Königsberger Str. 17.

Aus den Vereinen.

A. Z. Angemeldet sind die Herren Bruno Schaeffer, Berlin-Lichterfelde, Marschnerstr. 33; Dr. Hans Krösl, Innsbruck (Öster.), Maria-Theresien Str. 8; Willy Rath, Rudolstadt i. Th., i. Fa. „Isola", Hinter der Mauer 4a; Heinr. Hahn jr., Neuß a. Rhein, Krefelder Str. 60; Rudolf Kaiser, Neunkirchen a. Saar, Jägerstr. 10. — Aufgenommen sind die Mitglieder 289 Kurt Hoffschild, Kaufmann, Breslau, Ohlauer Str. 23; Mtgl. 290 Fr. Schmidt, Blechnermeister, Durlach i. Baden, Herrenstr. 27; Mtgl. 291 Paul Beling, Kaufmann, Rudolstadt i. Thür., Roonstr. 9 I; Mtgl. 292 Richard Huth, Herrenschneiderei, Perleberg, Wollweberstr. 3; Mtgl. 293 M. Strotmann, Kaufmann, Godesberg a. Rhein, Burgstr. 52; Mtgl. 294 Aage Lenchler, Nyborg i. Dänemark; Mtgl. 295 Carl Worm, Nyborg i. Dänemark. — Mtgl 3 (Balser, Kreuzwertheim) sucht dringend je 1,0 Grauedelsänger und Mossambikzeisig. Mtgl. 24 (Steinhagen, Lübeck) sucht je 1,0 Zebrafink, Bandfink, kl. Elsterchen; gibt im Mai junge Möwchen ab. Mtgl. 14 (Krabbe, Anklam) gibt ab 1,0 Graukardinal, bevorzugt wird Tausch gegen 0,1, kauft letzteren sowie 0,1 Grauedelsänger Mtgl. 35 (Pracht, Düsseldorf) sucht i. T. gegen feine Weichfresser, wie Goldstirnblattvogel, Silberohrsonnenvogel, Schama usw., 1,1 zuchtfähige blaue Wellensittiche und gegen 0,3 Rotkopfamandinen 3.0 dito. Kauft 2,1 Wellensittiche, 0,1 Zebrafink. Mtgl. 76 (Bartsch, Duisburg) sucht div. Exoten, auch Weber. Mtgl. 125 (Lücke, Badbergen) sucht Zuchtpaare von Wellensittichen, Zebrafinken, Möwchen u. a.; zahlt in Silbermark aus. Mtgl. 179 (Kradisch, Mariaschein) sucht seltenere Sittiche und Steinrötel. Mtgl. 194 (Gerhardt, Eberswalde) sucht 1,1 Wellensittiche, 0,1 Schmetterlingsfink. Mtgl. 219 (Koch, Dresden) gibt ab 1,1 jap. Möwchen e. Z., gelb-braunweiß, 8 Mon., sucht 1,1 dito, gelb oder braunbt., mögl. jünger. Mtgl. 243 (Jansen, Marienberg) ist fangberechtigt und sucht klassische Werke über Vogelfang gegen Portoersatz und Leihgebühr zu leihen; bittet ferner um Übersendung abgängiger ornith. Literatur zur Anwerbung von Vogelfreunden. Mtgl. 247 (Pölz, Hamburg) sucht 1,0 großen Alexandersittich. Mitgl. 250 (Reck, Sulingen) gibt ab 1,0 Tigerfink, bevorzugt i. T. gegen 1,0 oder 0,1 brbt. Möwchen. Mtgl. 251 (Lohmann, Harzgerode) sucht Wellensittiche und Möwchen; gibt a. W. Nahrungsmittel i. T. Mtgl. 255 (Voigt, Jena) gibt Ia weiße italien. Hirse, hellkörnigen Glanz und 1,0 gutsingende Amsel in Tausch gegen Exoten und Kanarien. Mtgl. 271 (Dr. Vranne, Taubenberg) sucht 1,1 Singsittich und Farbenwellensittiche, auch einzeln oder jung. Mtgl. 278 (Koppenseiner, Großschönau) sucht Wellensittiche, Prachtfinken und reinrassige Kanarien. Mtgl. 277 (Böttcher, Königsberg, wohnt Von-Brandt-Allee 19) sucht je 1,0 Kapuzenzeisig; Magellanzeisig, Mossambikzeisig, Indigofink. Mtgl. 291 (Beling, Rudolstadt) gibt ab 1,0 Malabarfasänchen gegen 0,1 Muskatfink oder andere Exoten in Paaren unter entsprechender Zuzahlung. — Wegen zeitweiser Krankheit können Anfragen usw. nur sehr schleppend erledigt werden.

A. Krabbe.

„Acgintha", Verein der Vogelfreunde zu Berlin. Am Karfreitag, den 30. März, findet eine Partie nach den Potsdam-Sarmunder Wiesen statt. Abfahrt Potsdamer Fernbahnhof 8^{00} vormittags. Treffpunkt 9^{00} in Neubabelsberg.

J. A.: O. Vorbrodt, 1. Schriftführer,
Berlin O 112, Scharnweberstraße 18.

Vereinigung der Liebhaber einheimischer Vögel zu Berlin. Besonderer Umstände wegen im Vereinslokal „Zum Alexandriner", Alexandrinenstraße 36a, finden unsere regelmäßigen Sitzungen wieder wie früher jeden 2. Donnerstag nach dem 1. und 15. ds. Monats statt. Gäste stets willkommen.

Der Vorstand. J. A.: P. Böhme, Schriftführer,
Berlin, Rüdersdorfer Straße 69.

Vereinigung der einheimischen Waldvogelliebhaber von Görlitz und Umgegend. Am 20. Januar 1923 feierte obige Vereinigung ihr 1. Stiftungsfest im Hotel „Brauner Hirsch", Görlitz. Es war dies eine Feier, wie man sie von echten Vogelliebhabern gewöhnt und echte Vogelliebhaber charakterisiert. Nachdem einige wohlgelungene Musikstücke die Veranstaltung eingeleitet hatten, gelangte ein von unserm verehrten Mitgliede Herrn Photograph Alfred Jäschke sinnreich verfaßter, so ganz auf unsere Ideale passender Prolog durch Fräulein Lücker zum Vortrag, für welchen beide reichen Beifall ernteten. Auch die Ansprache unseres 1. Vorsitzenden, Herrn Lücker, verdient besonderer Anerkennung. Er entrollte ein fesselndes Bild des ganzen Werdeganges und Aufbaues der Vereinigung. Die Vorzüge, die uns Vogelliebhabern vor andern Sterblichen innewohnen, wurden von Herrn Lücker in besonders warmherzigen Worten zum Ausdruck gebracht. Er wies besonders auf die jetzige verworrene, von vielem Schlechten und Verlogenen durchleuchten Zeit hin und empfahl, daß wir uns von diesem Übel losreißen und unsere Zuflucht nehmen zur reinen und edlen Natur, die wir mit unsern Pfleglingen in unsere Häuslichkeit verpflanzt haben. Herr Lücker ermahnte ferner, das große, angefangene Werk des Zusammenschlusses aller Vogelliebhaber Deutschlands fest im Auge zu behalten und uns durch nichts von dem einmal beschrittenen Wege abbringen zu lassen, denn nur Einigkeit mache stark. Weiter erwähnte der Redner, daß es nicht nur unsere Pflicht und unsere Parole sei, die edle Liebhaberei zu fördern, sondern wir haben es uns auch zur Aufgabe gemacht, uns intensiv an der Durchführung eines zweckentsprechenden Vogelschutzes zu betätigen. Nachdem Herr Lücker der Hoffnung Ausdruck gegeben hatte, daß die Liebe zur Natur und unsern gefiederten Freunden uns so weiter leiten möge wie bisher, schloß er seine zu Herzen gehende Rede mit dem Wunsche, daß die Vereinigung weier blühe und gedeihe. Anhaltender Beifall der Festversammlung war der Lohn für die treffenden Worte unseres bewährten Vorsitzenden. An dem guten Verlauf des Abends hat noch besonderen Anteil ein unter der Leitung unseres verehrten Mitgliedes Herrn Mummert auftretendes Sängerquartett. Die zu Gehör gebrachten Lieder waren, was Reinheit, Tonfülle und Rhythmus anlangte, einzig dastehend

und für unsere Ideale wie geschaffen gewählt. Auch an dieser Stelle sei den Sängern nochmals herzlich gedankt. Einen besonders schönen Anblick bot der Verlosungstisch. Nachdem noch einige wohlgelungene komische Vorträge zu Gehör gebracht waren, war es an der Zeit, das Tanzbein zu schwingen, und kamen die Teilnehmer voll und ganz auf ihre Rechnung. Erst in vorgerückter Stunde trennte man sich mit dem Bewußtsein im Herzen, den anwesenden Gästen gezeigt zu haben, was Idealismus zu leisten vermag und auch die Ansicht so manches stillen Gegners beeinflußt zu haben. J. A.: Rothe, 1. Schriftführer.

Vereinigung hannoverscher Vogelfreunde. Zu Sechs saßen wir, vom Vorstande der V. h. V.-Fr., im kleinen Kontor und berieten über die Tages-Ordnung der nächsten Sitzung, über Vorträge, Lichtbilder-Abende, Ausflüge, über die Erhöhung der Beiträge und die steigenden Kosten. 750 Mark soll die „Gef." kosten! „Können wir unseren Mitgliedern nicht zumuten", meint der Vorsitzende, „warum nicht" der Kassenwart. Ich befürworte. Weiß ich doch aus eigener Erfahrung, welch wertvolles Bindemittel die „Gef. Welt" zwischen Leser und Liebhaberei darstellt. Was sind schließlich 750 Mark heutzutage? Der Vogelfreund bringt gern Opfer. Die Anregungen, die Erfahrungen, die jede Nummer bringt, sind ihm so wertvoll, daß er nur notgedrungen auf den Bezug der „Gef." verzichten wird. Wenn man berücksichtigt, daß je größer die Zahl der Bezieher, je billiger das Blatt sein kann, so wird sich mancher überlegen, die geplante Abbestellung zur Ausführung zu bringen. Um den Mitgliedern die hohen Verzehrungskosten zu sparen, verlegten wir unsere Monats-Versammlungen in den Vortrags-Saal einer Schule. Der Besuch am 20. Januar war sehr zahlreich, obgleich außer einer trefflichen Vorlesung des Herrn Brauß besonderes nicht auf der Tages-Ordnung stand. Der Meinungs- und Erfahrungsaustausch war recht lebhaft. Am 29. Januar hielt Dr. Heinroth, der Leiter des Berliner Aquariums, einen Lichtbilder-Vortrag: „Unsere Eulen und Tagraubvögel. Beinahe wäre die Veranstaltung verunglückt. Ein unzulänglicher Apparat, fehlende sachkundige Bedienung, große Verzögerung des Beginns, beeinflußten empfindlich den Abend. Die große Schar der Zuhörer ertrug diese Unstimmigkeiten mit Geduld und freute sich über die Schönheit der hervorragenden Aufnahmen, dankte dem Redner mit lebhaftem Beifall für seine für die Wissenschaft so wertvollen Forschungen und Schilderungen.
A. Troschütz.

Verein für Vogelschutz und -pflege zu Jena. Jahresbericht von 1922. Bei Beginn des Jahres gehörten dem Verein 24 Mitglieder an, im Laufe des Jahres traten bei: Am 22. März Herr Bäckermeister Hans Sternkopf; am 17. Mai Herr Universitätsbeamter Franz Borggreve; am 28 Juni Herr Kaufmann Otto Mickan; am 16. Juli Frl. Elfriede Weldig. Leider hatte auch in diesem Jahre der Verein einen schweren Verlust in dem Dahinscheiden des allseits verehrten und geschätzten Mitgliedes des Herrn Oberstleutnant Siemers zu beklagen. Der Verblichene hat das Interesse unseres Vereins in jeder Beziehung auf das Eifrigste gefördert, sein Andenken wird stets in Ehren gehalten werden. Mit Beginn des neuen Jahres beträgt die Mitgliederzahl 27. Die Hauptversammlung fand am 25. Januar statt. Zum Vorstand wurden gewählt; Herr Jahn, Vorsitzender; Herr Sack, Kassierer; Herr Dreßler, Schriftführer. Zum größten Bedauern der Vereinsangehörigen mußte Herr Dreßler Mitte Juli infolge schwerer Erkrankung seine bisher in mustergültiger Weise ausgeübte Schriftführertätigkeit einstweilen niederlegen. Von den Mitgliedern wurde Herr Borggreve interimistisch zu seinem Nachfolger gewählt. Der Jahresbeitrag wird infolge der fortschreitenden Teuerung auf 10 M. festgesetzt, zahlbar in vierteljährlichen Raten. Das Eintrittsgeld beträgt 3 M. In dem verflossenen Vereinsjahr wurden den Mitgliedern eine größere Anzahl interessanter und belehrender Vorträge geboten. Hieran beteiligten sich die Herren Bischoff, Dreßler, Jacobi, Jahn, Leidholdt, Sack und Dr. Schmidt mit folgenden Themen: „Biographie von Alfred Edmund Brehm"; „Nestbau der Vögel"; „Der Steinkauz"; „Lapplands Vogelberge"; „Biographie Johann Friedrich Naumanns"; „Die Bedeutung der Bürzeldrüse"; „Die Nashornvögel und Kolibris"; „Der Grünfink"; Vorlesung aus Liebes Schriften; „Vogelfang in alter und neuer Zeit"; „Das Ende der Hochseevögel"; Vorlesung aus den Schriften des Herrn Löns, „Freileben und Haltung von Blaukehlchen"; „Der Trauerfliegenschnäpper"; „Der Waldkauz"; „Einiges über den Vogelzug"; Vorlesungen aus Manfred Kyber, Carl Ewald, Herm. Löns; „Naturschutzpark"; „Der Vogelmord in Italien"; „Der Mauersegler"; „Vogelschutz und Vogelschutzgehölze"; „Anleitung zum Sammeln von Winterfutter"; „Die Mönchgrasmücke"; „Etwas über die Vogelfangstation auf Helgoland; „Wasserstar"; „Nachtschwalbe und Kuckuck"; „Edelfalk"; „Baum- und Marderfalk". Zur Erläuterung der Vorträge wurde außer einem reichhaltigen Material ausgestopfter Exemplare noch folgende Vögel lebend gezeigt: Stein- und Waldkauz, Männchen und Weibchen vom Blaukehlchen, Trauerfliegenschnäpper, Grünfink und Hänfling. Auf einem Vormittagsausflug, der vom herrlichsten Wetter begünstigt war, unternahmen eine Anzahl Mitglieder und einige Gäste eine Wanderung nach dem Rautal; hierbei konnten folgende Vögel im Freien beobachtet werden: Bussard, Turmfalk, Feldlerche, Pirol, Singdrossel, Gartengrasmücke, Schwirl, Weidenlaubsänger, Waldlaubvogel, Gimpel, Hohltaube und Halsbandfliegenschnäpper. Ein Abendspaziergang über die Wöllnitzer Wiesen galt einem Turmfalkenhorst auf hoher Pappel und der Brutstätte eines Steinkäuzchens, die sich in einem hohlen Weidenkopf befand. Der Nestinhalt bestand aus drei bereits gut befiederten Jungen, von denen eins durch Herrn Sack den Teilnehmern gezeigt wurde. Es fanden ferner mehrere Fahrten nach dem bei Langensalza gelegenen, dem Freiherrn H. von Berlepsch gehörenden Gut Seebach statt, um die so zweckmäßig und vorbildlich eingerichteten Vogelschutzstationen kennen zu lernen. Letzteren Umstand ist es wohl in der Hauptsache zu danken, daß der in uns ruhende Wunsch nach größerer Betätigung auf vogelschützendem Gebiet wieder reger wurde. Eine Verwirklichung dieses lobenswerten Wunsches schien aber eine Unmöglichkeit zu sein, da unsere wirtschaftlichen Verhältnisse sich durch die Auswirkung vom verlorenen Krieg, Revolution, Konsequenzen aus Versailler Vertrag usw., allmählich zu einer Katastrophe auszuwachsen drohten. An ein Erwerben irgend eines Geländestreifens, um auf eigenem Grund und Boden einen ordnungsmäßigen Vogelschutz ausüben zu können, war also nicht zu denken. Ein Vorschlag des Herrn Borggreve, doch mal an die Carl-Zeiß-Stiftung heranzutreten und von dieser außer einem sich in mäßigen Grenzen bewegenden Zuschuß auch die Erlaubnis zu erbitten, einen Teil ihres im Rosental gelegenen Besitztums, übrigens für derartige Zwecke wie geschaffen, in ein Vogelschutzgehölz nach Berlepschschem Muster umwandeln zu dürfen, fand daher allgemeinen Beifall, und es wurde mit regem Eifer an seine Ausführung gegangen. Herr Jahn verfaßte in sehr geschickter Weise die an die Carl-Zeiß-Stiftung zu richtende Eingabe und stellte mit großem Fleiß und vieler Mühe alle hierzu erforderlichen Ausgaben zusammen. Herr Landmann war so liebenswürdig, von dem ausersehenen Geländestreifen, der zunächst nur in dem bescheidenen Ausmaße von 10 : 60 m gedacht ist, einen Lageplan anzufertigen. Herr Borggreve stellte einen in Farben gehaltenen Entwurf her, der der Carl-Zeiß-Stiftung ein annäherndes Bild der beabsichtigten Anlage geben sollte. Gleichzeitig wandte sich Herr Jahn an die in solchen Anlagen sehr erfahrene und bekannte Begründerin des Bundes für Vogelschutz in Stuttgart, Frau Kommerzienrat Hähnle mit der Bitte um Ratschläge. Frau Hähnle kam in liebenswürdigster Weise dieser Aufforderung nach und gab uns manchen beachtenswerten Fingerzeig unter Zusicherung weiterer beratender Unterstützung. Es sei hier eingeschaltet, daß der Verein außer der Mitgliedschaft der Vereinigung der Vogelliebhaber Deutschlands auch die des vorerwähnten Bundes für Vogelschutz erwarb und letzterem auch noch eine stattliche Anzahl Mitglieder persönlich beitraten. Wenn auch bis heute kein endgültiger Bescheid von der Carl-Zeiß-Stiftung vorliegt, so ist doch nach Lage der Dinge anzunehmen, daß unsern Wünschen entsprochen werden wird.
(Schluß folgt.)

Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig. Nächste Vereinssitzung Donnerstag, den 15. März, im Vereinslokal „Bauers Brauereirestaurant", Täubchenweg. Gäste sind stets willkommen.

J. A.: Joh. Birk, 1. Vorsitzender,
Leipzig-Mockau, Beuthstraße 29.

Käfige u. Gerätschaften

Verkaufe einen grün lack. **Metallkäfig,**
50×38×28, für 6000 ℳ, tausche auch gegen Vögel oder „Brehm", Ges. Vögel.
242] **H. Eberhardt,**
Nordhausen-Alltendorf 36.

Lerchenkäfig, gut erhalten, geg. Mehlwürmer zu vertauschen J. Hüttner, Dortmund, Gutenbergstr. 26. [243

Vorsatzgitter [244

jede Größe nach Skizze, Rahmen aus Hartholz,
Gitter aus verzinkt. Draht
liefert billigst als Spezialität
Otto Wagner, Rossen i. Sa.,
Schulstr. 9. Preisliste geg. zeitgem. Porto.

Verkaufe gegen Gebot 2 Zuchtpaare gr. Wellensittiche, 1 Bandfinken-Zuchtpaar, 1 Zuchtpaar Tigerfinken, 0,1 gr. Wellen- und 1 Mönchsittich, 1 zerlegb. Flugkäfig aus Eiche mit Drahtgewebeeinlagen, 104 lg., 68 brt., 85 hoch, mit 6 Futternäpfen aus Porzellan. Dazu zum außen anhängen eingerichtete 6 achteckige Nistkasten für Wellis mit auf der Drehbank ausgehohltem Boden, äußere Größe 32×20cm, aus 20mm stk. Brettern mit hint. Wandschieber, desgl. Badehaus, 22×22×24 cm, ev. ein Flemingkäfig, 60×81×40 cm, mit 2 z. auß. anzuhängenden Nistk. f. Prachtf., 1 Mehlwurmzuchtkiste, 38×20×18 cm mit Glasstreifeneinlagen; Bilder aus der Vogelstube, geb., Nuß, Der Wellensittich, Die Prachtf., Nuß, Der Präparator und Konservator. Angebote unter R. B. 2350 befördert diese Zeitschrift. [245

Futtermittel

Mehlwürmer

Geg. Einsend. von 2500 ℳ 1/4 Pfd. franko.
Größere Posten zum Tagespreis.
Anfragen Rückporto, sonst keine Antwort.
D. Waschinski & Co.
Biesenthal b. Berlin.
246] Postscheckkonto Berlin 34825.

Vogelfutter

für Kanarien, Waldvögel, Exoten, Papageien, Weichfresser. Anfragen nur gegen Rückporto. Liste 13 über Vogelfutter 50 ℳ, Liste 5 über Vogelkäfige, Zuchtgeräte usw. mit etwa 400 Abbildungen 150 ℳ. [247
W. Göpel, Leipzig,
Tröndlinring 1. Telephon 14958.

Ornis-Näpfe in Porzellan

Mod. II $12\frac{1}{2} \cdot 4\frac{1}{2} \cdot 3\frac{1}{2}$ tief
Mod. I $15\frac{1}{2} \cdot 5\frac{1}{2} \cdot 3\frac{1}{2}$ tief
größere Mengen auch für den Export; auch einzeln als Beirack. (Siehe Ornis-Buch ℳ 250.— und Porto.) [248
Ornis-Haus, Halle-Saale.
Bei Anfragen Rückporto erbeten.

Ornis-Haus
Halle-Saale.
249] Gegründet 1912.
Reform-Normal-Weichfresserfutter und Körnermischfutter
Tagespreise.
Bei Anfrage Rückantwort.
Ornis-Buch M. 250.— und Porto.

Reform-Käfige

Zerlegbar · Leichteste Reinigung · Einfachster sicherer Transport
1. Preis beim Käfig-Wettbewerb Leipzig 1919 (s. Ges. Welt 1920, Heft 14—16)
werden für alle Vogelarten hergestellt.
Goldene Medaille Leipzig 1921.
Ausführung: Hartholz, grünlackiert oder naturlackiert, Zinkschublade, Porzellannäpfe, Ledertuchdecke.
Keine Fabrikware, sondern beste Spezialarbeit!
Anfertigung als Kistenkäfig oder Wiener Form (halboffen) oder halboffen mit fester Rückwand. Ohne jedes Werkzeug in einer Minute zusammengestellt resp zerlegt. Verpackung zum Selbstkostenpreis.
Fertigen auch jede Art Käfige u. Volieren n. Zeichnung od. Maßangabe.
Anfragen Rückporto beifügen
Katalog gegen Einsendung von 150 Mark in Briefmarken.
Schlagnetze ohne Mittelsteg
für schädliche Vögel, prima handgeknüpfte Ware.
Kühn & Muschter, Inh. Arthur Muschter,
Borna b. Leipzig, Kasernenstr. 4.
Spezialwerkstätte für Käfigbau
Bank-Konto: Allgemeine Deutsche Credit-Anstalt Zweigstelle Borna.
Stadt-Girokasse Borna b. Leipzig Nr. 1506.
Postscheck-Konto: Leipzig 92250. Fernsprecher 147. [250
Zahlreiche Anerkennungs- und Dankschreiben.

Papageien Kanarienhähne Bastarde

kauft höchstzahlend und tauscht auch auf Exoten
Willy Odenwald, Fulda.
Eigner Export und Import. [251

Kaufe laufend zu konkurrenzlos höchsten Preisen:
Kanarienhähne und -weibchen
sowie **Sing- und Ziervögel, Exoten aller Arten, Papageien, graue, grüne usw.**
Arthur Muschter, Borna b. Leipzig,
Käfigfabrik und Vogelhandel en gros und en detail
Import. **Export.**
Anfragen Rückporto beifügen. [252

Wir suchen laufend

nur vollständige Jahrgänge und ganze Reihen, gebunden oder in Heften mit Titel, Inhaltsverzeichnis u. Farbentafeln
Gefiederte Welt
Journal für Ornithologie
Blätter für Aquarien- u. Terrarienfreunde
zu angemessenen Preisen.
Angebote nur **mit** Preisen erbeten.
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg
Postschließfach 148.

Qualitätsfutter Sanitas

aus gar. nur erstkl. milbensr. Ingred.
1 Kilo-Pak. 2500 ℳ, 5 Pak. à 2400 ℳ. [253
Sanitasverlag Heidelberg 46.

Zirka 5—6 Pfd. Mehlwürmer zu verk., event. gegen Ia Ameiseneier zu vertauschen. Anfragen bitte Rückporto beifüg. Anton Luginger, Pfarrkirchen, Niederbayern, Passauer Str. 274. [254

Vögel

Kaufe Vögel, Tiere aller Arten, zahle mehr als meine Konkurrenz. [255
Beck, Tierimport, **Stuttgart.**

Mehrere Zuchtpaare
grüne Wellensittiche,
blutsfr., gesund und wetterfest, von Liebhaber zur Zucht sofort gegen gute Preise **gesucht.** Bald. Angeb. erbeten an **Bruno Schaeffer,** Berlin-Lichterfelde IV, Marschnerstraße 33. A. Z. angem. [256

Blaukehlchen

2 Jahre gekäfigt, gegen besseren and. Weichfresser zu tauschen gesucht. [257
Lentze, Osnabrück, Struckmannstr.

Verkaufe

wegen Platzmangels gegen Gebot
1 Zuchtpaar Bandfinken, 1 Zuchtpaar Tigerfinken; [258
suche ein Wellensittichmännchen,
21. oder 22. Zucht.
Albert Friedel, Baumeister,
Bernstadt i. Sa.

Sterbefalls halber habe ich ein
Rosella-Weibchen,
welches mit gutem Erfolg gebrütet hat, gegen Höchstgebot zu verkaufen.
Frau Joh. Ohm Wtw.,
259] **Brake in Oldenburg.**

Suche 1 jungen Kanarienhahn, gebe in Tausch 1 Zuchtpaar jap. Mövchen. Kaufe 0,1 gelben Wellensittich. [260
Otto Steinhagen, Lübeck, Hundestr. 2.

Tausche gut schlagende **Singdrossel,** 3 Jahr gekäf., gut i. Gefieder, m. gr. Bauer, und **2 dicke Brehmbücher,** gut erh., geg. garant. blutsfr. zuchtfähiges Wellensittichpaar ein. **Fritz Keller, Berlin-Steglitz,** Rheinstraße 43, III. [261

Suche

einige Weibchen **jap. Mövchen** und ein Männchen **Zebrafink** und zahle pro Stück 10000 ℳ, event. tausche auch gegen **Männchen Mövchen.**
Wagner, Bruchmühle (Niederbarnim), Lindenstraße 32. [262

Achtung! Achtung!
Finkenliebhaber!

Wer züchtet oder besitzt **Reitzugfink mit Wirbel, langgezogenen Reitzug mit Schnapper,** und wo hätte ich Gelegenheit, mir einen solchen abzuhören. Porto wird vergütet. [263
Gefl. Meldungen unter „Reitzugfink" an die „Ges. Welt" bis 20. März.

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Hermsdorf bei Berlin; für den Anzeigenteil: Franz Wunderlich, Magdeburg, Postschließfach 148.
Verlag der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck: August Hopfer, Burg Bz. Mgdbg.

Jahrgang LII.
Heft 7. 5. April 1923.

Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Die Gefiederte Welt gelangt am Donnerstag nach dem 1. u. 15. jedes Monats zur Ausgabe und kostet für Monat April 750 Mark. Einzelpreis des Heftes 400 Mark.
Inserate für die folgende Nummer müssen bis spätestens Freitag früh in Händen der Verlagsbuchhandlung sein. Die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 10 Pfg. Grundpreis berechnet, der mit der vom „Börsenverein der Deutschen Buchhändler" von Zeit zu Zeit bestimmten Teuerungszahl zu multiplizieren ist. Die Teuerungszahl ist zurzeit „2000". — Auslandspreis für die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum —„10 Schweizer Franken.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung (M. Kretschmann) in Magdeburg.

Postschließfach 148. Postscheckamt: Magdeburg 3148. Fernsprecher: 1323.

Eindrücke von der Jubiläumsausstellung einheimischer Stubenvögel in Leipzig am 17. und 18. Dezember 1922.

Von A. Bischoff.

(Schluß.) (Nachdruck verboten.)

Die Käfige in der Ausstellung waren wohl samt und sonders als durchaus mustergültig anzusehen. Allein nur einer Singdrossel hätte ich ein Heim von größeren Ausmaßen gewünscht; dennoch schien sie sich in ihrem Käfige, den sie wahrscheinlich bereits längere Zeit bewohnt, recht heimisch zu fühlen; denn trotz der neugierig auf sie gerichteten, recht zahlreichen Menschenaugen ließ sie ihre zarten, frühlingsverheißenden Weisen ertönen und zeigte sich nicht im entferntesten unruhig und unbehaglich. Diesen Eindruck mußte man eigentlich von allen ausgestellten Vögeln haben. Es war geradezu auffallend, wie wohl sich all die prächtigen gefiederten Sänger in ihren Heimen fühlten ungeachtet der für sie ganz ungewohnten Aufstellung und Umgebung und trotz des sie umgebenden bekannten Ausstellungslärms. Wie besonnen und ruhig benahm sich die gesamte Vogelschar der wahrlich nicht geringen Anzahl der Besucher gegenüber, unbeirrt der neugierig auf sie gerichteten Blicke gewiß tausender Ausstellungsbesucher übertönten sie mit ihrem frohen Gesange und muntern Gezwitscher den unvermeidlichen Ausstellungslärm. Was war es wunder, daß der Riesenschwarm der Ausstellungsbesucher sich dauernd vor den Käfigen der Waldvögel hin- und herbewegte und manch einer wie gebannt hier verweilte, während drüben auf der Gegenseite des Saales, wo die „gelben Sänger" in sogenannten Gesangsschränken dicht verschlossen vor den Augen der Besucher Aufstellung gefunden hatten, nur vereinzelt einmal ein „Eingeweihter" mit fachmännisch gespitzten Ohren bald vor diesem, bald vor jenem „Kasten" etwa einen meisterhaften „Triller", eine „Klingel", eine „Schockel" oder eine „Rolle" zu erlauschen hoffte. Der Laie hingegen eilte hier rasch vorüber, ihn zog einzig das farbenprächtige Bild unserer einheimischen Sänger aus Garten, Wald und Flur an, dem schenkte er ungeteilt seine ganze Aufmerksamkeit.

Der Ausstellung lebender Waldvögel war angegliedert eine Sammlung zum Teil recht seltener Vogelbälge aus aller Herren Ländern, allerdings unter besonderer Betonung der deutschen Vogelwelt. Erwähnung verdient ferner die schmucke Sammlung von Ölgemälden, Aquarellen und Drucken mit zum Teil recht humorvoll dargestellten Szenen mit dem Vogelleben in der Natur und im trauten Heim des Liebhabers. Daneben sah man teils in vollständigen Gelegen, teils in einzelnen Stücken manch selten sonst zu schauendes Vogelei und Nest. Zudem wurde der Vogelkunde noch durch eine Ausstellung von einschlägiger Literatur Genüge geleistet.

Dem Vogelschutze diente im besonderen neben ausgestellter Fachliteratur eine Kollektion des Bundes für Vogelschutz, bestehend aus Nistkasten für verschiedene Vogelarten, Futterhäuschen und anderem Vogelschutzgerät.

In einem Nebensaale hatten verschiedene Händler bzw. Fabrikanten Käfige, Vogelfutter sowie allerlei Gerät im Dienste der Vogelpflege, Kanarienzucht usw. in Ständen ausgestellt.

Der Gesamteindruck, den wohl jeder Besucher von der Ausstellung mit nach Hause nehmen mußte, war für den Liebhaber, Gelehrten und Laien ganz zweifellos der denkbar beste. Jeder war des Lobes voll über all das Dargebotene und schied dankbaren Herzens aus den Ausstellungsräumen.

Und fragen wir uns: Was ist denn nun eigentlich der Zweck einer solchen Ausstellung? Etwa Reklame eines Vereins für seine Sache mit der Absicht, möglichst viele Neumitglieder zu gewinnen? Ganz mitnichten. Meines Erachtens liegt die Haupt-

aufgabe einer derartigen Veranstaltung ausschließlich doch wohl nur darin, dem großen Publikum einmal eindringlich zu zeigen, was eigentlich unsere Stubenvogelliebhaberei ist, wie sie richtig ausgeübt wird. Dabei gilt es, die leider immer noch so festgewurzelten Vorurteile möglichst restlos zu beseitigen und jeden Fernstehenden und Gegner zu der Überzeugung zu bringen, daß die rechte Art des Haltens von Stubenvögeln durchaus kein bloßer Sport oder gar etwa eine verwerfliche Tierquälerei darstelle, sondern daß es sich hierbei um eine durchaus gute und edle Sache handelt, deren erzieherischer Wert auf jung und alt gar nicht hoch genug bewertet werden kann. Schon der große Weise von Nazareth hat vor nunmehr nahezu 2000 Jahren bereits gesagt: Wie kann ein Mensch jemand lieben, den er nicht kennt? Dies Wort sollte man immer wieder jenen fanatisch denkenden Scharfmachern und Gegnern unserer Stubenvogelhalterei vor Augen halten, wenn sie gegen die Pflege von Stubenvögeln wettern und eifern. Denn wer unsere schöne Heimatnatur richtig schätzen und lieben will, der muß sie zuvor erst einmal richtig kennenlernen. Und wer liebt unsere Sänger wohl mehr und pflegt sie wohl besser als unsere Vogelliebhaber! Und bot in dieser Hinsicht die Leipziger Jubiläumsausstellung in ihrem prächtigen Arrangement mit ihren zweckmäßig eingerichteten kleineren und größeren Vogelheimen mitsamt ihren prachtvoll gefiederten Insassen, die sich nicht einmal durch ein so großes Publikum in ihrem lustigen Gezwitscher und jubelnden Gesange stören ließen, den besten Beweis dafür! Deshalb ist das Verdienst, das sich der Leipziger Liebhaberverein durch seine bisherigen Ausstellungen im Dienste der Stubenvogelpflege erworben hat, gar nicht hoch genug einzuschätzen. Darum gebührt dem Leipziger Verein, dessen Mitglieder nicht Mühe, Zeit, Geldopfer und was sonst noch alles dazu gehört, scheuten, derartige Veranstaltungen in die Tat umzusetzen, und im ganz besonderen ihrem ausgezeichneten Vorstande, einem Liebhaber und Vogelkenner seltenster Art, der ungeteilte Dank aller deutschen Vogelliebhaber. Möge es dem Leipziger Verein mit seinem bewährten, schaffensfreudigen Vorstande an der Spitze vergönnt sein, auch in Zukunft weiter segensreich zu wirken im Dienste der deutschen Stubenvogelliebhaberei und damit zum Heile unseres gesamten jetzt von erbarmungs- und rücksichtslosen Feinden schwer geknechteten deutschen Vaterlandes. Ein Volk, das seine Heimat liebt, wird nicht untergehen! So möge die Leipziger Jubiläumsausstellung, die hoffentlich nicht die letzte sein wird, reiche Früchte tragen und zur Nachahmung anregen.

Sprosser und Nachtigall.

Von J. Birk, Leipzig.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Kommt ein Frischfang von Sprosser und Nachtigall im ersten Jahre seiner Käfigung nicht in den Schlag, so ist das meistens eine Folge von zu spätem Fang, indem der Vogel bereits in die Paarung eingetreten war. Aber auch andere Umstände können mitsprechen, wie Nicht- oder Schlechtverhängen des Käfigs, ein den Vogel zu sehr beunruhigender Standort desselben und vor allem eine Gewöhnung an Mischfutter als Frischfang. Frische Ameisenpuppen müssen Sprosser und Nachtigall unbedingt haben, wenn sie als Frischfänge in den Schlag kommen sollen. Bleiben Frischfänge trotz allem im ersten Jahre stumm, so besteht Gefahr für den Eintritt resp. Verlauf der ersten Käfigmauser; mausert ein Frischfang nicht spätestens Ende Juli bis Anfang August, so ziehe man ihm ohne Sorge nach und nach Schwung- und Schwanzfedern aus, und zwar dermaßen, daß man eine Feder stehen läßt, die nächste auszieht und so fortfahrend, bis man mit den Flügeln und dem Schwanz durch ist, die stehengelassenen Federn fallen dann von selbst aus, und die Mauser kommt in Gang auch mit dem Kleingefieder. Am besten ist, man wartet mit der Einleitung dieser sogenannten künstlichen Mauser nicht zu lange, damit noch frische Ameisenpuppen zu haben sind; diese sind die besten Förderer der Mauser und der Federbildung. Für hohe Temperaturschwankungen sind beide Vögel sehr empfindlich, vor allem auch gegen Zugluft; die Nachtigall ist verhältnismäßig wärmebedürftiger als der Sprosser, der eigentlich ohne Schaden zu nehmen im ungeheizten Zimmer sehr gut überwintert. Ein kühl überwinterter Sprosser wird wohl länger bis zum Frühjahr auf seinen Schlag warten lassen, entfaltet aber dann einen intensiveren, feurigeren Schlag als der zu warm überwinterte Vogel, der meistens nur einen phlegmatischen, alles Feuer vermissen lassenden Schlag hören läßt und bereits seinem Gesangsende entgegengeht, wenn der kühl überwinterte erst anfängt, sich in seinem Schlag kräftig zu entwickeln. Wer zwei Sprosser käfigt, dem ist zu raten, einmal die Probe aufs Exempel zu machen und einen im ungeheizten, aber auch nicht zu niedrig temperierten, den anderen im geheizten, aber nicht zu warmen Zimmer zu überwintern, der Erfolg wird für das Angeführte sprechen. Überhaupt ist bei Haltung von Stubenvögeln, wenigstens bei den edleren, der goldene Mittelweg der beste, in Punkt Temperatur nicht zu kalt, nicht zu warm, sondern mäßige Zimmertemperatur. Nicht jeder Sprosser und jede Nachtigall schlägt, wenn mehrere derselben Art im Zimmer gehalten werden, meistens schweigt der im Gesang schwächere Vogel wieder und der im Organ stärkere setzt sich durch, darum ist es besser, man verteilt sie auf mehrere Räume, um in den vollen Genuß des Gesanges aller gekäfigten Sprosser und Nachtigallen zu gelangen. Ich halte es für zweckwidrig, neben einer prima Nachtigall noch eine andere im Vogelbestand zu halten, denn sie wird wohl etwas anders schlagen, tourenreicher oder tourenärmer sein, aber eine prima Nachtigall bringt schon das Höchstmöglichste an Abwechslung, so daß sich eine zweite erübrigt. Anders ist dies bei den Sprossern, deren Schläge sind so verschieden nach ihrem Vorkommen, ob nördlicher oder südlicher Vogel, jede Örtlichkeitsrasse hat ihrer Rasse eigene Schläge, so daß die Sprosserliebhaberei mit die interessanteste Abwechslung bietet, denn jeder Vogel mit anderem Verbreitungsgebiet hat anderen Schlag, wenigstens mit anderen Eigenheiten. Die Pflege von Sprosser und Nachtigall ist, wie ich schon anführte, im Prinzip die gleiche, doch erfordert der Sprosser entschieden mehr Sorgfalt betreffs der Fütterung, besonders von

Mehlwürmern, als die Nachtigall, auch ist der Sprosser, trotzdem die Nachtigall ebenfalls empfänglich ist für Fußkrankheiten, ganz besonders empfindlich an den Füßen, ja ich glaube, daß dieser leichten Neigung zu kranken Füßen die vielen Mißerfolge bei Sprossern zuzuschreiben sind. Ich bin ein scharfer Gegner von Treiben mit Gesangsreizmitteln in der gesangslosen Zeit bei allen Weichfressern, aber ganz besonders muß dies vermieden werden bei derartig fußempfindlichen Vögeln wie Sprosser und Nachtigall. Mehlwürmer sollen in der gesangslosen Zeit höchstens nur ab und zu als Leckerbissen gereicht werden, aber keinesfalls als tägliche Beigabe in einer größeren Anzahl. Mancher Liebhaber denkt, mit dem Mehlwurmtopf in der Hand bringt er seine Liebhaberei auf den höchsten Stand. Und nichts ist irriger als das. Ist die Gesangszeit da, der Vogel singt aber noch nicht, so beginne man dem Vogel täglich höchstens zwei Würmer zu reichen, auch etwas gekochtes mageres Fleisch, am besten Rinderherz, auch hartgekochtes Ei, vorausgesetzt, daß der Grund des Schweigens nicht in einer Verfettung des Vogels zu suchen ist. Manchmal wird sich der Vogel ohne Zutun des Pflegers selbst entfetten, indem er tagelang, sogar fünf bis sechs Tage jegliche Nahrungsaufnahme verweigert, selbst die sonst so begehrten, leckeren Mehlwürmer liegen läßt. Der Liebhaber braucht in solchem Falle keine Sorge zu tragen um seinen Liebling; hat er sich entfettet, so setzt auch bald der Gesang ein, singt der Vogel, so kann die Zahl der Mehlwürmer ruhig bis 15 Stück erhöht werden, aber nur nach und nach und nicht auf einmal, sondern täglich in mehreren Rationen. Ist ein Vogel im Herbst mager, so heißt es aufpassen, abends Beleuchtung zwecks nochmaliger Sättigung für die lange Nacht, kräftig füttern, gekochtes Ei, Weißwurm, auch täglich einige Mehlwürmer schaden dem mageren Vogel nicht. Etwas gut genährt muß im Herbst der Sprosser und die Nachtigall sein, auch einen kleinen Fettansatz sehe ich ganz gerne. Natürlich mästen, wie es manche Liebhaber im Wahne, ihren Liebling ja keine Not leiden zu lassen, öfters tun, ist ganz verwerflich.

(Schluß folgt.)

Ringdrossel.

Der Innenflugraum.

Von Alfred Troschütz, Hannover.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Das Beste und Nahrhafteste aber biete ich im Sommer und Herbst meinen Vögeln durch die Verabreichung lebenden Futters. Im Jahrg. 1913 S. 153 der „Gef. Welt" habe ich die Fangart beschrieben, im Jahrg. 1904 S. 227 der „Blätter für Aquarien- und Terrarienkunde" die „Praktischen Winke für den Insektenfang" zuerst veröffentlicht. (S. die Abhgn.) Für die Leser, denen jene Blätter nicht zugänglich sind, nachstehend eine kurze Beschreibung. Zum Schleppnetz gehört ein kräftiger Drahtbügel, etwa 24 cm breit, aber nur 12 cm hoch, damit er noch in die Tasche paßt. Die Ecken sollen abgerundet sein. Nach oben kommt in die Mitte des Bügels die Schraubenhülse, in welche die Blechtülle für den Spazierstock eingeschraubt wird. Um den Draht an der Unterseite des Bügels wird ein doppelter Blechstreifen so fest gelegt, daß letzterer verstell- und drehbar bleibt. Eine Seite des Streifens wird mit einer Reihe Löcher versehen, um das aus bester Seiden- (Müller-) Gaze bestehende, etwa 20 cm lange in einen zwei Finger breiten Zipfel auslaufende Netz befestigen zu können. Die starke Abnutzung beim steten Schleifen des Netzes verlangt besonders festes Annähen, möglichst auch Verdoppelung der Gaze in der Nähe des Drahtbügels. Als Insektenbehälter sind nicht zu kleine Blech- (Kakao-) Büchsen geeignet. Der Boden wird aus feinster Drahtgaze (Messinggaze) hergestellt. Der aufklappbare Deckel mit übergreifenden Rändern bekommt einen herzförmigen Ausschnitt mit einem durch Falz (gegen das Verlieren) gesicherten Schiebedeckel als Verschluß. Ein seitlicher Bügel erleichtert das Tragen. Beim Insektenfang werden sonnige, warme Plätze, der Morgensonne zugängliche Wassergräben, trockene windstille Wald- und Wiesenränder, Heidelbeer- und Unkrautbüsche, Gegenden mit üppigem Pflanzenwuchs aufgesucht. Feuchte kalte Orte sind zu meiden. Ruhig und gleichmäßig sei die Handhabung des Netzes. Leicht und lose muß der Bügel über den Pflanzenwuchs gleiten. Wenn das Netz dann hochgenommen, durch Anklopfen die gefangenen Insekten in den Zipfel gebannt sind, wird mit zwei Fingern dieser nach außen abgeschlossen und durch Umstülpen die Beute in die Büchse gebracht. Zur Lebendhaltung der Insekten gehört etwas lockeres Gras oder Laub in die Büchse.

Der kribbelnde, fliegende, wimmelnde und kriechende Inhalt einer Fangbüchse wird im Flugraum in eine große Schale geschüttet. Neben dem lebenden Futter werden beim Abstreifen Mengen von halb- und ganzreifen Gras- und Unkrautsamen gewonnen, die den Körnerfressern sehr bekömmlich sind. Vom ganzen Büchseninhalt sind am anderen Morgen nur einige trockene Reiser und Stengel übrig. Wie vorzüglich dies Insekten- und Unkrautsamenfutter auf den Gesundheitszustand der Vögel einwirkt, habe ich 1921 und 1922 zu vergleichen Gelegenheit gehabt. Im Vorjahre ein trockener, warmer Sommer, reiche Insektenausbeute, rasche schnelle Vermauserung, in diesem naßkalten Jahre geringe Ernte, lange sich hinschleppende

Mauser. In der Vogelstube mit zahlreicher Besetzung ist der Vogel in steter Bewegung. Kraftaufwand und Futteraufnahme sind größer als bei Käfigvögeln. Daher muß die Nahrung auch kräftiger und vielseitiger sein. Mehlwürmer füttere ich nur im Winter, und so sparsam wie möglich. Um jeden Vogel die ihm zuträgliche Gabe zuzumessen, gebe ich die Mehlwürmer einzeln, d. h. die Vögel holen sich solche meist aus der Hand. Anderen muß ich solche zuwerfen, und um diese gibt es eine tolle Hatz, ein Aus-dem-Schnabel-Reißen, ein Abjagen und Ablisten, das dem Beschauer immer Vergnügen bereitet. Da kommen die Gewandtheit, die List und die Ausdauer der Vögel zur vollen Geltung. Um gut beobachten zu können, sind die Futternäpfe, das Trinkgefäß und der Badenapf auf einem Schlitten aufgestellt, der unmittelbar vor der Schauseite entlang läuft und von dem kleinen Vorraum aus bedient und gereinigt werden kann.

Die Badegelegenheit mit Springbrunnen, herabfließendem Wasser usw. auszustatten, habe ich mich nie entschließen können. Wenn man sieht, wie stark das Wasser benutzt wird, kommt man ohne weiteres zu möglichst einfachen Gebrauchsformen. Ich setze eine große Emailleentwicklerschale in einen größeren Zinkblechbehälter, der an den Ecken Rillen zum Einschieben von Glasscheiben hat. Die benachbarten Fensterscheiben der Schauseite kann ich dadurch nicht vor dem Bespritzen, wohl aber die Futternäpfe vor dem Naßwerden schützen. Es wirkt erheiternd, zuzusehen, mit welchem Eifer, mit wie viel Ausdauer das Bad benutzt wird. Auch da kommen die Eigenarten der Vogelstubenbewohner zum Vorschein. Sitzen dreie im Napf, will sicher noch ein vierter hinein. Manchmal will aber auch einer das Bad für sich allein haben und wehrt dann, sich ständig drehend, mit spitzem Schnabel andere Eindringlinge ab. Jener ist vorsichtig und nippt erst. Der faust mit einem Ruck hinein ins kalte Naß. Dieser wälzt sich förmlich. Als ob er schwimmen lernen will, schiebt mancher durchs Wasser. Andere wippen auf und nieder und viele planschen, daß es weithin spritzt. Naß, wie „gebadete Katzen", geht es dann hinauf zum elektrischen Licht. Auf dem Laufsteg um die Glühbirne wird getrocknet. Mit geöffnetem Schnabel, ausgebreiteten Flügeln, gefächertem Schwanze lassen sie die ausströmende Hitze einwirken, suchen etwaige lästige Gefiederbewohner loszuwerden, und drehen und wenden sich mit sichtbarem Behagen. Die Hitze kann scheinbar nicht groß genug sein. Die Anregung zum Baden bringe ich durch tägliches Besprengen der Pflanzen und Anfeuchten und Verbessern der Luft mittels eines kräftigen Zerstäubers. Übrigens ziehen Meisen, Brillenvögel u. a. das Baden in nassem Gezweige dem im Napfe vor.

Das Reinigen des Flugraums erfordert wöchentlich 3—4 Stunden, die Fütterung von 65 Vögeln, 38 Körnerfressern und 27 Weichfutterfressern, täglich nur 30—40 Minuten Zeit. In dieser $^3/_4$ Stunde, am Abend nach Geschäftsschluß, läßt sich Reinigen und Futterversorgung ohne Rast bewerkstelligen. Es bleibt noch Gelegenheit zu Beobachtungen übrig. Im Vorraum wird dann der Schlitten herausgezogen, die kleinen Näpfe mit dem Spatel, die großen runden Freßnäpfe mit einer Handvoll Torf gesäubert. Das verstreute Futter wird zusammengekehrt und in einer Schale den Lerchen nach oben gegeben. Nach dem Reinigen des Schlittens werden die frisch gefüllten Freß-, Trink- und Badenäpfe aufgestellt, die Schutzscheiben am Badebehälter angebracht, Trink- und Freßnäpfe nach oben auf die Galerie gegeben, und die Vögel sind für einen vollen Tag versorgt. Alle 14 Tage wird gründlicher reingemacht, die Scheiben geputzt, Wände und Sprunghölzer abgewischt, die Sträuße erneuert, der Baum mit nassem Tuch und nasser Bürste abgerieben, die kleinen offenen Käfige gereinigt, der Torfmull von Futterüberresten und Kotansammlungen befreit und aufgelockert, der Sandkasten abgekehrt und nachgefüllt. Das erfordert zwei Stunden Zeit mehr. Die zweimalige jährliche Hauptreinigung fällt in die Tage der Neubeschaffung frischer Bäume. Da wird dann alles ausgeräumt, mit verdünntem Salzsäurebrei die Wände abgerieben und mit Wasser abgespült. Der Torfbelag der Galerie wird von der „befleckten" Oberseite mit schräg gehaltener Fuchsschwanzsäge befreit, der Bodenbelag völlig erneuert und sonst alles sauber gemacht. (Fortsetzung folgt.)

Von der unteren Wolga.

Von Ingenieur Kracht.

(Schluß.) (Nachdruck verboten.)

August. 15.: Heute jenseits der Wolga. Beutelmeisen sind nicht mehr zu sehen. Bienenfresser kreisen um die hohen Pappeln, die den Weidenwald überragen.

27.: In allen Sträuchern des Ortes piepsen Kohlmeisen. Gegen Abend zieht eine große Zahl kleiner Falken (Rötel-?) über die Stadt fort.

28.: Große Flüge von Saatkrähen ziehen vorüber. Im Garten sind mehrere Kirschkernbeißer, Gartengrasmücken, Buchfinken und Zwergfliegenschnäpper eingetroffen.

29.: Fange ein Weibchen der schwarzköpfigen Grasmücke.

30.: Beobachte jenseits der Wolga Mäusebussarde, Rohrweihen, Wiesenweihe, Fischadler, Braunkehlchen sowie viele Kiebitze, Sumpfschnepfen und Enten.

31.: Im Garten sind Gartenrotschwänze, ein weiteres Weibchen der schwarzköpfigen Grasmücke, ein grauer Fliegenschnäpper und ein Laubvogel.

September. 4.: Im Garten tummeln sich eine ganze Anzahl Zwergfliegenschnäpper und außer den Vorgenannten noch eine Dorngrasmücke.

5.: Eine Anzahl Blaumeisen haben sich eingefunden.

6.: Starker Gartenrotschwanzzug, viele Weidenlaubvögel, mehrere Zaungrasmücken.

7. u. 8.: Viele Zwergfliegenschnäpper, sonst wie am 6.

9.: Zwergfliegenschnäpper alle fort. Stare jubilieren an ihren Niststätten. Bienenfresser sieht man in großen Scharen.

10.—15.: Kühles Wetter, sehr wenig Vogelleben.

16.: Sehr viele Laubvögel sind da.

17.: Jenseits der Wolga. Vogelleben merkwürdig spärlich; beobachtete nur zirka 20 Möwen, viele Kohlmeisen, einige Laubvögel, mehrere Flüge

von Buchfinken und Stieglitzen sowie eine Singdrossel. Keinen einzigen Raubvogel.

22.: Heute ist es wieder warm, viele Laubvögel und Gartenrotschwänze.

23.: Im Garten treibt sich eine Misteldrossel herum.

30.: Unaufhörlich ziehen Flüge von Distelfinken nach Süden.

Oktober. 31.: Zirka 15 Wacholderdrosseln fliegen nach Süden vorüber; desgleichen eine große Schar Stieglitze.

November. 13.: Ein Rotkehlchen wird gefangen. Seidenschwänze sind da.

1918. Infolge des verspäteten Frühjahrs setzte der Vogelzug recht spät ein.

Februar. 25: Stare sind da.

März. 7.: Heute kehren die Stare von neuem zurück.

12.: Großtrappen und Gänse überfliegen die Stadt. Schwacher Lerchenzug. Steppenkiebitz ist da.

13.: Starker Raubvogelzug; beobachte allein fünf Seeadler.

19.: Ab 14. wieder strenger Winter, viel Schnee. In den vergangenen Tagen waren viele Goldammern da, heute sehe ich die erste weiße Bachstelze.

21.: Tauwetter. Starker Lerchenzug.

22.: Auf einem Spaziergang in die Steppe notiere ich: Zwei Flüge Ringeltauben (20 und 5 Stück) in zirka 25 m Höhe; ein Flug Hohltauben (7 Stück), fliegen dicht über den Boden dahin; zirka 20 Spiegellerchen, viele Feld- und Kalanderlerchen. Kurzzehenlerchen singen. Sehe die ersten Wüstensteinschmätzer sowie einen Wiedehopf. Viele Raubvögel, unter anderen zwei Fisch-, einen Steppenadler, vier Rauhfußbussarde, zwei Sperber, einen Mäusebussard.

24.: An den Steppengewässern sehr viele Enten, Uferläufer und Kiebitze. Sehe die ersten schwarzen Milane. In den Gärten treffe ich drei Kolkraben, zwei Rohrammern, Buchfinken und Stieglitze an. In der Steppe beobachte ich einen Flug Wildtauben und sechs Fischreiher.

27.: Zirka 20 weiße Bachstelzen sind auf dem Zuge.

31.: Sehe die erste Steppenweihe. Beobachte lange Zeit ein Paar des Steppenkiebitz. In den Gärten zwei Misteldrosseln.

April. 3.: Heute besonders starker Zug von Gänsen. Rauchschwalben treffen ein.

Eichelhäher.

5.: Sehe den ersten Laubvogel und Pieper.

7.: Buchfinken schlagen, Weidenlaubvögel singen; ein paar Singdrosseln tummeln sich im Gebusch. Nebelkrähen haben 1—2 Eier; schwarze Milane paaren sich.

16.: Sehe den ersten Nonnensteinschmätzer.

19.: Kalanderlerchen paaren sich. Scheuche einen Zwergtrappenhahn auf. Am Steppensee eine Menge Wat- und Schwimmvögel. Beobachte wieder den schon mehrfach erwähnten weißschwänzigen Adler. Sehe die erste Blauracke. Schwarzer Milan und Elstern haben Eier.

20.: Sehe das erste Gartenrotschwanzmännchen. Erhalte Eier vom Jungfernkranich und Steppenkiebitz.

29.: Viele Gartenrotschwänze und Ziegenmelker auf dem Zuge.

30.: Zaungrasmücken sind zurückgekehrt.

Mai. 2.: Sprosser sind da. Erhalte ein Zwergsumpfhuhn.

3.: Der erste schöne Frühlingstag. Zahlreiche Zwerg- und graue Fliegenschnäpper, Zaungrasmücken, Laubvögel, Gartenrotschwänze und Sprosser. In 10 bis 20 Exemplaren waren da Dorngrasmücke, rotrückiger Würger und Ziegenmelker. In wenigen Exemplaren werden beobachtet Braunkehlchen, Pirol, Kuckuck, Halsbandfliegenfänger, Karmingimpel, Bienenfresser, Gartenammer, Heuschreckenrohrsänger. Unter den vielen, vielen Zwergfliegenschnäppern sehe ich nur ein halb- und ein vollausgefärbtes Männchen.

4.: Zwergfliegenfänger bis auf vielleicht 20 Exemplare alle fort. Karmingimpel in zirka 10 Stücken da. Turteltauben sind wieder da.

6.: Neu angekommen sind Sumpfrohrsänger und Mauersegler. Es sind noch da einige Sprosser, Gartenrotschwänze, Dorn-, Zaun-, Sperber- und Gartengrasmücken, rotrückige Würger, Pirole, Wald- und Fitislaubvögel, Karmingimpel. Stare haben Junge.

8.: Starker Zug von Garten- und Sperbergrasmücken. Sumpf- und Binsenrohrsänger singen fleißig.

9.: Alle gefiederten Wanderer sind fort.

Vereinigung der Vogelliebhaber Landesverband Preußen.

Wir können unsern verehrten Mitgliedern die freudige Mitteilung machen, daß die Creutz'sche Verlagsbuchhandlung sich bereit erklärt hat, die Wünsche der Vereinigung in jeder Weise zu berücksichtigen. Dieses Entgegenkommen ist für uns von unschätzbarem Nutzen und sehr hoch anzuerkennen. Wir danken Herrn Kretschmann daher nochmals für die Liebenswürdigkeit Die so sehnlichst herbeigewünschte Vereinigungsaustauschzentrale ist nun zur Tat geworden

und wird den Mitgliedern vom 1. April dieses Jahres an eröffnet. Das Mitgliederverzeichnis nebst den Sitzungen und einem ausführlichen Organisationsplan kann vom Unterzeichneten zum Herstellungspreise von 600 M., für Nichtmitglieder 1000 M. — ausschl Porto — bezogen werden. Um den Platz in der „Gef. Welt" nicht unnötig zu belasten, werden nach Bedarf Nachträge zu dem Mitgliederverzeichnis herausgegeben. — Ferner geben wir bekannt, daß unsere Geschäftsführung eine bedeutende Erweiterung erfahren hat. Neu hinzugekommen sind die Abteilungen Pressedienst, Statistische Abteilung nebst einer Sammlung wertvoller ornithologischer Mitteilungen aus den Sitzungsberichten der Vereine, Literatur sowie die drei gesonderten Abteilungen Kanarienzucht, Farben- und Gestaltskanarien und Bastardzucht. Alles Nähere darüber finden die Mitglieder in unserm demnächst erscheinenden Organisationsplan. — Zur Stützung unserer Vereinigungsaustauschzentrale gaben die Herren der Vereinigung der Liebhaber einheimischer Vögel zu Berlin ein leuchtendes Beispiel deutschen Liebhabergeistes. Es stifteten Herr Böhme 1000 M., Herr Merz 3000 M., Herr Kirchner 500 M., Herr Krüger 300 M., Herr Jungnick 500 M., Herr Bohwinkel 300 M., Herr Damm 1000 M., Herr Müller I 500 M., Herr Müller II 500 M., Herr Dennert 300 M., Herr Kugel 500 M., Herr Titus 5000 M., Herr Sonnenburg 300 M., Herr Scholz 300 M., Herr Beutel 1000 M., Herr Geide 1000 M., Herr Rückert 600 M. Insgesamt 16600 M. Herr Reich in Bremen übersandte uns 2000 M. Vielen Dank den edlen Spendern. Wohlan, mit solchen Männern der Tat werden wir die Welt erobern können. — Neu aufgenommen die Herren: Heinrich Filor, Wilmersdorf und Heinrich Menge, Charlottenburg.

J. A.: Franz Nyncke, 1. Vorsitzender,
Berlin O 34, Königsberger Straße 17.

Vereinigung der Vogelliebhaber Landesverband Sachsen.

Unsern sehr verehrten Mitgliedern geben wir hiermit zur Nachricht, daß unsere 1. Jahresversammlung am 28. und 29. April 1923 stattfinden soll. Wir laden hierzu herzlichst ein und hoffen auf eine recht starke Beteiligung. Anträge sind bis spätestens 8 Tage vor der Jahresversammlung an den unterzeichneten 1. Vorsitzenden einzusenden. Die Vereine bitten wir, ihre Vertreter mit den nötigen Vollmachten ausstatten zu wollen. Das Stimmenverhältnis regelt sich nach der eingetragenen Mitgliederzahl der unserem Verbande angeschlossenen Vereine. Unser Programm stellt sich wie folgt dar: am Sonnabend, dem 28. April 1923, abends um 7 Uhr, Begrüßungsabend in Bauers Brauereirestaurant, Leipzig, Täubchenweg (Vereinslokal). Die Ortsgruppe Leipzig wird bei vorheriger schriftlicher Anmeldung an den 1. Vorsitzenden für kostenlose Unterkunft sorgen. Am Sonntag, dem 29. April 1923, vormittags 10 Uhr, Jahresversammlung in Bauers Brauereirestaurant, Leipzig, Täubchenweg.

Der Vorstand. J. A.: Joh. Birk, 1. Vorsitzender,
Leipzig-Mockau, Beuthstraße 29.

In nicht allzuferner Zeit soll dem Reichstage ein **neuer Entwurf zum Reichsvogelschutzgesetz** zugehen, der im allgemeinen einen erweiterten Schutz unserer Vogelwelt bringen wird. Vornehmlich sind es verschiedene Raubvogel- und andere Arten, die von der Freiliste abgesetzt werden sollen, um dadurch, wenn das Jagdgesetz keine anderen Bestimmungen enthält, den vollen Schutz des Gesetzes zu genießen. Wenn für unsere Liebhaberei in diesem Entwurfe auch keine ins Gewicht fallenden Verschlechterungen vorgesehen sind, so ist das keinesfalls ein Verdienst der Vogelliebhaber, die es in der Vertretung ihrer Interessen bei den gesetzgebenden Körperschaften leider noch nicht dahin gebracht haben, eine tonangebende Organisation zu schaffen. Ebenso wie uns alle der jetzt fertig vorliegende Entwurf mit kaum nennenswerten Abänderungen in bezug auf unsere Stubenvogelliebhaberei überrascht, ebenso kann uns eines Tages auch ein verschärfter Gesetzentwurf unverhofft kommen, in welchem der Stubenvogelliebhaberei die Existenzmöglichkeiten erschwert oder gar unmöglich gemacht werden.

Vogelliebhaber erwacht! Geht heraus aus verderblicher Lauheit, unterstützt die bestehenden Landesverbände Preußen und Sachsen durch eueren Beitritt und durch emsige Mitarbeit. Gründet nach gleichem Muster in den anderen deutschen Ländern Landesverbände, damit die Stunde nicht mehr fern ist, in der wir alle deutschen Vogelliebhaber in der uns als Ideal vorschwebenden Zentralorganisation, dem deutschen Reichsverbande der Vogelliebhaber, zusammengeschlossen finden. Heraus aus der Zurückhaltung! Helft durch Mitarbeit eine Vertretung unserer aller Interessen, eine Kampforganisation, wenn es gilt, zu schaffen, damit wir in der Zukunft auf alle Fälle gerüstet dastehen, weil nur im Zusammenschluß und in der Einigkeit Stärke und Macht geschaffen werden.

Vereinigung der Vogelliebhaber Landesverband Sachsen.
J. A.: Johann Birk, 1. Vorsitzender,
Leipzig-Mockau, Beuthstraße 29.

Aus den Vereinen.

A. Z. Angemeldet sind die Herren Helmut Hengstmann, Leopoldshall-Staßfurt, Blumenstr. 9; Harry Escher, Rudolstadt i. Thür., Schillingstr. 2; Wilhelm Martin, Eversberg a. Saar, Kaiserstr. 68; Max Krieges-korte, Stuttgart-Hedelfingen; Max Eifrig, Schierke i. Harz, Barenberg 11a. — Aufgenommen sind die Mitglieder Nr. 296 Bruno Schaeffer, Berlin-Lichterfelde, Marschnerstr. 33; Mtgl. 297 Dr Hans Krösl, Innsbruck (Österr.), Maria-Theresien-Str. 3; Mtgl. 298 Willy Rath, Rudolstadt i. Th., Hinter der Mauer 4a, i. Fa. „Isola"; Mtgl. 299 Heinrich Hahn jr., Neuß a. Rhein, Krefelder Str. 60; Mtgl. 300 Rudolf Kaiser, Neunkirchen a. Saar, Jägerstr. 10. — Mtgl. 45 (Beyer, Niederschönhausen) sucht 0,1 zuchtf. gelben Wellensittich, evtl. gegen Abgabe von Jungtieren. Mtgl. 82 (Aumüller, Delitzsch) vertauscht 0,2 ausgef. grüne gegen 1,0 ausgef. grünen und 0,1 ausgef. gelben Wellensittich, auch einzeln. Mtgl. 88 (Becker, Danzig) sucht Neunzig, „Fremdl. Stubenvögel", letzte Aufl. Mtgl. 92 (Lenze, zurzeit Marien-Hospital, Hagen) bittet sehr um Überlassung eines Pärchen Prachtfinken gegen Abzahlung und ist bereit, dafür im Herbst Wildvögel zu besorgen. Mtgl. 151 (Hiltenkamp, Essen) tauscht 0,1 gr. Wellensittich, 8 Mon., gegen ebensolchen zwecks Blutwechsel. Mtgl. 243 (Janssen, Marienberg) sucht Schlagnetz für große Vögel, evtl. gegen Gebühr zu leihen. Gibt Sepiaschalen und Ruß, „Der Kanarienvogel", 11. Aufl. gegen Vögel und Körnerfutter oder Literatur. Mtgl. 278 (Lang, München) gibt ab 3,0 Bandfink, 1,0 Grauastrild, 1,0 Feuerweber, 0,1 weißk. Pfäffchen, evtl. im Tausch. Mtgl. 290 (Schmidt, Durlach) sucht blutsfremdes, evtl. junges Pärchen Wellensittiche. Mtgl. 165 (Zehetner, München) wohnt jetzt Landsberger Str. 215, Gartenhaus. Mtgl. 247 kann den Mitgliedern Erdnüsse preiswert besorgen; Anfragen Rückporto. A. Krabbe.

„Aegintha", Verein der Vogelfreunde zu Berlin. Sitzung jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat abends 8 Uhr im „Aquarium".

J. A.: O. Vorbrodt, 1. Schriftführer,
Berlin O 112, Scharnweberstraße 18.

Verein für Vogelschutz und -pflege zu Jena. (Schluß.) Aber noch einen weiteren Fortschritt brachte uns das entschwundene Vereinsjahr, und zwar einen Zusammenschluß mit unserm hiesigen Bruderverein, dem „Ornithologischen Verein". Beide Vereinigungen werden also in Zukunft, unter Wahrung vollkommenster Selbständigkeit in allen ornithologischen Angelegenheiten, möge es sich um Vorträge und Ausflüge oder Förderung des Naturschutzgedankens handeln, als treue Kameraden gemeinsame Wege beschreiten. Daß dies zustande kam, ist in der Hauptsache dem Vorstand des „Ornithologischen Vereins", Herrn Universitätsamtmann Herzer, zu danken, der den ihm durch Herrn Borggreve unterbreiteten Vorschlägen sofort zustimmte und sich für die Annahme dieser Idee bei seinen Mitgliedern mit seiner ganzen Person einsetzte. Die von Versammlung zu Versammlung immer gigantischere Ausmaße annehmende Verteuerung aller Getränke wie auch des Beheizungsmaterials drohte in allerkürzester Zeit unser nach Beendigung des Krieges wieder neu aufblühendes Vereinsleben

zu vernichten, so daß der Vorstand mit ernstester Besorgnis erfüllt war. Da brachte uns Herr Wendekamm in letzter Stunde die erlösende Nachricht, daß der Naturwissenschaftliche Verein, dessen Mitglied er ist, auf seine Anregung hin beschlossen hat, uns zu gestatten, zukünftig unsere alle 14 Tage stattfindenden Vereinsabende in seinen Räumen im „Geleitshaus", Camsdorfer Straße 22, abhalten zu dürfen. Für Beleuchtung und Heizung müssen wir natürlich selbst aufkommen. Für diese hochherzige Tat sei Herrn Wendekamm wie auch dem Naturwissenschaftlichen Verein an dieser Stelle herzlichster Dank ausgesprochen. Es erübrigt sich wohl, besonders zu betonen, daß die Teilnahme aller Mitglieder des Naturwissenschaftlichen Vereins, für die ornithologische Fragen von Interesse sind, an unseren Vereinsabenden von uns stets mit ganz besonderer Freude begrüßt werden wird. Um unsern liebenswürdigen Wirten und einer Anzahl der eigenen Mitglieder entgegenzukommen, wird der Dienstag zum künftigen Vereinsabend erwählt. — Nunmehr hätten wir noch der gütigen Spender einiger wertvoller Geschenke zu gedenken, und zwar hat der verstorbene Herr Oberstleutnant Siemers dem Verein drei Nisturnen, „Die Prachtfinken" von Ruß, „Die einheimischen Vögel" von Arnoldt gestiftet. Herr Uhlmann unterhält während der Wintermonate mehrere Futterplätze, wodurch der Vereinskasse eine wesentliche Beihilfe entsteht. Herr Vogt hat mehrere Jahrgänge der „Gefiederten Welt" geschenkt. Zwei in der Versammlung vom 9. August unter uns weilende holländische Gäste, die Herren Ulrich J. Baumée aus Groningen und Van der Veen aus Amersforth übergaben unserer Vereinskasse als Beitrag zur Winterfütterung je einen holländischen Silbergulden, die umgewechselt die Summe von zirka 1000 M. ergaben. Auch im neuen Jahre wurde unser Verein wiederum von Herrn Baumée in gütiger Weise mit einer größeren Futterspende bedacht. Herr Borggreve schenkte dem Verein einen größeren Holzkasten mit Glasdeckel zur eventuellen Unterbringung von Vogelleim und Nestern. Allen gütigen Spendern sei im Namen des Vereins bestens gedankt. Wenn wir zum Schluß noch einen Rückblick auf das verflossene Vereinsjahr werfen, so können wir, trotz aller wirtschaftlichen Nöte, mit dem Erreichten zufrieden sein. Auch der Besuch der Vereinsabende war ein durchaus zufriedenstellender. Für die Zukunft wollen wir nur den einen Wunsch hegen, daß unser Vaterland durch innere Einigkeit die gegenwärtige schwere Prüfungszeit überwinden und zu neuer Größe aufsteigen möge, denn auch hiervon hängt das weitere Gedeihen und Blühen unseres Vereins und unserer guten Sache ab. Borggreve, Schriftführer.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig. Bericht über die Generalversammlung vom 15. Februar 1923, abends ½9 Uhr. Es waren 43 Mitglieder, ein Ehrenmitglied und ein Gast erschienen. Die Tagesordnung lautete wie folgt: 1. Protokoll der letzten Sitzung; 2. Eingänge und Aufnahme von Mitgliedern; 3. Bericht und Abrechnung vom 25jährigen Jubiläum; 4. Jahresbericht des Vorsitzenden; 5. Bericht des Kassierers; 6. Bericht der Revisoren; 7. Bericht des Bibliothekars und Archivars; 8. Neuwahl des Gesamtvorstandes; 9. Anträge; 10. Verschiedenes. Die Abrechnung des 25jährigen Stiftungsfestes ergab folgendes Bild: Einnahme 27252 M., Ausgabe 16925 M., Überschuß 10327 M. Aus dem Jahresbericht des 1. Vorsitzenden wäre in der Hauptsache zu erwähnen: Der Verein zählte am Schlusse des Geschäftsjahres 86 Mitglieder und 3 Ehrenmitglieder. Herr Wilhelm Dietze wurde anläßlich des 25jährigen Stiftungsfestes zum Ehrenmitglied ernannt. Ausgetreten sind 5 Mitglieder, eingetreten 15 Mitglieder. Mitgliedschaft auf Gegenseitigkeit bestand mit folgenden Vereinen: Verein der Liebhaber einheimischer Vögel Leipzig-West; Vereinigung der Liebhaber einheimischer Vögel zu Berlin; Vereinigung für Vogelschutz und -liebhaberei zu Frankfurt a. Main; Verein edler Sänger zu Wien; Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Kassel; Vereinigung der Vogelliebhaber zu Hannover und Bayerischer Vogelliebhaberverein. Ferner in bezug auf Vogelschutz: Deutscher Verein zum Schutze der Vogelwelt; Bund für Vogelschutz Stuttgart; Verein „Jordsand" zur Begründung der Vogelfreistätten an den deutschen Küsten; Freie Vereinigung von Naturfreunden Berlin; Süddeutsche Vogelwarte Stuttgart; Verein sächsischer Ornithologen und Sächsischer Verein für Natur- und Heimatschutz sowie der Arbeitsgemeinschaft zur Pflege des Naturschutzgebietes in Gundorf. An Fachzeitschriften wurden gehalten: „Gefiederte Welt", „Blätter für Naturschutz", „Tierbörse", „Mitteilungen des sächsischen Vereins Heimatschutz", „Mitteilungen der süddeutschen Vogelwarte Stuttgart" und die „Ornith. Monatsschrift". Veranstaltungen waren folgende: das 24- und 25jährige Stiftungsfest, 1 Ausstellung, 1 Familien-, 2 Nacht- und 2 Vormittagsausflüge. Ferner wurden 1 Generalversammlung und 21 Sitzungen abgehalten. Es wurden 5 Vorträge gehalten. Herr Thieme: „Wandertrieb der Vögel", Herr Vorwerk über „Meine Voliere", Herr Herbert Otto (II): „Sumpf- und Weidenmeise", Herr Vorwerk: „Entstehung des Vogelzuges" und Herr Höhne über „Vogelschutz". Der Bericht des Kassierers ergab folgendes Bild: Einnahme 27254,24 M., Ausgabe 1999813 M., somit ein Überschuß von 725611 M. und ein momentaner Kassenbestand von 20699 M. Dem Kassierer wird unter Vorbehalt Entlastung erteilt, da die Revisoren nicht anwesend waren. Hierauf gab der Bibliothekar eine Übersicht über den Stand der Bücher und der Archivar eine Übersicht über die Sammlungen. Die Neuwahl des Gesamtvorstandes ergab folgendes Bild: 1. Vorsitzender Herr Johann Birk; 2. Vorsitzender Herr Höhne; 1. Schriftführer Herr Herbert Otto (II); 2. Schriftführer und Bibliothekar Herr Vorwerk; Kassierer Herr Böttger; Archivar Herr Friedrich Otto (I); Beisitzer die Herren: Fischer, Paul Winkler und Max Chlodek (I); Revisoren: Herr Poetters und Heim; Vergnügungsausschuß die Herren: Otto Winkler, Ungebauer, Kegel, Berger, Fiedler, Keßler, Roth, Waag, Schwarz und Curt Chlodek (III). An Anträgen waren 4 eingegangen: Antrag 1, von Herrn Birk, betreffend einen Nachtrag zu § 9 der Satzungen, wurde einstimmig angenommen. Antrag 2, von Herrn Vorwerk, betreffend eine Änderung der Bibliotheksordnung, wurde vom Verein angenommen. Antrag 3, von Herrn Waag, zwecks Beitragserhöhung. Nach längerer Debatte wurde man darüber einig, den Vereinsbeitrag vierteljährlich auf 150 M. zu erhöhen mit der Aufgabe, von Viertel- zu Vierteljahr wieder zu erhöhen. Zu Antrag 4 des Ehrenmitgliedes Herrn Wilhelm Dietze: Aussprache über Verschiebung unserer Waldvögel. Über diesen Antrag entspann sich eine lebhafte Debatte, welche dem Landesverband Sachsen übergeben wird. Der Vorsitzende erinnert an die Abgabe der Beringungsliste. Die Feuerversicherung wird auf 2 Millionen erhöht. Der Archivar Herr Vorwerk fragte die Versammlung, ob er in Zukunft für abhandengekommene Bücher aufzukommen hat, was von der Versammlung mit „nein" beantwortet wurde. Schluß der Generalversammlung 12 Uhr nachts.
H. Otto, 1. Schriftführer.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig. Nächste Vereinssitzung Donnerstag, den 5. April, im Vereinslokal „Bauers Brauereirestaurant", Täubchenweg. Gäste sind stets willkommen.
J. A.: Joh. Birk, 1. Vorsitzender,
Leipzig-Mockau, Beuthstraße 29.

Verein der Liebhaber einheimischer Vögel Leipzig-W., Sitz Leipzig-Lindenau, Ecke Lützner- und Götzstraße, im Restaurant „Erholung": Sitzungen jeden 2. und 4. Montag im Monat. Alfred Schuck, 1. Vorsitzender.



Herrn O. H., Mügeln. 1. In dem Käfig könnten 6—8 Finkenvögel untergebracht werden, wenn es sich um die kleinen Arten Zeisig, Girlitz, Stieglitz, Hänfling usw. handelt. 2. Für die 3 Vögel ist er geeignet. Ob sie sich nun dauernd vertragen, ist schwer zu sagen, im allgemeinen sind die 3 aber verträglich. 3. Im Laufe des Jahres.

Herrn P. B., Rudolstadt. Das Weibchen Malabarfasänchen ist infolge von Legenot eingegangen.

Käfige u. Gerätschaften

Vorsatzgitter [274
jede Größe nach Skizz, Rahmen aus Hartholz,
Gitter aus verzinkt. Draht
liefert billigst als Spezialität
Otto Wagner Rossen i. Sa.,
Schulstr. 9. Preis iste geg. zeitgem. Porto.

Futtermittel

Qualitätsfutter Sanitas
aus gar nur erstkl. milbenfr. Ingred
5 Kilo-Pak. à 2850, 10 Pak. à 2800 M.
Sanitasverlag Heidelberg 46.

Mehlwürmer

Geg. Einsend. von 2500 M ¼ Pfd. franko.
Größere Posten zum Tagespreis.
Anfragen Rückporto, sonst keine Antwort.
D. Waschinski & Co.
Biesenthal b. Berlin.
276] Postscheckkonto Berlin 34825.

Vogelfutter

für Kanarien, Waldvögel, Exoten, Papageien, Weichfresser. Anfragen nur gegen Rückporto. Liste 13 über Vogelfutter 50 M, Liste 5 über Vogelkäfige, Zuchtgeräte usw. mit etwa 400 Abbildungen 150 M. [277
W. Göpel, Leipzig,
Tröndlinring 1. Telephon 14958.

Reform-Käfige

Zerlegbar · Leichteste Reinigung · Einfachster sicherer Transport
1. Preis beim Käfig-Wettbewerb Leipzig 1919 (s. Ges. Welt 1920, Heft 14—16)
werden für alle Vogelarten hergestellt.
Goldene Medaille Leipzig 1921.

Ausführung: Hartholz, grünlackiert oder naturlackiert, Zinkschublade, Porzellannapfe, Lederruckdecke
Keine Fabrikware, sondern beste Spezialarbeit!
Anfertigung als Kistenkäfig oder Wiener Form (halboffen) oder halboffen mit fester Rückwand. Ohne jedes Werkzeug in einer Minute zusammengestellt resp. zerlegt. Verpackung zum Selbstkostenpreis
Fertig n auch jede Art Käfige u. Volieren n. Zeichnung od. Maßangabe.

Anfragen Rückporto beifügen
Katalog gegen Einsendung von 150 Mark in Briefmarken.
Schlagnetze ohne Mittelsteg
für schädliche Vögel, prima handgeknüpfte Ware.
Kühn & Muschter, Inh. Arthur Muschter,
Borna b. Leipzig, Kasernenstr. 4.
Spezialwerkstatt für Käfigbau
Bank-Konto: Allgemeine Deutsche Credit-Anstalt Zweigstelle Borna.
Stadt-Girokasse Borna b. Leipzig Nr. 1506.
Postscheck-Konto: Leipzig 92200 Fernsprecher 147. [278
Zahlreiche Anerkennungs- und Dankschreiben.

Papageien
Kanarienhähne
Bastarde

kauft höchstzahlend und tauscht auch auf Exoten
Willy Odenwald, Fulda.
Eigner Export und Import. [279

Kaufe laufend zu konkurrenzlos höchsten Preisen:
Kanarienhähne und -weibchen
sowie **Sing- und Ziervögel, Exoten aller Arten, Papageien, graue, grüne usw.**
Arthur Muschter, Borna b. Leipzig,
Käfigfabrik und Vogelhandel en gros und en detail
Import. **Export.**
Anfragen Rückporto beifügen. [280

Antiquarische Bücher

Bade, Praxis der Aquarienkunde. Mit 185 Textbildern, 9 schwarzen und 1 farbigen Tafel. (1907.) In Lwd. gebd. M 3000
— — Mit 220 Textbildern, 12 schwarzen und 1 farbigen Tafel. (1911.) Brosch. M 2500
— **Mitteleurop. Vögel.** Bd. I. Mit 1 farbigen, 4 schwarzen, 31 phot. Tafeln, 144 Abbildungen. In Lwd. gebd. M 3000
— **Praxis der Terrarienkunde.** Mit 1 farbigen, 18 schwarzen Tafeln, 101 Textbildern. (1907.) Gebd. M 3000
Bungartz, Nutzhühner. Mit 119 Abbildungen. (1921.) Kart. M 1500
— **Taube.** Mit 37 Abbildungen. (1921.) Kart. M 1500
Decken, v. d., Reisen in Ost-afrika. Bd. IV: Vögel. Mit 11 Farbentafeln. Gebd. M 10000 (1870.)
Dürigen, Amphibien und Reptilien. Mit 12 Farbentafeln u. 47 Abbildungen. Gebd. M 15000
Geyer, Katechismus für Aquarienliebhaber. Mit 1 Farbentafel und 78 Abbildungen. (1896.) Gebd. M 2000
— — Mit 6 Tondrucktafeln und 76 Abbildungen. (1909.) Gebd. M 2000
Gowans, Nature books. No. 3, 12, 16, 20. Mit je 60 phot. Abbildungen. Kart. je M 1000
Gräßner, Eier der Vögel Mitteleuropas. 3. Aufl. in losen Bogen Fehlt Tafel 13. Seltenheit! M 30000
Grünhaldt, Künstliche Geflügelzucht. Mit 11 Holzschn. (1885.) M 2000
Hagen, Deutsche Vogelwelt und ihr Standort. Ein Exkursionsbuch z. Kennenlernen der Vögel Mit 4 Doppeltaf in, 74 Abbildungen. Kart. M 4000
Hahn, Der Pilzsammler. Mit 32 Farbentaf (1903.) In Lwd. gebd. M 8000
Hennicke, Vogelschutzbuch. Mit 8 einfarb Tafeln In Lwd. gebd M 3000
Homeyer, v., Ornithologische Briefe. (1881.) Seltenheit! Brosch. M 9000
Kisch, Seross rpflege. Mit 1 schwarzen Tafel und 1 Abbild. Brosch M 1000
Lauener-Große, Kat. der Kanarie-zucht. Mit vielen Abbildungen. (1895.) In Lwd. gebd. M 3000
Naumann. Naturgeschichte der Vögel. Bd. I, 1 (enthaltend zum größten Teil Drosselvögel). Mit sämtl. Tafeln. Roh M 10000
— — Ausgabe B (enthaltend ca. 400 Tafeln ohne Text in Original-Mappe). Seltenheit! M 100000
— — Bd IV. Mit sämtlichen Tafeln. Brosch. M 35000
— — Bd. X. Mit sämtlichen Tafeln. Roh M 30000
— — Bd. XII. Mit sämtlichen Tafeln. Brosch. M 35000
— — Bd. XII. Mit sämtlichen Tafeln. In Orig.-Halblwd. gebd. M 40000
Rohweder-Naumann, Schnepfen. (Sonderdruck.) Mit sämtlichen Tafeln. In Orig.-Halblwd. gebd. M 10000
(Sämtliche Naumann-Bände komplett, ganz tadellos erhalten und Seltenheit u!)
Neunzig, Einheimische Stubenvogel. Mit 22 farb. Tafeln und 189 Abbild. Brosch. M 18000 (1922.)
— — Mit 22 farb. Tafeln u. 189 Abbild. (1922.) In Ganzlwd. geb. M 23000
— — Mit 20 farb. Tafeln und über 200 Abbild. (1913.) In Halblwd. gebd. M 20000
— **Fremdländische Stubenvögel.** Mit 42 farb. Tafeln und über 400 Abbild. (1921.) Brosch. M 35000
Raabe, Aus unsers Herrgotts Kanzlei. Histor. Roman. (1922.) Einband defekt. In Halblwd. gebd. M 6000
Radde, Ornis caucasica. Mit 26 farb. Tafeln u. 1 Karte. (1884.) Tadellos erhalten. Seltenheit! In Halbleder gebd. M 80000
Rausch, Gefiederte Sängerfürsten. 2. Auflage. Mit 3 farb. Taf u. 16 Abb. Tadellos erhalten. Gebd. M 5000
Reichenow, Vögel. Bd. I und II. Mit 1 Karte und 185 Abbild. Tadellos. Brosch. M 20000
Rey, Eier der Vögel Mitteleuropas. 1500 Abbildungen auf 128 Farbentafeln. 2 Bände. (1912.) Tadell s. Seltenheit! Gebd. M 70000
Riesenthal, Raubvögel Deutschlands. Mit Atlas, enth. 60 farb. Tafeln. Sehr gut erhalten. Seltenheit! Gebd. M 40000
Robert, Gefiederte Freunde. Bd. I und II. Mit 40 farb. Tafeln. Tadellos erhalten. Seltenheit! In Folio gebd. M 35000
Ruß, Amazonen. Mit 21 Abbildungen. (1914.) Kart. M 2500
— — Mit 1 farbigen, 7 schwarzen Tafeln und 3 Abbild. (1896.) Gebd M 3000
— **Bilder aus der Vogelstube.** Mit 4 Holzschnitten. (1885.) Brosch. M 2000
— **Brieftaube.** Mit 12 Holzschnitten. Brosch. M 1000
— **Handbuch.** Bd. II: Einh. Stubenvögel. Mit 24 schwarzen Tafeln. Fehlt S. 193/19 (enthält u. a. Vogelfang). (1892). Selten! Gebd. M 10000
— **Fremdländische Stubenvögel.** Bd. II: Weichfresser. Mit 10 farb. Tafeln. In Halbleder gebd. M 50000
— — Bd. IV: Lehrbuch d. Stubenvogelpflege. Mit 2 farb. Tafeln u. 96 Abbild. Seltenheit! In Halbleder gebd. M 100000
— **Graupapagei.** mit 1 farb. Tafel und 3 Abbild. (1896.) Kart. M 1000
— **Huhn als Nutzgeflügel.** Mit 16 schwarzen Tafeln und 32 Abbild. (1894. In losen Bogen M 1000
— **Kanarienvogel.** In verschiedenen Auflagen. Kart. bzw. gebd. je M 2·00
— **Sprechende Papageien.** Mit 2 farb. Taf. u. vielen Abbild. Gebd. M 4000
— **Vogelzuchtbuch.** Mit 30 Abbild. (1891.) Brosch. M 2000
— **Wellensittich** Mit 1 Vollbild und 14 Abbild. (1893.) Brosch. M 1500
Schlag, Dompfaff. Mit 1 Tondruck- und 1 Schwarzdruck-Tafel. (1910.) In losen Bogen M 1000
Schüz, Vogelbüchlein. Mit 6 farb. Tafeln und vielen Abbildungen. (1922. Gebd. M 300
Storch, . . . aber der Wagen rollt. Allerlei Humor und Ernst von de Lebensfahrt. Gebd. und ohne Decken M 200
Voegler, Präparator und Konservator. Mit vielen Abbild. Brosch. M 300
Weinkauf, H. C., Conchylien des Mittelmeers. Bd. I. (1867.) Seltenheit Gebd. M 1000

Preise und Lieferbarkeit freibleibend!

Versand erfolgt nur gegen Voreinsendung des Betrages oder unter Nachnahme. Versendungsspesen und Porto werden, wenn nicht beigefügt, durch Nachnahme erhoben. Nach dem Ausland liefern wir nur mit Valutazuschlag nach vorheriger Vereinbarung.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg
Postscheckkonto: Magdeburg 3148 **Postschließfach 148**

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Hermsdorf bei Berlin; für den Anzeigenteil: Franz Wunderlich, Magdeburg, Postschließfach 148.
Verlag der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck: August Hopfer, Burg Bz. Mgdbg.

Jahrgang LII.
Heft 8. 19. April 1923.

Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Die Gefiederte Welt gelangt am Donnerstag nach dem 1. u. 15. jedes Monats zur Ausgabe und kostet für Monat April 750 Mark. Einzelpreis des Heftes 400 Mark.
Auslandspreis für das Vierteljahr 2 Schweizer Franken, für das Heft 0,35 Schweizer Franken.
Inserate für die folgende Nummer müssen bis spätestens Freitag früh in Händen der Verlagsbuchhandlung sein.
Die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 10 Pfg. Grundpreis berechnet, der mit der vom „Börsenverein der Deutschen Buchhändler" von Zeit zu Zeit bestimmten Teuerungszahl zu multiplizieren ist. Die Teuerungszahl ist zurzeit „2500". — Auslandspreis für die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum —,10 Schweizer Franken.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung (M. Kretschmann) in Magdeburg.
Postschließfach 148. Postscheckamt: Magdeburg 3148. Fernsprecher: 1323.

Zur Farbenzucht der Wellensittiche.

Von Dr. Braune.

(Nachdruck verboten.)

In Nr. 16 des vorigen Jahrganges dieser Zeitschrift richtet Herr Lichtenstädt an alle Wellensittichzüchter, die sich mit der Farbenzucht beschäftigen, die Bitte, ihre Erfahrungen hier zu veröffentlichen. Nun bin ich zwar augenblicklich leider weder Wellensittichzüchter, noch habe ich überhaupt schon Farbensittiche gezüchtet; meine züchterischen Erfahrungen jedoch auf verwandten Gebieten könnten vielleicht dem einen oder anderen Züchter bei seinen Versuchen von Nutzen sein, und so mögen bei Beginn der neuen Zuchtperiode einige Ausführungen zur Farbenzucht hier Platz finden.

Inzwischen sind mir auch die für unser Thema sehr wertvollen Ausführungen von O. Freytag, Wiesbaden, im Jahrbuch 1922 der A. Z. über „Farbenwellensittiche" bekannt geworden, dessen Angaben ich hier mit verwertet habe.

Als rein persönliche Bemerkung möchte ich nur vorausschicken, daß weder die gelben noch die blauen Wellensittiche, die ich bisher zu sehen Gelegenheit hatte, mich zu ihrer Anschaffung begeistern konnten. Die naturfarbenen grünen sind mir immer noch als die schöneren erschienen, aber dies ist natürlich Geschmackssache.

Besonderes Interesse gewinnen diese Farbenspielarten aber vom züchterisch wissenschaftlichen Standpunkt aus wegen der dabei zu beobachtenden Vererbungserscheinungen. Ob die hier in Betracht kommenden Fragen bereits vollständig geklärt sind, entzieht sich meiner Beurteilung, da mir die betreffende Literatur nicht zur Verfügung steht.

Wer mit Neuzüchtungen sich befassen und dabei nicht gänzlich im Dunkeln tappen will, wird gut tun, sich wenigstens einigermaßen mit den durch Mendel entdeckten Vererbungsgesetzen und den darauf begründeten weiteren Forschungsergebnissen bekannt zu machen. Er wird rascher die voraussichtlich erfolgversprechenden Wege erkennen und sich vielleicht jahrelange aussichtslose Versuche ersparen.

Da ich eine Reihe von Jahren nicht mehr Abonnent und Leser der „Gefiederten" gewesen bin, ist mir nicht bekannt, ob und welche Artikel über die Mendelsche Entdeckung hier erschienen sind und was deshalb bei den Lesern als bekannt vorausgesetzt werden darf. Eine ausführliche Darstellung des in Frage kommenden Stoffes ist hier ausgeschlossen; eine kurze Zusammenfassung der gerade für unser Thema in Betracht kommenden Fragen scheint aber des allgemeinen Verständnisses wegen und besonders in Rücksicht auf neu hinzugekommene Leser, denen diese Vorkenntnisse vielleicht noch fehlen, wohl geboten.

Das Wesentliche der Mendelschen Entdeckung besteht in der Erkenntnis, daß bei der zweigeschlechtlichen Fortpflanzung das neu entstehende Individuum nicht, wie man früher annahm, aus einer völligen Vermischung der beiden elterlichen Keimzellen bzw. der in diesen enthaltenen zahlreichen Erbanlagen hervorgeht, sondern gewissermaßen nur aus einer Art Vermengung, so daß sich die zusammengehörenden elterlichen Anlagen, z. B. die für eine bestimmte Färbung, zwar zusammenfinden und gewissermaßen aneinanderhaften, aber nicht wirklich sich vermischen oder zu einer gänzlich neuen, von den beiden elterlichen verschiedenen Anlage verschmelzen.

Zu dieser Erkenntnis gelangte Mendel bei seinen mit ungeheurem Fleiß und Geduld über viele Jahre und durch zahlreiche Generationen hindurch fortgesetzten Kreuzungsversuchen durch die Beobachtung, daß bei den Nachkommen der ersten Generation scheinbar verschwundene Merkmale der Eltern in der zweiten

Generation plötzlich, und zwar in bestimmter Regelmäßigkeit und gänzlich unverändert, wieder auftraten. Es zeigt sich ein richtiges Wiederaufspalten der elterlichen Anlagen, so daß man auch von den „Mendelschen Spaltungsregeln" spricht. Mendel experimentierte zwar ausschließlich mit Pflanzen, in der Hauptsache mit Erbsen, es hat sich aber gezeigt, daß diese Regeln auch bei Tieren ganz in gleicher Weise Geltung haben.

Diese ganz auffallende Erscheinung, daß von den beiden zusammengehörenden Merkmalen der Eltern bei den Nachkommen zunächst nur das eine in Erscheinung tritt, während das andere völlig verschwindet, bezeichnet schon Mendel als Dominanz und Rezessivität. Das rezessive Merkmal bleibt in der ersten Generation völlig verborgen, latent, erst in der nächsten tritt es wieder auf und dann völlig rein und unverändert. Die praktischen Beispiele werden diese Verhältnisse am besten klarstellen.

Mendel kreuzte z. B., auf ihre Reinheit vorher genau geprüfte, rotblühende Erbsen mit weißblühenden. Die erste Generation ergab nur rotblühende Pflanzen, die sich von den elterlichen rotblühenden zunächst in keiner Weise unterschieden. Bei der Weiterzucht zeigte sich aber ein großer Unterschied. Während die elterlichen rotblühenden ausschließlich rote Nachzucht gaben, fielen von diesen rotblühenden Kreuzungsprodukten sowohl rot- als auch weißblühende, und zwar, wie sich bei größeren Zahlenreihen zeigte, stets im Verhältnis von 3 roten auf 1 weiße. Und es zeigte sich ferner die Eigentümlichkeit, daß diese weißen, obgleich sie doch von roten stammten, ausnahmslos nur wieder weißblühende Nachzucht geben, während die roten sich verschieden verhielten, und zwar so, daß von 3 roten die eine gleichfalls ausschließlich rotblühende Nachzucht gab, sich also als rein erwies, während die beiden andern in gleicher Weise wie die erste Kreuzungsgeneration in rot- und weißblühende Pflanzen wieder aufspaltete, und zwar im gleichen Verhältnis von 3 : 1, wobei auch hier wieder sowohl die roten als auch die weißen Pflanzen sich genau so verhielten wie die der zweiten Kreuzungsgeneration. Die richtige Erklärung für diese Erscheinung gefunden zu haben, nämlich daß die elterlichen Anlagen in den Keimzellen der Nachkommen sich nicht vermischen, sondern nur zusammengelagert sich rein erhalten, ist das unsterbliche Verdienst Gregor Mendels.

Ein einfaches Schema wird diese für alle Vererbungsvorgänge grundlegenden Verhältnisse am einfachsten klar machen. Die Anlagen für ein bestimmtes Merkmal in den Keimzellen der Eltern sollen durch kleine Vierecke dargestellt werden, in unserem Beispiel der roten und der weißblühenden Erbsen für erstere durch schraffierte, für letztere durch leere. Jedes Individuum nun hat, wie wir annahmen, in seinen Keimzellen für jedes Merkmal eine doppelte Anlage, die eine vom Vater, die andere von der Mutter stammend. Schematisch dargestellt gibt dies also zwei zusammenhaftende schraffierte Vierecke für die rotblühenden, zwei leere, hier also weiße Vierecke für die weißblühenden. Beim Befruchtungsvorgang nun fallen diese auseinander, sie spalten auf, und damit sind für die Entstehung und Zusammensetzung des neuen Individuums vier Möglichkeiten gegeben: die eine väterliche rote Anlage kann sich sowohl mit der einen als auch mit der andern weißen mütterlichen verbinden und ebenso die zweite väterliche. Das Ergebnis ist in allen vier Fällen das gleiche: eine Verbindung von rot mit weiß. Da im Falle unserer Erbsen rot aber dominant, weiß rezessiv ist, so werden alle 4 Exemplare rotblühend sein. Schematisch ausgedrückt also:



Ganz anders wird das Ergebnis aber, wenn man diese unreinen roten sich gegenseitig befruchten läßt. Das Schema zeigte sofort das Resultat:



Die Pflanzen an den beiden Enden sind gleichartig zusammengesetzt (homozygot) und züchten deshalb auch rein weiter, die beiden mittleren verschiedenartig (heterozygot) und spalten in der Weiterzucht demgemäß wieder auf.

Den Beweis für die Richtigkeit dieser Erklärung erhält man, wenn man ein solches Kreuzungsprodukt mit seiner Stammart wieder kreuzt. Schematisch dargestellt wäre das Ergebnis folgendes:



Der praktische Versuch hat die Richtigkeit dieser Annahme dann ausnahmslos ergeben.

Weitere Forschungen haben aber gezeigt, daß die Erscheinung der Dominanz und Rezessivität bei Kreuzungen keineswegs immer auftreten. Kreuzt man z. B. die rotblühende mit der weißblühenden Wunderblume (Mirabilis Jalapae), so blüht die erste Kreuzungsgeneration ausnahmslos rosa. Diese rosablühenden geben in der Nachzucht aber sowohl rosa als auch weiße und rotblühende Nachkommen, und zwar im gleichen Verhältnis wie bei den Erbsen auf 1 rote und 1 weiße, die beide in der Nachzucht sich als rein erweisen, 2 rosablühende Pflanzen, die ihrerseits genau in gleicher Weise wieder aufspalten. Hier also sind die reinen Exemplare von den Kreuzungen sofort im Aussehen zu unterscheiden, indem letztere eine Zwischenform darstellen. Äußerlich zwar täuscht die rosablühende Zwischenform eine wirkliche Vermischung vor, das Wiederauftreten der ursprünglichen rot- bzw. weißblühenden Stammformen jedoch in den weiteren Generationen zeigt sofort, daß in den Keimzellen die Anlagen sich trotzdem rein erhalten haben.

Diese Art des Mendelns bezeichnet man als intermediäres, im Gegensatz zum alternativen, wobei entweder das eine oder das andere elterliche Merkmal dominiert. (Schluß folgt.)

Sprosser und Nachtigall.

Von J. Birk, Leipzig.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Ein Liebhaber in unserer Mitte sagte dereinst, die meisten Vögel im Käfig gehen an Unterernährung zugrunde, nur zum Teil, wir wollen aber besser sagen Abzehrung, aber bedeutend mehr unserer Stubenvögel fressen sich an den Fleischtöpfen Ägyptens, die ihre Pfleger für sie täglich aufstellen, zu Tode. Ein Nichtzuwenig, ein Nichtzuviel führt in der Fütterung stets zum Ziel, darum beobachtet den Körperzustand, es ist dies das Futterqualitäts- und -quantitätsbarometer für den Pfleger, es sagt ihm, wieviel und was er seinen Lieblingen füttern soll; eine genaue Kontrolle in diesem Punkte könnte manchen Vogel vor der Auszehrung sowie der Fettsucht retten. Das Auge des Liebhabers gewinnt bei längerer Praxis einen derartigen Scharfblick für die Abweichungen vom normalen Zustand des Vogels, daß er sofort merkt, wenn etwas nicht stimmt; ein Feststellen des Gewichts mit einer Wage habe ich noch nie gemacht und halte es auch nicht für nötig. Hat ein Liebhaber noch nicht den Kennerblick für das normale Aussehen eines Vogels, so tut er am besten, er untersucht von Zeit zu Zeit, ganz besonders im Herbst und Winter, den Körperzustand seiner Vögel, indem er sie aus dem Käfig langt; es ist dies zwar eine für den Liebhaber unangenehme Beschäftigung, bewahrt ihn aber vor manchem Verlust. Die Blankfütterung überwinterter Sprosser und Nachtigallen mit frischen Ameisenpuppen ist nicht unbedingt nötig, da dieselben auch mit Mischfutter gefüttert fleißig singen; selbstverständlich mit der nötigen Mehlwurmgabe bis zu 15 Stück, wenn die Vögel im feurigen Schlag sind. Man kann auch neben dem Mischfutter täglich als Beifutter einige frische Puppen geben, doch menge man dieselben niemals unter das Weichfutter, da sonst die Vögel im Futter wählerisch werden, indem sie nach den Ameisenpuppen suchen und das Futter rechts und links aus dem Napfe schleudern. Man kann auch einige Ameisenpuppen, wenn man sie nicht separat füttern will, oben auf das Futter legen. Die größte Vorsicht erfordert die Einfütterung resp. Gewöhnung an frische Ameisenpuppen von überwinterten Sprossern und Nachtigallen, da gerade beide Vogelarten sehr leicht bei zu rascher Darreichung von frischen Puppen und in zu großen Mengen in die Mauser kommen und die Vögel für diese Gesangsperiode dann verloren sind, auf Schlag ist nicht mehr zu rechnen. Der Schlag von überwinterten Sprossern und Nachtigallen setzt vielfach schon im Dezember ein, und dies ist auch die schönste Zeit. Frischfänge lassen im ersten Jahre meistens etwas länger mit dem Schlage warten, es gibt auch überwinterte Vögel, die ebenfalls hartnäckiger sind und erst im Januar oder Februar in den Schlag kommen. Außer der Gesangsperiode, die beim Käfigvogel meistens von Januar bis zur Mauser geht, singen ebenfalls ab und zu Sprosser und Nachtigall; manchmal beginnt ein Vogel bald nach der Mauser wieder mit dem Schlag. Derartige entartete Schläger habe ich nicht gerne, da dieselben vielfach nur halblaut stümpern, und wenn man denkt, jetzt beginnt die eigentliche Gesangsperiode, dann haben sich die betreffenden Vögel im Gesang bereits ausgegeben. Vielfach kommt bei derartigen Vögeln eine Verschiebung der Gesangs- und Mauserperiode vor, was ich nicht liebe, denn normal halte ich, wenn ein Vogel gegen Weihnachten mit dem Gesang beginnt und bis zur normalen Mauserzeit im Feuer durchschlägt. Wie verpflege ich nun meinen Sprosser oder Nachtigall, um recht lange in den vollen Genuß ihres schönen

Gartenrotschwanz.

Schlages zu kommen. Diese wichtige Frage läßt sich beim besten Willen nicht nach einem Schema festlegen, sondern muß von Fall zu Fall, d. h. von Individuum zu Individuum durch eingehende Beobachtung studiert werden. Man müßte sich eigentlich sagen, wenn ein Vogel einer Art bei irgendeiner Futtermischung gedeiht, normal und lebhaft bleibt und fleißig singt, daß nun jeder Vogel derselben Art zur Freude des Liebhabers gedeihen muß. Aber weit gefehlt, es machen sich manchmal bei einem Vogel Eigenschaften in körperlicher Hinsicht geltend, die qualitativ sowie quantitativ eine Futterumstellung notwendig machen. Ein Vogel bleibt beim besten Futter normal, ein anderer etwas zu mager, ein dritter wieder mästet sich ein Bäuchlein an, trotzdem es die Vögel einer Art sind. Vor allem kommt es mit darauf an, wie ein Vogel frißt, der eine leert seinen Napf aufs sauberste, ein anderer verbraucht von demselben Futterquantum kaum die Hälfte, ein dritter wieder ist wählerisch im Futter, sucht sich gewisse Bestandteile heraus und vergeudet viele Futterstoffe auf dem Käfigboden. Da liegt es nun beim

Liebhaber, regulierend einzugreifen, dabei darf er aber nicht in schnellen Wechsel in Menge sowie Beschaffenheit des Futters verfallen, denn es könnte schlimme Folgen zeitigen. Die im Handel befindlichen sogenannten Universalfutter sind mit großer Vorsicht zu prüfen, ehe sie in den Speisezettel eingefügt werden, denn es gibt mit wenigen Ausnahmen auch sehr viel Schund und obendrein ist er noch übermäßig teuer.

(Schluß folgt.)

Der Innenflugraum.

Von Alfred Troschütz, Hannover.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Die größte Anziehungskraft des Flugraums bildet naturgemäß seine Bevölkerung. Wie mannigfaltig und vielseitig diese sein kann, will ich möglichst kurz schildern, und dabei zugleich die besonderen Erfahrungen bekanntgeben, die ich mit einzelnen Vogelarten gemacht habe. Da ich voraussetzen kann, daß die Leser der „Gef. Welt" die Werke von K. Neunzig, „Einh. und fremdl. Stubenvögel" besitzen, sind gewisse Beschreibungen des betr. Vogels unnötig, denn mit Ausnahme des Indischen Rotschwanzes und des Mittelindischen Buchschmätzers (Cercomela fusca) sind alle genannten Arten in beiden Werken beschrieben und abgebildet. Wenn manche Vögel, wie Steinsperling, Schwarzkehlchen, viele Ammerarten, Brach- und Wasserpieper, Rohrsänger u. a. nicht erwähnt werden, so besagt das nur, daß es mir in langen Jahren nicht möglich war, Stücke davon zu beschaffen. Die Tauglichkeit für die Vogelstube ist damit nicht verneint. Dagegen habe ich Drosseln, Stare, Würger u. a. ob der Unverträglichkeit oder ob des zu starken Schmutzens mit Absicht nicht gepflegt. Sprosser: Vor zehn Jahren 2 Stücke $1^1/_2$ Jahre gepflegt. Ungemein gierig nach Mehlwürmern. Bekamen geschwollene Füße und gingen ein. Kein Gesang. Kaum geeignet! Nachtigall: Hin und wieder im Flugraum gehalten. Munter und beweglich. Zankte sich mit Blaukehlchen und Rotschwanz. Kein Gesang. Jetzt nur noch im Einzelkäfig. Weißsterniges Blaukehlchen: Mein besonderer Liebling! Zahmer, ungemein kluger Vogel, beweglich, von schöner Haltung, stets tadellos im Gefieder. Seit sechs Jahren im Flugraum, vorher etwa vier Jahre von Herrn Greite, Hannover, gepflegt. Der etwa 11 Jahre alte Vogel zeigt noch ein schönes Hellblau der Brust, natürlich nicht das prächtige Blau des dreijährigen Frischfangs. Zankt sich gern mit Rotkehlchen und Hausrotschwanz und weißer Bachstelze. Geht auf diese mit ausgebreiteten Flügeln und gesenktem Kopfe, mehr spielend als ernsthaft, los. Prächtiger Vogel für den Flugraum. Rotkehlchen: Sehr haltbar, niedlich, aber nicht immer verträglich. Habe schon zwei Männchen zusammengehalten, aber schließlich brachte der eine den andern um. Paarweise Haltung zu empfehlen. Gartenrotschwanz: Schöner Vogel, wundervoller Flieger. Zänkisch. Bei der Eingewöhnung oft schwierig, besonders bei jungen Vögeln. Im Futter dürfen getrocknete Ameisen nicht fehlen. Mein prachtvoller „Weißkopf" war in drei Tagen eingewöhnt. Bringt es fertig, während ich Mehlwürmer auf einem Blatt Papier aussuche, solche mit einem Schwung, ohne abzusetzen, unter den Fingern wegzuholen. Geeignet. Wenig ausdauernd. Hausrotschwanz: Seit Frühjahr pflege ich ein junges Weibchen, das sehr gewandt ist. Weißkopfschmätzer: Schöner Vogel mit allen Eigenschaften seiner europäischen Verwandtschaft, aber von noch größerer Beweglichkeit. Leider nur drei Jahre gepflegt. Braunkehlchen: Allerliebster Vogel. Eine Zierde der Vogelstube. Gewandt, zierlich, klug, oft mit der Verwandtschaft hadernd, beide Männchen manchmal aufeinander losfahrend. Netter Gesang. Merkwürdigerweise haben meine Braunkehlchen eine Zeitlang unter dem Haß der Schama gelitten. Es hat Jahre gedauert, bis diese ihre Abneigung gegen die braunkehligen Wiesenschmätzer verloren hat. Steinschmätzer: Ein Jahr lang ein Paar gepflegt. Scheu, vorsichtig, äußerlich immer tadellos. Hielten sich stets unten auf dem Boden auf. Verschenkt. Geeignet. Steindrossel: Ein aufgezogenes Stück acht Jahre lang gepflegt. Von der Schama umgebracht. Vermisse das prachtvolle Tier noch jetzt. Klug, etwas phlegmatisch, aber immer wie aus dem Ei gepellt, wenig Gesang, aber gesunden Appetit, sehr verträglich. Für den Flugraum besonders gut geeignet. Blaudrossel: Vor zehn Jahren zwei Stücke gepflegt, eins etwa $2^1/_2$ Jahre. Unbändig scheu und ängstlich, selbst nach mehr als zweijähriger Pflege. Kein Gesang. Verträglich. Geeignet?? Heckenbraunelle: Ruhiger, anspruchsloser Vogel, der sich im Flugraum ziemlich versteckt hält. Geeignet. Alpenflühvogel. Ungemein liebenswürdiger Vogel mit sehr ansprechendem, meist bei Licht vorgetragenem Gesang. Das dichte Gefieder immer gut im Stande. Hält sich fast nur oben auf dem Laufbrett auf. Paar hält zusammen. Seit sechs Jahren in der Vogelstube. Fußpflege bedarf besonderer Sorgfalt. Größere Steine müssen vorhanden sein. Hielt bei mir die durch einen kranken Fuß nötig gewordenen Pinselungen mit geradezu rührender Geduld aus. Sehr zu empfehlen. Zaunkönig. Nicht geeignet. Der kleine Kerl wurde bald so habgierig nach Mehlwürmern, daß er sie sogar dem Steinrötel aus dem Schnabel riß. Folge: Schlaganfall. Ein Männchen drang durch die Gitter eines Käfigs zu dem dort gepflegten Weibchen und brachte es um.

(Fortsetzung folgt.)

Vogelausstellung des Bayer. Vogelliebhabervereins, des Verbandes der deutschen Farben-, Gestalts-, Bastardkanarien- und Exotenzüchter und der Weltbundesgruppe Oberbayern der Kanarienzüchter und Vogelfreunde in München vom 24.—28. Dezember 1922 im „Hirschbräukeller", Bayerstraße.

Von Leopold Keidel, München.

(Nachdruck verboten.)

Wieder sind bewegte Tage verrauscht und ein würdiger Abschluß des Vereinsjahres ist in den Annalen des Bayer. Vogelliebhabervereins zu buchen gewesen. Freilich konnte der Verein nicht selbst so ein großes Unternehmen wagen und mußte mit der Weltbundesgruppe Oberbayern und dem Verbande der deutschen Farben-, Gestalts-, Bastard-

kanarien- und Exotenzüchter Hand in Hand gehen, aber was geschaffen wurde, erfreute das Herz jedes Vogelfreundes, und wurde die Ausstellung auch durch langatmige Artikel in der Presse gewürdigt. Von Nah und Fern kamen Anhänger und waren all des Lobes voll über das Gebotene. Leider war das Lokal für die reiche Auswahl der Schauobjekte doch zu klein bemessen und waren die einzelnen Abteilungen — gerade die Schau- und Zugstücke — räumlich sehr beschränkt. Die drei ausstellenden Vereine ließen auch in der Tat an Opferwilligkeit nichts zu wünschen übrig, obwohl die Vorbereitungen, wie Volieren- und Käfigtransport usw., sich unter den heutigen Verhältnissen sehr schwierig gestalteten. Besonders hervorzuheben wäre auch der Katalog, der mit einem farbigen Umschlagbild von Hans Lindl, einem bekannten Münchner Künstler, dem ganzen Unternehmen schon ein künstlerisches Gepräge gab, wie auch die Dekoration des Lokals, der Ehrentempel usw., den Ausstellern auch alle Ehre machte. Neben den Gesangskanarien der Weltbundesgruppe Oberbayern, die in der stattlichen Anzahl von zirka 80 Kollektionen um die Siegespalme stritten, war es der deutsche Verband der Farben-, Gestalts-, Bastardkanarien- und Exotenzüchter, der mit Schautieren den allgemeinen Beifall des besuchenden Publikums auslöste. Da waren es besonders Holländerkanarien, die in ruhiger, selbstbewußter Würde, mit steifen Beinen und vorgestrecktem Köpfchen den Strom der Besucher an sich vorübergleiten ließen. Leider ist dieser Sportszweig auf dem Aussterbeetat —, aber mit Genugtuung können wir feststellen, daß gerade München es ist, das die letzten Holländerkanarienzüchter in seinen Mauern beherbergt. Weiterhin sind es die Münchener Gestaltsfarbenkanarien, eine neue Spezies, die ebenfalls eine Münchener Zuchtrichtung ist, und deren Züchter sich im deutschen Verbande zusammengeschlossen haben. Wenn das Unternehmen auch noch jung ist, so wird doch zielbewußte Arbeit geschaffen, und hoffen wir, bald den Engländern in der Figuren- und Farbenzucht den Rang streitig zu machen. Auch Bastarden- und Gesangsfarbenkanarien waren zu sehen, die in allen Farben und Schattierungen, wie schiefergrau, weißbunt, silberbraun usw., neben dem Allgelb vorteilhaft abstachen. Eine eigene, vielseitige Gruppe bildeten die Exoten. Außer den bekannten Arten, wie Wellensittiche, Mövchen, Bandfinken, Zebra- und Schmetterlingsfinken, waren auch die Widafinkenarten, Malabarfasänchen, Muskatfinken, Webervögel, Kardinäle usw. zu sehen und bildeten in ihrem Artenreichtum ein farbenfrohes Bild. Hervorzuheben sind in dieser Sparte ebenfalls die Mitglieder des deutschen Verbandes, die weder Zeit noch Mühe scheuten, die Ausstellung zu bereichern und zu verschönern. Wir wollen nicht mit der Gruppe abschließen, ohne der Papageien zu erinnern, besonders war es ein Graupapagei und eine Rotbugamazone, die, in prachtvollem Gefieder, in prunkenden Messingkäfigen, den Ehrentempel zierten. Die dritte Abteilung, immer am dichtesten belagert, war das Bereich des Bayer. Vogelliebhabervereins. Manche Bewunderung konnte man hören und unwillkürliche Ahrufe ertönten aus der drangvollen Enge. Es war aber auch ein Bild der Liebe und Freude der Vogelliebhaberei, und was dort zu sehen war, gereichte jedem Aussteller zur Ehre. Besonders glänzte, wie gewohnt, natürlich als Matador Herr Schimang mit einer prachtvoll ausgestatteten Voliere, einem großen Laufstand und sonstigen Käfiggarnituren, die aber leider durch den Raummangel nicht die nötige Wirkung entwickeln konnten. Rühmlich zu nennen wäre auch Herr Rosenberger sen. mit zwei Salonkäfiggarnituren, die außerordentlich imponierten, ebenso die Herren Flierl, Kurz, Kleinschwärzer, Thürwinke, John usw.,

Weißkopfschmätzer.

die alle mit ihrem eigenen, sehr schönen Käfigmaterial das Ganze verschönern halfen. An einheimischen Vögeln war ebenfalls der Artenreichtum weitgehendst berücksichtigt. Neben den Grasmückenarten, besonders die Gartengrasmücke, die von jeher der Lieblingsvogel des Münchener Liebhabers, waren es auch die Erdsänger, wie Sprosser, Nachtigall, Haus- und Gartenrotschwanz, Blau- und Rotkehlchen, die in mehreren Exemplaren vertreten waren. Außer Finken, Ammern, Drosseln, Piepern war auch ein Steinrötel, eine Wiesenralle, Heide-, Hauben- und Feldlerchen, eine Wachtel, eine Eule, ein Star, ein Turmfalke, eine Dohle und zwei Eichelhäher zu nennen. An Fremdländern stehen eine Schama- und eine Amerikanische Spottdrossel an der Spitze, ebenso waren auch die mit Exoten aller Arten bevölkerten Flugkäfige der Herren Schimang und Rosenberger jun. prächtige Schaustücke. Ersterer war außerdem noch mit einer ganzen Mövchenkolonie, zum Teil mit Jungen oder auf Eier sitzend vertreten. An Ausstellern von einheimischen Vögeln teilen sich in die

Ehre die Herren Lang, Flierl, Rosenberger sen., Kurz, Ruttmann, Moser, Schimang, Wagenbauer usw., und boten die Tiere in ihrer tadellosen Verfassung ein erfreuliches Zeichen von dem hohen Stande der Vogelliebhaberei und -pflege in München. An Kanarien ist Herr Ziegler anzuführen, der mit je einem Paar Münchener Gestaltsfarben-, Holländer- und Goldkanarien aus seiner Spezialzucht die Ausstellung beschickte und dadurch seinen guten Zuchtruf nur noch mehr befestigte. Gruppe folgte auf Gruppe, Bild auf Bild, und der Besucher kam voll und ganz auf seine Rechnung. Wenn auch der materielle Erfolg kein großer war, gehen doch die Ausgaben im Verhältnis zu den Einnahmen ins Schwindelhafte, so war der moralische Erfolg um so größer. Haben wir doch dem Münchener Publikum gezeigt, daß wir trotz der uns auferlegten Härten, trotz der hohen Futterpreise und Anschaffungskosten für Käfige usw. treu zu unseren liebgewordenen Stubengenossen halten, und hoffen wir, durch die wiederholte Ausstellung endlich den Köhlerglauben aus der Welt zu schaffen, daß der Vogel sich in der Gefangenschaft unglücklich fühlt. Traf ich doch beim Durchwandern der Käfiggruppen einen alten gefiederten Bekannten, der schon bei der Ausstellung 1912 im Schrannenpavillon durch seine Anwesenheit glänzte — und heute nach zehn Jahren nochmals als Veteran, aber munter und fidel, seine lustigen Weisen plauderte. Das spricht mehr wie alle Worte — und wenn die Ausstellung in diesem Sinne aufklärend gewirkt hat, hat sie ihren Zweck vollauf erfüllt.

Aufruf zur Gründung der Vereinigung der Vogelliebhaber Deutschlands — Reichsverband.

Deutsche Stammesbrüder!

Von den Landesverbänden Preußen und Sachsen sind die Grundpfeiler für das große Werk des Zusammenschlusses aller Vogelliebhaber Deutschlands errichtet worden. Stark und gefestigt im inneren wie im äußeren Ausbau stehen sie als Wahrzeichen vor aller Welt bereit, den deutschen Einigungsgedanken zu verkünden. Sie haben bewiesen, daß in ihnen der Geist ernster Männer tief verankert liegt und daß sie berufen sind, die Geschicke unserer edlen Bestrebungen mit eiserner Energie und unbeugsamer Kraft in nie versiegendem Eifer anzufassen, um Taten zu schaffen, die einst als Marksein in der Geschichte deutscher Vogelliebhaberei einen hohen und hehren Widerhall finden werden. Aus den Landesverbänden soll als Krone dieser beiden neuzeitlichen Schöpfungen der Reichsverband hervorgehen. Damit stehen wir am Wendepunkte einer neuen Ära, deren Motive in dem Schaffensdrange nach einer festgefügten Organisation zu suchen sind. Deutsche Liebhaber und Vereine, jetzt zeigt, daß Ihr Stolz und Würde in Eurem Herzen tragt und bestrebt seid, an dem Aufbau unser aller Interessen mitzuarbeiten und die Sache über die Person zu stellen wißt. Bekundet den festen und aufrichtigen Willen durch Euren geschlossenen Beitritt zu den unterzeichneten Vereinigungen, damit wir als ein wohlgeordnetes Ganze zeigen können, daß wir nur eines Sinnes, Denkens und Fühlens sind. Jeder Deutsche, der Anspruch auf die Bezeichnung „Vogelliebhaber" macht, sollte nun begreifen lernen, daß er nicht mehr außerhalb unserer Vereinigungen stehen darf.

In der Einheit liegt unsere Stärke.

Vereinigung der Vogelliebhaber
Landesverband Preußen.
J. A.: Franz Nyncke, 1. Vorsitzender,
Berlin O 34, Königsberger Str. 17.

Vereinigung der Vogelliebhaber
Landesverband Sachsen.
J. A.: Johann Birk, 1. Vorsitzender.
Leipzig-Mockau, Beuthstr. 29.

Die Vorarbeiten zur Gründung des Reichsverbandes hat der preußische Landesverband in die Hand genommen. Anträge, Vorschläge und Wünsche von angeschlossenen Mitgliedern, die bei dem Statutenentwurf und später bei der Generalversammlung Berücksichtigung finden sollen, nimmt der 1. Vorsitzende des preußischen Landesverbandes jederzeit gerne entgegen.

Vereinigung der Vogelliebhaber Landesverband Sachsen.

Unsern verehrten Mitgliedern sowie allen Vogelliebhabern aus Sachsen und Thüringen nochmals zur gefl. Kenntnisnahme, daß die 1. Jahresversammlung am 28. und 29. April 1923 stattfindet. Am Sonnabend, dem 28. April, Begrüßungsabend um 8 Uhr (nicht um 7 Uhr) in Bauers Brauereirestaurant, Täubchenweg, 1/4 Stunde vom Hauptbahnhof. Vortrag vom 1. Vorsitzenden über Liebhaberfragen. Hierauf gemütliches Beisammensein. Freiquartiere stehen in genügender Anzahl zur Verfügung und werden Anmeldungen an den Unterzeichneten erbeten. Sonntag, den 29. April: Geschäftliche Sitzung um 10 Uhr vormittags in Bauers Brauereirestaurant, Täubchenweg. Tagesordnung: 1. Verlesung des Gründungsprotokolls; 2. Feststellung der anwesenden Vereinsvertreter und Mitglieder nebst Prüfung der Vollmachten; 3. Jahresbericht; 4. Kassenbericht; 5. Anträge; 6. Verschiedenes, u. a. der Plan zur Gründung der Vereinigung der Vogelliebhaber Deutschlands — Reichsverband; der Anschluß der Vereine und Vogelliebhaber Thüringens an den Landesverband Sachsen. Da der Beschluß gefaßt werden soll, den Landesverband Sachsen mit Großthüringen zu verschmelzen, so sind die Vereine und Liebhaber Großthüringens ganz besonders noch herzlichst eingeladen.

Der Vorstand. J. A.: Johann Birk, 1. Vorsitzender

Die erste Vogelausstellung in Oschatz.

Am 3. März 1923 wurde die Ausstellung von Herrn Herrmann, unserm 1. Vorsitzenden, mit einer kurzen, zu Herzen gehenden Ansprache im Beisein des Amtshauptmanns nebst Gemahlin und der Spitzen der Stadt usw. eröffnet. Dann folgte die Führung und die Erklärung der ausgestellten Objekte. Die Gründung des „Vereins für Vogelkunde, -schutz und pflege" ist noch nicht ein Jahr her und doch wurde durch fleißiges Bestreben des Vorstandes und seiner Mitglieder eine Schau zustande gebracht, die dem jungen Verein alle Ehren brachte. Herrmann hatte ja allein vor zirka 15 Jahren in Leipzig (Forkers Restaurant) eine Ausstellung mit zirka 80 Arten Vögel abgehalten, die noch manchem im Gedächtnis sein wird. So waren auch alle die, welche die Oschatzer Ausstellung besuchten, des Lobes voll, und lange Spalten in den Zeitungen rühmten diese Schau. Der Besuch war über alles Erwarten. Der Schuldirektor wollte eine Verlängerung, doch war dies unmöglich. Die Führung war wie folgt: Eine kleine Gruppe gestopfter Raubvögel, darunter ein Pärchen Sperber, die größten Räuber unserer kleinen Singvögel. Dann eine kleine Kollektion verschiedener Käfige, wo vor allem ein Reise- und Versandkäfig bewundert wurde, den Herrmann früher auf den Ausstellungen zum Transport seiner Vögel verwendete. Derselbe hat 70 Abteilungen und ist ja auch abgebildet und beschrieben in der „Ges. Welt" vom 11. Juli 1908. Ein Futterplatz für den Winter zeigte Gestelle für Park und kleine Besitzungen. Dann kamen die Bilder berühmter Ornithologen (Ruß, Brehm, Liebe usw.) in einer originellen Einrahmung, 160×170 cm groß, welches schön dekoriert war mit Lorbeerbäumen usw. Jetzt ging es zu unseren geliebten Sängern, Weich- und Körnerfressern. Lustiges Konzert war da zu hören. Ein Mitglied öffnete die Tür des Käfigs von einer Gartengrasmücke; diese flog auf dessen Finger, nahm den dargereichten Mehlwurm und flog wieder zurück in ihr Gebauer trotz der vielen Zuschauer. Ein kleines Mädchen nahm ihren Dompfaff auf den Finger, und dieser liebkoste die Kleine auf ihren Mund. Fehlende Vögel waren im Bild sehr naturgetreu zu sehen auf einer großen Tafel. In einem Glaskasten waren über 50 Eier vom Sperber verschiedener Größe und Farbe zu sehen, ebenso 1 Straußenei. Auf einem Tisch waren vor-

zügliche Futtersorten, und was sonst zur Vogelpflege nötig, ausgestellt. Unter Literatur waren hauptsächlich Werke aus der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung, Magdeburg, ausgestellt und wurden auch Werke verkauft; so z. B. auch das Buch von Neunzig, Einheimische Vögel. Von großem Wert war eine Schmetterlings- und Käfersammlung und bildete den Hauptanziehungspunkt. So war diese Ausstellung nicht allein für Vogelliebhaber, sondern für jeden Naturfreund eine wahre Befriedigung. Vogelkunde, -schutz sowie Veredelung des Gemüts sind ja auch das höchste Bestreben des Vereins.

Aus Anlaß seines 25jährigen Bestehens hatte der Verein für Vogelkunde-, schutz- und liebhaberei zu Leipzig es trotz der ungünstigen Verhältnisse wiederum unternommen, eine Ausstellung einheimischer Stubenvögel am 17. und 18. Dezember 1922 im Leipziger Kristallpalast in Verbindung mit einer Kanarienausstellung zu veranstalten. Wenn auch die Ausstellung in Bezug auf Reichhaltigkeit der Anzahl und Arten die vorjährige nicht ganz erreichte, so wird doch jeder Besucher diese mit Befriedigung verlassen haben. Der Kenner besonders mußte die — mit wenigen Ausnahmen — einwandfreie Käfigung und gute Befiederung der ausgestellten Vögel anerkennen, von denen auch ein Teil gut im Gesang war. Es waren 48 Arten und fast alle in mehreren Stücken ausgestellt, besonders erfreute es, daß in diesem Jahre auch der Sprosser wieder vertreten war. Der Besuch der Ausstellung war während des ganzen Tages ein sehr reger, natürlich zogen unsere Lieblinge aus Feld und Wald die Besucher besonders an, während den unsichtbaren Künstsängern in dunklen Singkästen nur vereinzelte Anhänger dieser Liebhaberei lauschten. „So is es äm, de Kunst wird nicht geschätzt", meinte ein biederer Kanarienfreund auf der Ausstellung. Von allen Vogelliebhabervereinen Sachsens waren Vertreter zum Besuche der Ausstellung erschienen, welche sich am Nachmittage zu einer kurzen Besprechung unter Leitung des rührigen Vorsitzenden des Leipziger Brudervereins, Herrn J. Birk, zusammenfanden, zu der auch Herr Amtshauptmann Ryssel, Leipzig, erschienen war, welcher erklärte, daß er unseren Bestrebungen wohlwollend gegenüberstehe. Der mit der Ausstellung verbundene Käfigwettbewerb hatte hinsichtlich der Einzelkäfige eigentliche Neuheiten nicht hervorgebracht. Es waren ausschließlich die den meisten Vogelpflegern schon längst als am praktischten bekannten Käfige nach Wiener Art gezeigt, mit einigen Verbesserungen in Bezug auf Anbringung der Sitzstangen, Türen und Fütterungseinrichtungen. Dem Vernehmen nach, soll es vorläufig die letzte Ausstellung gewesen sein, was mancher Anhänger unserer schönen Liebhaberei bedauern wird. Doch ist zu hoffen, daß bei dem regen Geiste, welcher im Leipziger Vereine herrscht, die Unterbrechung der Ausstellungen nicht allzulange dauert.

W. Grund, Chemnitz.

Aus den Vereinen.

A. Z. Angemeldet sind die Herren M. Kaltofen, Oberbahnhofsvorsteher, Gleisberg, Amtsh. Döbeln; Max Hamann, Grund, Post Mohorn, Bez. Dresden; Achim Götz von Zitzewitz, Berlin W 50, Kurfürstendamm 243; Carl Martens, Spediteur, Danzig-Langfuhr, Ulmenweg 13. — Aufgenommen sind die Mitglieder Nr. 301 Helmut Hengstmann, Leopoldshall-Staßfurt, Blumenstraße 8; Mtgl. 302 Harry Escher, Rudolstadt i. Thür., Schillingstr. 2; Mtgl. 303 Wilhelm Martin, Elversberg a. Saar, Kaiserstr. 68; Mtgl. 304 Max Kriegeskorte, Stuttgart-Hedelfingen; Mtgl. 305 Max Eifrig, Schierke i. Harz, Barenberg 11a. — Mtgl. 3 (Balser, Kreuzwertheim) gibt Zuchtweibchen Mossambikzeisig ab. Mtgl. 22 (Schulz, Stettin) sucht 0,1 gelben oder grünen Wellensittich resp. beide. Mtgl. 65 (Müller, Küllstedt) vert. 1,0 Nymphe gegen Weibchen oder Männchen Wellensittiche. Mtgl. 85 (Determann, Hannover) vertauscht 1,0 Tigerfink, 1,0 Napoleonweber, 0,1 Silberschnabel gegen Paar Exoten oder ersteren und letzteren gegen 0,1 Napoleonweber. Mtgl. 88 (Becker, Danzig) kauft 1,0 Amarant. Mtgl. 144 (Buschendorf, Großkochberg) sucht 0,1 kl. Elsterchen, evtl. im Tausch gegen 1,0. Mtgl. 162 (Zacher, Kamenz) sucht 1,1 gr. Wellensittiche, Zuchtpaar Mövchen, 1,0 Alpenstieglitz. Mtgl. 252 (Gagsteller, Mannheim) sucht 1,1 oder 2,1 gr. Wellensittiche. Mtgl. 283 (Halm, Gohlsdorf) sucht Exoten im Tausch gegen Lebensmittel oder Körnerfutter; tauscht Dr. E. Bade, „Heimische Käfigvögel" gegen Nuß, „Webervögel und Widafinken". Mtgl. 292 (Hut, Perleberg) sucht (evtl. i. T. geg. junge Wellens.) je 1,1 Nymphen, Sperlingspapagei, Nußköpfchen, 1,0 Schmetterlingsfink. Mtgl. 274 (Leppert, Schopfheim) kann aus der Schweiz einige Schamas vermitteln und den Versand selbst vornehmen; verkauft 1,0 Sonnenvogel oder tauscht gegen Weibchen. — Einige süddeutsche Liebhaber haben die Absicht, sich zwecks gemeinsamer Beschaffung von Körnerfutter zusammenzuschließen; ein Herr der A. Z. würde die Sache finanzieren. Mitglieder, welche Interesse dafür haben, wollen sich unter Beifügung von Rückporto gefl. an Mitglied 237 (Stoltze, Böblingen) wenden, welches Auskunft erteilt. — Von nordd. Mitgliedern ist eine zwanglose Zusammenkunft in Hamburg anläßlich Eingang einiger größeren dort erwarteten Transporte angeregt. Ich bitte die Mitglieder, die hierfür Interesse haben, um diesbezügliche Mitteilung unter Beifügung von Rückporto. Näheres und Programm wird darauf baldmöglichst mitgeteilt. — Die Mitglieder 2, 8, 57, 66, 71, 83, 85, 94, 118, 124, 199, 216, 217, werden gebeten, die mehr erhaltenen Jahrbücher mit 400 Mark das Stück zu vergüten, soweit dies noch nicht geschehen ist. Obige Nummern stehen hierfür noch offen. Irrtum vorbehalten. A. Krabbe.

Der **Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig** hat für das laufende Jahr 1923 folgenden Ausflugsplan festgelegt: Am 15. April 1923 Halbtagswanderung Wurzen-Eilenburg. Abfahrt Leipzig, Hauptbahnhof früh 4^{45} Uhr, bis Wurzen (Sonntagsfahrkarte); am 9. Mai 1923 Nachtausflug in die Bitterfelder Gegend. Abfahrt Leipzig, Hauptbahnhof abends 11^{07} Uhr, bis Wolfen; am 27. Mai 1923 Halbtagswanderung Schkeuditz-Maßlau-Obertau. Abfahrt Leipzig, Hauptbahnhof, 4^{55} Uhr bis Schkeuditz; am 10 Juni 1923 Tageswanderung in die Sprödaer Heide. Abfahrt Leipzig, Hauptbahnhof früh, 4^{05} Uhr, bis Delitzsch; am 15. Juli 1923 Familienausflug nach Plaußig. Treffpunkt nachmittags 2 Uhr. Endstation Mockau; am 16. September 1923 Tageswanderung Frohburg-Kohren-Streitwald. Abfahrt Leipzig, Hauptbahnhof früh 4^{05} Uhr (Gaschwitz umsteigen), Abfahrt Leipzig, Bayer. Bahnhof früh 4^{30} Uhr. Etwaige Fahrplanänderungen sind zu beachten. Den unserem Verbande angeschlossenen Mitgliedern bietet sich Gelegenheit, herrliche Stunden zu verleben, die für spätere Zeit unvergeßlich sind. Zur Teilnahme sind alle herzlich willkommen. — Nächste Sitzung am Donnerstag, dem 19. April, im Vereinslokal „Bauers Brauereirestaurant", Täubchenweg. Gäste sind stets willkommen. Der Vorstand. J. A.: Joh. Birk, Leipzig-Mockau, Beuthstraße 29.

Verein für Vogelschutz und -pflege Seifhennersdorf und Umgegend. Unsere letzte Monatsversammlung, welche am 7. April 1923 im Vereinslokal Gasthof „Zur Weintraube" stattfand, stand im Zeichen einer sehr wichtigen Tagesordnung. Die Tagesordnung lautete wie folgt: 1. Eingänge; 2. Landesverband; 3. Fischerheim; 4. Verschiedenes. Eingegangen war eine Zeitschrift, betitelt Zeitschrift für Kaninchen-, Vogel- und Hundepflege; von einer Bestellung wurde abgesehen. Der 2. Punkt, Landesverband, zeitigte eine ausgedehnte Debatte. Nach verschiedenen Reden einiger Mitglieder wurde beschlossen, dem Landesverband nach Eingang der Statuten beizutreten. Der wichtigste Punkt der Tagesordnung war der 3., Fischerheim. Der Vorsitzende gab bekannt, daß es dem Verein nach vielen Bemühungen gelungen ist, Mitpächter des idyllisch gelegenen sog. „Fischerheim" zu werden. Hierüber entspann sich eine lang ausgedehnte Debatte. Mitglied Herr Börner stiftete dem Verein zwei Warnungstafeln, weitere zwei sind von Herrn Heinrich in Aussicht gestellt, so daß dem Verein eine große Geldausgabe erspart bleibt. Weitere Spenden gingen von den Herren Claus und Palme ein. Allen Spendern sei an dieser Stelle nochmals herzlichst gedankt. Ferner wurde beschlossen, eine Sammlungsliste unter den Mitgliedern zirkulieren zu lassen für die Auslagen unseres neuen Heims. Möge es dem Verein eine dauernde Stätte bleiben.

Max Hamann, 1. Vorsitzender.

Käfige u. Gerätschaften

Verkaufe gegen Höchstgebot:

1 Schindlerschen Nachtigallenkäfig mit Wachstuch- und Drahtdecke, 2 Schindlersche Sprosserkäfige, alles beste Ausführung, und 2 Schindlersche Badehäuschen, gebraucht, ferner 1 Gesellschaftskäfig, 60×55×35 cm, schwarz lackiert, neu, mit extratiefer Zinkschublade, großem Badehaus und 2 Futterhäuschen, beste Handarbeit. [307

Georg Beck, Charlottenburg,
Kantstraße 37, II.

Futtermittel

Qualitätsfutter Sanitas

aus gar. nur erstkl. milbenfr. Ingred. 5 Kilo-Pak. à 2850, 10 Pak. à 2800 M.
308] **Sanitasverlag Heidelberg 46.**

Vogelfutter

für Kanarien, Waldvögel, Exoten, Papageien, Weichfresser. Anfragen nur gegen Rückporto. Liste 13 über Vogelfutter 50 ₰, Liste 5 über Vogelkäfige, Zuchtgeräte usw. mit etwa 400 Abbildungen 150 ₰. [309

W. Göpel, Leipzig,
Tröndlinring 1. Telephon 14958.

Mehlwürmer

Geg. Einsend. von 2500 ₰ ¼ Pfd. franko.
Größere Posten zum Tagespreis.
Neu eingetroffen: Ein kleiner Posten **Weißwurm**, per Pfund 40.0 ₰ exkl. Porto und Verpackung.
Anfragen Rückporto, sonst keine Antwort.

D. Waschinski & Co.
Biesenthal b. Berlin.
310] Postscheckkonto Berlin 34825.

Vögel

Verkaufe

meine **Ia chinesische Nachtigall** für 25000 ₰. **Hans Mattes,**
311] Ulm a. Donau, Rothstraße 27.

Suche Dompfaffweibchen zu kaufen. Erbitte Preisoff. über sämtl. Sing- und Ziervögel. **A. Gasenzer,** Berlin N 58, Lychenerstr. 96, v. III. [312

Kaufe laufend zu konkurrenzlos höchsten Preisen:

Kanarienhähne und -weibchen

sowie **Sing- und Ziervögel, Exoten aller Arten, Papageien, graue, grüne usw.**

Arthur Muschter, Borna b. Leipzig,
Käfigfabrik und Vogelhandel en gros und en detail
Import. **Export.**
Anfragen Rückporto beifügen. [313

Im Interesse unserer verehrl. Abonnenten bitten wir das

Abonnement auf die „Gefiederte Welt"

für Monat Mai rechtzeitig erneuern

zu wollen. Die Gefiederte Welt kann sowohl durch den Buchhandel als auch beim Postamt für 750 Mk. für den Monat Mai bestellt werden.

Direkte Zusendung vom Verlage kann nur noch ausnahmsweise und **nur gegen vorherige Einsendung von 850.— Mk.** für Monat Mai — Postscheckkonto Magdeburg 3148 — erfolgen.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg
Postfach 148

Naturwissensch. Antiquariat

insbesondere Ornithologie, Kleintierzucht u. Gartenbau kauft laufend zu angemessenem Preis

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg,
Postschließfach 148

Papageien Kanarienhähne Bastarde

kauft höchstzahlend und tauscht auch auf Exoten

Willy Odenwald, Fulda.

Eigner Export und Import. [321

Weichfresser!

Nachtigallen, Blaukehlchen, Rotkehlchen, Lerchen, Hänflinge, noch im rot. Federschmuck, Gimpel, Stieglitze, Singdrosseln **tausche** ich gegen Prachtfinken, andere Exoten, Kanarien und Futter.

Gebe im Frühjahr **Ameiseneier** ab.

Suche gut erhaltene **Käfige** und **Aquarien zu kaufen.**
Angebote an [314

Heinr. Essmann,
Hamburg 35, Normannenweg 5.

Dorngrasmücke, Gartengrasmücke, Sperbergrasmücke u. Laubvögel in Tausch gegen Nützliches gesucht. [315
Weber, Raboisen 56, Hamburg 1.

Abzugeben:

Indigofink, Mozambikzeisig, einige Jahrgänge Gefiederte Welt. Erbitte Angebot mit Rückporto. [316
O. Leuschner, Berlin NW 52,
Werftstraße 10, III.

Nur Tausch je 1,0 Tigerfink, Napoleonsweber, Star, 0,1 Silberschnabel gegen leicht brütende Exoten. **Hans Determann,** Hannover, Haarstr. 8 B. [317

0,1 Singsittich

wird gegen ein ebensolches 1,0 eingetauscht. [318
Gustav Rambausek,
Wien XVIII, Martinstraße 88/4.

Blaukehlchen

vertausche gegen ornith. Literatur.
Stein, Leipzig Fso. [319

Suche:

Gefiederte Welt 1874 u. 1890, Ornith. Monatsschrift 1876 und 1877, Ornith. Monatsberichte 1922 (auch mit kurzer Reihe anderer Jahrgänge) und andere ornithologische Bücher. [320
Otto Bretschneider, Neustadt i. Sa.

Gesucht Ornith. Monatsschrift

1907, 1914.
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung Magdeburg.
Postschließfach 148.

Reform-Käfige

Zerlegbar · Leichteste Reinigung · Einfachster sicherer Transport
1. Preis beim Käfig-Wettbewerb Leipzig 1919 (s. Ges. Welt 1920, Heft 14—16)
werden für alle Vogelarten hergestellt.
Goldene Medaille Leipzig 1921.

Ausführung: Hartholz, grünlackiert oder naturlackiert, Zinkschublade, Porzellannäpfe, Ledertuchdecke.
Keine Fabrikware, sondern beste Spezialarbeit!
Anfertigung als Kistenkäfig oder Wiener Form (halboffen) oder halboffen mit fester Rückwand. Ohne jedes Werkzeug in einer Minute zusammengestellt resp. zerlegt. Verpackung zum Selbstkostenpreis.
Ferttgen auch jede Art Käfige u. Volieren n. Zeichnung od. Maßangabe.

Anfragen Rückporto beifügen
Katalog gegen Einsendung von 150 Mark in Briefmarken.

Schlagnetze ohne Mittelsteg
für schädliche Vögel, prima handgeknüpfte Ware.

Kühn & Muschter, Inh. Arthur Muschter,
Borna b. Leipzig, Kasernenstr. 4.
Spezialwerkstätte für Käfigbau.
Bank-Konto: Allgemeine Deutsche Credit-Anstalt Zweigstelle Borna.
Stadt-Girokasse Borna b. Leipzig Nr. 1506.
Postscheck-Konto: Leipzig 92250. Fernsprecher 147. [322
Zahlreiche Anerkennungs- und Dankschreiben.

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Hermsdorf bei Berlin; für den Anzeigenteil: Franz Wunderlich, Magdeburg, Postschließfach 148.
Verlag der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck: August Hopfer, Burg Bz. Mgdbg.

Jahrgang LII.
Heft 9. 3. Mai 1923.

Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Die Gefiederte Welt gelangt am Donnerstag nach dem 1. u. 15. jedes Monats zur Ausgabe und kostet für Monat Mai 750 Mark. Einzelpreis des Heftes 400 Mark. Auslandspreis für das Vierteljahr 2 Schweizer Franken, für das Heft 0,35 Schweizer Franken. Inserate für die folgende Nummer müssen bis spätestens Freitag früh in Händen der Verlagsbuchhandlung sein. Die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 10 Pfg. Grundpreis berechnet, der mit der vom „Börsenverein der Deutschen Buchhändler" von Zeit zu Zeit bestimmten Teuerungszahl zu multiplizieren ist. Die Teuerungszahl ist zurzeit „2500". — Auslandspreis für die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum —,10 Schweizer Franken.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung (M. Kretschmann) in Magdeburg.

Postschließfach 148. Postscheckamt: Magdeburg 3148. Fernsprecher: 1323.

Zur Farbenzucht der Wellensittiche.

Von Dr. Braune.

(Schluß.) (Nachdruck verboten.)

Auf die zahlreichen, oft überaus komplizierten weiteren Erscheinungen des Mendelns und ihre Erklärung einzugehen, ist hier nicht der Platz. Alles hat nur die Richtigkeit der Mendelschen Entdeckung weiter bestätigen können. Einige einfache Beispiele sollen aber denen, die sich mit solchen Zuchtversuchen befassen wollen, als weiterer Anhalt dienen. Die Kenntnis der Mendelschen Vererbungsgesetze ist leider noch viel zu wenig Allgemeingut der gebildeten Menschheit geworden; wer sich genauer unterrichten will, findet Ausführliches in Mendels grundlegender kleinen Abhandlung „Versuche über Pflanzenhybriden" und besonders in Bateson, „Mendels Vererbungstheorien", deutsch von Winckler.

Von den erwähnten, auf die Mendelsche Entdeckung gegründeten zahlreichen Zuchtversuchen will ich nur einige solche hier anführen, die gerade für den Farbenzüchter vielleicht als Anhalt und Wegweiser zu dienen geeignet sein können.

Kreuzt man das Japanische Seidenhuhn, eine Gefiederabnormität, mit einem gewöhnlichen Hahn oder Huhn, so hat die erste Generation durchweg völlig normales Gefieder. Die Nachzucht von dieser gibt aber auf 3 normalfedrige Tiere 1 Tier mit Seidengefieder. Von ersteren 3 ist 1 normalfedrig, rein, die beiden andern spalten wieder auf. Ebenso wie das Seidengefieder verhält sich Struppfedrigkeit und Kaulschwänzigkeit. Die Normalfedrigkeit ist dominant, die Abnormität ist rezessiv. Es gibt jedoch auch Fälle, d. h. bei anderen Merkmalen, wo die Abnormität dominant ist.

Betrachtet man bei vorgenannter Kreuzung nicht die Seidenfedrigkeit, sondern die Haubenbildung oder auch die Rauhfüßigkeit (Federbildung an den Läufen), so zeigt sich hier nicht Dominanz und Rezessivität, sondern intermediäres Mendeln: die erste Generation, also die unreinen Exemplare, zeigen Schopfbildung und geringere Fußbefiederung.

Paart man reine Albinos, gleichviel welcher Gattung und Art, zusammen, so sind die Nachkommen stets wieder ausschließlich Albinos. Unvollständige Albinos — sog. partieller Albinismus — verhalten sich dabei natürlich auch ungleichmäßig. Paart man einen Albino mit einem normalfarbenen Exemplar, so sind die Nachkommen normalfarben. Normale Färbung ist dominant. Weiterhin spalten diese Nachkommen aber ganz gesetzmäßig wieder auf.

Weiße Japanische Mövchen z. B. haben bei meinen eigenen Versuchen stets nur reinweiße Junge ergeben. Paart man sie mit braun- oder gelbbunten (partieller Albinismus) zusammen, so erhält man in der Mehrzahl bunte, aber auch reinweiße Nachzucht.

Weiße Mäuse zusammengepaart geben ausnahmslos wieder reinweiße Junge. Paart man Weiße Maus mit Japanischer Tanzmaus (schwarz-weißscheckig und tanzend), so erhält man ausnahmslos rein graue, nicht tanzende, Nachkommen.

Das Symptom des Tanzens erweist sich, auch in der Weiterzucht, als einfach rezessiv. Anders verhält sich die Färbung. Zu erwarten wären weiße, graue und schwarz-weißscheckige Tiere. Solche erhält man wohl — wobei allerdings gerade die charakteristische Tanzmausscheckung nur ganz selten und erst in den späteren Generationen auftritt —, außerdem aber noch verschiedene andere Färbungen und Zeichnungen, wie rein schwarze Tiere sowie schwarze und graue mit größeren und kleineren weißen Abzeichen. Beim Kreuzen der weißen mit wilden grauen Mäusen spalten

schließlich sogar gelbe heraus. Die Erklärung hierfür ist die, daß die graue Farbe der Maus kein einfaches, sondern ein zusammengesetztes Merkmal darstellt, welches seinerseits bei solchen Kreuzungen wieder aufspaltet und dadurch mehr oder weniger komplizierte Verhältnisse schafft. Solche zusammengesetzte Merkmale sind keineswegs selten und sie erschweren das Erkennen des wirklichen Sachverhaltes oft außerordentlich.

Das Geschlecht, d. h. ob ein Merkmal vom Vater oder von der Mutter stammt, bildet in der Regel keinen Unterschied, besonders bei Pflanzen, und ebensowenig das Geschlecht der Nachzucht. Es gibt aber auch hier Ausnahmen, so aber, daß auch diese eine ganz bestimmte Gesetzmäßigkeit aufweisen.

Paart man z. B. einen schwarzen Bantamhahn mit einer weißen Bantamhenne, so fallen in der ersten Generation sowohl gesperberte als auch schwarze Tiere. Die gesperberten sind sämtlich Hähne, die schwarzen ausschließlich Hennen. Macht man diese Kreuzung aber umgekehrt, so erhält man lauter gesperberte Tiere beiderlei Geschlechts.

Ein ganz ähnliches Verhalten zeigen auch die bekannten Gold- und Silbersebrightbantams.

Die Exotenliebhaber einer früheren schöneren Zeit — vielleicht auch noch einige wenige glückliche von heute — züchteten viel die farbenprächtigen Gouldamandinen, sowohl die schwarz- als auch die rotköpfige Art. Sie werden unter den, auch schon bei importierten, nicht seltenen Kreuzungsexemplaren oftmals Weibchen gesehen haben, deren Kopffärbung Schwarz und Rot gemischt zeigte — allerdings stets nur beide Farben mosaikartig gemengt, nicht wirklich vermischt —, niemals aber ein ebensolches Männchen. Die Erklärung ist: das männliche Geschlecht mendelt alternativ — wobei Rot dominant ist —, das weibliche intermediär.

Die vorstehenden Beispiele mögen für unsern heutigen Zweck genügen. Wenn man noch bedenkt, daß jedes Individuum nicht nur einige wenige, sondern zahllose Merkmale (Anlagen) aufzuweisen hat, von denen doch jedes Paar für sich mendelt, so kann man sich von der Fülle der möglichen Kreuzungsformen ungefähr eine Vorstellung machen.

Ehe wir nun die aus den Mendelschen Gesetzen zu ziehenden Schlüsse für unsern Fall anwenden, mögen noch ein paar Bemerkungen zu dem Begriffe Spielart vorausgeschickt werden.

Von Spielarten, gleichviel ob hinsichtlich der Farbe oder anderer Merkmale, unterscheiden wir, ihrer Entstehung nach, hauptsächlich zweierlei: Variationen und Mutationen. Erstere stellen sich dar als kleine und kleinste Abweichungen von den elterlichen Merkmalen. Durch das zufällige — oder, wie bei der künstlichen Zucht, absichtlich herbeigeführte — Zusammentreffen solcher zunächst geringen Abweichungen bei den Eltern können diese auch bei den Kindern und dann noch in verstärktem Maße wieder auftreten und schließlich, nach einer Reihe von Generationen, zu ausgesprochen von der ursprünglichen Art abweichenden Merkmalen führen. So kann z. B. ein bläulicher Gefiederton durch Zusammenpaaren zweier solcher Eltern schließlich zu ausgesprochen blauem Gefiederton bei den Jungen werden, der sich dann auch mehr oder weniger konstant vererbt.

Viel rascher als Variationen haben Mutationen den gleichen Erfolg. Man bezeichnet damit die mit einem Male, gewissermaßen sprunghaft, auftretenden Abänderungen elterlicher Merkmale bei den Kindern, wie solche durchaus nicht selten zu beobachten sind. Zu diesen gehört z. B. der Albinismus, der sich durch plötzliches Auftreten von Weiß in Haaren oder Federn und durch rote Augen kennzeichnet, d. h. durch Fehlen des normalen Farbstoffes (Pigment) in diesen Gebilden.

Beide, sowohl Variationen als auch Mutationen, verhalten sich bei der Vererbung ziemlich gleich, nur daß Mutationen eben rascher zum Ziele führen. Beide pflegen sich bei der Paarung mit einem normalen Artgenossen rezessiv zu verhalten, ihr völliges Verschwinden in der ersten Generation bedeutet für den Züchter also noch keineswegs einen Mißerfolg. Erst die nächste Generation klärt über die wirklichen Verhältnisse auf.

Nun zu unsern Farben-Wellensittichen. Die natürliche Grundfarbe ist Grün, mit den bekannten andersfarbigen Abzeichen und Zeichnungen. Gelb ist Albinismus von Grün, sog. „Xanthismus", wie z. B. bei unserm Kanarienvogel, und ist nach der Art seines Auftretens als ausgesprochene Mutation anzusprechen. In dem an ornithologischen Raritäten überaus reichhaltigen Rothschildschen Museum in Tring findet sich eine ganze Kollektion solcher normalerweise grünfarbigen Vögel, die vollen oder teilweisen Xanthismus aufweisen.

Rein gelbe Wellensittiche (totaler Albinismus) zusammengepaart werden also stets wieder gelbe Nachzucht geben. Erhält man von gelben auch grüne, so darf man sicher sein, daß mindestens eines der Eltern nicht „rein" ist, bzw. nur partiellen Albinismus aufweist. Gelbe mit grünen (reinen) Vögeln gepaart werden naturfarbene grüne erwarten lassen; diese zusammen oder mit rein gelben gepaart werden aber das Verhalten von Heterozygoten zeigen, d. h. sowohl gelbe als auch grüne Nachzucht, im entsprechenden Verhältnis, geben. Da es sich bei diesen Verhältniszahlen selbstverständlich immer nur um Wahrscheinlichkeitsrechnung handelt, so wird man das genaue Verhältnis natürlich nicht bei kleinen, sondern erst bei größeren Zahlenreihen erwarten dürfen.

Ob die satinglänzenden, wie wohl besser statt „satingrün" zu sagen ist, als Variation oder Mutation zu betrachten sind, kann dahingestellt bleiben. Gesehen habe ich diese Spielart noch nicht. Mit der gelben oder blauen Abart dürften sie nicht zusammenhängen. „Satinfarben" dürfte wohl eine etwas unglücklich verdeutschte und deshalb von Herrn Lichtenstädt ob ihrer Sinnlosigkeit mit Recht bemängelte Bezeichnung für „Grün mit Satinglanz" sein. Wenigstens entnehme ich dies der französischen Bezeichnung „vertes satinées", die ich auf Seite 8 des „Jahrbuches 1922" in einem kleinen Artikel von Krabbe finde. Man würde besser also „satinglänzend" sagen.

Die blauen Wellensittiche dürften wohl als Variation entstanden sein, also durch allmähliches Herauszüchten immer intensiverer Blaufärbung.

Die olivgrünen scheinen, nach Freytag, eine Mischfarbe von Blau und Grün zu sein. Die gleichen beiden Anlagen, nur das Blau vielleicht in ganz geringem Grade, scheinen die blaugrünen zu enthalten, nur daß hier die beiden Farben nicht gemischt erscheinen. Weitere Züchtungen dürften hier voraussichtlich noch genauere Aufklärung bringen, ebenso wohl bei den jadefarbenen, die aus Kreuzung von Blau, Gelb und Grün hervorgehen sollen. Hier kann die Liebhaberei noch dankenswerte Arbeit für die Wissenschaft leisten. Möglicherweise könnte Herr Freytag auch von seiner englischen Quelle noch genauere Aufklärung erhalten.

Die oben angeführten Beispiele stellen, wie schon bemerkt, nur eine sehr bescheidene Auslese aus den zahllosen auf die Mendelsche Entdeckung gegründeten Forschungsergebnissen dar. Der Leser kann danach wenigstens ahnen, mit welchen geradezu unbegrenzten Möglichkeiten bei derartigen Zuchtversuchen zu rechnen ist. So ganz einfach scheinen die Verhältnisse bei der Farbenzucht der Wellensittiche nicht zu liegen, um so größer aber ist das Interesse bei der Züchtung und die Freude am Erfolg.

Sprosser und Nachtigall.

Von J. Birk, Leipzig.

(Schluß.) (Nachdruck verboten.)

Es gibt auch Universalfutter, deren einzelne Futterstoffe einwandfrei sind und sich gut eignen wegen der bequemen Fütterung. Der erfahrene Vogelpfleger soll nicht und wird es auch meistens nicht tun, seinen Sprosser, seine Nachtigall und auch die noch vorhandenen edlen Sänger mit derlei unverdaulichen Stoffen, wie sie manche Universalfutter enthalten, vollzustopfen, als Fleischmehl, Hundekuchen, gemahlen, usw. Ein wirklich gutes Nachtigallen- resp. Sprosserfutter soll der Liebhaber selbst mischen, resp. das tägliche Futterquantum durch nachstehende Stoffe selbst zusammenstellen, wie geriebene saftige, süße Speisemöhre, geriebenen Zwieback, Ameisenpuppen, Weißwurm, am besten in gemahlenem Zustande, und gequetschten Hanfsamen. Mit Weißwurm und gequetschtem Hanf, die bei mageren Vögeln nicht zu knapp bemessen sein dürfen, läßt sich der Nährwert des Futters regulieren, indem der Zusatz von Hanf und Weißwurm bei Vögeln mit Fettansatz stark reduziert, und wenn nötig, ganz weggelassen wird. Ein geschätztes Futterzusatzmittel ist auch süßer Quark, der früher auch bei uns in Leipzig häufiger mitgefüttert wurde, heute aber wegen der schwierigen Beschaffung einwandfreien süßen Quarkes fast gar nicht mehr gefüttert wird. Aus Obst, wie aus Beeren, überhaupt aus vegetabilischer Nahrung, machen sich Sprosser und Nachtigall nicht viel, manche fressen selbiges nur ungern, denn von Natur aus sind beide Vögel keine Fruchtfresser, sondern ausgesprochene Wurmvögel, die ihre hauptsächlichste Nahrung in Kerbtieren vom Boden aufnehmen, die also mehr animalische und wenig vegetabilische Kost bekommen dürfen. Die Füße von Sprosser und Nachtigall sind auch gegen äußere Einflüsse sehr empfindlich und der Liebhaber hat daher sein Hauptaugenmerk auf praktische Käfigsitzstangen zu richten, die ebenfalls ständig von Schmutz reinzuhalten sind. Da sich beide Vögel naturgemäß viel auf dem Boden aufhalten, so ist gleichfalls auf peinlichste Sauberkeit im Käfig zu achten, indem der Bodenbelag durch tägliche Auswechslung des Papiers von Unrat möglichst reingehalten wird. Der Vogel läuft durch den Kot, verunreinigt damit die Sitzstangen, woran sich harte Krusten bilden, welche die zarten Füße verletzen, es bilden sich feine Risse in



Alpenlerche.

der Haut, Schmutz dringt ein, die Wunde entzündet sich und das Fußgeschwür ist da. Die Verhütung der Fußgeschwüre durch äußerliche Fußhautverletzungen ist leichter als die Heilung derselben. Die Fußgeschwüre, auch die innerlicher Natur, welche meistens in zu starker Fütterung mit Gesangsreizmitteln in der gesangslosen Zeit, speziell mit zu viel Mehlwürmern, ihre Ursachen haben, stellen sich besonders leicht bei Sprosser und Nachtigall ein. Greift der Pfleger nicht ein, so ist der Vogel meistens einem langsamen Siechtum verfallen, indem nach und nach alle davon befallenen Zehen abfallen und den Vogel zum Krüppel machen. An Gesang von Sprosser und Nachtigall, die mit Fußgeschwüren behaftet sind, ist nicht zu denken, speziell der Sprosser ist am empfänglichsten für Fußkrankheiten. In früheren Jahren wurde bei den Leipziger Liebhabern zur Vorbeugung gegen Fußkrankheiten und zur Linderung für erkrankte Füße alles mögliche versucht, so die Sitzstangen mit einem Gummischlauch oder weichem Flanell überzogen, auch Korksitzstangen wurden verwendet, aber alles

war zwecklos. Die mit Gummi überzogenen Sitzstangen wurden durch die Nässe glatt und hart, so daß sich der Vogel kaum noch halten konnte. Mit Flanell versehene Sitzstangen erzeugten an den kranken Füßen noch mehr Hitze, anstatt kühlend zu wirken; an den porösen Korksitzstangen blieben die Vögel mit den Krallen hängen und Unglücksfälle kamen öfters vor. Auch die früher so viel gepriesenen federnden Sitzstangen, die ein Vorbeugungsmittel gegen Fußkrankheiten sein sollten, indem der starke Anprall des Fußes an die harte Holzsitzstange durch die federnde Bewegung abgemildert werden sollte, sind wieder verschwunden; denn was die künstliche Nachahmung des schwankenden Zweiges beim freilebenden Vogel darstellen sollte, war weiter nichts, wenigstens für den erfahrenen Vogelpfleger, als eine sinnlose Spielerei. Am besten halte ich, und mit mir wohl noch viele Liebhaber, saftig grüne, der Natur entnommene Sitzstangen nicht nur für Sprosser und Nachtigall, sondern für alle Käfigvögel, die Sitzstangen benötigen. Es ließe sich noch manches über Sprosser und Nachtigall als Käfigvögel sagen, doch eine weitere Ausschweifung würde die Geduld der geehrten Zuhörer zu sehr in Anspruch nehmen, und übrigens sollen auch diverse Fragen offen gelassen werden für die hoffentlich recht lebhafte Debatte, die diesen meinen oberflächlich gehaltenen Ausführungen folgen soll.

Sprosser und Nachtigall, die Idealvögel eines jeden begeisterten Vogelliebhabers, sind bei vielen, die sich mit der Käfigung von einheimischen Vögeln beschäftigen, noch lange nicht genügend bekannt, wenigstens nicht in der Praxis. Wer einmal das Glück hatte, einen schlagenden Sprosser oder eine ebensolche Nachtigall zu besitzen, dem haben sie sich ins Herz gesungen mit ihren himmlischen Tönen, so daß er von beiden mindestens einem ständig in seinem Heim das Asylrecht gibt. Mögen sich auch die Zeiten trübe und hoffnungslos auf unser Gemüt legen, wir träumen und zehren von längst verschwundenen, schönen Tagen, wenn Sprosser und Nachtigall jubelnd jauchzen und wehmutsvoll klagen, und hat bereits das Weiß des beginnenden Alters das blonde Haar des Mannes gefärbt, er bleibt doch ewig jung bei den glockenreinen, von Lebenslust sprühenden Liedern unserer beiden Sängerfürsten, von Sprosser und Nachtigall.

Der Innenflugraum.

Von Alfred Troschütz, Hannover.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Zaungrasmücke: Seit sechs Jahren in Pflege. Kleiner Bosnickel, der gern Händel sucht. Gewandt, fangeslustig, ausdauernd. Zu empfehlen. Dorngrasmücke: Recht nett für den Flugraum. Ein von dem verstorbenen Herrn Nissen, Bergedorf, aufgezogenes Stück wurde unglaublich dreist. Geeignet. Mönchgrasmücke: Seit Jahren vier Stück in Pflege, darunter Vater und zwei Söhne, die seit ihrer Ankunft Tag und Nacht eng zusammenhalten. Vater mit wundervollem Überschlag. Gesanglich mein besonderer Liebling, ist für den Flugraum sehr gut geeignet, nicht so unermüdlich im Gesang wie im Käfig, aber stets munter, etwas vorsichtig, verträglich und tadellos im Gefieder. Besonders empfehlenswert. Des Gesangs wegen vielleicht paarweise zu pflegen. Gartengrasmücke: Pflege eine seit fünf Jahren, die im Frühjahr und Herbst nachts sehr unruhig ist und oft schwer mausert. Recht guter Gesang. Verträglich. Schwieriger zu halten als die anderen Grasmücken. Sperbergrasmücke: Oft zänkisch, futterneidisch, scheu. Wenig Gesang. Der jetzige Pflegling ist ein auffallend schönes Tier, mit dunklem Gefieder. Geeignet. Gelbspötter: Nicht geeignet. Hat viel unter den Verfolgungen anderer Vögel zu leiden. Die Unruhe der Vogelstube sagt ihm nicht zu, zumal er da auch oft vom Futternapf verdrängt wird. Sumpfrohrsänger: Nur für den Käfig geeignet. Weichlich. Drosselrohrsänger: Einmal $1^3/_4$ Jahre lang gepflegt. Trotz sehr reicher Mehlwurmgaben nicht durch die Mauser gebracht. Erlag einem Schlaganfall. Für den Flugraum gut geeignet, da äußerst gewandt. Wurde bald zahm. Sein „Kärre-Kied" ließ er schon um Neujahr hören. Für seine Ernährung fehlt ein Futtermittel, das die Wasserinsekten des Freilebens ersetzt. Waldlaubvogel, Weidenlaubsänger, Fitislaubsänger: Alle drei nicht geeignet. Zwergfliegenschnäpper: $1^1/_2$ Jahre lang habe ich mich bemüht, diesen hübschen Vogel in gutem Gesundheitszustande zu erhalten, brachte ihn aber nicht durch die Mauser. Sehr gewandt und verträglich. Weicht Angriffen von Artverwandten geschickt aus. Geeignet? Trauerfliegenschnäpper: Ruhiger, schöner Vogel, eleganter Flieger. Fabelhaft geschickt beim Fangen zugeworfener Mehlwürmer. Gut geeignet. Seidenschwanz: Von seltener Schönheit. Ruhiges, gesetztes Wesen. Durchaus verträglich. Paar immer zusammen, unterhält sich manchmal schnabelknackend. Verehrer von Süßigkeiten (Feigen, Datteln, Korinthen, Kunsthonig). Verdient seinen Ruf als stets fressender und stark schmutzender Vogel in keiner Weise. Sehr empfehlenswert. Bartmeise: Eine Zierde jeder Vogelstube. Ungemein haltbar. In 12 Jahren noch nie ein Stück durch Krankheit verloren. Das so lange gepflegte älteste Männchen erlag im Vorjahr den Folgen eines Beinbruchs. Durch die Liebenswürdigkeit des Herrn Cordier, Zürich, war es mir möglich, die Paare im Tauschwege aus Holland zu ergänzen. Müssen paarweise gehalten werden. Locken und kraulen sich gern, sind sehr zärtlich zueinander. Werden aber nicht zahm. Die wundervolle Gefiederfärbung wird in der Gefangenschaft noch duftiger. Das Weibchen legte zweimal Eier, die unbefruchtet waren, da das Männchen zu alt. Scharren viel im Körnerfutter. Fressen gern Mehlwürmer. Goldhähnchen: Mehrere erfolglose Versuche. Nicht geeignet. Schwanzmeise: Allerliebste Kerlchen. Gar nicht ängstlich und scheu. Immer munter. Oft recht keck. Halten alle immer zusammen. Fressen gern trockene Ameiseneier, Biskuit, Datteln, Feigen, Kunsthonig und Mehlwürmer. Weibchen niedlicher Balztanz. Sumpfmeise: Fidele Gesellen von unglaublicher Beweglichkeit. Auch unter sich durchaus verträglich. Rasch sehr zahm, oft frech werdend. Ausdauernd. Noch nie ein Tier durch Krankheit verloren. Lapplands-Meise. Übertrifft die Sumpfmeise noch an Gewandtheit. Zutraulich und verträglich. Mit beispielloser Geschick-

lichkeit sauste sie beim Verlassen des Vorraums hinter mir her, trotz selbsttätigem Türschließer. Hielt sich oft halbe Tage lang im Laden auf, jeden Winkel durchsuchend. Eines Sonntags vormittags durch die offene Fensterklappe ins Freie geraten, hat sie, wie Nachbarn erzählten, sich den ganzen Nachmittag bemüht, den Eingang zum Flugraum wiederzufinden. Leider vergeblich. Ein Prachtkerlchen! Haubenmeise: Sehr hübsch. Jung aufgezogene scheinen haltbarer und werden sehr zahm. Hamstert gern. Versteckt Korinthen im Torfmull und sucht dann breitbeinig durch Scharren das Versteckte wiederzufinden. Munter und verträglich. Tannenmeise: Öfter, aber nie länger als drei Jahre gepflegt. Nicht sehr ausdauernd, aber verträglich. Blaumeise: Oft von großer Schönheit. Unter sich zänkisch. Hacken einander auf die Füße. Ziemlich weichlich. Längste Verpflegungsdauer vier Jahre. (Indische) Bergmeise: Unverträglich. Brachte mehrere kleine ausländische Finken um und fraß ihnen das Gehirn aus. Kleiber: Fröhliche Gesellen von erstaunlicher Beweglichkeit. Immer sauber und glatt, munter und verträglich. Das Hamstern der Körner, besonders von Sonnenblumenkernen, geht ihnen über alles. Mit Mehlwürmern vermeiden sie es aber, da die Teilnahme der anderen zu groß. Gewinnt man bald lieb. Weiße Bachstelze: Zänkischer als die anderen, manchmal futterneidisch. Hält sich gut. Liebt erhöhten Sitzpunkt. Geeignet. Gebirgsstelze: Liebenswürdiger und zutraulicher als die Artgenossen. Schöne Erscheinung. Das Weibchen mausert oft schwer. Das Männchen tötete im Frühjahr sein Weibchen. Geeignet. Schafstelze: Prächtiger Vogel. Immer tadellos im Gefieder. Kommt seltener auf den Boden herab. Macht sich nicht viel aus den anderen Bachstelzen. Gut geeignet. Wiesenpieper, Baumpieper: Beide, die sich mit Vorliebe am Boden des Flugraums aufhalten, fallen durch ihr nettes, ruhiges Wesen, ihr „würdevolles" Daherschreiten vorteilhaft auf. Eine Zier des Flugraums, immer glatt und schön im Äußeren, sehr verträglich, der Baumpieper durch guten Gesang ausgezeichnet. Sehr zu empfehlen. Alpenlerche: Seit Frühjahr zwei in Pflege. Im Anfange, wie alle Lerchen, dummscheu, jetzt schon recht manierlich. Äußerlich hübsch. Feldlerche: Das seit fünf Jahren im Flugraum befindliche Tier ist noch jetzt ein „Angstmeier" schlimmster Art. Kommt nie auf den Boden. Sehr zurückhaltend mit dem Gesang. Ihre Vorgängerin in der Pflege war eine überaus fleißige Sängerin, die auch einen schönen Buchfinkenschlag in dreimaliger Wiederholung tadellos zu Gehör brachte. Heidelerche: Junges, schönes Tier. Noch recht vorsichtig und scheu. Bleibt stets auf dem Laufbrett. Wenig Gesang. Haubenlerche: Altes Weibchen, während eines strengen Winters halbverhungert erhalten. Brauchte ein volles Jahr zur völligen Erholung. Nicht scheu. Äußerlich recht stattlich. Wühlt viel im Futter und „paddelt" gern im Torfmull. Alle Lerchen sind für den Flugraum geeignet, ohne je darin zutraulich zu werden. Lerchenspornammer: Von einem Händler als „junge Schneeammer" für 3 Mark gekauft. Angeblich aus Holland eingeführt. Nach der Mauser durch den hellbraunen Halsstreifen als Lerchenammer festgestellt. Sehr angenehmer, verträglicher Vogel ohne jede Scheu. Eigenartiger, schöner Gesang, dem ein Klingen wie der Anschlag an ein Metallglöckchen einen ganz besonderen Reiz verlieh. Durch meine Unachtsamkeit davongeflogen. Feldsperling: Von dreien noch einen behalten, die andern abgegeben. Bildsauberes Kerlchen, das gern im Sande badet, immer verträglich ist, es aber gar nicht gern hat, wenn man in seine Nähe kommt. Zu empfehlen. Bergfink: Hübsch und sehr haltbar. Geeignet. Ich mag den „Quäker" nicht. Buchfink: Unser Edelfink muß paarweise gehalten werden. Von großer Härte und Ausdauer. Das älteste Paar seit 12 Jahren im Flugraum. Weibchen noch immer schön, stattlich und — eifersüchtig. Männchen jagen sich und die Weibchen im Frühjahr aus Eifersucht mit einer Kraft und Geschicklichkeit im engen Raume, die Staunen erregt. Sonst stets verträglich. Frißt gern Mehlwürmer, Ameisenpuppen und Weichfutter, Weibchen beim Nestbau auch Erde. Baute in einem mit Heu gefüllten Käfig ein Nest, das mit Faden und dünnen, angefeuchteten Halmen gut ausgepolstert wurde. Das Weibchen setzte sich dann ins Nest und glättete die Nestwände durch andauerndes Drehen. Fünf Eier. Beim Brüten in meiner Abwesenheit durch neugierige Beschauer gestört, flog das Weibchen ab. Buchfinkenweibchen sind im Benehmen ungemein liebenswürdige Stubenvögel. Als ich ein junges Männchen zum älteren Paar brachte, stellte der alte Hahn sofort den Schlag ein und hat ihn bis heute noch nicht wieder hören lassen. Aber auch das junge Männchen sagt jetzt keinen „Ton". Der Alte war ein fleißiger Schläger. (Fortsetzung folgt.)



Bergmeise.

Frischgehaltene Ameisenpuppen.

Von Viktor Müller.

(Nachdruck verboten.)

Frische Ameisenpuppen, das ideale Futter für unsere gekäfigten Weichfresser, stehen uns leider nur während weniger Sommermonate bei günstiger Witte-

rung zur Verfügung. Außer dieser Zeit sind wir auf gedörrte Puppen, einem recht minderwertigen Ersatz, angewiesen.

Frisches Gemüse (Obst usw.) steht uns aber in genau gleicher Weise auch nur während weniger Sommermonate zur Verfügung, und doch können wir es zu jeder Jahreszeit in „frischgehaltenem" durchaus vollwertigem Zustand genießen. Ich erinnere nur an Spargel, den „König der Gemüse". In Gälsern frischgehalten, ist er ebenso köstlich und vollwertig wie frisch aus dem Garten geholt. Warum sollen sich nun frische Ameisenpuppen nicht in gleicher Weise frischhalten lassen?

Ich beschloß, es zu versuchen. Mein Vorhaben konnte ich jedoch erst zur Ausführung bringen, nachdem ich meinen Jahresbedarf gedeckt hatte. Wohl alle Liebhaber, denen es möglich ist, sich ihren Bedarf an Puppen draußen selbst zu holen, haben während des vergangenen Sommers 1922 ihre Schwierigkeiten gehabt. Die kühle, regnerische Witterung beeinträchtigte stark das Brutgeschäft der Ameisen, allenthalben (wenigstens hier am Niederrhein) waren die Haufen schwach ausgebaut und die Ausbeute dementsprechend sehr mäßig. Nach manch anstrengender, aber auch ebenso schöner, gemeinsam mit meinem Freund H. H. unternommener Tagestour war ich endlich so weit, daß ich einige Liter riskieren konnte.

In Betracht kam für mich nur das bekannte Weckſche Frischhaltungsverfahren, das seit vielen Jahren in wohl jedem Haushalt bestens bekannt und zur Frischhaltung von Obst, Gemüsen usw. mit durchweg sicherem Erfolg in Gebrauch ist.

Mit einem erstmaligen Mißerfolg mußte ich rechnen, zumal es in der Weckschen Gebrauchsanweisung beispielsweise betr. Fisch heißt: „Nicht alle Fische, in erster Linie nicht die zartfleischigen, die nur kurze Siedezeit erfordern, lassen sich frischhalten." Was ist nun zarter und empfindlicher, Fischfleisch oder frische Ameisenpuppen?

Ich schrieb also mein Versuchsquantum von drei Litern auf Verlustkonto und füllte, soeben von einer Tour zurückkehrend, die frisch hereingebrachten Puppen, nachdem ich sie, wie gewohnt, leicht abgehitzt hatte, ohne irgendeinen Zusatz locker in die bereitstehenden $^1/_4$-Liter-Gläser, legte sorgfältig Gummiring und Deckel auf und stellte dann die im Gläserhalter unter mäßigem Federdruck gehaltenen ersten sechs Gläser in den Sterilisiertopf.

Vollkommen ohne Anhaltspunkt war ich bezüglich des Erhitzungsgrades und der Erhitzungsdauer, zweier wichtiger Faktoren. Nun hätte ich ja mit, sagen wir mal, je zwei Gläsern sechs verschiedene Temperaturen und Zeiten wählen können, um so „das Richtige" herauszufinden. Da ich aber abends erst zurückkam und redlich müde war, beschränkte ich mich darauf in nur zwei Partien zu sterilisieren, und zwar einmal sechs Gläser 15 Minuten bei 75 Grad und einmal sechs Gläser 10 Minuten bei 98 Grad. Nach dem Erkalten waren die Gläser geschlossen bis auf je eines von jeder Partie, die ich darauf nochmals einige Minuten einsetzte, worauf dieselben auch geschlossen waren. Vermutlich befand sich vorher irgendein Fremdkörperchen zwischen Gummi und Glasdichtungsfläche. Nun hatte ich einstweilen abzuwarten. Ab und zu sah ich nach und fand, daß die Gläser geschlossen und die Puppen dem Aussehen nach unverändert blieben. Sechs Wochen später öffnete ich dann das erste Glas. Der Inhalt hatte sich tadellos gehalten, die Puppen waren wie frische, jedoch feucht und zusammenballend, wie Puppen, die etwas Regen abbekommen haben. Dem wurde abgeholfen, indem ich sie, auf das Kuchenblech des Herdbackraumes ausgebreitet, bei gutem Feuer kurze Zeit (zirka $^1/_2$ Minute) einschob, bis sie mäßig dampften, und sie dann, auf einem Papierbogen ausgebreitet, an der frischen Luft abkühlen ließ. Nach zirka 10 Minuten waren sie äußerlich so schön trocken, daß sie sich wieder rollen ließen. Sie entsprachen vollständig frischgeschwelgten (abgehitzten) Puppen und hielten sich auch, gleich diesen, kühl aufbewahrt, ebenso lange, bis sie allmählich, ohne zu verderben, eintrockneten. Öffnete ich die dem Glas entnommenen Puppen, so enthielten sie, je nach dem Entwicklungsstadium, entweder „Milch" oder den sogenannten Ameisenkern bzw. das mehr oder weniger entwickelte, noch weiße Insekt. In der Folge öffnete ich nun hin und wieder ein Glas abwechselnd von jeder Partie und fand stets dasselbe gute Resultat, so daß ich meinen Gefiederten, insbesondere den wintermausernden (Sumpfrohrsänger, Gelbspötter und Gartengrasmücke), das Mischfutter häufiger aufbessern konnte.

Hiermit ist erwiesen, daß sich frische Ameisenpuppen sterilisieren lassen. Was diese Tatsache für unsere Liebhaberei bedeutet, ist wohl ohne weiteres klar. Selbstverständlich werde ich in diesem kommenden Sommer Puppen in größerer Menge einwecken, jedoch ohne sie vorher abzuhitzen. Zum Besten unserer gefiederten Freunde wäre zu wünschen, wenn recht viele Liebhaber in gleicher Weise verfahren würden. Hervorheben möchte ich jedoch, daß m. E. nur dann mit Erfolg gerechnet werden kann, wenn die Puppen, direkt aus dem Wald kommend, ohne Zeitverlust zur Verwendung kommen und im allgemeinen streng nach den Weckschen Vorschriften verfahren wird. Puppen, die schon einige Tage alt oder mit der Post gesandt sind, werden sich wohl nicht mehr dazu eignen.

Auch einen kleinen Mißerfolg hatte ich zu verzeichnen. Mitte November fand ich, als ich wieder einmal die Gläser kontrollierte, ein Glas vor, das nicht mehr geschlossen war. Die darin befindlichen Puppen waren sauer und mußten fortgeschüttet werden.

Seitdem ist es bei diesem Einzelverlust geblieben. Die wenigen Gläser, die ich jetzt, Mitte Januar 1923, noch habe, sind nach wie vor gut geschlossen. Eins davon geht gleichzeitig mit diesem Bericht der verehrlichen Schriftleitung als Beleg und zur Prüfung zu.

Vereinigung der Vogelliebhaber Landesverband Preußen.

1. Wir haben die erste Auflage unseres Organisationsplanes der Herstellungskosten wegen nur in sehr beschränktem Maße anfertigen lassen können. Doch die rege Nachfrage wird eine zweite Auflage in kurzer Zeit erforderlich machen, deren Stückpreis aber auf 800 M. erhöht werden

muß. Wir bitten, etwaige Bestellungen uns recht bald mitzuteilen, damit wir einen ungefähren Überblick über die noch benötigten Exemplare gewinnen können. Sollte unter unsern verehrten Mitgliedern jemand in der Lage sein, denselben billiger herstellen lassen zu können, so würden wir für diesbezügliche Angebote sehr dankbar sein.

2. Die Mitgliederbeiträge für das Geschäftsjahr 1923 bitten wir alsbald an unsern Kassierer Herrn Erich Merz, Berlin-Friedenau, Wilhelm-Hauff-Str. 14, abführen zu wollen.

3. Die Mitgliedschaft haben erworben: Mtgl. F 20, Heinrich Filor, Wilmersdorf, Bernhardstr. 13; Mtgl. G 30, August Giede, Berlin O 112, Neue Bahnhofstr. 6; Mtgl. K 64, Walter Kegel, Berlin SO 33, Pücklerstr. 15; Mtgl. K 65, Walter Kahl, Berlin S 59, Wilibald-Alexis-Str. 25; Mtgl. K 66, Fritz Kleinvogel, Berlin NW 5, Stephanstr. 10; Mtgl. L 19, Ewald Lorenz, Stahnsdorf b. Berlin, Dorfplatz 1; Mtgl. M 37, Albert Müller, Köln-Kalk, Mainzer Straße 99; Mtgl. P 21, Fritz Pölz, Hamburg 24, Mühlendamm 12; Mtgl. P 22, Wilhelm Peter, Berlin NO 17, Fürstenwalder Str. 14.

4. Eingegangene Beiträge: Herr Fritz Pölz, Hamburg, 5000 M.; Herr Albert Müller, Köln, 500 M.; Herr Kantzhak, Charlottenburg, 1000 M.

J. A.: Franz Nyncke, 1. Vorsitzender,
Berlin O 34, Königsberger Str. 17.

Aus den Vereinen.

A. Z. Angemeldet sind die Herren Fritz Glaißner, Inspektor, Stuttgart, Haustrigstr. 104; Josef Seger, Kaufmann; Hermann Kammüller, Hofmeister; Gustav Knie, Bahnbeamter, sämtlich in Schopfheim in Baden. — Aufgenommen sind die Mitglieder Nr. 306 M. Kaltofen, Oberbahnhofsvorsteher, Gleisberg, Amtsh. Döbeln; Mtgl. 307 Max Hamann, Grund, Post Mohorn, Bez. Dresden; Mtgl. 308 Achim Götz von Zitzewitz, Berlin W 50, Kurfürstendamm 243; Mtgl. 309 Carl Martens, Spediteur, Danzig-Langfuhr, Ulmenweg 13. — Mtgl. 73 (Schimang, München) sucht 1,0 Schmetterlingsfink gegen 0,1 oder bar. Mtgl. 171 (Schütze, Eystrup) tauscht 1,1 gr. Reisfinken gegen andere Prachtfinken. Mtgl. 204 (Stepan, Bodenbach) sucht 1,1 Schama und Rußköpfchen. Mtgl. 225 (Dr. Ulmersbach, Heidelberg) tauscht 0,1 Zebrafink und 0,1 oder 1,0 Möwchen gegen 0,1 Safranfink oder 0,1 Mossambikeisig. Mtgl. 243 (Jauffen, Marienberg) gibt ab Ruß, „Kanarienvogel", 11. Aufl., geb., und eine Partie Sepiaschalen gegen je 1,0 Bergfink, Zeisig, Dompfaff oder Hänfling evtl. Waldvogelfutter. Mtgl. 247 (Pölz, Hamburg) sucht 1,0 gr. und 0,1 kl. Alexandersittich sowie diverse andere einzelne Sittiche. Mtgl. 282 (Schiebe, Liegnitz) sucht Prachtfinken, a. W. i. T. gegen Möwchen oder Waldvögel, tauscht 2,2 junge Möwchen gegen dito zwecks Blutwechsels. — Von einer Firma liegt der A. Z. ein Angebot auf Hirse vor, das Pfd. 850 M., sowie andere Futterarten. Anfragen Rückporto. A. Krabbe.

Der **Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig** beging am 10. Februar im Gesellschaftshaus „Metropol" die Feier der 25. Wiederkehr seines Gründungstages. Ein von Fräulein Böttcher in empfindender, trefflicher Weise zum Vortrag gebrachter Prolog eröffnete den offiziellen Teil unseres Stiftungsfestes. In wechselreicher Folge hielten nun Festreden, Gesangsvorträge und weitere Darbietungen die Anwesenden in ihrem Bann. Nachdem einige „Lieder zur Laute" verklungen waren, übergab die Tochter unsers 1. Vorsitzenden, Fräulein Birk, eine von den Damen des Vereins gestiftete Standarte. Reichen Beifall lösten ihre tiefempfundenen, dem Treiben des Vogelliebhabers abgelauschten Worte aus. Die Festrede hielt unser hochverdienter 1. Vorsitzender, „unser" Joh. Birk. Ausführlich auf die Gründung unseres Vereins eingehend, entwarf er seinen aufmerksamen Zuhörern ein Bild von den nun hinter uns liegenden 25 Vereinsjahren. Treffliche, zu Herzen gehende Worte fand er beim Gedenken derjenige, welche uns vom Tod entrissen wurden. Mit begeisternden Worten forderte er die jetzigen Mitglieder auf, trotz aller Nöte dieser Zeit unsere schöne, edle Liebhaberei wie bisher hochzuhalten. War ihm wohl schon der seiner Rede folgende Beifall Lohn genug, so hatten es sich doch die Vereinsmitglieder nicht nehmen lassen, ihren verehrten Führer durch ein sichtbares Zeichen ihrer Anerkennung und Zuneigung Ausdruck zu verleihen. Anschließend wurde ihm vom 2. Vorsitzenden, Herrn Säring, im Namen des Vereins ein von Herrn Winkler wunderschön gemaltes Bild überreicht. Im weiteren Verlaufe des Abends schritt man zur Ehrung der Jubilare. Die Herren Wilhelm Dietze und Paul Thiel, beide Herren Gründer und Förderer unseres Vereins, waren einstimmig zu Ehrenmitgliedern ernannt worden; während es dem in Schlesien wohnenden Herrn P. Thiel nicht möglich war, an diesem Abend unter uns zu weilen, konnte Herr W. Dietze vom 1. Vorsitzenden herzlich begrüßt und ihm ein Ehrendiplom überreicht werden. Glückwünsche waren eingegangen von der Vereinigung der Vogelliebhaber Landesverband Sachsen; vom Verein der Liebhaber einheimischer Vögel, Berlin; vom Verein für Vogelschutz und -pflege, Dresden; vom Verein der Liebhaber einheimischer Vögel, Leipzig-West; vom Ornithologischen Verein, Leipzig; vom Verein „Kanaria", Leipzig; vom Verein für Vogelkunde, -schutz und -pflege, Oschatz; vom Zoologischen Verein, Zwickau i. S. Eine besondere Überraschung und Ehrung ward uns nachträglich vom Verein der Liebhaber einheimischer Vögel, Berlin, zuteil. Unser 1. Vorsitzender wurde vom genannten Verein zum Ehrenmitglied ernannt und ihm sowie unserm Vereine als „dem jetzt an erster Stelle stehenden Liebhaberverein" ein schönes Diplom überreicht. Gegen 3 Uhr morgens fand unser Fest sein Ende. Mögen all die schönen, so trefflichen, an jenem Abend gesprochenen Worte in Erfüllung gehen zum Wohle unserer edlen Liebhaberei und zum Wohle unseres lieben Vereins — Nächste Sitzungen am Donnerstag, dem 3. und Donnerstag, dem 17. Mai. Vorwerk.

Vereinigung der Vogelliebhaber Sitz Liegnitz. Unsere Versammlungen finden jetzt jeden 2. und 4. Mittwoch im Monat in der Wohnung des Herrn Stachowiak, Neue Goldberger Str. 74 II, welche uns selbiger in liebenswürdigster Weise zur Verfügung gestellt hat, statt. Alle Freunde und Vogelliebhaber sind zu unsern Versammlungen als Gäste herzlich willkommen. J. A.: Friedrich, Schriftführer.

Die Mitglieder der **Zoologischen Gesellschaft Wien, Vereinigung von Tierfreunden,** haben beschlossen, ihre jeden Donnerstag stattfindenden Zusammenkünfte während der Sommermonate bei günstigem Wetter bei ihrem Mitgliede Herrn Norbert Grasl, Wien XXI., Schloßhoferstraße 20, abzuhalten. Der Genannte hat dort im Schatten eines alten Kastanienbaumes ein halbes Dutzend großer Volieren errichtet, in denen nahezu hundert exotische Vögel in über 20 Arten beherbergt und eventuell gezüchtet werden. Gäste herzlich willkommen!

Frl. E. F., Kiel. Die Schachtel kam zertrümmert hier an, enthielt nur den stark zerquetschen Vogel und den Brief. Verpackung in festen Pappschachteln ist durchaus nötig. 1. Mohn, Kürbiskerne, Wal-, Haselnüsse. 2. Allerlei lebende Insekten können statt der Mehlwürmer gereicht werden. 3. Geschälter Hafer ist nicht zu empfehlen. Bezugsquellen kann ich an dieser Stelle nicht angeben.

E. W., Petriceni. 1. Der Vogel hat wahrscheinlich im Spätsommer nicht gemausert und holt das Versäumte jetzt nach, wie das häufiger vorkommt. Daß er unbedingt über ein Jahr alt sei, kann man nicht mit Sicherheit bestätigen. Es konnten ja auch irgendwelche besonderen Umstände den Ausfall der Schwanz- und Schwungfedern veranlaßt haben. 2. Gleich nach der Ankunft, Schlagnetz mit Wurm geködert, früh am Morgen.

Herrn G. B., Nassau. Worauf die Hemmung im Wachstum der Schwingen des einen Flügels zurückzuführen ist, läßt sich von hier aus schwer ermitteln. Es muß einmal abgewartet werden, ob nicht bei der Mauser im Spätsommer wieder normale Federbildung eintritt.

Qualitätsfutter Sanitas

aus gar. nur erstkl. milbenfr. Ingred. 5 Kilo-Pak. à 2850, 10 Pak. à 2800 M.
331] **Sanitasverlag Heidelberg 46.**

Vogelfutter

für Kanarien, Waldvögel, Exoten, Papageien, Weichfresser. Anfragen nur gegen Rückporto. Liste 13 über Vogelfutter 50 M, Liste 5 über Vogelkäfige, Zuchtgeräte usw. mit etwa 400 Abbildungen 150 M. [332

W. Göpel, Leipzig,
Tröndlinring 1. Telephon 14958.

Mehlwürmer

Geg. Einsend. von 2500 M ¼ Pfd. franko.
Größere Posten zum Tagespreis.

Neu eingetroffen: Ein kleiner Posten **Weißwurm**, per Pfund 4000 M exkl. Porto und Verpackung.

Anfragen Rückporto, sonst keine Antwort.

D. Waschinski & Co.
Biesenthal b. Berlin.
333] Postscheckkonto Berlin 34825.

Scharpie, kg 5000 M, **Vilbenpulver**, kg 25000 M, 500 g 13000 M, liefert [334
Doletzky, Heegermühle.

Vögel

Gebe noch einige pr. Paare

Wellensittiche

gegen gute Zigarren und Zigaretten ab.
335] **Syré**, Lehrer, **Viernau.**

Wer tauscht im Frühjahr **Ameisenei mit v. Nachtigallen.** Verkaufe **Rehgeweihe**, nehme a. Stieglitz i. T.
336] **Galle, Forst i. L.**, Trieblerstr. 60.

1 erstklassiges Wellensittich-Zuchtweibchen zu kaufen oder gegen sehr schönen, großen, ausgestopften **Auerhahn** zu tauschen gesucht. [337
A. Jausch, Leipzig, Waldstr. 13 II

Abzugeben ge en Gebot, eventl. gegen Zuchtpaar besserer Exoten: **Die fremdländischen Stubenvögel** von Dr. Karl Ruß, 4 Bände, in Halbleder gebunden, wie neu. Suche auch i Tausch **1,0 Dompfaff-Wildfang** zur Zucht.
Apotheker Pistor,
338] **Oberaula**, Bezirk Kassel.

Gebe ab, evtl. im Tausch

0,1 japanisch. Mövchen, suche 0,2 Wellensittiche.
R. P. Dittes, [339
Bad Schmiedeberg, Bez. Halle.

Exoten gesucht

am liebsten P achtfinken. In Tausch gebe **jap. Mövchen** und Ia **Waldvögel**, letztere in vollem Gesang.
Arthur Schiebe, Liegnitz i. Schl.,
340] Luisenstr. 24 III.

Orangeblaufinken, Indigofinken, Schwarzgimpelfinken, gutsingende **Schwarzkehltrupiale, mexikan. Gelbbrustkernbeißer, 1 Elsterstar, Schuppenwachteln,** leicht züchtend, **Goldbugpapagei, ganz zahmer Ariel-Tukan, Kappenblaurabe, Schwarzkopfnonnen.** Anfrager wollen bitte Rückporto beifügen.
E. W. Lenger, Berlin N 58,
341] Schönhauser Allee 70 a.

1,2 gr. Wellensittiche, 1.1 Bandfinken gegen Gebot abzugeben, tausche auch gegen präp. Vögel oder lebenden Goldfasan. [342
Theodor Bell, Hörde-Dortmund,
Wellinghoferstraße 83.

Kaufe laufend zu konkurrenzlos höchsten Preisen:

Kanarienhähne und -weibchen

sowie **Sing- und Ziervögel, Exoten aller Arten, Papageien, graue, grüne usw.**

Arthur Muschter, Borna b. Leipzig,
Käfigfabrik und Vogelhandel en gros und en detail
Export. Import.
Anfragen Rückporto beifügen. [343

Reform-Käfige

Zerlegbar · Leichteste Reinigung · Einfachster sicherer Transport
1. Preis beim Käfig-Wettbewerb Leipzig 1919 (s. Ges. Welt 1920, Heft 14—16)
werden für alle Vogelarten hergestellt.
Goldene Medaille Leipzig 1921.

Ausführung: Hartholz, grünlackiert oder naturlackiert, Zinkschublade, Porzellannäpfe, Ledertuchdecke.

Keine Fabrikware, sondern beste Spezialarbeit!
Anfertigung als Kistenkäfig oder Wiener Form (halboffen) oder halboffen mit fester Rückwand. Ohne jedes Werkzeug in einer Minute zusammengestellt resp. zerlegt. Verpackung zum Selbstkostenpreis.
Fertigen auch jede Art Käfige u. Volieren n. Zeichnung od. Maßangabe.

Anfragen Rückporto beifügen
Katalog gegen Einsendung von 150 Mark in Briefmarken.

Schlagnetze ohne Mittelsteg
für schädliche Vögel, prima handgeknüpfte Ware.

Kühn & Muschter, Inh. Arthur Muschter,
Borna b. Leipzig, Kasernenstr. 4.
Spezialwerkstätte für Käfigbau.
Bank-Konto: Allgemeine Deutsche Credit-Anstalt Zweigstelle Borna.
Stadt-Girokasse Borna b. Leipzig Nr. 1506.
Postscheck-Konto: Leipzig 92250. Fernsprecher 147. [344
Zahlreiche Anerkennungs- und Dankschreiben.

Papageien Kanarienhähne Bastarde

kauft höchstzahlend und tauscht auch auf Exoten

Willy Odenwald, Fulda.

Eigner Export und Import. [345

Suche [346

Schindler-Ideal-Käfige

mit seitl. Glasverkleidung, Sprosser oder Nachtigalgröße.
Ornithologische Literatur
Gebe eventl. in Zahlung: **frische Ameiseneier** (jed. Quantum abgebb.)
Dörsing, Köln-Efeld., Thielenstr. 5

Suche **junge Zebrafinken**, Männchen oder Weibchen, gegen gl ichsolche zwecks Blutauffrischung zu tauschen; eventl. kaufe auch solche. [347
E. Türck, Chemnitz, Henriettenstr. 51.

Vertausche laut., feur. Rotkehlchen oder **Schwarzköpfchen gegen Ia. Reitzugfink.** [348
Riedel, Gittersee, Dresdner Str. 19.

Suche:

Gefiederte Welt 1874 u. 1890, Ornith. Monatsschr 1876 u. 1877, Ornith. Monatsberichte 1922 (auch mit kurzer Reihe and Jahrgänge) u. and. ornithol. Bücher. [349
Otto Bretschneider, Neustadt i. Sa.

Inserate

für das am 17. Mai 1923 zur Ausgabe gelangende Heft 10 der Gefiederten Welt erbitten bis 11. Mai früh.

Die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit **10 Pfg. Grundpreis** berechnet, der mit der vom „Börsenverein der Deutschen Buchhändler" bestimmten Teurungszahl — zurzeit „2500" — zu multiplizieren ist. — Auslandspreis —,10 Schweizer Franken.

„Ornis" [350

Freie Bezugs-Vereinigung der Waldvogel-Liebhaber Deutschlands
bestand von 1912 bis 1. Oktober 1920. Durch sachgemäße und reelle Belieferung der Mitglieder mit Vogelfutter u. Bedarfsartikeln erwarb sie sich einen Ruf, der noch fortbesteht. — Auf vielseitigen Wunsch bringe ich diese Tatsache in Erinnerung, auch allen denjenigen, die von dem Bestehen derselben noch keine Kenntnis haben. — Ein **Benachrichtigungsblatt** kann leider **nicht** mehr erscheinen, doch ist das Ornis-Haus nach wie vor bestrebt, die besten von allen am Markte erhältlichen Artikeln zu liefern, das mir geschenkte Vertrauen werde ich weiter zu erhalten wissen. — Über meine Tätigkeit gibt das „Ornis-Buch" Auskunft. Rabatt kann **nicht** mehr gewährt werden, doch kommen nur brauchbare Mischungen zum Versand. Bei Anfragen erbitte ausreichendes Rückporto und Angabe der vorhandenen Vogelarten. — Auskunft bereitwilligst. Bücher und Blätter sende für 800 M. frei (Ausland 2400 Mk.)

Ornis-Haus, Halle a. S.
Fernruf 4198
„Reform · Normal"-Weichfutter nach Angabe des Herrn Ap thek. Adalbert Jena-Biberach-Riß. Moderner elektr Betrieb Gleichmäßige Körnung, restloser Verbrauch garantiert.

Ostafrikanische Waffensammlung

1 langes Araberschwert mit breit. Lederscheide, 1 Horn einer Säbelantilo als Stoßwaffe, mit Ledereinfassu 90 cm lang, 1 Köcher mit 11 Pfeil und 1 Bogen, 1 Antilopengehör 1 Jagdtasche, 4 Dolche mit Lederscheid 3 geflochtene Teller, 2 holzgeschni Haarkämme, 1 Schnupftabakdose, 6 St Steingeld der Ureingebornen, 1 22 lange griechische Landschildkrötensch zu verkaufen gegen Höchstgebot.

Dr. Karl Ruß: Die Papageien, i Naturgeschichte, Pflege, Züchtung Abrichtung. 891 S., in Leder Gebr. Ortleb: Der Kanarienvogel. 18 St. Olbrich: Der Rose Zucht Pflege. 261 S., in Leinen. Starcke: Praktische Kaninchenzu 240 S., in Leinen. Hans Geyer: Katechismus für Te rumliebhaber. In Leinen. Hermann Lachmann: Das Terrari Ankenbrand: Das Terrarium. Letztere beiden im Einband etwas lädi Karl Neunzig: Gefiederte Hausfre Pflege fremdländischer Stubenv 51 Abbildungen und 68 S. im Tausch gegen Sing- oder Nymp sittiche usw. oder seltene Körnerfr Exoten. Bei Anfragen Rückporto.

Richard Huth
Perleberg.

Verkaufe:

Karl Neunzig, Die einheimi Stubenvögel, 6. Aufl., mit 22 F tafeln und 188 Textabbildung **Karl Neunzig, Die fremd Stubenvögel**, 5. Aufl., mit 42 F tafeln und 400 Textabb. Beide neu in extra starkem Einband zus 120000 M.
Bahrenburg, Bremen 13, u.

Gefiederte W

1. Quartal 1923, **Zimmerfontä Wasserpumpe**, 40 l pro Stun Riemenantrieb, zu kaufen gesucht Angebote an **Rosendaal, Emm**
353] Heerenberger Str.

Gr. Naumann Bd. 2, 3, à 14500 M, **Ges. Welt** Jg. 12 15 usw. à 4000 M, Neunzig, **Stubenvögel** 14000 M u. viele Werke spottbillig abzugeben od Jagdsachen zu vertauschen.
Dluczewski, Hermsdorf b.
354] Sollquellstraße 15.

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Hermsdorf bei Berlin; für den Anzeigenteil: Franz Wunderlich, Magdeburg, Postschließfa
Verlag der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck: August Hopfer, Burg Bz. Mgdbg.

Jahrgang LII.
Heft 10. 17. Mai 1923.

Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Die Gefiederte Welt gelangt am Donnerstag nach dem 1. u. 15. jedes Monats zur Ausgabe und kostet für Monat Mai 750 Mark. Einzelpreis des Heftes 400 Mark.
Auslandspreis für das Vierteljahr 2 Schweizer Franken, für das Heft 0,35 Schweizer Franken.
Inserate für die folgende Nummer müssen bis spätestens Freitag früh in Händen der Verlagsbuchhandlung sein. Die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 10 Pfg. Grundpreis berechnet, der mit der vom „Börsenverein der Deutschen Buchhändler" von Zeit zu Zeit bestimmten Teuerungszahl zu multiplizieren ist. Die Teuerungszahl ist zurzeit „3000". — Auslandspreis für die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum —,10 Schweizer Franken.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung (M. Kretschmann) in Magdeburg.

Postschließfach 148. Postscheckamt: Magdeburg 3148. Fernsprecher: 1323.

Über Vogelhaltung und ihre Voraussetzungen.

Von A. Adlersparre.

(Nachdruck verboten.)

Für jedes menschliche Streben ist es nicht nur förderlich, sondern ein unabweisbares Bedürfnis, sich von Zeit zu Zeit auf seinen Inhalt — sein Ziel, seine Mittel und seine Begrenzung — zu besinnen. Dies gilt von der Vogelhaltung ebensowohl wie von jeder lebenskräftigen Kulturäußerung. Denn diejenige Bewegung, die nicht länger sucht, prüft und sich selbst erneuern, vertiefen und richtigstellen will, deren Zeit ist schon aus. Stillstand ist Tod. Vielleicht machen die Schwierigkeiten, die sich nunmehr allerorts gegen die Vogelhaltung aufzutürmen scheinen, sowohl die äußeren von der immer besser organisierten und vorsichtiger arbeitenden Tierschutzbewegung als die inneren von den ökonomischen Umwälzungen in allen Ländern, die nach dem Kriege so viele der alten bewährten Namen mehr oder minder in den Hintergrund geführt und ganz neue vorangestellt — vielleicht machen diese Schwierigkeiten den Zeitpunkt für eine Selbstprüfung wohl geeignet.

Was will die Vogelhaltung? Die Vogelhaltung setzt sich mehrere Ziele. Sie will ihren Ausübern Freude und Zerstreuung bereiten, sportliche und ästhetische Interessen anregen, will innerhalb ihrer gegebenen Grenzen unsere Kenntnis von der Vogelwelt und von den biologischen Gesetzen, denen diese unterworfen ist, verbreiten und bereichern. Letztere Bestrebungen bilden ihre Grundlage; mit ihnen steht und fällt die ganze Vogelhaltung. Denn ohne eingehende Kenntnis von den großen biologischen Kausalzusammenhängen, von den Beziehungen zwischen Außenwelt und Lebewesen und ohne folgerichtige Anpassung der Gefangenschaftspflege, wird Vogelhaltung nichts anderes als ein Koloß auf zerbrechlichen Lehmfüßen. Zwar kann man eine überwältigende Summe mehr oder minder zufällig gefundener Details, subtiler Verhaltungsmaßregeln zur Durchführung eines liebhaberischen Massenbetriebes haben. Was man aber nicht bekommt, das ist der klare zusammenhaltende Überblick, der uns allein sagen kann, sowohl wo die Schwierigkeiten liegen und in welcher Richtung diese zu lösen sind, als die Hilfsmittel hierfür, und der uns die vorliegende Wirklichkeit von neuen Gesichtspunkten betrachten und verstehen läßt — zum Frommen unserer Pfleglinge. Denn bei der Vogelhaltung handelt es sich ja nicht um nur sinnreiche Mechanismen, die bequem und ohne größere Verantwortung nach erster bester Schablone behandelt werden können, sondern um hochstehende lebende Geschöpfe, die ihren natürlichen Außeneinflüssen (Milieukonstellation) entrissen sind und denen es also unsere sonnenklare Pflicht ist, vor allem anderen diese Außenbedingungen, insoweit sie von physiologischer Bedeutung sind, in der Gefangenschaft wiederzuschenken. Denn ebenso grundlos wie die Behauptung, daß der Vogel von einer nach jetztzeitigen Begriffen korrekten Pflege gequält werden könnte — ein Standpunkt, den sogar die Tierschutzfreunde, wenigstens der denkende Teil von ihnen, schon längst aufgegeben haben —, ebenso unzweifelhaft ist es, daß ungenügende Rücksicht auf die biologischen Fundamentalgrundsätze der Pflege dem Tiere viele körperliche Leiden verursachen kann und daß also eine nach antiquierten Prinzipien arbeitende Pflege nur allzu leicht das wird, was wir jedoch alle innigst haben vermeiden wollen — Tierquälerei!

Zur zeitgemäß richtigen Pflege kann gewiß der einzelne Vogelwirt auf mehreren Wegen kommen. Aber ebenso gewiß ist, daß keiner von diesen Wegen be-

quemer ist oder rascher zum Ziele führt als der, welcher über den zuverlässigsten Teil der Stubenvogelliteratur geht, d. h. über diejenige Literatur, die, was Deutschland betrifft, unter der vieljährigen, ausgezeichnet sachkundigen Leitung steht, die uns allen wohlbekannt ist. Vogelhaltung ist nun einmal — das kann nie genug betont werden — nicht irgendwelches Vollendetes, hinsichtlich der Methodik ein für allemal feststehendes. Ruß brachte sie einen Riesenschritt vorwärts, auf die Höhe des derzeitigen Wissens. Und wir ehren ihn dafür, aber nicht blindlings, sondern in klarer Einsicht von der Begrenzung alles menschlichen Werkes. Nach seiner Zeit hat die biologische Forschung wie nie früher Riesenfortschritte gemacht. Neue große Wissenschaftsgebiete sind erschlossen. Und die Vogelhaltung muß sich von Jahr zu Jahr nach den erscheinenden Forschungsergebnissen modifizieren. Selbstverständlich ist es dem einzelnen Vogelpfleger nicht möglich, das alles zu verfolgen, was innerhalb der vielen medizinischen und naturwissenschaftlichen Fachdisziplinen ausgeforscht und erörtert wird, welche unter die Hilfswissenschaften einer zielbewußt arbeitenden Vogelhaltung gerechnet werden müssen, sondern unter vielem anderen gehört es zur vogelpflegerischen Fachliteratur, das Erforderliche in für Tierhaltung herausgearbeiteter, möglichst zugänglicher Form zurechtzulegen, in bestem Einklang mit und Fortsetzung von Ruß' seinerzeitigen Wirksamkeit. Diejenigen, die auf diesem Gebiete schriftstellerisch tätig sind, tun sicherlich nach bestem Können dies gerne und ohne Dankbarkeit zu beanspruchen. Was aber dabei nicht zu vermissen sein dürfte, das ist, daß diejenigen Vogelwirte, zu deren Bequemlichkeit und Vorteil — nicht ohne Mühe und Aufopferung — gearbeitet wird, auch in rein egoistischem Interesse — soweit nun ihre Tierfreundlichkeit, was mehr ist als bloß ein Bekenntnis des Mundes —, diese Fachliteratur unterstützen wollen. Sonst wird hierhergehörende Arbeit, wo es auf Veröffentlichung ankommt, meinungslos, gemißbrauchte Arbeitskraft. (Schluß folgt.)

Die Zucht des Zebrafinken.

Von Karl Buschendorf.

(Nachdruck verboten.)

Als ich nach den Kriegsjahren wieder anfing, Exoten zu halten, so war das erste, was ich mir zulegte, ein Paar Zebrafinken. Allen bekannt, ist dieser schöne Vogel wohl einer der beliebtesten Prachtfinken. Seine ansprechende Färbung und sein munteres, zutrauliches Wesen sind so recht dazu angetan, ihm eine Vorzugsstellung bei den Liebhabern ausländischer Vögel einzuräumen, zumal er zu den am leichtesten züchtbaren Stubenvögeln zu zählen ist.

Vielen Lesern wird die Zucht gelungen sein. Wenn ich aber im folgenden meine Erfahrungen zum besten gebe, so wird doch vielleicht mancher Anfänger in der Exotenliebhaberei einiges Wissenswerte daraus entnehmen können und vor mancher Enttäuschung bewahrt bleiben. Im Ruß-Neunzig heißt es sehr richtig, daß die Erfahrungen, die man mit der Zebrafinkenzucht macht, für die gesamte Stubenvogelzucht maßgebend sind. So ist es in der Tat. Mit einem Paar Zebrafinken kann man alles erleben; vom Legen einzelner Eier ohne zu Brüten bis zum anstandslosen Aufziehen gleich des ersten Geleges mitten im Winter ohne frische Ameisenpuppen. Bei kaum einem anderen Vogel ist mir eine so große individuelle Verschiedenheit aufgefallen wie bei ihm. Der eine ist verträglich mit anderen und seinesgleichen, der andere wird zum ständigen Angreifer und Störenfried auch außerhalb der Brutzeit. Einer ist fast ruhelos und stürmisch zu nennen, der andere beinahe bedächtig und gemessen. Importierte und gezüchtete machen nach meinen Erfahrungen keinen Unterschied. Sehr verschieden ist auch die Futteraufnahme der einzelnen Individuen; dieser frißt ausschließlich Senegalhirse, jener Kanariensaat, die von anderen ganz verschmäht wird; die einen nehmen — und das ist für die Zucht sehr wichtig — Mehlwürmer, die anderen Eifutter und wieder andere — weder Ei noch Mehlwürmer, sondern an Aufzuchtfutter nur frische Ameisenpuppen. Darin liegt die Hauptschwierigkeit der Zucht. Doch davon später.

Hat man nun ein Paar Zebrafinken und will sie zur Brut schreiten lassen, so tue man das nicht früher, als bis sie ein bestimmtes Alter erreicht haben. Eine Zeitspanne anzugeben, halte ich für unzweckmäßig; man merkt das im allgemeinen am Benehmen der Vögel, ob sie zur Zucht taugen, auch kennt man ja das Alter niemals, wenn man vom Händler kauft. Legen die Weibchen im Verlauf des Nistens einzelne Eier, so sind sie bestimmt zu jung, und man tut gut, ihnen dann noch eine Weile die Nistgelegenheit zu entziehen. Es gibt welche, die nicht vor einem Jahre zur Zucht taugen, und das dürfte als Norm gelten; bei mir nistete aber auch im Sommer 1922 ein selbstgezüchtetes Männchen im Alter von knapp fünf Monaten mit einem importierten Weibchen zusammen in sechs Bruten hintereinander mit bestem Erfolg.

Steht eine Vogelstube zur Verfügung, so lasse man die Zebrafinken kurzerhand fliegen, sie werden sich dann selber die ihnen am meisten zusagende Nistgelegenheit wählen. Sollen sie im Käfig nisten, so sei derselbe nicht zu klein, zu groß kann er gar nicht sein. Als Nistgelegenheit hänge man ein Harzerbauerchen, mit Leinwand überspannt, oder ein vorn halb offenes Kästchen von außen an den Käfig an. An Nistmaterial reiche man allerlei Fasern, Grashalme, Moos, Papierstreifen, Fäden, Holzwolle und zum Auspolstern der Nestmulde kurze Tierhaare und gezupfte Leinwand. Die Vögel werden sich meist nicht lange nötigen lassen und alsbald mit dem Nestbau beginnen. Ich möchte hier auf ein Rezept des seligen Pfarrer Blume hinweisen, bei Käfigzucht immer nur eine Nistgelegenheit anzubringen. Gelegenheit macht Diebe. Dem Männchen könnte doch mitten in der Brut das andere Kästchen besser gefallen, es trägt dann, wenn gerade das Weibchen am Brüten ist, einige Halme ein, vielleicht nur aus langer Weile in dem engen Gelaß, es versäumt dann die rechtzeitige Ablösung des Weibchens und die Brut kann gestört werden. Während des Nestbaus vermeide man jedes Nachsehen; sitzen die Vögel, so tut der Anfänger gut, wenigstens bei der ersten Brut seine Neugierde ganz zu bezähmen; zu leicht kann etwas

verdorben werden. Bei Zebrafinken ist auch das Nachsehen durchaus unnötig, denn die Vögel helfen sich immer selbst. Es könnte nur schaden, aber niemals nützen. Wenn ja ein taubes Ei da sein sollte, was übrigens selten vorkommt, so wird es aus dem Nest befördert, ebenso eingegangene Junge.

Soweit, nämlich bis zum Schlüpfen der Jungen, geht die Sache meistens gut, aber nun kommt die große Sorge, werden die Alten das Aufzuchtfutter annehmen? Gehen sie vorher nicht ran, so mache man sich keine unnötigen Gedanken; vom Aufzuchtfutter genommen wird fast stets erst, wenn Junge da sind. Allen Sorgen überhoben ist man meistens, wenn man frische Ameisenpuppen beschaffen kann. Gewiß, es kommen auch Fälle vor, wo die Jungen nicht aufgezogen werden, weil das Weibchen einfach wieder zu legen beginnt; aber in den meisten Fällen ist es das Aufzuchtfutter, das von dem betreffenden Paar nicht angenommen wird. Rührend ist da die rastlose Angst, mit der ein solches Paar den ganzen Käfig nach Nahrung für die Jungen durchsucht, nur an das Aufzuchtfutter kann es sich nicht gewöhnen, und bald liegen die Jungen herausgeworfen tot am Boden. Hat man ein solches Paar, so heißt es alles erdenkliche versuchen, damit die Jungen über die ersten Tage hinwegkommen. Vielfach kann man sich mit Mehlwürmern helfen; werden solche mit Begier gefressen, dann hat man meistens gewonnen. Man muß dann nur sechs- bis achtmal am Tage füttern, jedesmal drei bis vier große Würmer mit eingedrücktem Kopf und zerschnitten. Mit den zerschnittenen Mehlwürmern wird dann auch immer eine Wenigkeit vom Eifutter mit aufgenommen. Man darf dabei nicht ängstlich sein, die Vögel zu überfüttern; ein Nest mit Beispielsweise sechs Jungen kann ziemliche Mengen vertilgen. Nimmt nun aber ein Paar auch keine Mehlwürmer, immer vorausgesetzt, daß keine frischen Ameisenpuppen zur Hand sind, und will durchaus nicht ans Eifutter, so kann man sie manchmal zur Annahme bewegen, wenn man das Eifutter einfach in den Sand gibt; bei dem Suchen nach Nahrung für die Jungen nehmen die Vögel dann davon auf.

Das bekömmlichste Futter für die Nestjungen ist nach meinen Erfahrungen hartgekochtes Ei mit wenig Eierbrot. Gebrühte Ameisenpuppen und Weißwurm werden meist nur wenig genommen, wenn Ei gereicht wird. Frische Ameisenpuppen sind insofern bequemer, als sie von allen anstandslos gefressen werden, aber sie haben den einen Nachteil, daß die Alten den Jungen meist alles gleich hineinstopfen und dann nichts mehr haben bis zur nächsten Fütterung. Da habe man nur ja kein Mitleid und lasse sich verleiten, den Napf immer wieder zu füllen; ein Darmkatarrh der Jungen wäre die Folge. Ein anderer Nachteil der frischen Puppen ist der, daß sie nicht immer mit unbedingter Regelmäßigkeit zu beschaffen sind, auch nicht, wenn man sie selber im Walde sammelt. Kommen dann einmal 14 Tage Regenwetter, so ist man in der größten Verlegenheit, denn die Vögel wollen dann meist nichts anderes fressen und die Brut geht unter Umständen zugrunde. Sind die Jungen erst einige Tage alt, so reiche man auch über Nacht in kaltem Wasser eingequellte Sämereien, je nachdem, was das alte Paar am liebsten frißt. Die Körner müssen zwischen einem Tuch vor der Verfütterung lufttrocken gerieben werden. Leider nur für wenige zu beschaffen, und auch dann nur für einige Wochen, ist unreife Kolbenhirse, die ein ausgezeichnetes Aufzuchtfutter abgeben soll. Mit Grünkraut in der Nistzeit bin ich vorsichtig; ich weiß sehr wohl, daß andere bessere Erfahrungen damit gemacht haben und Grünes in der Hecke nicht missen wollen.

Sind die Jungen ausgeflogen, so lasse man sie noch ungefähr 14 Tage bei den Alten, die dann zu einer neuen Brut schreiten wollen. Man gebe tunlichst nicht eher Baustoff, als bis man die Jungen entfernt hat. Dadurch wird erstens erreicht, daß die Pausen zwischen den einzelnen Bruten länger



Zebrafink.

werden, was den Vögeln nur dienlich sein kann, und zweitens werden die Alten durch das Herausfangen der Jungen gar zu leicht gestört, wenn sie schon mit der nächsten Brut begonnen haben. Die Jungen stecke man in einen anderen geräumigen, hellen Käfig, der ruhig in demselben Zimmer hängen kann, und gebe ihnen ein altes Nest zum Übernachten; sonst kann man leicht durch nächtliches Toben, zu dem alle jungen Vögel neigen, Verluste haben. Damit sich die Jungen nun gut entwickeln, sei die Ernährung möglichst mannigfaltig. Keinesfalls fehlen darf jetzt Grünkraut und Badewasser. Wenn auch der alte Vogel vielleicht beides ohne Nachteil für seine Gesundheit eine Weile entbehren kann, so nicht der junge. Stoffwechselstörungen sind die unausbleibliche Folge. Wenn man aber jede Woche ein paarmal Grünes ab und zu ein wenig Eifutter und alle Tage frisches Badewasser gibt, so wird man an der Entwicklung und schnellen Verfärbung seine Freude haben.

Licht, nicht zu enger Raum, Ruhe und ein offenes Auge für die Bedürfnisse des Vogels sind die Vor-

bedingungen zu einer erfolgreichen Zucht. Wer dann noch einen anfänglichen Mißerfolg verschmerzen kann, der wird mir darin übereinstimmen, daß der Zebrafink zu den begehrenswertesten Zuchtvögeln zu zählen ist.

Etwas vom Gelbspötter.

Von Oscar Stauder, Ulm.

(Nachdruck verboten.)

Jeder Liebhaber hat seine bestimmte Art, die ihm besonders ans Herz gewachsen ist, so ist dies bei mir der Gelbspötter. Von allen Weichfressern, welche ich käfige, ist er immer derjenige, auf welchen ich mein größtes Augenmerk richte. Schon sein Äußeres kennzeichnet ihn als einen echten Sänger, der langgestreckte Kopf, der plattgedrückte Schnabel, das lebhafte Auge, verraten etwas ganz besonders. Kaum bei einer andern Art sind diese Merkmale so scharf gekennzeichnet.

Schon in meiner Jugend, als ich noch unerfahrener Liebhaber war, hegte ich den Wunsch, einmal näher mit diesem Imitator bekannt zu werden. Aber ich mußte mich lange gedulden, meine Fremdenjahre, der leidige Krieg, waren alles Hindernisse, die das ideale Ziel zurückdrängten. Im Winter 1919 erhielt ich von einem erfahrenen Liebhaber zwei Exemplare, einen alten Wildfang und ein jung aufgezogenes Männchen. An Leistungsfähigkeit übertraf der Alte den Jungen bei weitem. Wer überhaupt bei dieser Art auf gute Sänger reflektiert, darf es nur mit Wildfängen versuchen. Den zweiten Alten fing ich selbst samt der Brut und schenkte den flüggen Jungen nebst dem vermutlichen Weibchen die Freiheit. Welche Freude, einen selbstgefangenen Spötter zu besitzen. Ich sollte eines andern belehrt werden.

Als es Weihnachten zu ging, sehnte ich mich Tag für Tag nach dem herrlichen Gesang, der Vogel kam schön in die Mauser, und ich glaubte keinen Fehlgriff gemacht zu haben. Es wurde März, April, aber mein Spötter ließ nichts von sich hören. Diese Enttäuschung! Ich hatte ein sicheres Weibchen gekäfigt. Mich reute das teure Futter, denn jeder Liebhaber, der sich schon mit diesem heiklen Burschen befaßte, wird mir recht geben, wenn ich behaupte, daß der Spötter ziemlich am teuersten zu stehen kommt von sämtlichen Weichfressern. Die vielen Ameisenpuppen, die Mehlwürmer, alles umsonst. Jedoch ich ließ den Mut nicht sinken, und freute mich auf den nächsten glücklichen Fang. Der geehrte Leser wird staunen, wenn ich zu meinem Leidwesen berichte, daß es mir noch ein zweitesmal so ging. Das Geschlecht dieser Art ist sehr schwer zu erkennen, auch kann ich mit Bestimmtheit sagen, jedesmal den schöner gelb gefärbten Vogel behalten zu haben. In unserer Gegend sind diese Vögel kaum anders zu erhalten als bei der Brut. Fang mit Lockvogel, am Wasser usw. sind bisher ohne Erfolg geblieben. Letzteres möchte ich auch vom Pirol berichten.

Anfangs Mai, oft auch in den letzten Tagen des April, kehrt der Spötter von seinem Winterquartier zurück. Als Aufenthaltsort wählt er meistens Kastanienalleen, weniger belebte Parks und Laubwälder mit dichtem Unterholz. Er ist ein echtes Sonnenkind und gegen Kälte sehr empfindlich. Bei warmem Wetter vernimmt man alsbald seine lieblichen Weisen, dabei in steter Bewegung oder nach Fliegen haschend. Ich glaube, daß kaum ein anderer Sänger die Aufmerksamkeit des Liebhabers in diesem Maße auf sich zu lenken weiß, wie gerade unser Spötter. Manchmal ist es die reinste Überraschung, bald glaubt man einen Schwarm Stare zu hören, dann wieder den Lockruf der Schwalben, Flötenrufe des Pirols und viele andere mehr. Hier wird der Spötter um so mehr geschätzt, da die Nachtigall vollständig fehlt und er dieselbe somit ersetzt.

Die Eingewöhnung im verhüllten Käfig mit frischen Ameisenpuppen geht leicht vor sich. Mit dieser Fütterung fährt man am besten so lange fort, als erstere überhaupt erhältlich sind. An diesen einmal abgefressen, ist er leicht an das Mischfutter zu bringen. Von Universalfuttern ist nur das Beste zu reichen, da sonst kaum längere Zeit auf Erfolg gerechnet werden darf, denn kaum ein anderer Sänger spiegelt Wartung und Pflege in diesem Maße wieder, wie gerade der Spötter. Mein Mischfutter, welches ich von August ab reiche, besteht aus feingehacktem, gekochtem Rindfleisch, Weißwurm mit Möhre angefeuchtet, vermengt mit den besten Ameisenpuppen. Ab und zu etwas gemahlenen Hanf, da durch diese Zugabe schönes Gewölle ausgeworfen wird. Meiner Ansicht nach ersetzt dieser Insektenflügel und andere unverdauliche Stoffe, die auch in der Freiheit als Gewölle ausgeworfen werden. Vom Oktober ab beginnt die Wurmfütterung, täglich 4 Stück, morgens vor der Futtergabe und abends, nachdem das Mischfutter gefressen ist. Die Tagesportion ist am besten in zwei Rationen zu geben, da bei hoher Temperatur, welcher dieser Vogel beansprucht, das Futter zu sehr austrocknet und somit ungenießbar wird. Gegen Weihnachten reiche ich immer mehr Würmer, bis sich die Zahl in der Mauser auf 30 Stück erhöht. Ganz besonders möchte ich betonen, niemals Würmer während der Tageszeit zu füttern, da sonst der Spötter immer mehr Abstand nimmt vom Mischfutter. Auch bei allen andern Arten ist es empfehlenswert, Würmer nur morgens und abends zu reichen, weniger aus vorher erwähntem Beispiel, mehr um die Bettelei zu verhüten. Anstatt mit Gesang begrüßt zu werden, sieht der Pfleger bei seinem Eintritt bloß neugierige Köpfe, die auf Leckerbissen warten.

Gesanglich stelle ich den Spötter neben unsere Nachtigall. Es ist dies natürlich mein persönliches Urteil. In diesem Punkte gehen die Ansichten der Liebhaber weit auseinander. Bei all meinen Sängern ist das Bild erst vollkommen mit der Einreihung des Spötters. Besonderen Vorzug andern gegenüber gebührt ihm dadurch, weil man lange nicht in diesem Maße die dummscheue Springerei anzuhören hat, besonders abends bei Licht, was viele andere Arten oft nach langer Käfigung nicht unterlassen. Als gute Empfehlung möchte ich noch bemerken, daß Altmeister Rausch, Wien, seinen Berichten nach alljährlich 8 bis 15 Köpfe durchwinterte. Ein Besuch hätte sich damals gelohnt! Zum Schluß rufe ich jedem Liebhaber zu, dem es an Zeit, Geduld und Geld nicht fehlt, es einmal mit diesem idealen Sänger zu versuchen. Auch hier bleibt der verdiente Lohn nicht aus.

Redet ein zahmer Vogel mit seinem Pfleger?

Von Emil Kaforke, Berlin.

(Nachdruck verboten.)

Ob zahme Tiere mit ihrem Pfleger reden, kann nur der beurteilen, der Tiere selbst verpflegt und in deren Seelenleben soweit eindringt, daß er jede Gefühlsäußerung richtig zu deuten vermag. Menschen, welche sich nicht in Verbindung mit der Tierwelt befinden, verbreiten Deutungen, die dem logischen Denken direkt wiederstreben.

„Meint doch Spinoza: „Außer dem Menschen gebe es im Umkreise der Natur kein Wesen, an dessen Geistesart wir uns erfreuen und das wir uns in Freundschaft zu irgend einem Verkehr verbinden könnten." Und Strindberg: „Wer Tiere gern um sich duldet, wer seine Liebe an eines dieser Geschöpfe hängt, der zeigt damit, daß es mit dieser Liebe nicht zum besten bestellt ist." Solche Männer, denen eine Unzulänglichkeit zu exaktem Denken nicht gut beigemessen werden kann, sind nur zu verstehen, wenn man eine große Kluft annimmt, die Menschen und Tiere — natürlich mit größtem Unrecht — trennt. Allerdings war August Strindberg, wie sein guter Freund Carl Ludwig Schleich erzählt, ein großer Mystiker, der ihm einst mitteilte: „Er habe durch heiße nächtliche Gebete einen schlechten Menschen zu Tode gebetet."

Nun wir Tierfreunde, Vogelliebhaber, die wir uns als ein Stück der zusammenhängenden Natur betrachten, sind selbstverständlich anderer Meinung. Zwei hochorganisierte Wesen, die sich seelisch nahestehen, erstreben Verständigung, sie reden miteinander. Die Sprache ist es, die uns bindet, das Band von Herz zu Herz schneller und fester schlingt. Ja, sie müssen sich unterhalten, sie werden getrieben durch eine nicht zu unterdrückende Daseinsfreude. Und das gilt für Menschen und Tiere. Zu berücksichtigen ist die Art und Weise der gegenseitigen Mitteilung, die durch Laute, Gesten und Geberden erfolgt. Wie sich Pferde, Hunde, Katzen ihrem Freunde gegenüber verhalten, darf als bekannt vorausgesetzt werden, wie ein zahmer Vogel seine Gunst dem Pfleger kundgibt, zeigen meine Lieblinge.

Zwölf Jahre alt, erhielt ich die Aufgabe, in Abwesenheit meines Vaters eine Nachtigall und mehrere Kanarienvögel mit Futter und Wasser zu versorgen. Die Sängerkönigin, die mein Vater im nahen Stadtwalde selbst gefangen hatte, war berufen, die jungen Kanarien zu Nachtigallenschlägern auszubilden; sie war der erste Vogel, welcher mit mir redete. Wie meine Angehörigen versicherten, wurde das Tierchen schon unruhig, sobald ich den Hausflur betreten hatte, es kannte Schritt und Tritt von mir genau. Im Zimmer angelangt, mußte ich, um das seelische Gleichgewicht meines Pfleglings herzustellen, sofort an den Käfig, einige liebe Worte sagen und den Schnabel berühren. Hierauf gab die edle Sängerin ihre herrlichen Weisen zum besten. Der Ausdruck des schönen Auges ist nicht zu beschreiben, nur zu empfinden. Die tiefbewegende Handlungsweise des Tieres wurde nicht durch gereichte besonders schmackhafte Nahrung, sondern einzig und allein durch meine hingebende Freundschaft ausgelöst.

Hochbeglückt kam ich eines Tages nach Hause, ein alter Vogelfänger hatte mir einen Star geschenkt. In kaum zehn Minuten saß der neue Gast in einem ausrangierten Kanarienheckkäfig und ließ eine Stunde später sein wundersames Geschwätz deutlich hören. Meine liebe Mutter und ich freuten uns gerade über den prächtigen Kerl, als mein Vater die Tür öffnete, die Sachlage gleich erfaßte und mir bedeutete, daß für derartige Gesangskünstler kein Platz in seinen Räumen wäre. „Die Sorte verdirbt Nachtigall und Kanarienvögel, raus!" — Also in meine Vogelstube, welche sich im sogenannten Hinterhause befand und von Kanarienweibchen, Stieglitzen, Zeisigen bewohnt war. Matz erhielt, da ich eine Züchtung der anderen Insassen nicht beabsichtigte, sofort die Freiheit, um sich nach Herzenslust auszutummeln. Langsam, aber sicher wurden wir sehr gute Freunde; er flog auf meine Schulter, spielte, indem mein Bleistift ihm begehrenswert erschien, er erzählte viel und repräsentierte einen überaus angenehmen Gesellschafter.

Gartensänger.

Wie ein Hund vor dem Hause seinen Herrn erwartet, so saß Matz auf dem Fensterbrett, das ihm die Aussicht auf die Straße bot, um zu erspähen, ob ich nicht bald meinen Weg zu ihm nähme, da nach seiner Beobachtung der Unterricht zu Ende sein müßte. So bot mir der Vogel köstliche Stunden.

Als Student erwarb ich auf einer Berliner Vogelausstellung in der guten alten Zeit für 10 M. einen fehlerhaft pfeifenden Dompfaffen, der seinen Standort auf meinem Arbeitstisch erhielt. Nach wenigen Tagen waren Hans und der neue Gebieter die intimsten Stubengenossen. Kein Vogel hat mir seelisch näher gestanden, als dieser buntgefiederte Landsmann. Er ist die Ursache, daß ich den Dompfaff für sprachbegabt halte, denn Laute und Geberden, mit denen dieser Vogel eine Verständigung herbeiführte, waren so menschlich zärtlich, daß man an eine Seelenwanderung hätte glauben können. Er pfiff sein „Blau blüht ein Blümelein" zu jeder Stunde, wie oft ich es auch wünschte. Ein glückliches Dreiblatt: Ein Blümelein, Hans und ich! — Mein Blümelein hatte treue, blaue Augen.

Ein anderes Bild: Ornisausstellung in Berlin. Zwei Schritt vor mir ging der körperlich kleine, aber geistig große Dr. Karl Ruß in Gesellschaft einer liebenswürdigen Dame, um dieser die bunten Krumm-

schnäbel vorzuführen. Ein großer Alexandersittich fesselte durch sein prachtvolles Gefieder ungemein viele Besucher, mit denen er jedoch durchaus in keine nähere Berührung treten wollte. Dr. Karl Ruß stand einige Minuten ruhig lächelnd vor dem Vogel, sprach dann liebevolle Worte zu ihm, öffnete den Käfig, und der Bann war gebrochen, der neue Freund kam auf den dargebotenen Finger. Wie ein olympischer Sieger zeigte unser Altmeister mit der hocherhobenen Rechten den herrlichen Papagei den erstaunt dreinschauenden Anwesenden. Mensch und Vogel hatten sich seelisch genähert.

All das zahme Federvolk redet in der ihm eigenen Sprache mit seinem Pfleger, von dem es auch voll und ganz verstanden wird.

Wenn ich an Dr. Karl Ruß denke, dann kommt mir auch die „Gef. Welt" nicht aus dem Sinn. Ihm, ihr und ihm, dem jetzigen Leiter, verdanken wir Vogelfreunde manch frohe Stunden, so daß es heilige Pflicht ist, für die Erhaltung unserer Zeitschrift Sorge zu tragen. Sie redet mit uns klar und deutlich, sie gehört zu den Mitteln, welche die Kultur fördere. Nicht der Verbrauch von Seife bestimmt die Kulturhöhe eines Volkes, sondern die Schöpfungen, die Wissenschaft, Kunst und Natur miteinander verbinden: Museen, Zeitschriften mit lebenswahren Abbildungen, botanische und zoologische Gärten. „Der Menschheit ganzer Jammer faßt mich an", wenn ich mir vergegenwärtige, daß der Berliner Zoo und unsere „Gefiederte" eingehen würden. Das jetzt drückende Joch der alles zerstörenden Überkultur kann nur abgeschüttelt werden, sobald alle Tierfreunde mit jeder zu Gebote stehenden Kraft für das Fortbestehen der wirklichen Kulturstätten vereint eintreten.

Vereinigung der Vogelliebhaber Landesverband Preußen.

Auf die in Heft 6, Blatt 46, zur Kenntnis gebrachten Anträge sind keine Einsprüche erfolgt. Die Generalversammlung findet daher beschlußmäßig im November statt. Wenn die Ausstellungsfrage endgültig geregelt ist, wird Ort, Zeit und Tag bekanntgegeben. Anträge für die Generalversammlung bitten wir jetzt schon in den Vereinen besprechen und uns zusenden zu wollen, damit wir sie zeitig genug in der „Ges. Welt" veröffentlichen können.

Die Vereinigungs-Austauschzentrale bittet um lebhafte Inanspruchnahme. Zusendungen dafür müssen stets bis zum Sonnabend nach dem Erscheinen des Blattes erfolgen.

Neu aufgenommen: Mtgl. S. 69, Hans Seidel, Liegnitz, Friedrichplatz 6; Mtgl. W. 25, Fritz Willigkeit, Berlin N 31, Hussitenstr. 4—5. Mtgl. H. 36 wohnt jetzt Grünstr. 8.

J. A.: Franz Nyncke, 1. Vorsitzender,
Berlin O 34, Königsberger Str. 17.

Der Verband der Vogelschutz- und Finkenvereine für Rheinland und Westfalen (Sitz Düsseldorf)

hält am 10. Juni sein diesjähriges Verbandssingen in dem Garten unseres Sportsfreundes Fritz Nelchen in Düsseldorf, Ulmenstraße Nr. 104, ab. Außer den zwei Wanderpreisen, bestehend in zwei silbernen großen Pokalen im Werte von 300,000 M., werden auch 180,000 M. an Ehren- und Geldpreisen ausgesungen.

Wettstreitsbestimmungen für Scharfsingen!

Punkt 1. Der Wettstreit beginnt um 7 Uhr.

Punkt 2. Der Raum, in welchen das Singen stattfindet, ist dem Publikum bis zur Absperrung freigegeben.

Punkt 3. Jeder Vogel muß weiß eingebunden sein. Der Abstand der Käfige ist von Mitte zu Mitte 75 cm.

Punkt 4. Das Einsatzgeld beträgt für jeden Vogel 300 M. Dieser Betrag ist beim Anmelden zu entrichten. Anmeldeschluß ist der 4. Juni.

Punkt 5. Als Preise werden Geldpreise genommen. Es werden von den anwesenden Vögeln 40% prämiiert.

Punkt 6. Die Verlosung der Nummern nimmt der Vorstand in der vorhergehenden Woche vor. Jeder Besitzer eines Vogels nimmt die Nummerkarte in Empfang und stellt den Vogel auf den mit der Nummer versehenen Platz. Eine Liste des Verbandsschriftführers enthält die Nummern der Vögel, sowie die Namen der Besitzer. Werden die Vögel freigegeben, so wird dem Besitzer der Vogel nach Abgabe der Nummerkarte ausgehändigt. Stellt jemand die angemeldeten Vögel nicht aus, so ist der Einsatz verfallen.

Punkt 7. Jeder Verein stellt vier Punktierer und vier Kontrolleure, die auf dem Anmeldeschein der Vögel namhaft zu machen sind. Kontrolleure und Punktierer eines Vereins dürfen nicht hintereinander stehen, keiner darf vor Beendigung des Singens seinen Posten verlassen. Jeder Vorsitzende muß Punktierer und Kontrolleure dem Verbandsvorstand zuführen.

Punkt 8. Nach Eröffnung des Wettstreits darf kein Vogel fortgenommen werden.

Punkt 9. Die Zahl der Rundgänge wird am Wettstreitsmorgen bekannt gegeben. Jeder Vogel wird sofort abgehört. Bei jeder Gruppe befindet sich ein Sportsfreund, der mit der Uhr in der Hand die Zeit zum Weiterrücken angibt. Von Minute zu Minute wird weitergerückt.

Punkt 10. Die Punktierer dürfen dem Käfige nicht zu nahe kommen. Es darf unter keinen Umständen ein Käfig mit dem Hut oder, falls es regnet, mit dem Schirm berührt werden. Lautes Unterhalten ist verboten. Es darf, wenn es einmal nötig ist, nur im leisen Flüsterton gesprochen werden. Rauchen ist verboten.

Punkt 11. Es werden nur ganze Gesänge prämiiert; sind Vögel da, die deshalb beanstandet werden, so ist dieses dem Vorstand zu melden. Die Untersuchung darüber führt die Wettstreitskommission. Vögel mit abgebrochenen Ausgang können nicht voll punktiert werden. Der Ausgang muß immer verständlich sein. Derartige Vögel sind vor dem Wettstreit zu melden.

Punkt 12. Die Vögel werden in Gruppen eingeteilt. Die Gruppen unterstehen einem dazu bestimmten Vorstandsmitgliede.

Punkt 13. Gleich nach Schluß werden vom Verbandsschriftführer die Resultate aufgeschrieben. Bis das geschehen, muß jeder Gruppenführer in seiner Gruppe verbleiben. Ist der letzte Vogel punktiert, müssen die Punktierer und Kontrolleure den Absperraum verlassen, so daß alles übersehen werden kann. Alle Vögel werden nach System Timmer mit der Rechenmaschine punktiert. Die mehrmals durchgesungenen Maschinen werden besonders gekennzeichnet.

Wettstreitsbestimmungen für Schönheitsvögel!

Punkt 1. Der Wettstreit findet zusammen mit dem Kampfsingen statt.

Punkt 2. Den Mitgliedern und den Besuchern ist der Aufenthalt in der Nähe der Vögel während der Prämiierung nicht gestattet, der Raum wird abgesperrt. Zutritt hat nur der Verbandsvorsitzende. Sollte jedoch die Wettstreitskommission von den Herren Preisrichtern verlangt werden, so haben auch diese Zutritt.

Punkt 3. Das Singen wird in Klassen eingeteilt, und zwar Weuzbizar I. und II. Klasse, Düsterwie I. und II. Klasse und I. Gemischte Klasse.

Punkt 4. In der I. Klasse sind nur reine Vögel zugelassen. Stellt es sich nachträglich heraus, daß ein Vogel einen Beigesang hat, so kann der Vogel an dem Morgen nicht mehr umgesetzt werden. Der Vogel wird nicht prämiiert.

Punkt 5. Alle Vögel müssen weiß eingebunden sein, so daß vom Käfig nichts zu sehen ist. Auch dürfen Monogramm oder Erkennungszeichen an den Tüchern nicht vorhanden sein.

Punkt 6. Der Abstand der Käfige wird, wenn der Raum es erlaubt, 1—2 Meter sein.

Punkt 7. Das Singen dauert ununterbrochen mindestens zwei Stunden, Schluß 10 Uhr. Nach der Prämiierung ist der Aufenthalt bei den Vögeln gestattet.

Punkt 8. Als Preise werden Geldpreise verliehen. Von den anwesenden Vögeln werden 40% prämiiert.

Punkt 9. Die Vögel müssen wie beim Kampfsingen sechs Tage vorher beim Verbandsvorsitzenden angemeldet werden. Später werden keine Vögel mehr angenommen. Das Satzgeld, pro Vogel 300 M., ist beim Anmelden zu entrichten.

Punkt 10. Die Vögel werden nach Punkten prämiiert, und zwar in vier Lagen. Die Höchstzahl der Punkte in jeder Lage ist 4. Jeder Preisrichter muß selbständig arbeiten.

Punkt 11. Es ist verboten, reine Vögel in der II. Klasse auszustellen. Die Preisrichter werden darauf aufmerksam gemacht, streng darauf zu achten und dieses sofort zu melden, damit die Sache untersucht werden kann.

Punkt 12. In der I. Klasse der Weuzbizare sind nur Weuzbizare und Feutges zugelassen, in der II. Klasse nur Weuzbizare und Feutges mit Nebengesängen.

Punkt 13. In der I. Klasse der Düsterwie sind nur reine Düsterwie, in der II. Klasse nur Düsterwie mit Nebengesänge zugelassen.

Punkt 14. In der I. Gemischten Klasse sind nur reine Sänger, also Vögel, die nur immer ein und denselben Gesang bringen, zugelassen. Jedoch dürfen hier keine Weuzbizare, Düsterwie, Feutges ausgestellt werden.

Punkt 15. Nach Schluß des Wettstreits werden die Resultate festgestellt. Es wird hier ausdrücklich gebeten, den Vorstand bei dem Feststellen der Resultate nicht zu stören oder sonst zu belästigen. Die Feststellung muß in aller Ruhe erfolgen, um ein genaues Resultat bekannt geben zu können. Die Bekanntmachung kann vor 2 Uhr mittags nicht erfolgen. Schluß voraussichtlich 4 bis 5 Uhr.

Punkt 16. Jeder, der einen Preis errungen hat, wird nachträglich einen Auszug aus der Prämiierungsliste erhalten, aus der zu ersehen ist, wie der Vogel von jedem Preisrichter und in jeder Lage prämiiert wurde.

Punkt 17. A. Die Preisrichter werden von den Vereinen gestellt. Jeder Verein muß einen Preisrichter stellen. Diejenigen Vereine, die einen zweiten Preisrichter stellen sollen, werden in der letzten Woche vor dem Singen bekannt gemacht. Die Namen der Preisrichter müssen beim Anmelden der Vögel bei den Punktierern und Kontrolleuren mit angegeben werden. B. Das Einteilen der Preisrichter untersteht dem Verbandsvorsitzenden. Es werden voraussichtlich in I. und II. Klasse Weuzbizar zusammen fünf Preisrichter richten. Ebensoviel in der I. und II. Klasse Düsterwie. Wie viel Richter in der Gemischten Klasse teilnehmen, kann noch nicht festgestellt werden, weil nicht zu übersehen ist, wie viel Vögel kommen. Hat die Zahl jedoch 15 nicht überschritten, so übernehmen diejenigen Richter die Klasse, welche die wenigsten Vögel zum Richten haben.

Punkt 18. Die Preisrichter müssen befähigt sein, in jeder Klasse richten zu können.

Punkt 19. An jedem Käfig ist eine nicht zu kurze Schnur zum Aufhängen zu befestigen.

Punkt 20. Ist der Wettstreit beendet, so bleiben die Vögel so lange stehen, bis die Resultate festgestellt sind. Sind die Vögel freigegeben, so kann jeder durch Abgabe seiner Nummerkarte seinen Vogel in Empfang nehmen. In jeder Klasse sind Mitglieder anwesend, die dafür bestimmt sind, die Vögel anzunehmen und auch nachher wieder auszugeben. Sollte jedoch jemand nicht zu finden sein, so daß er seinen Vogel nicht in Empfang nehmen kann, so muß der Vogel dem Vorstand übergeben werden. Diejenigen Sportsfreunde, die also die Vögel wieder ausgeben, werden für die abhanden gekommenen Vögel verantwortlich gemacht. Die Nummerkarten werden auf der Herbst-Vertreterversammlung wieder ausgegeben.

Bestimmungen für das Wanderpreissingen 1923.

Punkt 1. Jeder Verein, der dem Verband angehört, kann sich an dem Wanderpreissingen beteiligen.

Punkt 2. Es werden zwei Wanderpreise ausgesungen, einer im Kampf- und einer im Schöngesang.

Punkt 3. Der Kampf gilt Verein gegen Verein. Derjenige Verein, der mit seinen sechs besten Vögeln die Höchstpunktzahl erreicht, erhält den Wanderpreis, der zweitbeste Verein einen Ehrenpreis von 10000 M., der drittbeste von 8000 M., der viertbeste von 6000 M, der fünftbeste von 4000 M., der sechstbeste von 3000 M, der siebenbeste von 2000 M. Außerdem werden noch zirka 160 kleinere Geldpreise ausgesungen.

Punkt 4. Der Wanderpreis geht für ein Jahr an den singenden Verein über. Der Verein muß im nächsten Wanderpreissingen den Preis mit der entsprechenden Gravierung wieder abgeben, und zwar in demselben Zustande, wie er in Empfang genommen wurde. Sollte der Preis beschädigt sein, so ist der Verein haftbar dafür.

NB. Im vorigen Jahre blieb der Wanderpreis für Schöngesang in Düsseldorf und wurde vom Finkenklub Düsseldorf-Oberbilk errungen, wogegen der Wanderpreis für Kampfsingen dem Buchfinkenklub Solingen zufiel.

Punkt 5. Die Wanderpreise werden acht Tage vor dem Singen in Düsseldorf bei Herrn Kasper Fuß, Graf-Adolf-Platz, ausgestellt. Ist der Wanderpreis von einem Verein dreimal errungen worden, so geht er in dessen Besitz über.

Punkt 6. Die Ehrenurkunde vom Wanderpreis wird den Vereinen auf der Herbstvertreterversammlung überreicht.

Diese Bestimmungen wurden in der Vorstandssitzung am 13. April bei Sportsfreund Bauer, Düsseldorf-Oberbilk, einstimmig angenommen.

Düsseldorf, den 13 April 1923.

Albert Timmer, Verbandsvorsitzender,
Düsseldorf, Gravelottestraße 20.

Aus den Vereinen.

A. Z. Angemeldet sind die Herren Ad. Peltzer, Düsseldorf-Gerresheim, Benderstr; Heins Heck, Tierfarm, Elsenhöhe b. Marburg a. L.; Oskar Scherz, Kaufmann, Wien II, Ferdinandstr. 31; A. Bätz, Berlin-Tempelhof, Kaiserin-Augusta-Str. 9; Artur Brathuhn, Eisleben, Helbraer Str. 47; Lektor Carl E. Andersen, Voldgade 1, Sönderborg (Dänemark); Willi Möhring, Schafstädt b. Merseburg, Markt 183. — Aufgenommen sind die Mitglieder Nr. 310 Fritz Glaißner, Inspektor, Stuttgart, Hausteigstr. 104; Mtgl. 311 Josef Seger, Kaufmann, Schopfheim i. Baden, Gartenstr.; Mtgl. 312 Hermann Kammüller, Hofmeister, Schopfheim i. Baden; Mtgl. 313 Gustav Knie, Bahnbeamter, Schopfheim in Baden. — Mtgl. 27 (Sztachovics, Wien) gibt ab 1,0 Zebrafink, 1,0 Goldbrüstchen, 1,1 Tigerfink. Mtgl. 74 (Volpert, Olching) gibt ab i. T. geg. zuchtf. gelbe und grüne Wellensittiche, Zebrafinken oder Möwchen: 1,1 Muskatfinken, 2,2 Amaranten, 1,0 Schmetterlingsfink, 1,1 unbekannte Amandinen. Mtgl. 242 (Römer, Liegnitz) tauscht 1,1 Goldstirnsittiche gegen Nymphen, Singsittich oder kl. Papageien. Mtgl. 258 (Stümcke, Vegesack) sucht dringend 0,1 Nymphensittich; gibt ab 1,1 Muskatfinken gegen Gebot. Mtgl 284 (Hauser, Freiburg) sucht Neunzig, „Fremdl. Stubenvögel" i. T. geg. „Einh. Stubenvögel" 4. Aufl., gebd. oder 6. Aufl., broschiert, oder Bechstein, „Hof- und Stubenvögel" 5. Aufl. 1879, gebd., wünscht ferner 2,0 Goldfasan, 22er Brut, geg. 0,2 dito einzutauschen und 1,1 Brautenten o. a. geg. 1,1 Bisamenten, evtl. gegen 0,1 jungen Schwan. A. Krabbe.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig. Nächste Vereinssitzung Donnerstag, den 17. Mai, im Vereinslokal „Bauers Brauereirestaurant", Täubchenweg. Gäste sind stets willkommen.

J. A.: Johann Birk, 1. Vorsitzender,
Leipzig-Mockau, Beuthstraße 29.



Herrn X., Wilsleben. Anscheinend handelt es sich um eine Lähmung. Aber wenn tatsächlich rheumatische Erscheinungen vorlägen, wäre dem Vogel auch nicht zu helfen.

Herrn Karl P., Landsberg a. W. Der Brief ist mit Adresse versehen weiterbefördert worden.

Käfige u. Gerätschaften

Größere Stubenvoliere

für Wellensittichzucht gesucht. [355
Chr. Hacker, Fabr.-Direktor,
Schwenningen a. N.

Guterhaltene
Zimmervoliere
zu kaufen gesucht. Gefl. Angebote an
Rosendaal, Emmerich,
Heerenbergerstr. 22 A. [356

Futtermittel

Vogelfutter

für Kanarien, Waldvögel, Exoten, Papageien, Weichfresser. Anfragen nur gegen Rückporto. Liste 13 über Vogelfutter 50 *M*, Liste 5 über Vogelkäfige, Zuchtgeräte usw. mit etwa 400 Abbildungen 150 *M*. [357
W. Göpel, Leipzig,
Tröndlinring 1. Telephon 14958.

Mehlwürmer

Geg. Einsend. von 3000 *M* 1/4 Pfd. franko.
Größere Posten zum Tagespreis.
Neu eingetroffen: Ein kleiner Posten **Weißwurm**, per Pfund 4000 *M* exkl. Porto und Verpackung.
Anfragen Rückporto, sonst keine Antwort.
D. Waschinski & Co.
Biesenthal b. Berlin.
358] Postscheckkonto Berlin 34825.

Frische Ameiseneier
versende ab Mitte Mai täglich frisch.
Behrke, Braunschweig,
Sophienstraße 35. Fernruf 1281.
Anfragen ohne Rückporto bleiben unbeantwortet. [359

Vögel

Gesucht

zu gutem Preis **Weibchen** gr. und gelb. Wellensittich, zuchtfähig, desgl. **weiße Hirse.** [360
O. Hegemann, Hameln a. d. W.,
Klütstraße 1a. A.-Z. Nr. 177.

Tausche

Nachtigall u. **Schwarzplatte** gegen **Mehlwürmer.** (Doppelkarte.)
P. Rückert, Berlin O 112,
Simon-Dach Str. 7. [361

Vertausche 1,1 grüne Kanarienvögel, Männchen 76-Punktvogel mit gebogener Hohlrolle, markigen Knorren und tiefen Pfeifen, Weibchen ebenfalls guter Abstammung, gegen 1 Paar grüne oder gelbe Wellensittiche. **Hermann Lietzmann,**
362] Heilanstalt Lengerich i. Westf.

Suche lautfingende Feldlerche und gebe dagegen Stieglitz oder lautfingendes Rotkehlchen in Tausch.
Paul Oehme, Freiberg i. Sa. [363

Suche Nachtigallen ♂ u. ♀ zum Aussetzen in Tausch gegen Ia. getrocknete Ameisenpuppen. Desgl. Gelbspötter ♂ und graue Grasmücken ♂. Gefl. Angebote unt. F. H. 26 a. d. Ges. Welt. [364

Verkaufe **ind. Damadrossel** gegen Höchstgebot, evtl. in Tausch gegen bes. Exoten. **Ja. Wagenbauer, München,** Westendstraße 153 III. [365

Kaufe laufend zu konkurrenzlos höchsten Preisen:

Kanarienhähne und -weibchen

sowie **Sing- und Ziervögel, Exoten aller Arten, Papageien, graue, grüne usw.**

Arthur Muschter, Borna b. Leipzig,

Käfigfabrik und Vogelhandel en gros und en detail
Import. **Export.**
Anfragen Rückporto beifügen. [366

Reform-Käfige

Zerlegbar · Leichteste Reinigung · Einfachster sicherer Transport
1. Preis beim Käfig-Wettbewerb Leipzig 1919 (s. Ges. Welt 1920, Heft 14—16)
werden für alle Vogelarten hergestellt.
Goldene Medaille Leipzig 1921.
Ausführung: Hartholz, grünlackiert oder naturlackiert, Zinkschublade, Porzellannäpfe, Ledertuchdecke.
Keine Fabrikware, sondern beste Spezialarbeit!
Anfertigung als Kistenkäfig oder Wiener Form (halboffen) oder halboffen mit fester Rückwand. Ohne jedes Werkzeug in einer Minute zusammengestellt resp. zerlegt. Verpackung zum Selbstkostenpreis.
Fertigen auch jede Art Käfige u. Volieren n. Zeichnung od. Maßangabe.
Anfragen Rückporto beifügen
Katalog gegen Einsendung von 150 Mark in Briefmarken.
Schlagnetze ohne Mittelsteg
für schädliche Vögel, prima handgeknüpfte Ware.
Kühn & Muschter, Inh. Arthur Muschter,
Borna b. Leipzig, Kasernenstr. 4.
Spezialwerkstätte für Käfigbau.
Bank-Konto: Allgemeine Deutsche Credit-Anstalt Zweigstelle Borna.
Stadt-Girokasse Borna b. Leipzig Nr. 1506.
Postscheck-Konto: Leipzig 92250. Fernsprecher 147. [367
Zahlreiche Anerkennungs- und Dankschreiben.

Papageien
Kanarienhähne
Bastarde
kauft höchstzahlend und tauscht auch auf Exoten
Willy Odenwald, Fulda.
Eigner Export und Import. [368

Sehr wichtig!

Alle bei mir bestellten Waren müssen abgeholt werden, da ein Paketversand ab hier ausgeschlossen ist. Anfragen ohne Rückporto können nicht mehr erledigt werden.

Tausche pr. Nachtigall
gegen Mehlwürmer oder Futter. Frische Ameiseneier abzugeben. [369
Emmy Voß, Köln,
Marlostr. 23. Vogelheim zur bes. Welt.

Granatastrilde, Buntastrilde, Wachtelastrilde, Elfenastrilde, Angolaschmetterlingsfinken, Goldstirnsittiche u. a. m. Anfragen mit Rückporto. [370
E. W. Lenger, Berlin N 58,
Schönhauser Allee 70 a.

Tausche **Amarant ♂ u. 1,1 Astrild,** sowie **Briefmarkensammlung und Klassiker (Goethe und Schiller)** gegen Exoten und großen Flugkäfig.
Verkaufe oder tausche **Meyers Konversationslexikon, 3. Auflage, 19 Bände,** sehr gut erhalten, gegen Singvögel beliebiger Art. [371
Max Friedrich, Liegnitz, Mittelstr. 69

Wegen Zuchtaufgabe [372
weit unter Wert abzugeben: **1,0 Harzer Kanarienedelroller,** Vorsänger (Hohlrolle, Klingelrolle, Knarre, Flöte, schöne lange reine Touren), prämiiert, 2 Jahre alt, tadellos, 65000 *M* (Wert mind. 200000 *M*), 0,3 Ia. Harzer Roller, Weibchen, 2jähr., à 13000 *M*. Kapitales, sehr starkes, schädelechtes **Wasserbockgehörn** (Schraubenantilope), 3/4 m lg., erlegt Kamerun Dez. 1900, mit Eichenaufsatz 1700 *M*. Tausche Paar Wellensittiche, Zebrafinken od. seltene Exoten. Major **Rempe, Bonn,** Ritterhausstr. 21

„Ornis" [373
Freie Bezugs-Vereinigung der Waldvogel-Liebhaber Deutschlands
bestand von 1912 bis 1. Oktober 1920. Durch sachgemäße und reelle Belieferung der Mitglieder mit Vogelfutter u. Bedarfsartikeln erwarb sie sich einen Ruf, der noch fortbesteht. — Auf vielseitigen Wunsch bringe ich diese Tatsache in Erinnerung, auch allen denjenigen, die von dem Bestehen derselben noch keine Kenntnis haben. — Ein **Benachrichtigungsblatt** kann leider **nicht** mehr erscheinen, doch ist das Ornis-Haus nach wie vor bestrebt, die besten von allen am Markte erhältlichen Artikeln zu liefern; das mir geschenkte Vertrauen werde ich weiter zu erhalten wissen. — Über meine Tätigkeit gibt das „Ornis-Buch" Auskunft. Rabatt kann **nicht** mehr gewährt werden, doch kommen nur brauchbare Mischungen zum Versand. Bei Anfragen erbitte ausreichendes Rückporto und Angabe der vorhandenen Vogelarten. — Auskunft bereitwilligst. Bücher und Blätter sende für 800 Mk. frei (Ausland 2400 Mk.)
Ornis-Haus, Halle a. S.
Fernruf 4198
„Reform-Normal"-Weichfutter nach Angabe des Herrn Apotheker Adalbert Jena-Biberach-Riß. Moderner elektr. Betrieb. Gleichmäßige Körnung restloser Verbrauch garantiert.

Abzugeben als überzählig 3,1 gr. Wellensittiche, zuchtf.
Gesucht i. Tausch
verschiedene einheimische Körnerfresser i. Männchen, sowie Fremdländer, einzel. und in Paaren, auch junge. [37
O. Hegemann, Hameln a. d. W.
Klütstraße 1a. A.-Z. Nr. 177

Zu verkaufen gegen Gebo
„Fremdländische Stubenvögel" vo. Neunzig (gebd.), „Der Wellensittich von Dr. Ruß (geheftet), „Die Prachtfinken" von Dr. Ruß (gebunden), „D. Webervögel und Widafinken" (gebd. „Gefiederte Welt" 1920 (gebd.), 192. und 1922 (lose). Angebote an
Valentin Bohrer, Lorsch (Hessen
Wormser Str. 29. [37

Gefiederte Welt,
vollständige Jahrgänge von 1913—191. ungebunden, zu verkaufen. Anfrage unter **W. B. 10** an die Geschäftsstel. der Gefiederten Welt. [37

Ges. Welt 1903—1921 m. all. Taf. Orig.-Bdn., tadell., J. 22 lose m. O.-De. geg. gut. Geb. z. verk. **P. Bernhard** Leipzig-R., Riebeckstraße 1. 3

Vertausche
1 italienische Harmonika, gut erhalt. fehlerfrei, prima Handarbeit, eingele. 2-reihig, 24 Bässe, gegen 2 Paar jun. Wellensittiche; 1 deutsche Harmoni. fast neu, feines Instrument, 2-reih. 8 Bombardonbässe, schöner Kla. gegen 2 Paar junge Wellensittiche.
Martin Schöll,
Garmisch (Oberbayern). [3

Inserate
für das am 7. Juni 1923 Ausgabe gelangende Heft 11 der G. Welt erbitten bis 1. Juni 1923 fr.
Die viergespaltene Nonpareillezeile o. deren Raum wird mit **10 Pf. Grun. preis** berechnet, der mit der v. „Börsenverein der Deutschen Bu. händler bestimmten Teuerungszahl. zurzeit „3000" — zu multiplizieren. — Auslandslieferungen —,10 Schwei. Franken.

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Hermsdorf bei Berlin; für den Anzeigenteil: Franz Wunderlich, Magdeburg, Postschließfach 148.
Verlag der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck: August Hopfer, Burg Bz. Mgdbg.

Jahrgang LII.
Heft 11. 7. Juni 1923.

Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Die Gefiederte Welt gelangt am Donnerstag nach dem 1. u. 15. jedes Monats zur Ausgabe und kostet für Monat Juni 750 Mark. Einzelpreis des Heftes 400 Mark.
Auslandspreis für das Vierteljahr 2 Schweizer Franken, für das Heft 0,35 Schweizer Franken.
Inserate für die folgende Nummer müssen bis spätestens Freitag früh in Händen der Verlagsbuchhandlung sein. Die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 10 Pfg. Grundpreis berechnet, der mit der vom „Börsenverein der Deutschen Buchhändler" von Zeit zu Zeit bestimmten Teuerungszahl zu multiplizieren ist. Die Teuerungszahl ist zurzeit „4200". — Auslandspreis für die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum —,10 Schweizer Franken.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung (M. Kretschmann) in Magdeburg.

Postschließfach 148. Postscheckamt: Magdeburg 3148. Fernsprecher: 1323.

Über Vogelhaltung und ihre Voraussetzungen.

Von A. Adlerspare.

(Schluß.) (Nachdruck verboten.)

Die vogelpflegerische Fachliteratur besteht bekanntlich aus zweierlei Haupttypen: dem Handbuch und der periodischen Literatur (Wochen-, Monats- und Jahresschriften). Das erstere beabsichtigt eine zusammengefaßte Darstellung des Gegenstandes auf der Höhe unseres Wissens beim Erscheinungsdatum zu geben, ein Lehr- und Nachschlagebuch sowohl für Anfänger wie für Fortgeschrittene zu sein. Die natürliche Aufgabe der letzteren (außer in supplementären Teilen, Briefkasten, Sprechsaal) ist neue Untersuchungen, Auseinandersetzungen, Gesichtspunkte, Arbeitsergebnisse, Fortschritte, Modifikationen u. dergl. an die Öffentlichkeit zu bringen, was alles von gleichem Wert für Anfänger und Fortgeschrittene ist und auf welche das Handbuch in späteren Auflagen Rücksicht zu nehmen hat. Es könnte vielleicht der eine oder andere meiner Leser meinen, es wäre eine allzu elementare Auseinandersetzung. Wie schwer es aber vielen fällt, sich in diese Dinge hineinzudenken, beweisen die in der periodischen Literatur des öfteren vorkommenden Aufsätze, die im wesentlichen nichts anderes sind als Auszüge aus dem Handbuch, mit eigenen, nicht immer besseren und deutlicheren Worten und Ausprobierungen, Auszüge, die den resp. Schriftleitern sicherlich nicht geringe Verlegenheiten bringen. Es ist nämlich einleuchtend, daß ein Durcheinanderwerfen dieser zwei Literaturtypen nur dazu führt, daß das Handbuch dem Leser der Zeitschrift überflüssig wird und umgekehrt, mit anderen Worten, daß sich die beiden Druckwerke totkonkurieren. Zum Schaden aller und zu niemandes Nutzen! — Auch in anderer Hinsicht wird bisweilen gesündigt. Die Wahl der Stilart scheint nicht immer die richtige. Naturwissenschaftliche Fragen erfordern sicherlich eine Schreibweise ohne Umschweif und Unsicherheit, aber von möglichst durchleuchtender Klarheit, Sachlichkeit, Präzision, Logik; also eine Schreibweise, die nur an die bewußte Verstandestätigkeit appellieren will und darf. Nicht aber an das halb oder ganz unbewußte Gefühlsleben! Es ist nämlich — das müssen wir stets im Auge behalten — nicht das Gefühl und der Glaube, durch welche die naturwissenschaftlichen — und folglich auch vogelpflegerischen — Wahrheiten in unseren Tagen festgestellt werden! Auch wäre es für das Ansehen der Vogelhaltung nur förderlich, wenn die einzelnen Vogelpfleger sich in ihrer übrigen Tätigkeit, insbesondere in ihrer Vereinstätigkeit, um mehr Klarheit, minder Sentimentalität, mehr Präzision, minder üblen Pathos bemühen wollten. Eine der schwereren Ausstellungen seitens außenstehender, nichtvogelpflegender Kreise richtet sich gerade gegen das verworrene Durcheinanderweben biologischer und gefühlsmäßiger Gesichtspunkte — so ziemlich dieselbe Anklage, die wir selbst mit so vielem Recht gegen die Tierschützler der älteren Schule zu richten pflegen. Die Position der Vogelhaltung im bürgerlichen Leben dürfte aber z. Zt. nicht so fest sein, daß wir ohne Risiko die Gewogenheit der sachlich urteilenden Außenstehenden abweisen können!

Bei einer so starken Hervorhebung der Bedeutung der Pflege könnte man meinen, daß kein Raum mehr für die liebhaberischen Interessen übrig bliebe. Das ist nicht zu befürchten, ist auch nie meine Meinung gewesen. Was ich gewollt, ist nur eine meines Erachtens richtigere Abwägung von dem Verhältnis zwischen Pflege und liebhaberischer Ausbeutung innerhalb der Vogelhaltung, und es ist, wie aus dem Vorstehenden hervorgegangen sein dürfte, meine bestimmte

Ansicht, daß dabei die Pflege und deren zeitgemäße Umformung, rein verstandsmäßig gesehen, unwillkürlich an die erste Stelle kommen muß, während dagegen die liebhaberische Auswertung nur in dem — zwar sehr umfangreichen — Maße, wie sie sich mit einer einwandfreien Haltung vereinen läßt, ihre Existenzberechtigung hat. Durchblättert man eine Anzahl Jahrgänge einer Stubenvogelzeitschrift — hier, wie im übrigen betrachte ich die Vogelhaltung mehr als eine internationale Erscheinung, was ich für das Richtigste halte, und wende mich also nicht gegen eine gewisse Seite —, so wird man sicherlich finden, daß es meistenteils die liebhaberischen Interessen sind, die sich da am breitesten machen, während der speziellen Pflege, die sich gemäß der Natur der Sache vorzugsweise über physiologische Kausalitätsforschung hervorarbeiten muß, meistens nur ziemlich geringe Aufmerksamkeit gewidmet wird — fast ausschließlich als ein Mittel für das Gewinnen einer liebhaberischen Meistausbeutung und ohne viele Gedanken über die weitaus wichtigere Frage, ob dieses Mittel aus physiologischem Gesichtspunkt — also aus dem Gesichtspunkt der beizubehaltenden vollen Gesundheit des Vogels — als zulässig oder nicht angesehen werden kann. In vollem Einklang hiermit ist auch der Umstand, daß die Pflege bei einer beträchtlichen Anzahl Vogelwirten fortwährend auf demselben unklaren, lückenhaften, widerspruchsvollen Grund stillsteht, wie vor mehreren Menschenaltern. „Die Teile haben sie in der Hand, leider fehlt nur das geistige Band". Diese meines Erachtens nicht nur dem Wohlbefinden der Vögel, sondern auch der Zukunft und dem Fortbestehen der Vogelhaltung ernstlich gefährdende, allzu stark liebhaberische Interessenbetonung wird auch im Verhalten der Vogelpfleger zur Fachliteratur, welche jedoch nunmehr auf gewissen Gebieten bis auf Unkenntlichkeit verbessert ist, gespürt. Es ist, wenn ich mich recht erinnere, Heinrich Ibsen, der irgendwo behauptet, daß eine normale Wahrheit nur 20 Jahre lebt. Ich möchte sagen, daß eine normale Stubenvogelliteratur auch nicht die Hälfte dieser Zeit leben kann. Die naturwissenschaftliche Forschung geht rasch vorwärts! Aber wie oft trifft man nicht Vogelwirte, die, ihre moralische Verantwortlichkeit unterschätzend, sich mit jahrzehntealter Literatur begnügen und auch die besten Zeitschriften und Neuausgaben mehr als Luxus betrachten zu können glauben! Ältere Literatur kann gewiß ihren großen Wert haben, das sei durchaus nicht verneint, aber dieser Wert liegt auf einem ganz andern Gebiet, als dem der aktuellen Pflege!

Es ist nicht ganz gleichgültig, welche Stellung die einzelnen Vogelpfleger hierhergehörenden Fragen gegenüber einnehmen wollen. Wir wollen uns nicht in trügerischen Hoffnungen von ungestörtem Dasein in Ruhe und Frieden einwiegen. Von uns nicht wohlgewogenen, außenstehenden Kreisen wird auf die Vogelhaltung bekanntlich sehr genau aufgepaßt und nicht selten explodieren hie und da kleine Minen. Eine Anklage, die nunmehr von tierschützlerischer Seite gerne gegen uns Tierhalter gerichtet wird, zielt darauf hin, daß unsere Wirksamkeit ärgerniserweckend, gefühlsverletzend wäre. Zwar bin ich mit den Bestimmungen der bürgerlichen Gesetzgebung nicht sehr vertraut, habe jedoch den Eindruck, daß in einem geordneten Gemeinwesen die Beschuldigung, die Gefühle großer Mitbürgergruppen (wie es die Tierschützler zweifellos sind) zu verletzen, schon an sich als etwas ziemlich ernsthaftes anzusehen ist. Die Reichsversammlungen mit ihrer politisch wechselnden Zusammensetzung werden von Zeit zu Zeit aufgefordert, in gesetzgebender Form mehr oder minder endgültig über uns zu richten. Zeigte es sich dann zuletzt, daß auch in anderer Hinsicht begründete Anklagen gegen uns gerichtet werden könnten, dann fürchte ich, daß die Sonne der privaten Vogelhaltung für immer unter den Horizont sinken wird. Denn ein tragkräftiger Unterschied unter den verschiedenen Richtungen der Stubenvogelhaltung dürfte sich kaum hervorkonstruieren lassen. Sei es, daß man einheimische, exotische oder domestizierte Vögel hält — Erlenzeisig, Bandfink, Wellensittich, Mövchen, Reis- oder Kanarienvogel — was dem einen Vogel gegenüber physiologisch unzulässig ist, das ist es fast ausnahmslos auch gegenüber dem anderen.

Stockholm, den 20. März 1923.

Sprosser.

Von Theodul Szerbanowicz.

(Nachdruck verboten.)

Den Artikel über Sprosser und Nachtigall von Herrn J. Birk, Leipzig, möchte ich, was den Sprosser anbelangt, ergänzen. Vor allem will ich die Worte des Herrn J. Birk besonders betonen, daß der Sprosser sich nur in einem Heim eines erfahrenen Vogelliebhabers befinden soll, denn durch das Abfangen und Käfigen eines Sprossers ohne genaue Kenntnis des Lebens dieses Sängerfürsten geht dieser sicherlich in der Mauserzeit ein, wenn ihn nicht der Tod bereits nach einigen Tagen in der Gefangenschaft ereilt. Ich betone dies nur deshalb, damit auch bei uns das Geschlecht dieses Sängerfürsten nicht ausgerottet werde, denn genug tragen dazu die südlichen Völker bei, welche in jedem vorbeiziehenden Vogel ein Stückchen Fleisch sehen, das unbedingt verspeist werden muß.

Die Sprossermännchen treffen in der Nordbukowina vereinzelt bereits gegen 15. April ein. Gegen Ende des Monats April sind bereits alle vorhanden. Die Sprosserweibchen treffen erst gegen 20. April ein. Der beste Fang erfolgt sofort nach dem Eintreffen des Sprossers, da er durch den langen Flug abgemagert ist und im Käfig sofort auf das Essen gierig losgeht. Sprosser, die um die Zeit vom 15. bis zum 25. April eingefangen werden, gewöhnen sich an die Gefangenschaft auch sehr leicht, weil sie gewöhnlich noch nicht verpaart sind und nicht nach dem Weibchen trauern. Jeder Sprosser, der frisch eingefangen ist, tobt in der Nacht sehr im Käfig, so daß sein Gefieder dadurch leidet und er am Tage eine außergewöhnliche Mattigkeit an den Tag legt. Zu einem frisch gefangenen Sprosser, der sich bereits 24 Stunden in dem mit einem grünen Tuch verhängten Käfig befindet, ist es am besten, ein junges grünes Kanarienweibchen hereinzugeben. Ein junges Kanarienweibchen deshalb, damit es nach dem auch so bereits scheuen Vogel nicht hackt. Das Kanarien-

weibchen wirkt auf den Sprosser durch das nicht scheue Benehmen vor dem Menschen sehr beruhigend ein. Gleichzeitig gewöhnt sich der Sprosser auch an das Eifutter, welches das Kanarienweibchen mit Appetit verzehrt. In der ersten Zeit der Gefangenschaft vertilgt der Sprosser über 30 Mehlwürmer täglich, nebenbei läßt er sich auch das Kanarienfutter schmecken und verspeist auch 5—6 große Küchenschaben. Gleichzeitig muß man auch bereits Trockenfutter, wie es in den Handlungen verkauft wird, in Milch aufgeweicht, reichen, damit sich der Sprosser auch an dieses Futter gewöhnt, da die ausschließliche Fütterung mit Mehlwürmern schadet. Die Mehlwürmer sollen nur in getötetem Zustande gereicht werden, und zwar so, daß man ihnen erstens den Kopf eindrückt und zweitens sie in der Mitte mit einer Schere durchschneidet. Man kann selbstverständlich Mehlwürmer nur mit eingedrücktem Kopf reichen, jedoch habe ich festgestellt, daß die durchgeschnittenen Mehlwürmer durch das Hervortreten des weißen Inneren bei den Sprossern besonderen Appetit erregen. Ein Sprosser, der durchwegs mit Mehlwürmern gefüttert wird, sieht nie glatt aus, sondern sitzt immer mit gesträubtem Gefieder, was unbedingt von Unbehagen zeigt. Nachdem das Kanarienweibchen 3—4 Tage mit dem Sprosser beisammen war, ist es aus dem Käfig herauszunehmen, damit der Sprosser mit dem Schlagen beginne. Der Sprosser schlägt das erste Jahr in der Gefangenschaft von Anfang bis Ende Mai, manchmal sogar bis 10. oder 15. Juni. Die Mauser geht bei einem Sprosser sehr schwer vor sich, und wenn man zu den Mehlwürmern nicht immer ein wenig Ossa Sepia und sehr fein zernahlene Eischalen zugibt, bleibt der Sprosser in der Mauser stecken, und wenn er nicht zugrunde geht, so ist das Gefieder verkrüppelt. Beim Reichen von Ossa Sepia und Eischalen in zerstoßenem Zustande haften diese an den Mehlwürmern und der Sprosser verschluckt auch diese mit und erhält, wenn auch langsam, ein sehr schönes Gefieder. Nachdem der Sprosser zu schlagen aufgehört hat, soll man ihm wieder das Kanarienweibchen in den Käfig geben, wodurch er in kurzer Zeit ganz zahm wird. Überwintern muß man den Sprosser in einem sehr warmen Zimmer, da er die Kälte wie ein Kanarienvogel nicht verträgt. Der Flußsand am Käfigboden soll wenigstens jeden fünften Tag unbedingt erneuert werden. Der Käfig soll wenigstens jeden Monat ausgebrüht werden, da der Sprosser unter Milbenplage sehr leidet. Wenn der Sprosser in der Gefangenschaft gut gehalten wird, beginnt er mit dem Schlagen im ersten Jahre der Gefangenschaft am Anfang des Monats April und schlägt bis Mitte oder Ende Mai. Im zweiten Jahre der Gefangenschaft beginnt er Ende September zu zwitschern, d. h. ganz leise zu singen, und setzt um die Zeit zu Weihnachten mit dem Schlagen ein und hört Mitte oder Ende April auf. Daß man dem Sprosser Holunderbeeren und Ameiseneier in der Gefangenschaft reichen soll, ist allgemein bekannt, weshalb ich dies nicht besonders anführen will. Die Eßgefäße sollen vor jedem Essenreichen ordentlich gewaschen werden. Die Sprosser, die im Laufe des Monats Mai gefangen werden, kann man selten erhalten, da sie, wie bereits oben erwähnt, nach ihrem Paar trauern, fortwährend im Käfig herumtoben und selten zu schlagen beginnen. Hie und da bleibt so ein Vogel am Leben, besonders, wenn man ihm fortwährend frische Ameiseneier reicht. Nicht jeder Sprosser soll abgefangen werden. Man soll denjenigen Vogel, der sich besonders im Gesange auszeichnet, zum Fangen auswählen. Bei uns sucht man zum Fangen solche Sprosser aus, die wenigstens dreimal den Ruf „utük, utük, utük“ bringen und dann den Schlag, klingend wie: „u—luh, u—luh, zanem, zanem, zanem, jarrom, jarrom, bühom, bühom, bühom usw. bringen. Selbstverständlich folgen darnach noch andere angenehme Strophen. Am besten ist es, denjenigen Sprosser zum Fangen auszuwählen, deren Schlag auf weite Strecken gegen Abend zu hören ist, viele Strophen besitzt und möglichst wenig Knorren hat. In der Nordbukowina kommen die Sprosser besonders am Pruthflusse in den Weidenpflanzungen vor. Das Fangen bewerkstelligt man mit Schlagnetzen. Die Schlagnetze sind so beschaffen, daß der zuklappende Teil des Netzes auf die aufgescharrte Erde beim Zuklappen zu liegen kommt. Hierdurch wird erreicht, daß der zum Fangen in Aussicht genommene Sprosser in paar Minuten gefangen ist, da er bis zum Mehlwurm am Erdboden und nicht auf das Drahtgitter gehen muß. Hierdurch wird auch verhindert, daß der Sprosser von der Seite des Netzes am Rande desselben stehend, den Mehlwurm zu erreichen sucht und dadurch beim Zuklappen des Netzes verwundet wird. Der Mehlwurm soll in ein

Schuppenwachtel (wurde kürzlich wieder angeboten).

aufgespaltetes grünes Weidenstäbchen gerade in der Mitte eingesteckt werden, so daß seine beiden Hälften sich fortwährend bewegen. Jeder Sprosser okkupiert für sich einen bestimmten Rayon in den Weidenpflanzungen, wo er keinen Nebenbuhler duldet. Innerhalb dieses Rayons hat er gewöhnlich einen Strauch, in welchem er als seinem Lieblingsplatz fortwährend seinen Schlag hören läßt. Unter diesem Strauch, knapp an der Wurzel desselben, ist das Laub wegzuscharren, so daß die Erde zum Vorschein tritt, dann ist das Netz aufzustellen. Sobald sich der Sprosser gefangen hat, muß man ihn vom Schlagnetz wegnehmen und zirka eine Viertelstunde in der Nähe des Platzes verweilen, damit man sich überzeuge, daß das Schlagen aufgehört hat und man bestimmt das in Aussicht genommene Männchen gefangen hat. Das Männchen hat nämlich größere und feurigere Augen als das Weibchen. Das Weibchen hat bedeutend kleinere Augen. Es sind auch die Merkmale in der Farbe vorhanden, die in den Büchern bereits aufgenommen wurden. Dem Laien passiert es sehr oft, daß er statt des Männchens das Weibchen abfängt und es natürlich umsonst füttert, bis es evtl. ein Ei legt. Nach dem Fangen befördere ich den Sprosser gewöhnlich in der leicht geschlossenen Hand, da hierdurch verhindert wird, daß der Vogel in einem kleinen Käfig oder in einem Kasten, dessen Wände aus grünem Tuch bestehen, durch das Schaukeln beim Tragen in Furcht versetzt, gänzlich seine Schweif- und Flügelfedern, die nicht wie bei den Finkenarten hart sind, durch das Herumtoben vernichtet.

Der Innenflugraum.

Von Alfred Troschütz, Hannover.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Kreuzschnäbel: Sehr unterhaltende, muntere Vögel, unter sich nicht immer verträglich. Ihre Klettergewandtheit ist groß. Das Zusehen beim Entsamen der Tannenzapfen macht Vergnügen. Bei einem der Männchen kommt das Rot des Gefieders ganz zart wieder zum Vorschein. Haltbar und geeignet. Hakengimpel: Vor Jahren mehrfach schon erkrankte Tiere bekommen, die bald eingingen. Seither nicht mehr im Handel, wie alle nordischen Vögel. Dompfaff: Eine Zierde der Vogelstube. Jetzt ein ungleiches Paar im Besitz, er, ein großer „Russe", sie eine zierliche Deutsche. So schön der Russe ist, so faul und phlegmatisch ist er auch. Für Feigenabfälle, Vogelbeeren und süßes Obst schwärmen beide. Weibchen futterneidisch. Sehr zu empfehlen. Rotkopfgirlitz: Nicht lange gepflegt. Hübsch. Girlitz: Weibchen sehr futterneidisch. Gesang nicht bedeutend. Geeignet. Birkenzeisig, Berghänfling, Stieglitz, Erlenzeisig: Alles angenehme Gäste des Flugraums. Der Erlenzeisig ist der liebenswürdigste. Stieglitz bereits elf Jahre alt. An schönen Vormittagen singen alle um die Wette. Bluthänfling: Paar seit zehn Jahren im Flugraum. Männchen noch immer paarungslustig. Unermüdlicher Sänger. Mischt in seinen schönen Naturgesang viel von dem Gehörten. Wenn auch im Anfang scheu, legt sich dies mit der Zeit, besonders wenn paarweise gehalten. Immer verträglich. Sehr zu empfehlen. Grünling: Mehrfach gepflegt. Hübsch und ausdauernd. Schätze ihn sonst nicht. Geeignet. Von dem verstorbenen Herrn Nissen, Bergedorf, der noch mit 70 Jahren große Erfolge in der Aufzucht junger Vögel hatte, erhielt ich einmal 3 junge Wachteln (?), die nach einjähriger Pflege als ausgewachsene Rebhühner in andere Hände übergingen. Sie fraßen unheimlich, oft 2 Salatköpfe im Tage. Ein reizendes Bild war es, wenn beide Weibchen, im Torfmull eingewühlt, der Ruhe pflegten und das Männchen mit erhobenem Kopfe sichernd dabei stand. Alpenstrandläufer: Paar, jung, für 3 M. gekauft. Als Futter Weißwurm unter nasses Moos in den Sandkasten gestreut und daneben große Wasserbecken aufgestellt. Waren bald eingewöhnt. Da nach jeder Futteraufnahme die biegsamen Schnäbel im Wasser abgespült werden, verdarb dies sehr rasch und mußte oft gewechselt werden. Hübsche Ziervögel für den unteren Flugraum. Beide verkauft. Flußregenpfeifer: Muntere, niedliche Tiere. Ihren eintönigen Ruf lassen sie oft hören. Stehen viel auf einem Bein und bewegen sich so gewandt fort. Eigenartiges ruckweises Kopfnicken. Gar nicht scheu. Rennen viel an den Wänden des Flugraums entlang, sind aber sofort da, wenn es Leckerbissen, wie Mehlwürmer, lebende Insekten u. a. gibt. Das Waten in den Futternäpfen habe ich ihnen noch nicht abgewöhnen können. Zu empfehlen.

Mit der Schilderung der Ausländer kann ich mich noch kürzer fassen. Es wird sehr lange dauern, bis der deutsche Liebhaber seine Käfige und Flugräume wieder mit Vögeln aus Asien und Afrika bevölkern kann. Die Firma Ruhe, Alfeld, die in Vorkriegszeiten die meisten Seltenheiten fremdländischer Vögel in großer Zahl einführte, schreibt mir auf meine Anfrage nach indischen Kronenmeisen, daß diese mindestens 2000 M. das Stück kosten werden, gegen 20 M. im Jahre 1913. Da kann man nicht mehr mit. Übriggeblieben ist von größerem Bestande allein das Schamapaar. Männchen von Herrn Hiltmann, Berlin, bezogen, Weibchen von Herrn Apotheker Pistor, Oberaula, aufgezogen. Das Männchen ist ein mäßiger Naturfänger, aber ein Nachahmer allerersten Ranges, ein musikalisches Talent. Staunenswert ist die Vielseitigkeit, der stete Wechsel der Melodien. Vom flotten Marsch bis zum „Jaulen" junger Hunde kann der Vogel alles wiedergeben, was er einmal gehört hat. Daß er manchmal auf den weniger schönen Strophen mit Vorliebe „herumreitet", muß erwähnt werden. Schlimmer ist sein jähzorniges Temperament. Der Vogel hat Launen. Schlimm wird es, wenn ihn die Eifersucht packt. Dann gibt es Mord und Todschlag. Und doch möchte ich ihn auf keinen Fall missen. Einen rassigeren Vogel, einen wundervolleren Flieger, einen so feurigen Sänger gibt es meines Wissens kaum. Für den Flugraum ist die Schama nicht immer geeignet. Sie ist nie futterneidisch, duldet es, wenn die Schwanzmeisen sich dicht an sie anschmiegen, und kann gleich darauf ein Braunkehlchen oder einen Kreuzschnabel wütend verfolgen. Das ist aber das Eigenartige bei den Bewohnern des Flugraums: sie gewöhnen sich mit der Zeit aneinander, lernen sich gegenseitig meiden, Angriffen auszuweichen. Von

Jahr zu Jahr wird das Zusammenleben besser. Indische Kronenmeise: Von diesem Prachtvogel habe ich fast ein Dutzend gepflegt und die meisten auf geradezu beklagenswerte Weise, durch unverantlichen Leichtsinn Fremder, eingebüßt. Nächst dem Blaukehlchen mein liebster Vogel. Ich sehe den schmucken Kerl im Geiste noch manchmal auf meinem Finger sitzen, mit wehender Haube laut und hell rufend, mit derben Schnabelhieben die Finger zu öffnen suchend, die ihm den Sonnenblumenkern oder den Mehlwurm vorenthalten. So etwas Keckes und Zutrauliches, Kraftvolles und Gewandtes hat keine unserer Meisenarten. Wie prachtvoll ist das schwarzgelbe Kleid! Dabei verträglich, ausdauernd, ich habe die Art länger als acht Jahre gepflegt, genügsam und immer munter und fidel. Gangesbrillenvogel: Dieser scheinbar so zarte gelbe Vogel mit den weißen Augenringen ist der gewandtesten und zähesten einer. Nur süße Früchte verlangt er. Die Verträglichkeit mit unseren Grasmücken läßt zu wünschen übrig. Jacksons Brillenvogel: (Ersteinführung.) 1914 von Ruhe, Alfeld, erworben. Weit lebhafter und gewandter als der Indier. Sehr guter Grasmückengesang. Baute verschiedene Nester. Wurde maßlos eifersüchtig und tötete mehrere Grasmücken und Gelbspötter. Beide 1918 an Herrn Weidholz, Wien, verkauft. Zwergtimalie: Mit den beiden Brillenvögeln zuerst „ein Herz und eine Seele." Später weggebissen. Monotones Fiepen. Gewandt in Busch und Zweigen. Fruchtfresser wie jene. Etwa drei Jahre gepflegt.

(Fortsetzung folgt.)

Schwarzkehltrupial (kürzlich im Handel).

Eine Stadt ohne Sperlinge.

Von H. Ehlers.

(Nachdruck verboten.)

Eine Stadt ohne Sperlinge ist die preußische Bergstadt Altenau im Oberharz. Dieselbe liegt 500 m hoch und zählt 2000 Einwohner, die als Bergleute, Holzhauer, Fuhrleute usw. ihr tägliches Brot verdienen. Eine gute Einnahme bringt auch der Sommerverkehr; denn Altenau ist als klimatischer Luftkurort und Sommerfrische wegen seiner Einfachheit und geschützten Lage im oberen Okertale von Sommergästen rege besucht — von Sperlingen ängstlich gemieden.

Als der deutsche König Heinrich I. noch Herzog der Sachsen war, soll er von Eberhard von Franken im Oberharze beim Finkenfang getroffen sein, als dieser ihm die deutsche Königswürde antrug. Noch jetzt kennt man diesen Platz, er liegt nicht weit von uns! Noch heute gibt es hier Finken genug; Buchfinken und Zeisige sind zahlreich vorhanden. Hänflinge und Stieglitze nicht so häufig. Der Haussperling fehlt.

Der Spatz hat erst im achtzehnten Jahrhundert vom Oberharze Besitz ergriffen. In den über 600 m hochgelegenen Bergstädten Clausthal und Zellerfeld wurde er 1725 eingeführt und ist seitdem dort heimisch. Er brütet heute in allen höher oder niedriger gelegenen Städten des Oberharzes, trotzdem man hier wegen des rauhen Gebirgsklimas keinen Getreidebau treiben kann. Er fehlt in der Bergstadt Altenau.

Verschiedene Versuche, den Haussperling anzusiedeln, waren ohne Erfolg. Der letzte Versuch wurde im Jahre 1905 gemacht. Ein Lehrjunge hatte aus dem Flachlande neun Sperlinge (drei Männchen und sechs Weibchen) mitgebracht und hier fliegen lassen. Den dickfälligen Burschen gefiel unsere Sommerfrische ausgezeichnet. Sie vermehrten sich binnen drei Jahren auf 36 Stück. Überstanden sogar den strengen Winter 1907/1908 gut. Doch im Spätsommer 1908 war kein Sperling mehr da. Wo sie geblieben sind, niemand weiß es. Der Haussperling ist kein Zug- oder Strichvogel. Er ist ein Standvogel. Wo er aus dem Ei gefallen ist, bleibt er bis zum Tode. Außerdem liegt die nächste größere Ortschaft 9 km entfernt.

Viele Vogelfreunde suchen dies Rätsel so zu lösen: Nördlich des Städtchens Altenau, etwa 2 km entfernt, lag damals eine königliche Schmelzhütte, die Erze aus der deutschen Kolonie Südwest-Afrika verhüttete. Durch die Röstung der bleihaltigen Erze entstanden giftige Bleidämpfe, die in der nächsten Umgebung der Hütte wenig grünende Natur duldeten, keinen Nadelwald gestatteten. Bei ungünstigem Winde roch man diesen häßlichen Hüttenrauch (hauptsächlich nachts) im Orte. Nun glaubten viele Leute,

die Spatzen wären des Nachts ein Opfer plötzlich ganz heftig aufgetretener Bleidämpfe geworden.

Heute ruht das Hüttenwerk, die Arbeit ist eingestellt. Aus den Hüttenleuten sind Bergleute geworden. Die Gebäude sind schon größtenteils abgebrochen.

Nun hält man es an der Zeit, nochmals einen Versuch mit dem Haussperling zu machen. Wer hilft dies naturgeschichtliche Rätsel zu lösen? — Geld ist dazu nicht da. — Welcher liebenswürdige Gönner der Sache sendet einige Sperlinge (Männchen, Weibchen oder alleinfressende Jungspatzen)? Sendungen nimmt dankend entgegen Lehrer Ehlers, Altenau (Harz). — Die Verschickung muß in geschlossener Kiste (kl. Luftlöcher) erfolgen. Im freien Käfig flattern die wilden Vögel andauernd und sterben schließlich vor Erschöpfung, ehe sie das Reiseziel erreichen.

An die Leser!

In Angelegenheit der Cyperus-Sprößlinge! Auf meinen Artikel: „Die Spötter unter den einheimischen Singvögeln" („Gef. Welt" 1922) laufen fortgesetzt Anfragen und Wünsche um Überlassung von Cyperus-Sprößlingen ein. Aber ohne Rückporto. Den obwaltenden, allgemeinen Verhältnissen nach bin ich auf eine derartige Naivität oder gesunden Egoismus nicht eingerichtet. Sogar ornithologische Naterteilung wird gewünscht — alles per Rechnung und Nachnahme! Ein wenig Nachdenkender wird mir Recht geben, daß dies weder für einen Geschäftsmann, noch für einen Privatgelehrten für die Zeitlage ein empfehlenswerter Verkehr ist. Zur Sache erkläre ich: Cyperus-Sprößlinge, soweit Vorrat reichte, habe ich bereits im vorigen Jahre restlos vergeben, und zwar ohne Geschäftszweck. In diesem Jahre muß ich die Triebkraft der Pflanze erst abwarten. Arthur Dresler.

Vereinigung der Vogelliebhaber Landesverband Sachsen.

Bericht über die am 28. und 29. April 1923 stattgefundene Jahresversammlung.

Die Vereinigung der Vogelliebhaber Landesverband Sachsen beging, worauf wiederholt in der „Gef. Welt" hingewiesen worden war, am 28. und 29. April 1923 seinen 1. Jahrestag. Der Bedeutung für den Liebhaber entsprechend war zur Entgegennahme des Berichtes über die Entwickelung und den Stand der jungen Vereinigung aus Nah und Fern Folgschaft geleistet worden. Wie zu anderen Veranstaltungen der Leipziger Liebhabervereine auch, ließ die Teilnahme nichts zu wünschen übrig. Der Versammlungsraum war am Begrüßungsabende, dem 28. April 1923, voll besetzt und Frohsinn und gute Laune hielten Einzug.

Der rührige Vorsitzende der Sächs. Vereinigung, Herr Birk, begrüßte mit schlichten warmen Worten die Festteilnehmer und ließ sich dabei nicht die Gelegenheit nehmen, auf die Bedeutung des gegenwärtigen und folgenden Tages hinzuweisen. Es waren Worte der Zufriedenheit, aber auch der Sorgen des Idealisten, wie er in Liebhaberkreisen doch noch, aber immerhin wenig angetroffen wird.

Aus Liebe zur Sache widmeten sich Mitglieder und deren Angehörige der Verschönerung des Festes. Es mögen erwähnt und dankend anerkannt werden das Quartett Rüffer, das die Veranstaltung der Vereinigung durch Darbietung mehrerer wunderschöner, dem Feste angepaßter Lieder, unterstützte. Frl. Böttcher im Verein mit Herrn Böttcher jun. boten durch Liedervorträge teils mit Lauten-, teils mit Klavierbegleitung Genüsse seltener Art. Herr Otto Winkler, ein Genie erster Klasse, weil er Alltagsmensch, Liebhaber der Vogelwelt, Bildermaler und nicht minder Spaßmacher ist. Er hatte, wie immer, die Teilnehmer auf seiner Seite. Einen weiteren seltenen Genuß bot Herr Birk in seinem Vortrag: Betrachtungen über die Liebhaberei. Gewann sich Herr Winkler die Herzen der Teilnehmer durch seinen frischen Humor, so zog Herr Birk mit seinem herrlichen Vortrag die Liebhaberherzen an sich. Es waren wiederum ernste Worte eines Führers seltenster Art, des ausgesprochenen Idealisten in der Liebhaberei, Worte, die auch unfruchtbaren Boden aufnahmefähig machen und unter seiner zahlreichen Anhängerschaft Frucht zeitigen werden. Und zuletzt sei noch des Herrn Beeger gedacht, der durch Deklamationen sein bestes beitrug, Gäste und Liebhaber zu erfreuen. — Wie an anderer Stelle, so soll auch hier noch mal allen, Damen und Herren, der beste Dank der Vereinigung abgestattet werden.

Am 29. April 1923, vorm. 10 Uhr, fand die geschäftliche Sitzung statt. Vertreten waren die Vereine Chemnitz, Zwickau, Leipzig, Dresden und Seifhennersdorf, der Verband Mitteldeutscher Vogelhändler, Ortsgruppe Leipzig, und persönlich war das Einzelmitglied, Herr Kurt Geilert aus Elsterberg i. V., erschienen. Ferner nahmen zahlreiche Gäste und Interessenten von hier und anderen sächsischen Orten teil. Zur Aussprache und Kritik standen die in der „Gef. Welt" Nr. 8 vom 3. Mai 1923 festgesetzten Tagesordnungspunkte. Die Gründungniederschrift wurde genehmigt, die Vollmachten der Vereinsvertreter in Ordnung befunden. Der Jahresbericht des 1. Vors., Herrn Birk, gewährte Über- und Einblick in das Schaffen und über das zielsichere Vorwärtsschreiten der Liebhaberbewegung in Sachsen. Der Mitgliederbestand der Vereinigung am Berichtstage betrug 383 Vereins- und 14 Einzelmitglieder, zusammen 397. Nicht einbegriffen sind in diesen Zahlen die Anmeldungen von Sächs. Vereinen und Einzelmitgliedern, die sowohl während als auch nach der Jahresversammlung getätigt wurden. Die Werbung für den Landesverband erfolgte in Tages- und Fachzeitschriften, der Erfolg war jedoch nicht der aufgewendeten Arbeit und den Kosten entsprechend, dagegen brachten die persönlichen und schriftlichen Bemühungen einen weit besseren Erfolg. Die Ursache der Erfolglosigkeit der Zeitungs- und Zeitschriftenwerbung lag zum größten Teil darin, daß die Zeitschriften für den minderbemittelten Liebhaber nicht erschwinglich und andererseits die Werbeersuchen der Vereinigung wohl in vielen Zeitungen nicht aufgenommen sein dürften. Ein weiterer Grund besteht auch zweifellos darin, daß infolge der strengen sächs. Vogelschutzbestimmungen mancher Liebhaber im verborgenen Winkel seiner Liebhaberei huldigt und der Öffentlichkeit abgeneigt ist. Vor allem der letzteren Ansicht, daß das Halten von Stubenvögeln nur im Verborgenen blühen darf, wird künftig die Vereinigung ihre Aufmerksamkeit widmen müssen. — Trotz der geringen Beiträge, die sowohl von den Vereinsmitgliedern als auch den Einzelmitgliedern im vergangenen Geschäftsjahr erhoben wurden und dank zahlreicher Stiftungen aus Mitgliederkreisen konnte die Vereinigung nach dem Kassenbericht des Kassierers, Herr Ludw. Böttcher einen Kassenbestand von 4249.— ℳ am Ende des Geschäftsjahres buchen. — Die Wahl des Gesamtvorstandes erfolgte in kürzester Frist. Der bisherige Vorstand wurde einstimmig wiedergewählt und besteht fürs neue Geschäftsjahr aus den Herren Birk als 1., Scholtisch als 2. Vors., Petters als 1., Vorwerk als 2. Schriftf., Ludw. Böttcher als Kassierer. Beisitzer im Vorstande sind wie bisher die jeweiligen 1. Vorsitzenden der angeschlossenen Vereine. Kassenprüfer sind die Herren Niemand und Roth. — Die Beiträge zur Vereinigung sind neu geregelt worden. Den Forderungen der Zeit, in erster Linie aber den Postgebühren entsprechend, mußte der Beitrag für Einzelmitglieder auf 500.— ℳ, deren Aufnahmegebühr auf 100.— ℳ und der Beitrag für Vereinsmitglieder auf 100.— ℳ fürs laufende Geschäftsjahr festgesetzt werden. — Einem Antrage Zwickaus entsprechend stimmte die Vereinigung in der Ansicht, ein gutes Werbemittel zu erhalten und auch die noch nicht angeschlossenen Liebhaber an die Öffentlichkeit zu bringen, der Stiftung von Verbandsehrenpreisen in Gestalt von Diplomen oder ähnl. zu. Die Preise stehen ausstellenden Vereinen zur Verteilung an ein Mitglied zu. Ein zweiter Antrag Zwickaus, Kauf- und Tauschmöglichkeiten unter Mitgliedern zu schaffen, wurde vertagt und auf den Plan über die Obliegenheiten des zu gründenden Reichsverbandes gesetzt. — Einer der wichtigsten Punkte der Tagesordnung war: Die Verschiebung unserer Waldvögel ins Ausland. Es galt, im Verein mit dem Verbande Mitteldeutscher Vogelhändler, Ortsgruppe Leipzig, Mittel und Wege zu finden, um der Verödung unserer Natur und dem Massenvogelmord zu steuern. Zunächst wurde als erster

Weg der aufgenommen, Verständigungen zu suchen zwischen den die Sache bekämpfenden Verbänden und den Exporteuren, ferner auch mit den Zeitungen und Zeitschriften bezw. Fachschriften, die durch Aufklärungshinweise den Exportfirmen die Ausführung erleichtern zum Schaden der Allgemeinheit und Liebhaber. Sollte dieser Weg nicht zum Erfolge führen, so soll die Angelegenheit dem Plane über die Obliegenheiten des Reichsverbandes einverleibt werden. — Den Wünschen der thüringischen Liebhaber kommt die Vereinigung nach gefaßtem einstimmigen Beschlusse in der Weise entgegen, daß die thüringischen Liebhaber Anschluß an den Sächs. Landesverband finden können. — Zur Fortbildung, Aufklärung der Mitglieder und zu Werbezwecken fand eine Anregung Zwickaus einstimmige Annahme, Vorträge zur Verfügung zu stellen, die in den angeschlossenen Vereinen Verwertung finden können. Herr Birk erklärte sich bereit, unter Vorbehalt des Eigentumsrechts seine druckreifen Vorträge zur Verfügung zu stellen. An die Schaffung eines Vortragsarchivs soll gedacht werden. Für Material werden die Vereine sorgen, die dazu in der Lage sind. — Zur Teilnahme an der Gründung des Reichsverbandes werden zwei Vertreter abgeordnet werden. Alles Erforderliche regelt der Vorstand. Die Kosten sollen im Umlagewege von den Vereinen und Einzelmitgliedern erhoben werden. —

Der Schluß der 1. Jahresversammlung erfolgte nachmittags um 2 Uhr. Die Liebhaber schlossen sich in Gruppen zusammen und besichtigten die Bestände einzelner Liebhaber. Die Zeit war kurz bis zur Abfahrt des Zuges, der die auswärtigen Liebhaber wieder an Ort und Stelle bringen sollte. Petters.

Aus den Vereinen.

A. Z. Angemeldet sind die Herren Viktor Prayer, Hadersdorf-Weidlingen b. Wien, Mauerbachstr. 20; Karl Gleißner, Gera-Reuß, Schillerstr. 14; Dr. Emil Schünke, Kiel, Flenthör 28; Chr. Frandzen, Kristiania (Norwegen), Raadhusgaten 2; Frl. Karin Biese, Helsingfors (Finnland), Konstantinsgatan 15. — Aufgenommen sind die Mitgl. Nr. 314 Ad. Peltzer, Düsseldorf-Gerresheim, Benderstr; Mtgl. 315 Heins Heck, Tierfarm Elsenhöhe b. Marburg a. L.; Mtgl. 316 Oskar Scherz, Kaufmann, Wien II, Ferdinandstr. 31; Mtgl. 317 A. Bätz, Berlin-Tempelhof, Kaiserin-Augusta-Str. 9; Mtgl. 318 Artur Brathuhn, Eisleben, Helbraer Str. 47; Mtgl. 319 Lektor Carl E. Andersen, Sönderborg (Dänemark), Voldgade 1; Mtgl. 320 Willi Möhring, Schafstädt b. Merseburg, Markt 183. Mtgl. 310 ist zu berichtigen: Gleißner, Heusteigstr. — Mtg. 31 (Wagner, Salzbrunn) verk. 1,1 gelbe, 0,1 weiße, 1 junge Lachtaube, evtl. mit Käfig; Mtgl. 65. (Müller, Küllstedt) verk. 1,0 Nymphe, 1,1 Bandfink; Mtgl. 71 (Weinheimer, neue Adresse undeutlich, bitte wiederholen) sucht 0,1 Silberschnabel, 0,1 Amarant, 0,1 Bandfink, 1,1 Schmetterlingsfink; Mtgl. 235 (Richter, Bernstadt) sucht 0,2 Wellensittiche, evtl. i. T. gegen Männchen, ferner Exoten und Sittiche aller Art; Mtgl. 282 (Schiebe, Liegnitz) gibt ab: je 1,1 Grauastrild, Schönbürzelchen, Elsterchen, Bandfink, Schwarzkopfnonne, Tigerfink, je 1,0 Maskenamandine, Spitzschwanz i. T. gegen Schmetterlingsfinken, Sperlingspapageien, Grauköpfchen, Wellensittiche oder bessere Exoten; Mtgl. 292 (Huth, Perleberg) sucht 1,0 blaufl. Sperlingspapagei i. T. gegen 0,1, sucht Nymphen. (Händlerangebote bisher nicht eingegangen.) — Aus Liebhaberhand ist der A. Z. Schama mit Schindlerkäfig angeboten. Mtgl. 14 hat stets Interesse für seltenere Weber und Witwen. Von einigen neuen Mitgliedern sind z. T. sehr erhebliche Beiträge gespendet, die ich aus verschiedenen Gründen nicht veröffentlichen will. Aufstellung im neuen Jahrbuch. Sämtliches Papier und Umschläge für das nächste Jahrbuch ist bereits eingekauft. Erbitte schon Anmeldungen für redaktionelle Beiträge als Erweiterung der im Jahrbuch 3 begonnenen Zuchtberichte, ferner zur Reproduktion geeignete Aufnahme einer Vogelstube oder Voliere. — Am Dienstag abend, dem 8. Mai, fand im Lloydhotel in Hamburg eine zwanglose Zusammenkunft daran interessierter Mitglieder statt. Anwesend waren die Herren Pölz, Zielsdorff, Müller-Hamburg, Ludwig-Halle, Schütze-Eystrup und Krabbe-Anklam. Nachdem am andern Morgen die Herren Haberlandt sen. und jun. und Grosse-Magdeburg eingetroffen waren, fand um 9 Uhr der vorher angemeldete Besuch bei Fockelmann in Großborstel statt. Die gespannten Erwartungen, mit denen man den Park betrat, sind nicht enttäuscht worden. In liebenswürdiger Weise empfangen, wurde sofort eine eingehende Besichtigung der ausgedehnten Räume des Vogelhauses vorgenommen. Es war ein großer Transport südafrikanischer Vögel eingetroffen, der sich den entzückten Blicken in durchweg tadelloser Beschaffenheit präsentierte. Dazu in dichtgedrängten Scharen „Senegalfinken" aller Art. Besonders hervorzuheben waren Elfen-, Bunt- und Angolablauastrilde, seltene Witwen, darunter Hahnschweif- und Königswitwen, Oryx-, Taha-, Mahali- und Textorweber, Schnurrbärtchen, orangegesichtige Unzertrennliche, Meyers Langflügelpapageien, Glanzstare und Beos, fingerzahme Leveillants- und Rotkopfbartvögel, Rotsteißbülbül, Fächerpapagei, Helmkuckuck und Schuppenwachtel. Besonderes Aufsehen erregten die zum erstenmale eingeführten südafrikanischen Bienenfresser in bester Befiederung. Nachdem den vielfachen Wünschen der anwesenden Herren Rechnung getragen war, lud Herr Fockelmann zu einem frugalen Frühstück ein, dem munter zugesprochen wurde, bis man nach angeregter Unterhaltung dankerfüllten Herzens reichlich spät und mehr oder minder beladen von den freundlichen Gastgebern schied. A. Krabbe, Anklam.

V. A. Z. Mtgl. S 16 tauscht 1 ♂ Heidelerche, 1 ♂ Feldlerche, 3 Zaunkönige. Mtgl. F 19 sucht in Tausch Singvögel beliebiger Art. Mtgl. L 11 tauscht 1 ♂ Amarant und 1,1 Astrild gegen Exoten und großen Flugkäfig.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig. Nächste Sitzungen Donnerstag, den 7. Juni und Donnerstag, den 21. Juni, im Vereinslokal „Bauers Brauereirestaurant", Täubchenweg. Gäste sind willkommen.
J. A.: Joh. Birk, 1. Vors., Leipzig-Mockau, Beuthstr. 29.



Herrn V. M., F. b. Krefeld. Die Sendung ist gut angekommen. Obgleich die Puppen 6 Tage unterwegs waren, waren sie noch von guter Beschaffenheit und der Inhalt war milchig, trotzdem sie etwas zusammengeschrumpft waren.

Herrn A. H., München. Der Zeisig ist einem Herzschlag erlegen. Besondere Krankheitskennzeichen waren nicht festzustellen.

Herrn J. H., Nordhorn, ist brieflich Bescheid zugegangen.

Herrn W. K., Hildesheim, ist brieflich Auskunft erteilt.

Herrn Dr. H., Hamburg. Die Veröffentlichung der Einsendung würde mir und dem Einsender evtl. einen Prozeß wegen Beleidigung duech die Presse zuziehen, möglicherweise auch noch eine Schadenersatzklage. Ich beurteile das Verhalten der Fa. selbstverständlich nicht anders, als Sie es tun.

Herrn A. W., Jena. Den gütigst übersandten Vortrag werde ich gelegentlich veröffentlichen. Besten Dank für die Grüße und herzliche Erwiderung.

Herrn W. Z., Potsdam. Aegintha und Vereinigung der Liebhaber einheimischer Vögel zu Berlin. Adressen sind unter der Rubrik „Aus den Vereinen" zu ersehen.

A. Sch., Bln.-Charlottenburg. Einen Wildfang Sittich zu zähmen, dauert im allgemeinen geraume Zeit. Viel hängt vom Alter, der Eigenart des Vogels und vom Wesen und Geschick des Pflegers ab. Goldstirnsittiche sind meist der Zähmung wenig zugänglich, oder es dauert bei ihnen geraume Zeit. Schneller wird die kleine weißschnäblige Art der Elfenbeinsittich zahm. Meist sind von der Schmalschnabelsittichgruppe die Feuerflügelsittiche so zahm, daß sie sofort auf die Hand kommen. Am wenigsten eignet sich für die Zähmung von den Vögeln dieser Gruppe der Tuikasittich. Außerordentlich zahme und liebenswürdige Vögel sind aufgepäppelte Sittiche der verschiedensten Arten. Solche Tiere sind ab und zu bei den Händlern erhältlich.

Herrn H. B., Kirchmöser. ♀ Erlenzeisig ist einer Darmentzündung erlegen. Wodurch diese hervorgerufen, kann nicht festgestellt werden.

Futtermittel

Vogelfutter

für Kanarien, Waldvögel, Exoten, Papageien, Weichfresser. Anfragen nur gegen Rückporto. Liste 13 über Vogelfutter 50 *M*, Liste 5 über Vogelkäfige, Zuchtgeräte usw. mit etwa 400 Abbildungen 150 *M*. [379

W. Göpel, Leipzig,
Tröndlinring 1. Telephon 14958.

Größerer Posten frische **Ameiseneier** per sofort zu kaufen gesucht, ebenso auch mehrere Paare Ia Wellensittiche zur Zucht. Eilangebot an **Josef Hochholzer, Leopoldskron Nr. 100** (Salzburg). [380

Vögel

Zwecks Blutwechsel gebe zuchtfähiges
Wellensittichmännchen
(grün) gegen gleiches im Tausch. [381
Landwehr, Dortmund,
Schmiedestr. 13a. A. Z. Nr. 241.

Suche Wellensittichweibchen, einige grüne und gelbe, zu höchsten Liebhaberpreisen. Gebe evtl. prima Nachtigall in Zahlung oder Tausch gegen Exoten. [382
Wisniewsky, Leipzig-Eu.,
Görlitzer Str. 8.

Verkaufe 5 Stück junge grüne
Wellensittiche
gegen Gebot, evtl. Tausch auf **gelbe.**
R. Tilch, Neurode i. Schles.,
Kirchstraße 7, II. [383

Suche eine pr. **Gartengrasmücke**
zu tauschen gegen einen pr. Schwarzkopf.
H. Eberhardt, Nordhausen,
Altendorf 36. [384

Tausche Steinkauz gegen Weichfresserkäfig oder besseren Weichfresser. [385
E. Nawior, Rothenschirmbach
(Kreis Querfurt).

2,2 gr. Wellensittiche, Ia Zuchtpaare, 3 sechs Monate alte Junge, 1,0 dtl olivgrüner Wellensittich, Zuchtv. f. d. Meistgebot zu verkaufen. [386
Reinhold, Königsberg i. Pr.,
Insel Venedig 1 II. Ansr. u. geg. Rückp.

2,1 Zebrafinken
zu kaufen gesucht, auch einzeln. [387
Bindnagel, Elberfeld,
Flensburger Str. 9.

Ia Sprosser u. Nachtigall
im Tausch gesucht gegen Textilwaren.
Paul Schönfelder,
Bertsdorf b. Zittau. [388

Suche 0,1 Lachtaube und 0,1 Turteltaube,
Garantie für Geschlecht, gegen guten Preis. Tausche evtl. 1,0 Lachtaube.
Th. Lehmann,
Stotternheim (Thür.). [389

Gebe noch einige **pr. Paare Wellensittiche** gegen einen g. Photogr.-Arparat ab. **Syré,** Lehrer, **Biernau i. Th.** [390

Vertausche Zeisig, Stiegl. u. Buchf. geg. Nützliches. Angebote erb. **H. Roth, Bremerhaven,** Deich 87 III. [391

Zebrafinken gesucht,
i. T. gebe diverse Prachtfinken, Zuchtp. Girlitze. Kaufe auch Obige. [392
A. Schiebe, Liegnitz i. Schl.
Luisenstraße 24 III.

1,1 Gimpel, ♂, Stieglitz, Girlitz, Buchfink, ♂ Sumpfmeise, Goethes, Schillers sämtliche Bände, wie Briefmarkf. 1500 Stück, Sätze tausche gegen 3 Paar Exoten, 2 Wellensittiche. [393
Laßner, Liegnitz, Kaiserstr. 8.

Reform-Käfige

Zerlegbar · Leichteste Reinigung · Einfachster sicherer Transport
1. Preis beim Käfig-Wettbewerb Leipzig 1919 (s. Ges. Welt 1920, Heft 14—16)
werden für alle Vogelarten hergestellt.
Goldene Medaille Leipzig 1921.

Ausführung: Hartholz, grünlackiert oder naturlackiert, Zinkschublade, Porzellannäpfe, Ledertuchdecke.
Keine Fabrikware, sondern beste Spezialarbeit!
Anfertigung als Kistenkäfig oder Wiener Form (halboffen) oder halboffen mit fester Rückwand. Ohne jedes Werkzeug in einer Minute zusammengestellt resp. zerlegt. Verpackung zum Selbstkostenpreis.
Fertigen auch jede Art Käfige u. Volieren n. Zeichnung od. Maßangabe.

Anfragen Rückporto beifügen
Katalog gegen Einsendung von 150 Mark in Briefmarken.

Schlagnetze ohne Mittelsteg
für schädliche Vögel, prima handgeknüpfte Ware.

Kühn & Muschter, Inh. Arthur Muschter,
Borna b. Leipzig, Kasernenstr. 4.
Spezialwerkstätte für Käfigbau.
Bank-Konto: Allgemeine Deutsche Credit-Anstalt Zweigstelle Borna.
Stadt-Girokasse Borna b. Leipzig Nr. 1506.
Postscheck-Konto: Leipzig 92250. Fernsprecher 147. [394
Zahlreiche Anerkennungs- und Dankschreiben.

Papageien
Kanarienhähne
Bastarde

kauft höchstzahlend und tauscht auch auf Exoten

Willy Odenwald, Fulda.

Eigner Export und Import. [395

Kaufe laufend zu konkurrenzlos höchsten Preisen:

Kanarienhähne und -weibchen

sowie **Sing- und Ziervögel, Exoten aller Arten, Papageien, graue, grüne usw.**

Arthur Muschter, Borna b. Leipzig,
Käfigfabrik und Vogelhandel en gros und en detail
Import. **Export.**
Anfragen Rückporto beifügen. [396

Wir suchen laufend

nur vollständige Jahrgänge und ganze Reihen, gebunden oder in Heften mit Titel, Inhaltsverzeichnis u. Farbentafeln

Gefiederte Welt
Journal für Ornithologie
Blätter für Aquarien- u. Terrarienfreunde

zu angemessenen Preisen.
Angebote nur **mit** Preisen erbeten.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg
Postschließfach 148.

„Ornis" [397

Freie Bezugs-Vereinigung der Waldvogel-Liebhaber Deutschlands
bestand von 1912 bis 1. Oktober 1920. Durch sachgemäße und reelle Belieferung der Mitglieder mit Vogelfutter u. Bedarfsartikeln erwarb sie sich einen Ruf, der noch fortbesteht. — Auf vielseitigen Wunsch bringe ich diese Tatsache in Erinnerung, auch allen denjenigen, die von dem Bestehen derselben noch keine Kenntnis haben. — Ein **Benachrichtigungsblatt** kann leider **nicht** mehr erscheinen, doch ist das Ornis-Haus nach wie vor bestrebt, die besten von allen am Markte erhältlichen Artikeln zu liefern; das mir geschenkte Vertrauen werde ich weiter zu erhalten wissen. — Über meine Tätigkeit gibt das „Ornis-Buch" Auskunft. Rabatt kann **nicht** mehr gewährt werden, doch kommen nur brauchbare Mischungen zum Versand. Bei Anfragen erbitte ausreichendes Rückporto und Angabe der vorhandenen Vogelarten. — Auskunft bereitwilligst. Bücher und Blätter sende für 800 Mk. frei (Ausland 2400 Mk.)

Ornis-Haus, Halle a. S.
Fernruf 4198

„Reform · Normal"-Weichfutter nach Angabe des Herrn Apotheker Adalbert Jena-Biberach-Riß. Moderner elektr. Betrieb. Gleichmäßige Körnung, restlofer Verbrauch garantiert.

Gebe noch einige pr. Paare **Wellensittiche** auf erstkl. Tauben ab, Starenhälse bevorzugt. [398
Syré, Lehrer, Biernau i. Thür.

Vert. einschall. Reitzugf. geg. Nützliches. 399] Oberlehrer **Günther, Lommatzsch.**

400] **Gefied. Welt** 1903—1918 geb., 1918—1923 in Heft., tadellos erh., f. Höchstgeb. zu verkauf. Gefl. Angeb. an **M. Hellwig, Würzburg,** Erthalstr. 4.

Gegen Höchstgebot zu verkaufen:
Flörickes Vogelbuch, Ges. Welt 21 u. 22, geb., Die Prachtfinken und Präparator, geb., Der Kanarienvogel, Wellensittich von Dr. K. Ruß, Vogelzuchtbuch von Dr. K. Ruß, 1 Fernglas (Prismenglas) 8×80 mill. frei Porto. [401
Karl Kirchenmaier, Oestringen, Baden.

Verkaufe gegen Gebot:
Neunzig, Fremdl. Stubenvögel, geb., neu, 1 Flugkäfig 80×39×77, f. neu, 1 Steinkauz, 1 Heidelerche, tausche auf Grasmücke und Gelbspötter. Retourmarke.
A. Freiwald, Heuelingen b. Bremen,
Sandstraße 2. [402

Kaufe zu guten Preisen: Ges. Welt, einzeln und reihenweise, gebd. oder ungebd. — Brehm, Gefang. Vögel. — Reichenow, Papageien. Alle größeren ornithol. Werke. Getrockn. Ameiseneier Weißwurm und Mehlwürmer. [403
A. Troschütz, Hannover,
Große Aegidienstr. 4.

Gesucht
Ornith. Monatsschrift
1907, 1914.
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung
Magdeburg.
Postschließfach 148.

Tausche Armeepistole 08
nebst 100 Patr. gegen Wellensittich
Angebote unter M. W. 99 postlagernd
Rietschen, O.-Lauf., Schlesien. [40

Inserate

für das am 21. Juni 1923 z
Ausgabe gelangende Heft 12 der Ge
Welt erbitten bis 15. Juni 1923 frü
Die viergespaltene Nonpareillezeile ob
deren Raum wird mit **10 Pf. Grun**
preis berechnet, der mit der vo
„Börsenverein der Deutschen Bu
händler bestimmten Teuerungszahl
zurzeit „4200" — zu multiplizieren i
— Auslandslieferungen —, 10 Schweiz
Franken.

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Hermsdorf bei Berlin; für den Anzeigenteil: Franz Wunderlich, Magdeburg, Postschließfach 148.
Verlag der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck: August Hopfer, Burg Bz. Mgdbg.

Jahrgang LII.
Heft 12. 21. Juni 1923.

Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Die Gefiederte Welt gelangt am Donnerstag nach dem 1. u. 15. jedes Monats zur Ausgabe und kostet für Monat Juni 750 Mark. Einzelpreis des Heftes 400 Mark. Auslandspreis für das Vierteljahr 2 Schweizer Franken, für das Heft 0,35 Schweizer Franken. Inserate für die folgende Nummer müssen bis spätestens Freitag früh in Händen der Verlagsbuchhandlung sein. Die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 10 Pfg. Grundpreis berechnet, der mit der vom „Börsenverein der Deutschen Buchhändler" von Zeit zu Zeit bestimmten Teuerungszahl zu multiplizieren ist. Die Teuerungszahl ist zurzeit „5000". — Auslandspreis für die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum —,10 Schweizer Franken.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung (M. Kretschmann) in Magdeburg.

Postschließfach 148. Postscheckamt: Magdeburg 3148. Fernsprecher: 1323.

Wellensittiche in der Gartenvoliere.

Von Norbert Grasl.

(Nachdruck verboten.)

Als eifriger Züchter von Wellensittichen — ich habe im Laufe eines Jahrzehntes wohl an tausend Stück dieser reizenden Tierchen in meinen Gartenvolieren flügge werden gesehen — erlaube ich mir, zu diesem Thema auch das Wort zu ergreifen, zumal Herr Lichtenstädt dazu auffordert.

Schon vor Jahren habe ich darauf hingewiesen, daß meine Wellensittichzucht in freier Gartenvoliere außerordentliche Erfolge aufzuweisen hat, und es gereicht mir zur Freude, daß vom züchterischen Standpunkt die Käfigung von Wellensittichen in Gartenflughäusern immer mehr Beachtung findet. Auch ich kann nur bestätigen, daß bei meinen Wellensittichen Gelege unter 6 Eiern nur ausnahmsweise (meist bei jungen Weibchen) vorkommen, dagegen 6—10 Eier die Regel sind. Für Liebhaber, die nur im Zimmer zu züchten Gelegenheit haben, mag dies wie Aufschneiderei klingen, denn die Zuchtergebnisse im Zimmer sind oft genug sehr spärliche. So erzielte ein hiesiger Liebhaber mit 6 Pärchen heuer in zwei zweckmäßigen Käfigen bei denkbar günstigstem Standort und sorgfältiger Verpflegung 3 Junge. Ein zweiter Liebhaber von 3 Zuchtpaaren nur eines.

Nachstehend meine Zuchterfolge im abgelaufenen Sommer mit 6 Paar Sittichen:

Paar	I	2	Bruten	32	Eier	18	Junge flügge
„	II	3	„	17	„	15	„ „
„	III	2	„	16	„	0	„ „
„	IV	4	„	25	„	20	„ „
„	V	3	„	24	„	18	„ „
„	VI	3	„	24	„	9	„ „

d. i. zusammen 80 Junge von 138 Eiern. Bei obiger Aufstellung ist noch zu bemerken, daß mir außerdem 7 junge Sittiche vor dem Flüggewerden von Rußköpfchen umgebracht wurden, 6 Stück gingen im Nistkasten durch einen unglücklichen Zufall zugrunde und 11 weitere Junge starben unmittelbar vor dem Ausfliegen infolge Fütterung mit schlechter Hirse während meiner Erkrankung.

Meine Erfahrungen betreffs Winterbruten decken sich gleichfalls mit denen des Herrn Lichtenstädt. Auch im Spätherbst (Oktober) gelegte Eier wurden verlassen, Junge gingen größtenteils ein. Ein naßkalter Herbst fördert ganz besonders die Sterblichkeit der Jungvögel, während vorübergehende niedrige Temperaturen, auch unter 0 Grad, selbst dann nicht schaden, wenn die Jungen noch nackt sind. In früheren Jahren konnte ich die unangenehme Erfahrung machen, daß im Februar die vorzeitig vereinigten Paare brutlustig wurden und bei Temperaturrückschlägen Legenot auftrat.

Keinesfalls halte ich es aber für vorteilhaft, den Wellensittichen die Eier wegzunehmen und erst dann unterzulegen, wenn das Gelege vollzählig ist. Beispielsweise ist es mir infolge meines Berufes nicht möglich, so oft in die Nistkasten Einsicht zu nehmen, als mir dies notwendig erscheint, um zu vermeiden, daß die Eier vorzeitig angebrütet werden. Ferner kann der Pfleger eigentlich nie wissen, wann das Gelege vollzählig ist. Angenommen, man überläßt dem Weibchen nach dem 6. Ei das Gelege, so kann es immerhin passieren, daß das Tier weitere 6 Eier dazulegt; dann ist aber wieder ein Altersunterschied der Jungen von 10—12 Tagen vorhanden.

Allerdings machte auch ich die Wahrnehmung, daß von großen Gelegen meist nur 6 Junge großgezogen werden. Die zuletzt ausgefallenen sterben meist wenige Tage nach dem Schlüpfen. Aber in diesen Fällen helfe ich mir damit, daß ich die Jungen

nach ihrer Größe in den Nistkasten sortiere. Dabei habe ich wiederholt beobachtet, daß auch 9 und 10 Sittiche gleichzeitig in einem Kasten gut gedeihen und alle flügge werden, vorausgesetzt, daß der Altersunterschied dieser Tiere 8—10 Tage nicht übersteigt. Von einem Gelege von 11 Eiern beließ ich beispielsweise 6 Junge dem Elternpaare, während die später schlüpfenden Tiere unmittelbar nach dem Ausschlüpfen einem anderen Pärchen untergeschoben wurden, das durchwegs unbefruchtete Eier erzielt hatte. Alle 5 Stiefkinder wurden prompt flügge.

Auf einen Faktor möchte ich aber besonders aufmerksam machen, der die Wellensittichzucht leicht vereitelt, ich meine die Bösartigkeit einzelner Weibchen. Diese Xantippen sind nach meiner Erfahrung weit häufiger, als vielfach angenommen wird. Es gibt Tiere, die Jahr und Tag die denkbar besten Mütter sind und sich plötzlich einbilden, einen anderen Nistkasten beziehen zu wollen. Die dort vorhandenen Jungen werden einfach umgebracht, das dort bisher ansässige Paar vertrieben. Wenn die gefährdete Brut rechtzeitig anderen Paaren untergeschoben werden kann, so tröstet sich das vertriebene Paar meist schon nach wenigen Tagen mit einem anderen Nistkasten und beginnt dort eine neue Brut, ohne weiter behelligt zu werden. Aber es gibt noch viel gefährlichere Weibchen, die sich nicht begnügen, nur eine Familie zu delogieren. Ich meine solche Weibchen, die von Kasten zu Kasten wandern, alle Junge umbringen und alle Paare beunruhigen. Solche Tiere sind dabei aber selbst meist schlechte Brüterinnen und vereiteln in der Voliere jeden Zuchterfolg. Nachdem sie sich auch im Einzelkäfig meist nicht bewähren, empfehle ich, sie abzuschaffen.

Aus obigen Gründen empfiehlt es sich, in einem Flughause nicht mehr als 3—4 Paare einzusetzen, sonst geht bei störenden Weibchen die Übersicht verloren. Wenn Brehm von Zuchträumen erzählt, wo Hunderte von Pärchen „friedlich" nebeneinander nisten, so kann ich nicht glauben, daß eine solche Zuchtanlage einträglich sein kann, weil es ganz unmöglich ist, eine große Anzahl von Weibchen, die alle einen Flugraum bewohnen, genau zu beobachten. Gar bald würde man unangenehme Dinge beobachten können, ohne die Urheberin unter den vielen Tieren eruieren zu können. Dagegen glaube ich, daß eine Anzahl kleinerer Gartenvolieren (mit etwa 6 bis 8 Raummeter), die jede mit 3—4 Paar Sittichen bevölkert ist, eine vorteilhafte Anlage wäre, deren wirtschaftlicher Wert sicher nicht unbedeutend genannt werden könnte.

Ferner sei noch hervorgehoben, daß ich in Gesellschaft von Wellensittichen alles mögliche fliegen hatte, wobei ich die Wahrnehmung machte, daß die Wellensittiche in freier Gartenvoliere nicht so leicht störend auftreten. Ich zweifle natürlich nicht daran, daß häufig Störungen vorzukommen pflegen, aber ich glaube, es handelt sich dabei um oben geschilderte Weibchen, die ihre Artgenossen genau so behelligen wie andere Vögel. Wenn die Wellensittiche aber normal brüten bzw. unter den Nistkasten ihre Wahl getroffen haben, werden andere Nester kaum beachtet. So wurden beispielsweise 3 im Flugraum ohne besonderen Schutz angebrachte Harzerkanariennester nicht beachtet. Vor Jahren habe ich gemeinsam mit Wellensittichen im selben Flugraum Mövchen und selbst Dompfaffen (Gimpel) gezüchtet. Auch die brütenden Sonnenvögel blieben unbeachtet. Nymphensittiche und Rußköpfchen lebten in friedlicher Eintracht mit den Wellensittichen. Nur heuer waren die letzteren von den Rußköpfchen leidenschaftlich befehdet worden.

In den einschlägigen Werken von Ruß und Neunzig wird immer betont, daß die kleinen Prachtfinken und ihre Nester vor den Wellensittichen besonders geschützt werden müssen. In meinem Flughaus trugen heuer Bandfinken emsig in einen Nistkasten ein und legten ungestört ihre Eier. Natürlich bin ich überzeugt, daß die Bandfinken aus dem Kasten sofort weichen müssen, wenn ein Wellensittichpaar gerade dort brüten will. Das passiert aber auch einem schwächeren Wellensittichpaar. Es gilt eben auch hier das Recht des Stärkeren sowohl für die Sittiche untereinander als auch anderen Vögeln gegenüber.

Es ist nicht jedermanns Sache, nur Wellensittiche zu züchten. Die meisten Exotenliebhaber wollen eben andere bunte Tropenkinder auch im Käfig mitfliegen haben und womöglich von mehreren Paaren Junge erzielen. Da fällt es mir nun auf, daß dies von vielen Exotenliebhabern für unmöglich gehalten wird. Die Niststätten der Prachtfinken sollen da durch dichtes Gezweige geschützt werden usf. Vielleicht ist aber gerade das eifrige Brüten und die außerordentlich große Nachkommenschaft der Wellensittiche daran schuld, daß diese in der Gartenvoliere gar nicht Zeit finden, sich mit den anderen Vogelarten oder deren Nestern zu beschäftigen. Ich will durchaus nicht behaupten, daß die diesbezüglichen Beobachtungen anderer erfahrener Vogelfreunde nicht richtig sind, aber ich glaube, daß es ganz gut denkbar ist, daß sich Wellensittiche, deren Fortpflanzung in der Gartenvoliere viel lebhafter und glücklicher vor sich geht als im Zimmer, doch hier im Freien ihren andersartigen Käfiggenossen gegenüber sich auch anders verhalten als in der Wohnstube.

Wenn also in einem Gartenflughaus von etwa 6—8 Raummeter nur 3 Paar Wellensittiche fliegen, gleichzeitig aber noch je ein Paar Nymphen und Rußköpfchen und eventuell 1—2 Paar Prachtfinken oder ein Pärchen Sonnenvögel, so kann ein Käfig mit 6—8 Paaren diverser Vögel bevölkert werden, ohne daß die Übersicht verlorengeht, während es meines Erachtens schon weit unübersichtlicher wäre, in demselben Raum mit 6 Paar Wellensittichen züchten zu wollen. Wenn mir also beispielsweise für etwa 3 Flugräume 6 Paare Wellensittiche und ebensoviele Nymphen- und Prachtfinkenpaare zur Verfügung stehen, so würde ich nicht je einen Raum für Wellensittiche, einen für Nymphen und einen für Prachtfinken verwenden, sondern ich würde in jedem Käfig eine bunte Gesellschaft vereinigen. Vom Standpunkt des Liebhabers ist eine derartige Käfigung ebenso interessant wie auch in wirtschaftlicher Hinsicht zweckmäßiger, weil übersichtlicher.

Ich erblicke gerade darin das besonders Wertvolle und Interessante, daß der Exotenliebhaber in der Lage ist, in der Gartenvoliere seine Tiere in

einer Art zu käfigen, die den Gedanken Gefangenschaft nicht so leicht aufkommen läßt, und trotzdem oder besser vielleicht gerade deshalb reichliche Nachzucht erzielen kann.

So wird eine Anlage von einigen Gartenvolieren, mit bunten Exoten bevölkert, auch auf den der Liebhaberei fernstehenden Beschauer ganz anders wirken als ein Dutzend kleiner Flugkäfige im Wohnzimmer, deren jeder nur ein Pärchen Vögel beherbergt.

Ornithologisches in Goethes Dichtungen.

Von Walther Bacmeister.

(Nachdruck verboten.)

Es ist bekannt — fast brauche ich es nicht zu erwähnen —, daß Goethe, der große Dichter, auch ein Naturforscher von nicht geringer Bedeutung war. Sein ganzes Leben hindurch hat er sich mit verschiedenen Zweigen der Naturwissenschaft befaßt. Der Osteologie, der vergleichenden Zoologie, der Optik, der Meteorologie galt seine meiste Neigung;

Weidenlaubvogel. Fitislaubvogel.

für die Lehre von den Gesteinen und von der Geschichte der Erde hatte er eine besondere Vorliebe. Vor allem aber fesselte ihn die Pflanze und ihr Leben. Mit dem Mikroskop suchte er in ihr Geheimnis einzudringen. In Weimar, in Italien, in Karlsbad, wohin er eigens einen Pflanzenkenner mitgenommen hatte, vertiefte er sich in das Studium der Pflanze. Er wollte entdecken, wie „die Natur aus dem Einfachsten in das Mannigfaltigste sich entwickle." Die „Urpflanze" wollte er finden. Wie schön und wie bescheiden zugleich spricht er sich über diese Studien aus:

„Mit Botanik gibst du dich ab? mit Optik? Was tust du?
Ist es nicht schönerer Gewinn, rühren ein zärtliches Herz?
Ach, die zärtlichen Herzen! Ein Pfuscher vermag sie zu rühren;
Sei es mein einziges Glück, dich zu berühren, Natur!"

Welches Verhältnis aber nahm Goethe zur Tierwelt ein? Ich weiß es nicht, ob schon jemand mit dieser Frage sich näher beschäftigt hat. Ein Freund der Tierwelt in der Richtung, daß er Tiere gehegt und gepflegt hätte, war der Dichter offenbar nicht, wie es dies seine Freundin Charlotte von Stein gewesen ist. Den Hund beispielsweise scheint er gar nicht geschätzt zu haben. Er äußert sich in den „Epigrammen" sehr wegwerfend über ihn (Nr. 74), gleichzeitig allerdings auch im selben Atem über den Menschen. Auch Vögel scheint Goethe nie gehalten zu haben, wie dies der Dichter Moericke gerne getan hat. Doch habe ich, wenn ich mich recht erinnere, irgendwo gelesen, daß Goethe einmal dem geliebten Sohn August in dessen Jugendjahren ein paar Raubvögel angeschafft hat.

Das Verhältnis unseres Dichters zur vogelkundlichen Wissenschaft war ein sehr loses. Ich habe früher einmal in der „Ges. Welt" (47. Jahrg. 1918 Heft 1—3) Goethes Beziehungen zur Ornithologie darzustellen versucht und die Frage, ob Goethe sich mit der Vogelkunde wissenschaftlich beschäftigte, verneint, während ich die weitere Frage, ob er wenigstens vogelkundlichen Fragen Teilnahme entgegengebracht habe, bejahen zu sollen glaubte. Sein Berater in ornithologischen Angelegenheiten war, wie a. a. O. ausgeführt wurde, sein vogelkundiger Sekretär Eckermann. Aus dessen „Gesprächen mit Goethe" ist zu entnehmen, daß die Kenntnisse des Dichters von den Vögeln und deren Leben bescheidene genannt werden müssen. Offenbar waren ihm die Kleinvögel im wesentlichen unbekannt. Seine Kenntnisse blieben auf die größeren Arten beschränkt. Kuckuck, Eule, Storch, Rabe, Taube, Nachtigall, Kranich — diese und noch einige andere mehr kannte Goethe, wie wir dies aus seinen Schriften entnehmen können und wie sich dies fast von selbst versteht. Er war nicht der trockene Gelehrte, der Büchermensch, den statt der lebendigen Natur nur „Rauch und Moder, Tiergeripp und Totenbein" umgeben. Seinem offenen Sinn „enthüllten sich die Kräfte der Natur". Und da alles und gar alles, was er mit seinen lebhaften Sinnen erfaßte, auch einen geistigen Niederschlag in seinen Werken erhielt, so wird es nicht verwunderlich sein, daß auch die Vögel, die er kannte, in seinen Prosaschriften und Dichtungen nach dem Umfange seiner Kenntnisse von ihm verwertet wurden.

Waldlaubvogel.

Es erscheint mir nun nicht unmüßig und für Goethefreunde und -verehrer nicht ohne Reiz, der Frage nachzugehen, in welcher Weise Goethes vogel-

kundliches Wissen in seinen Werken zum Ausdruck kam. Die Frage in ihrem ganzen Umfange zu behandeln, verbietet die Beschränktheit des mir zur Verfügung stehenden Raumes. Ich möchte nur einiges Bezeichnende hervorheben.

Wenn wir nun zu den einzelnen Vogelarten, die Goethe erwähnt, übergehen, so ist — zum Glücke möchte ich sagen — von der bei Dichtern geringeren Grades so beliebten Nachtigall bei Goethe wenig die Rede. Erwähnt wird sie in dem Gedicht „Philine", wo sie in der Nacht „Verliebten liebevoll ein Liedchen singt". Schöner, anschaulicher, wie wir es sonst von Goethe kennen, mutet es uns an, wenn er in dem Gedicht „Sehnsucht" schildert, wie es ihn nach der Geliebten aus Zimmer und Haus hinausdrängt, dorthin, wo sich „die Wolken um Felsen verziehn", dort

. . . . wiegt sich der Raben
Geselliger Flug;
Ich mische mich drunter
Und folge dem Zug.
Und Berg und Gemäuer
Umflittigen wir;
Sie weilet da drunten,
Ich spähe nach ihr.

Da kommt sie und wandelt,
Ich eile sobald,
Ein singender Vogel,
Zum buschigen Wald.
Sie weilet und horchet
Und lächelt mit sich;
„Er singet so lieblich
Und singt es an mich."

Als Sinnbild des reinen ehelichen Glückes vergleicht unser Dichter in dem Gedicht „Die glücklichen Gatten" diese mit einem Pärchen weißer Tauben, das dorthin fliegt,

„Wo um besonnte Lauben
Gefüllte Veilchen blühn."

Ganz anderer Art ist das Gedicht „Beruf des Storchs", das über derben Spaß hinausgehend, man fast als frivol bezeichnen möchte. Dem Weisen von Weimar standen, wie wir wissen, eben alle Töne zur Verfügung, die zarten und derben, die leichten und tiefgehenden, die sinnigen und kecken. Ihm war nichts Menschliches fremd.

Ins Gebiet des Humors weist das Gedicht „Fuchs und Kranich", in dem er witzig einem sehr verschieden gearteten Gästepaar, das sich bei ihm zu Tische geladen hatte, auch verschiedenartige Gerichte auftischte, damit jedes auf seine Rechnung komme:

„Willst nicht Salz und Schmalz verlieren,
Mußt, gemäß den Urgeschichten,
Wenn die Leute willst gastieren,
Dich nach Schnauz' und Schnabel richten."

Ebenso heiter-liebenswürdig beschreibt der Dichter im „Frühlingsorakel" die bekannte Sitte, an den Kuckuck gewisse Fragen zu richten, auf die dann der „prophetische Vogel", der „Blütensänger", die Antwort durch die Anzahl seiner Rufe gibt:

„Hörst du! ein verliebtes Paar
Sehnt sich herzlich zum Altar;
Und es ist bei seiner Jugend
Voller Freude, voller Tugend.
Ist die Stunde denn noch nicht voll?
Sag', wie lange es warten soll!
Horch! Coucou! Horch! Coucou!
Immer stille. Nichts hinzu.
Ist es doch nicht unsre Schuld!
Nur zwei Jahre noch Geduld!"

Auffallend erscheint die französische Wortbildung „Coucou". Man hat geglaubt, aus dieser Form auf ein unbekanntes französisches Vorbild schließen zu sollen. Dem dürfte aber nicht so sein. Die Form „Coucou" entspricht einmal mehrfach im Gedicht dem Erfordernis eines reinen Reimes und außerdem ist mit Recht darauf aufmerksam gemacht worden, daß die Häufung des deutschen „Kuckuck" unerträglich hart sein würde. Das artige Gedicht ist in einem der ersten Lenze des 19. Jahrhunderts, vielleicht 1802, entstanden. (Fortsetzung folgt.)

Der Innenflugraum.

Von Alfred Troschütz, Hannover.

(Fortsetzung und Schluß.) (Nachdruck verboten.)

Goldstirnblattvogel: Schön, dumm, faul und gefräßig. Bald vertauscht. Weißohrbülbül, Kalabülbül, Rotohrbülbül: Von den dreien, die alle ziemlich ängstliche Naturen waren, ist mir der schwarzköpfige Kalabülbül durch Stimme und Benehmen am angenehmsten in der Erinnerung. Verkauft. Mamulastelze: Stattlicher Vogel mit gutem lerchenartigen Gesange. Angriffslustig, doch nie bösartig. Ausdauernd, sehr dankbar. Kubafink, Grauer Kronfink, Hartlaubzeisig, Mossambikzeisig, Graugirlitz, Magellanzeisig: Wie unsere Finken sehr angenehme, ausdauernde Gäste des Flugraums. Einige sind zänkisch, andere dagegen sehr gute Sänger. Den Magellanzeisig erwarb Herr Balser, Kreuzwertheim, der ihn sehr erfolgreich zur Zucht mit Isabellkanarien verwandt hatte. Paradieswitwe: Im Herbstkleid in den Flugraum gebracht. Das Prachtkleid entwickelte sich leicht, und der lange, wehende Schwanz sah beim Fliegen ganz malerisch aus. Sonst ohne Reiz. Abgegeben. Goldbrüstchen, Orangebäckchen, Tigerfink, Helenafasänchen, Schönbürzel, Elfenastrild, Binsenastrild, Diamantfink: Daß ich diese kleinen „Quäker" jemals wieder pflegen sollte, halte ich für ausgeschlossen, obgleich die letzten Vier äußerlich sehr gut wirken. Sie sind wenig ausdauernd und kommen im Flugraum nicht zur Geltung. Zwergelsterchen: Sehr nett. Hübscher Gesang. Drolliger Balztanz. Das Paar verschwand einige Wochen in einem Harzerbauer, den es mit Kiefernadeln bis auf ein enges Schlupfloch ausgefüllt hatte. Dann waren plötzlich vier Zwergelsterchen vorhanden. Die Jungen glichen den Alten täuschend. Bald ging es wieder ans Brüten. Als aber der Betrieb zu „gemischt" wurde, gab ich alle, um Inzucht zu vermeiden, ab. Dankbare kleine Vögel, hart und ausdauernd. Sehr zu empfehlen. Braunbrüstiger Blauschnäpper, Indischer Rotschwanz (?): Beide von Ruhe, Alfeld, erhalten, aber da verunglückt (Säurevergiftung), nicht lange genug gepflegt, um genau schildern zu können. Waren prächtige Flieger, die die Insekten vom Fenster holten, ohne dieses zu berühren. Mittelindischer Buschschmätzer (Cercomela fusca): Ersteinführung. Von Ruhe, Alfeld, erhalten. Drosselgröße. Dunkelbraunes Gefieder. Leicht gebogener Schnabel. Ausdauernd. Tötete im Frühjahr mehrere Blaukehlchen. Gegen andere Vögel friedlich. Da Gesang ganz reizlos, kommt der Vogel für die Haltung kaum in Betracht. Ich sehe deshalb von genauer Beschreibung ab.

Nunmehr, nach Aufzählung der mehr oder weniger erfolgreich gepflegten Arten, eine Zusammenstellung

der für den Anfänger oder den erfahrenen Pfleger geeigneten Vögel zu geben, scheint unnötig. Bei den ausländischen Vögeln verbieten Kosten und fehlende Einfuhr eine reichere Besetzung. Bei den Inländern beeinflussen die Beschaffungsmöglichkeiten, Raum und Zweck (Zucht) die Wahl. Daß friedliche Vögel mit viel Bewegungslust zu bevorzugen sind, ist naheliegend. Mancher liebt die allzeit muntere Meise, jener der Exoten bunte Schar. Dieser bevorzugt Grasmücken- oder Sprossergesang, den Finkenschlag, die laute Singdrossel. Andere züchten, der Zeitmode nachgehend, Wellensittiche. Wähle jeder nach seinem Geschmacke, bevorzuge aber immer kräftige, gesunde Tiere. Junge oder zarte Vögel fühlen sich im Flugraum nicht wohl. Das lebhafte Durcheinander, angriffslustige Mitbewohner, die am Futternapf oft feindselig sind, beunruhigen und ängstigen jeden Neuankömmling. Körnerfresser finden sich schon eher zurecht und den Weg zum Futter. Manchen Arten, wie Rotschwänzen, Hänflingen, Lerchen und Grasmücken müssen die Futternäpfe an die Plätze gestellt werden, wo sie Schutz suchen. Jeder neue Vogel erfordert stete Beobachtung, die übrigens überaus reizvoll ist. Schon der erste Tag gestattet Schlüsse auf späteres Zusammenleben. Geht der „Neue" ans Futter, schmeckt ihm dies, was man bald erkennt, sind weitere Besorgnisse unnötig. Die volle Gewöhnung an den Flugraum dauert länger, bis zu $1^1/_2$ Jahren. Das Gefieder wird dann etwas lockerer als in der Freiheit getragen, was den Laien beim Betrachten unter Außerachtlassung der Beschauungsnähe zum Staunen über die Größe der Vögel verführt.

Zwergelsterchen.

Ich vermeide es tunlichst, den gesunden Vogel zu berühren oder zu fangen, so leicht dies am Abend, nach Ausschalten des elektrischen Lichtes, mit der elektrischen Taschenlampe möglich ist. Jener Vogel wird durch den Zugriff erschreckt und geängstigt. Bei dem Krankheitsverdächtigen ist es ja nicht zu vermeiden, zumal in der Vogelstube die sichersten Erkennungszeichen der Krankheit, die Beschaffenheit des Kotes, fehlen. Mit den Jahren übersieht man mit einem Blicke den Gesundheitszustand seiner Pfleglinge, täuscht sich aber oft über die Schwere und den Fortschritt der Krankheit. Vom Erkennen des Krankseins bis zum tödlichen Ende sind es oft nur wenige Tage, selbst bei Vögeln, die jahrelang in bestem Gesundheitszustande waren. Kränkelt der Vogel länger, wird er immer magerer, ist eine Hilfe selten möglich. Erlaubt Zeit und Zustand die Freilassung nicht, dann mache man rasch ein Ende. Den Vogel in die Hand genommen, Kopf und Rücken nach unten, beendet ein harter Wurf auf den Boden das Leiden sofort und ohne Qual. Zum Glück sind solche Fälle recht selten. „Kurieren" kann man öfter. Das Beschneiden der Krallen und Schnäbel ist bei älteren Vögeln von Nöten. Ich habe es einmal bei einer 12 Jahre lang gepflegten Bartmeise übersehen. Das Tier blieb im Gezweig hängen, brach ein Bein und ging daran zugrunde. Ein Schnabelbruch, und die unzweckmäßige Entfernung des baumelnden Endes durch Scherenschnitt endete gleichfalls unglücklich. Viel zu schaffen gemacht hat mir die Heilung der durch einen aufgezogenen Dompfaff eingeschleppten Krätze (Kalkbeine). Es hat vieler Pinselungen mit Sezojodol bedurft, um das durch den steten Juckreiz für den Vogel überaus lästige, ansteckende Übel zu beseitigen. Heiserkeit heilt, wenn die Luft nicht zu trocken, von selbst. Vor den größten Plagen des Vogelwirts, Mäusen und Milben, schützt der Torfmullbodenbelag und die völlige Abgeschlossenheit des Flugraums. Unglücksfälle ereignen sich in der Vogelstube im Laufe der Zeit wohl öfter als bei der Käfigpflege. Die Vögel werden dort mit den Jahren dreister und sorgloser, sausen beim Reinigen, unbekümmert um den Pfleger, nach außen und zurück, versuchen, ohne die Gefahr zu kennen, im Wassereimer zu baden, haschen allzugierig und hastig nach den zugeworfenen Mehlwürmern. Die Umsicht des Pflegers hilft da manchen Unfall vermeiden. Daß Eifersuchtskämpfe nicht selten mit dem Tode des Angegriffenen enden, habe ich bereits in der „Gef. Welt" (1922, Heft 13) geschildert. Vermeidbar sind sie nicht. Vögel, die Jahre lang friedlich zusammenlebten, überfallen einander plötzlich, und mit unheimlicher Wut tötet einer den andern, den vermeintlichen oder wirklichen Nebenbuhler. (Bei mir: Zaunkönig, Rotkehlchen, Gebirgsbachstelze, Schama, afrik. Brillenvogel, indischer Buschschmätzer.)

Diese Schattenseite kann all das Lichte, Liebenswürdige, den ganzen Zauber und Reiz, den das Zusammenhalten einer Schar so verschieden gearteter „gefiederter Freunde" hat, nicht verdunkeln und verscheuchen. Das ist ja der Vorzug, das Anziehende des Flugraums, daß er jeden Tag, jede Stunde neue Bilder, neue Augenblicke bietet. Alle diese köstlichen Szenen, die sich da ereignen, zu schildern, würde wohl dem Leser und Schilderer Freude machen, nicht aber dem Herrn Herausgeber und Verleger. Ich hebe diese Aufzeichnungen komischer und tragikomischer Vorkommnisse für spätere bessere Zeiten auf.

Im Jahreswechsel der Vogelpflege kenne ich drei kritische Zeitpunkte. Das Aufhören der Zentralheizung im Frühjahr, die Zeit zwischen Kälterwerden und Beginn des Heizens im Herbst und die Trieb- und Brunstzeit im Frühjahr. Die letztere bleibe ohne weitere Erwähnung. Die anderen mit ihrer Einwirkung auf den Gesang verdienen einige Worte. Wenn Ende Oktober das Heizen beginnt, so vergehen

keine drei Wochen, und die Schar der Körnerfresser beginnt an schönen hellen Vormittagen mit dem Gesang. Ende November folgen am Abend Rotkehlchen und Alpenbraunelle, am Tage Gartengrasmücke und Mönch. Im Januar fängt die Schama an und bis zum April nimmt der Gesang stetig zu. Mit der Abstellung der Heizung, Ende April, erfolgt der Rückschlag, und erst Mitte Juli ist der Gesang wieder auf voller Höhe, dann langsam zurückgehend bis zur Mauserzeit, die fast ausnahmslos rasch und gut verläuft. Mancher Leser wird glauben, daß es bei 65 Bewohnern des Flugraums ein tolles gesangliches Durcheinander gibt. Dies ist nicht an dem. Jeder Vogel hat seine Zeit. Ein „Überschreien" kommt in der Vogelstube nicht vor. Nie singen von vier Mönchgrasmücken zwei zu gleicher Zeit. Und wenn die Stieglitze und Hänflinge am Vormittage ein gemischtes Konzert veranstalten, so hat man auch da seine Freude daran. Zuviel Gesang kann der Vogelfreund nicht leicht haben.

„Woher haben Sie alle diese Vögel?" Diese Frage höre ich oft. Die meisten kaufte ich vorzugsweise beim Händler hier, in Berlin, in Tirol und anderwärts. Manche Arten wurden eingetauscht, einige auch aus Liebhaberkreisen erworben. Da gehört oft Glück dazu, um Selteneres zu bekommen. Wenn ich in der „Gef. Welt" lese: Nur erstklassige Vögel mit Ia Gesang anbieten, muß ich den Kopf schütteln. Welcher Liebhaber gibt solche Vögel weg? Der Erwerb wird immer schwieriger und kostspieliger. Sprosser, Steinrötel, Orpheusgrasmücke und andere herrliche Sänger sind kaum noch zu haben. Dazu die hohen Futterpreise. Das Pfund Ameiseneier wurde mir im November 1922 vom Großhändler mit 2050 M., das Pfund Mehlwürmer mit 1000 M. angeboten. Da gilt es Opfer bringen, um eine Schar Vögel weiter zu halten und zu verpflegen. Den Orts- und Landesvereinen liegt es jetzt ob, durch gemeinsamen, verbilligten Bezug von Futtermitteln den mit irdischen Gütern nicht immer reichlich versehenen Vogelfreunden die Liebe zur Natur, zur Vogelwelt mit ihrem Leben, ihrem stillen, unvergänglichen Glück zu erhalten.

Kleine Mitteilungen.

Zur Farbenzucht der Wellensittiche. Wer heute Anspruch darauf erhebt, als Züchter zu gelten, muß die Mendelschen Vererbungsregeln kennen, einerlei, ob er Pflanzen oder Tiere züchtet. Kennt er diese Regeln nicht, so ist sein Paaren nur eine Spielerei und kein Züchten und seine Kreuzungsprodukte sind Zufallsprodukte, die in der Hand des erfahrenen Züchters sehr wertvoll sein können, in seiner Hand den züchterischen Wert nicht auswirken. Soll ein Zuchtziel erreicht werden, so ist neben züchterischem Verständnis, Beobachtungsgabe und Kenntnis viel Raum und viel Zuchtmaterial nötig, denn die Erforschung, ob ein Tier sicher homozygot oder heterozygot ist, erfordert individuelle Behandlung und viele Zuchtperioden, da zur Zucht bekanntlich zwei Tiere gehören und die Feststellung, welches der beiden Tiere homozygot oder heterozygot ist, kann sehr langwierig und kostspielig werden, wenn man nicht das blinde Glück hat, durch Zufall zwei gleichartige Tiere zusammengebracht zu haben. Zu diesen Schwierigkeiten kommen nun noch die Gefahren der Inzucht. Ein neues Zuchtziel, in unserem Fall die Farbe der Wellensittiche, ist ohne eine verständige und beherrschend geleitete Inzucht nicht zu erreichen. Hierbei spielen die körperlichen und organfunktionellen Eigenschaften der Elterntiere die ausschlaggebende Rolle. Die ersten Anzeichen von Degenerierung der Zuchten erfordern ein scharfes Auge und eingehende Kenntnis des Züchters. Diese Klippen zu umschiffen, ist uns durch weitgehendstes Waltenlassen der Natur möglich. Der Mensch ist nicht imstande, die morphologischen Eigenschaften am lebenden Tiere zu erkennen und die physiologischen erst nach längerer Beobachtungszeit und deshalb ist die innerhalb des gesteckten Zuchtziels gegebene freie Zuchtwahl das nach meiner Meinung am raschesten, sichersten und Schaden verhütendsten zum Ziel Führende. Denn die Natur allein führt die zur Erhaltung der Arten notwendigen Ergänzungen in der Paarung der einzelnen Individuen herbei. Die gelbe Spielart der Wellensittiche ist nach der Literatur unstreitig ein Inzuchtprodukt, wenn nicht schon eine Degenerierungserscheinung, wie überhaupt der Flavismus bei den Papageien, und somit ist diese Art heikel und empfindlich. Anders die blauen. Wenigstens habe ich sogenannte blaublütige und am Bauch bis teilweise zum Kropf herauf himmelblau zeigende Wellensittiche im freistehenden Drahtvogelhaus überwintert und trotz Kälte und Schnee einige Bruten hochgebracht. Jetzt, im Frühjahr, ist Hochbetrieb mit bis sechs aus einem Nest ausgeflogenen Jungen, auch ist der Prozentsatz der blau vererbenden Tiere ein guter. Zur Zuführung von frischem Blut bin ich gerne erbötig, Interessengemeinschaft mit Besitzern möglichst blauer Wellensittiche zu machen. Blaue Tiere vom Ausland einzuführen, ist heute ja nahezu unmöglich, doch glaube ich mit Bestimmtheit, durch Zusammenfassen der vorhandenen Kräfte auch deutsche blaue Wellensittiche auf dem beschrittenen Wege herauszubringen.

Rich. Schwarzkopf, Ingelfingen, Württbg.

Vereinigung der Vogelliebhaber Landesverband Sachsen.

Unter Hinweis auf den Bericht über die Jahresversammlung in der letzten Nummer der „Gef. Welt" werden die der Vereinigung angeschlossenen Vereine und Einzelmitglieder gebeten, für recht baldige Einzahlung der Verbandsbeiträge besorgt sein zu wollen. Die Beiträge sind wie folgt festgesetzt worden: für Vereine 100 M. pro Mitglied nach dem Mitgliederbestande des 1. April d. J. und für Einzelmitglieder 500 M. Durch die Bezahlung der Beiträge ist gleichzeitig die Bereitwilligkeit für die weitere Zugehörigkeit zur Vereinigung erklärt. Die Vereine wollen zur Ermöglichung der Statistik den Mitgliederstand am 1. April d. J. mitteilen. Bei Anfragen irgendwelcher Art bitten wir Rückporto beizufügen.

Aus den Vereinen.

A. Z. Angemeldet sind die Herren Mag.-Baurat Herm. Pfützenreuter, Berlin-Halensee, Sassenerstr. 27, und Martin Schöll, Garmisch i. Oberbayern, Marktplatz 46. — Aufgenommen sind die Mitgl. Nr. 321 Viktor Prayer, Hadersdorf-Weidlingen b. Wien, Mauerbachstr. 20; Mtgl. 322 Karl Gleißner, Gera-Reuß, Schillerstr. 14; Mtgl. 323 Dr. Emil Schünke, Kiel, Flenthör 28; Mtgl. 324 Chr. Frandzen, Kristiania (Norwegen), Raadhusgaten 2; Mtgl. 325 Frl. Karin Biese, Helsingfors (Finnland), Konstantinsgatan 15. — Mtgl. 139 (Ohlsen, Nyborg) sucht dringend 0,1 kl. Kubafink, 2,2 gelbb. jap. Möwchen. Mtgl. 147 (Woithe, Westhofen) sucht 0,1 gr. Wellensittich im Tausch geg. 1,0 bei Tragung der Versandkosten. Mtgl. 177 (Hegemann, Hameln) sucht 0,1 oder 1,1 Bandfink. Mtgl. 191 (Schneider, Rüppur) verk. 1,0 gr. Wellensittich, 1,0 gelben Wellensittich oder tauscht beides gegen gutes Zuchtweibchen oder 1,1 Zebrafink oder 1,1 Möwchen. Mtgl. 236 (Sommer, Leipzig) tauscht 1,0 Muskatfink geg. 1,0 Möwchen, kauft 1,1 zuchtr. Möwchen, 1,1 Silberschnabel, 1,1 Goldbrüstchen, 0,1 Schmetterlingsfink, verk. 1,1 Girlitz, tauscht Neunzig, „Einh. Stubenvögel" gegen dito „Fremdl.". Mtgl. 296 (Schaeffer, Lichtenfelde) sucht alte oder junge Wellensittiche geg. guten Preis, desgl. Ruhe „Wellensittich", gbd.; gibt a. W. Kanarienzuchtgeräte und div. Literatur in Tausch. Mtgl. 299 (Hahn jr., Neuß) sucht je 0,1 Bandfink, Mossambikzeisig, Weißkehlpfäffchen, 1,0 Indigofink und weiße Hirse. A. W. tauscht

Zebrafinken. — Die Aufnahmegebühr beträgt ab 1. Juli 1500 M., Jahresbeitrag mit 500 M. bleibt bis zum Beschluß der Jahresversammlung gültig.

A. Krabbe, Anklam, Demminer Str. 10.

Vereinigung der Vogelliebhaber von Dortmund und Umgegend. Dem Anruf des Herrn Steenkamp zur Gründung des Vereins am 17. Mai 1923 waren 7 Herren gefolgt. Nach einer Ansprache des Herrn Steenkamp fand eine Aussprache über die beabsichtigte Gründung des Vereins statt. Nachdem die Anwesenden sich für die Gründung des Vereins erklärt hatten, wurden die provisorischen Statuten verlesen und nach einigen Abänderungen angenommen. Hierauf folgte die Wahl des Vorstandes. Das Eintrittsgeld wurde auf 500 M. und der Monatsbeitrag auf 200 M. vorläufig festgesetzt. Als Versammlungstage gelten der 2. und 4. Donnerstag im Monat. Das Vereinslokal ist bis auf weiteres Restaurant „Zum Schieferhäuschen" auf der Kuckelke zu Dortmund. Ferner wurde beschloffen, daß sich der Verein dem Landesverband Preußen anschließt. Vereinsorgan ist die „Gef. Welt". Die Gründer sind die Herren: Paul Steenkamp, Vorsitzender; Alois Risse, Schriftführer; Carl Schriek, Kassierer; Hubert Schulte, Bücherwart; Carl Pistor, Wilh. Kraus und Emil Lappe. — Mitgliederversammlung vom 24. Mai 1923. Um 8^{40} Uhr eröffnete der Vorsitzende die 2. Monatsversammlung. Auf der Tagesordnung standen folgende Punkte: 1. Belehrende Vorlesung aus der „Gef. Welt", Thema: „Die Grundregeln der Stubenvogelliebhaberei" von Herrn J. Birk, Leipzig. Anschließend hieran Aussprache. 2. Verlesung des Gründungsberichtes. 3. Der Vorsitzende Herr Steenkamp schenkt dem Verein einen Band der „Gef. Welt" Jahrgang 1921 (ungebunden). Das Einbinden desselben übernahm ein anderes Vereinsmitglied. 4. Beschlußfassung über den Anschluß an den Landesverband Preußen. 5. Es wurde beschlossen, daß der Verein vom 1. Juni 1923 an die „Gef. Welt" bezieht. 6. Zwei neue Mitglieder melden ihren Beitritt an. Zum Schluß gibt der Vorsitzende die Einladung des Brudervereins in Hörde bekannt. Dieser Verein hatte uns Vogelliebhaber von Dortmund und Umgegend zu seiner am 26., 27. und 28. Mai in Hörde, Bruchstraße, Lokal Ungewitter, stattfindenden Ausstellung von Waldvögeln eingeladen, welcher Aufforderung wir gerne gefolgt sind. Ein Gegenbesuch der Liebhaber von Hörde erfolgt in unserer am 14. Juni stattfindenden Mitgliederversammlung. Vogelliebhaber stets herzlich willkommen.

Der Vorstand des Vereins der Vogelliebhaber von Dortmund und Umgegend.

Groppenbroich, den 8. Juni 1923.

Alois Risse, Schriftführer.

Vereinsadresse: Verein der Vogelliebhaber zu Dortmund und Umgegend, per Adr.: Herrn Paul Steenkamp, Dortmund, Mallinckrodtstr. 163.

Alte Vereinigung der Liebhaber zu Dresden. Die Vereinigung hielt am 6. März, 10. April und 8. Mai 1923 ihre Monatsversammlungen ab. Der Herr Vorsitzende Ritschel brachte in ihnen verschiedene Eingänge zum Vortrag, von denen man allenthalben Kenntnis nahm. Ferner kamen die Protokolle je von der vorausgegangenen Monatsversammlung zur Verlesung, gegen die Widersprüche nicht erhoben wurden. Weiter machte der Herr Vorsitzende Mitteilung von der erfolgten Aufnahme der Vereinigung in den Sächsischen Landesverband. Aufnahmen neuer Mitglieder fanden statt, wie auch wiederum eine Erhöhung der Monatsbeiträge hat Platz greifen müssen. Von den bisher ins Auge gefaßten Partien hat keine verwirklicht werden können. Sie scheiterten stets an der unwirtlichen Witterung. Beschloffen wurde die Ausführung einer Nachtpartie acht Tage nach Pfingsten in das vogelreiche Saubachtal. Zu allen Zusammenkünften der Vereinigung sind Gäste willkommen. Paul Groß, Schriftführer.

Vereinigung hannoverscher Vogelfreunde. Mit Frühlingsanfang beginnt für den Vogelpfleger gewissermaßen das neue Jahr. Es ist naheliegend, für diesen Zeitpunkt einmal eine Übersicht über die Pfleglinge der Vereinsmitglieder zu geben. Der Bestand wächst naturgemäß noch bis Mai wesentlich. Im Februar wurden immerhin 600 Vögel verpflegt, was bei den jetzigen Futterpreisen schon etwas besagen will. Von den 600 waren 300 Körnerfresser, 30 Kanarienvögel, 220 Weichfresser und 50 Ausländer. Zeisige, Stieglitze, Hänflinge, Dompfaffen und Buchfinken bilden die Hauptzahl der Körnerfresser, Rotkehlchen, Mönchgrasmücken, Nachtigallen, Singdrosseln, Gartengrasmücken und Heidelerchen die der Weichfresser. Von seltener gepflegten Vögeln seien Blaukehlchen, Seidenschwänze, Bartmeisen, Getreiderohrsänger, Trauerfliegenschnäpper, Flußregenpfeifer, Gebirgsbachstelze, Wiesenschmätzer, Zaunkönig und Goldhähnchen erwähnt. Auch die Ausländer haben eine bedeutende Zunahme erfahren. Später soll darüber ausführlicher berichtet werden. Die Preise, die für ausländische Seltenheiten angelegt werden müssen, muten phantastisch an. Eine gute Schama kostet etwa 3 englische Pfund. Man rechne das einmal um! Der große Erfolg unsers Dr. Heinroth-Vortrags war der Anlaß, mit dem Bund der Wandervögel eine Vortragsreihe „Wandern und Schauen" zu veranstalten. Die sechs sehr gut besuchten Vorträge, mehrfach mit Lichtbildern, führten in die landschaftliche Gestaltung, das Vogelleben, in die Volkskunde und Vorgeschichte Niedersachsens ein. Bei dem Vortrag „Das Vogelleben Niedersachsens", den unser Mitglied Lehrer Ottens-Eilvese mit gewohnter Sachkenntnis hielt, war das Fehlen der Lichtbilder zu bedauern. Aber es war nicht möglich, außer solchen vom Stuttgarter Bund, diese zu beschaffen. In den verschiedenen Vereinen sind sicher gute Lichtbilder vorhanden. Wenn solche Naturaufnahmen dem Verbande zugestellt würden, kann eine Sammlung ornithologischer Lichtbilder zustandekommen, die, von Verein zu Verein ausgeliehen, unserer Sache weite Förderung und Ausbreitung verschafft. Über unsere Beobachtungsausflüge erfolgen später weitere Mitteilungen. Bei jedem Wetter unternommen, haben diese Wanderungen den zahlreichen Teilnehmern ein ungemein reiches Vogelleben, Landschaftsbilder von großer Schönheit, Erholung, Anregung in Hülle und Fülle gezeigt und gebracht. Wirtschaftliche Vorteile konnten wir unsern Mitgliedern durch Lieferung von Nußabfällen, Körnerfutter, getrocknetes Eigelb, von Vogelbüchern, einem illustrierten Heimatführer u. a. zu sehr ermäßigten Preisen bieten. Außer kleinen Vorträgen war die Unterhaltung an den Vereinsabenden trotz Fehlens von Bier und Zigarren stets rege. Die Mitgliederzahl, auch von auswärts, wächst andauernd und hat das erste Hundert längst überschritten. Mit dem Vogelschutzverein halten wir rege Fühlung und haben den verdienten Vorsitzenden, Herr Fr. Becker, zu unserm Ehrenmitglied ernannt. Die Führungen, die Herr Becker als erster in Hannover veranstaltet, haben ungemein zur Kenntnis der Vogelwelt beigetragen. Auch im Sommer und Herbst werden unsere Wanderungen fortgesetzt, und für die Wintertage haben wir einige hervorragende Lichtbildervorträge in Aussicht. A. Troschütz.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig. Nächste Sitzung Donnerstag, den 5. Juli 1923, im Vereinslokal „Bauers Brauereirestaurant", Täubchenweg. Gäste sind willkommen.

J. A.: Joh. Birk, 1. Vors., Leipzig-Mockau, Beuthstr. 29.



Herrn Dr. A., Hamburg. In der Beurteilung oder Verurteilung des von der genannten Firma eingeschlagenen Verfahrens stimme ich mit Ihnen völlig überein. Den mir gegenüber geäußerten Wunsch kann ich aber mit Rücksicht auf das Preßgesetz nicht erfüllen. Der andere Vorschlag ist Sache des Verlages, dem ich Ihre Mitteilung vorlegen werde.

Herrn G. M., Hildesheim. Da die Wellensittiche stets unter den gleichen Erscheinungen eingehen, müssen auch die gleichen Ursachen vorliegen, die ich natürlich nicht ermitteln kann. Es ist Sache des Pflegers, genau zu prüfen, was das Eingehen der Tiere veranlassen kann. Es könnte schlechte Beschaffenheit des Futters, Halten in sehr hoher Wärme, Vergiftung und noch vieles andere vorliegen.

Futtermittel

Vogelfutter

für Kanarien, Waldvögel, Exoten, Papageien, Weichfresser. Anfragen nur gegen Rückporto. Liste 13 über Vogelfutter 50 ℳ, Liste 5 über Vogelkäfige, Zuchtgeräte usw. mit etwa 400 Abbildungen 150 ℳ. [405

W. Göpel, Leipzig,
Tröndlinring 1. Telephon 14 958.

Frische Ameiseneier

versende täglich frisch, ferner **getrocknete Ameiseneier, Weißwurm** usw.
H. Behrke, Braunschweig,
Sophienstraße 35. Fernruf 1281. [406

Frische Ameiseneier

liefert ständig **Hermann Arold,** Zoologische Handlung, Berlin N 58, Fransecky-straße 4. Postscheckkonto Berlin 149 951. Anfragen Rückporto. [407

Vögel

Lachtauben

kaufe jeden Posten und zahle pro Paar frei Braunschweig 20 000 ℳ unter Garantie gesunder Ankunft. [408
H. Behrke, Braunschweig,
Sophienstraße 35. Fernruf 1281.

Verein der Vogelfreunde und Kanarienzüchter in Thalheim b. Wels

(Ob.-Österreich)
kauft 3—4 Paar echte, reine, schöne **Holländer Kanarien** für Zuchtzwecke. Nur erstklassiges Material (nicht Geschwister) kommt in Betracht! Angebote unt. Angabe von Farbe, Alter und Preis sowie von diesjährigen Ameiseneiern erbeten an [409
Warenhaus Peter Steinerberger, Wels (Ob.-Österr.), Traungasse 7.

1,0 Rotkehlchen,

laut schlagend, tausche gegen 1,0 ebensolchen **Zeisig** oder **Girlitz.** [410
C. E. Grünewald,
Alsfeld (Hessen), Schützenrain.

Suche für sofort 2—3 gr. zuchtfähige

Wellensittich-Weibchen

(auch einzeln). **Zahle** gern **höchsten Preis,** da ich dieselben dringend benötige. Suche auch noch ca. **3,3 Jungtiere** (auch einzeln). [411
Erich Richter, Bernstadt.
Mitgl. A. Z. 235.

Vertausche noch einige Paare gr. Wellensittiche auf ein gutes Mikroskop. [412
Syré, Lehrer, **Biernau i. Thür.**

2,2 gr. Wellensittiche, 23 er Zucht, geg. Meistgeb. z. verk. 1,1 Halbmondsittich auf 2,2 Zuchtp. Wellensitt. z. vertauschen.
Römer, Liegnitz, Haagstr. 16. [413

Papagei, gut und viel sprechend, und andere Singvögel sowie Ziervögel zu kaufen gesucht. Angebote unter „Papagei" an die Geschäftsstelle der „Gefiederten Welt". [414

Tausche prima **nord. Sprosser,** erstkl. Schläger, gut eingewöhnt, ferner Nachtigall, Sperber- und Mönchsgrasmücke gegen Wellensittiche oder einheimische Körnerfresser.
Ernst Scheide, Osnabrück,
Spindelstraße 18 B. [415

Gebe ab je 1 Stieglitz, Hänfling, Braunellen-Hahn, tadell. i. Ges. u. Gefied., geg. lautsing. Rotkehlchen od Nachtigall. [416
Dube, Hamburg 26, Wolfshagen 11a.

Reform-Käfige

Zerlegbar · Leichteste Reinigung · Einfachster sicherer Transport
1. Preis beim Käfig-Wettbewerb Leipzig 1919/22 (siehe Gefiederte Welt 1920, Heft 14—16), Goldene Medaille Leipzig 1921/22
werden für alle Vogelarten hergestellt.

Ausführung: Hartholz, grünlackiert oder naturlackiert, Zinkschublade, Porzellannäpfe, Ledertuchdecke.
Keine Fabrikware, sondern beste Spezialarbeit!
Anfertigung als Kistenkäfig oder Wiener Form (halboffen) oder halboffen mit fester Rückwand. Ohne jedes Werkzeug in einer Minute zusammengestellt resp. zerlegt. Verpackung zum Selbstkostenpreis.
Fertigen auch jede Art Käfige u. Volieren u. Zeichnung od. Maßangabe.

Heck-, Flug-, Einsatz-Käfige.
Ausstellungs-Käfige nach Vorschr. d. V. D. K.
Transport-Käfige, jeden Posten.
Anfragen Rückporto beifügen. Katalog gegen Einsendung von 150 M. in Briefmarken.

Schlagnetze ohne Mittelsteg
für schädliche Vögel, prima handgeknüpfte Ware. [417

Kühn & Muschter, — Inhaber — **Borna b. Leipzig,**
Arthur Muschter, Kasernenstraße 4.
Bankkonto: Allgem. Deutsche Credit-Anstalt Zweigstelle Borna; Stadt-Girokasse Borna b. Leipzig Nr. 1506. — Postscheck.: Leipzig 92 250. — Tel. 147.
Zahlreiche Anerkennungs- und Dankschreiben.

Papageien Kanarienhähne Bastarde

kauft höchstzahlend und tauscht auch auf Exoten

Willy Odenwald, Fulda.

Eigner Export und Import. [418

Kaufe laufend zu konkurrenzlos höchsten Preisen:

Kanarienhähne und -weibchen

sowie **Sing- und Ziervögel, Exoten aller Arten, Papageien, graue, grüne usw.**

Arthur Muschter, Borna b. Leipzig,
Käfigfabrik und Vogelhandel en gros und en detail
Import. **Export.**
Anfragen Rückporto beifügen. [419

Antiquarische Bücher

Bade, Praxis der Aquarienkunde. Mit 185 Textbildern, 9 schwarzen und 1 farbigen Tafel. (1907.) In Lwd. gebd. ℳ 3000
— — Mit 220 Textbildern, 12 schwarzen und 1 farbigen Tafel. (1911.) Brosch. ℳ 2500
— **Praxis der Terrarienkunde.** Mit 1 farbigen, 18 schwarzen Tafeln, 101 Textbildern. (1907.) Gebd. ℳ 3000
Bau, Käferbuch. Kart. ℳ 4000
Bau Beneden, Schmarotzer des Tierreiches. Gebd. ℳ 3000
Berlepsch, Freiherr v., Der ges. Vogelschutz. Mit 8 Farbentafeln und vielen Abb. ℳ 10 000
Bungartz, Nutzhühner. Mit 119 Abbildungen. (1921.) Kart. ℳ 1500
— **Taube.** Mit 37 Abbildungen. (1921.) Kart. ℳ 1500

Preise und Lieferbarkeit freibleibend!
Versand erfolgt nur gegen Voreinsendung des Betrages oder unter Nachnahme. Versendungsspesen und Porto werden, wenn nicht beigefügt, durch Nachnahme erhoben. Nach dem Ausland liefern wir nur mit Valutazuschlag nach vorheriger Vereinbarung.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg
Postscheckkonto: Magdeburg 3148 **Postschließfach 148**

Im Interesse unserer verehrl. Abonnenten bitten wir das

Abonnement auf die „Gefiederte Welt" für Monat Juli rechtzeitig erneuern

zu wollen. Die Gefiederte Welt kann sowohl **durch den Buchhandel** als auch **beim Postamt für 1000 Mk. für den Monat Juli** bestellt werden. Direkte Zusendung vom Verlage kann nur noch ausnahmsweise und nur gegen vorherige Einsendung von 1200 Mk. für den Monat Juli — Postscheckkonto Magdeburg 3148 — erfolgen.

Auslandspreis für das III. Vierteljahr 2 Schweizer Franken.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. Postfach 148.

Gebe noch einige pr. Paare **Wellensittiche** auf erstkl. Tauben ab, Staarenhälse bevorzugt. [420
Syré, Lehrer, **Biernau i. Thür.**

Wellensittichweibchen,

je ein gelbes und grünes, zuchtfähig, dringend gesucht, eventuell in Tausch gegen Pärchen Amaranten, Tigerfinken oder Silberfasänchen. Angebote mit Preis an **Dr. Kröss, Innsbruck,** Maria-Theresien-Straße 8. [421

Tausche 6 hellgrüne Weichfresserkäfige (Grasmückengr.), 1 Lerchenkäfig (ungestr.), 1 Drosselkäfig (ungestr.), 2 Badehäuser für Grasmücken, 1 Badehaus f. Drossel, 1 ff. Rotkehlchen (Lichtsäng.), Ges. Welt 1910 (ff. gebd.), 1 Kiste Mehlwurmansatz. **Suche** Gehrockanzug, Größe 50, Hosenlänge 82, auch getr. Sende nicht zuerst (Treue gegen Treue). Rückporto. **Heinrich Obst, Bieber** b. Offenbach a. Main. [422

Gesucht

Ornith. Monatsschrift
1907, 1914.
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung Magdeburg.
Postschließfach 148.

Brehms Tierleben,

11 Bände, letzte Ausgabe, in Leder gebd. ganz neu, gegen Höchstgebot abzugeben. Ausland nicht unter 120 Schweizer Franken. Offerten sind zu richten an
Willy Rath, [42
Rudolstadt i. Th., i. Fa. „Isola".

Verk. o. vert. geg. Vögel: Bade, Praxis d. Aquarienkunde, gebd. 2000, —, Praxis d. Terrarienkd., gbd. 2000, —, Die mitteleur. Vögel 2000, Walter, Kanarienbast.-Zucht 1000, Böcker-Wetzlar, Stubenvögel 2000, Lachmann, Terrarium 1500, Flöricke Dtsch. Schwimmv. 5000, —, Dtsch. Sumpf- u. Strandv. 5000, Dürigen, Fremdl. Zierfische 3000, Reichenow, Vögel, 2 Bd. 3000, Ruß, Vogelzuchtbuch 5000. **Karl Volpert Olching** b. München, Graßlfingerstr. 21. Alle Bücher wie aus d. Lad., gebd. [42

Inserate

für das am 5. Juli 1923 zu Ausgabe gelangende Heft 13 der Ge Welt erbitten bis 29. Juni 1923 frü

Die viergespaltene Nonpareillezeile od deren Raum wird mit **10 Pf. Grund preis** berechnet, der mit der vo „Börsenverein der Deutschen Buc händler bestimmten Teuerungszahl zurzeit „5000" — zu multiplizieren i Auslandspreis —,10 Schweizer Franke

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Hermsdorf bei Berlin; für den Anzeigenteil: Franz Wunderlich, Magdeburg, Postschließfach 148.
Verlag der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck: August Hopfer, Burg Bz. Mgdbg.

Jahrgang LII.
Heft 13. 5. Juli 1923.

Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Die Gefiederte Welt gelangt am Donnerstag nach dem 1. u. 15. jedes Monats zur Ausgabe und kostet für Monat Juli 1000 Mark. Einzelpreis des Heftes 600 Mark.
Auslandspreis für das Vierteljahr 2 Schweizer Franken, für das Heft 0,35 Schweizer Franken.
Inserate für die folgende Nummer müssen bis spätestens Freitag früh in Händen der Verlagsbuchhandlung sein.
Die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 10 Pfg. Grundpreis berechnet, der mit der vom „Börsenverein der Deutschen Buchhändler" von Zeit zu Zeit bestimmten Teuerungszahl zu multiplizieren ist.
Die Teuerungszahl ist zurzeit „9000". — Auslandspreis für die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum —,10 Schweizer Franken.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung (M. Kretschmann) in Magdeburg.
Postschließfach 148. Postscheckamt: Magdeburg 3148. Fernsprecher: 1323.

Ornithologisches mit besonderer Berücksichtigung der Vogelwelt des Halleiner Tales.

Von Dr. Viktor Ritter v. Tschusi zu Schmidthoffen.

(Nachdruck verboten.)

Der der jetzigen Generation kaum dem Namen nach bekannte Erforscher der Ornis Galiziens, später Konservator am gräflich Dzieduszyckischen Museum in Lemberg, Ernst Schauer*), schrieb mir einst, daß ihm sein Lehrer in der Vogelkunde, der berühmte Eierkundige F. A. L. Thienemann beim Abschiede gesagt, daß es für die Wissenschaft von weit größerem Nutzen sei, ein kleines Gebiet genau und sorgfältig zu beobachten, als große Länderstrecken flüchtig zu durchforschen. Die Wahrheit dieser Worte fand ich vielfach Gelegenheit zu bestätigen; denn selbst ein räumlich kleines Fleckchen Erde, das unter scharfer Kontrolle von Aug und Ohr steht, bietet dem Sehenden und Hörenden immer interessantes und neues und nicht zuletzt sind es die Veränderungen, die sich im Auftreten und im Bestande der Vogelwelt vollziehen und auf leicht überblickbarem Raume geradezu dem Beobachter aufdrängen. Wie reich sich das Auftreten von verschiedenen Arten, selbst auf engbegrenztem Raume gestalten kann, dafür möchte ich als Beispiel meinen kleinen Besitz anführen. Selber, allerdings sehr günstig mitten im Halleiner Tal gelegen, umfaßt drei Hektare Park, Wiese und Feld und birgt außer alten hohen Laub- und Nadelbäumen auch viel Buschwerk, das die dem Besitz umgebende Mauer umsäumt. Bereits 1886*) stellte ich die Zahl der daselbst seit 1871 beobachteten Vogelarten auf 139 fest und seit dem weit zurückliegenden Zeitpunkte hat sich die Zahl um ein beträchtliches vermehrt. Natürlich bildeten dabei die durch oder über den Besitz dahinziehenden Arten den Hauptteil. Ich war aber auch in der Lage, Vogelarten daselbst als neu für unser Land festzustellen, die ich in mehreren Fällen auf meinen täglichen ornithologischen Ausflügen im weiteren Beobachtungsgebiete erst später daselbst aufzufinden vermochte. Detailforschungen mit und ohne Beringungshilfe lassen sich besonders bei unseren Sommervögeln, die in unsern Gärten brüten, also unter unseren Augen stehen, leicht ausführen; aber auch die gewöhnlichsten unserer Standvögel sind noch sehr dankbare Beobachtungsobjekte, wenn man für alle Vorgänge ein aufmerksames Auge hat. Es ist zwar bekannt, daß der Vogelbestand jeder Gegend in bezug auf Vermehrung und Verringerung jährlich wechselt, auch wenn die Landschaft keine merkbaren Veränderungen erfahren hat, die zu ihren Gunsten oder Ungunsten ausfielen. Eine veränderte Bodenbewirtschaftung beeinflußt aber vielfach eine Vermehrung, Verringerung oder das Verschwinden gewisser Arten, und zwar nicht der Brutvögel allein, sondern auch der Durchzügler, je nachdem sich die örtlichen Verhältnisse günstig oder ungünstig gestalten. Witterungseinflüsse, besonders zur Brutzeit, vermögen den Vogelbestand einer Gegend zu heben oder beträchtlich zu vermindern und ein gleicher Vorgang vollzieht sich auf dem Zuge durch jene und —

*) Seine publizistische Tätigkeit fiel in die Jahre 1862—1880. (J. f. O. u. Schwalbe.)

*) Die Vogelwelt meines Gartens. — Monatsschr. Deutsch. Ver. Sch. Vogelw. XI. 1886. Nr. 7.

wie nicht zu unterschätzen — auch durch die Massenfänge in den Ländern romanischer Zunge.

Ohne hier auf die Details der Ursachen lokaler Vermehrung oder Verminderung näher einzugehen, da ich selbe in einer Arbeit an anderer Stelle*) ausführlich behandelte, möchte ich hier nur auf die Veränderungen hinweisen, die sich hier im Halleiner Tale innerhalb der letzten Dezennien vollzogen, und zwar bei gewöhnlichen und meist in die Augen fallenden Arten. Es sind dies in erster Linie der rotrückige Würger (Lanius collurio), der Wiesenschmätzer (Pratincola rubetra) und der Hausrötling (Phoenicurus gibraltariensis) und der Star (Sturnus vulgaris). Ersterer trat früher sehr zahlreich auf, belebte alle Feld- und Wiesenhecken und siedelte sich in allen Anlagen, die ihm zusagende Verhältnisse boten, an. Hier war er allerdings eine recht unbeliebte Erscheinung, als er insbesondere die Finkennester zerstörte und die Baustoffe derselben für seine Nestanlage verwendete.

Geradezu ein Charaktervogel unserer blumigen Wiesen war der Wiesenschmätzer, den man überall auf den Doldengewächsen sitzen sehen und seinen Gesang vortragen hören konnte. Die erste Brut ging meist zugrunde, da um diese Zeit die Wiesen gemäht werden. Das tat aber dem Bestande kaum einen Eintrag und jährlich war die normale Zahl ohne merkliche Schwankungen vorhanden.

Auch der Hausrötling gehörte zu den häufigen überall gesehenen Arten, die dem einsamsten Gehöfte durch Bewegung und Gesang Leben verliehen.

Der bei meiner Herkunft 1871 hier überaus häufige Star, welcher in mindestens sechs Paaren bei mir nistete und die zahlreichen ihm bei fast jedem Gehöft und in den Gärten angebrachten Nistkästen besetzt hatte, begann sich allmählich zu vermindern und nicht wenige seiner früheren Brutstätten blieben leer. Heuer hatte ich nur ein einziges Brutpaar. Wohl stellte sich bei einem bis ins Vorjahr besetzten Kasten ein Starmännchen ein, trug mit allem Eifer Niststoffe herbei, sang unermüdlich, aber da er keine Gefährtin fand, verschwand er wieder nach ungefähr 14 Tagen.

Da sich die örtlichen Verhältnisse für die hier angeführten Arten nicht geändert, so liegt die Frage nach der oder den Ursachen nahe, welche einen so auffälligen Rückgang genannter Arten veranlaßt haben dürften. Als einzig in Betracht kommend erscheint mir die Annahme des Verunglückens in der Fremde, sei es durch niedrige Witterungseinflüsse auf dem Zuge, sei es durch Wegfang oder Erlegung. Das familienweise Ziehen und das meist vereinigt der einzelnen Arten eines Gebietes kann unter Umständen von katastrophaler Wirkung auf den Vogelbestand einer Gegend sein, da, abgesehen von sehr einzelnen Ausnahmen, der Vogel immer zur Stätte zurückkehrt, wo seine Wiege gestanden. Das hat schon Pallas**) gewußt und die Beringung hat dafür unumstößliche Beweise erbracht. Durch das Verunglücken derartiger Verbände kann der örtliche Bestand der betroffenen Arten schwer geschädigt, ja für Jahre hinaus nahezu vernichtet werden, denn die artfremden Individuen ziehen ihrem Brutgebiete zu und eine Neubesiedelung erfolgt zumeist nur durch Einwanderung aus den angrenzenden Gebieten, die ihr Plus abstoßen, falls sie über ein solches verfügen. Dies ist wohl der Grund, warum ein Ersatz nur allmählich erfolgt und oft Jahre erfordert.

Der heurige Vogelbestand im Halleiner Gebiet weist gewaltige Lücken auf. So fehlen diesmal vollständig als Brutvögel der graue Fliegenschnäpper (Muscicapa striata), die Hausschwalbe (Hirundo urbica), der rotrückige Würger (Lanius collurio).

In äußerst verminderter Zahl erscheinen die Rauchschwalbe (Chelidon rustica), der Segler (Apus apus), der Hausrötling (Phoenicurus gibraltariensis), der Wiesenschmätzer (Pratincola rubetra), die Bachstelze (Motacilla alba), die Dorngrasmücke (Sylvia communis), die Zaungrasmücke (Sylvia curruca), der Star (Sturnus vulgaris).

Die Ankunft bzw. der Durchzug der Sommervögel erfolgte in folgender Reihenfolge: 17. Februar: 4 Starenpaare (Sturnus vulgaris); 2. März: Erster Finkenschlag; 5. März: Erste Singdrosseln (Turdus philomelos); 7. März: Erste Schnepfe am Thurnberg (Scolopax rusticola); 12. März: Viele Finken; 17. März: Weiße Bachstelze (Motacilla alba); 24. März: Weidenlaubvogel (Phylloscopus collybita), Kleinspecht (Dendrocopus minor); 28. März: Hausrötling (Phoenicurus gibraltariensis), Rotkehlchen (Erithacus rubecula); 31. März: Gartenrotschwänzchen (Phoenicurus phoenicurus); 6. April: 1 Rauchschwalbe (Chelidon rustica); 8. April: Gegen Mittag zogen 4—5000 Saatkrähen (Corvus frugilegus) in zwei Scharen von S. nach N.; 13. April: Girlitz (Serinus germanicus); 14. April: Fitis (Phylloscopus trochilus); 15. April: Ein sehr heller Habicht (Astur gentilis) nach S.; 23. April: Erster Kuckucksruf (Cuculus canorus); 24. April: 8 Uhr abds. ungefähr 30 Rauchschwalben (Chelidon rustica) über den Wiesen; 27. April: Schwarzplättchen (Sylvia atricapilla), Waldlaubvogel (Phylloscopus sibilatrix); 30. April: Dorngrasmücke (Sylvia communis); 5. Mai: Spottvogel (Hippolais icterina), Stare ausgekrochen, 4—5 Segler (Apus apus); 6. Mai Zaungrasmücke (Sylvia curruca); 13. Mai: Gartengrasmücke (Sylvia borin); 23. Mai: Stare ausgeflogen; 27. Mai: Sumpfrohrsänger (Acrocephalus palustris).

Tännenhof b. Hallein, im Mai 1923.

*) Die Vogelwelt und die Wandlungen in ihrem Bestande im Laufe der Zeit, deren Ursachen und unsere heutigen Bestrebungen. — Monatsschr. Naturw. Unterricht aller Schulgattungen. Leipzig u. Berlin (B. G. Teubner) IX. 1916. H. 5, S. 244—255.

**) Semper enim aves ad ea loca, ubi ipsae excluse sunt, ad prolificandum revertuntur! — Zoogr. rosso-asiatica, II. p. 185.

Ornithologisches in Goethes Dichtungen.

Von Walther Bacmeister.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Eine heitere Lebensauffassung bekunden auch die folgenden kurzen Strophen, die wir den „Sprüchen in Reimen" entnehmen:

„Will Vogelfang dir nicht geraten,
So magst du deinen Schuhu braten,"

woraus hervorzugehen scheint, daß Goethe der Ansicht war, man benütze den Uhu zum Vogelfang,

während dieser Vogel meines Wissens immer nur zur Vogeljagd, zur sog. Hüttenjagd, verwendet wurde.

„Der Vogel ist froh in der Luft gemütet,
Wenn es da unten im Neste brütet."

„Wie Kirschen und Beeren behagen,
Mußt du Kinder und Sperlinge fragen."

Aus dem Heitern und Humorvollen dieser Proben lenken wir mit unserm Dichter die Schritte hinüber ins Feierliche und Weihevolle. Durch kein anderes Tier aus dem Vogelgeschlechte könnte diese Stimmung besser versinnbildlicht werden als durch den stolzen weißen Schwan, der in wundervoller Ruhe und Gemessenheit auf stillem Wasser seine Bahn zieht. Die Schilderung, die ich hier im Sinne habe, finden wir in dem reichsten und tiefsten Werke Goethes, im „Faust", und zwar in dessen zweitem Teile in jenem Abschnitt, dem der Dichter die Bezeichnung „Klassische Walpurgisnacht" gegeben hat. Faust will die „Wohlgestalt", die er durch die Kunst des Mephistopheles bisher nur in „Zauberspiegelung" erblickte, die nur ein „Schaumbild" war, gewinnen, wiegen, besitzen: Helena, die schönste Frau des klassischen Altertums. Er begibt sich auf die Suche nach ihr in Persephones Reich, in die Unterwelt. Auf dem Wege dorthin kommt er an den Peneiosfluß, wo die Nymphen ihn umgeben und ihn, den Rastlosen, Unruhvollen, auffordern, „im Kühlen die ermüdeten Glieder zu erholen" und zu erfrischen. Vor seinem inneren Auge steigt erneut ein seine Seele mächtig ergreifendes Traumbild empor: die Verbindung des Zeus in der Gestalt eines Schwanes mit Leda, welchem Bunde Helena entsproß. Hier sei nur die Stelle angeführt, die von den heranschwimmenden Schwänen handelt, von denen einer, der schönste, zu Leda hinstrebt:

„Wundersam! Auch Schwäne kommen
Aus den Buchten hergeschwommen,
Majestätisch rein bewegt.
Ruhig schwebend, zart gesellig,
Aber stolz und selbstgefällig,
Wie sich Haupt und Schnabel regt . . .
Einer aber scheint vor allen
Brüstend kühn sich zu gefallen,
Segelnd rasch durch alle fort;
Sein Gefieder bläht sich schwellend,
Welle selbst auf Wogen wellend,
Dringt er zu dem heiligen Ort . . ."

Um Gegensätze eindringlich hervorzukehren, greift Goethe gerne zu kräftigen wirksamen Vergleichen. So bezeichnet in derselben Dichtung Phorkyas (in deren Gestalt Mephistopheles sich verbirgt) der Helena gegenüber deren leichtlebige und flatterhafte Dienerinnen als eine Schar,

„Die neben Deiner Schönheit Schwan
Nur schlecht befittich't, schnatterhafte Gänse sind."

Denselben Dienerinnen stellt Phorkyas mit satanischer Grausamkeit in Aussicht, daß, während ihre Herrin einen edlen Tod durch das Opferbeil erleiden müsse, sie „am hohen Balken drinnen, der des Daches Giebel trägt, wie im Vogelfang die Drosseln der Reihe nach zappeln müssen". Diese Darstellung ist zweifellos eine Erinnerung an die bekannte Schilderung in Homers Odyssee, wo Telemach, der Rinder- und Sauhirte, dieselbe Strafe an den untreuen Mägden des Odysseus vollzieht.

Das Geschlecht der Eulen finden wir mehrfach in Goethes Dichtungen erwähnt. Wie die Lebensweise dieser nächtlichen Raubvögel es mit sich bringt, werden sie vom Dichter da verwendet, wo die Schilderung einen Zug ins Düstere, Schauerliche erhalten soll. So heißt es im „Zigeunerlied":

„Im Nebelgerinnsel, im tiefen Schnee,
Im wilden Wald, in der Winternacht,
Ich hörte der Wölfe Hungergeheul,
Ich hörte der Eulen Geschrei.
Wille wau, wau, wau!
Wille wo, wo, wo!
Wito hu!"

Auch in der Walpurgisnacht im ersten Teil des „Faust", die Faust und Mephistopheles bekanntlich im „Harzgebirge, in der Gegend von Schierke und Elend" mit all ihren Schauern erleben, hören wir von der Eulensippe. Es darf angenommen werden, daß Goethe diese Vögel aus eigener Anschauung, vielleicht von einer seiner drei Besteigungen des Brocken her, kannte. Einmal blieb er auch eine Nacht auf dem Hexenberge. Nacht ist es auch, als Faust mit Mephistopheles den Blocksberg empor-



Ringelastrild × Zebrafink.

klimmt, um in der Hauptnacht der Hexen an deren tollem Treiben teilzunehmen. Nacht ist es; Irrlichter müssen, vom Satan herbeigerufen, den beiden Wanderern leuchten. Wilder und gespenstiger wird die Gegend. Die Wasser stürzen rauschend vom Berge nieder, die „Felsennasen schnarchen und blasen".

„Uhu! Schuhu! tönt es näher,
Kauz und Kiebitz und der Häher,
Sind sie alle wach geblieben?"

Rasend packt die Windsbraut die nächtlichen Wanderer an, wie mit Keulenschlägen trifft sie ihren Nacken. „Du mußt", sagt Mephistopheles,

„Du mußt des Felsens alte Rippen packen,
Sonst stürzt sie dich hinab in dieser Schlünde Gruft.
Ein Nebel verdichtet die Nacht,
Höre, wie's durch die Wälder kracht!
Aufgescheucht fliegen die Eulen.
Hör'! es splittern die Säulen
Ewig grüner Paläste."

Kauz und Uhu, ja sie passen gut in das nächtliche gespenstige Treiben da oben auf dem Blocksberg zu den Hexen, dem Lärm und dem Wirrwarr der Natur, die aus den Fugen geraten zu sein scheint. Auch die Gesellschaft des Hähers, aufgescheucht etwa durch den nächtlichen Sturm, durch die flackernden Irrlichter, lassen wir noch gelten. Sein häßlicher Schrei paßt zum „Schuhu" der großen Eule. Aber

— der Kiebitz? Was hat der dort oben, hoch im Gebirge, fern von seinen nassen Wiesen, weit ab von der Ebene, seiner Heimat, zu tun? — Wir wollen mit dem Dichter nicht rechten, daß er hier offenbar von den naturgeschichtlichen Tatsachen abwich und den Kiebitz, der mit seinem eigentümlichen gaukelnden Fluge und seinem heiseren Geschrei an sich nicht übel in das Gesamtbild paßt, in eine Gegend versetzt, in die er seiner Natur nach nicht gehört. Vielleicht hat den Dichter der Stabreim „Kauz und Kiebitz" verlockt, diesen zu jenem zu gesellen. Im übrigen wollen wir nicht vergessen, daß wir uns in der „Traum- und Zaubersphäre", im Reiche der Hexen, des Hexenmeisters und sonst einer tollen Gesellschaft befinden, daß der Hexensabbat über den Blocksberg heraufgezogen ist. Hier wird das Ungewöhnliche Ereignis! Lassen wir dem Dichter die dichterische Freiheit. Statt zu mäkeln, wollen wir ihm staunend und entzückt lauschen, wenn er den Hexenwirrwarr und den den ganzen Berg entlang strömenden wütenden Zaubergesang in unvergleichlich großartiger und packender Weise uns vor Augen führt.

(Schluß folgt.)

Allerlei vom Starmatz.

Von Professor Fritz Braun.

(Nachdruck verboten.)

Da der Erwerb neuer Papageien für einen valutaschwachen Beamten so ziemlich ausgeschlossen ist, empfand ich es doppelt dankbar, daß mir der weite, parkartige Garten meines neuen Danziger Heims in den überreich vorhandenen Jungstaren eine Art von Ersatz dafür bieten konnte. Die hohen Dachziegelgebirge des Lehrerseminars, in dem ich — ohne dienstliche Beziehungen zu der Anstalt zu haben — ein freundliches Unterkommen fand, sind die reinen Starenbrutkolonien, und wenn im Juni (dieses Jahr geschah es um den siebenten herum) die grauen Nestlinge ausfliegen, steckt jeder Baum im Garten voll von ihnen. Am ersten Ausflugstage könnte man sie wohl leicht mit einer kräftigen Wasserspritze erbeuten, doch lernen sie so rasch im dichtesten Laube Deckung suchen, daß du schon nach 24 Stunden mit solcher Jagdmethode kaum noch ans Ziel kämest.

Wirklich unangenehm werden die Jungstare uns erst, wenn die Süßkirschen reifen. Schritten wir da nicht energisch ein, so möchten sie die Früchte trotz allen Fähnlein und wehenden Papierschnitzeln nicht etwa zehnten, sondern sich so gut wie vollzählig zu Gemüte führen. Da findet denn das Tesching reiche Arbeit, und Jahr für Jahr kann ich mir unter den flügellahm geschossenen Grauröcken neue Pfleglinge aussuchen.

Es ist seltsam, wie rasch sich diese Stare — sie teilen die Eigenschaft übrigens mit den meisten Vögeln, die krank oder wund in unsere Käfige gelangen — an die neue Lebenslage gewöhnen. Kirschen und Johannisbeeren erleichtern die Eingewöhnung der Jungvögel, und wenn ihre Wunden geheilt sind, können sie auch schon halb und halb für zahm gelten.

Zu singen begannen die Jungvögel bei mir allerdings erst gegen Ende August, so daß ich, da ich sie mit Sicherheit doch nie zu bestimmen vermochte, wegen ihres Geschlechts immer etwas in Sorge war. Bisher traf ich es aber immer gut. Ich habe noch kein Weibchen gesund gepflegt.

In den ersten Tagen pflegten sich die Gefangenen mit Kirschen zu begnügen — draußen mochten sie in dieser Zeit ja auch kaum etwas anderes fressen — dann mischte ich aber die süßen Früchte immer mehr und mehr mit Weizenkleie und zerquetschtem Hanf, bis gegen Ende der Kirschenzeit nur noch diese Futterbestandteile übrig blieben, zu denen dann täglich noch acht Mehlwürmer hinzukamen. Mit dieser einfachen und selbst heute noch erschwinglichen Kost waren die Vögel durchaus zufrieden, und ihr Kot bekam davon eine so feste und geruchlose Beschaffenheit, daß ich ihre Käfige in meinem Arbeitszimmer zu dulden vermag.

Zur Zeit verpflege ich zwei solche Stare. Den einen schoß ich selber vor zwei Jahren flügellahm, den andern beraubte im letzten Sommer mein Neffe durch einen Streifschuß mit einer 9 mm-Kugel beinahe aller Schwungfedern des einen Flügels. Der ist deshalb auch viel weniger entstellt als der ältere Vogel, dessen Flügel merklich, wenn auch nicht sonderlich störend für den Beschauer, herabhängt.

Beide Vögel sind eifrige Sänger geworden, doch reicht der jüngere in dieser Hinsicht seinem Kumpan nicht das Wasser. Der zeigte aufs beste, wie recht die Liebhaber tun, aufgezogene Stare zu den guten Sängern zu rechnen. Das erste Lied, das er hören ließ, war die meisterhaft vorgetragene Weise meines nachgerade 12 Jahre von mir verpflegten Grauedelsängers, zu der bald noch der helle Frühlingsruf und das bauchrednerisch gemütliche Geschwätz des Kleibers, seines Käfignachbarn, kamen. Erst viel, viel später, recht eigentlich erst im dritten Lenz seines Lebens, meisterte er das arteigentümliche Starenlied mit seinem Schleifen und schrillen Pfiffen. Außerdem sagt er „Jakob", besonders eifrig dann, wenn er mich im Verdacht hat, ich könnte dadurch zum Verabfolgen außeretatsmäßiger Mehlwürmer angeregt werden. Zahm ist er so, wie es eben nur ein Star zu werden pflegt. Scharre ich, mit der Hand in den Käfig langend, seine harten Exkremente zusammen, so schnäbelt er in einem zu zwischen meinen Fingern herum und nimmt dabei selbst einen wohlgemeinten Klaps nicht übel. Setze ich ihm aber gar sein frischgefülltes Futtergefäß auf den Käfigboden, so haut er sicherlich aus Leibeskräften auf mich ein, sein „Jakob" halb gemütlich, halb futtergierig nur so herausprudelnd.

Sein junger Gesell singt bis auf ein paar Stieglitzstrophen nur das eigene Lied und ist zahm und zutraulich. Dabei sieht man es ihm kaum noch an, daß er sich wegen einer Verwundung gefangen geben mußte. Dennoch würde ich, müßte ich zwischen beiden wählen, ohne Zaudern nach dem älteren greifen. Der jüngere Vogel ist doch einer von vielen, der ältere aber ein Individuum, ein Original, wie sich solche unter allen begabten Vogelarten finden, unter Papageien so gut wie unter Erlenzeisigen, unter Gimpeln so gut wie unter Starmätzen.

Da ich dies niederschreibe, hängen die Kirschbäume im Garten wieder voll grüner Früchte. Bald

werden sie wieder von süßen Kirschen und grauen Staren nur so strotzen. Wer weiß, was ich in diesem Jahre davon ernten mag?

Meine Stieglitzbastardzucht 1921 und 1922.

Von Linda Hirsch.

(Nachdruck verboten.)

Im Sommer des Jahres 1920 brachten mir Bauernkinder zwei halbflügge Stieglitze, und ich setzte sie in ein Nestchen hinein in den Käfig zu meinem Kanarienweibchen. Es war ein altes Weibchen und saß gerade auf nur zwei gelegten Eiern. Als ich nach einer Weile wieder ins Zimmer kam, sah ich zu meinem Erstaunen, daß das Weibchen ihre Eier verlassen hatte und sich auf die Stieglitze niedergelassen hatte und sie fütterte. Einesteils freute ich mich, war ich doch nun des schwierigen Stopfens enthoben, andernteils taten mir die Eier leid, welche nun nicht ausgebrütet wurden, da ich keine weiteren Weibchen damals hatte. Und es fütterte sie groß; als sie schon längst allein fressen konnten, fütterte es noch fleißig weiter, denn stürmisch wurden es von allen beiden um Futter angegangen. Es sah niedlich aus, wenn alle drei auf der Sitzstange saßen, das Weibchen in der Mitte und rechts und links die Stieglitze, bald erhielt der eine einen Schnabel voll, bald der andere.

Im Herbst verfärbten sie sich und wurden ganz prachtvolle Vögel, da ich sie in der Sonne am Fenster draußen hängen hatte. Sie ließen auch schon ihren Gesang ertönen, denn beide waren Männchen. Ich überwinterte sie nebst anderen Waldvögeln mit jungen Kanarienweibchen in einem 1 m langen, 50 cm hohen und 50 cm breiten Käfig. Im März schon kam jedes Pärchen allein in einen 50 cm langen, 50 cm breiten und 50 cm hohen Käfig. Und ich hatte Glück; die Weibchen bauten ihre Nester und legte jedes drei Eier, aber sie waren unbefruchtet. Es war eben noch zu früh für die Stieglitze. Aber im April begann ein eifriges Liebeswerben und tänzeln um die Weibchen, der eine half mit bauen, kugelte auch das Nest aus, kurz, benahm sich wie ein richtiger pflichtgetreuer Vogelehemann. Als Weibchen um Begattung zwitscherten, taten beide ihre Pflicht. Der eine Stieglitz kümmerte sich aber sonst nicht viel um die Wiege seiner Kinder. Von beiden Weibchen wurden vier Eier gelegt und am 14. Tage kamen je vier Junge, das eine etwas später, aus. Meine Freude war groß. Der pflichtgetreue Stieglitz fütterte sein Weibchen und dieses wieder die Jungen in den ersten acht Tagen. Der andere aber machte Unsinn, zupfte Fäden aus dem Nest und jagte das Weibchen. Ich nahm ihn heraus. Es kam auch zu keiner Brut mehr mit ihm, denn eines Tages war er durchs offene Türchen zum Fenster hinaus entwischt. Stieglitz Nr. 1 fütterte seine Jungen, als das Weibchen schon wieder auf Eiern saß. Ich erhielt bis August zehn Stieglitzkanarien, die vier vom Stieglitz Nr. 2 mit eingerechnet, und hatte somit Glück mit meinem ersten Bastardzuchtversuch im Jahre 1921. Neun Stück verkaufte ich im Herbst, als sie vermausert und verfärbt waren. Ich hatte sie draußen in der Sonne hängen und wurden einige Männchen ganz besonders schön. Was beim Stieglitz rot ist, wurde ein tiefes Goldbraun, Köpfchen und Nacken aschgrau, Rücken braun mit schwarzen Streifen, die Flügel gelb gesäumt, die untere Seite grüngelblich, ins Weiße übergehend. Die Weibchen hatten mattere Farben und die braunen Käppchen waren kleiner. Der Schnabel war nicht ganz so spitz wie beim Stieglitz, Körperbau dem Kanarienweibchen ähnlich. Und ein Gezwitscher durcheinander, daß die Leute auf der Straße stehenblieben. Die Fütterung in der Hecke war folgende: hartgekochtes Hühnerei, fein gehackt mit geriebener Semmel und einer Messerspitze voll „Piep“ vermischt, eine andere Schale voll allerlei Waldvogelfutter nebst Rüb- und Spitzsamen. Obst und



Rosttäubchen.

Grünkraut, Vogelmiere, Salat, Spinat fütterte ich, als die Jungen schon selbständig fressen konnten, ab und zu. Sehr gern fressen sie schwarze Holunderbeeren, die ich in ganzen Büscheln oben auf dem Käfig durch die Stäbe gleiten ließ und binnen kurzem kahlgefressen waren und sie hatten rote Schnäbel davon bekommen. Ein Weibchen nur behielt ich zurück, um es mit einem Kanarienhahn zu paaren, es bewährte sich aber nicht, kugelte nur immer im Nest herum und baute nicht. Ich gab es fort, und es hat beim nächsten Besitzer drei Wochen lang auf natürlich unbefruchteten Eiern gebrütet. Dieser hat es dann wieder weiterverkauft, da er keinen passenden Hahn für dasselbe hatte.

Im Jahre 1922 hatte ich noch mehr Glück, denn ich erhielt von dem Stieglitz mit seinem Weibchen 13 Junge und darunter vier prachtvolle Männchen mit gelbem Halsring. Einer war besonders schön. Ziemlich breit, wie ein Hermelinkragen, hatte er einen gelben Hals- und Schulterring, war auch größer und ein prachtvoller Sänger Ich wollte ihn be-

halten, aber ich hatte dem Käufer 12 Stieglitzkanarien versprochen, und da mir einer einging, wollte ich nicht wortbrüchig werden und gab den schönen Stieglitzkanarienhahn leider mit weg.

Habe dieses Jahr auch Hänfling mit Kanarienweibchen zusammengegeben. Voriges Jahr war das Tierchen noch zu wild, da nicht aufgepäppelt, dieses Jahr singt es hervorragend und scheint zahmer zu sein. Falls ich einen Erfolg habe, werde ich darüber berichten.

Kleine Mitteilungen.

Im Vogelparadies! Nachdem am 28. Mai ein starkes Gewitter mit Regen über Dortmund niederging, war am anderen Morgen der Himmel blau und wolkenlos und lenkte ich bei herrlichem Sonnenschein, einer Einladung folgend, meine Schritte als Vogelliebhaber in das Gebiet, man kann wirklich sagen „Vogelparadies", nach Groppenbruch bei Mengede, am Dortmund-Ems-Kanal gelegen. Unsere Wanderung zu 3 Liebhabern führte uns zunächst durch prachtvolle Getreidefelder und Wiesengründe zum Stadtpark Mengede, dann weiter in 2 kleine Eichenwaldungen mit viel Unterholz und Dornengebüsch, woselbst wir die Nester der Nachtigall und Dorngrasmücke fanden. Unsere Sangeskönigin baute fast auf dem Boden unter einem Brombeerstrauch, während das Nest der Dorngrasmücke zirka 1 Meter hoch unter einem Dornenstrauch sich vorfand. Weiter lenkten wir unsere Schritte in ein kleines Buchenwäldchen und sodann zum eigentlichen Paradies der Vogelwelt, zu den lange sich hinstreckenden Brachtümpelfeldern (Sandgräben, ausgeziegeltes Terrain), durchzogen von vielen Wassergräben, Wassertümpeln und umgeben von Ufern. Dieses Gelände ist von der Natur aus mit vereinzeltem Buschwerk, Dornsträuchern, kleinem Waldgebüsch mannigfach geschaffen und bietet ein wirklich ruhiges Leben für unsere gefiederten Sänger. Hier hatten wir das Vergnügen, das Nest des Rotrückenwürgers, ein Hänflingsnest und ein Nest der Rohrammer zu entdecken. Das Nest des Hänflings und des Rotrückenwürgers standen in Dornensträuchern zirka ¾ Meter über der Erde, während das Nest der Rohrammer versteckt auf der Erde sich in einer wasserreichen Sandniederung vorfand. Nunmehr traten wir der Chaussee und Eisenbahn entlang unseren Rückweg an; unterwegs wurden wir noch auf ein Steinschmätzernest aufmerksam. Diese Vögelchen hatten am Eisenbahndamm in einer kleinen Vertiefung gut versteckt unter aufgeschichtete Bruchsteine ihr Nest angelegt. Einer meiner Freunde hat in dem beschriebenen Vogelparadies bisher 36 Vogelarten festgestellt, woraus der Schluß zu ziehen ist, daß auch in unmittelbarer Nähe unserer großen Industriestädte noch mancher gefiederte Sänger anzutreffen ist.

Paul Steenkamp.

Frühjahrsbeobachtungen. Trotz des warmen Winters waren die Ankunftsdaten doch ziemlich spät: Februar 23: Storch. März 15.: Girlitz; 22.: Hausrotschwanz, Zilp, Zalp und Rotkehlchen; 31.: Blaukehlchen, hier nur Durchzugsvogel. April 1.: Schwarzkopf, Fitislaubvogel; 3.: Rauchschwalbe; 12.: Hausschwalbe, Gartenrotschwanz; 19.: Turmsegler, Kuckuck; 24.: Wendehals; 26.: Nachtigallen, Dorn- und Zaungrasmücken; 27.: Wald- und Gartenlaubvogel; 28.: Rotrückiger Würger, diverse Rohrsänger; 29.: Gartengrasmücken; Mai 10.: Pirol.

Heinrch Arnold, Biebrich a. Rh., Hessen-Nassau.

Aufruf.

Mit größter Trauer haben wir in der Tagespresse gelesen von der großen finanziellen Not, in die die Töchter unseres verehrten Alfred Brehm geraten sind. Wir halten es daher für eine Ehrenpflicht, uns an die große Zahl der Verehrer dieses verdienten Mannes in der sicheren Annahme zu wenden, daß jeder, ob begütert oder nicht, in der gegenwärtig schweren Zeit so rasch wie möglich sein Scherflein zur Linderung der Not der Geschwister Brehm beisteuern wird.

Eine kulturelle Schande und ein Akt größter Undankbarkeit gegen diesen großen Mann wäre es, der besonders uns Vogelfreunde unermeßliche wissenschaftliche Werte geschaffen hat, würden wir seinen Töchtern nicht helfend zur Seite stehen.

Wir bitten deshalb um tatkräftige Unterstützung der bedrängten Töchter Alfred Brehms. Gütige Spenden sind zu richten an: Geschwister Brehm in Oberrenthendorf bei Triptis in Thüringen.

F. Borggreve,
Schriftführer des Vereins für Vogelschutz und -pflege, Jena.

Thüringer Vogelfreunde und -freundinnen!

Eine gebieterische Forderung der gegenwärtigen Zeitverhältnisse im Interesse unserer schönen Liebhaberei ist der Zusammenschluß aller Vogelschützer und -pfleger in Ortsvereinen und machtvollen Landesverbänden. Das tägliche Leben allein ist ja schon der beste Lehrmeister dieser Wahrheit. Überall, wo etwas „erreicht" wurde, dankt man es allein nur dem Zusammenschluß. Aqua- und Terrarianer haben ihre Interessenförderung durch Ortsvereine und Landesverbände zu erreichen verstanden. Nur die Vogelliebhaberei Thüringens, wo seit ältesten Zeiten die Liebe zur Natur, insbesondere zur Vogelwelt, tief im Volke ruht, hat noch keine Vertretung, die ihrer Bedeutung entspricht.

Der dem Landesverband Sachsen angeschlossene Verein für Vogelschutz und -pflege zu Jena will sich nun im Interesse der Förderung unserer Ideale gern der mühevollen Aufgabe unterziehen, soweit dies noch nicht geschehen, möglichst in ganz Thüringen Ortsvereine ins Leben zu rufen, die sich dann später einem großen, machtvollen Landesverband anzugliedern hätten.

Um dies restlos erreichen zu können, wendet sich der genannte Verein an alle Vogelfreunde, -pfleger und -schützer Thüringens mit der dringenden Bitte, sich an ihrem Wohnorte zu Vereinen zusammenzuschließen. Unser Verein ist auf Wunsch gern bereit, zu den Gründungsversammlungen einen Vertreter zu entsenden. Wo jedoch aus zwingenden Ursachen eine Vereinsgründung nicht möglich ist, würde ein unmittelbarer Anschluß an den „Nächstliegenden" oder an unsern Verein als auswärtiges Mitglied in Frage kommen.

Gleichzeitig wird um Mitteilung aller Anschriften Thüringer Vogelliebhabervereine, sowie aller Vogelliebhaber, auch solcher, die keinem derartigen Vereine angehören, gebeten.

Damit auch die Adressen derjenigen Liebhaber, die die „Gefiederte Welt" nicht lesen, uns nicht verloren gehen, richten wir an die Abonnenten der „Gefiederten Welt" die höfliche Bitte, alle ihnen bekannten Freunde unserer guten Sache von dem Inhalt dieses Aufrufes unterrichten zu wollen. Etwaigen Anfragen bitte Rückporto beizufügen. Mitarbeiter sind herzlichst willkommen.

Verein für Vogelschutz und -pflege zu Jena.
J. A.: Franz Borggreve, Schriftführer,
Jena i. Thür., Dornburger Str. 381.

Bücher und Zeitschriften.

W. Marshalls **Bilderatlas zur Tierkunde** mit beschreibendem Text. 2. Auflage. Dritter Teil: **Die Vögel.** Mit 176 Holzschnitten und 70 Ätzungen. In Halbleinen geb. 11 M. Grundzahl (mit der Schlüsselzahl des Börsenvereins zu multiplizieren). Verlag des Bibliographischen Instituts, Leipzig.

Mit besonderer Freude begrüßen wir, daß Marshalls Bilderatlas zur Tierkunde, der längere Zeit vergriffen war, wieder zu erscheinen beginnt. Zunächst liegt der Band „Vögel" in gediegener Ausstattung und auf gutem Papier gedruckt vor. Die alte bewährte Form ist insofern beibehalten, als dem Bilderatlas ein beschreibender Text vorangeht. Beiden ist aber eine gründliche Erneuerung zuteil geworden. Den modernen Anforderungen entsprechend, ist

dem mit vorbildlicher Knappheit gefaßten Text, wie bei den Vogel-Bänden in dem im gleichen Verlag erschienenen „Brehms Tierleben", das Gadowsche System zugrunde gelegt. In den Bildern finden wir von den besten alten die saubern Kunstwerke eines G. Mützel und Friedr. Specht wieder, von neuen viele Zeichnungen des genialen Wilh. Kuhnert und des ebenso feinkünstlerischen wie naturwahren W. Heubach. Fast ein Drittel der Bilder sind „Natururkunden" nach Photographien. Farbige Bilder kann man wegen der hohen Kosten in diesem Bilderatlas natürlich nicht erwarten. Aber auch ohne solche ist er eine reiche Fundgrube wissenschaftlich einwandfreien wie künstlerisch vollendeten Anschauungsmaterials für Schule, Haus und Büchereien.

Aus den Vereinen.

A. Z. Angemeldet sind die Herren Karl Blüm i. Fa. Louis Hildebrand, Spedition, Biebrich a. Rhein, Kaiserstr. 57; Paul Wisniewsky, Leipzig-Eu., Görlitzer Str. 8; Alfred Thieme, Leipzig (Adresse?). — Aufgenommen sind die Mitgl. Nr. 326 Herm. Pfützenreuter, Mag.-Baurat, Berlin-Halensee, Sassenerstr. 27; Mtgl. Nr. 327 Martin Schöll, Garmisch i. Oberbayern, Marktplatz 46. — Adresse von Mtgl. 324 Frandzen, Kristiania, ist zu berichtigen: wohnt Bygdo, Allee 9 II. — Mtgl. 26 (Sztachovics, Wien) sucht dringend 0,1 roten Kardinal im Tausch gegen 0,1 Schama, Mai 23 imp., oder erstkl. Sprosser, franko gegen franko. Mtgl. 216 (Schwarzkopf, Ingelfingen) gibt zirka 20 blaublütige Wellensittiche, diesj. Zucht, ab, tauscht auch 1,1 gegen 1,1 Nymphensittich.

Mtgl. 324 Frandzen, Kristiania, spendete 7000 M. für die F. Matz-Spende. A. Krabbe.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig. Nächste Sitzung Donnerstag, den 5. Juli und Donnerstag, den 19. Juli, im Vereinslokal „Bauers Brauereirestaurant", Täubchenweg. Gäste sind willkommen.
J. A.: Joh. Birk, 1. Vors., Leipzig-Mockau, Beuthstr. 29.

Verein für Vogelkunde und -liebhaberei zu Karlsbad. Wie sich in Deutschland alle Vogelliebhaber in Ortsgruppen und Landesvereine zusammengeschlossen haben, so haben sich auch die Karlsbader Liebhaber vereinigt, um alle Angriffe gegen unsere schönste Liebhaberei, die Vogelpflege, durch die Organisation abzuwehren. Es hat sich schon eine große Zahl von Vogelpflegern der Ortsgruppe angeschlossen und der Verein wird in kurzer Zeit eine starke Mitgliederzahl besitzen. Als Vereinszeitung für jedes Mitglied wurde die „Gefiederte Welt" beantragt. Nächste Ortsgruppen folgen in Gablonz, Reichenberg, Brünn, Prag usw. Wir kennen den Kampf unserer Vogelfreunde in Deutschland. Auch uns deutschen Vogelpflegern in Böhmen will man unsere Lieblinge nehmen, also durch ein Gesetz, das das Käfigen von Waldvögeln verbietet. Es haben sich Tierschutzvereine bei der Landesverwaltung eingesetzt und sich angeboten, behilflich zu sein, ein Gesetz mit auszuarbeiten zu helfen, das uns verbietet, die liebsten Sänger, unsere Weichfresser, zu käfigen. In dieser Frage wird der Vogelliebhaber nicht gefragt, der für seine Lieblinge das letzte opfert und an seinen Sängern im ärmsten Heim das Liebste besitzt. Vogelliebhaber vereinigt euch in Ortsvereine und Landesverbände (Reichsverband), unterstützt die Arbeit zur Vereinigung unserer Vogelpfleger, führt jeden Liebhaber unserer Ortsgruppe zu! Durch Mitarbeit eines Jeden können wir, wenn es gilt, eine Kampforganisation sein, denn nur Einigkeit ist Macht, mit der wir unsere Rechte erkämpfen können.
Ludwig Hederer, 1. Vors., Karlsbad, Petersberg 1132.

Die **Vereinigung der Vogelliebhaber Landesverband Sachsen** veranstaltete am 28. und 29. April 1923 ihre erste Jahreshauptversammlung, welche zu Ehren „unseres" 1. Vorsitzenden Herrn Joh. Birk zur vollsten Zufriedenheit besucht war. Für die offizielle Einleitung sei an dieser Stelle dem Leipziger Doppelquartett besonders gedankt, welches durch sein für diesen Abend treffend gewähltes Lied „Es rauscht der Wald" allen Teilnehmern den wahren Sinn der von uns so hoch geschätzten Natur zu Gehör brachte. Nach den von allen Vorständen erfolgten Begrüßungsansprachen gab „unser Joh. Birk" einen Vortrag „Betrachtungen über unsere Liebhaberei" zum besten. Die mit nicht endenwollendem Beifall aufgenommenen Ausführungen ließen erkennen, daß es nur dem Manne möglich ist, die Herzen seiner Zuhörer befangen zu halten, welcher seit seiner frühesten Jugend unsere Lieblinge in der Natur und Stubenpflege, ihre Eigen- und Gewohnheiten ergründet hat. Wohl manchem anwesenden Liebhaber werden es unvergeßliche Eindrücke gewesen sein, und ich hoffe annehmen zu dürfen, daß es alle wahren Liebhaber verstehen werden, wenn ich von Herzen wünsche, in diesem Sinne nach den Worten „unsers" Joh. Birk in Zukunft zu handeln und zu wirken. Den Abschluß der offiziellen Feier bildeten noch einige eigens dazu gewählte Gesangsstücke des Leipziger Doppelquartetts. Diesen Herren sei nochmals herzlichst gedankt. Die folgenden Stunden des Beisammenseins wurden durch musikalische Gesangs-, humoristische sowie Prologstücke ausgefüllt. Dem Fräulein und Herrn Böttcher sowie Herrn Winkler und auch allen übrigen Mitwirkenden gestatten wir unseren herzlichsten Dank auszusprechen. Erst in den späten Abendstunden wurde das Feld unserer gemeinschaftlichen Zusammenkunft verlassen. Für die am 29. April 1923 vollbrachte Kleinarbeit, welche für unsere Liebhaberei von größtem Nutzen sein dürfte, sei allen aufs wärmste gedankt. Im besonderen danken wir alle den Leipziger Herren für die liebevolle Aufnahme und die Gastfreundschaft, welche sie uns zuteil werden ließen. Auch den Herren von Leipzig sei unser wärmster Dank gewiß, welche uns die Quartiere bereitgestellt haben. Gern und mit Freuden werden wir an Leipzig denken, und mit dem Wunsche, daß unsere edle Liebhaberei in Zukunft gute Erfolge zeitigen möge, grüßen wir alle Leipziger Herren aufs beste. Zugleich im Auftrag der anwesenden auswärtigen Vertreter

W. Silbermburg
vom Verein für Vogelschutz und -pflege, Dresden.



Redaktionsbriefkasten.

Herrn Dr. St., Böblingen. Über die Schädlichkeit der Verwendung von Zink bei Vogelkäfigen gehen die Meinungen auseinander. Die Futter- und Wassergefäße der überall als vorzüglich geltenden Wiener Käfige für Insektenfresser sind aus Zinkblech hergestellt. Das feuchte Futter, Obst, Beeren und dergleichen kommt andauernd mit dem Zink in Berührung, ohne daß sich schädliche Folgen gezeigt hätten. Etwas anders liegen die Verhältnisse, wenn Zinkdraht für Papageienkäfige verwendet wird. Papageien benagen den Draht und könnten leicht Zinkteilchen und bei längerem Gebrauch der Käfige auch Zinkoxyd aufnehmen. Das könnte schädliche Folgen haben. Besser ist es jedenfalls, gut verzinntes Drahtgeflecht für diese Käfige zu verwenden. Das in der Eisenwarenhandlung in verschiedenen Maschenweiten erhältlich ist. — Das Benehmen der Nymphensittiche ist das normale. Das Weibchen ist jedenfalls noch nicht geschlechtsreif. Die Ernährung ist gut. Statt des enthülsten Hafers wird besser unenthülster verabreicht. Haltung im nicht geheizten, frostfreien Zimmer ist zuträglicher. Badewasser kann gereicht werden.

Herrn A. B., Obertürkheim. Das Federrupfen ist eine Krankheit, die nur durch naturgemäße Pflege und Haltung des Vogels behoben werden kann. Vor allem muß sich der Kreuzschnabel in einem reichlich mit frischen Nadelholz(Kiefern)zweigen ausgestatteten geräumigen Käfig reichlich bewegen können. Die frischen Nadelholzzweige mit den jungen Sprossen bieten dem K. auch zuträgliche Nahrung. Frische Luft, Badegelegenheit sind notwendig und jetzt auch neben dem anderen Futter täglich etwas Insektenfresserfutter.

Herrn E. H., Klodnitz. Das Halten einheimischer Vögel ist in Preußen nicht verboten. Der Landjäger hat kein Recht, Ihnen einen Vogel fortzunehmen. Der Fang ist verboten. Auf Antrag kann Ihnen von dem Landrat des Kreises der Fang für eine bestimmte Zeit und Örtlichkeit gestattet werden. — Selbstverständlich ist es gut, wenn Sie dem Landesverband Preußen beitreten. Er ist die Organisation, welche die Interessen der Vogelliebhaber vertritt.

Käfige u. Gerätschaften

Größere Stubenvoliere

für Wellensittichzucht gesucht. [425
Chr. Hacker, Fabr.-Direktor,
Schwenningen a. N.

Futtermittel

Vogelfutter

für Kanarien, Waldvögel, Exoten, Papageien, Weichfresser. Anfragen nur gegen Rückporto. Liste 13 über Vogelfutter 200 *M*, Liste 5 über Vogelkäfige, Zuchtgeräte usw. mit etwa 400 Abbildungen 600 *M*. [426

W. Göpel, Leipzig,
Tröndlinring 1. Telephon 14958.

Frische Ameiseneier

versende täglich frisch, ferner **getrocknete Ameiseneier, Weißwurm** usw.
H. Behrke, Braunschweig,
Sophienstraße 35. Fernruf 1281. [427

Frische Ameiseneier

liefert ständig **Hermann Arold,** Zoologische Handlung, Berlin N 58, Fransecky-straße 4. Postscheckkonto Berlin 149951. Anfragen Rückporto. [428

Suche jeden Posten
frische Ia Ameiseneier

laufend zu kaufen. [429
Severin Niegemann, Köln-Sülz,
Aegidiusstraße 52.

Vögel

Suche sofort und zahle 170000 Mark

für zwei einwandfreie gr. zuchtfähige
Wellensittich-Weibchen,

evtl. auch ein gelbes. Ferner suche 1,1 Zuchtpaar und ca. 3,5 gr. Jungtiere. Es kommen nur kräftige für Gartenvoliere geeignete Tiere in Frage. Angebote mit Preis an
Erich Richter, Bernstadt i. S.,
Troggasse. Mitgl. A.Z. 235. [430

Lachtauben

kaufe jeden Posten und zahle pro Paar frei Braunschweig 20000 *M* unter Garantie gesunder Ankunft. [431
H. Behrke, Braunschweig,
Sophienstraße 35. Fernruf 1281.

Verein der Vogelfreunde und Kanarienzüchter in Thalheim b. Wels

(Ob.-Österreich)
kauft 3—4 Paar echte, reine, schöne **Holländer Kanarien** für Zuchtzwecke. Nur erstklassiges Material (nicht Geschwister) kommt in Betracht! Angebote unt. Angabe von Farbe, Alter und Preis sowie von diesjährigen Ameiseneiern erbeten an [432
Warenhaus Peter Steinerberger,
Wels (Ob.-Österr.), Traungasse 7.

Papagei, gut und viel sprechend, und andere Singvögel sowie Ziervögel zu kaufen gesucht. Angebote unter „Papagei" an die Geschäftsstelle der „Gefiederten Welt". [433

Suche 1 Zuchtpaar jap. **Möwchen** und **2,1 Zebrafinken.** Gebe dafür **Wellensittiche** ab. [434
Syré, Lehrer, **Viernau i. Thür.**

Gebe ab **1,1 Nymphensittiche.**
Dr. Kayser, Magdeburg,
Landesfrauenklinik. [435

Reform-Käfige

Zerlegbar · Leichteste Reinigung · Einfachster sicherer Transport
1. Preis beim Käfig-Wettbewerb Leipzig 1919/22 (siehe Gefiederte Welt 1920, Heft 14—16), Goldene Medaille Leipzig 1921/22
werden für alle Vogelarten hergestellt.

Ausführung: Hartholz, grünlackiert oder naturlackiert, Zinkschublade, Porzellannäpfe, Ledertuchdecke.
Keine Fabrikware, sondern beste Spezialarbeit!
Anfertigung als Kistenkäfig oder Wiener Form (halboffen) oder halboffen mit fester Rückwand. Ohne jedes Werkzeug in einer Minute zusammengestellt resp. zerlegt. Verpackung zum Selbstkostenpreis.
Fertigen auch jede Art Käfige u. Volieren n. Zeichnung od. Maßangabe.

Heck-, Flug-, Einsatz-Käfige.
Ausstellungs-Käfige nach Vorschr. d. V. D. K.
Transport-Käfige, jeden Posten.
Anfragen Rückporto beifügen. Katalog gegen Einsendung von 150 M. in Briefmarken.

Schlagnetze ohne Mittelsteg
für schädliche Vögel, prima handgeknüpfte Ware. [436

Kühn & Muschter, — Inhaber — **Borna b. Leipzig,**
Arthur Muschter,
Kasernenstraße 4.
Bankkonto: Allgem. Deutsche Credit-Anstalt Zweigstelle Borna; Stadt-Girokasse Borna b. Leipzig Nr. 1506. — Postscheck.: Leipzig 92250. — Tel. 147.
Zahlreiche Anerkennungs- und Dankschreiben.

Papageien Kanarienhähne Bastarde

kauft höchstzahlend und tauscht auch auf Exoten

Willy Odenwald, Fulda.

Eigner Export und Import. [437

Kaufe laufend zu konkurrenzlos höchsten Preisen:
Kanarienhähne und -weibchen

sowie **Sing-** und **Ziervögel, Exoten aller Arten, Papageien, graue, grüne usw.**

Arthur Muschter, Borna b. Leipzig,
Käfigfabrik und Vogelhandel en gros und en detail
Import. **Export.**
Anfragen Rückporto beifügen. [438

Gebe ab ein blauflügeliges
Sperlingspapageiweibchen

gegen ein dito Männchen.
Suche ein Paar junge Nymphensittiche im Tausch gegen zwei Sperlingspapagei-Weibchen. [439
R. Huth, Perleberg. A.Z. 292.

Da mir für Stubenvoliere zu groß, gebe ab
1,1 Goldstirnsittiche

(Wert z. Zt. 240000 *M*).
Tausche gegen erstkl. **Sprosser** oder gegen **Fremdländer.**

Suche Schamadrossel.
O. Hegemann, Hameln a. d. W.,
Klütstraße 1a. [440

Suche zu kaufen 2—3 Paar zuchtfähige **Wellensittiche.** Off. mit Preis an **W. Isaaks,** Oberpostschaffner, **Harburg** (Elbe). [441

Tausche 1,1 Wellensittich und 6 Waldvögel gegen einen Ia Kanarienhahn. **Gerhard Hahn,** Gohlsdorf (Post Brockendorf), Bez. Liegnitz. [442

Wellensittiche,

1—2 Zuchtpaare, auch andere Exoten **gesucht.** Angebote mit Preis an [443
Ranglack, **Halberstadt,** Domplatz 29.

Wellensittiche.

Den Liebhabern, welche ich letztes Mal nicht bedienen konnte, stehen jetzt 1923er Jungtiere aus Freivolieren von winterharten Eltern zur Verfügung, ohne Geschlechtsgarantie. Am liebsten Tausch auf seltene Exoten, sprechenden Papagei, Volieren oder Vogel-Literatur. Mitglieder der A.Z. bevorzugt. [444
L. Rösch, Lauffen a. Neckar (Württ.).

„Ornis" [445

Freie Bezugs-Vereinigung der Waldvogel-Liebhaber Deutschlands
bestand von 1912 bis 1. Oktober 1920. Durch sachgemäße und reelle Belieferung der Mitglieder mit Vogelfutter u. Bedarfsartikeln erwarb sie sich einen Ruf, der noch fortbesteht. — Auf vielseitigen Wunsch bringe ich diese Tatsache in Erinnerung, auch allen denjenigen, die von dem Bestehen derselben noch keine Kenntnis haben. — Ein **Benachrichtigungsblatt** kann leider **nicht** mehr erscheinen, doch ist das Ornis-Haus nach wie vor bestrebt, die besten von allen am Markte erhältlichen Artikeln zu liefern; das mir geschenkte Vertrauen werde ich weiter zu erhalten wissen. — Über meine Tätigkeit gibt das „Ornis-Buch" Auskunft. Rabatt kann **nicht** mehr gewährt werden, doch kommen nur brauchbare Mischungen zum Versand. Bei Anfragen erbitte ausreichendes Rückporto und Angabe der vorhandenen Vogelarten. — Auskunft bereitwilligst. Bücher und Blätter sende für 800 Mk. frei (Ausland 2400 Mk.)
Ornis-Haus, Halle a. S.
Fernruf 4198
„Reform - Normal"-Weichfutter nach Angabe des Herrn Apotheker Adalbert Jena-Biberach-Riß. Moderner elektr. Betrieb. Gleichmäßige Körnung, restloser Verbrauch garantiert.

Wellensittiche,

23er Brut, 1,1 grün oder gelb, **gesucht.** Auf Wunsch Vögel in Tausch. [446
Friedrich Barth, Göttingen.

Kanarien-Hähne

und **-Weibchen,** Papageien, Wellensittiche, weiße Mäuse, Meerschweinchen und ähnliche Tiere kaufe ständig höchstzahlend. Angebote mit Preis erbeten.
H. Behrke vorm. **Mätje.** Gegr. 1874.
Tierexport Braunschweig,
Sophienstr. 35. Fernruf 1281. [447

0,1 gr. Wellensittich, 15 Monate alt, gegen Meistgebot zu verkaufen.
Schneider, Karlsruhe-Rüppurr, (Baden), Grün 44. [448

Gebe in Tausch ab: 2 Zeisige, 2 Hänflinge, evtl. ein gutsingendes Rotkehlchen. **Nehme in Tausch:** 1 Gimpel, 1 Kreuzschnabel oder gutes Mischfutter für Körnerfresser oder sonst Nützliches. Anfragen bitte Rückporto. [449
Paul Schulz, Neustadt i. Sachsen, Niedergraben 7.

Gesucht

Ornith. Monatsschrift
1907, 1914.
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung Magdeburg.
Postschließfach 148.

Verkaufe gegen Meistgebot: Brehms Tierleben 1864, 4 Bände (Säugetiere und Vögel) mit vielen Holzstichen und Textabbildungen; Handbuch der Naturgeschichte 1773, 1. Band (Mensch und Säugetiere) mit vielen Kupfern; Buffon Naturgeschichte der Vögel 1784, 9. und 10. Band (enth. Amseln, Kernbeißer, Kardinäle, Sperlinge, Kanarien usw.) Nehme Sonnenvogel mit in Zahlung. Ferner gebe ab: Ia Schwarzkopf in Tausch gegen Ia Gartengrasmücke.
H. Eberhardt, [450
Nordhausen-Altendorf 36.

Inserate

für das am 19. Juli 1923 zur Ausgabe gelangende Heft 14 der Gefiederten Welt erbitten bis 13. Juli 1923 früh.
Die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit **10 Pf. Grundpreis** berechnet, der mit der vom „Börsenverein der Deutschen Buchhändler bestimmten Teuerungszahl — zurzeit „9000" — zu multiplizieren ist. Auslandspreis —,10 Schweizer Franken.

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Hermsdorf bei Berlin; für den Anzeigenteil: Franz Wunderlich, Magdeburg, Postschließfach 148.
Verlag der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck: August Hopfer, Burg Bz. Mgdbg.

Jahrgang LII.
Heft 14. 19. Juli 1923.

Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Die Gefiederte Welt gelangt am Donnerstag nach dem 1. u. 15. jedes Monats zur Ausgabe und kostet für Monat Juli 1000 Mark. Einzelpreis des Heftes 600 Mark. Auslandspreis für das Vierteljahr 2 Schweizer Franken, für das Heft 0,35 Schweizer Franken. Inserate für die folgende Nummer müssen bis spätestens Freitag früh in Händen der Verlagsbuchhandlung sein. Die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 10 Pfg. Grundpreis berechnet, der mit der vom „Börsenverein der Deutschen Buchhändler" von Zeit zu Zeit bestimmten Teuerungszahl zu multiplizieren ist. Die Teuerungszahl ist zurzeit „15 000". — Auslandspreis für die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum —„10 Schweizer Franken.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung (M. Kretschmann) in Magdeburg.

Postschließfach 148. Postscheckamt: Magdeburg 3148. Fernsprecher: 1323.

Was und wie soll man füttern!

Vortrag, gehalten im Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig.

Von J. Birk, Leipzig.

(Nachdruck verboten.)

Wenn ich mir erlaube, heute einen Vortrag über obiges Thema zu halten, so bin ich mir auch voll und ganz bewußt, daß ich hiermit ein Gebiet der Liebhaberei beschreite, welches schon oberflächlich betrachtet die schwierigsten Obliegenheiten des Vogelpflegers umfaßt, hängt doch von einer sachgemäßen Fütterung der ganze Erfolg der Stubenvogelliebhaberei ab. Eine der gewagtesten und schwierigsten Aufgaben bedeutet die Behandlung der Futterfrage, die zu lösen im einheitlichen Sinne der Vogelliebhaberei wohl für jeden ein Ding der Unmöglichkeit bedeutet. „Viele Wege führen nach Rom." Dieses wahre Sprichwort paßt auf die Verschiedenartigkeit der Fütterungsmethoden innerhalb der Liebhaberei wie zu keiner andern Sache. Viele Wege nach einem Ziel, aber auch gleich guter Erfolg, das ist der beste Beweis für das Praktische der vielen existierenden Fütterungsmethoden. Fast jeder langjährige Vogelliebhaber hat sich durch die Praxis auf ein gewisses System festgelegt, das zu verteidigen und anzupreisen manche Liebhaber mit gutem Recht tun. Wenn Sie nun von mir erwarten, daß ich gleichfalls ein unfehlbares System auftische, auf das Sie sich einschwören sollen, so muß ich erwidern, daß ich dazu nicht in der Lage bin, denn was nützt es, wenn ich von Gold spreche und habe nur Eisen zur Verfügung. Heute kann ich nicht mehr sagen wie unser unschätzbarer Altmeister Rausch, man nehme soundso viel Teile Weißwurm, Ameisenpuppen usw., heute sprechen die nackten Tatsachen, daß viele Liebhaber die beiden Hauptbestandteile im Speisezettel unserer gefiederten Lieblinge, wie Weißwurm und Ameisenpuppen, zeitweise gar nicht oder nur in ungenügender Menge auftreiben können. Für uns Leipziger besteht die Tatsache,- daß der nahrhafte Weißwurm auf dem Markt nicht mehr zu erhalten ist; dieser Zustand dürfte wohl vor der neuen Ernte keine Änderung mehr erfahren. Der harte, unerbittliche Lehrmeister Krieg hat auch den Vogelliebhaber auf eine sehr harte Probe gestellt; wurde es dem Vogelliebhaber nicht leicht, seine irdische Hülle immer wieder nur in der Hauptsache mit Kohlrüben vollzustopfen, um so schmerzlicher berührte es ihn, daß er seinen gefiederten Lieblingen ebenfalls nur noch Kriegsfutter der verrufensten Sorte anbieten konnte. Wer früher dachte, dieses oder jenes muß die oder jene Vogelart unbedingt zu ihrer Erhaltung bekommen, ist mit der Durchhaltung seiner gefiederten Lieblinge während der Kriegszeit eines anderen belehrt worden. Die traurige Wahrheit bleibt aber bestehen, daß der Krieg gar manchen gefiederten Stubengenossen das Leben gekostet hat, und nur mit Grauen wird mancher Vogelliebhaber dieser kummer- und sorgenvollen Zeiten gedenken; aber gelernt hat der Vogelliebhaber trotzdem dabei, war es auch ein schmerzliches Lehrgeld, das er hierfür entrichten mußte. Man soll seinen Lieblingen stets nur vom Guten das Beste bieten, diese erprobte Liebhaberregel der alten Praktiker bleibt trotzdem auch heute noch mit vollem Recht bestehen, vorausgesetzt, daß er es kann, indem ihm vom Guten auch das Beste zur Verfügung steht, aber leider ist dieses Glück nicht immer jedem Liebhaber beschieden. Er ist dann gezwungen, mit bescheidenerem Futter seine Liebhaberei auf der Höhe zu halten, das heißt, ebenfalls damit zum Erfolge

zu gelangen. Tritt diese traurige Notwendigkeit ein, so muß der Liebhaber alle seine Kunst aufwenden, um die fehlende Qualität durch dementsprechende Quantität wieder auszugleichen. Sie wissen ja, daß dereinst ein Liebhaber aus unserem Kreise folgende Behauptung aufstellte: Die meisten Todesfälle bei den Käfigvögeln haben in Unterernährung ihre Ursache. Dies mußte ich meinen Erfahrungen nach widerlegen, ich habe den Kernpunkt der Krankheits- und Todeserscheinungen im Gegenteil gefunden. So wichtig es ist, stets zu wissen, was man füttert, so wichtig ist es auch zu wissen, wie man füttern soll. Selbst vom Guten das Beste in schematischer Weise allen Vogelarten gefüttert, wird schwere nachteilige Folgen für einzelne Vogelarten zeitigen, ja selbst bei verschiedenen Individuen einer Art bringt eine in qualitativer und quantitativer Gleichmäßigkeit vor sich gehende Fütterung verschiedene Wirkungen hervor. Während ein Vogel ein und derselben Art beim besten und nahrhaftesten Futter kaum in normaler Körperform zu halten ist, im Gegenteil, immer mit einer gewissen Magerkeit zu kämpfen hat, setzt ein anderer Vogel derartig Fett an, daß für die Lebensdauer desselben sehr nachteilige Folgen eintreten. Meinen Erfahrungen nach ist es sehr wichtig, nur einwandfreies Futter zu verwenden, aber noch wichtiger für die Gesundheit des Vogels und demzufolge für den Gesangserfolg ist eine den Eigenschaften der einzelnen Futterbestandteile Rechnung tragende Zusammensetzung des täglichen Futters. Während ein Vogel mehr fettbildende Substanzen benötigt, müssen bei einem anderen weniger nahrhafte, bei einem anderen wiederum sogar entfettende Bestandteile in den täglichen Speisezettel einrangiert werden. Der Liebhaber muß stets ein scharfes Auge für den Körperzustand seiner Pfleglinge haben, nicht zu fett und nicht zu mager, auch hier ist der goldene Mittelweg der beste, doch ziehe ich einen kleinen Fettansatz entschieden einem unter normal befindlichen Körperzustand vor, ja, zu gewissen Zeiten und bei verschiedenen Arten ist ein gewisser Fettansatz von großem Vorteil. Ist ein Vogel zu fett, so ist er gesangsfaul und macht einen unnatürlichen Eindruck, mausert schlecht oder gar nicht, darum muß stets auf eine normale Körperbeschaffenheit das Hauptaugenmerk gerichtet werden. Magere Vögel zur Mauserzeit sind meistens den Anforderungen, welche die Neubildung des Federkleides an den Körper stellt, nicht gewachsen, sie mausern ebenfalls schlecht oder gehen dadurch dem Tode entgegen. Die Futtermittel, welche uns in der sachgemäßen Vogelpflege zur Verfügung stehen, sind zahlengemäß nicht gering, ständig wird etwas Neues als gut angepriesen, probiert, verschwindet aber ebenso schnell, wie es gekommen ist, denn es bewährte sich nicht in der Praxis. Es ist nicht immer gesagt, wenn der Vogel etwas gerne frißt, daß ihm dies für sein ferneres Wohlbefinden im Käfig auch dienlich ist. Die moderne Stubenvogelliebhaberei ist so weit vorgeschritten, daß ihr jetziger Stand uns vollständig den Weg weisen kann zur sachgemäßen Stubenvogelpflege. Für die Fütterung unserer körnerfressenden Stubenvögel stehen uns jetzt nach des Krieges Nöten wieder öl- sowie mehlhaltige Sämereien in einwandfreier Beschaffenheit zur Verfügung, etwas anderes war es im Kriege, da vegetierten unsere Lieblinge mit einem derartig minderwertigen, an Nährstoffen armen Futter, daß die Verluste keine geringen genannt werden können, speziell der Exotenliebhaberei hatte die Futterknappheit den Todesstoß versetzt. Was wir unseren einheimischen Stubenvögeln bieten konnten, war ein Gemisch von Unkrautsämereien, zum größten Teil waren es aber Hülsen und Unrat, womit unsere Lieblinge ihren Hunger zu stillen suchten. Heute ist es etwas anderes, den Kostenpunkt natürlich ausgeschaltet; wir erhalten wieder, wie in Vorkriegszeiten in einwandfreier Beschaffenheit nachstehende Sämereien: Hanf, Mohn, Sommerrübsen, Kanariensamen, enthülsten Hafer, Hirse, Distel-, Erlen-, Salatsamen usw. Auch eine Menge weiterer Unkrautsamen bilden eine Vervollkommnung der uns zur Verfügung stehenden Sämereien, welche von allen Körnerfressern sehr gern genommen werden. Zu gegebener Zeit bildet Grünfutter die tägliche Beigabe zu den Sämereien, im Herbst und Winter bildet auch Obst, wie Äpfel, Birnen usw., eine willkommene Abwechslung. Um seinen Lieblingen auch im Winter ab und zu Grünfutter verabreichen zu können, säe man Körnerfutter in Blumentöpfe, im warmen Zimmer wächst das Grüne sehr schnell, so daß man bei mehreren Töpfen nicht an Grünfuttermangel leidet, Apfel bildet gleichfalls im Winter sehr guten Grünfuttererſatz. Ohne Grünfutter kommt man in der Körnerfresserpflege nicht aus, auch hierbei muß Abwechslung geboten werden, gar mancher Vogelhalter denkt, wenn der Vogel täglich sein Näpfchen Körnerfutter und Wasser erhält, so hat er seinen Pflegepflichten Genüge getan. Als Grünfutter zu gegebenen Zeiten dient hauptsächlich das Sternkraut, besser als Vogelmiere, bei uns im Volksmund als „Mäusegedärme“ bekannte Unkraut. Außerdem gibt ein begehrtes Grünfutter das Kreuzkraut, Kopfsalat, im zeitigen Frühjahr und im Spätherbst bis zum Eintritt des Frostes auch Spinat und Mangold, letztere zwei Sorten wurden von meinen Vögeln sehr gerne genommen. Das Grünfutter ist, will man seine Körnerfresser dauernd gesund, d. h. auch im normalen Körperzustand erhalten, neben genügender Bewegungsfreiheit ein Hauptfaktor in der Vogelpflege. Je mehr Bewegungsfreiheit, desto mehr Kräfteverbrauch, desto mehr Nahrungsbedürfnis, und daher auch desto mehr Futterverbrauch, richtiger gesagt rationeller Futterverbrauch. Je kleiner der Käfig, desto weniger Bewegungsfreiheit, desto weniger Kräfteverbrauch, desto mehr Ruhe, desto mehr Fettansatz, aber leider auch desto mehr Futterverabreichung bei vielen Liebhabern. Wenn man beispielsweise sieht, wie mancher Stieglitz, Zeisig, Buchfink oder irgendein anderer Körnerfresser in Einzelkäfigung mit dem täglich verabreichten Futterquantum wählerisch umgeht, das heißt den Napf bis zum Boden nach seinen Lieblingssämereien durchsucht und dabei den größten Teil Futter herausschleudert, so muß man nach dem Rezept „Hunger ist der beste Koch“ verfahren. Diese Futternascherei ist ein Zeichen, daß das verabreichte Quantum für das wirkliche Nahrungsbedürfnis des betreffenden Vogels ein viel zu reichliches ist. Man verringere vor allem die täglichen Portionen so weit

und so lange, bis der Vogel auch von weniger begehrten, aber sehr dienlichen Sämereien, wie z. B. Sommerrübsen, mit frißt, meistens ist Hanf das begehrteste, aber, in Übermenge gereicht, auch das schädlichste Futter für unsere Körnerfresser.

(Fortsetzung folgt.)

Ornithologisches in Goethes Dichtungen.

Von Walther Bacmeister.

(Schluß.) (Nachdruck verboten.)

Wie in der deutschen Walpurgisnacht des ersten Teils des Faust, so treffen wir auch in der klassischen im zweiten Teile scharf ausgeprägte Vogelgestalten an: Reiher und Kraniche. Beide Vogelarten hat Goethe wohl sicherlich aus eigener Anschauung gekannt. Seinem naturwissenschaftlich gut geübten Auge ist gewiß nicht der in Gesellschaft nistende Reiher entgangen, noch

„Der Kraniche
Laut-heiser klingender Zug, der über unser Haupt
In langer Wolke krächzend sein Getön herab
Schickt, das den stillen Wanderer über sich hinauf
Zu blicken lockt."

Goethe wußte auch, und damit berühren wir eine auch heute noch nach 100 Jahren klaffende, schwärende Wunde, daß Roheit und menschliche Eitelkeit es über sich gewinnen, die Reiher um ihres Federschmuckes willen abzuschießen. Ergreifende Töne findet der große Dichter, um die Ruchlosigkeit solchen Gebarens zu schildern. Es sind wahrhaft „klassische" Worte, die er im zweiten Teile des „Faust" prägt, und es gehört deren Kenntnis sozusagen zum eisernen Bestande eines jeden Vogelfreundes und Vogelschützers. — Das Volk der Pygmäen will am Peneiosfluß den Kampf gegen die Reiher aufnehmen, und es befiehlt ihm sein oberster Heerführer, sie sollen die „unzählig nistenden, hochmütig brüstenden Reiher auf Einen Ruck" schießen, damit ihre Helme mit deren Federn geschmückt werden können. Nichts anderes geschieht auch heute noch den edlen „unzählig nistenden" Reihern und sonstigen Schmuckvögeln, die niedergeknallt werden, um törichten Frauen zu eitelem Schmuck und Tand als Kopfputz zu dienen, Weibern, auf die wir ihrerseits das Wort „hochmütig brüstende" anwenden möchten.

Schwarzgimpelfink.

In der Tat schießen die Pygmäen die Reiher am Weiher ab, um ihre Federn zur Helmzierde zu erlangen. Vorbeifliegende Kraniche aber, die als „die Kraniche des Ibykus" bezeichnet werden, haben den schändlichen Mord gesehen und werden ihn — daher ihre Bezeichnung — rächen. Von dem nutzlosen Abschlachten der Reiher geben sie oder, sagen wir besser, gibt der Dichter durch sie folgende ergreifende Schilderung:

„Mordgeschrei und Sterbeklagen!
Ängstlich Flügelflatterschlagen!
Welch ein Ächzen, welch Gestöhn
Dringt herauf zu unsern Höhn!
Alle sind sie schon ertötet,
See von ihrem Blut gerötet;
Mißgestaltete Begierde
Raubt des Reihers edle Zierde."

Ja, so ist es: Nichts anderes als eitle Putzsucht, als mißgestaltete Begierde ist es, das die Frauen immer noch trotz aller Vorstellungen veranlaßte, sich mit dem „Reiherstutzen" zu schmücken! Wissen sie es denn immer noch nicht, daß die Reiher den schönsten Federschmuck zur hochzeitlichen Zeit anlegen und daß ihr Abschuß gerade in dieser Zeit die Jungen dem elendesten Hungertod preisgibt. Wissen sie es wirklich noch nicht, oder wollen sie es nicht wissen? Ein wahrer Ingrimm ergreift den Vogelfreund, wenn er auf Frauenhüten solchen „Schmuck" sieht, der kein Schmuck, sondern eine Schande ist. Freilich, das Gesetz schützt das Privateigentum, mag sein Erwerb auch Tausenden von unschuldigen Geschöpfen Tod und Verderben gebracht haben. Fiat justitia! Mögen Tausende und aber Tausende von grauen Reihern, Silberreihern, Seidenreihern, Kolibris, Paradies- und anderen „Schmuck"-vögeln darüber zugrunde gehen, ihre Jungen elend verhungern, ganze Arten herrlicher Gottesgeschöpfe ausgerottet werden! Was kümmern sich darum die eiteln Weiber! —

Doch mit diesem trüben und traurigen Bilde wollen wir nicht Abschied nehmen von unserm Dichter, dem wir Dank wissen für seine packenden und ergreifenden Worte.

Das schöne und tiefsinnige Gedicht „Harzreise im Winter", dessen Aufbau und Inhalt so recht die eigenartige Schönheit Goethescher Lyrik aufweist, beginnt mit dem Verse:

„Dem Geier gleich,
Der, auf schweren Morgenwolken
Mit sanftem Fittich ruhend,
Nach Beute schaut,
Schwebe mein Lied."

Wir begnügen uns damit, die Kraft und Schönheit des von dem Dichter gebrauchten Bildes auf uns wirken zu lassen, ohne danach weiter zu fragen, ob das geschaute Bild auch mit dem äußeren Auge wahrgenommen wurde. Wäre dies der Fall, so ist es natürlich kein „Geier" gewesen, den der wandernde Dichter in der Harzlandschaft sah. Denn dort kommt, so wenig wie im übrigen Deutschland, jener gewaltige Flieger nicht vor. Wir wissen auch darüber nichts, ob Goethe etwa in der Schweiz, die er dreimal in den Jahren 1775, 1779 und 1797 besuchte, gerade dieses damals wohl noch etwas häufigeren Vogels, des Bart- oder Lämmergeiers, ansichtig wurde. Vielfach wird ja, wie bekannt, die Bezeichnung „Geier" im Volke da und dort einfach für jeden großen Raubvogel angewandt. Dagegen scheint mir der Fall mit dem stolzesten aller Vögel, dem königlichen Adler, anders zu liegen. Ihn, den Beherrscher der Lüfte, hat Goethe offenbar leibhaftig in der Schweiz geschaut, wo er ja heute noch, und zu Goethes Zeit vielleicht häufiger als jetzt, vorkommt. Die prachtvolle Gegenständlichkeit, mit der Goethe in seinen Schweizer Briefen über diesen großartigen Flieger sich ausspricht, beweist dies nahezu untrüglich. Er schreibt: „Wir fühlen die Ahnung körperlicher Anlagen, auf deren Entwicklung wir in diesem Leben Verzicht tun müssen: so ist es ganz gewiß mit dem Fliegen. So wie mich sonst die Wolken schon reizten, mit ihnen fort in fremde Länder zu ziehen, wenn sie hoch über meinem Haupte hinwegzogen, so steh ich jetzt oft in Gefahr, daß sie mich von einer Felsenspitze mitnehmen, wenn sie an mir vorbeiziehen. Welche Begierde fühle ich, mich in den unendlichen Luftraum zu stürzen, über den schauerlichen Abgründen zu schweben und mich auf einen unzugänglichen Felsen niederzulassen. Mit welchem Verlangen hole ich tiefer und tiefer Atem, wenn der Adler in dunkler, blauer Tiefe unter mir, über Felsen und Wälder schwebt und in Gesellschaft eines Weibchens um den Gipfel, dem er seinen Horst und seine Jungen anvertraut hat, große Kreise in sanfter Eintracht zieht."

Diese Kraft des Ausdrucks, die Deutlichkeit und Richtigkeit der Schilderung des stolzen Vogels beweist uns, daß es Goethe vergönnt war, das einzig schöne Bild des über der Erde schwebenden, kreisenden, im Luftmeer schwimmenden Aars von Angesicht zu schauen. Und nun vernehmen wir noch, und damit möchte ich meine Darstellung schließen, in welch unvergleichlich großartiger und tiefer Weise, alles störende Beiwerk weglassend, der große Mann den von ihm geschauten Vorgang in dichterisch vollendeter Form verewigte. Die Stelle, der ein Wort der Erläuterung noch anzufügen Torheit und Vermessenheit sein würde, lautet:

„Doch ist es jedem eingeboren,
Daß sein Gefühl hinauf und vorwärts dringt,
Wenn über uns, im blauen Raum verloren,
Ihr schmetternd Lied die Lerche singt,
Wenn über schroffen Fichtenhöhen
Der Adler ausgebreitet schwebt,
Und über Flächen, über Seen
Der Kranich nach der Heimat strebt."

Etwas über Papageien.

Von Emil Kaforke, Berlin.

(Nachdruck verboten.)

1. Der brütende Arara.

„Die Araras suchen sich vorhandene Höhlungen zu Niststätten aus, die sie bei jeder Brut wieder benutzen und die meist nicht groß genug sind, den langen Schwanz des brütenden Vogels mit aufzunehmen, so daß dieser, zum Nestloche heraushängend, die Gegenwart des Insassen verrät."

Diese Schilderung, welche alle einschlägigen Werke auf Grund der Mitteilungen hervorragender Reisenden enthalten, muß nach meiner eigenen Beobachtung bei Araras in der Gefangenschaft zweifellos auf Irrtum beruhen. Daß die bestehenden Höhlungen nicht groß genug sind, um den in wagerechter Linie befindlichen langen Schwanz des brütenden Vogels mit aufzunehmen, ist nicht nur meist, sondern vielleicht immer der Fall, selbst bei den gewaltigsten Baumriesen im Hinblick auf die Höhenlage der Bruträume. Da aber jeder Höhlenbrüter, um sich und die Seinen vor den Unbilden des Wetters und den Nachstellungen der Feinde zu schützen, in seiner Wochenstube versteckt bleiben und die Eingangsöffnung im Auge behalten muß, so dürfte die mitgeteilte Wahrnehmung nicht der Wirklichkeit entsprechen.

Sicher haben die betreffenden Forscher den aus der Höhlung hängenden langen Schwanz gesehen, aber nur dann, wenn der Arara sich gerade einmal in derartiger Stellung befand oder im Schlupfloch resp. unmittelbar hinter diesem saß. Als völlig ausgeschlossen gilt, daß ein brütender Vogel stets die gleiche Stellung einnimmt und sogar, in unserem Falle, die Kontrolle über die Eingangspforte aufgibt. Es wäre direkt ein Unglück für das Tier, wenn seine schönen Schwanzfedern zum Aushängeschild dienen sollten. Nein, Mutter Natur sorgt schon für ihre Kinder.

Der brütende Arara bleibt den auf dem Waldesboden weilenden Menschen hauptsächlich unsichtbar, da er nach meiner untrüglichen Beobachtung den Schwanz an der Wandung der Niststätte einfach aufstellt und nicht aus dem Tor heraushängen läßt. Ist die Wohnung zu niedrig, dann erscheinen die Enden der Schwanzfedern leicht umgebogen.

Das Verhalten der Araras in zu engen Bruträumen zeigen genau auch die großen und kleinen Alexandersittiche. Übrigens wählen die Papageien in der Freiheit lieber etwas weniger weite als zu große Höhlungen, damit die Jungvögel durch die nächtliche Temperaturerniedrigung nicht allzusehr belästigt werden. Vielleicht ist es einem valutastarken Leser möglich, meine Berliner Studien an den Ufern des Amazonenstromes und Orinoko nachzuprüfen.

2. Mauvais genre.

„Ein Hauskunde für jedermann" ist Spemanns goldenes Buch der Sitte. In diesem Werke geben sich Graf und Gräfin Baudissin die größte Mühe, den Rohdiamanten Mensch so zu schleifen, daß er jederzeit im reinsten Lichte erstrahlt. Leider fällen die Verfasser bei der Kritik über Tierliebhaberei bezüglich der Papageien ein abfälliges Urteil, das nicht unangefochten bleiben darf.

Wir lesen: „Auch der Papagei nimmt mehr Aufmerksamkeit in Anspruch, als er verdient. Wie selten trifft man auf einen gelehrigen, gutsprechenden — und selbst für diese Künste ist das durch Mark und Bein gehende Gekreisch zu teuer bezahlt. Sich diese störenden, oft lästigen Vögel zu halten, ist etwas — — mauvais genre."

Mit diesen Worten bewiesen die gräflichen Herrschaften, daß sie eine mindestens mangelhafte Bekanntschaft mit einer hochbegabten Vogelgruppe gemacht und deren Schattenseiten leider nur kennen gelernt haben. Selbstverständlich klingen die Urwaldschreie eines Arara, einer Amazone oder gar eines Molukkenkakadu wenig angenehm, indes der Kundige weiß, daß man die störenden Gefühlsäußerungen einzelner unerzogenen oder verzogenen Individuen nicht der ganzen Sippe zur Last legen darf. Am unleidlichsten sind die verzogenen Tiere, mit denen nichts anzufangen ist, während unerzogene durch sachgemäße Behandlung sich in die zutraulichsten Stubengenossen verwandeln und gar nicht genug Aufmerksamkeit verdienen. Ich will nicht leugnen, daß ein unverwüstlicher Schreier unter allen Umständen nicht geduldet werden kann. So besaß ein äußerst liebevoller Papageienfreund einen zahmen, vielsprechenden rotrückigen Arara, der entsetzlich lärmte, wenn er sich einsam fühlte. Alle erdenklichen Mittel, den Vogel zu beruhigen, abzulenken, zu beschäftigen, versagten, ihn zu verkaufen vermochte der Besitzer nicht, und ein Quälgeist schlimmster Sorte beherrschte das Haus. Da, in einer schönen Sommernacht um die fünfte Stunde tobte Palli so furchtbar, daß sein Pfleger in höchster Erregung aus dem Bett sprang, ihn ergriff und den Kopf vom Rumpf trennte. — Kurze Zeit befand sich in meinem Heim ein allerliebster, überaus verwöhnter kleiner Gelbhaubenkakadu, der, sobald ich das Zimmer verließ, Papa, Papa schrie, bis er entweder müde oder ich wieder anwesend war. Nun ja, lästige Gesellen sind wohl vorhanden, werden aber nicht geduldet, so daß man von etwas — mauvais genre kaum reden kann.

„Wie selten trifft man auf einen gelehrigen, gutsprechenden" — im Gegenteil, alle sind gelehrig und viele gutsprechend. In meinem Arbeitszimmer befanden sich Jahr und Tag ein großer Weißhaubenkakadu, Graupapagei und Neuguinea-Edelpapagei, ohne je lästig geworden zu sein. Augenblicklich wohnen bei mir zwei Graupapageien und ein Inkakakadu, die alle „Künste" zum besten geben, sich auf Kommando ruhig verhalten, ja selbst einen Musikvortrag nicht unterbrechen. Daß ein gesunder Vogel seine Anwesenheit meldet, ist ganz klar, er soll doch unterhalten, er soll sich des Daseins freuen. Wer Papageien nach seinen Wünschen bilden will, der mag junge Tiere wählen, selbst zähmen und unterrichten. Das ist allerdings leichter gesagt als getan. Wirklich ganze Erfolge erzielen nur besondere Menschenkinder, die sich „durch die Zivilisation von der Natur nicht isolieren lassen, die mit dem lebendigen Wachstum der Natur in beständiger Berührung bleiben." Sie müssen nach dem Ausspruche des bekannten indischen Dichters Rabindranath Tagore: „Eins sein und sich fühlen mit Wolken und Winden, mit Tier und Strauch."

Zur Winterfütterung der Vögel.

Von Dr. Karl Mansfeld.

(Nachdruck verboten.)

In Heft 3 der „Gef. Welt" vom 1. Februar 1923 behandelt E. Kaforke die Fütterung der Vögel im Winter und nennt sie „weder gerecht noch zweckmäßig". Ehe man solche in Bausch und Bogen verurteilende Meinung veröffentlicht, sollte man doch zum mindesten die bisher über diese Frage erschienene Literatur berücksichtigen und sich dadurch vor allem erst einmal über die Forderungen der Verfasser unterrichten, die sich mit dieser Frage langjährig eingehend befaßt haben.



Sonnenvogel.

Eine verständige Winterfütterung bezweckt ausschließlich, den Vögeln über die Tage ungünstigster Witterung, vornehmlich während des Glatteises und Rauhreifes, hinwegzuhelfen, wenn ihnen die Aufnahme ihrer natürlichen Nahrung unmöglich wird. Es ist durch mehrfache Beobachtungen erwiesen, daß gerade unsere nützlichen Vögel, wie die Meisenarten, Kleiber, Baumläufer und Goldhähnchen, in diesen kritischen Tagen in Menge eingehen. Bei dem raschen Stoffwechsel dieser Vögel genügen nach der langen sechszehnstündigen Nacht — von abends 4 bis früh 8 Uhr — schon einige nahrungslose Stunden, sie dem Hunger erliegen zu lassen. Kaforke sagt ja selbst: „Nur da haben wir Menschen Hilfe zu leisten, wo die gefiederte Welt durch unser Eingreifen in eine Notlage geraten ist." Dieser Fall liegt aber hier vor. Im deutschen Urwald fanden sich einst genügend hohle Bäume und andere gegen die Witterung geschützte Stellen, an denen den Vögeln auch bei Rauhreif und Vereisung immer der Tisch gedeckt war. Das Kulturland mit seinen ausgedehnten Ackerflächen und seiner allein auf größtmöglichste

Holznutzung eingestellten Waldwirtschaft bietet ihnen solche Plätze aber nicht mehr oder nur ganz vereinzelt, und deshalb muß der Mensch für Ersatz sorgen.

Würden jedoch die Futterplätze nun erst errichtet, wenn die Not schon da ist, so käme die Hilfe für viele Vögel zu spät, denn die meisten würden das Futter in der kurzen Zeit gar nicht finden. Deshalb muß die Anlage schon bei milder Witterung geschehen, um die Tiere rechtzeitig an die Futterstelle zu gewöhnen. Es genügt dazu eine Handvoll Hanf schon vollkommen. Ich konnte selbst beobachten, wie die Meisen und Genossen auf den regelmäßigen täglichen Zügen durch ihr Wohngebiet auch den Futterplatz besuchten, hier aber nicht länger verweilten als auf ihren natürlichen Futterstellen, den Bäumen. Nur bei ungünstiger Witterung, wenn ihnen die Futterquellen der Natur versperrt sind, bleiben die Vögel den ganzen Tag an den Futterstellen, und dann muß ihnen natürlich noch reichlich Nahrung nachgegeben werden. Die Hauptbedingung ist deshalb für jede Winterfütterung: unbedingte Wettersicherheit. Das Futter muß den Vögeln auch bei schroffstem Witterungswechsel, bei Wirbelschnee, Wind, Regen, Glatteis unbedingt, und zwar in bester Beschaffenheit, zugänglich bleiben. Eine wirklich nutzbringende Fütterung muß ebenso wettersicheren Unterschlupf gewähren, wie er sich auch in der von der Kultur noch nicht berührten Natur, in den Urwäldern, gefunden hat. Andernfalls ist das Futter den Vögeln nur bei gutem Wetter, also nur so lange zugänglich, als sie es eigentlich nicht brauchen; nach einem Witterungswechsel vorbezeichneter Art ist es aber zerstreut, verdorben oder verdeckt, und die an diese Futterstelle gewöhnten Vögel sind nun erst recht dem Verderben preisgegeben. Deshalb die ernste, gar nicht eindringlich genug zu stellende Mahnung: Lieber gar nicht füttern, als falsch!

Auf unrichtiger Auffassung beruht die Ansicht, daß die Vögel durch eine künstliche Fütterung verwöhnt und damit von der Vertilgung der Insekten abgehalten werden. Im „Gesamten Vogelschutz" zitiert Freiherr von Berlepsch hierfür die sehr alte, aber sehr klare Ausführung Liebes: „Jedes Ersatzfutter für Insektenfresser ist nur ein Notbehelf, wie jeder Vogelwirt bestätigen wird. Auf unseren winterlichen Futterplätzen, selbst auf den luxuriös eingerichteten mit Mehlwürmern und Ameisenpuppen, finden die Vögel nur einen dürftigen Ersatz für ihr natürliches Futter in Wald, Feld und Garten; letzteres ziehen sie stets vor. Daher die Erscheinung, die dem befangenen Vogelfreunde gewöhnlich als schnöder Undank erscheint, daß nach Eintritt des Tauwetters die Futterplätze veröden."

Was der Verfasser vom Sperling sagt, kann ich dagegen nur nachdrücklich unterstützen. Es wäre aber falsch, wollte man nur die Fütterung einstellen, weil sie auch ihm zugute kommt, was sich ja auch schon durch Anwendung einer geeigneten Futtervorrichtung, der Bruhnschen Meisendose mit Antispatztrog, verhindern läßt. Im Interesse des Vogelschutzes überhaupt ist vielmehr die fast vollständige Ausrottung des Sperlings mit allen Mitteln anzustreben. Er ist ja ein unleidlicher Eindringling in Deutschlands Vogelwelt, und wo er sich breitmacht, verdrängt er mehr und mehr viele unserer heimischen Vögel. Durch regelmäßige Vernichtung der Bruten und Wegfangen im Winter läßt sich letzten Endes eine genügende Einschränkung des Sperlings erzielen.

Andererseits sollte man sich die Förderung unserer einheimischen gefiederten Freunde in jeder möglichen Weise angelegen sein lassen, und dazu trägt, wie wir gesehen haben, für unsere Standvögel in hohem Maße eine naturgemäße Winterfütterung bei. Ja, ein „intensiver Vogelschutz" — Vermehrung der Vögel über das ursprüngliche normale Maß hinaus — wie wir ihn zum erfolgreichen Schutze unserer Kulturflächen benötigen, ist ohne sie überhaupt nicht zu erreichen. Wir bezüglich der Natur so kärglich behandelten Großstädter wollen uns die Winterfütterung aber auch schon um deswillen nicht nehmen lassen, weil sie das beste Mittel ist, wenigstens etliche Vögel in unsere Umgebung zu ziehen. Jede nähere Beobachtung und Beschäftigung mit der Vogelwelt läßt uns ja die Sorgen und Lasten des Tages wenigstens zeitweise vergessen, und das ist vielleicht der schönste Gewinn, hinter dem ein wirtschaftlicher Vor- oder Nachteil weit zurücktritt.

Kleine Mitteilungen.

Frühjahrsbeobachtungen im Weizacker und anderes. Februar. 7.: Frühlingsruf der Kohlmeise. 19.: Die ersten Feldlerchen. Am 21. am Bahndamm ungefähr 20 Wacholderdrosseln verzehren die Beeren des Weißdorn. Im Erlenwäldchen ungezählte Zeisige und einige Stieglitze, Sperber stößt mehrere Male dazwischen, aber vergebens. 25.: Wunderbarer Vorfrühlingstag, am Wall die ersten Stare, Lerchen ziehen den ganzen Vormittag, Finken und Amseln üben fleißig. März. 2.: Ungefähr 30 ziehende Wildgänse, Flug Nordwest-Südost. Rotkehlchen lassen sich fleißig hören. Am Graben des Ostwalles eine Gebirgsstelze, war in mehreren Stücken den ganzen Winter zu beobachten. 20.: Am Lindenweg zirka 20 Heidelerchen. Wiesenpieper in großer Zahl. Weiße Bachstelze am 21. und Hausrotschwanz am 26. Am 30. Ausflug per Rad in die Leiner Forst. Heidelerchen in mehreren guten Sängern abgehört. Mittelspecht kann sich im Trommeln nicht genug tun. Auch war es mir an diesem Tage vergönnt, den ersten lebenden Schwarzspecht im Freien zu Gesicht zu bekommen, leider war er aber recht scheu. Für meine Pfleglinge daheim konnte ich die ersten frischen Ameisenpuppen mitnehmen. April. 2.: Weidenlaubsänger, Rohrammer, Rothänflingsweibchen trägt zu Neste. 14.: Die ersten Schwalben. Am 18. Fitissänger, volles Gelege des Rothänflings (4 Eier). Gartenrotschwanz am 23. Nachtigall und Müllerchen am 26. Ausflug per Rad in die Stadtheide am 27., Kuckuck, Trauerfliegenschnäpper, Schilfrohrsänger, braunkehliger Wiesenschmätzer, Steinschmätzer konnten an diesem Tage von mir zum erstenmal festgestellt werden. Dorngrasmücke und gelbe Bachstelze am 28. Mai. 4.: Gelbspötter und Gartenammer, flügge Jungen der Amsel. Segler am 6. und Durchzugssprosser am 7., Pirol, Gartengrasmücke, Sperbergrasmücke und Sumpfrohrsänger machten ebenfalls an diesem Tage wohl den Schluß mit der Rückkehr in ihr Nistgebiet. In meiner Gartenvoliere ist alles im vollen Gesang. Feldlerchenpärchen beschäftigt sich eifrig mit Nestbau. Heute, am 27. Juni, sitzt Weibchen auf 4 Eiern. Junge müssen am 30. schlüpfen. Ausführlicheres hierüber folgt. In meinem Garten füttern Blaumeisen ihre Jungen. Mein Junge sagt mir, daß ein starker Verwesungsgeruch dem Kasten entströmt. Wir nehmen den Kasten ab, es sind 9 Junge darin, 2 tot. Nachdem wir den Kasten gesäubert, wird er mit seinem Inhalt wieder an Ort und Stelle gebracht. Erwähnen möchte ich noch, als ich die ersten frischen Puppen mit Ameisen in meine Voliere gab, ergriff mein Buchfinkenweibchen die lebenden

Ameisen, um sich diese blitzschnell unter die Flügel zu stecken, was es damit bezweckte, ist mir bis jetzt nicht klar. Im Freien trifft man schon viele Jungvögel, Nachtigallen scheinen ja ihre Jungen glücklich groß zu bekommen. Nur die Grasmücken scheinen vom Pech verfolgt, von den 8 bis 10 Nestern, die ich wußte, ist auch nicht ein Gelege hochgekommen. Hierin habe ich unsere Nebelkrähen in Verdacht. Juni. 23.: Soeben will ich die Vögel in der Voliere füttern, morgens 6 Uhr, Feldlerchenweibchen verläßt zögernd das Nest, sehe zu meinem größten Erstaunen, daß schon sämtliche Jungen geschlüpft. Brutdauer also nur 11 Tage. Georg Rose, Pyritz i. Pom.

Sprechsaal.

(Steht den Abonnenten kostenlos zur Verfügung.)

Frage 1: Welcher Liebhaber bzw. Preisrichter ist imstande, das wortgetreue Schlagen der Schwarzplatten in dieser Zeitschrift bekanntzugeben. Wie bekannt, gibt es Doppel- und als Seltenheiten unter den Liebhabern vierschallige Schläger. Liebhaber, welche öfter Ausstellungen besuchen, werden selbst schon die Wahrnehmung gemacht haben, daß man fast in jeder Gegend, sogar jeder Sportsfreund dieser Art, die Schläge anders ausdeutet. Um nun die Sache einmal einheitlich festzulegen, würde ich es sehr begrüßen, wenn einmal die Ansichten über dieses Thema ausgetauscht würden, um so den Preisrichtern die Sache zu erleichtern und auf anderer Seite auch wieder den Pflegern dieser Art Vögel gerecht zu werden. Daß das Richten der Schwarzplatten auf Ausstellungen schwer ist, ergibt sich schon daraus, daß ein Vogel oft im Vorgesang (bzw. Dichten) mehr Punkte erhalten muß, als wenn er gleich mit seinem vollen Schlag beginnt, denn beides, wie es verlangt wird, ist nicht immer der Fall.

Ein Plattenliebhaber aus dem Erzgebirge.

Aus den Vereinen.

A. Z. Angemeldet sind die Herren Leo Harwart, Steuersekretär, Berlin-Charlottenburg, Spreestr. 55, ptr. l.; Helmut Hampe, Braunschweig, Steintorwall 11a; Walter Barth, Göttingen, Zindelstr. 6; Max Heimann, Rathenow a. H., Buschstr. 2. — Aufgenommen sind die Mitgl. Nr. 328 Carl Blüm, i. Fa. Louis Hildebrand, Spedition, Biebrich a. Rhein, Kaiserstr. 57; Mtgl. 329 Paul Wisniewsky, Leipzig-Eu., Görlitzer Str. 8; Mtgl. 330 Alfred Thieme, Oberlehrer, Leipzig, Johannisallee 5. — Mtgl. 12 (Haberlandt, Magdeburg) sucht zwecks Blutauffrischung aus erster Brut Nachzucht von Wellensittichen, Möwchen und Zebrafinken. Mtgl. 19 (Porzelt, München) gibt 0,1 Schmetterlingsfink gegen 1,0, am liebsten an Selbstabholer, tauscht Neunzig, Vogelzuchtbuch von Dr. Ruß, geb. und „Gef. Welt" Jahrg. 20, 21 und 22 gegen Neunzig, „Fremdl. Stubenvögel" 5. Aufl., geb. Mtgl. 74 (Volpert, Olching) sucht i. T. geg. junge Wellensittiche folgende Kaninchen: je 1,1 gemsf. Thüringer, Blauloh, weiße Wiener, Havanna, 1,0 blaue Wiener, 8—16 Mon. alt, aus ges. la Stämmen. Mtgl. 241 (Landwehr, Dortmund) sucht dringend 1,0 zuchtf. oder 1,1 junge Wellensittiche, vermittelt z. W. von dortiger Handlung Senegalfinken, Weber usw. Mtgl. 258 (Stümcke, Vegesack) sucht 0,1 Nymphensittich i. T. gegen junge gr. oder gelbe Wellensittiche aus Gartenvoliere. Sucht 0,1 Goldfasan oder Kücken. Mtgl. 328 (Blüm, Biebrich) gibt junge Wellensittiche und Kanarien ab und sucht 1,0 Zebrafink und Paare von Möwchen, Elsterchen, Reisfinken, Nymphen und gelbe Wellensittiche im Tausch. — Da der Beitrag für unsere Bekanntmachung für das dritte Vierteljahr an den Verlag 50000 M. beträgt, so werden die Mitglieder gebeten, bei Einsendung jeder möglichst kurz gehaltenen Veröffentlichung 1000 M. beizufügen, bis von der Herbstversammlung ein erhöhter Beitrag festgesetzt ist. A. Krabbe.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig. Nächste Sitzung Donnerstag, den 19. Juli 1923 und Donnerstag, den 2. August 1923, im Vereinslokal „Bauers Brauereirestaurant", Täubchenweg. Gäste sind willkommen.

J. A.: Joh. Birk, 1. Vors., Leipzig-Mockau, Beuthstr. 29.

Verein der Vogelliebhaber Lübeck (Ziervogelverein). Aus den letzten Vierteljahresversammlungen sei hervorgehoben: Unsere Mitgliederzahl beträgt 34 männliche und 1 weibliches Mitglied. Der Kassenbestand beträgt 6860 M. Da im Zuchtjahr 1923 eine Ausstellung beschlossen wurde, ist der Beitrag auf monatlich 200 M. festgesetzt. Den Ehrenmitgliedern Herren Rob. Steinhagen, Rud. Strehlke und Wilh. Sien wurden je 1 gemaltes Ehrendiplom übergeben. Von dem Gelde aus der Sammelbüchse wurden für die Ausstellung folgende Preise festgesetzt: In der Selbstzuchtklasse 1 Preis für die 4 besten Kanarienweibchen, 1 Preis für deutsche Waldvogelzucht, 1 Preis für ausländische Vögel, 1 Preis für den besten Bastard, 1 Preis für Farben- und Gestaltskanarien. In der Allgemeinen Klasse: 1 Preis für den besten Insektenfresser, 1 Preis für ausländische Vögel, 1 Preis für deutsche Körnerfresser. Die Vereinsehrenpreise werden erst später festgesetzt. Alle Vögel in der Selbstzuchtklasse müssen geschlossene Fußringe tragen. Als Delegierte zum Verbandstage in Hamburg wurden gewählt die Herren: Adolf Steinhagen, Rud. Strehlke und Max Wischendorf. Da die geschlossenen Wellensittichringe, die sich gut bewährt haben, alle vergriffen sind, sollen neue Offerten eingeholt werden. Herr Steinhagen hielt einen Vortrag über „Prämiierung". Die Mitglieder waren sich einig, daß auch unsere Ziervögel stets nach Zahlensystem prämiiert werden sollen. Die mitgebrachten Vögel erhielten: Zebrafinken 48 Punkte, Sperlingspapagei 52 Punkte, Stieglitz 33 Punkte, Girlitz 42 Punkte. Unser 1. Vorsitzender Herr Rud. Strehlke befindet sich seit Januar im Krankenhaus. Ferner hielt Herr Hagen einen Vortrag über „Gefiederfärbung der Vögel". Nach dem Vortrag schenkte der Redner sein neues herausgegebenes Buch der Bibliothek. Dann zeigte Herr Hagen noch einen Balg eines Goldfuchskanarien aus dem Jahre 1870 vom hiesigen Museum, welcher nur noch mit den jetzt gezüchteten Fuchskanarien den Namen gemein hat. Man sieht daraus, welchen Fortschritt die Farbenkanarienzucht durchgemacht hat. Zu dem Verbandstage am 15. Juli 1923 in Hamburg wurde den Delegierten auf den Weg gegeben, dahin wirken zu wollen, daß nach § 26 zwei Klassen in der Abteilung Ziervögel ausgeschrieben werden müssen, welches 2 Jahre nicht geschehen ist. Ferner wurde auf den beiden letzten Verbandsausstellungen der Wanderpreis nicht vergeben! Wenn solche groben Fehler vorkommen, ist es kein Wunder, daß der Verband auf morschen Pfeilern steht. — Dann wurden die ersten jungen Vögel zur Kontrolle angemeldet. — In der Sammelbüchse befanden sich 23135 M. Allen Spendern besten Dank.

Adolf Steinhagen, Brandenbaumer Landstr. 161.

Herrn E. M., Chemnitz. Um Tannenmeisen, welche nur Hanf verzehren, an ein Insektenfresserfutter zu gewöhnen, gibt man ihnen ein gutes Futtergemisch, welches mit geriebener Möhre zurechtgemacht ist. Man vermengt es mit etwas grob gequetschtem und wenig eingedrücktem Hanf sowie frischen Ameisenpuppen und getöteten und in Stücke geschnittenen Mehlwürmern. Besonders an letzteren bleiben Teile des Gemisches haften und werden mitverzehrt. Es wird dann die Menge des Hanfes immer mehr verringert, bis er ganz fortbleibt. Im Herbst und Winter kann er dann neben obigem Futter und auch Sonnenblumenkerne, Nadelholzsamen und etwas Mohn wieder gereicht werden.

Herrn W. K., Hildesheim. Sperlingspapageien sind, gut eingewöhnt, durchaus harte Vögel, welche auch niedere Wärmegrade vertragen. Gutes und abwechslungsreiches Futter müssen sie erhalten. Hirse, Spitzsamen, daneben einige Hanfkörner, Hafer und Reis in Hülsen, Obst, Beeren, frische Zweige, etwas Grünkraut, ab und zu ein Stückchen Eierbrot sind zu reichen. Die Käfiggröße genügt für den Züchtungsversuch. — Grauköpfchen sind meines Wissens nach dem Kriege bisher noch nicht eingeführt.

Papageien
Kanarienhähne
Bastarde

kauft höchstzahlend und tauscht auch auf Exoten

Willy Odenwald, Fulda.

Eigner Export und Import. [451

Käfige u. Gerätschaften

Suche: Schindler-Sprosser-käfige zu kaufen. Vorderfront ohne Tür. Schiebetür an beiden Seitenwänden. Angeb. an **J. Bahn, Düsseldorf,** Wielandstr. 21. [452

Futtermittel

Vogelfutter

für Kanarien, Waldvögel, Exoten, Papageien, Weichfresser. Anfragen nur gegen Rückporto. Liste 13 über Vogelfutter 200 M, Liste 5 über Vogelkäfige, Zuchtgeräte usw. mit etwa 400 Abbildungen 600 M. [453

W. Göpel, Leipzig,
Tröndlinring 1. Telephon 14958.

Frische Ameiseneier

versende täglich frisch, ferner **getrocknete Ameiseneier.**
H. Behrke, Braunschweig,
Sophienstraße 35. Fernruf 1281. [454

Vögel

Kanarien-Hähne

und **-Weibchen,** Papageien, Wellensittiche, weiße Mäuse, Meerschweinchen und ähnliche Tiere kaufe ständig höchstzahlend. Angebote mit Preis erbeten.
H. Behrke vorm. Mätje. Gegr. 1874.
Tierexport Braunschweig,
Sophienstr. 35. Fernruf 1281. [455

Suche 1 Zuchtpaar jap. Möwchen und 2,1 Zebrafinken. Gebe dafür Wellensittiche ab. [456
Syré, Lehrer, Viernau i. Thür.

Schamadrossel,
Goldstirnsittiche, Mondsittiche, Sperlingspapageien, Rotkopfkardinäle, Safranfinken, Schwarzkopfnonnen, Silberschnabel, Halsbandfinken, Amaranten, Astrilde, Elsterchen, Textorweber, fliegender Hund, Alligator lucius zu verkaufen.
H. Behrke, Braunschweig,
Sophienstraße 35. Fernruf 1281.
Anfr. Rückporto. [457

Gebe ab gegen getr. Ameiseneier
1,0 Rotkehlchen,
1 Jahr get., flotter Sänger, aalglatt.
Suche
1 Paar Wellensittiche.
O. Schmidt, Wittenberg (Bez. Halle),
Grünstraße 28. [458

Suche
Zuchtf. gr. Wellensittichmännchen,
gebe
ein ebensolches Weibchen ab.
Paul Bost, Berlin N 4, Chausseestraße 26. [459

Vertausche
1,0 Nachtigall, 1,0 Schwarzplättchen, beide erstkl., **1,0 Gartenrotschwanz,** aufgezogen, jung, **gegen Nützliches.** Nur an Selbstabholer.
Anton Dorn, Forchheim i. Bay.,
Alleestraße 33. [460

Suche
Jap. Möwchen und Zebrafinken, Zucht- oder Jungtiere. [461
Angebote mit Preis an **M. Lehmann, Seidenberg O.-L.,** Wilkaerstraße 12.

Brehm, Tierleben
neueste Aufl., 13 Bde, fast wie neu, zu verkaufen. Vorteilhafter Preis. [462
Demmel, München,
Johannes-Platz 20/3.

Kaufen laufend zu konkurrenzlos höchsten Preisen:

Kanarienhähne und -weibchen

sowie **Sing- und Ziervögel, Exoten aller Arten, Papageien, graue, grüne usw.**

Kühn & Muschter, Leipzig,
Promenadenstraße 29. Telephon 10226.
Käfigfabrik und Vogelhandel en gros und en detail
Import. **Export.**
Anfragen Rückporto beifügen. [463

Reform-Käfige

Zerlegbar · Leichteste Reinigung · Einfachster sicherer Transport
1 Preis beim Käfig-Wettbewerb Leipzig 1921/22 (siehe Gefiederte Welt 1920, Heft 14—16), Goldene Medaille Leipzig 1921/22
werden für alle Vogelarten hergestellt.

Ausführung: Hartholz, grünlackiert oder naturlackiert, Zinkschublade, Porzellannäpfe, Ledertuchdecke.
Keine Fabrikware, sondern beste Spezialarbeit!
Anfertigung als Kistenkäfig oder Wiener Form (halboffen) oder halboffen mit fester Rückwand. Ohne jedes Werkzeug in einer Minute zusammengestellt resp. zerlegt. Verpackung zum Selbstkostenpreis.
Fertigen auch jede Art Käfige u. Volieren n. Zeichnung od. Maßangabe.

Heck-, Flug-, Einsatz Käfige.
Ausstellungs-Käfige nach Vorschr. d. V. D. K.
Transport-Käfige, jeden Posten.

Anfragen Rückporto beifügen. Katalog gegen Einsendung von 300 M. in Briefmarken.

Schlagnetze ohne Mittelsteg
für schädliche Vögel, prima handgeknüpfte Ware. [464

Kühn & Muschter, Leipzig,
Promenadenstraße 29. Telephon 10226.
Bankkonto: Allgem. Deutsche Credit-Anstalt Zweigstelle Borna; Stadt-Girokasse Borna b. Leipzig Nr. 1506. — Postscheck.: Leipzig 92250. — Tel. 147.
Zahlreiche Anerkennungs- und Dankschreiben.

Antiquarische Bücher

van Beneden, Schmarotzer des Tierreiches. Gebd. M 900
Dürigen, Amphibien und Reptilien. Mit 12 Farbentafeln u. 47 Abbildungen Gebd. M 4500
Giebel, Naturgeschichte d. Tierreiches. 5 Bde. I. Säugetiere mit 926 Abb. II. Vögel mit 804 Abb. III. Amphibien und Fische mit 423 Abb. IV. Gliedertiere mit 764 Abb. V. Bauchtiere mit 591 Abb., tadellos erhalten. Gebd. M 30000
Geyer, Katechismus für Aquarienliebhaber. Mit 1 Farbentafel und 78 Abbildungen. (1896.) Gebd. M 900
Gowans, Nature books. No. 12, 16, 20. Mit je 60 phot. Abbildungen Kart. je M 400
Graber, Dr., Insekten. 2 Bde. mit vielen Abb. M 750

Preise und Lieferbarkeit freibleibend!
Versand erfolgt nur gegen Voreinsendung des Betrages oder unter Nachnahme. Versendungsspesen und Porto werden, wenn nicht beigefügt, durch Nachnahme erhoben. Nach dem Ausland liefern wir nur mit Valutazuschlag nach vorheriger Vereinbarung.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg
Postscheckkonto: Magdeburg 3148 **Postschließfach 148**

Tausche 1½ kg prima Hanf und ½ kg guten Mohnsamen gegen **ein Erlenzeisigpärchen** und **ein gutsingendes Rotkehlch n.** [465
S. Hill, z. Z. Warnemünde, Strandweg 11.

1,2 Kanarien und **feine weiße Zwergspitzhündin,** 1 Jahr alt, vertausche gegen **garant. Wellensittichzuchtpaare** od. **Draht-Einsatzkäfige** oder verk. use gegen Preisangebot. Jede Garantie — Ansichtssendung. [466
Lehrer **Rüßlein, Ebermannstadt** (Obfr.)

Inserate

für das am 2. August 1923 zur Ausgabe gelangende Heft 15 der Gefiederten Welt erbitten bis 27. Juli 1923 früh.
Die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit **10 Pf. Grundpreis** berechnet, der mit der vom „Börsenverein der Deutschen Buchhändler bestimmten Teuerungszahl zurzeit „15000" — zu multiplizieren ist. Auslandspreis —,10 Schweizer Franken.

Im Interesse unserer verehrl. Abonnenten bitten wir das

Abonnement auf die „Gefiederte Welt"

für Monat August rechtzeitig erneuern

zu wollen. Die Gefiederte Welt kann sowohl durch den Buchhandel als auch beim Postamt für 1200 Mk. für den Monat August bestellt werden.

Direkte Zusendung vom Verlage kann nur noch ausnahmsweise und **nur gegen vorherige Einsendung von 1700.— Mk.** für den Monat August — Postscheckkonto Magdeburg 3148 — erfolgen.
Auslandspreis für das III. Vierteljahr 2 Schweizer Franken.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg
Postfach 148

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Hermsdorf bei Berlin; für den Anzeigenteil: Franz Wunderlich, Magdeburg, Postschließfach 14
Verlag der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck: August Hopfer, Burg Bz. Mgdbg.

Jahrgang LII.
Heft 15. 2. August 1923.

Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Die Gefiederte Welt gelangt am Donnerstag nach dem 1. u. 15. jedes Monats zur Ausgabe und kostet für Monat August 3000 Mark. Einzelpreis des Heftes 1800 Mark. Auslandspreis für das Vierteljahr 2 Schweizer Franken, für das Heft 0,35 Schweizer Franken. Inserate für die folgende Nummer müssen bis spätestens Freitag früh in Händen der Verlagsbuchhandlung sein. Die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 10 Pfg. Grundpreis berechnet, der mit der vom „Börsenverein der Deutschen Buchhändler" von Zeit zu Zeit bestimmten Teuerungszahl zu multiplizieren ist. Die Teuerungszahl ist zurzeit „30 000". — Auslandspreis für die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum —,10 Schweizer Franken.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung (M. Kretschmann) in Magdeburg.

Postschließfach 148. Postscheckamt: Magdeburg 3148. Fernsprecher: 1323.

Was und wie soll man füttern!

Vortrag, gehalten im Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig.

Von J. Birk, Leipzig.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Hanf ist als ölhaltige Sämerei sehr nahrhaft und daher fettbildend, und ohne alle anderen Beigaben ausschließlich das ganze Jahr gefüttert, wie dies in Thüringen, Erzgebirge, Böhmen usw. noch geschieht, auch sehr nachteilig, viele Vögel werden augenleidend davon, er verursacht eiternde Entzündungen, Blindheit, sowie auch Melanismus (Schwarzfärbung des Gefieders). In vielen Gegenden wird dem Hanf im gequetschten Zustande durch Überbrühen mit kochendem Wasser diese üble Eigenschaft genommen und er dient so als ausschließliches Vogelfutter. So wertvoll Hanfsamen für den Vogelliebhaber in der Körner- sowie auch Weichfresserpflege ist, so muß doch auf eine richtige Verwendung betreffs der Menge geachtet werden. Vögel z. B., welche in einem ganz kalten Raum oder eventuell im Freien überwintert werden, vertragen ohne Nachteil viel größere Quantitäten Hanf als in normaler Zimmerwärme überwinternde Vögel. Um ein Beispiel zu geben, wieviel Körnerfutter bei mir ein Vogel täglich bekommt, muß ich das Quantum in Gramm angeben, doch möchte ich hierbei gleich erwähnen, um keine Irrtümer aufkommen zu lassen, daß ich in meiner Liebhaberei keinesfalls mit Futterzumessung nach Gramm arbeite, sondern die Qualität sowie Quantität des Futters nur nach dem Wohlbefinden resp. der Körperform der Vögel einstelle. Meine 12 Körnerfresser im Gesellschaftskäfig im ungeheizten, öfter auf Gefrierpunkt stehenden Zimmer erhalten bei reichlicher Bewegungsfreiheit täglich ein Gemisch von Sämereien, wie Hanf, Sommerrübsen, Glanz, Mohn, Erlen- und Distelsamen, Leinsamen sowie Wegebreitsamen, im Gewichte von reichlich bemessen 100 Gramm, bekommt also der Vogel durchschnittlich berechnet noch nicht einmal 10 Gramm. Die 12 Vogelarten, die sich in diese Futtermenge täglich teilen, enthalten auch große starkfressende Arten und setzen sich folgendermaßen zusammen: 3 Zeisige, 2 Girlitze, 2 Stieglitze, 2 Hänflinge, 1 Dompfaff sowie 1 Buchfink und 1 Grünfink. Trotzdem die große Bewegungsfreiheit sowie die äußerst niedrige Temperatur des Zimmers eine gesteigerte Nahrungsaufnahme zur Erzeugung der notwendigen Körperwärme bedingt, genügt diese knapp bemessene Futtermenge, um meine Körnerfresser normal und trotz Gefrierpunkt im Gesang zu erhalten, das Wohlbefinden gibt sich auch im natürlichen Benehmen und ebensolchen glatten Gefieder zu erkennen. Jeder Vogelliebhaber wird im Anfangsstadium seiner Liebhaberpraxis darin gefehlt haben, nur um seine Lieblinge ja nicht hungern zu lassen, wird des Guten zu viel getan, und ein wahres Sprichwort sagt treffend: „Allzuviel ist ungesund". Das beste Maß, bis zu welchem Quantum ein Vogel an Futter braucht, gibt er ja bei intensiver Beobachtung selbst kund, von der täglich verabreichten Menge darf nichts vermoscht werden, aber auch nichts übrigbleiben. So einfach sich die Pflege unserer heimischen Körnerfresser auch ansieht und in Wirklichkeit bei nötiger Sachkenntnis auch ist, so schwer ist es auch für den Laien, diese Vögel dauernd in einem normalen Körperzustand zu erhalten, meistens wird ihr Käfigalter kein allzu hohes, denn die aufgezwungene Fettsucht, d. h. Verfettung der inneren Organe, bereitet ihnen, trotzdem nur vom Guten das Beste an Futter gereicht wird, ein frühzeitiges Ende als Käfigvogel. Darum nochmals

kurz gesagt, die Vogelart, das Individuum an sich, mit dem Futter in quantitativer wie qualitativer Hinsicht in Einklang bringen, nicht mehr an Futter reichen, als unbedingt zur Erhaltung eines Vogels im natürlichen Zustande nötig ist. Dies alles gilt auch für Weichfresser, und gerade in der Pflege derselben muß der Vogelliebhaber über ein gewisses Maß von Erfahrungen in der Praxis verfügen. Wie schon gesagt, läßt sich in der Vogelpflege nicht mit nach Gramm bemessenen Futtermengen arbeiten, der scharfe Blick und das Beobachtungsvermögen sind der beste Gradmesser für die Bedürfnisse unserer gefiederten Lieblinge, speziell in der Futterfrage. In der Pflege der edlen Sänger, zu denen unsere kerbtierfressenden Stubenvögel zählen, stehen uns wiederum verschiedene Futterstoffe zur Verfügung, die uns unentbehrlich geworden sind. Ameisenpuppen und Weißwurm, diese zwei Ersatzmittel, haben sich in der Pflege der Weichfresser so glänzend bewährt, daß ihre Einführung eine allgemeine geworden ist. Bis heutigen Tages hat sich noch kein Ersatzfutterstoff gefunden, der diese beiden Hauptfuttermittel entbehrlich machen und demnach verdrängen konnte. Diesen beiden Futterstoffen wohnt eine Nährkraft inne, die vollständig genügt, um unsere Weichfresser dauernd erhalten zu können; der Liebhaber soll daher Ameisenpuppen und Weißwurm als Hauptbestandteile im Weichfuttergemisch führen, ganz gleich, um welche Vogelart es sich handelt. Die Zusammenstellung des Weichfuttergemisches besorgt, wenn möglich, der Liebhaber am besten selbst, weiß er dann doch die Qualität des Futters jederzeit nach dem Körperzustand seiner Pfleglinge zu richten. Zeigt ein Vogel Neigung zum Fettansatz, so wird nach und nach das Quantum Weißwurm verringert und dementsprechend durch Ameisenpuppen ersetzt; in entgegengesetzter Weise wird verfahren, wenn ein Vogel im Körperzustand unter Normal steht, denn Weißwurm ist das nahrhafteste Futtermittel, das uns zur Verfügung steht. Die vielen in der Fachliteratur angepriesenen Weichfuttermischungen hier anzuführen, dürfte zu weit gehen, doch muß gesagt werden, daß ziemlich alle als brauchbar bezeichnet werden können. Ein brauchbares Futtergemisch wird sich wohl jeder Liebhaber nach längerer Praxis zusammengestellt haben. Doch nicht allein an der passenden Zusammenstellung des Weichfutters allein hängt der Erfolg, denn ebenso wichtig ist, außer dem „Was man füttert" auch das „Wie man füttert" zu beachten.

Ein Vogel, das ganze Jahr mit einem gleichmäßig zusammengestellten, sich täglich in Qualität und Quantität gleichbleibenden Futtergemisch gefüttert, wird wohl seinem Pfleger wenig Freude durch Gesang bereiten, denn eine schablonenhafte Fütterung der Weichfresser ist vor allen Dingen zu verwerfen. Das Hauptfuttergemisch besteht am besten aus zwei Teilen guter geriebener Möhre, zwei Teilen Ameisenpuppen, einem Teil pulverisierten resp. gemahlenen Weißwurm, den ich dem in Wasser erweichten Weißwurm vorziehe, überhaupt sollen die meisten Bestandteile in gemahlenem Zustande vermischt werden, um die Vögel nicht wählerisch im Futter zu machen. Um das Futtergemisch zu einer weichen, flockigen, mehr trockenen als zu feuchten Masse zu machen, nimmt man geriebenen Biskuit oder Zwieback als Zusatz, wodurch überflüssige Feuchtigkeit aufgesaugt wird. Ein derartiges Futtergemisch eignet sich für die häufigst als Stubenvögel gehaltenen Weichfresser, wie Nachtigall, Rot- und Blaukehlchen, sämtliche Grasmückenarten, Gelbspötter, usw. als Hauptfutter. Um nun jeder Vogelart in ihrer natürlichen Veranlagung gerecht zu werden, kommen nun nur noch die als Leckerbissen und als Abwechslung geltenden Beigaben in Betracht, die wir als Würze des Futtergemisches betrachten sollen. (Fortsetzung folgt.)

Aus meiner Vogelstube.

Von S. Lichtenstaedt.

(Nachdruck verboten.)

Ein Dezembermorgen, früh halb sechs Uhr. Stockdunkle Nacht. Der Wecker vor meinem Bette klingelt und mahnt zum Aufstehen. Wäre ich nicht glücklicher Besitzer einer Vogelstube von zirka 60 Sittichen, so könnte ich noch ein gutes Stündchen im warmen Bette zubringen. So aber mahnt die Pflicht. Also heraus. Ein Blick auf mein Freithermometer vor dem Fenster zeigt mir — 14 Grad Celsius. „Arme Vögel", denke ich unwillkürlich in Gedanken an meine Wellensittiche draußen in der Freivoliere. Vier Junge habe ich vor drei Tagen in einem Kasten konstatiert, nackt, höchstens vier Tage alt. Arme Vögel, ist der Mensch nicht grausam und ein Tierquäler erster Klasse. Diese Gedanken, freundlicher Leser, halten aber nur so lange an, bis ich vor meiner Freivoliere stehe, denn meine Australier scheinen sich wenig um die Kälte zu kümmern und verzehren als besonderen Leckerbissen Eisstückchen, wie ich häufig genug beobachten konnte. Doch davon weiter unten.

Sechs Uhr fünfzehn stehe ich in meinem Vogelzimmer und drehe das elektrische Licht an. Kaum eine Minute später beginnt das Zwitschern, Piepen, Kreischen und Flattern in allen Volieren. Ein rascher Blick überzeugt mich, daß alles munter, kein kranker oder gar toter Vogel vorhanden ist.

Zuerst begrüßen mich meine beiden Mohrenköpfe und meine rosenköpfigen Zwergpapageien. Erstere wissen, daß ihnen während der Fütterung die goldene Freiheit winkt, denn kaum öffne ich die Tür ihrer Voliere, um die Futternäpfe zu holen, so zwängen sie sich blitzschnell heraus und sitzen entweder auf meiner Schulter oder auf ihrem Käfig. Ich weiß, sie sind Brot gewöhnt, denn kaum stelle ich die gefüllten Näpfe wieder herein, so sind auch meine Mohrenköpfe wieder da und begehren Einlaß zu den Fleischtöpfen Ägyptens.

Die Morgenfütterung sollte jeder Vogelliebhaber unbedingt einhalten. Der Vogel ist gewohnt, morgens seine Hauptmahlzeit einzunehmen, denn die lange Nacht macht Appetit. In der Freiheit fliegt der Vogel natürlicherweise morgens zum Futterplatz und zur Tränke, im Käfig verlangt er auch morgens einen gefüllten Napf. Jeder Liebhaber sollte dem Rechnung tragen. Auch ist es ein angenehmes Gefühl, zu wissen, daß man seine Lieblinge versorgt hat und nun seinen Berufsgeschäften ungestört nachgehen kann, anstatt immer denken zu müssen: Beeile dich, du mußt noch füttern.

Viele Liebhaber glauben nun richtig zu füttern und füttern doch falsch. Ich meine dies vor allen Dingen in bezug auf die mehr oder minder zuträglichen Futtersorten. Für große Papageien halte ich beispielsweise Hanf, Hafer und Sonnenblumenkerne in größeren Mengen für schädlich, Spitz, Hirse und Obst für sehr zuträglich. Mein Jako frißt die ersteren am liebsten, bekommt diese aber nur in ganz kleinen Portionen aufs Futter, sonst nur Spitz, Obst und ab und zu eine Wal- oder Haselnuß. Nun frißt er erst die Sonnenblumenkerne und den Hanf fort und — streikt. Am Nachmittag bettelt er unaufhörlich nach neuem Futter, jedoch vergebens. Am nächsten Tage ist auch der Spitz hübsch säuberlich aufgefressen. Ähnlich verfahre ich nun mit meinen anderen Sittichen. Alle Sämereien, welche ich nicht für zuträglich halte, gibt es nur knapp. Erst wenn meine Wellensittiche Spitz und Glanz völlig ausgefressen haben, gibt es wieder etwas Hafer, letzteren aber nur sparsam. Es ist z. B. unglaublich, was meine Rosenköpfchen für Futterverschwender sind. Der ganze Boden unter dem Futternapf ist voll herausgeschleudertem Futter, so daß ich glaube, daß den Tierchen irgend etwas zur Ernährung fehlt. Nicht weit hinter ihnen stehen die Sperlingspapageien. Jedes Maiskorn wird von diesen angebissen und fortgeworfen, bei den teuren Futterpreisen eine kostspielige Angewohnheit.

Sperlingspapagei.

Die morgendliche Fütterung meiner Lieblinge dauert knapp 30 Minuten. Dann sind alle Näpfe gefüllt, das Wasser erneuert, und ein allgemeines Schmausen, Kreischen und Zanken beginnt. Jeden Morgen gibt es Apfel, das Leib- und Magenessen meiner Sittiche, allwöchentlich einmal — nicht öfter — Vogelmiere. Ist die Fütterung beendet, wird das Licht abgedreht, und eine Stunde später, wenn die Sonne erscheint, beginnt das Leben von neuem.

Wenn junge Wellensittiche in den Kästen sind, wird an der Fütterung wenig oder gar nichts geändert. Aufzuchtfutter gebe ich nicht, höchstens ab und zu ein paar trockene und im Sommer frische Ameisenpuppen, und noch nie ist mir ein Vogel an mangelnder Nahrung eingegangen. Sehr leicht verhungern junge Wellensittiche aber, wenn man an Winterabenden nicht mindestens eine Stunde lang die Stube erhellt. Bei mir wird stets von 7—8 Uhr nochmals das Licht angedreht, und sofort beginnt das Kreischen und Piepen der Jungen nach Futter und das Füttern der Alten. Die Stube muß, was ich ausdrücklich betonen will, hell erleuchtet sein, nicht nur durch eine Kerze oder matte Petroleumlampe. Im Dämmerlicht füttern die Vögel selten oder gar nicht, bei heller Beleuchtung jedoch sofort. Hat man brütende Weibchen, so muß man vor Löschen des Lichtes darauf achten, daß diese ihr Gelege wieder besetzt haben; daß angebrütete Eier verloren sind, wenn sie eine Nacht nicht bedeckt sind, glaube ich übrigens nicht.

Ich bringe meine Wellensittiche übrigens leicht in die Kästen, indem ich vor Dunkelmachen an den Volieren mit einem Tuche winke. Die erschreckten Weibchen suchen dann Hals über Kopf ihre Kasten auf.

Am Nachmittag vor Dunkelwerden werden die Freivolieren versorgt. Kälte, wie schon erwähnt, scheint die Wellensittiche nicht zu stören. Sehr häufig standen sie an dem gefrorenen Wassernapf und hackten lustig in die Eisstücke. Vor Sturm und Schnee sind sie in meinen Volieren geschützt. Man sollte im Winter nie Wellensittiche, welche an die äußere Frosttemperatur gewöhnt sind, ins Zimmer nehmen, auch nicht ins ungeheizte. Einem befreundeten Liebhaber ließ ich auf dessen dringende Bitten ein Pärchen aus meiner Voliere ab, und brachte dieser die Vögel ins ungeheizte Zimmer. Nach acht Tagen waren beide Vögel tot, sie konnten anscheinend den Übergang nicht vertragen. Natürlich wird auch kein vernünftiger Mensch im Winter Zimmerwellensittiche ins Freie bringen. Wer diese Sittiche im Freien überwintern will, muß sie im Frühling oder anfangs des Sommers ins Freie bringen, damit sie sich allmählich an frische Luft und Kälte gewöhnen. Im strengen Winter nisten Wellensittiche verhältnismäßig selten im Freien, im Frühjahr dagegen entwickeln sie dann eine unheimliche Fruchtbarkeit.

Solche Freivögel sind prächtig befiederte, harte Geschöpfe und werden nicht von jedem bißchen Luftzug umgeworfen.

Eine geradezu unheimliche Fruchtbarkeit entwickeln meine gelben Wellensittiche. Alle drei Weibchen haben augenblicklich Eier und Junge, während ich vor kurzer Zeit schon zirka 20 Junge von ihnen abgegeben habe. Nach dieser Brut aber ist Schluß. Dann werden die Paare auf 6—8 Wochen getrennt, um erst wieder im Frühling der Liebe goldne Zeit durchzukosten.

(Fortsetzung folgt.)

Meine Vögel und deren Behausung.

Von Chas. Neidhardt, San Jose, Cal.

(Nachdruck verboten.)

Während der Wintermonate befindet sich ein Teil meiner Vögel auf der eingeschlossenen Veranda, 1,95 × 3,60 m. Zwei Fenster, 90 × 90 cm, befinden sich an der Ostseite, drei Fenster an der Südseite und ein Fenster und eine Tür mit Glasscheibe an der Westseite. Infolgedessen ist ein Überfluß an Licht und Sonnenschein vorhanden. Die Veranda schließt sich der Küche an und wird auch von da erwärmt; die Verbindungstür ist Tag und Nacht offen, so daß bei Tag eine Mindesttemperatur von 56 Grad Fahrenheit und bei Nacht eine solche von 40 Grad herrscht. Die Temperatur im Freien ist sehr gemäßigt und sinkt vom November bis April manchmal 1—2 Grad unter den Gefrierpunkt, abwechselnd mit wunderschönem Wetter, Regen oder Nebel. Am unangenehmsten ist für die Vögel und auch für andere Lebewesen dieses naßkalte, neblige Wetter, doch bekommen wir zum Glück nur wenig davon zu kosten.

Augenblicklich befinden sich folgende Vögel gekäfigt: eine Schamadrossel, ein Stieglitz, Zeisig, Grünling, zwei Paar Tigerfinken, eine Papageiamandine, ein jap. Möwchen, eine jap. Meise und etwa ein Dutzend Kanarien. Die Kanarien brachte ich im November aus der Voliere in das Haus, um sie für den Verkauf an den Käfig zu gewöhnen. Stieglitz, Zeisig und Grünling waren erst kürzlich importiert, ebenso die anderen Vögel, mit Ausnahme der Schama und eines Tigerfinken, der den Sommer in der Freivoliere zubrachte, die Schamadrossel ist seit letztem Frühjahr in meinem Besitz. Diese Schama ist einer der besten Vögel, die ich je gehabt habe. Der Käfig ist 1,20 m lang, 60 cm hoch und 60 cm tief, $^3/_4$ zölliges Drahtgeflecht und hat als Sitzstange einen Weidenast mit den Seitenzweigen. Die Schama mauserte im Juli August und befindet sich in tadellosem Gefieder. Als Futter reiche ich getrocknete Ameiseneier, gekochtes oder rohes Fleisch und zirka 12 Mehlwürmer pro Tag, außerdem Kellerasseln, Schnecken, Schmetterlinge und fast alle möglichen Kerbtiere und Insekten, und es ist erstaunlich, welche Unmassen der Vogel vertilgen kann. Als Grünfutter habe ich nun vieles versucht und fand heraus, daß sie alles verschmähte, ausgenommen Anacharis, und das kam ganz durch Zufall. In meinem geheizten Aquarium habe ich Anacharis; da es zu üppig wuchs, dünnte ich es aus und warf bei der Gelegenheit ein Stück in den Käfig. Im Nu war die Schama hinterher, brach es in Stücke und verzehrte es mit größtem Wohlbehagen. An Obststückchen pickt sie, ohne etwas davon zu fressen. Baden tut sie ab und zu, sie ist sehr lebhaft und scheint von kühlem Wetter nicht beeinflußt zu sein, so daß ich sie vielleicht im Mai in eine Freivoliere tun werde. Leider ist der Nachteil, daß sie allein gehalten werden muß, da sie sofort die anderen Vögel befehden würde, wie sie es durch ihr Benehmen im Käfig beweist, indem sie versuchte, einen Kanarienvogel, der frei im Zimmer flog, in ihren Käfig zu ziehen. Er hatte sich an das Gitter gesetzt, und sie packte ihn bei einem Flügel, ziehend aus Leibeskräften. Auch hinter Vogeleiern ist sie her; unfruchtbare Eier von Zebrafinken, die ich ihr gab, pickte sie, doch genoß sie nur wenig vom Inhalt. Im Gesang ist sie unermüdlich, sie singt, seit sie in meinem Besitz ist — vor, während und nach der Mauser —, im vollen Gesang ist sie aber nur im Frühjahr und Anfang Sommer. Der Gesang ist sehr mannigfaltig, absolut keine Regelmäßigkeit, alles Mögliche, aber wenig Unschönes. Während die Leistungen staunenswert sind, kann ich den Gesang nicht mit wundervoll bezeichnen, doch denke ich, daß im Freien sich der Gesang bedeutend besser anhören würde. Der Vogel ist sehr zutraulich, nimmt die Mehlwürmer vom Finger, fliegt ruhig im Zimmer und sucht mit Vorliebe nach Spinnen. Der Preis im Wiederverkauf war in den letzten Jahren 25 $ das Stück, fiel letztes Frühjahr auf 15 $, sind gegenwärtig (Dezember) hier nicht im Handel, werden aber von New-York mit 14 $ das Stück en gros offeriert. Der Unterschied in den Preisen der Importeure und der Händler ist gewöhnlich 100—200 %. Der Stieglitz ist ein sehr schöner Vogel, aber sehr wild, es vergingen drei Wochen, ehe er sang. Der Zeisig ist zahm und singt. Der Grünling, ein stattlicher Kerl, hat noch keinen Laut von sich gegeben. Diese drei Herren werden im März in die Freivoliere befördert. Der Preis für Stieglitz war 5 $, für Grünling und Zeisig 3.50 $ das Stück. Die Preise für Futter sind auch gesalzen: Blaumohn 30 c und Distel 35 c das Pfund = 450 Gramm. — Die Tigerfinken, Möwchen, Papageiamandine und Meise sind in einem Käfig. Die Finken sind schön ausgefärbt; es sind wirklich reizende Vögel und ihr kurzer Gesang klingt ganz schön. Die Papageiamandine ist ein kräftiger Vogel und weniger empfindlich als die Tigerfinken, von denen besonders die Weibchen sehr leicht eingehen. Bei den Importeuren kann man Hunderte der kleinen Finken in einem Käfig sehen, wo sie drei bis vier hoch dichtgedrängt in Reihen sitzen, um sich warmzuhalten. Interessant ist die jap. Meise, immer beschäftigt, die Sonnenblumenkerne oder den Glanz aufzuhacken, sogar aus den Ameiseneiern wird das Innere herausgeholt. Diese Meise scheint ein Vogel zu sein, der ganz gut im Freien überwintern kann, er wird im März an die frische Luft befördert, der Rest im April. Der Preis für die jap. Meise und die Amandine war 3.50 $ das Stück, für das Möwchen 2 $, für die Tigerfinken 2 $ das Paar. Füttere mit Hirse $6^1/_4$ c, Glanz 7 c, Sonnenblumenkernen $12^1/_2$ c, Ameiseneiern 1.10 $, Hanf $8^1/_2$ c und Raps (soll importiert sein) 20 c das Pfund = 450 Gramm. Der Preis für Hirse und Glanz ist bei Abnahme von 100 Pfund, für Ameiseneier direkt vom Engroshändler.

Betreffs der Kanarien möchte ich erwähnen, daß das Geschäft im allgemeinen langsam war. Für gewöhnliche Kanarien wurden im Wiederverkauf 4 bis 6 $ verlangt, für importierte Roller 10 $. Der Engrospreis für importierte Roller war in New York 42 $ das Dutzend, für Weibchen 18 $ das Dutzend. Franko San Jose kamen die Hähnchen auf zirka 4 $ das Stück zu stehen, Verkaufspreis 10 $. Es ist daher nur natürlich, daß sich die hiesigen Händler

keine Mühe geben, die gewöhnlichen Kanarien zu verkaufen, da sie ja an einem Roller soviel verdienen wie an zwei der anderen Sorte. Roller (importierte) wurden zwei Jahre zurück mit 25 $ das Stück verkauft, letztes Jahr mit 17.50 $ und dieses Jahr trotz des Zolles von 50 c das Stück 10 $. Diese 50 c Zoll sollten nicht viel Unterschied machen, tun es aber doch. Kostet der Vogel dem Importeur 50 c mehr, so schlägt er 1 $ auf den Verkaufspreis und der Händler noch 1 $, so daß die ursprünglichen 50 c Zoll den schließlichen Verkaufspreis um 2 $ erhöhen. Kleine Ursachen, große Wirkungen. Es ist überhaupt sehr überraschend, wenn man die hiesigen Preise mit den Preisen in England vergleicht, zumal in den meisten Fällen die ersten Einkaufspreise dieselben und in vielen Fällen die Transportkosten zugunsten der Amerikaner sind. Die Preise in England sind in den meisten Fällen bedeutend niedriger als hier. Grüne und gelbe Wellensittiche in England 12/6 s resp. 16/6 per Paar, in San Jose, Cal. 5 $ resp. 12 $ das Paar. Beide Sorten sollen von Australien importiert sein. Rechnet man den Schilling mit .20 c, so kann man sich einen Begriff machen. Der Preisunterschied in afrikanischen Vögeln ist beinahe der fünffache. Graupapageien wurden mit 125 $ offeriert, Paradieswitwen mit 10 $ das Paar, in England 15 s, Napoleonsweber 15 $ per Paar, in England 8/6 s. Europäische Vögel werden natürlich in England billiger als in Amerika verkauft, aber auch hier sind die Preisunterschiede sehr interessant. Detailpreis in Engand für Stieglitz 4 s, Zeisig 3 s, in San Jose 5 resp. 3.50 $, in New York Engrospreis zirka 1.75 $. Liederpfeifende Dompfaffen in England 65 s, in Californien nicht unter 25 $, in New York en gros 15 $. (deutsche Firma). Importierte deutsche Roller in England 10 s, in Kalifornien 10 $. Junge Doppelgelbköpfe (Papageien) kauft man hier für 15 $ das Stück; eine amerikanische Firma importiert dieselben von Mexiko. Es sind sehr junge Vögel und schreien stets nach Futter (eingeweichtes Brot), doch gewöhnen sie sich schnell an Sonnenblumenkerne. Diese Tiere werden natürlich sehr zahm, und ich kann mit dem meinigen tun, was ich will. Ich habe denselben seit zirka einem halben Jahr, und fängt derselbe jetzt an, sprechen zu lernen. Er mausert sich jetzt und bringt mehr gelbe Federn am Kopf, im Anfang war nur die Stirn gelb; auch der Schnabel, der anfangs ein paar dunkle Flecke zeigte, ist jetzt ganz hell. Ich besaß auch eine weißstirnige Amazone von Nicaragua, ein sehr schöner Vogel, bedeutend kleiner als der Gelbkopf. Er sprach auch einige Worte, aber nur, wenn er an meinen Mahlzeiten teilnehmen wollte. Trotzdem er fingerzahm war, ließ er sich sonst nicht anrühren, sondern biß sofort. Ich mußte ihn schließlich aufgeben, da er ein unverbesserlicher Schreier war und mir sonst den Gelbkopf verdorben hätte.

Doppelgelbkopf.

Ornithologische Beobachtungen auf einer Eisenbahnfahrt.

Von Hans Passig.

(Nachdruck verboten.)

Die Beobachtung der Vögel auf Eisenbahnfahrten ist meistens unsicher und mit Schwierigkeiten verbunden. Reist man mit einem Schnell-(D)-Zuge, so wird das Auge wohl kaum jemals den meistens flüchtenden Vogel so lange festhalten, daß er mit Bestimmtheit erkannt werden kann. Verweist man auf die Aufenthaltszeit auf den Bahnhöfen, so gibt es auf den gewöhnlich größeren Halte- und Knotenpunkten doch von der Vogelwelt nur wenig zu sehen. Auch das ein- und aussteigende Reisepublikum stört nur zu leicht unsere Beobachtungen, die sich jedoch günstiger gestalten bei Benutzung von Personen- (sogenannten Bummel-)Zügen, obwohl es auch hier noch scharfer Anspannung von Auge und Ohr bedarf, will man auch nur einige verwendbare Aufzeichnungen ins Notizbuch bringen.

Ich unterziehe viele Seiten meines Tagebuches einer Durchsicht der Eintragungen in Eisenbahnzügen, finde aber den Stoff durchweg so dürftig, daß es sich nicht verlohnt, hier etwas darüber mitzuteilen. Nur die Angaben auf einem Blatt aus dem Jahre 1910 scheinen mir interessant genug zu sein, sie weiter auszubauen und dann hier zu veröffentlichen.

Es ist an einem freundlichen Maitage, morgens zwischen 5 und 6 Uhr, als ich in den bereitstehenden Zug einsteige, der mich nach der Großstadt bringen soll. Mir wird ein Wagenabteil zur alleinigen Benutzung überlassen, damit ich nach Belieben ungeniert rechts und links Ausschau halten kann. In der Bahnhofshalle zeigt sich schon rege Vogeltätigkeit. Mehl- und Rauchschwalben durchflattern die Halle von einem bis zum andern Ende, Sperlinge und Stare sitzen teils auf, teils unter Dach-

überständen, und auf einer Stellwerksbude „schwanzwippt" ein Hausrotschwanz. Ein grauer Fliegenschnäpper kommt blitzschnell — man sieht nicht, woher — und holt ein kleines beflügeltes Wesen von dem Dache des Erfrischungsraumes herunter. Mittlerweile ist die Zeit der Abfahrt herangekommen. Der behäbige Stationsleiter gibt das Abfahrtszeichen, das Zugbegleitungspersonal nimmt seine Plätze ein, und unter dem Geschimpfe der Spatzen und dem Zischen und Pfeifen der Stare rollt langsam der Zug aus der Halle hinaus, draußen empfangen von den Turmschwalben, die ihn kreischend wie toll übersegeln. Bei der Überfahrt über den Stepnitzkanal fliegt eine Elster auf und nimmt, nicht allzuweit vom Bahnkörper entfernt, Platz auf einer hohen Ulme. Nun kommt das Wiesental der Stepnitz und der Karthane, teils noch unter Wasser. Viele Rabenkrähen, einzeln und auch in kleinen Trupps, suchen hier ihr Frühstück. Kiebitze „gaukeln" über den seichten Wasserflächen oder laufen auf der Wiese nahrungsuchend umher. Bedächtig und majestätisch schreitet auch ein Storch über die weiten Grasflächen und spießt Frösche. Nahe an der Eisenbahn fliegen mehrere Stockenten auf und lassen sich auf der überschwemmten Wiese wieder nieder; wie ich sehe, schwimmen dort schon einige Krickenten und Teichhühner. Auf dem Graben neben der Eisenbahn, von Weidenbusch und Schilf umgeben, schwimmt ein kleiner Taucher. Nicht weit davon auf einem Inselchen im Graben, doch so versteckt, daß man es nur von oben im Eisenbahnwagen sieht, sitzt das Weibchen auf dem Neste. Eine Anzahl Haustauben überfliegen den Zug und läßt sich auf einem Dache im Dorfe Kuhblank nieder, wo auf einer Eiche eine Elster hockt. Das Tempo des Zuges verlangsamt, und die Haltestelle Kuhblank ist erreicht. Auf dem Dache des kleinen Dienstgebäudes stolziert eine Bachstelze umher. Eine Feldlerche schwingt sich von einem Roggenacker singend in die Luft, läßt sich aber gleich wieder fast senkrecht herab. Der Zug rollt weiter. Da springt nicht weit vom Bahndamm entfernt ein Hase auf und sucht so rasch wie möglich recht weit von dem pustenden Ungetüm fortzukommen. Im Kiefernwalde sitzt auf einem starken Aste eine Wildtaube und sonnt sich. Über einer Waldblöße rüttelt ein Turmfalke. Zwei Vögel steigen an verschiedenen Stellen des Waldsaumes auf, den einen erkenne ich deutlich als Baumpieper, der andere scheint eine Heidelerche zu sein. Ein Zug aus der meiner Fahrt entgegengesetzten Richtung versperrt mir kurze Zeit die Aussicht, und als er vorbei ist, befinden wir uns in Wilsnack. Hier pfeifen die Spatzen auch was von den Dächern, wie überall, wo sie zu Hause sind, und die Stare auf dem Dache des Bahnhofsgebäudes und in den Bäumen nebenan schwatzen ein entsetzliches Kauderwelsch. Ein Waldrotschwanz tänzelt auf einem Güterwagen. Weiter geht die Fahrt auf dem Eisenwege. Undeutlich höre ich noch, wie ein Buchfink auf dem Friedhofe schlägt, auch vernehme ich den Gesang des Fitis beim nahen Schützenhause im Walde. Dann übertönt das Fahrgeräusch des Zuges wieder jeden von außerhalb kommenden Laut. Auf hohem Gesträuch unfern der Bahn sitzt ein Goldammer und scheint gerade singen zu wollen, erschrickt aber und fliegt schnell davon. Auf einer abgeholzten Fläche hoppeln mehrere Kaninchen umher, eines sitzt auf den Hinterbeinen und bewundert wahrscheinlich den vorbeifahrenden Zug. Über den gelben Sand läuft ein, wie ich annehme, pieperartiger Vogel, eine Lerche ist es nicht.

Nach wenigen Minuten ist Station Glöwen schon da. Was ich hier zuerst vernehme, sind zirpende Laute junger Spatzen, noch im Neste. Hausschwalben in größerer Anzahl umfliegen die Stationsgebäude. In den Tannen schlägt ein Buchfink. Auf fortgesetzter Fahrt erkenne ich einen Mäusebussard, der einem Gehölze zufliegt, gefolgt und belästigt von einigen Krähen. Schnell schwindet die Zeit. Schon wieder wird Halt gemacht, und ich lese: „Breddin". Ich höre einen Goldammer singen, ein Buchfink schlägt im Garten des Stationsvorstehers und ein Bluthänfling schaukelt sich auf der Telegraphenleitung. Das Dampfroß ruht nicht lange und schleppt uns gleich weiter. Ich gewahre einen jagenden Sperber und einen flüchtenden Grünfinken. In einem Garten ist eine riesige Vogelscheuche aufgebaut, scheinbar ohne Nutzen und Erfolg, denn auf ihren Armen und auf ihrem schönen Hute tummeln sich etwa sechs Feldsperlinge. Nur einen Augenblick gewinnt man Zeit zu horchen auf der Haltestelle Stüdenitz, dann geht es weiter. Ein Grauammer und mehrere Rauchschwalben wiegen sich auf den Leitungen an der Bahn. Nicht mit Bestimmtheit vermag ich die Art zu erkennen, doch scheinen es Erdschwalben zu sein, die in einem Wegetunnel umherflattern. Hoch, auf einem Dornstrauche neben einer Viehweide thront ein lebhaft gefärbter Vogel, der Gestalt nach muß es ein Rotrückenwürger sein. Zwei kleinere Vögel kämpfen im Fluge hartnäckig miteinander. Ihre Art vermag ich nicht genau zu erkennen, es scheinen aber Bachstelzen zu sein. Während ich die beiden Kämpfer schon nicht mehr sehe, über diese Beobachtung jedoch noch nachdenke, ist der Zug schon in Zernitz angelangt, und beinahe vergesse ich nach dem Vogelleben auch hier auszuspähen, doch einige singende Hänflinge im Garten nicht weit ab vom Stationsgebäude errinnern mich daran, und da sehe ich auch noch eine Kohlmeise und höre den Gesang der Dorngrasmücke, zudem bemerke ich die Anwesenheit von nicht wenigen Spatzen, alten und im Neste zirpenden Jungen, kann in der Eile aber nicht herausbekommen, an welchem Gebäude sie wohnen, denn das Räderwerk setzt sich wieder in Bewegung, und andere Gegenstände schieben sich vor das beobachtende Auge. An seinen Bewegungen erkenne ich einen Gartenrotschwanz, der sich von einem Zaune herab auf seine Beute stürzt. Auf starkem Halm im Felde sitzt ein Braunkehlchen. Mehrere Feldlerchen beleben die Luft, welche auch von vielen Hausschwalben durchsegelt wird. (Schluß folgt.)

Kleine Mitteilungen.

Insektenfang. Angeregt durch den Artikel des Herrn Troschütz, der das Fangen von Insekten mittels des Schleppnetzes schildert, will ich darauf aufmerksam machen, daß es

für die Vogelpfleger, die einen Garten haben, und sei er noch so klein, vielerlei in diesem zu fangen gibt, ganz abgesehen von all dem Grünzeug, das der Garten für die Körnerfresser fast zu jeder Jahreszeit bietet. Daß man Raupen usw. von den Nutzgewächsen ablest und verfüttert, ist ja selbstverständlich. Kohlweißlingsraupen werden jedoch von fast keinem Vogel gefressen, wohl aber deren Puppen und Schmetterlinge. Ich will in diesem Jahre die von den Kohlpflanzen abgelesenen Kohlweißlingsraupen in einem Behälter zum Verpuppen bringen und die später schlüpfenden Schmetterlinge an Rotkehlchen, Grasmücken usw. verfüttern. In kleinen Strohbündchen, die man unter Beerensträucher usw stellt, sammeln sich allerlei Insekten, besonders Kellerasseln und Ohrenkneifer, durch Ausschütteln sind sie leicht zu fangen und werden gleich getötet, größerer Vorrat evtl. getrocknet. Im Garten zeigen sich beim Hacken stets Kolonien der kleinen Rasenameisenarten. Ich stülpe nun über jede derartige Kolonie einen Blumentopf, in den hinein die Ameisen kleine Hügel bauen. Die Puppen liegen meist obenauf, werden mit einem kleinen Handspaten abgehoben, mitsamt Erde und Ameisen in einen Blumenuntersetzer getan und dieser wieder in einen mit Wasser zur Hälfte gefüllten tiefen Teller oder dergleichen. Dieser Teller kommt in die Voliere resp. in den Käfig. Die Ameisen können durch das Wasser hindurch die Puppen nicht verschleppen, und alle Vögel, auch die kleinsten Prachtfinken, nehmen die kleinen Puppen gern, während die großen Puppen der Waldameise zur Aufzucht der jungen Prachtfinken oft verschmäht werden. Die Blumentöpfe — ich habe etwa 50 in Betrieb — liefern aber auch noch andere Beute. Namentlich in nassen Jahren gibt es im Rasen usw. unglaubliche Mengen der Nacktschnecken. Ich finde unter den Töpfen täglich mindestens 20 Stück, die von Drosseln, Rotkehlchen usw. sehr gern gefressen werden. Ich wälze sie tüchtig in Kleie und vermenge sie unter das Insektenfutter. Im Frühjahr fand ich beim Graben Regenwürmer in so ungeheuren Massen, daß meine Hühner sie nicht alle vertilgen konnten. Ich habe sie durch kochendes Wasser getötet und dann getrocknet. Wie Herr v. Boxberger angibt, schrote ich alle getrockneten Insekten, z. B. Regenwürmer, Ameisenpuppen, Weißwurm, und halte diese Methode für gut. Adolf Voigt, Jena.

Aus den Vereinen.

A. Z. Aufgenommen sind die Mtgl. 331 Leo Harwart, Steuersekretär, Berlin-Charlottenburg, Spreestr. 55, ptr. l.; Mtgl. 332 Helmut Hampe, Braunschweig, Steintorwall 11a; Mtgl. 333 Walter Barth, Göttingen, Zindelstr. 6; Mtgl. 334 Max Heimann, Rathenow a H., Buschstr. 2. — Mtgl. 12 (Haberlandt, Magdeburg) sucht zwecks Blutauffrischung junge Zebrafinken, Möwchen und Wellensittiche, einzeln oder paarweise. Mtgl. 282 (Schiebe, Liegnitz) tauscht vorj. Ia Kanarienhahn gegen Exoten beliebiger Art. — Der Ausschuß hat beschlossen: 1. Die Aufnahmegebühr beträgt ab 1. Juli einschl. Jahresbeitrag 6000 M., Ausland doppelt, hochvalutarisches Ausland nach Vereinbarung. 2. Eine Farbentafel zum Jahrbuch nur dann beizugeben, wenn die hohen Kosten durch freiwillige Beiträge aufgebracht werden. Herr Neunzig hat sich zur Anfertigung bereit erklärt. Die bereits angekündigte Erhebung von 1000 M. Unkostenzuschuß von jedem Mitglied für eine Veröffentlichung zu erheben. 4. Die diesjährige beschließende Versammlung findet im Herbst in Hamburg statt. Einladungen hierzu werden rechtzeitig ergehen. — Ich bitte nochmals, literarische Beiträge zur Fortführung der Zuchtberichte im Jahrbuch rechtzeitig anzumelden, ebenso die zur Reproduktion geeignete Aufnahme einer Vogelstube oder Voliere zur Verfügung zu stellen. Die Unkosten für die Herstellung des Bildstockes würde eines unserer ausländischen Mitglieder sicher gerne übernehmen. — Der Anregung einiger Mitglieder folgend, wird eine Sammlung für die in Not geratenen Geschwister Brehm ausgeschrieben. Spenden werden auf unser Postscheckkonto Berlin 80731 erbeten, von wo allwöchentlich die Weiterleitung erfolgt. Quittung an dieser Stelle. A. Krabbe.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig. Nächste Sitzungen Donnerstag, den 2. August und Donnerstag, den 16. August 1923, im Vereinslokal „Bauers Brauereirestaurant", Täubchenweg. Gäste sind willkommen.

J. A.: Joh. Birk, 1. Vors., Leipzig-Mockau, Beuthstr. 29.

Die **Vereinigung der Vogelliebhaber Sitz Liegnitz** und die **Vereinigung der Zierfischfreunde und -pfleger** veranstalteten vom 13.—16. Juli im Gartensaal des „Volkshauses" gemeinsam ihre Ausstellung. Von den Mitgliedern der Vereinigungen wurde mit allen Kräften an der Verschönerung des Ausstellungsraums gearbeitet. Ausgestellt waren die verschiedensten einheimischen und fremdländischen Vögel, nur unsere Weichfutterfresser waren sehr schwach vertreten. Von den Zierfischfreunden waren die verschiedensten Zierfische in zirka 70 Aquarien ausgestellt. Ferner boten präparierte Sing- und Raubvögel sowie prächtige Bilder den Besuchern einen reizenden Anblick. Zahlreiche Blumentöpfe und Lorbeerbäume gaben der Ausstellung ein prächtiges Aussehen. Der Besuch der Ausstellung war ein sehr reger, so daß uns ein kleiner Überschuß verblieb. Jedoch den besten Dank für unsere Mühe und Arbeit erblicken wir in dem Eintritt von 10 neuen Mitgliedern. Wollen wir hoffen, im nächsten Jahre wieder mit einem erfreulichen Ergebnis abschließen zu können.

Max Friedrich.

Zoologische Gesellschaft, Wien, Vereinigung von Tierfreunden. Während des Gesellschaftsabends am Donnerstag, dem 12. Juni, berichtete Herr Grasl über Ammendienste bei Rußköpfchen. Einem aus dem Besitze des Herrn Rambousek stammenden Pärchen wurde ein Gelege von 4 Nymphensittichеiern untergeschoben, nachdem die Elterntiere, infolge Störung durch Ratten, die in der Gartenvoliere Eintritt gefunden hatten, ihre bereits 10—12 Tage bebrüteten Eier verlassen hatten. Die Rußköpfchen, ziemlich alte Tiere, die auch heuer wieder auf ihren unbefruchteten Eiern brüteten, erzielten 3 junge Nymphensittiche. Als die letzteren nach etwa 16 Tagen die Größe ihrer Pflegeeltern überschritten hatten, zeigte es sich, daß die Rußköpfe nicht mehr imstande waren, die Jungen genügend zu füttern. Trotz frischer Ameiseneier hatten die Nymphen leere Kröpfe und schienen sehr erschöpft zu sein. Der Pfleger entschloß sich, die schon mit langen Federkielen versehenen Vögel selbst zu atzen. Ein warmer Brei von Hirse, Weizengrieß und Eierbrot wurde nach der Methode v. Lucanus verabreicht. Leider gingen alle Vögel ein. Indessen hatte sich das alte Nymphenpaar neuerlich zu einer Brut entschlossen. Hoffentlich diesmal mit vollem Erfolg. Von den Mitgliedern haben besonders Herr Handl namhafte Zuchterfolge mit japanischen Möwchen (derzeit bereits über 30 flügge), Fräulein Krezmar u. a. mit Kanarienvögeln. Eine Sammlung für die in Not geratenen Geschwister Brehm ergab 120000 K.



Herrn H. K., Innsbruck. Das Weibchen Wellensittich ist zweifellos einer Vergiftung erlegen. Niere, Lungen, Herzbeutel, alles war blutüberfüllt, die Darmwände angeätzt. Der Wellensittich war während der Brut und der Aufzucht der Jungen besonders empfindlich. Es muß gerade in dieser Zeit darauf geachtet werden, daß sie sehr gutes und bekömmliches Futter erhalten. Die im Handel befindlichen Sämereien sind nicht von der guten Qualität der Vorkriegszeit. Sie sind meist nicht rein, und je mehr verschiedenen Samen man darbietet, desto mehr Gefahr laufen die Vögel, etwas Schädliches zu erhalten. Zur Aufzucht der Jungen genügt bei Wellensittichen weiße Hirse und Kanariensat. Geschälter Hafer ist wenig tauglich. Wenn schon Hafer gereicht wird, dann solchen in den Ähren. Hanf, gemischte Samen, Biskuit, Mehlwürmer ist alles überflüssig und gefährdet die Vögel nur.

Futtermittel

Vogelfutter

für Kanarien, Waldvögel, Exoten, Papageien, Weichfresser. Anfragen nur gegen Rückporto. Liste 13 über Vogelfutter 200 *M*, Liste 5 über Vogelkäfige, Zuchtgeräte usw. mit etwa 400 Abbildungen 600 *M*. [467

W. Göpel, Leipzig,
Tröndlinring 1. Telephon 14 958.

Vögel

Kanarien-Hähne

und -**Weibchen**, Papageien, Wellensittiche, weiße Mäuse, Meerschweinchen und ähnliche Tiere kaufe ständig höchstzahlend. Angebote mit Preis erbeten.
H. Behrke vorm. **Mätje.** Gegr. 1874.
Tierexport Braunschweig,
Sophienstr. 35. Fernruf 1281. [468

Tausche pr. Zuchtp. Nymphensittiche (d. J. 4 J.) geg. and. Sittiche (k. Wellensitt.) od. sonst. bess. Exoten; zahle auch zu. Fr. See, **Frankfurt a. M.**, Bahnhofsplatz 8. [469

Grünes Kanarienweibchen
vertauscht gegen **Waldvögel** [470
Georg Herrmann,
Hermsdorf b. Sagan.

Papagei, gut und viel sprechend, und andere Singvögel sowie Ziervögel zu kaufen gesucht. Angebote unter „Papagei" an die Geschäftsstelle der „Gefiederten Welt". [471

Verkaufe nur geg. Gebot 2.1 Schmetterlingsfinken, Ia Zuchtvögel, gesund und prachtvoll befiedert. **Ernst Petrich,** Plauen i. V., Jößnitzer Str. 145. [472

Tausche 5 kg prima Hanf und 3 kg guten Mohnsamen gegen ein Erlenzeisigpärchen und ein gutsingendes Rotkehlchen. **E. Hill,** z. Zt. **Warnemünde,** Strandweg 11. [473

Mozambikzeisig
oder 1,0 Grauedelsänger **gesucht** gegen bar oder 1,1 Wellensittich **in Tausch.**
Friedrich Barth, Göttingen. [474

Grüne Wellensittiche,
Brut 1923, abzugeben oder gegen andere Vögel zu tauschen. [475
Max Kriegeskorte,
Stuttgart-Hedelfingen.

Wiedehopf
kauft
R. Lomnický, Prag VII, (Č.S.R.),
Korunovační 1020. [476

Nußköpfchen geg. Vögel tauscht Rothe, Breslau, Kohlenstraße 7, 1. Eth. [477

„Ornis" [478
Freie Bezugs-Vereinigung der Waldvogel-Liebhaber Deutschlands
bestand von 1912 bis 1. Oktober 1920. Durch sachgemäße und reelle Belieferung der Mitglieder mit Vogelfutter u. Bedarfsartikeln erwarb sie sich einen Ruf, der noch fortbesteht. — Auf vielseitigen Wunsch bringe ich diese Tatsache in Erinnerung, auch allen denjenigen, die von dem Bestehen derselben noch keine Kenntnis haben. — Ein **Benachrichtigungsblatt** kann leider **nicht** mehr erscheinen, doch ist das Ornis-Haus nach wie vor bestrebt, die besten von allen am Markte erhältlichen Artikeln zu liefern; das mir geschenkte Vertrauen werde ich weiter zu erhalten wissen. — Über meine Tätigkeit gibt das „Ornis-Buch" Auskunft. Rabatt kann **nicht** mehr gewährt werden, doch kommen nur brauchbare Mischungen zum Versand. Bei Anfragen erbitte ausreichendes Rückporto und Angabe der vorhandenen Vogelarten. — Auskunft bereitwilligst. Bücher und Blätter sende für 800 Mk. frei (Ausland 2400 Mk.)
Ornis-Haus, Halle a. S.
Fernruf 4198

„Reform · Normal"-Weichfutter nach Angabe des Herrn Apotheker Adalbert Jena-Biberach-Riß. Moderner elektr. Betrieb. Gleichmäßige Körnung, restloser Verbrauch garantiert.

Tausche: jg. rotr. Würger, Gelbspötter, Dorngrasmücke, Hänfling. **Suche:** Gartengrsm., Grauedelsänger, Zebrafinken. Angebote an **A. Völker, Stettin,** Schnellstraße 7. [479

Je 1 prima Zuchtpaar **Zebrafinken,** kleine **Elsterchen, Amaranten** zu verkaufen gegen Gebot. Ferner 3 junge unausgefärbte **Zebrafinken** sowie 2 junge **Mövchen** gegen Höchstgebot abzugeben. **Lentze, Osnabrück,** Struckmannstraße 7. [480

Gegen vollständige Jahrgänge der **„Gefiederten Welt"** gebe i. Tausch: **1,0 Schmetterlingsfink, 1,0 Amarant, 1,0 Helenasasänchen, Zebrafinken** und **Wellensittiche.** Suche: **1 Schilffink, 1 Maskenamandine, 0,1 kl. Kubafink, 1,0 gr. Kubafink.**
Große, Magdeburg,
Sieverstorstraße 42. [481

[redacted]

Inserate

für das am 16. August 1923 zur Ausgabe gelangende Heft 16 der Gef. Welt erbitten bis 10. Aug. 1923 früh. Die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit **10 Pf. Grundpreis** berechnet, der mit der vom „Börsenverein der Deutschen Buchhändler bestimmten Teuerungszahl — zurzeit „30 000" — zu multiplizieren ist. Auslandspreis —,10 Schweizer Franken.

[redacted]

Kaufen laufend zu konkurrenzlos höchsten Preisen:

Kanarienhähne und -weibchen

sowie **Sing-** und **Ziervögel, Exoten aller Arten, Papageien, graue, grüne usw.**

Kühn & Muschter, Leipzig,
Promenadenstraße 29. Telephon 10 226.
Käfigfabrik und Vogelhandel en gros und en detail
Import. **Export.**
Anfragen Rückporto beifügen. [482

Papageien Kanarienhähne Bastarde

kauft höchstzahlend und tauscht auch auf Exoten

Willy Odenwald, Fulda.

Eigner Export und Import. [483

Reform-Käfige

Zerlegbar · Leichteste Reinigung · Einfachster sicherer Transport
1. Preis beim Käfig-Wettbewerb Leipzig 1919/22 (siehe Gefiederte Welt 1920, Heft 14—16), Goldene Medaille Leipzig 1921/22
werden für alle Vogelarten hergestellt.

Ausführung: Hartholz, grünlackiert oder naturlackiert, Zinkschublade, Porzellannäpfe, Ledertuchdecke.

Keine Fabrikware, sondern beste Spezialarbeit!
Anfertigung als Kistenkäfig oder Wiener Form (halboffen) oder halboffen mit fester Rückwand. Ohne jedes Werkzeug in einer Minute zusammengestellt resp. zerlegt. Verpackung zum Selbstkostenpreis.
Fertigen auch jede Art Käfige u. Volieren u. Zeichnung od. Maßangabe.

Heck-, Flug-, Einsatz-Käfige.
Ausstellungs-Käfige nach Vorschr. d. V. D. K.
Transport-Käfige, jeden Posten.
Anfragen Rückporto beifügen. Katalog gegen Einsendung von 300 M. in Briefmarken.

Schlagnetze ohne Mittelsteg
für schädliche Vögel, prima handgeknüpfte Ware. [484

Kühn & Muschter, Leipzig,
Promenadenstraße 29. Telephon 10 226.
Bankkonto: Allgem. Deutsche Credit-Anstalt Zweigstelle Borna; Stadt-Girokasse Borna b. Leipzig Nr. 1506. — Postscheck.: Leipzig 92 250. — Tel. 147.
Zahlreiche Anerkennungs- und Dankschreiben.

Preiserhöhung der Gefiederten Welt!

Bei der jetzt einsetzenden ungeheuren Teuerungswelle kann selbstverständlich der vor Monatsfrist festgesetzte **August-Preis von 1200 Mark** nicht innegehalten werden. Wir müssen ihn vielmehr **auf 3000 Mark erhöhen** und damit

eine Nachzahlung von 1800 Mark

vermittels anliegenden Postschecks — Magdeburg 3148 — erbitten!

Wir sind stets bestrebt, den Preis der Gefiederten Welt so niedrig als möglich zu halten, um auch Minderbemittelten die Haltung des Blattes zu ermöglichen, und hoffen, daß die geringfügige, für den Bestand der Zeitschrift unbedingt nötige Preiserhöhung nicht als drückend empfunden wird.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg
Postschließfach 148

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Hermsdorf bei Berlin; für den Anzeigenteil: Franz Wunderlich, Magdeburg, Postschließfach 148
Verlag der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck: August Hopfer, Burg Bz. Mgdbg.

Jahrgang LII.
Heft 16. 16. August 1923.

Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Die Gefiederte Welt gelangt am Donnerstag nach dem 1. u. 15. jedes Monats zur Ausgabe und kostet für Monat August 3000 Mark. Einzelpreis des Heftes 1800 Mark.
Auslandspreis für das Vierteljahr 2 Schweizer Franken, für das Heft 0,35 Schweizer Franken.
Inserate für die folgende Nummer müssen bis spätestens Freitag früh in Händen der Verlagsbuchhandlung sein. Die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 10 Pfg. Grundpreis berechnet, der mit der vom „Börsenverein der Deutschen Buchhändler" von Zeit zu Zeit bestimmten Teuerungszahl zu multiplizieren ist.
Auslandspreis für die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum —,10 Schweizer Franken.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung (M. Kretschmann) in Magdeburg.
Postschließfach 148. Postscheckamt: Magdeburg 3148. Fernsprecher: 1323.

Was und wie soll man füttern!

Vortrag, gehalten im Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig.

Von J. Birk, Leipzig.

(Fortsetzung und Schluß.) (Nachdruck verboten.)

Eine gern genommene Beigabe zum Weichfutter ist gequetschter Hanfsamen, doch bin ich kein Anhänger einer täglichen Beigabe zum Weichfutter, sondern betrachte ihn als willkommene Abwechslung in der täglichen Futterration. Beeren in frischer sowie getrockneter Form für unsere Grasmücken, speziell Mönch- und Gartengrasmücke, als tägliche Beigabe habe ich als ein Idealfutter gefunden, das sehr gerne genommen wird. Getrocknete Beeren vom roten Traubenholunder stehen täglich, solange meine Grasmücken mit Mischfutter verpflegt werden, auf dem Speisezettel, nur in der Zeit der Blankfütterung mit frischen Ameisenpuppen fehlen dieselben. Auch die Beeren vom schwarzen Holunder sind wertvoll, ebenso die Verabreichung von Obst, wie es die Jahreszeit bietet, als Leckerbissen, im Winter des öfteren gebratener Apfel vervollkommnen die Speisekarte meiner Grasmücke. Ist ein Vogel trotz genügender Beigabe von Weißwurm nicht auf normalen Körperzustand zu bringen, so füttere man Hühnerei, gekochtes Rindfleisch, auch Rinderherz mit, doch halte ich letzteres, trotz seines Nährwertes, mehr als Gesangsreizmittel. Speziell bei Gelbspöttern macht sich in der Zeit der kurzen Tage eine sehr kräftige Ernährung notwendig, da sie sonst leicht abmagern und die bevorstehende Mauser keinesfalls überstehen. Ständig müssen Spötter auch genügend Mehlwürmer mitbekommen. Bei Grasmücken, die ebenfalls starke Fresser sind, hat der Liebhaber sein Augenmerk und die Vorbeugung auf die leicht auftretende Fettsucht zu richten, verhindern läßt sich das Fettwerden leichter, als einen fetten Vogel wieder normal bekommen. Viele Vögel entfetten sich auch selbst, indem sie in den Gesang eintreten oder anfangen zu mausern, oder überhaupt tagelang gar kein Futter anrühren. Mir sind viele Fälle derartiger Selbstentfettung bekannt, und auch in meiner Praxis sind mir schon verschiedene Fälle, darunter sehr krasse, bekannt. Eine Nachtigall nahm volle sechs Tage keinerlei Futter, selbst Mehlwürmer nicht an, bis sie am sechsten Tage mit dem Schlag anfing und auch wieder fraß und in Körperbeschaffenheit normal war. Eine Gartengrasmücke hielt es fünf Tage ohne jegliche Futterannahme aus, Eintritt des Gesanges, der Wintermauser und normaler Körperbeschaffenheit war das Resultat. Mehr Fälle sind mir noch von Nachtigall, Schwarzplättchen und Gartengrasmücke bekannt, wo die Futterverweigerung nur ein paar Tage dauerte. Der in diese Eigentümlichkeit nicht eingeweihte Liebhaber bekommt es selbstverständlich mit der Angst um seinen Liebling zu tun, doch ist eine derartige Selbstentfettung nicht gefährlich, viel gefährlicher ist eine gewaltsam herbeigeführte Entfettung durch plötzliche Entziehung aller nahrhaften, fettbildenden Futterstoffe. Geht die Abmagerung wie gewünscht vor sich, so kommt es auch häufig vor, daß die Abmagerung nicht mehr aufzuhalten ist und in Auszehrung übergeht, was den Verlust des Vogels nach sich zieht. Darum warne ich jeden Liebhaber in solchen Fällen vor rapiden Änderungen, was die Qualität und Quantität des Futters anbetrifft; nur allmählich ersetze man einen nahrhaften Futterbestandteil durch einen weniger nahrhaften, bis man denselben ganz wegläßt. Über das Problem Fütterung ließe sich stundenlang plau-

dern. Die Futterangelegenheit in allen ihren Einzelheiten zu behandeln, dazu gehören mehrere Abende, doch wollen wir uns noch kurz mit einigem Wissenswerten beschäftigen. Wer sich eingehend mit der Futterfrage befassen will, dem rate ich, die einschlägige Literatur zu studieren, er wird darin mehr Brauchbares als Verwerfliches finden, doch kommt bei allen Futtermethoden, mögen sie auch die brauchbarsten sein, das: „Wie man füttert" stets in den Vordergrund. Am besten fährt derjenige Liebhaber, dem es seine Zeit erlaubt, täglich zweimal zu füttern, die erste Fütterung erfolgt zeitig früh so, daß die Vögel beim Anbruch des Tages einen gefüllten Futternapf vorfinden, das Quantum des Futters darf nicht reichlicher sein, daß es bis gegen Mittag reicht, nun kann der Vogel ruhig zwei Stunden hungern, bevor er die zweite Tagesration vorgesetzt bekommt. Aber leider ist dies dem größten Teil der Liebhaber nicht möglich, der Beruf zwingt sie, die Tagesration gleich auf einmal zu reichen, ebenso ergeht es mir. Ich bemesse die Rationen nicht zu groß, damit die Vögel beides nachmittags ausgefressen haben, dann reicht man abends, wenn die Vögel bei genügender Beleuchtung sind, noch eine kleine Ration, in der Gesangszeit auch noch eine zweite Gabe von Mehlwürmern. Der Liebhaber hat vor allem auch auf die Ausleerungen der Vögel zu achten, und er wird sofort an dem Kot merken, wenn bei der Verdauung etwas nicht in Ordnung ist; Darmkatarrh zeigt sich durch dünne, kalkartig, schleimig aussehende Entleerungen, ebenso auch bei Durchfall, Darmerweiterung durch auffallend starken würstchenförmigen Kot. Fast alle diese Krankheiten sind eine Folge von zu nassem Futter, vor dem nicht dringend genug gewarnt werden kann. Das beste Mittel bei Durchfall ist Hühnerei mit Mohnmehl vermengt, bei Darmkatarrh warmer Haferschleim und vor allem Wärme und Vermeidung alles reizbaren Futters. Bei Verstopfung, welche der Vogel durch ständiges Wippen des Hinterkörpers beim Entleeren kundgibt, habe ich als bestes Mittel einige in gutem Salatöl ertränkte Mehlwürmer gefunden, schon nach geraumer Zeit wird dem Vogel Linderung verschafft. Bei mageren, der Auszehrung entgegengehenden Weichfressern füttere man, wenn erhältlich, viel Spinnen, ich habe damit schon manchen Vogel, speziell Nachtigallen, gerettet. Bei allen soeben erwähnten Krankheiten, deren Entstehungsursache meistens auf fehlerhafte Fütterung zurückzuführen ist, bleibt die Hauptsache, daß ihr Vorhandensein, resp. ihre Entstehung zeitig genug bemerkt wird, denn ist eine Krankheit bereits zu weit vorgeschritten, so ist meistens keine Rettung mehr für den Vogel. Die beste Vorbeugung gegen derlei Krankheiten ist nicht zu feuchtes, stets frisch zubereitetes Futter und Abwechslung durch Darreichung von allerlei Leckerbissen, wie sie gerade die Jahreszeit bietet. Das Hauptfutter unterziehe man keinen allzu schroffen Veränderungen, erfordert der Körperzustand eines Vogels eine solche, so verringere man nach und nach die wegzulassende und steigere nach und nach die dafür nötige Futtersorte. Vor allem hüte sich der Liebhaber vor Versuchen mit allen möglichen fertig erhältlichen Universalfuttern; es gibt wohl brauchbares, aber auch noch mehr verwerfliche Mischungen, die nur auf den Vorteil des Verkäufers, nicht aber auf den des Vogels zugeschnitten sind. Darum ist jedem Liebhaber nur zu raten, wenn er es ermöglichen kann, sein Futter selbst zusammenzustellen, wenn nicht, so verwende er nur einwandfreie, bereits erprobte Futtermischungen. Über Verfütterung von Mehlwürmern in der gesangslosen Zeit ist man geteilter Meinung; es gibt Liebhaber, die jahraus jahrein Mehlwürmer füttern und nur in der Gesangszeit das Quantum erhöhen, andere wieder füttern nur vom Beginn der Gesangszeit ab oder bei Eintritt des Gesanges Mehlwürmer und steigern dieselben bis zur Höchstentfaltung des Gesanges. Zu letzteren gehöre auch ich, und die Praxis hat mich gelehrt, daß auch so sehr gute Erfolge zu verzeichnen sind. Ist der Mehlwurm in der Pflege der Weichfresser uns unentbehrlich geworden, so ist derselbe doch mehr als Gesangsmittel wie als Nahrungsmittel zu betrachten, trotzdem sind dem Mehlwurm nahrhafte Eigenschaften nicht abzusprechen. So wichtig der Mehlwurm in der Fütterung unserer Weichfresser ist, so verderbenbringend kann er auch sein, wenn der Liebhaber nicht weiß, wann und vieviel er dieser oder jener Vogelart reichen kann. Manche Liebhaber kennen darin kein Maß und Ziel, und doch ist es wichtig, jeden Vogel sein gewisses Quantum in 2—3 Raten täglich zu verabreichen, am besten früh, mittags und abends. Die ganze Vogelpflege beruht auf Darbietung einwandfreien Futters in Qualität und Quantität bemessen nach dem Bedürfnis des betreffenden Vogels, Einhaltung möglichst pünktlicher Fütterungszeiten, nicht wie man bei manchen Liebhabern zu sehen bekommt, heute wird um 7 Uhr früh gefüttert, morgen einige Stunden später, dies ist eine verwerfliche Methode, die in der Bequemlichkeit des Liebhabers ihre Ursache hat. Gerade Sonntags wird darin viel gesündigt, und gerade da ist es nötig, will der Liebhaber wenigstens einmal in der Woche richtigen Genuß vom Gesang haben, daß genau die Fütterungszeit wie wochentags eingehalten wird. Manche Liebhaber halten nicht viel von geriebener Möhre unter das Futter, ich kann dies aber nur empfehlen, nur süße, saftige Speisemöhren darf man dazu verwenden, über das Aus- oder Nichtausdrücken des Saftes ist man auch geteilter Meinung, ich stehe auf dem Standpunkt, ist der Feuchtigkeitsgehalt der Möhre ein großer, speziell bei frischen Möhren, so drückt man eben den Saft etwas aus, im übrigen reibt man eben nicht zu viel, so daß man durch Vermengen der Futterstoffe eine flockige, leicht krümlige, für die Anzahl der Vögel nicht zu reichlich bemessene Masse bekommt. Der Liebhaber erhält mit der Zeit in der Futterbereitung eine dermaßen sichere Übung, so daß er genau das Quantum für die nötige Anzahl Vögel zubereitet. Wer es ermöglichen kann, seine Vögel, nicht nur die Frischfänge, sondern auch die Überwinterten, mit Ausnahme des Blaukehlchens, in der Zeit der frischen Ameisenpuppen blank zu füttern, tue es, denn dies bietet dermaßen Vorteile für die Widerstandskraft des Vogels im Käfig, daß die Überwinterung und speziell die Mauser viel weniger Schwierigkeiten macht als sonst. Kann keine Blankfütterung aus irgendwelchen Gründen durchgeführt

werden, so ist es aber dringend zu empfehlen, gegen Ende der Gesangszeit vor und während der Mauser nebenbei frische Ameisenpuppen zu füttern. Das wertvollste Ersatzfutter und nebenbei auch das gebräuchlichste sind die Ameisenpuppen, in zweiter Linie kommt der Weißwurm und dann folgen alle die vielen Futterstoffe, wie Möhre, gequetschter Hanf, Quark, Biskuit oder Zwieback, gekochtes Rindfleisch, Rinderherz, gekochtes Hühnerei, Beeren, Obst, Mehlwürmer usw. Vor allem aber soll der Liebhaber zu jeder Zeit, wenn erhältlich, lebende Insekten, wie unbehaarte Raupen, Schmetterlinge, Käfer usw. füttern. So hoch ich den Altvater der Liebhaberei, unsern Rausch, einschätze, so unrecht muß ich ihm geben, wenn er behauptet, durch die Fütterung resp. den Anblick lebender Insekten werden die Vögel an ihre verlorene Freiheit erinnert, dies ist eine irrige Auffassung Rauschs, im Gegenteil, je mehr lebende Insekten wir neben dem täglichen Ersatzfutter reichen können, um so natürlicher ist die Fütterung und um so natürlicher erhält sich der Organismus des Vogels, er mausert danach leichter, denn Natur bleibt Natur. In neuester Zeit hat sich bei den Leipziger Liebhabern die Zucht des Kornkäfers eingebürgert, ich habe bei meinen Probeversuchen in der Fütterung gefunden, daß die Larve des Kornkäfers ein Idealfutter darstellt und ist ebenso eine Beigabe als Gesangsreizmittel wie die Larve des Mehlkäfers, unseres unentbehrlichen Mehlwurms, nur macht die Zucht des Kornkäfers mehr Schwierigkeiten wie die des Mehlkäfers. In früheren Zeiten züchtete ich auch die Larve des Pelz- sowie die des Speckkäfers, doch habe ich gefunden, daß die Larven wohl gerne genommen werden, die Zucht derselben aber unrentabel und vor allem für die Wohnung ganz gefährlich ist, schon aus diesem Grunde scheidet der Pelz- und Speckkäfer von selbst aus. Es ließe sich noch lange plaudern über Futterfragen, doch will ich die Geduld der Leser nicht mehr länger in Anspruch nehmen, möchte aber meine Abhandlung nicht etwa als eine vollständige Behandlung dieses Themas betrachtet wissen, im Gegenteil, ich konnte nur streifen, aber nicht eingehend erörtern, denn gerade das: „Was und wie soll man füttern“ bildet ja den Kernpunkt der Stubenvogelliebhaberei. Hoffentlich bringt uns die anschließende Debatte noch manches unter dieses Thema Gehörige, mögen meine Ausführungen die Anregung dazu geben, sollte dies erreicht werden, so ist der Zweck meiner Ausführungen voll und ganz erfüllt.

Fichtenkreuzschnabel.

Aus meiner Vogelstube.

Von S. Lichtenstaedt.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Viel Ärger hatte ich in letzter Zeit durch eine Anzahl „Nestflüchter“ bei meinen Wellensittichen. Solche Junge, noch ganz nackt und kahl, erklommen mit Hilfe der inneren Sitzstange das Flugloch, krabbelten heraus, hielten sich ein paar Minuten am Gitter und sausten, fast zwei Meter hoch, in die Tiefe. In zwei Kasten war diese Krankheit geradezu chronisch. Heil und munter kamen zu meinem Erstaunen die Jungen unten an und schrien bald kläglich um Futter. Vorsichtig wurden sie zurückgebracht, in einer halben Stunde lagen sie wieder unten. Dreimal dasselbe Spiel, dreimal derselbe Erfolg.

Da bemerkte ich folgendes reizende Familienbild. Ein schon vollbefiedertes Weibchen derselben Brut fütterte unbeholfen die schreienden kleinen Geschwister. Die Eltern kümmerten sich um die Flüchtlinge gar nicht, dagegen flog bald dies, bald jenes fremde Weibchen zu ihnen und atzte sie. Leider kamen von vier Vögeln nur zwei hoch, zwei fand ich verhungert am Boden

Zwei kleine Episoden muß ich noch berichten. Meine zweite Freivoliere, bevölkert mit zirka 30 Jungen eigener Zucht, wurde gereinigt, und plötzlich entflohen mir unter der Hand zwei Vögel und waren im nahen Walde verschwunden. Mein Ärger war groß, aber schließlich mußte ich mich trösten. Nachts brach ein furchtbarer Sturm los, und mußte ich bei jedem Windstoß an die armen Ausreißer denken. Am zweiten Tage bemerkte ich zu meinem Erstaunen beim Füttern vor der Voliere meine beiden Ausreißer, eifrig in den Hülsen am Boden umhersuchend. Sie schienen schon sehr matt zu sein, entflohen aber bei meinem Nahen auf die nächsten Obstbäume. Kaum entfernte ich mich, waren sie wieder da. Jeder Fangversuch war leider vergebens, und schienen die armen Kerle dem Hungertode preisgegeben zu sein, denn das Unwetter tobte unvermindert fort. Ich schüttete Futter vor die Voliere, welches auch gierig angenommen wurde.

Am Abend war heller Mondschein und spät abends ging ich noch einmal in den Garten. Freudig überrascht war ich, als ich meine beiden Flüchtlinge auf der Voliere fest schlafend fand. Ein paar Minuten später flatterten sie im Käscher. Drei Tage erholten sich die Tiere im Einzelkäfig von ihrem Ausflug, heute sind sie munter und fidel.

Ein Drama spielte sich heute in meiner Wellensittichvoliere ab. Vormittags herrschte eine große Aufregung unter den Tieren, und bald bemerkte ich, daß ein Weibchen wieder ‚rasend' geworden war, ein Zustand, den ich schon in meinen früheren Artikeln beschrieben hatte. Dasselbe stürzte wie eine Furie auf ein zweites Weibchen, welches vier Eier im Kasten hatte. Ein Kampf auf Tod und Leben schien entbrannt zu sein. Warum? Wer kann in eine so kleine Vogelseele blicken? Eifersucht, unbefriedigter Geschlechtstrieb, Neid? Ich griff sofort ein, konnte aber keinen der Vögel fangen und glaubte, daß die Händel vielleicht nur vorübergehend sein würden. Bald aber ging es von vorne los. Der „Teufel" wollte in den Kasten zu den Eiern, die Mutter verteidigte heldenhaft ihre Brut. Wieder vergebliche Fangversuche meinerseits und Ruhe.

Nach einer halben Stunde betrete ich wieder die Vogelstube. Der „Teufel", erkenntlich an seinem fehlenden Schwanz, saß vergnügt am Futternapf.

Ich hob den Nistkasten ab und erschrak. Das zweite Weibchen lag tot auf den Eiern. Die Gehirnschale lag bloß, der Oberkopf war furchtbar zerfleischt, die Augen fast aus den Höhlen getreten. Noch im Tode hatte der Vogel die Flügel gleichsam als Schutz über sein Gelege gebreitet. Mutterliebe. Der Mörder sitzt in Einzelhaft, zur Verhütung weiterer Schandtaten.

Herr Dr. Bilfinger schreibt, daß er solche Mord- und Zanksucht für chronisch hält, ich kann dem jedoch nicht zustimmen. Mehrere derartig sadistische Tiere wurden von mir später wieder in die Voliere gesetzt, und — waren die friedlichsten Bewohner, zogen ihre Bruten tadellos auf und bekümmerten sich überhaupt nicht um ihre Mitbewohner.

(Schluß folgt.)

Meine Vögel und deren Behausung.

Von Chas. Neidhardt, San Jose, Cal.

(Fortsetzung und Schluß.) (Nachdruck verboten.)

Im Freien habe ich eine Reihe von Volieren: Nr. 1 1,80 m breit, 4,50 m lang; Nr. 2 1,80×3,30 m; Nr. 3 4,20×3,30; Nr. 4 und 5 unter Dach je 1,50 m breit und 1,50 m tief, mit offenem Flugraum je 1,80 m breit und 1,50 m und 3 m tief, schließen sich an den tiefsten Seiten in einer Art Halbbogen an Nr. 3 und 6 an. Nr. 6 ist für Tauben, hat einen geschlossenen Raum im Schuppen, 2,70 m breit und 3,60 m tief, mit einem offenen Flugraum, 1,50 m breit und 3,60 resp. 3 m tief, und eine Höhe im Giebel von 3 m unter Benutzung eines Teiles des Schuppendaches; im Schuppen, der 4,80 m tief und 12 m lang ist, befindet sich noch ein Käfig, 1,80 m lang, 60 cm tief und 90 cm hoch, er beherbergt gegenwärtig drei Dutzend Kanarienweibchen. Nr. 1, 2 und 3 haben einen gedeckten Raum, 1,80 m tief, am offenen Ende 1,80 m hoch und an der Rückwand 1,50 m. Der Rest ist offener Flugraum. Der gedeckte Raum ist am Nordende mit Brettern verschlagen und an der Südseite zur einen Hälfte mit Glas und zur anderen Hälfte mit Brettern versehen, außerdem ist die Vorderseite (Ost) des Südendes noch mit zwei Fenstern versehen, um den Finken und Kanarien einen mehr geschützten Platz zu geben, auch befindet sich der Futtertisch dort. Nr. 1, 2 und 3 haben Doppeltüren; Nr. 1 und 2 je einen Springbrunnen, Nr. 3 zwei Springbrunnen, Nr. 6 hat laufendes Wasser. Entlang Nr. 1 an der Nordseite ist eine Hecke von Privet (ein Immergrün), um den Wind zu brechen, und an der Vorderseite ist eine Kletterrose Cheerokee. Die übrigen Volieren, ausgenommen Nr. 6, werden von Weintrauben überschattet, das Angenehme mit dem Nützlichen verbunden. Nr. 4 und 5 haben außerdem ein Beet von Stachel- und Johannisbeeren an der Ostseite des Flugraumes. Die vorherrschenden Winde sind Süd und Nord, Regen meistens mit Südwind, Ost- und Westwinde sind sehr selten. Alle Volieren werden von der Morgen- und Mittagssonne beschienen und können von meinem kleinen Hause aus bequem übersehen werden. Ich kann also bei schlechtem Wetter von dem warmen Zimmer aus alle Tiere in Gemütsruhe betrachten. Nr. 1 und 2 haben Drahtgeflecht am Boden und der Rest Zement, um die Ratten fernzuhalten. Die Böden habe ich erst kürzlich hineingetan, nachdem mir die Ratten großen Schaden zugefügt hatten. Nr. 1 beherbergte früher kalifor. Schopfwachteln, später Lachtauben und jetzt drei Sonnenvögel und einen Kardinal. Diese Vögel waren zusammen mit Kanarien und Finken in Nr. 3 und haben sich schön vertragen, nur glaube ich, daß sie durch ihr hastiges Fliegen die jungen Kanarien erschreckt haben und die Ursache waren, daß viele derselben das Nest zu früh verließen. Der Kardinal ist drei Jahre in meinem Besitz und gewiß ein schöner Vogel, aber noch so scheu wie je. Von einem herrlichen Gesang ist aber nicht die Rede, man hört ein paar Pfeifen, Dui, dui, dui, dann kommt eine Schnarre, und aus ist das Vergnügen. Die Kanarien haben es in ihren Gesang aufgenommen und bringen es ganz schön zum Vortrag. Seit

den letzten paar Monaten läßt er sich überhaupt nicht hören. Die drei Sonnenvögel sind ein lustiges Trio, ein Weibchen und zwei Männchen, d. h. es ist sehr zweifelhaft, ob das eine wirklich ein Männchen ist. Es ist zwar als solches verkauft worden, ist auch lebhaft gefärbt, aber singen tut es nicht; habe es beinahe zwei Jahre. Das Weibchen ist schon beinahe vier Jahre bei mir, in der Zeit habe ich zwei Männchen verloren. Eins davon hatte sich, glaube ich, an Fliegen überfressen, oder auch möglich, daß giftige Fliegen dabei waren. Es war dies der zahmste Vogel, kam stets und holte sich seine Mehlwürmer, und den ganzen Tag pfiff er seine lustige Weise. Und wirklich, mir sind die Sonnenvögel ans Herz gewachsen, so frisch, frei findet man wenig Vögel. Immer im Gang, immer fidel, ein richtiger Sonnenvogel. Der Preis ist verhältnismäßig gering, 3 $ für ein Männchen, 4—5 $ für ein Paar. Kardinäle wurden für 10 $ und 7,50 $ verkauft. Das Hauptfutter für die Sonnenvögel und auch für den Kardinal sind eingeweichte Soda-Cracker, nebenbei etwas Hirse, gequetschte Sonnenblumenkerne, als Delikatesse Walnuß und ein Paar Mehlwürmer. Äpfel werden gern gefressen, ebenso Weintrauben, auch Kirschen, besonders der Kardinal liebt die letzteren. Ameiseneier werden nicht beachtet, jedoch hatte ich einen Sonnenvogel, der Ameiseneier sehr gern fraß. Talg wird auch gern genommen. In einer Vogelhandlung, wo Hunderte hereinkommen, hingen große Stücken Talg in der Voliere. Als Schlafstätten benutzten die Vögel dort große Mattenkörbe, worin sie anscheinend importiert wurden. Voliere Nr. 2 ist von Wellensittichen und einem Paare Nymphensittichen bewohnt. Die Wellensittiche nisten und haben zirka 20 Junge gezogen, doch habe ich mindestens vier bis fünf Weibchen an Legenot verloren. Augenblicklich sind vier Kasten bewohnt, doch kann ich nicht sagen, ob Eier vorhanden sind, von Jungen ist nichts zu hören. Die ersten Jungen wurden im November 1921 geboren (5 Stück). Ich wollte die Tiere nicht stören und wartete daher so ungefähr drei Wochen, ehe ich revidierte. Was war das für ein Schmutz! Hätte es gar nicht für möglich gehalten, daß Tiere, und noch dazu junge, unter diesen Verhältnissen leben konnten, erstens der Schmutz, dann der wunderbare Geruch und zu guter Letzt die durch die Ausdünstung hervorgerufene Feuchtigkeit. Seit dieser Zeit sehe ich öfters nach. Diese Jungen waren sehr schlecht ausgefiedert, und es vergingen Monate, ehe sie fliegen konnten; die Eltern waren ein gelbgrünes Männchen und ein grünes Weibchen. Letzten Sommer tauschte ich sechs junge Männchen für ein Paar Nymphensittiche ein, die hier mit 12,50 $ verkauft wurden. Bis jetzt haben aber die letzteren noch keine Anstalten zum Nisten gemacht. Mein Bestand an Wellensittichen ist zirka 20. Für die gelben bezahlte ich zwei Jahre später 12 $ per Paar und für die grünen 7,50 $. Letztes Frühjahr kamen aber solche Unmengen von Australien, daß der Preis im Wiederverkauf auf 3,50 $ per Paar herunterging. Was der Engrospreis war, wissen die Götter. Ich füttere Hirse, Kanariensamen und eingeweichte Soda-Cracker, die zur Aufzucht der Jungen sehr gern gefressen werden. Unreifer Hafer, Hirse, Gräser und Vogelmiere werden mit großer Begier gefressen. Nr. 3 war hauptsächlich von Kanarien bevölkert,

Schwarzkopfpirol.

außerdem Zebrafinken, Tigerfinken, Nonnen, einen Nonpareil, Sonnenvögel und Kardinal. Gegenwärtig hausen bloß noch die Zebrafinken und $^1/_2$ Dutzend Kanarienhähne dort. Die Zebrafinken sind sich vollkommen selbst überlassen, es sind zirka 12 Stück. Vier Jahre später kaufte ich 6 Stück, à 50 $, die alle von einem Paar abstammten. Seit der Zeit sind einige gestorben, einige verschenkt und einige von den Ratten gefressen worden und trotzdem gibt es immer noch ein Dutzend. Eier kann man immer finden, Junge gibt es wenig, manchmal eins, sehr oft keins und sehr selten zwei oder drei. Das läßt sich bei der fortgesetzten Inzucht weiter gar nicht anders erwarten. Hübsche Kerlchen sinds, beehb, beehb, beehb trompeten sie, und dabei sind sie dummdreist und, beinahe hätte ich gesagt, gottesfürchtig. Der Verkaufspreis ist hier 2,50—3,50 $ das Paar, je nach dem Vorrat. Als Nester benutzen sie aus Schilf geflochtene Manschetten (strawcuffs, werden von Japanesen angefertigt und von Arbeitsleuten als Ärmelschützer benutzt), von denen ich die Rückseite mit einem Brettchen verschlossen habe. Außerdem benutzen

sie Kanariennester, welche sie mit einem riesigen Aufbau versehen. Was diese kleine Bande für Nestmaterial verbraucht, ist erstaunlich, und sie genieren sich absolut nicht, es den Kanarien zu stehlen. Von den Nonnen kaufte ich im letzten Frühjahr drei Stück zum Preise von 3 $ für die drei, es waren gerade eine Unmenge angekommen. Einen Vogel verlor ich und die anderen zwei befinden sich anscheinend ganz wohl im Freien. Diese Nonnen sind sehr scheu und immer versteckt, ob es ein Paar ist, läßt sich nicht sagen. Der Papstfink ging mir leider kurz nach der Mauser ein; der Umschlag im Wetter und sein scheues Wesen waren jedenfalls die Ursache. Als ich den Vogel in die Voliere brachte, war er zahm, badete, sonnte sich und ließ es sich gefallen. Aber der Eindruck, den er auf die Kanarien ausübte, war einfach unglaublich. Wo sich der Fink niederließ, stob alles auseinander, und schließlich wurde der Vogel so scheu, daß er sich kaum aus dem Versteck hervorwagte. Jedenfalls wäre es besser gewesen, wenn ich den Vogel in seinem Käfig in die Voliere getan hätte, aber ich hatte mir ja nicht träumen lassen, daß die Kanarienvögel sich so verhalten würden. Die Zebrafinken gaben nichts um ihn, sie betrachteten ihn nur von allen Seiten und mit einem beehb-beehb war die Sache erledigt. Bezahlte 3,75 $ für den Vogel. Mit den Kanarien werden weiter keine Umstände gemacht, außer den eingeweichten Sodakrackers gibt es noch Ei während der Heckzeit. Auch vermenge ich das Weichfutter mit Paprika, um die Farbe der Vögel aufzubessern.

Voliere Nr. 4 und 5 beherbergten Zwerghühner, späterhin Tauben, bis die Ratten mir den Spaß verdarben. Ich mußte ausräumen, zementierte den Boden und habe augenblicklich meinen Hund dort einquartiert, ein schottischer Schäferhund, der bereits 12 Jahre in meinen Besitz ist. Nr. 6 ist von Modeneser Haustauben und einem Paar Perrückentauben bevölkert. Mit der Zeit werden jedenfalls noch einige Tümmler dazu kommen.

Zum Schluß möchte ich noch dem Wunsche Ausdruck geben, daß sich Deutschlands Geschick so zum besten wenden möge, daß jeder Vogelliebhaber es ermöglichen kann, sich einige Vögel zu seiner Freude zu halten. Möge auch unsere Zeitschrift, die „Ges. Welt", wieder aufblühen, so daß sie ihren früheren Höhepunkt erreicht, dazu gehören nicht nur gute Beiträge, sondern auch eine lebhafte Unterstützung durch Anzeigen usw.

Ornithologische Beobachtungen auf einer Eisenbahnfahrt.

Von Hans Passig.

(Fortsetzung und Schluß.) (Nachdruck verboten.)

Bei Überfahrt der Dosse sehe ich auf diesem Flusse zwei Stockenten schwimmen, auf einem Pfahl am Ufer hat sich soeben eine Schafstelze niedergelassen, fliegt nun aber wieder davon. Unter Buchfinkengeschmetter in hohen Bäumen gelangen wir an auf Bahnhof Neustadt a. Dosse. In den Anlagen lassen sich mehrere Kohlmeisen hören. Grünfinken beleben die Gärten. Auf der fortgesetzten Fahrt bemerke ich in einem Weidengebüsche zwei Nonnenmeisen. Von einem Acker fliegen einige Rebhühner auf. Ein Gartenrotschwanz „knickst" auf einer Bahnwärterbude. Nun ist Friesack erreicht. Viele Hausschwalben bewegen sich im Himmelsblau, einige lassen sich flatternd nieder auf die Leitungen am Bahnkörper. Sperlinge beider Arten „schilpen" auf dem Dache eines Güterschuppens. Auf der folgenden Strecke erscheinen viele Krähen, meistens Nebelkrähen, sie belästigen und verfolgen einen Sperber. Plötzlich ertönt von der Maschine des Zuges das Achtungssignal und — — rrrßßß — da halten wir auf freier Bahnstrecke. Neugierige und besorgte Gesichter erscheinen an den Abteilfenstern: Was ist los? Kein Unfall hat sich ereignet. Gleisverbesserungen nur erfordern das Halten des Zuges auf Minuten. Ich nutze die Zeit zum Ausblick auf die weite flache Gegend. Dabei höre ich den Gesang zahlreicher Lerchen, Rufe von Kiebitzen und kleineren Regenpfeifern wie auch die Melodie des Grauammers. Einige Hasen bewegen sich auf den Wiesen. Bei einem nicht weit entfernten Wärterhause krächzt ein Hahn. Im dabeiliegenden Garten auf einem Obstbaume schwatzt eine Elster. Vorsichtig wird der Zug weiter geleitet. Auf einem ausgeworfenen Kieshaufen nahe am Gleise trippelt eine zutrauliche Haubenlerche umher und duckt sich, als der Zug vorüberfährt, fliegt aber nicht fort. Eine Weihe — die Art vermag ich nicht zu bestimmen — schwebt in der Fahrtrichtung dahin und läßt sich beobachten fast bis zur Ankunft auf der Haltestelle Vietznitz, wo ich nur wenig Vogelleben bemerke, doch höre ich Rohrsängerlaute und gleich nach der Abfahrt sehe ich an einem mit Weiden bewachsenen Graben ein Blaukehlchen. Schafstelzen erkenne ich mehrmals, während sie auf der Drahteinfriedigung der Viehweiden sitzen. Nach der Einfahrt auf Station Paulinenaue jubeln wieder die Spatzen. Hausrotschwänze singen lebhaft in den Gärten und auf den Dächern. Buchfinken „trompeten" zu unserer Weiterreise. Ein Turmfalke fliegt zum nahen Walde. Hin und wieder „klettert" eine Feldlerche in die Luft. Schon fährt der Zug weniger geräuschvoll, so daß ich den Gesang einer Zaungrasmücke gut vernehmen kann, und hält gleich darauf an auf der Haltestelle Bergerdamm, wo sich im Gebüsch verschiedene Vogelarten tummeln, vorzüglich Grasmücken. Nach gar nicht langer Fahrt, nicht weit entfernt von der Haltestelle rennen in kurzen Abständen voneinander zwei Fasanen ins Feld hinein. Auffällig und neu für mich bietet sich mir dann eine besondere Erscheinung. Auf einer Fläche mit nicht besonders hohem Graswuchse, doch nur so weit von der Eisenbahn entfernt, daß noch ein Erkennen möglich ist, bewegen sich zwei große Vögel, der eine richtet sich hoch auf, der andere scheint Nahrung zu suchen. Ich staune, doch ist kein Zweifel möglich: Großtrappen sind es! Ist es denkbar, daß die sonst so scheuen Tiere sich soweit an den Anblick des täglich sich wiederholenden Zugverkehrs gewöhnt haben, daß sie keine Furcht bekunden, während man dieselben sonst kaum zu Gesicht bekommt? Ich denke noch darüber nach, als der Schaffner schon „Nauen" ruft, auf welcher Station mir dann die verhältnismäßig zahlreichen

Rauchschwalben auffallen. Auch Feldsperlinge sind reichlich vorhanden, ebenso Stare. Schnell geht die Fahrt weiter. Über sumpfartigem Gelände „gaukeln" zahlreiche Kiebitze. Rehe und Damm-hirsche äsen am Waldessaum, ohne sich um das Zuggerassel zu kümmern. Über dem Walde dies-seits Finkenkrug flattern Wildtauben, weiterhin be-merke ich noch einen Raubvogel, der ein Mäuse-bussard sein könnte, doch in der Entfernung erkenne ich die Art nicht. Vorbei an Finkenkrug und Seege-feld gelangen wir bald in Spandau an. Daselbst und auf der Strecke bis Berlin kommen noch mancherlei gut erkennbare Gefiederte zu Gesicht, wie Stare, Spatzen und auch graue Fliegenschnäpper. Mehrmals sehe ich fliegende Möwen. Bald merkt man, daß man in den Bereich der Großstadt kommt. Viele Rauchschwalben eilen über uns kreuz und quer dahin. Auf gesondert stehenden Fabrikanlagen sitzen einige Raben- und Nebelkrähen. Zahlreiche Turmschwalben rasen in dem weiten Raum über dem Häusermeere wie toll auf und ab und nach Begrüßung durch eine Anzahl buntfarbiger Haus-tauben und schornsteinfegerartig gekleideter Spatzen ist die Eisenbahnpartie beendet. — „Berlin, Lehrter Bahnhof, alle aussteigen"!

Kleine Mitteilungen.

Wo siedeln sich die jungen Schwarzstörche an? Wer Ge-legenheit hat, ausgiebige Beobachtungen an besetzten Schwarz-storchhorsten zu machen, dem wird und muß es auffallen, daß die Vermehrung von Brutpärchen eine nur mäßige ist; ich habe dies auch s. Zt. Professor Schalow mitgeteilt und hat Schalow in seiner Ornis Marchica, Seite 240 darauf hin-gewiesen. Als ich am 1. Oktober 1911 von Eberswalde nach der Oberförsterei Hochzeit hinversetzt wurde, suchte ich in den reichlich vorhandenen Altholzbeständen nach Raubvogelhorsten; neben vielen andern fand ich auch einen Schwarzstorchhorst auf einer Kiefer in ca. 20 m Höhe dicht am Stamm stehend, daß dieser Bau besetzt gewesen war, konnte ich noch recht gut erkennen, reichlich weißes Gekälk am Horstbaum, sowie an den Nachbarstämmen war gut sichtbar, einige Schwung-federn von nigra fand ich; die Vegetation rings um den Horstbaum war eine üppige, soweit dies die vorgeschrittene Jahreszeit dies noch erkennen ließ. Meine Annahme, daß ich es hier mit einem Schwarzstorchhorst zu tun hatte, wurde durch den Revierverwalter Forstmeister Dittmar, Hochzeit, bestätigt. Hier an diesem schon altbesetzten Horst wollte ich meine Studien und Zählungen an erbrüteten Jungstörchen vornehmen; in den Kriegsjahren 1915—1918 tat dies liebenswürdigerweise Forstmeister Dittmar. Die Zählung ergab; 1912 4 Junge, 1913 3 Junge, 1914 4 Junge, 1915 4 Junge, 1916 3 Junge, 1917 3 Junge, 1918 4 Junge, 1919 4 Junge, 1920 3 Junge, 1921 4 Junge, 1922 3 Junge, 39 Junge in 11 Jahren. Beobachtungen an diesem Schwarz-storchhorst gab Dr. Moeller in den Ornith. Monatsberichten im 48. Bd. 1923, Seite 6 bekannt. Schalow erwähnt in seinem Werk auf Seite 241, daß Lord Rothschild glaubt, daß die alten Vögel die selbständig gewordenen Jungen aus den erbrüteten Revieren vertreiben, dem kann ich aber durch vielfache Beobachtungen nicht beipflichten. Hier nur einige Aufzeichnungen. 13. April 1919 4 Waldstörche kreisend, der eine Vogel gibt leise pfeifende Töne von sich. Anfang April 1920 sah ich in einem anderen Waldteil der Ober-försterei Hochzeit 5 zusammen kreisende Vögel, im Nachbar-orgen saß der Brutvogel auf dem Horst; April 1922 im Beisein Dr. Henrici, Frankfurt a. M., 3 kreisende Vögel, auf dem 100 m entfernt stehenden Horst ebenfalls brütender Vogel. Im Laufe von 11 Jahren habe ich in der weiteren und näheren Umgebung 4 besetzte Schwarzstorchhorste kennen gelernt. Der Waldstorch genießt hier strenge Schonung, wenn auch die heute modern einsetzende Waldwirtschaft viele Altholzbestände, man möchte fast sagen, vernichtet, so trifft dies für die hiesige Gegend noch nicht zu. Daß der Schwarz-storch auch 5 Eier im Gelege hat, erfuhren wir, mein Freund de Vries aus Amsterdam?

Goldstirnblattvogel. Am 25. Juli ds. Js. ist mein Goldstirnblattvogel einem Schlaganfall erlegen. Der Vogel, über welchen ich in der „Gef. Welt" Jahrg. 1916 Seite 89 berichtete, war vom 20. Januar 1914, also 9½ Jahre in meinem Besitz. Er war bis zu seinem Lebensende im Prachtgefieder und vollkommen munter.

Curt Kradisch.

Aus den Vereinen.

A. Z. Angemeldet sind die Herren Paul Liebsch, Großröhrsdorf i. Sa., Bischofswerdaer Str. 241; P. Löding, Sparkassengehilfe, Levinghausen, Post Wattenscheid, Chaussee 74; Paul Hahn, Obermonteur, Augsburg 10, Wartenburgerstr. 42/2; Frau Anna Rischow, Stralsund, Jungfernstieg 3a. — Mtgl. 65 (Müller, Küllstedt) gibt ab 1,0 Nymphe, nimmt in Tausch Weber, Widafinken, Männ-chen Stieglitz, Dompfaff, Goldammer, Birkenzeisig. Mtgl. 221 (Keidel, Hildesheim) sucht 1,1 junge Nymphen und 3 bis 4 junge Wellensittiche, mögl. 1. Brut 1923 zur Blutauf-frischung. Mtgl. 235 (Richter, Bernstadt) verk. oder tauscht 1,1 Goldstirnsittich gegen andere Sittiche oder Körner-fresser. Mtgl. 328 (Blüm, Biebrich) sucht Sittiche jeder Art, Unzertrennliche, Astrilde und Amandinen, Sonnen-vögel usw. gegen bar oder im Tausch für Gesangskanarien, gr. Wellensittiche, 4 Bd. Ruß, Brehms Tierleben, Bd. Säugetiere und Vögel. Mtgl. 305 (Eifrig, Schierke) sucht 1,1 gr. Wellensittiche. Mtgl. 321 (Prayer, Hadersdorf) gibt wegen Auflösung der Wellensittichzucht aus fr. Garten-voliere Jungtiere und Zuchtpaare ab, mögl. gegen Pracht-finken, Weber und Widafinken. Kauft Weber und Wida-finken.

Für die Geschwister Brehm konnten bereits ausge-wiesen werden: Mtgl. 23 100 M., Mtgl. 299 100 M., Mtgl. 14 50 M., Mtgl. 247 50 M., sämtlich in Tausen-den. Weitere Spenden auf Postscheckkonto erbeten.

A. Krabbe.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig. Nächste Sitzungen Donnerstag, den 16. August und Donnerstag, den 6. September 1923, im Vereinslokal „Bauers Brauereirestaurant", Täubchenweg. Gäste sind willkommen.

I. A.: Joh. Birk, 1. Vors., Leipzig-Mockau, Beuthstr. 29.



An unsere Leser! Wiederholt werden von Lesern der „Gefiederten Welt" im Ausland zur Beantwor-tung von Anfragen die Postwertzeichen ihres Landes bei-gelegt. Mit diesen Postwertzeichen kann ich nichts be-ginnen. Zur Freimachung der Antwort sind sie nicht zu verwenden, auf den Briefmarkenhandel kann ich mich auch nicht verlegen, und es kann nicht verlangt werden, daß ich für die Freimachung des Auslandsbriefes einige tausend Mark aus meiner Tasche zahle. Es können in Zukunft Briefe, in denen für die Freimachung der Antwort aus-ländische Postwertzeichen beiliegen, nicht direkt beantwortet werden. — Für briefliche Auskunft ist außer dem Porto für die Rückantwort eine Gebühr von 10000 M. beizufügen, für Sektionen fernere 10000 M.

Herrn X. in Y. Es handelt sich nicht um Vogel-, sondern um Mehlmilben. Universalfutter, in welchem sich Milben aufhalten, ist unbrauchbar. Aus dem Körner-futter werden sie durch Wärme, besonders Sonnenwärme, und durch häufiges Lüften und Umschütten der Samen entfernt. Menschen werden diese Milben nicht gefährlich.

Herrn R. L., Prag (siehe oben „An unsere Leser!"). An dieser Stelle kann ich Bezugsquellen nicht nennen.

Vögel

Suche

1,1 Zwergelsterchen
Zucht- oder Jungtiere. [485
B. Hack, Wiesdorf (Niederrhein), Hindenburgstraße.

Vert. Schindl.-Grasm.-Käf., Wiener Nacht.-Käf., Lerchenkäf., Gef. Welt 1922, Farbent. g. Bast v. Häusl.. Stiegl., Mönch-, Dorn-, Sperbergrasm., Braunelle, Ameiseneier, Weisw. od. Mehlw.
Galle, Forst L., Trieblerstr. 60. [486

Tausche

5 kg geschälten Hafer und Exoten-Mischfutter prima Qualität gegen Wellensittiche od. andere Exoten. Zahle evtl. noch zu. Angebot erbittet **Wisniewsky**, Leipzig-En., Görlitzer Straße 8. A.Z. 329. [487

Suche

2 Zuchtweibchen grüne Wellensittiche 22er und zahle höchsten Preis. Gefl. Offerten mit Preisangabe an **Louis Köther**, Hildesheim, Jacobistraße 11 I. A.Z. Mitgl. 269. [488

---

2 Zuchtpaare [489
gr. Wellensittiche
und 1 Männchen gegen Weizen abzugeben. Bei Anfragen Rückporto beifügen.
H. Dunkel, Lengerich i. Westf. 186.

Papagei

gut sprechend, sowie Kakadus, größere Sittiche, Nuzköpfchen und jap. Mövchen zu kaufen gesucht. Zahle Liebhaberpreise. [490
Angebote an **Fr. Gauter**, Steinen, Amt Lörrach (Baden).

Vert. Ia. lautf. Rotkehlchen geg. Girlitzmännchen. [491
Voigt, Jena, Feodorastraße 13.

---

1 Zuchtpaar
gr. Wellensittiche
zu kaufen gesucht. Offert. m. Pr. erb. **Max Heimann**, Rathenow, Buschstraße 2. A.Z. Mitgl. 334. [492

Sprosser und rotrückigen Würger tausche gegen Rübsen, Ameisenpuppen oder Mehlwürmer. **Karl Nuß**, Königsberg (Pr.), Vord. Vorst. 33. [493

---

20 Jahrg. „Gef. Welt"
1903—22 m. all. Taf. in Orig.-Bänden i. ganzen u. d. Ausland geg. Gebot z. v.
O. Dutzauer, Leipzig-R., [494
Riedelstraße 6 II.

„Ornis" [495
Freie Bezugs-Vereinigung der Waldvogel-Liebhaber Deutschlands
bestand von 1912 bis 1. Oktober 1920. Durch sachgemäße und reelle Belieferung der Mitglieder mit Vogelfutter u. Bedarfsartikeln erwarb sie sich einen Ruf, der noch fortbesteht. — Auf vielseitigen Wunsch bringe ich diese Tatsache in Erinnerung, auch allen denjenigen, die von dem Bestehen derselben noch keine Kenntnis haben. — Ein **Benachrichtigungsblatt** kann leider **nicht** mehr erscheinen, doch ist das Ornis-Haus nach wie vor bestrebt, die besten von allen am Markte erhältlichen Artikeln zu liefern; das mir geschenkte Vertrauen werde ich weiter zu erhalten wissen. — Über meine Tätigkeit gibt das „Ornis-Buch" Auskunft. Rabatt kann **nicht** mehr gewährt werden, doch kommen nur brauchbare Mischungen zum Versand. Bei Anfragen erbitte ausreichendes Rückporto und Angabe der vorhandenen Vogelarten. — Auskunft bereitwilligst. Bücher und Blätter sende für 800 Mk. frei (Ausland 2400 Mk.)
Ornis-Haus, Halle a. S.
Fernruf 4198
„Reform · Normal"-Weichfutter nach Angabe des Herrn Apotheker Adalbert Jena-Biberach-Riß. Moderner elektr. Betrieb. Gleichmäßige Körnung, restloser Verbrauch garantiert.

Reform-Käfige
Zerlegbar · Leichteste Reinigung · Einfachster sicherer Transport
1. Preis beim Käfig-Wettbewerb Leipzig 1919/22 (siehe Gefiederte Welt 1920, Heft 14—16), Goldene Medaille Leipzig 1921/22
werden für alle Vogelarten hergestellt.
Ausführung: Hartholz, grünlackiert oder naturlackiert, Zinkschublade, Porzellannäpfe, Ledertuchdecke.
Keine Fabrikware, sondern beste Spezialarbeit!
Anfertigung als Kistenkäfig oder Wiener Form (halboffen) oder halboffen mit fester Rückwand. Ohne jedes Werkzeug in einer Minute zusammengestellt resp. zerlegt. Verpackung zum Selbstkostenpreis.
Fertigen auch jede Art Käfige u. Volieren n. Zeichnung od. Maßangabe.
Heck-, Flug-, Einsatz-Käfige.
Ausstellungs-Käfige nach Vorschr. d. V. D. K.
Transport-Käfige, jeden Posten.
Anfragen Rückporto beifügen. Katalog gegen Einsendung von 300 M. in Briefmarken.
Schlagnetze ohne Mittelsteg
für schädliche Vögel, prima handgeknüpfte Ware. [498
Kühn & Muschter, Leipzig,
Promenadenstraße 29. Telephon 10 226.
Bankkonto: Allgem. Deutsche Credit-Anstalt Zweigstelle Borna; Stadt-Girokasse Borna b. Leipzig Nr. 1506. — Postscheck.: Leipzig 92 250. — Tel. 147.
Zahlreiche Anerkennungs- und Dankschreiben.

Kaufen laufend zu konkurrenzlos höchsten Preisen:
Kanarienhähne und -weibchen
sowie **Sing- und Ziervögel, Exoten aller Arten, Papageien, graue, grüne usw.**
Kühn & Muschter, Leipzig,
Promenadenstraße 29. Telephon 10 226.
Käfigfabrik und Vogelhandel en gros und en detail
Import. **Export.**
Anfragen Rückporto beifügen. [496

Papageien
Kanarienhähne
Bastarde
kauft höchstzahlend und tauscht auch auf Exoten
Willy Odenwald, Fulda.
Eigner Export und Import. [497

Bitte!

In eigenem Interesse wollen die pp. Einsender beachten, daß
a) **alle für die Redaktion** der „Gefiederten Welt" bestimmten **Zuschriften** (Sprechsaal-Anfragen und -Antworten, Vereinsnachrichten usw.) und **Sendungen** (tote Vögel, Manuskripte) nur an **Herrn Karl Neunzig, Hermsdorf bei Berlin**, Neue Bismarckstr.,
b) **alle Bestellungen** auf **Abonnements, Inserate** und dergl. Geschäftliches nur an die **Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg**, Postschließfach 148,
zu richten sind.

Im Interesse unserer verehrl. Abonnenten bitten wir das

Abonnement auf die „Gefiederte Welt"

für Monat September rechtzeitig erneuern

zu wollen. Die Gefiederte Welt kann sowohl durch den Buchhandel als auch beim Postamt für 7500 Mk. für den Monat **September** bestellt werden.

Direkte Zusendung vom Verlage kann nur noch ausnahmsweise und **nur gegen vorherige Einsendung von 10 000.— Mk.** für den Monat Sept. — Postscheckkonto Magdeburg 3148 — erfolgen.
(Auslandspreis für das III. Vierteljahr 2 Schweizer Franken.)

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg
Postfach 148

Inserate

für das am 6. September 1923 zur Ausgabe gelangende Heft 17 der Gefiederten Welt erbitten bis 31. August 1923 früh.

Die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit **10 Pfg. Grundpreis** berechnet, der mit der vom „Börsenverein der Deutschen Buchhändler" bestimmten Teurungszahl — zurzeit „300 000" — zu multiplizieren ist. — Auslandspreis —,10 Schweizer Franken.

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Hermsdorf bei Berlin; für den Anzeigenteil: Franz Wunderlich, Magdeburg, Postschließfach 14.
Verlag der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck: August Hopfer, Burg Bz. Mgdbg.

Jahrgang LII.
Heft 17/18. 15. September 1923.

Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Die „Gefiederte Welt“ kostet für Monat September 110 000 Mark.
Auslandspreis für das Vierteljahr 2 Schweizer Franken, für das Heft 0,35 Schweizer Franken.
Im Inseratenteil wird die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum mit 10 Pfg. Grundpreis berechnet, der mit der vom „Börsenverein der Deutschen Buchhändler“ von Zeit zu Zeit bestimmten Teuerungszahl (in jeder Buchhandlung zu erfahren) zu multiplizieren ist.
Auslandspreis für die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum —,10 Schweizer Franken.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung (M. Kretschmann) in Magdeburg.
Postschließfach 148. Postscheckamt: Magdeburg 3148. Fernsprecher: 1323.

Ein paar Worte über Alter und Alterserscheinungen einiger höherer Vögel.

Von A. Adlersparre.

(Nachdruck verboten.)

Bei den Vogelpflegern dürfte es ab und zu eintreffen, daß die eine oder andere Art in ihr physiologisches Senium, ihr Greisenalter, eintritt. Wann dies geschieht, die Länge des Seniums und die Art der senilen Veränderungen, das alles wäre zweifellos von großem Interesse kennenzulernen, u. a. vom praktischen Gesichtspunkt als ein Maßstab dafür, wie hoch der Vogelhalter eigentlich sein Ideal stellen sollte. Wollen wir nämlich ohne kindische Eigenliebe ehrlich und anspruchslos gestehen, daß der Vogel, wenn er eines vorzeitigen Todes stirbt, eine unphysiologisch kurze Lebenszeit aufweist, dann liegt der wirkliche Fehler nicht an ihm selbst, nicht darin, daß er, wie die trügerische Phrase lautet, weichlich ist! Denn jeder Vogel ist kräftig, wenn er nur die individuell richtige Pflege bekommt. Sondern die Schuld liegt an uns, seinen Wärtern, in unserem leider noch unvollkommenen Können, seine wirklichen Bedürfnisse völlig zu erkennen. Krankheit ist nämlich immer mit mangelhafter Pflege gleichbedeutend (wenn auch nicht immer mit Verwahrlosung) und tritt nie und nimmer auf, ohne daß pathologische (krankmachende) Reize da sind, welche Reize die erstrebenswerte ideale Pflege — zum Unterschied von dem lange nicht idealen Freileben — fernhalten soll. Aber an irgendwelche Lebensperiode ist dagegen Krankheit nie unauflöslich geknüpft, weder an Greisenalter noch an irgendeine andere.

Eine senile Veränderung, die unter Vögeln nicht selten vorkommen dürfte, ist grauer Star, Katarakt. Aus meiner langjährigen Vogelpraxis erinnere ich mich wenigstens mehrerer solcher Fälle besonders unter Möwchen und Kanarienvögeln. Grauer Star, wie bekannt eine Trübung der Augenlinse, kommt in verschiedenen Lebensaltern und aus verschiedenen Gründen zustande, steht aber, wo er seniler Natur ist, zweifellos im Zusammenhang mit Nutritionsstörungen innerhalb des Auges und derjenigen Gefäßverkalkung, die im Senium gewöhnlich ist. Operative Eingriffe, nach welchen bekanntlich Korrektionsgläser erforderlich sind, dürften für Kleinvögel in der Regel nicht befürwortet werden können. Dagegen ist es mir s. Zt. in zwei Fällen von frühzeitiger, partieller Trübung bei sonst munteren und lebhaften Individuen durch innerliche und äußerliche Jodkaliumbehandlung gelungen, den sehr befriedigenden Erfolg zu erreichen, daß die Trübung, die sonst bei Kleinvögeln ziemlich rasch fortschreitet und baldige Blindheit bringt, in dem einen Fall vollständig verschwand, in dem anderen sich merkbar verminderte und anscheinend das Sehen nicht länger genierte, was das Leben der beiden Vögel um rund ein Drittel verlängerte, denn blinde Vögel hält man ja nicht gerne. Die Erklärung der vorteilhaften Wirkung von Jodkalium liegt zweifellos in dessen resorptionsfördernder Einwirkung auf viele krankhafte Prozesse. Da indessen Jodkalium durchaus nicht ein ungefährliches Mittel ist und in ungewohnten Händen leicht mehr Schaden als Nutzen bringen könnte, begnüge ich mich hier, die Tatsache zu konstatieren, und befürworte, daß man bei Bedarf sich an einen Fachmann wendet, der weiß, wo und wie er schon im frühesten Stadium Äußerungen der bisweilen überaus starken Intoleranz (Idiosynkrasie) aufzuspüren und zu beseitigen hat, damit das Tierchen nicht unnötigerweise leidend wird.

Bei vielen Vögeln entwickelt sich als physiologische Altersveränderung ein Ergrauen bis Weißwerden der Federn, eine Canities senilis. Vorzugsweise, wie es scheint, da, wo melanoide Pigmentierung vor-

liegt. Die Federfarbstoffe der Vögel sind nämlich zweierlei Arten: Melanine und Lipochrome. In die erste Gruppe gehören Pigmente, die braune und schwarze Farben verursachen, in die letzte Gruppe Gelb und Rot. Die grüne Farbe wird oft durch Zusammenwirkung von Melanin mit gelbem Lipochrom zuwege gebracht. Geht nun der gelbe Anteil des Grüns verloren, während der melanotische beibehalten wird, und begünstigen zudem die äußeren Zellenschichten der Federn das Aufkommen gewisser Lichtbrechungsverhältnisse, so entsteht blaue Farbe (vgl. Wellensittiche). In ähnlicher Weise kann auch erklärt werden beispielsweise das Blau des Himmels (Lichtbrechungsphänomene; Hintergrund, Himmelsraum, praktisch genommen schwarz — vgl. die Nacht) und das Blau des Auges (vordere, lichtbrechende Schichten der Regenbogenhaut pigmentfrei; dahinter in stratum pigmenti der pars iridica retinae Melanin, fehlt auch letzteres, wird die Regenbogenhaut rötlich). Geht auch der Melaninanteil verloren, wird die blaue Feder weiß; ein Beispiel hierfür dürfte ein ergrauender Granatfink in meinem Besitz geben. Verliert dagegen die grüne Feder den Melaninanteil, behält aber das Lipochrom, dann wird die Farbe gelb (vgl. Wellensittich und Kanarienvogel). — Der lipochrome Farbstoffanteil scheint sich s. Z. sehr hartnäckig beibehalten zu wollen. Während ich Fälle seniler Canities bei verschiedenen Arten mit melanoider Pigmentierung gehabt, Möwchen, Granatfink, Zebrafink (bei letzterer Art auch ein paar Fälle von partiellem Albinismus, d. h. angeborener, in den Erbsubstanzen begründeter Pigmentlosigkeit), so habe ich unter meinen Vögeln noch nie einen Fall von Weißwerden lipochrom gefärbter Federn zu verzeichnen. In gutem Einklang hiermit steht die Tatsache, daß das Gelbwerden grüner Farben gewöhnlicher ist als das Blauwerden, zumal letzteres verhältnismäßig selten vollkommen rein ist, oft wird (wie bei Wellensittichen) mehr oder weniger Gelb s. Z. „mitgeschleppt", welches dem Federkleid wenigstens partiell einen mehr oder minder grünlichen Anflug gibt. Indessen gibt es ja albinistische Rassen lipochrom gefärbter Vögel, beispielsweise Wellensittich und Kanarienvogel; diese dürften aber, wo sie wirklich weiß sind und nicht nur scheinbar, verhältnismäßig selten vorkommen. — Der Grund einer senilen Canities dürfte in Altersveränderung der Federpapille liegen. Es gibt aber auch Fälle von frühzeitigerem Weißwerden; sie können durch Stoßverletzungen einer oder mehrerer Papillen (wie bei einem meiner Braunrückenelsterchen: Flügellahm von Ankunft, Sturzfall auf Schwanz) oder durch Hautentzündungen u. a. m. entstehen. In ähnlicher Weise ist zweifellos auch die nicht seltene Entstehung anormal gefärbter Federn im Grün mehrerer Papageien zu verstehen; die Papille wird aus irgendwelchem Grunde beschädigt, sei es durch Intoxikation infolge Insektenbisses, sei es durch menschliche Eingriffe o. a., der Melaninfaktor fällt weg und die Feder wird gelb oder gelbrot. Der Canities und dem Albinismus gegenüber fasse ich solche durch verschiedenartige äußere Reize bewirkte Fälle von Weißwerden als leukopathische Veränderungen zusammen. Aus vorstehendem dürfte schließlich auch ersichtlich sein, daß man bei anormaler Färbung nicht voreilig zur Verbastardierung als Erklärungsgrund greifen soll, was sonst in vielen Fällen recht nahe liegt!

Noch weitere Alterserscheinungen sind beispielsweise Abmagerung, erhöhte Kälteempfindlichkeit, stoßweise Mauser, wo diese im Alter der Reife mehr gleichartig verlief, schließlich auch wucherndes Wachsen von Krallen, Hornbedeckungen des Fußes und Schnabels. Letzterem wird des öfteren eine allzu große und ausschließliche Bedeutung beigemessen. Ein sicheres Kennzeichen höheren Alters ist das nicht. Ich habe Einjährige mit sehr üppig wachsenden Krallen, Fußdecken und Schnäbeln schon mehrmals gesehen, aber auch Bejahrte, die in angeführter Hinsicht von normalen jugendlichen Individuen kaum merkbar verschieden waren! Einigermaßen sicher kann man deshalb nur dann sein, wenn mehrere Altersveränderungen gleichzeitig da sind. Eine isolierte Erscheinung dürfte man kaum berechtigt sein für ausschlaggebend zu halten!

Der Eintritt des Seniums läßt sich nicht immer leicht fixieren. Bei Möwchenweibchen scheint dieses, obgleich individuelle Variationen natürlich vorkommen, im allgemeinen im sechsten Jahre zu beginnen, in welchem Alter Weibchen bei mir verkümmerte, gelblose Eier legten. Bei Männchen dürfte das Greisenalter noch etwas später eintreten. Die Dauer des Seniums scheint bei Möwchen auf 3—4 Jahre, die physiologische Lebenslänge also auf zirka zehn Jahre geschätzt werden zu können. — Auch in betreff Gouldamandinen bin ich in der Lage, einige Daten darzulegen. Ein im Vorsommer 1914 importiertes, zu der Zeit nur teilweise neuvermausertes, jedoch aber vollständig ausgefärbtes, also nicht später als im Vorjahre 1913 (meines Erachtens jedoch früher) ausgebrütetes Weibchen legte noch im Frühjahr 1919 Eier, aus welchen normale Junge ausgebrütet wurden; im Herbst desselben Jahres wurden jedoch nur „Hexeneier" gelegt. Alter also bei Eintritt des Seniums nicht geringer als sechs Jahre. Betreffendes Weibchen ging am 20. November 1922 ein; meine Sektion bestätigte, daß die Todesursache Lungenentzündung war, eine im hohen Alter ziemlich allgemeine Krankheit sowohl bei den Vögeln als bei Menschen. Das Senium des Gouldmännchens tritt anscheinend noch später als das des Weibchens ein. Ein im Vorjahre 1913 in vollem Alterskleid eingeführtes, also spätestens im Vorjahre 1912 ausgebrütetes Männchen, welches, anscheinend von einer Körnerfutterpartei des Jahres 1920 infektiert, am 5. Juli 1921 an einer aktinomykoseartigen Geschwulstkrankheit einging, erwies, trotz seiner neun Jahre, außer ziemlich unbedeutender Wucherung der Fußbehornung keine auffallenden Alterserscheinungen. Auch ist ein im Herbst 1914 bei mir ausgebrütetes Männchen, das sich noch in meinem Besitz befindet, volleibig, kälteunempfindlich und, natürlich außer der Mauserzeit, sehr munter und lebhaft; wenn ein Nest da ist, sogar stürmisch. Ich glaube deshalb berechtigt zu sein, die physiologische Lebenslänge der Goulds auf zirka 12 oder vielleicht sogar auf 15 Jahre mit einem Senium von wahrscheinlich mehr denn drei Jahren zu schätzen. In diesem Zusammenhang brauche ich wohl kaum darauf hinzuweisen, daß die

durchschnittliche Lebenslänge der Art sowohl im Freien als in der Gefangenschaft bedeutend kürzer ist. So z. B. sollen zahlreiche importierte Pärchen, gleichwie es der Fall bei mehreren anderen Arten ist, nur die ersten wenigen Wochen beim Liebhaber überleben, was natürlich in einer Durchschnittsstatistik mitgerechnet werden muß. — Zebrafink verhält sich etwa wie Möwchen, wahrscheinlich so auch Braunrückenelsterchen. Das Alter meines Granatfinken läßt sich leider nicht genauer bestimmen. Außer dem Ergrauen im Braun, Schwarz und Blau zeigt er nunmehr regionär stoßweise Mauser und eine gewisse Kälteempfindlichkeit, die nicht gut mit einem südafrikanischen Winterbrüter (vgl. Stark: Birds of South Africa, Vol. I, S. 104—105) im besten Lebensalter zusammengehören kann. Er scheint völlig gesund, ist kaum mager, auch nicht merkbar verändert in bezug auf Füße, Krallen und Schnabel. Wahrscheinlich ist er jedoch ziemlich alt. Ein Flammenweber, der, im Prachtkleid eingekauft, etwa 15 Jahre in meinem Besitz war, ehe er einging, schien ein Senium von zirka fünf Jahren zu haben. Er wies schließlich in auffallendem Grade alle Alterserscheinungen auf, außer der einer Canities, welche letztere ich nebenbei auch nie im Schwarz älterer Goulds gesehen habe.

Stockholm, den 30. Juni 1923.

Etwas über die Heckenbraunelle.

Von Fritz Wagner, Bildstock.

(Nachdruck verboten.)

Ich möchte den geehrten Lesern der „Ges. Welt" heute einmal mitteilen, wie ich zu meiner Heckenbraunelle kam, einem Vogel, der anscheinend in Liebhaberkreisen noch viel zu wenig gewürdigt wird, und doch kann ich mir als Käfigvogel fast kein liebenswürdigeres, zutraulicheres Tierchen denken. Wenn ich ihm durch nachstehende Zeilen neue Freunde erwerben könnte, wäre ihr Zweck erfüllt. Eines Tages, es war am 15. Mai 1923, erhielt ich von einem Bekannten ein kleines, kaum aus dem Ei geschlüpftes Vogelbaby, angeblich war es das letzte einer fünfköpfigen Kinderschar. Die Geschwister waren alle tot, da das Nest infolge des andauernden Regens und der großen Kälte, oder sonst eines Umstandes, verlassen war. Art und Gattung konnte ich nicht feststellen, denn der kleine war noch fast nackt. Rücken und Flügel jedoch ließen eine bräunliche Farbe erkennen. Das sehr dünne Schnäbelchen war außen wie auch innen von fleischroter Farbe. Nachdem ich mir das Nest beschreiben ließ, welches in einem Dornengestrüpp stand, glaubte ich die Dorngrasmücke vor mir zu haben. Das Tierchen war sehr schwach, so daß ich wenig Hoffnung hatte, es am Leben zu erhalten. Doch frisch gewagt ist halb gewonnen und ohne Fleiß keinen Preis. Ich ging also in den Garten, in dem es an Regenwürmer nicht mangelte, suchte einige kleine Würmer, die größeren zerschnitt ich (übrigens keine angenehme Beschäftigung, welche viel Mühe und Zeit kostet, mir auch manchmal den Appetit verdorben hat). Gierig schluckte der kleine die ihm gereichten Würmer, und andern Tages konnte ich ihn als gerettet betrachten. Ich fütterte nun ausschließlich Regenwürmer, was sich auch bei verschiedenen anderen Arten von Weichfressern, die ich so aufpäppelte, bewährt hatte. Nach ungefähr acht Tagen gab ich dann auch getrocknete Ameiseneier, da ich mir frische nicht beschaffen konnte, auch diese wurden gern genommen. Daß meine Fütterung richtig war, bewiesen mir die guten Fortschritte, die mein Pflegling machte. Unheimlich war aber auch die Menge Würmer, die in dem kleinen Schnäbelchen verschwanden. Am zehnten Tage sah ich ihn zum erstenmal allein fressen, allerdings noch recht unbeholfen. Ich fütterte noch einige Tage, natürlich nicht mehr so oft, bis

Graukardinal.

er dann selbständig war. Immer noch glaubte ich, eine Dorngrasmücke zu besitzen, bis er sich nach glatt verlaufener Mauser in seinem neuen Kleide präsentierte und sich als Heckenbraunelle vorstellte. Es war mir allerdings vorher schon aufgefallen, daß sie sich oft und gern auf dem Boden aufhielt, sich daselbst auch sehr geschickt bewegte, was die Grasmücken ja bekanntlich nicht tun. Heute nun, nach einer zweimonatigen Pflege, hat sich meine Heckenbraunelle zu einem wahren Prachtexemplar ihrer Gattung entwickelt. Daß sie als Käfigvogel noch nicht so bekannt ist, wird wohl auch auf ihr verstecktes Leben, das sie auch draußen führt, zurückzuführen sein, denn selten bekommt man sie draußen zu Gesicht; da sie nicht leicht das schützende Gebüsch verläßt und man eher glaubt, eine am Boden dahinhuschende Maus zu sehen. Jedenfalls hat sie mir schon sehr viel Freude bereitet. Morgens, sobald ich in das Zimmer trete, in dem sich auch noch in Einzelkäfigen je ein Buchfink und ein Hänfling befinden, beide von mir vor etwa drei Jahren aufgepäppelt, begrüßt sie mich mit lautem, durchdringendem „sit-sri-sri-siri", und die helle Freude guckt ihr

aus den Augen, wenn ich ihr nun die Käfigtür öffne und sie zutraulich auf meinen Finger springt, um einen Leckerbissen in Gestalt eines Mehlwurms oder Stubenfliege zu erbetteln; auch kleine Regenwürmer nimmt sie noch gern. Gegen fremde Personen ist sie immer etwas mißtrauisch, doch nie scheu. Als Futter gebe ich ein gewöhnliches Mischfutter (Drosselfutter), welchem ich noch getrocknete Ameiseneier sowie etwas gequetschten Hanf zusetze, täglich einige Stubenfliegen und 1—2 Mehlwürmer, ferner in einem besondern Napf allerlei kleine Sämereien, darunter Mohn als Hauptbestandteil, auch die Haut der gekochten Milch nimmt sie als Abwechslung gern. Als Bodenbelag verwende ich frisches Moos, ich halte das für besser als Sand; erstens bleibt es länger sauber, zweitens hat es auch immer einen angenehmen frischen Geruch. Bei dieser Pflege befindet sie sich sehr wohl, was sie mir durch liebevolles Wesen und vertrauensvolle Hingabe zu erkennen gibt. Ich erwarte nun noch den Augenblick, wo sie ihr munteres, anspruchsloses Liedchen zum besten geben wird, was wohl auch nicht mehr allzulange dauern wird, denn in ganz früher Morgenstunde höre ich öfter ein leises, kaum dem Ohre vernehmbares Trillern und Zwitschern. Wenn sie auch als Sängerin nicht viel in Betracht kommt, so hat ihr Liedchen doch etwas Munteres, Frisches und wird immer gern gehört. Ich kann darum die Heckenbraunelle jedem, der nicht allzu anspruchsvoll in bezug auf Gesang ist, nur empfehlen. Sie trägt sich immer sehr schmuck im Gefieder und soll auch nach Angaben bekannter Ornithologen lange Zeit im Käfig ausharren.

Aus meiner Vogelstube.

Von S. Lichtenstaedt.

(Schluß.) (Nachdruck verboten.)

Eine eigenartige Beobachtung habe ich bei manchen Weibchen gemacht. Dieselben bekommen auf der Nasenwachshaut eigenartige dunkle Risse und Flecke, ja häufig platzt die Wachshaut förmlich auseinander. Allmählich nimmt sie eine dunkle Farbe an, sieht förmlich zerfressen aus und verunziert den Vogel ungemein. Solche Weibchen zeigen nicht die alte Munterkeit, sind bissig, verlassen Eier und Junge und zeigen häufig alle Anzeichen eines Unwohlseins. Solche Wachshäute werden überhaupt nicht mehr glatt, werden zwar im Laufe von Monaten etwas heller, bleiben aber immer runzelig und höckerig. Es scheint hier eine eigenartige Verderbnis der Säfte vorzuliegen, jedenfalls entferne ich solche Weibchen wenn irgend möglich aus der Zucht, denn alle oben beschriebenen „Teufel“ hatten solche anormale Wachshaut. Jedem Züchter rate ich dringend, nur Zuchtweibchen unter den Wellensittichen zu wählen, welche eine glatte hellkaffeebraune Wachshaut zeigen, welche keinerlei Flecken oder Unebenheiten aufweisen. Es wäre interessant, hier die Erfahrungen anderer Züchter mit Weibchen zu erfahren, welche eine runzelige dunkle Nasenhaut aufweisen. Meine Erfahrungen mit solchen sind die denkbar schlechtesten. Zur Zucht soll man auch unter den männlichen Wellensittichen nur solche wählen, welche eine leuchtend blaue glatte Nasenhaut zeigen, ohne alle Runzeln und Risse. Man kann durch die mehr oder weniger große Schönheit und Glätte der Nasenhäute bei den Wellensittichen geradezu auf mehr oder minder gute Zuchtvögel schließen.

Laut biblischer Vorschrift soll der Mensch am Sonntage ruhen. Für uns Vogelliebhaber trifft dieses aber nicht zu, denn gerade am Sonntage ist Arbeitstag: Großreinemachen. Diese Arbeit soll jedoch nicht eigentlich Mühe und Plage machen, sondern soll Vergnügen bereiten, Vergnügen allerdings nur dem, der mit Leib und Seele dabei ist. Beachte, freundlicher Leser, folgendes: 1. Halte nicht mehr Vögel, als du ohne Mühe versorgen und reinigen kannst; 2. Halte diese in solchen Käfigen, Volieren oder meinetwegen auch Vogelstuben, welche praktisch gebaut oder eingerichtet sind.

Meine sämtlichen Volieren haben hohe Stollen, praktische genau passende Zinkschubkästen, nach meinen eigenen Angaben eingebaute äußerst praktische Futtervorrichtungen, in denen nichts beschmutzt werden kann, und zweckentsprechend eingebaute Türen, welche selbst der intelligenteste Sittich nicht öffnen kann. Der Name von Meister Schindler und Manecke bürgen für tadellose Arbeit. Als Bodenbelag benutze ich ausschließlich sehr groben Seesand. Feiner Sand fliegt bei jedem Herumtollen der Vögel ins Zimmer, der schwere bleibt hübsch säuberlich im Käfig. Ausgewaschen werden alle Käfige mit Cellocresol (ungiftig, vorzüglich desinfizierend) oder verdünntem Kreolin. Als Sitzstangen haben meine sämtlichen Sittiche Weiden oder Holunderruten. Ich kann jedem Liebhaber raten, die scheußlichen, gleichmäßigen Holzstangen aus seinen Käfigen zu verbannen.

Die geschmeidigen, verschieden dicken Ruten werden von den Sittichen stets vorgezogen. Häufig benutzen meine Sittiche ganz dünne Stangen zum Schlafen, kaum drei Millimeter dick, ein andermal wieder dicke Äste zum Übernachten, ein Zeichen, daß auch der Fuß Abwechslung haben will. Die Reinigung solcher Ruten, wenn man es nicht vorzieht, sie stets zu erneuern, geschieht leicht durch warmes Wasser. Kein unangenehmes Kratzen und Waschen wie bei den scheußlichen Holzstangen.

Alle Sittichnistkästen müssen häufig kontrolliert werden, müssen deshalb leicht zugänglich in der Voliere angebracht werden. Sind meine jungen Wellensittiche beispielsweise acht Tage alt, so werden sie vorsichtig aus dem alten Nistkasten gehoben, dieser gereinigt, frisches, im Winter leicht angewärmtes Sägemehl hereingeschüttet, nachdem vorher eine tüchtige Prise Insektenpulver verspritzt wird, und die Tierchen wieder in ihr sauberes Nest gelegt. Mutter und Kinder nehmen so etwas niemals übel. Bei großen Gelegen (4—6 Jungen) wiederhole ich diese Prozedur nach 14 Tagen nochmals.

Als mein Ideal schwebt mir aber noch etwas anderes vor. Vielleicht kann ich im kommenden Frühjahr dieses Ideal verwirklichen. Eine große Freivoliere, 10 Meter lang, 6 Meter hoch, überdacht, naturgemäß mit dicken, ausgehöhlten Baumstämmen ausgestattet, ein Urwald im Kleinen, bevölkert mit 30—40 Paar farbenprächtiger Sittiche, Sommer und Winter im Freien — das ist mein

Ideal, ob ich es erreiche und wie ich es erreiche, das werde ich vielleicht den freundlichen Lesern unserer „Gefiederten Welt" im Frühjahr berichten.

Bei der großen Auswahl, welche ein Exotenliebhaber unter den vielen Arten hat, sollte jeder Liebhaber unbedingt nur eine bestimmte Art Exoten pflegen. Sonst verzettelt er sich zu viel, und die Geschichte wächst ihm über den Kopf. Prachtfinken, Weber, Sittiche, Weichfresser, jede Art bietet ihm genügend Auswahl. Ich bleibe nur noch den Sittichen treu, und hoffe von diesen interessantesten Exoten noch manches dem freundlichen Leser berichten zu können. Deshalb schlug ich auch alle Angebote von Händlern, welche hier nicht hereinpassen, aus. Sonnenvögel (Zuchtpaare), graue Kardinäle, Textorweber, Zebrafinken und ein Transport Araras trafen in den letzten Wochen ein, allerdings zu Preisen, gegen die die früher gezahlten geradezu geschenkt waren. Mit dem Dollar steigen eben auch die Preise für unsere Lieblinge. Allmächtiger Dollar, welcher selbst bis in unsere Käfige seine Macht ausübt.

Schamadrossel (Jugendkleid).

Brutbeobachtungen von 1917.

Von Ernst Aellen, Korntal.

(Nachdruck verboten.)

Noch nie habe ich mich so stark nach dem ersten Nest, nach dem ersten Gelege gesehnt wie dieses Jahr! Noch nie habe ich aber auch so lange darauf warten müssen. Während in früheren Jahren die ersten Amsel-, Singdrossel- und Goldammergelege schon Ende März, Anfang April anzutreffen waren, mußte ich mich heuer bis Ende April, auf das erste Goldammergelege sogar bis Mitte Mai gedulden. Der Grund liegt meines Erachtens nur in der überaus verspäteten Abreise des Winters. Haben die rauhen West-, Nordwest- und Nordostwinde es doch vermocht, verschiedene Angekömmlinge wieder zur Abreise aus meinem Beobachtungsgebiet zu bewegen und den an wärmelnden Februartagen schon aufgelebten Gesang bis Ende April ganz oder doch teilweise zu ersticken!

Wenn der vergangene Winter mit seinen ungemein starken Nachtfrösten, seiner bis in den April hinein unter 0° bleibenden Bodentemperatur und seiner lange standhaltenden Schneedecke so manches Vogelleben vernichten konnte — wie manchmal brachte ich doch von meinen täglichen Gängen Vögel heim, deren Magenprobe ergab, daß sie verhungert und dann erfroren waren! —, hat glücklicherweise der Sommer mit seinem infolge der lange anhaltenden warmen Witterung überaus großen Futterreichtum eine staunenswerte Fülle von Jungen flügge werden lassen. So dürfte die Natur ihren selbstverschuldeten Fehlbetrag wieder gutgemacht haben! Und in der Tat wimmelt es jetzt von Finken und Ammern, Meisen und Drosseln, Grasmücken und Buntkehlchen, und so viel Stare wie heuer habe ich mein Lebtag noch nie gesehen! Wie der Jahrgang 1917 eine selten reiche Getreide-, Wein- und Obsternte gebracht hat, so war er auch im Vogelleben und, wie mir scheint, auch für die kleineren Säuger fruchtbar.

Wenn auch der harte Winter mit seinen Entbehrungen im allgemeinen keinen Einfluß auf das Gelege auszuüben vermochte, so glaube ich doch, einzelne, besonders in diesem Jahre, und zwar nur bei der ersten Brut aufgetretene Absonderlichkeiten dem Futtermangel in den ersten Wochen der Ankunft zuschreiben zu müssen.

Erstens habe ich einige Gelege gefunden, deren Eier außergewöhnlich stark hinter dem Durchschnittsmaß zurückgeblieben sind. Sie allesamt sind gar nicht zum Ausschlüpfen, wohl aber bis zu einer gewissen Entwicklung gekommen, vielleicht nicht nur wegen der Kleinheit des einzelnen Eis, sondern auch wegen vermutlicher Mängel in der Zusammensetzung, z. B. wegen ungenügender Eiweißmenge, so daß die Jungen im Ei drin verhungern mußten. Bemerkenswert ist dabei noch, daß die Nester besagter Gelege alle an einem nach Norden gelegenen Waldrand gebaut worden sind, wo von vornherein weit und breit der Boden und mit ihm sein Insekten- und Pflanzenleben den weckenden und belebenden, dem Vogel Futter schaffenden Sonnenstrahlen entzogen war. An nach Süden, Südost und Südwest gerichteten Waldrändern habe ich lauter normale oder sogar maximale Eiermaße feststellen können.

Zweitens ist mir dieses Jahr, wie noch nie, aufgefallen, daß frühbrütende Arten, wie Singdrossel und Amsel, ihre Nester unvorsichtigerweise so offen und nieder an Waldränder und Wege hingebaut haben, daß man, ohne zu wollen, geradezu hineinsehen mußte. Ist nun nicht möglich, daß die Brut-

paare ihre Nester so tief anbringen konnten, weil die kalte und nasse Witterung des März und April die störenden und die nistplatzsuchenden Vögel vorsichtig und scheu machenden Sonntagsausflügler und Werktagsbummler dauernd an die Stube bannte? Die Nester der zweiten und einer allfälligen dritten Brut wurden dann schon in Dickichten und dort so hoch angebracht, daß ich, um die Maße zu ermitteln, zu klettern gezwungen war. Leider sind aber alle jene sorglos gebauten Nester mit wenigen Ausnahmen ihrer Eier — obschon angebrütet! — und ihrer Jungen beraubt worden, und ich kann mir nichts anderes denken, als daß bei dem gegenwärtigen Eiermangel Liebhaber eines in der Nähe liegenden Industrieortes die Frevler waren. Außerdem konnten Eichelhäher und Rabenkrähe (Corvus corone, *L.*) in je einem Falle als Feinschmecker beobachtet werden, wobei aber zu bemerken ist, daß diese als natürliche Glieder der Tierlebensgemeinschaft das volle Recht dazu haben.

Nun zu den Einzelheiten. Das erste fertige Gelege, das ich am 22. April zu Gesicht bekam, war das einer Amsel. Das Nest stand an einem ungefähr 2 m hohen Steilrain eines gegen Süden gelegenen Hohlweges. Der Absturz des Raines ist unbewachsen und läßt die offenen, verwitternden Keupermergel sehen. Der obere, ein wenig überhängende Rand ist mit Gras überwuchert. Zudem wächst eine Akazie aus ihm heraus, deren Wurzeln teilweise offen daliegen. Auf eine solche Hauptwurzel und, in der Hauptsache, auf eine vorspringende Erdnase des Raines hat die Amsel in 1,50 m Höhe ihr Nest gebaut, ohne alle Deckung, in einem besonderen Sinne des Wortes „bodenständig". Durch Mitverbauen von herabhängenden, dürren Grashalmen und Verkleidung des Nestes mit demselben in nächster Nähe wachsenden Stoff hat sie es fertig gebracht, daß die Brutstätte dem blinden Publikum entgehen konnte, bis die Jungen sich durch ihr Schreien verrieten. Am 10. Mai wurden sie ausgenommen.

Färbung und Glanz der Eier waren normal, die Größenmaße die folgenden: 31,8 × 21,1; 31,4 × 20,9; 31,65 × 20,5 *), während das mittlere Amselei 29 × 21,4 mißt. Bei keinem der folgenden Beispiele fällt so sehr wie bei diesem auf, daß, wo der Längsdurchmesser des Eies ein starkes Mehr aufzuweisen hat, der Querdurchmesser das Mittel nicht oder nur wenig übersteigt oder sogar, wie im angeführten Fall, unter das Mittel sinkt. Überhaupt schwankt der Querdurchmesser nie so stark wie der Längsdurchmesser, was natürlicherweise damit zusammenhängt, daß bei der Entstehung des Eies das Wachstum nach der Breite durch die Ausdehnungsmöglichkeit des Eileiters und der Kloake gehindert ist, während das Wachstum des Eies nach der Länge weniger begrenzt ist.

Von allen beobachteten Amselgelegen wäre anzugeben, daß das längste Ei 31,8, das kürzeste Ei 26 gemessen hat. Zwischen diesen beiden Grenzen herrscht also ein Unterschied von 5,3 mm oder mehr als $^1/_2$ cm! Vom Mittel aus betrachtet, ist die obere Grenze 2,8 mm und die untere Grenze 2,5 mm von ihm entfernt. Das breiteste Ei maß 22 und das schmalste Ei 20,2. Zwischen diesen beiden Grenzen herrscht also nur ein Unterschied von 1,8 mm; vom Mittel aus berechnet, ist die obere Grenze bloß 0,6 mm, die untere aber 1,2 mm entfernt. Was alles die oben aufgestellten Behauptungen beweist. Das absolut größte Ei maß 31,8 × 21,1 und das absolut kleinste Ei 26,5 × 21,1. Merkwürdig dabei ist, daß beim größten wie beim kleinsten Ei der Querdurchmesser derselbe war! Das Gelege mit den kleinsten Eiern war das folgende: 28,0 × 21,1; 28,9 × 21,1; 27,9 × 21,2; 26,5 × 21,1. Das Gelege der größten Eier war das an erster Stelle angeführte.

Das eben genannte, kleinste Gelege stand mit noch einem andern, kleinen Gelege (Durchschnitt 27,9 × 21,2) am oben erwähnten, nach Norden gelegenen Waldrand. Bei einem Gelege war der Embryo zu einem Viertel entwickelt, aber tot, und die Eierschale angepickt. Beide Gelege wurden über die Zeit hinaus bebrütet und dann verlassen.

In einem Nest fielen die beiden Gegensätze 31 × 21,1 zu 26,9 × 21 auf. Das Mittel der drei übrigen Eier betrug 29,6 × 21,2.

Die schönsten, gleichmäßig großen Eier hatte das folgende Gelege: 30,0 × 21; 30,0 × 21,9; 30,2 × 21; 30,3 × 22.

Die durchschnittliche Eierzahl war 4. Die geringe Eierzahl der ersten Brut — oft nur 3, dreimal sogar nur 2 Eier — hat das Mittel hinuntergedrückt. Die höchste Eierzahl eines Geleges war 7, wobei alle 7 Eier erbrütet und alle Jungen flügge wurden! Für diese reiche Nachkommenschaft hat die Amselmutter eine riesige, unförmige Kinderstube gebaut, wie wenn sie sich ihrer schon von vornherein bewußt gewesen wäre.

Die geringste Eierzahl war 2. In allen drei Fällen wurden die Eier bebrütet und die Jungen hochgebracht, und zwar, wie mir schien, schneller als bei reichhaltigeren Gelegen.

In fünf Fällen blieb ein Ei, wahrscheinlich ein unbefruchtetes, liegen, d. h. es wurde noch ein oder zwei Tage nach dem Ausschlüpfen der Jungen bebrütet und dann, angesichts des Mißerfolges, vom Brutpaar entfernt.

Daß beim Flüggewerden der Jungen ein schwach entwickeltes Geschwisterlein nicht hätte mittun können, zurückgeblieben, vergessen worden und verhungert wäre, habe ich bei Amseln nie beobachtet, wohl aber bei andern Arten, z. B. bei der Goldammer.

*) Maßangabe in mm.

Kleine Mitteilungen.

Horsten des Turmfalken in einem hohlen Baum. Professor Schalow erwähnt in seinem ausgezeichneten Werk „Beiträge zur Vogelfauna der Mark Brandenburg, Berlin 1919" vom Turmfalken nicht einen Fall, daß in der Mark Gelege in hohlen Bäumen gefunden seien. Ich habe während meiner langen Sammeltätigkeit zweimal solche Brutorte gefunden. Im Revier Überheide der Oberförsterei Pechteich, Hofjagdrevier Schorfheide, unmittelbar an der Steinfurther Feldgrenze am Grenzgraben stand eine wohl sicherlich 250jährige Eiche. In einem schräg nach dem Walde zu wachsenden Ast dieser Eiche meißelte im Frühjahr 188[illegible] ein Schwarzspecht seine Höhlung; die „erbrüteten Jungen" flogen aus, und im nächsten Jahre nahm diese Höhlung eine Blaurake an. Winterstürme brachen dann den Ast oberhalb an dem Einflugloch ab, so daß ein 15 cm langer Spalt entstand. Ein Pärchen Turmfalken siedelte sich hier 189[illegible] an und richtete in der erweiterten Höhlung seinen Horst ein; wohl dasselbe Pärchen erbrütete auch 1892 seine Jungen. Dann fiel leider dieser Baum der Axt zum Opfer, wie so

viele in der Schorfheide, der Bestand wurde abgetrieben. Seitdem hier so mancher alte Baumriese der modernen Forstwirtschaft weichen mußte, ist die Vogelwelt zurückgegangen. Ich erinnere nur an Schellente und Gr. Säger, früher waren dort diese beiden Arten häufige Brutvögel. In anderen Gegenden brütet selbstredend dieser Falke in Felsen, alten Mauern und Türmen; in Frankreich horsteten bei dem Waldlager Chambley an einer Bahnstrecke im Mauerwerk mehrere Pärchen gemeinsam mit Dohlen, oft habe ich mich hier an den Flugspielen erfreut. Ludwig Holz berichtet im Ornith. Zentralblatt im II. Jahrgang vom 15. Mai 1877 auf Seite 76/77, daß dieser Falke im Umanschen Gebiete, Südrußland, in hohlen Bäumen brütet. Sind in der Mark schon ähnliche Brutorte gefunden worden?

W. Rüdiger.

Aus den Vereinen.

A. Z. Angemeldet Herr Ado Mertes, Diplomingenieur, Mainz, Wallaustr. 62. — Aufgenommen sind Mtgl. 335 Paul Liebsch, Großröhrsdorf i. Sa., Bischofswerdaer Str. 241; Mtgl. 336 P. Löding, Sparkassengehilfe, Levinghausen, Post Wattenscheid, Chaussee 74; Mtgl. 337 Paul Hahn, Obermonteur, Augsburg 10, Bartenburgerstr. 42/2; Mtgl. 338 Frau Anna Rischow, Stralsund, Jungfernstieg 3a. — Mtgl. 282 (Schiebe, Liegnitz) vert. vorj. Kanarienhahn gegen Exoten bel. Art. Mtgl. 172 (Handl, Wien) gibt ab eine größere Anzahl selbstgezüchteter jap. Möwchen und im Herbst junge Zebrafinken. — Mtgl. 14 (Krabbe, Anklam) sucht 1,0 Napoleonweber, ptl. i. T. gegen anderes. Mtgl. 271 (Braune, Taubenberg) sucht zuchtfähige Weibchen Amarant. — Die Geldentwertung zwingt zur Erhöhung der Aufnahmegebühr, die ab 1. September 100 000 M. beträgt. Die Gebühr für Veröffentlichung von Bekanntmachungen wird auf den Wert einer Briefmarke festgesetzt.

Für die Geschwister Brehm konnten weiterhin ausgewiesen werden: Mtgl. 163 100 M., Mtgl. 183 60 M., Mtgl. 271 19 M., sämtlich in Tausenden.

Ich kann mir nicht versagen, unsere verehrten Mitglieder, insbesondere die im Ausland, dringend zu bitten, zum Fortbestand der „Gef. Welt" in jeder Hinsicht beizutragen.

A. Krabbe.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig. Nächste Sitzung Donnerstag, den 20. September 1923, im Vereinslokal „Bauers Brauereirestaurant", Täubchenweg. Gäste sind willkommen

J. A.: Joh. Birk, 1. Vors., Leipzig-Mockau, Beuthstr. 29.

Am 1. August ds. Js. wurde in Leipzig-Plagwitz ein Verein zur Wahrung der Interessen des Vogelschutzes, der Vogelpflege und -kunde gegründet. Der Verein trägt den Namen **Verein der Vogelfreunde Leipzig-Plagwitz.** Die Sitzungen finden jeden 1. und 3. Montag im Monat bei Herrn Muresch, Leipzig-Plagwitz, Gleisstr. 26 II r. statt. Vogelfreunde jederzeit willkommen.

Karl Scholdisett, 1. Vors., Leipzig-Plagwitz, Lauchstädter Str. 30 II r.



Herrn C. B., Breslau X. 1. Die Fütterung und Haltung der N. ist richtig. Normalerweise müßte die N. Juli und August mausern. Da bisher der Federwechsel ausgeblieben ist, wird es gut sein, die N. in einen recht großen Käfig zu bringen, der auch den Sonnenstrahlen zeitweise ausgesetzt ist, ihr Gelegenheit zum Baden zu geben, wo falls sie nicht freiwillig badet, täglich vermittels eines Zerstäubers das Gefieder gründlich zu benetzen. Häufig verzögert sich aus nicht erkennbaren Ursachen der Eintritt der Mauser. Ein Frühjahrsfang soll spätestens im Mai abschlagen beginnen. 2. In dem Käfig von angegebener Größe können etwa 12 einheimische Vögel untergebracht werden. Es kommt dabei natürlich auf die Arten an.

Herrn A. D., Forchheim. In dem Käfig von angegebener Größe werden die genannten Vögel auch singen, wenn auch nicht so fleißig wie im Einzelkäfig.

Herrn F. W., Bildstock (Saar). Milben wie Pelzkäfer sind der Mehlwurmzucht gefährlich. Letztere lassen sich durch Herausfangen der Larven wie der Käfer leichter entfernen als die Milben, zu deren Entfernung eine umständliche und meist öfter zu wiederholende Prozedur notwendig ist.

Frau J. N., Chemnitz. Es kann möglich sein, daß der Kanarienhahn zu alt für die Züchtung ist. Aber es ist auch möglich, daß er für die Züchtung, ganz abgesehen vom Alter, überhaupt nicht brauchbar ist. Wenn die Eier sämtlicher Weibchen, welche mit dem Hahn zusammen gehalten wurden, stets unbefruchtet waren, so ist ohne weiteres anzunehmen, daß der männliche Vogel ungeeignet ist oder der Vogel ist krank, worauf sein jetziges Benehmen hindeutet. Weibchen, welche sich selbst rupfen, sind auch nicht zur Züchtung zu verwenden. Das Selbstrupfen wird durch irgendwelche Reize in der Haut verursacht und ist schwer zu bekämpfen. Das Lysoformbad hat damit nichts zu tun. Milben bekämpft man durch sorgfältigste Reinhaltung des Käfigs und der Zubehörteile, durch häufiges Übergießen mit kochender Seifenlauge oder Lysoformwasser. Das Bad der Vögel in Lysoformwasser, wie es in dem Buch „Der Kanarienvogel" und den übrigen Büchern des Creutzschen Verlages, welche sich mit Vogelpflege befassen, beschrieben ist, befreit die Vögel von Milben. Das Hauptfutter der Kanarienvögel ist Rübsen. Die anderen Samen werden nur als Beigabe gereicht. Jetzt noch Züchtungsversuche mit Kanarienvögeln anzustellen, ist nicht zu empfehlen. Das Brutgeschäft würde durch Eintritt der Mauser unterbrochen werden. Der Kanarienhahn wird am besten jetzt aus dem Zuchtkäfig entfernt.

An unsere Leser!

Der katastrophale Rückgang der Mark hat unsere Preisangabe für den Monat September der „Gefiederten Welt" bei weitem überholt, so daß wir eigentlich genötigt wären, noch eine Nachzahlung in gleicher Höhe nachzufordern. Da dieser Weg des damit verbundenen Zeitverlustes wegen für uns nicht gangbar ist, müssen wir einstweilen das Defizit von zirka 50 Millionen auf uns nehmen, rechnen aber darauf, daß Gönner des In-, namentlich aber des valutastarken Auslandes durch einmalige Spende dieses Defizit verringern helfen werden. Statt der zwei Nummern im September müssen wir uns schon mit einer begnügen!

Eine Fortführung der Zeitschrift halten wir bei den entsetzlichen Sprüngen des Dollars der letzten Zeit nicht für möglich, da wir nicht in der Lage sind, den Preis einen Monat vorher auch nur einigermaßen annähernd bestimmen zu können. Wir haben aber die Absicht, die Zeitschrift, sobald stabilere Verhältnisse eintreten, in gewohnter Weise fortzuführen und werden dann mit unseren Mitteilungen an die bisherigen Abnehmer herantreten!

Bis dahin nehmen wir Abschied von unseren Abonnenten und sprechen die Hoffnung und den Wunsch aus, daß in absehbarer Zeit wieder bessere Umstände für die Vogelliebhaberei eintreten mögen. Den vielen Gönnern der „Gefiederten Welt" herzlichen Dank!

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg.
Postschließfach 148. — Postscheckkonto: Magdeburg 3148.

Käfige u. Gerätschaften

Messingkäfig für Papagei, Umfang 1½m, Höhe 75 cm, zu verkaufen. Angebote ab hier an [499
Amtsrat **Volges**, Domäne Schäferhof bei Nienburg/Weser.

Vögel

Achtung!

Wegen **Abreise** habe noch zu verkaufen:

1,1 Ia Nymphen, Märzbrut 1922, blutsfremd aus freier Voliere; **1,1 Zuchtpaar grüne Wellensittiche** mit gelbem Blut; **1,1 Zuchtpaar grüne Wellensittiche,** ♂ olivfarbig, ♀ grün und Jungtiere: einige **Ia Kanarienzuchthähne und Weibchen,** sowie **Ia Vorsänger und Jungtiere.** Alle Vögel sind kerngesund und in bester Verfassung, gebe volle Garantie. Ferner **1 schöne Zimmervoliere,** noch wie neu, weiß gestrichen mit Naturbaum und 2 Zinkschubladen 1,50×1,50×50 und noch **verschiedene kleinere Käfige,** alle in gutem Zustande.. Genaue Angaben gegen Retourmarke. [500

Eilige Angebote erwünscht

Karl Kellner,
Eberbach i. Bad., A.Z. 223.

NB.: **A. Z.-Mitglieder erhalten den Vorzug.**

---

2 ♂ Ia Schamadrosseln in vollem Gesang, 9 andere seltene indische Drosseln zu verkaufen für zus. £ 14. Offerten unter **R. 21** an die Exped. der „Ges. Welt". [501

Gr. Wellensittiche, 35 Stück junge, 7 Freivol. gezüchtet und bes. kräftig, ohne Geschlechtsgarantie habe abzugeben. Anfragen nur mit Rückporto. Suche 1,0 Sperlingspapagei gegen dito 0,1 zu tauschen evtl. zu kaufen. Suche 1,1 Nymphensittiche. [502
R. Huth, Perleberg.

Suche zu kaufen 1 Zuchtp. Sing-, Nymphen- oder Königssittiche oder 1,1 Jungtiere desgl. oder gebe dafür in Tausch 1 Paar Goldstirnsittiche und Wellensittiche, beide aus Gartenvoliere.
Erich Richter, Bernstadt i. Sa.,
A. Z.-Mitgl. 235. [503

Tausche Amazone gegen blutsfremde zuchtf. grüne Wellensittiche. Bei Anfragen Rückporto beifügen. **W. Rau, Reichenbach i. Schl.,** Frankensteinerstraße 19. [504

Gebe 3 prachtvolle Rotkehlchen gegen Weiß- oder Mehlwürmer ab. **Götze, Wiesbaden,** Lothringer Str. 23, II. [505

Sprosser!!

Wer tauscht Ia **Sprosser** gegen **Weißwurm neuer Ernte.** [506
Peter Koch, Mannheim, Dammstraße 34.

Je 1,1 Wachtelastrild, weiße Reisfinken, weiße jap. Möwchen in bar oder Tausch gegen Zebrafinken, jap. Möwchen, Wellens. (grüne u. gelbe) gesucht.
Arthur Schiebe, Liegnitz i. Schl., Luisenstr. 24. (A. Z.-Mitgl. 282.) [507

Kaufe laufend zu höchsten Tagespreisen **Kanarienhähne u. -weibchen,** Papageien usw. Stückzahl und Preis an **Anton Mildner,** Vogelh., Großschönau i. S. Unverbindlichen Anfragen Rückporto beilegen. [508

Kaufe und zahle z. Zt. für

Kanarienhähne	à	4 500 000 ℳ
Kanarienweibchen	à	350 000 ℳ
Wellensittiche	à	3 000 000 ℳ
Meerschweinchen	à	500 000 ℳ
weiße Mäuse	à	15 000 ℳ
Lachtauben, alte	à	500 000 ℳ

ferner **Papageien, Eichhörnchen** und ähnliche Tiere. [509
H. Behrke vorm. Mätje, Tierexport, Braunschweig, Sophienstr. 35.
Fernruf 1281. Gegr. 1874.

Gebe in Tausch auf Weber und andere Exoten nachstehende Vögel ab: **1,1 Paradieswidafink** (unausgefärbt), 1,0 Mozambikzeisig, 1,0 Bandfink, 1,0 Zebrafink, 0,1 Indigofink, 1,1 Erlenzeisig, 1,0 Kurzschnabelgirlitz und junge grüne Wellensittiche.
H. Hahn jr., Neuß am Rhein, Crefelder Str. 60. (A. Z.-M. 299.) [510

Wiedehopf,
Schama-Weibchen
kauft **R. Lomnicky,**
Prag VII (C.S.R.)
511] Korunovační 1020.

Suche Klappkamera 9×12 zu kauf. evtl. tausche hierf. g. Bücher. Anfr. Rückp. Angebote an **H. Zieß, Fulda.** [512

Suche weiße und gelbe Hirse im Tausch gegen **Schnurrbärtchen, Kubafinken, Amaranten, Möwchen und Zebrafinken.**
Gefl. Angebote mit kleinem Muster an **Buschendorf,** Großkochberg bei Rudolstadt. [513

Tausche Kamera, 13×18 mit Extr.-Rup.-Apl., bereits neu aus Hartholz mit Mess.-Beschl. gegen nur **ein Pärchen Nymphen-, Alexandersittiche** oder andere. [514
Fr. Ganter, Steinen, Amt Lörrach (Baden).

Guterhaltene Bücher,
Erzählungen, Naturwissenschaften usw., zu billigsten Preisen abzugeben. Anfragen Rückporto. [515
Hans Zieß, Fulda.

Papageien
Kanarienhähne
Bastarde

kauft höchstzahlend und tauscht auch auf Exoten

Willy Odenwald, Fulda.

Eigner Export und Import. [516

Kaufen laufend zu konkurrenzlos höchsten Preisen:

Kanarienhähne und -weibchen

sowie **Sing- und Ziervögel, Exoten aller Arten, Papageien, graue, grüne usw.**

Kühn & Muschter, Leipzig,
Promenadenstraße 29. Telephon 10226.

Käfigfabrik und Vogelhandel en gros und en detail
Import. **Export.**
Anfragen Rückporto beifügen. [517

Reform-Käfige

Zerlegbar · Leichteste Reinigung · Einfachster sicherer Transport
1. Preis beim Käfig-Wettbewerb Leipzig 1919/22 (siehe Gefiederte Welt 1920, Heft 14—16), Goldene Medaille Leipzig 1921/22
werden für alle Vogelarten hergestellt.

Ausführung: Hartholz, grünlackiert oder naturlackiert, Zinkschublade, Porzellannäpfe, Ledertuchdecke.

Keine Fabrikware, sondern beste Spezialarbeit!
Anfertigung als Kistenkäfig oder Wiener Form (halboffen) oder halboffen mit fester Rückwand. Ohne jedes Werkzeug in einer Minute zusammengestellt resp. zerlegt. Verpackung zum Selbstkostenpreis.
Fertigen auch jede Art Käfige u. Volieren u. Zeichnung od. Maßangabe.

Heck-, Flug-, Einsatz-Käfige.
Ausstellungs-Käfige nach Vorschr. d. V. D. K.
Transport-Käfige, jeden Posten.
Anfragen Rückporto beifügen. Katalog gegen Einsendung von Briefporto.

Schlagnetze ohne Mittelsteg
für schädliche Vögel, prima handgeknüpfte Ware. [518

Kühn & Muschter, Leipzig,
Promenadenstraße 29. Telephon 10226.
Bankkonto: Allgem. Deutsche Credit-Anstalt Zweigstelle Borna; Stadt-Girokasse Borna b. Leipzig Nr. 1506. — Postscheck.: Leipzig 92250. — Tel. 147.
Zahlreiche Anerkennungs- und Dankschreiben.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg

Postscheckkonto: Magdeburg 3148 — Postschließfach 148

Für Papageien-Pfleger.

Der Wellensittich, seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht. Von Dr. Karl Ruß. Sechste, von Karl Neunzig gänzlich umgearbeitete und vermehrte Auflage. Mit 1 Farbentafel und 31 Textabbildungen. Kart. 2.50 M

Sprechende Papageien. Ein Hand- und Lehrbuch von Dr. Karl Ruß. 3. verb. Aufl. Mit 2 Farbendruck- u. 32 Schwarzdrucktafeln. Kart. 4.50 M

Der Graupapagei, seine Naturgeschichte, Pflege, Abrichtung und Züchtung. Von Dr. Karl Ruß. Zweite, von Karl Neunzig bearbeitete Auflage. Mit einem buntfarbigen Aquarelldruck, 16 Textabbildungen und 1 Verbreitungskarte. Kart. 2.50 M

Der Graupapagei in der Freiheit und in der Gefangenschaft. Von Dr. Carl R. Hennicke. Mit 1 Buntbild. Geheftet 1.50 M

Die Amazonen-Papageien, ihre Naturgeschichte, Pflege, Abrichtung und Züchtung. Von Dr. Karl Ruß. Zweite von Karl Neunzig bearbeitete und vermehrte Auflage. Mit 1 buntfarbigen Aquarelldruck und 21 Textabbildungen. Kart. 2.50 M

Behandlung und Heilung der Krankheiten von grauen und grünen Papageien. Von O. Mc... jewski. Geheftet 1.— M

Vogelschutz.

Handbuch des Vogelschutzes. Von Prof. Dr. C. Hennicke. Mit 9 Tafeln in Doppelton, 1 Karte und mehr als 200 Textabbildungen. Geh. 8.— M

Die angeführten Preise sind Grundpreise, die mit der jeweiligen Schlüsselzahl zu multiplizieren sind.
Für Auslandslieferungen: 1 ℳ = 1 Schweizer Frank.

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Hermsdorf bei Berlin; für den Anzeigenteil: Franz Wunderlich, Magdeburg, Postschließfach ...
Verlag der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck: August Hopfer, Burg Bz. Mgdbg.

Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Begründet

von

Dr. Karl Ruß.

Herausgegeben und illustriert von Karl Neunzig.

Dreiundfünfzigster Jahrgang.

Magdeburg 1924.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung
(M. Kretschmann).

Inhalts-Übersicht.

(* bedeutet mit Abbildung.)

Größere Arbeiten.

Adlerfparre, A.
Einiges über Vitamine und Vogelhaltung. S. 9, 17.
*Ein paar Worte über das Gefangenleben des Waldhüttenfperlings. S. 83.
Noch ein paar Worte über Rofenpapageien und über das Abfterben der Jungen im Ei. S. 170.
Amman, Dr.
Mellum ein Vogelparadies in der Nordfee. S. 70.
Bacmeifter, W.
*Johann Andreas Naumann. S. 431.
Barth, Walter.
Baftardzucht um 1555 und anderes. S. 94.
Beyer, Max.
Prachtfinkenzucht in der Lorivoliere. S. 300.
Bilfinger, Dr.
Über Wellenfittichzucht. S. 87.
Von meinen Rofenpapageien. S. 89. 97.
Birk, J, Leipzig.
Der Gelbfpötter. S. 196, 202, 210.
Ein Beitrag zur Weichfreffer-Fütterung. S. 234, 241, 449.
Liebhaberforgen. S. 340, 350. 356.
Borggreve, Franz.
Nachtigall und Amfel, eine Vogelfchutzbetrachtung. S. 73, 81.
Boxberger, Dr. L. von.
Bekämpfung der Milben. S. 252.
Braun, Fritz.
Allerlei Biologifches. S. 106.
Vogelleben im Wiefengelände. S. 153, 162.
Von meinen Vögeln. S. 193, 201, 306.
Caftellamare.
Ein Befuch beim Welthaufe L. Ruhe, Alfeld. S. 15.
Diener, Prof. K. A.
Mein Jamaika-Trupial. S. 150, 155, 164.
Duncker, Dr. H.
*Exakte Vererbungsverfuche bei Kanarien. S. 2, 11, 19, 26, 34, 43, 50, 58.
Duve, Karl, Hamburg.
Die gelben Gruben. S. 247.
Birkhahnbalz. S. 278.
Engel, Rudolf.
Unglaublich, aber wahr! S. 177.
Ewald, Rudolf
Mit einem „Fockelmannfchen" Tiertransport. S. 39.
Fiedler, Walter, Neuftrelitz.
*Meine gefiederten Lieblinge. S. 214.
Finck, Karl, Neukölln.
*Der rotrückige Würger, feine Pflege, Sommer- und Winterernährung. S. 316, 326, 333.
Ein Weihnachtserlebnis. S. 349. 355.
Fifcher, Johann.
Aus dem Böhmerwald S. 60.
Freiwald, A., Hemelingen.
Mein erfter Sumpfrohrfänger. S. 237.
Frickhinger, Dr. H. W., München.
Nur ein Star. S. 163.
Fuchs, Franz.
*Von Eisvögeln und Zaunkönig. S. 244.
*Jagdfalken. S. 291.
G., W.-Gladbach.
Am Niederrhein. S. 62.
G., P.
*Über den Gefang einiger nordamerikanifchen Droffeln. S. 130, 139.
Galle, Karl.
Motive und Bedeutung der Vogelliebhaberei. S. 91, 98.
Gravel, Hans, Effen.
Ein Frühlingsmorgen im Emslande. S. 135.
Groebel, Heinrich.
Zur Frage der Weichfreffer-Fütterung. S. 217.
Groß, Paul.
Das Rotkehlchen. S. 33, 41.
Günther, Adolf, Lommatzfch.
Über Vogelpflege. S. 298.
Hamve, Helmut.
Garnelenfchrot und Dörrfleifch als Weichfreffer-Futter. S. 226.
Hirfch, Linda, Aubftadt.
Meine Kanarien- und Kanarienbaftardzucht 1924. S. 287, 294.
Jacabs, M.
Zur Frage der Weichfreffer-Fütterung. S. 185.
Noch ein Wort zur Weichfreffer-Fütterung. S. 274.
Jena, A., Biberach.
Unberechtigte Amtshandlung eines Polizeibeamten. S. 271.
*Über Heckenbraunellen. S. 282.
Kaforke, Emil.
Drecklerche, Schmierfink und Genoffen. S. 31.
Etwas über den Graupapagei. S. 105.
Früchte. S. 129.
*Schreien und Sprechen. S. 329.
Keibel, Leopold.
*Der Münchener Geftaltsfarbenkanarienvogel. S. 82.
Kluß, W., Stettin.
Mein Werdegang als Kanarienzüchter. Kanarienvogel oder Grünfink? und der Kanarienvogel vor 3000 Jahren. S. 166, 173.
Kögel, A. J, Berlin.
Zehn Tage Vogelfchutzftudien. S. 169.
Krabbe, A.
Ein Sonntagmorgen in der Vogelftube. S. 49.
*Webervögel und Widafinken. S. 265, 273, 281, 289, 297, 305, 313, 323, 331, 339, 347.
Kracht, Ingenieur.
*Leicht zerlegbare Käfige für Frifchfänge. S. 182.
Kröfl, Dr. Hans.
Ein rettender Eingriff bei Legenot. S. 62
Krüger, A.
Nur ein Star. S. 53.
Kühn, Bernhard.
Von meinem Baumpieper. S. 22.
Lichtenftaedt, S.
Nochmals Farbenzucht der Wellenfittiche. S. 36.
*Mein Blaubartblattvogel. S. 113.
*Exoten. S. 284, 293, 302, 309, 318.
Lindner, Kurt.
*Der Mäufebuffard in Gefangenfchaft. S. 269.
Marz, Ernft, Chemnitz.
Von einem Gimpelweibchen. S. 253.
Mendel, Dr. Gg. Victor, Berlin.
Rotbart-Maxe. S. 122
Mertens, Ado.
Erlebniffe mit Nymphen. S. 238.
Meyer, Jof., Luzern.
Nochmals über Wellenfittichzucht. S. 194.
Meyer, Max, Berlin.
Meine Lieblinge und ich! S. 140, 147.
Munfterhjelm, A.
*Ein Grünflügelarara. S. 209.

Neunzig, Karl.
Neueinführungen und Seltenheiten. S. 5.
*Whites Ammerfink — Poospiza whitii *(Scl.)*. S. 6.
Waldhüttensperling — Passer griseus *(Vieill.)*. S. 13.
*Nacktaugenstärling — Gymnomystax melanicterus *(L)*. S. 14.
*Blauohrenblauhäher — Aphelocoma cyanotis *(Ridgw.)*. S. 23.
Rotachselkuhstärling — Molothrus rufoaxillaris *(Cass.)*. S. 31, 38.
*Glanzkuckuck — Chrysococcyx cupreus *(Bodd.)*. S. 45.
*Weißflügelschmätzerdrossel — Cossypha humeralis *(Sm.)*. S. 52.
*Skotts Trupial — Icterus parisorum *(Bp.)*. S. 52, 69.
*Falzschnabelpfäffchen — Sporophila falcirostris *(Tem.)*. S. 70.
Gelbscheitelweber — Hyphantornis spilonotus *(Vig.)*. S. 77.
*Prachtglanzstar — Spreo superbus *(Rüpp.)*. S. 77.
*Rotschwingenglanzstar — Amydrus murio *(L.)*. S. 84.
*Staffelschwanzfliegenschnäpper — Stenostira scita *(Vieill.)*. S. 85.
*Geperlter Schmuckbartvogel — Trachyphonus margaritatus *(Cretzschm.)*. S. 100.
*Kajenneralle — Rufirallus cajennensis *(Gm.)*. S. 117.
*Lasurblauer Bischof — Cyanocompsa parellina *(Bp.)*. S. 117.
Afrikanischer Halsbandsittich — Palaeornis cubicularis *(Hasselqu.)*. S. 118,
Goldaugentimalie — Pyctorhis sinensis *(Gm.)*. S. 118.
*Sperlingstäubchen von Ekuador. — Ch. cruziana *(d'Orb)*. S. 125, 131.
*Graukopfpfäffchen — Sporophila plumbeiceps *(Salvad.)*. S. 146.
*Somalibülbül — Pycnonotus arsinoe somalinensis *Rchw.* S. 172.
*Die abessinische Gabelrake — C. caudatus corti *(Shell.)*. S. 173.
*Die Strichelblaurake — C. naevius *(Daud.)* S. 173.
*Rüppells Graugirlitz — Poliospiza tristriata *(Rüpp.)*. S. 178.
Nordöstlicher Bandfink — Amadina fasciata alexanderi *Neum.* S. 178.
Abessinischer Amarant — Lagonosticta senegala carlo *Neum.* S. 187.
*Abttangare — Tanagra abbas *Licht.* S. 187.
*Königsglanzstar — Cosmopsarus regius *Rchw.* S. 188.
*Rotflügel-Helmglanzstar — Galeopsar salvadorii *Sharpe.* S. 204.
*Klunker- oder Lappenstar — Perissornis carunculatus *(Gm.)*. S. 204.
*Schwarzkopfweber — Ploceus cucullatus nigriceps *(Lay.)* S. 212.
*Ani — Crotophaga ani *Gm.* S. 213, 223.
*Riesenhabia — S. grandis *(Lcht.)* S. 228.
*Buntkehlhabia — S. magnus *(Müll.)*. S. 229.
*Gelbkehlhabia — S. magnoides magnoides *Lafr.* S. 229.
*Schwefelgelber Girlitz — Serinus sulfuratus *(L.)*. S. 235.
*Larvenweber — Ploceus cucullatus abyssinicus *(Gm.)*. S. 236.
*Reichards Weber — Ploceus reichardi *(Rchw.)*. S. 242.
*Heuglins Weber — Ploceus heuglini *Rchw.* S. 243.
*Gilbweber — Ploceus galbula *Rüpp.* S. 243.
*Schwarzschnäbliger Mahaliweber — Plocepasser melanorhynchus *Rüpp.* S. 250.
*Grüner Astrild — Neisna quartinia *Bp.* S. 251.
Dunkler Blauastrild — Uraeginthus bengalus schoanus *Neum.* S. 252.
*Somalilärmdrossel — Crateropus leucopygius smithi *Sharpe.* S. 258.
*Hilgerts Mausvogel — Colius leucothis hilgerti *Neum.* S. 259.
*Weißbindendrosselschmätzer — Th. albiscapulata *Rüpp.* S. 268.
Orangehaubenkakadu — Lophochroa citrinocristatus *(Fras.)*. S. 268.
Rotbauchmohrenkopf — Poicephalus rufiventris *(Rüpp.)*. S. 269.
*Benguellapapageien — Poicephalus robustus fuscicollis *(Kuhl)*. S. 276.
*Braunkopfpapagei — Poicephalus fuscicapillus *(Verr.)*. S. 277.
*Mexikanische Baumwachtel — Colinus pectoralis *J. Gd.* S. 300.
Massenawachtel — Cyrtonix montezumae *(Vig.)*. S. 301.
*Rotkehlfliegenschnäpper — Siphia strophiata *Hdgs.* S. 309.
*Christian Ludwig Brehm. S. 161.
*Heidelberg. S. 314, 325.
*Vogelschau der Vereinigung der Vogelliebhaber, Landesverband Preußen S. 342, 352. 360.
Neunzig, Rudolf.
*Ein neuer Fall von bilateralem Hermaphroditismus beim Gimpel. S. 93.
*Rabenvögel in der Gefangenschaft. S. 197.
Neues vom lateral hermaphroditisch gefärbten Gimpel. S. 246.
Nieselt, Ernst.
Gelbspötter, sein Fang, Eingewöhnung und Überwinterung. S. 108.
Pedersen, Alwin.
Der Wiedehopf. S. 6.
Pölz, Fritz.
*Weißbauchpapagei — Caica leucogaster *(Kuhl)*. S. 25.
Importbericht. S. 46.
Pracht, Stadtarchitekt.
*Meine Oryxweber und ihre Zucht. S. 225.
Quantz, B.
Ornithologische Beobachtungen aus Südhannover. S. 254, 261.
Rambausek, Gustav.
Der tarantinische Zwergpapagei und seine erste glückliche Züchtung. S. 75.
Reischek, Andreas.
*Neuseeländische Papageien. S. 121.
Reuen, L.
*Mein Glanzstar und anderes. S. 286.
Rose, Georg.
Zucht der Feldlerche in Gartenvoliere und anderes. S. 24.
Rothenberg, D.
Die gefiederten Bewohner meines Gartens. S. 78, 85.
Ruß, Karl.
Die Frau als Vogelliebhaberin und Vogelpflegerin. S. 157.
Schmeißer, Joh. Aug., Nürnberg.
Ornithologische Beobachtungen in Bad Salzungen. S. 110, 126.
Schöndube, E.
Eisvögel. S. 179.
Schuster, B.
Zur Pflege unserer heimischen Finkenvögel. S. 221, 230.
Schütze, Eduard.
*Über Unzertrennliche und Sperlingspapageien. S. 57, 65.
Schwarzkopf, Richard.
Farbenwellensittichzucht eine Fußringfrage! S. 345.
Sommer, Vincenz, Münster.
„Die weiße Amsel." S. 114, 124.
Ein arger Räuber. S. 206, 215.
Sperling, Ingenieur, Halle.
Dr. Lahmanns Nährsalzextrakt. S. 260.
Vogelfangarten. S. 266.

Stöcker, Apotheker, Hamburg.
Bekämpfung des Ungeziefers. S. 119, 133.
Stöß-Lößnitz.
Erzgebirgische Vogelliebhaberei. S. 28.
Sunkel, Werner, Marburg.
Der Kühkopf. S. 141.
Thiele. Robert.
Etwas vom Blaukehlchen. S. 74.
*Heidelerche und Baumpieper, zwei Kinder der Heide. S. 257.
Die Nachtigall. S. 344.
Troschütz. A.
*Die Alpenbraunelle — Prunella collaris collaris *(Scop.)*. S. 1.
Beschaffung und Aufbewahrung lebenden Futters. S. 66.
Usinger, Anton.
Über den Nestbau des Vogels. S. 154, 163.
Voigt, Adolf, Jena.
Erinnnerungen an meine Gartenvoliere. S. 180, 189.
Fütterung ausländischer Körnerfresser. S. 335.
Voigt, jun., Walther, Jena.
Aus meiner Vogelstube. S. 219.
Wiese, Dr. J.
Vogelberge und Vogelfang auf den Färöer-Inseln. S 137, 145.
Ziegler, Benno.
*Der Holländerkanarienvogel. S. 68.

Kleine Mitteilungen.

Chinesischer Bülbich — Pycronotus s. sinensis. S. 7.
Elsterdrossel — Copsychus saularis. S. 8.
Hahnenfedriges Weibchen vom Rotrückenwürger. S. 8.
Partiell flavistischer Zeisig. S. 8.
Einbürgerung von Paradiesvögeln. S. 16.
Vordringen des Uralkauzes. S. 16.
Grünling mit weißen Wangen und Kehlfedern. S. 16.
Starkes Auftreten von Birkenzeisigen und Berghänflingen. S. 16.
*Zügelastrild. S. 32.
*Rotbrauner Weber. S. 32.
Über Eingewöhnung von Erlenzeisigen. S. 40.
Schizochroismus vom Blumenaufsittich. S. 40.
Legenot. S. 40.
Sind die Sperlinge Finken- oder Webervögel? S. 40.
Naturfreunde aus Leipzig und Umgebung im Jahre 1923. S. 48, 56
Behandlung von Legenot. S. 63.
*Ein praktischer Sockel für Käfige. S. 64.
Meine ersten blauen Wellensittiche. S. 71.
Naturbeobachtungen. S. 72.
Vom Turmfalk(?) geschlagenes Rebhuhn. S. 72.
Sammeln von Ameisenpuppen. S. 87.
Papageienraub im Zoo. S. 88.
Eingewöhnung von Erlenzeisigen. S. 96.
Girlitz im Winter bei Hamburg. S. 96.
Frühjahrsbeobachtung (Berlin). S. 96.
Wanderfalken. S. 104.
*Afrikanische Bartvögel. S. 104.
*Damadrossel — Geocichla citrina. S. 112.
Die Vogelfreistätte Mellum. S. 120.
*Tarantinische Zwergpapageien. S. 127.
Beobachtungen (Hasloch). S. 128.
Vogelausstellung im Erzgebirge 1924. S. 128.
Walderde in Käfigen und Vogelstuben. S. 136.
Storch-Forschung. S. 143.
Beobachtungen bei Escheburg-Börnsen. S. 151.
Historisches zur Vogelstimmenkunde. S 159.
Die Zusendung lebender Vögel in das besetzte Gebiet. S. 159.
Erlebnisse mit meinem Perlstar „Jakob". S. 160.
Nochmals die „tarantinischen Zwergpapageien". S. 175.
Züchtung von blauen Wellensittichen. S. 191.
Vom tarantinischen Unzertrennlichen und vom Rußköpfchen. S. 191.
*Königstyrann. — Tyrannus tyrannus. S. 207.
Eigentümlicher Fang eines Eisvogels. S. 216.
Fußkrankheiten beim grauen Hänfling. S. 231.
Frühjahrsbeobachtungen (Leipzig). S. 232.
Kardinäle. S. 232.
Brütende Schwalben in einer Gastwirtschaft. S. 256.
Mauersegler. S. 256.
Blaue Brieftauben. S. 272.
Geschlechtsunterschied beim japanischen Möwchen. S. 272.
Singen unsere Sommervögel in den Winterquartieren? S. 280.
Direktor des Zoologischen Gartens von Sofia. S. 280.
Etwas über Safranfinken. S. 296.
Auslandsbericht. S. 303.
Bluthänfling. S. 319.
Auslandsbericht. S. 329.
Vom Tarantiner Unzertrennlichen. 330.
Ausstellung des Vereins von Vogelfreunden, Karlsruhe 362.

Sprechsaal.

Frage		Seite	Antwort Seite
1.	Fruchtbarkeit der Bastarde.	8.	16.
2.	Unregelmäßige Mauser beim Stieglitz.	48.	
3.	Angriff einer Eule auf Volieren im Freien.	48.	
4.	Erkrankung von Zeisigen.	64.	
5.	Betr. Amseln.	104.	
6.	„ Füttern der Nestjungen.	144.	
7.	„ Aufzuchtfutter für Prachtfinken.	152.	176. 183. 192.
8.	„ Mischlinge von Prachtfinken.	152.	
9.	„ Züchtungen von Mischlingen untereinander.	152.	
10.	„ Einrichtung einer Mehlwurmhecke.	168.	199.
11.	„ Vogelliebhaberverein in Ostpreußen.	168.	
12.	„ Bezugsquelle für Kajennepfeffer.	175.	
13.	„ Zahl der Jungen des Gartenrotschwanzes.	183.	224.
14.	„ Milbenbekämpfung.	239.	264. 272. 304.
15.	„ nächtliches Toben von Körnerfressern.	256.	272.
16.	„ Vogelliebhaberverein in Elberfeld.	346.	

Nur ein Star. S. 72.
Vorsicht beim Auslegen von Fallen. S. 80.
Legenot. S. 88.
Brütet der Star zweimal. S. 112.
Überwinterung des Girlitz. S. 144.
Versendung von Vögeln. S. 183, 207, 224.
Fußkrankheit beim Hänfling. S. 264.
Ausbleibende Antworten bei brieflichen Anfragen. S. 288, 330.
Geschlechtskennzeichen bei Spitzschwanzamandinen. S. 346.

Bücher und Zeitschriften.

Zoologia Palaearctica. Herausgeber Rudolf Zimmermann, Dresden. Heft 1—3, S. 16.
Vogelleben und Vogelschutz. Von O. v. Riesenthal, Verlag, J. Neumann, Neudamm. S. 88.
Tarzan bei den Affen.
Tarzans Rückkehr in den Urwald. Verlag Dieck & Co., Stuttgart. S. 112.
Die Vögel Mitteleuropas. Von Dr. Oskar und Magdalena Heinroth. Verlag von Hugo Bermühler, Berlin. Heft 1, S. 184.
Bengt Berg, „Mit den Zugvögeln nach Afrika. Verlag Dietrich Reimer, Berlin. S. 312.

Vom Vogelmarkt.

S. 34, 56, 64, 72, 80, 88, 96, 104, 112, 120, 128, 136, 144, 152, 160, 168, 176, 184, 192, 200, 208, 216, 224, 232, 240, 248, 256, 264, 272, 280, 288, 296, 304, 312, 320, 330, 338, 346, 354, 362, 362.

Redaktionsbriefkasten.

S. 64, 72, 80, 88, 96, 104, 112, 120, 128, 136, 144, 152, 160, 168, 176, 184, 192, 200, 208, 224, 232, 240, 248, 256, 264, 272, 280, 288, 304, 312, 320, 330, 338, 346, 354, 362, 362.

Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber.

S. 120, 176, 200, 240, 256, 264, 280, 288, 296, 311, 330, 337, 362.

Verschiedenes.

An die Freunde der Ges. Welt S. 1, 9.
Aufruf. S. 239.
An die Leser. S. 346.

Register.

Abttangare 187*.
Acanthis flammea flammea *(L.)* 208.
„ „ holboelli *(Brehm)* 208.
Agapornis roseicollis *(Vieill.)* 57.
„ taranta *(Stanl.)* 65.
Albinismus (Amsel) 114. 124 353. 361.
Alexandersittich s. Halsbandsittich.
„ großer 329.
Art 137. 145.
Alpenbraunelle 1. 3*.
„ lerche 2 0*. 232. 361.
Amadina fasciata alexanderi *Neum.* 178.
Amadinen 336.
Amarant 50. 181. 191. 220.
„ abessinischer 187.
„ dunkelroter 47.
Amazone 15. 80. 328.
Ammersink 5.
„ Withes 5*. 6.
Ammern 107. 193.
Amsel 48. 56. 73. 81. 104. 106. 111. 114. 124. 128 141. 142. 169. 182. 190. 254. 255. 261 308.
Amydrus morio *(L.)* 84.
„ „ rüppelli Verr. 85.
Andamanenstar 108.
Ani 211*. 213. 223. 228.
Aphelocoma cyanotis Ridgw. 23.
„ sordida *(Sw.)* 23.
Aquila elanga, Pall. 208.
Ara, gelbflügeliger s. Gelbflügelara
„ mee blauer 329.
Astrild 336
„ grüner 251. 253*.
„ olivgrüner 251.
Atlasfink 49. 308. 314.
Auerhahn 127.
Austernfischer 71.

Bachstelze, weiße 56. 111. 128. 142. 153. 200. 254. 262.
Babiaamazone 361.
Bandfink 177. 182. 191.
„ nordöstlicher 178.
Bartsittich 25.
„ strichsperlinge 306.
„ vögel 100
„ vogel, Levaillants 104.
Baumfalk 128. 143.
„ läufer 16. 142. 155.
„ pieper 22. 24. 111. 128. 142. 257. 261. 263. 361.
„ wachtel 278 300. 312.
„ „ mexikan. 278. 300. 301*.
Benguellapapagei 269. 276. 277*.
Bergfink 222. 230.
„ hänfling 16. 143. 208. 220. 230. 344*.
„ meise 109*. 112.
Bindenkreuzschnabel 230.
Birkenzeisig 16 181. 201. 208. 221. 222. 230. 307.
„ großer 206*. 208.
Birkhahn 278.
Bischof, lasurblauer 117. 143*.
Blattvogel, blaubärtige s. Blaubartblattvogel
„ grüner 115*.
Blauara 129.
„ astrild 47.
„ „ dunkler 252.
„ bartamazone 361.
„ bartblattvogel 15. 113. 115*. 132.
„ gimpelfink 117.
„ kehlchen 74. 82. 142. 181. 185. 234. 262. 343. 361.
„ „, Wolfsches 74.
„ kröncken 129. 328.
„ meise 86. 106. 142. 148. 217. 255.
„ rake 169. 353.
„ schnäpper, braunbrüstiger 15.
„ stirnamazone s. Rotbugamazone
„ „ sittich 48.
„ wangenbartvogel 175*. 176.
„ „ blauhäher 21*. 23.
Blumenaunsittich 329.
Bluthänfling 30. 48. 56. 64. 78. 107. 111. 153. 168. 181. 190. 193 208. 219. 222. 224. 230. 264. 306. 318
„ schnabelweber 50. 181. 191. 273. 274*.
„ „ aethiopischer 50. 273. 274*.
„ „ südafrikan. 274*.
Brachvogel 143.
Brandgans 71.
„ seeschwalbe 71.
„ weber 275*.
Braundrossel 354.
Braunellen 185.
Braunkopfpapagei 269. 277. 278*.
„ rückengoldsperling 50.
„ „ strauchschmätzer 174*. 176.
„ stärling 31.
„ wangensittich 248.
Brillenhordenstärling 353.
„ kakadu 329.
„ pfäffchen 147.
Bronzeflügeltaube 270*.
„ männchen 191.
Brotogerys pyrrhopterus *(Lath.)* 248.
Buchfink 24. 48. 56. 78. 106. 111. 128. 135. 141. 142. 144. 147. 153. 162. 163. 169. 222. 230. 253. 254 261.
Büffelweber 313. 315*.
Bülbül, chinesischer 7.
Buntastrild 15. 47.
„ kehlhabia 221*. 229.
„ „, nördliche 221*.
„ specht, großer 128. 169. 199*.

Cabanisweber 290*.
Caica leucogaster *(Kuhl)* 25
Calliste brasiliensis *(L.)* 133.
Cedernvogel 187.
Chamaepelia cruziana (d. Orb.) 125.
„ minuta *(L.)* 330.
„ passerina *(L.)* 125.
„ talpacoti (Tem. Knip.) 125.
Chopistar 286.
Chrysococcyx cupreus *(Bodd.)* 45.
Cinnamon-Norwich 20. 23*.
Colinus Less. 278
„ pectoralis *J. Gd.* 278. 300.
Colius leucotis hilgerti *Neum.* 259.
„ marcrourus *(L.)* 259.
Coliuspasser *Rüpp.* 347.
„ albonotatus *(Cass.)* 347.
„ macroura *(Gm.)* 347.
Conurus aeruginosus *(L.)* 248.
Copsychus saularis *(L.)* 8.
Coracias caudata corti *Shell.* 173.
„ naevius *Daud.* 173.
Cosmopsarius regius *Rchw.* 188.
Cossypha caffra *(L.)* 52.
„ humeralis *Sm.* 52.
Crateropus *Sw.* 258.
„ leucopygius smithi *Sharpe* 258.
Crotophaga *L* 214.
„ ani *Gm* 213
Cyanocompsa parellina *(Bp.)* 117.
Cyanops asiatica *(Lath.)* 176.
Cyrtonyx *J. Gd* 278.
„ montezumae *(Vig.)* 278. 301.

Damadrossel 15. 110*. 112.
Dayal „ 15. 183*.
Diatropura progne *(Bodd.)* 339.
Dinemellia *(Rchb.)* 178 313.
„ dinemelli *(Rüpp.)* 78. 313.
Diukafink 5.
Dohle 48. 56. 72. 128. 153. 198.
Dominikanerwitwe 47. 49. 323. 325*. 361.
Dorpelgelbkopf 318. 329.
Dornrasmücke 128. 162. 361.
Dreizehenspecht 198.
Drossel 130.
„ rohrsänger 142.
„ schmatzer 268.
„ Swainsons 130. 133*.
„ Wilsons 130.
Drosling 258.
Dunenkopfpapagei 353.

Edelpapagei, Müllers 280.
Eichelhäher 56 110. 128 142. 198. 361.
Eisvogel 128. 143. 179. 215. 216. 244..
Elfenastrild 15. 47.
„ beinsittich 285. 329.
Elster 56. 128. 159. 164. 197*. 198. 361.
Elsterchen, Heuglins 37*.
„ drossel 8.
„ specht 198*.
Ente 159.
Erlenzeisig 8. 30. 51. 96. 104. 107. 111. 128. 181. 184 190. 208. 219. 220. 221. 222. 224. 231. 253. 255. 261. 307.
Erzpfaffchen 147.
Estrilda rhodopyga *(Sund.)* 32.

Fächerpapagei 47.
Fasan 48. 136.
Falzschnabelpfäffchen 61*. 70. 147.
Feldlerche 24. 56. 111. 128. 169. 217. 259. 361.
„ sperling 48. 78. 86. 107. 111. 128. 142. 201. 308.
Felsensittich 329.
Feuerflügelsittich 152. 248. 285.
„ tangare 133.
„ weber 274.
Fichtenkreuzschnabel 230. 312.
Fischreiher 142. 206. 215.
Filistaubvogel 1 1. 128. 256. 261. 280.
Flammenweber 49. 274. 275*. 282.
Flavismus 8.
Fliegenschnäpper 185.
„ „, grauer 169. 264.
Flußregenpfeifer 56.
„ seeschwalbe 71.
„ uferlaufer 143.
Fruchttaube, gemalte 303.

Gabelrake, abessin. 172.
„ weih 143.
Galeopsar salvadorii *Sharpe* 204.
Gartengrasmücke 56. 111. 155*. 169. 217. 228.
„ rotschwanz 56. 111. 128. 169. 183. 224. 225. 256. 361.
„ sänger 56. 82. 108. 111. 196. 202. 210. 275. 320. 361.
Gebirgslori 300. 302*.
„ nelze 153. 169. 255. 262.
Gelbbauchammer 298.
„ brustara 329.
„ flügelara 47. 129. 329.
„ haubenkakadu, kleiner, 329. 330.
„ kehlhabia 229.
„ nackenamazone 329*. 361.
„ „ paradieswitwe 332.
„ rückenwitwe 49. 330.
„ scheitelweber 77. 298.
„ steißbülbül 172. 173*.
„ weber 289
Geocichla citrina *Lath.* 112.
Gilbweber 246*. 290
Gimpel 48. 93. 111. 128. 181. 189. 201. 214. 222. 224. 230. 246. 253. 255. 307. 320.
Girlitz 56. 78. 86. 96. 107. 111. 128. 142. 144. 153. 162. 181. 222. 230. 253. 262.
„ schwefelgelber 235*.
Glanzkuckuck 45*.
„ star 285
„ „ abessinischer 286*.
„ witwe 184. 323.
Glockenvogel 361.
Goldammer 48. 56. 106 111. 128. 135. 153. 164. 254. 255. 261. 307.
„ augentimalie 118*.
„ brüstchen 47.
„ hähnchen, feuerköpfiges 111.
„ „ gelbköpfiges 111. 155. 163. 185. 217. 361.
„ stirnblattvogel 15. 115*.
„ „ sittich 5. 47. 248. 285. 320.
Gouldamandine 284. 318.
Granatastrild 15. 47.
Grasammerfink 6.
„ mücke 142. 185. 235.
„ sitich 361.
Grauammer 111. 153.
„ astrild 220.
„ girlitz, gelbbürzeliger 49. 128.
„ „ Rüppells 178. 181*.
„ „ weißbürzeliger 49. 128. 152. 202. 220. 307. 336.
„ kardinal 184. 312.
„ kopfpfäffchen 146, 147*.
„ papagei 15. 105. 284. 328.

Graupfäffchen 145.
„ schwanzdrossel 354.
„ specht 126.
Grundrötel 6.
Grünflügelara 47. 207. 229*. 329.
„ häher, mexikan. 285*.
„ kardinal 232.
„ ling 16. 56. 64. 78. 86. 107. 111. 128. 142. 153. 162. 166. 168. 174. 181. 189. 193. 222. 224 255.
„ specht 126. 128. 142. 255.
„ guajakittich 353.
Guatemalasittich 247*. 285.
Gymnomystax melanicterus *(L.)* 14.

Hahnenfedrigkeit 8.
„ schweifwitwe 47. 49. 339. 341*.
Hakengimpel 230.
Halsbandbartvogel 101*. 104.
„ regenpfeifer 159*. 164.
„ sittich 118. 329.
„ „ afrikanischer 118.
Haubenlerche 128. 153. 162.
„ meise 111. 128. 349.
Hausrotschwanz 8. 48. 56. 111. 128. 169. 235. 263.
„ sperling 111. 128. 170.
Heckenbraunelle 48. 50. 56. 128. 255. 282. 283*. 361.
Heidelerche 136. 169. 217. 257. 262*. 361.
Helenasajänchen 47. 50.
Hermaphroditismus (Gimpel) 93*.
Honigsauger 284.
Hühnerhabicht 127. 143. 154. 244. 269. 291*.
Hyazinthara 329.
Hyphantornis abyssinicus *(Gm.)* 305.
„ cucullatus *(St. Müll.)* 298.
„ nigriceps *Lay.* 205.
„ spilonotus *Vig.* 77. 298.
Hypochaera chalybeata *(St. Müll.)* 314.

Icterus parisorum *Bp.* 52.
Indigofink 284. 353.
Inkakakadu 88.
Jagdfalk 291.
Jamaikatrupial 150. 155. 164.
Jendajasittich 47. 329.

Kajenneralle 117*.
Kakapo 121.
Kalanderlerche 361.
Kampfläufer 71.
Kanarienflügelsittich 47. 353. 361.
„ vogel 3. 11. 19. 26. 34. 43. 50. 59. 82. 104. 112. 166. 168. 173. 192. 232. 287. 299.
„ „ Holländer 68. 69*.
„ „ Münchener Holländer 68. 69*. 82. 83*.
„ „ „ Gold 82.
„ „ Schweizer 68.
„ „ von Roubaix 68.
Kappapagei 276.
Kardinal 128.
„ roter 152. 232. 329. 353. 361.
Karmingimpel 230. 307.
„ mexikan. 152. 255*. 256. 353. 361.
Katzendrossel 140 142*. 144. 353.
Kea 121. 123*. 328.
Kiebitz 136. 143. 153. 169.
Kiefernkreuzschnabel 230.
Kirschkernbeißer 48. 111. 128. 222. 361.
Kleiber 142. 155. 194. 214.
Kleinelsterchen 37*. 181. 224.
„ specht 142.
Klunkerstar 203*. 204. 353.
Knackente 143.
Köhleramsel 354.
Kohlmeise 56. 107. 111. 128. 142. 148. 214. 254.
Kolkrabe 110.
Königsglanzstar 188. 189*. 353.
„ tyrann 207*.
„ wida 47. 323. 332. 333*.
Krähen 164. 198. 254.
Kranich 254. 311*. 318*.
Kreuzschnabel 29. 61. 222. 230. 349.
Krickente 143.
Kronenkranich 317*.
Kronfink 50.
„ brasilianischer 354.
„ tangare 354.
Kubafink klein 220. 284. 318. 336. 353.
„ tangare 133.
Kuckuck 45. 142. 159. 169. 184. 214. 262.
Kuhstärling 31. 288.
Kurzschwanzpapagei 47.
Küstenseeschwalbe 158. 164.

Lachmöwe 143
Lagonosticta senegala carlo *Zedl.* 187.
Lamprocolius chalybaeus *(Henpr. Ehrenbg.)* 286.
Lamprocolius cyaniventris *Blyth* 78.
Lanius collurio *L.* 73.
„ excubitor *L.* 73.
Lankashire-Rasse 35*.
Lappenstar s. Klunkerstar.
Larmdrossel 258.
Larvenweber 236. 237*. 305.
Laubvogel 142. 155. 185.
Leinfink, sibirischer 91.
Lerchen 159. 164 165.
„ ammerfink 6.
Linura fischeri *Rchw.* 333.
Lophochroa citrinocristatus *(Fras.)* 265.
Lumme 137. 145.
Lund 137. 145.
Lybius torquatus *(Dum.)* 104.

Madenhacker 213.
Magdlazerfig 353.
Mahaliweber 89.
„ schwarzschnäbeliger 250. 251*. 306.
Mainastar 194.
Malabarblattvogel 115*.
„ fasänchen 50.
Marabu 319*.
Maskengrassfink 284. 361.
„ weber 47. 361.
Massenawachtel 239. 240. 276. 301.
Mauersegler 126. 154. 224. 256. 263.
Mäusebussard 48. 127. 128. 143. 154. 269*.
Mausvogel, Hilgerts 259. 361*.
Mehlschwalbe 126. 128. 263.
Meisen 107. 154. 185. 193. 261. 349.
Melanopteryx *Rchw.* 305.
„ rubiginosus *(Rüpp.)* 32. 305.
Milan 143.
„ roter 208.
Milvus milvus *(L.)* 208.
Mischling:
Birkenzeisig × Kanarienvogel 308.
Bluthänfling × „ 95.
Erlenzeisig × „ 95. 107.
Girlitz × „ 95.
Stieglitz × „ 95. 189. 287. 294*. 353.
Zitronenzeisig × „ 95.
Barabandsittich × Blaukappensittich 329.
Silberschnabel × Mönchen 191.
Sprosser × Nachtigall 343.
Misteldrossel 142. 361.
Mittelspecht 142. 167*. 198*.
Mohrenkopf 135*. 329. 353.
Molothrus ater *(Bodd.)* 31.
„ badius *(Vieill.)* 31.
„ bonariensis *(Gm.)* 31.
„ rufoaxillaris *Cass.* 31.
Molukkenkakadu 329. 343*.
Mönchgrasmücke 24. 61. 108. 128. 144. 152. 181. 185. 217. 228. 263. 361.
„ sittich 329.
Morgenammerfink 6.
Mossambikzeisig 47. 128. 152. 181. 191. 308.
Mowchen, japan. 50. 88. 180. 191. 192. 200. 224. 272. 300. 318.
Möwe 137.
Mülleramazone 47. 329.
Muskatfink 182.

Nachtigall 24. 63. 73. 78. 81. 86. 136. 142. 159. 181. 185. 208. 217. 227. 235. 276. 344. 361.
„ rohrsänger 16.
Nachtschwalbe 169.
Nacktaugenstärling 13*. 14.
Nebelkrähe 72. 128. 198. 349.
Neisua quartinia *(Bp.)* 251.
Nestor notabilis *J. Gd.* 121.
Neuguinea-Edelpapagei 129. 329.
Neuseeländersittich, rotstirniger 329.
Niltawafliegenschnäpper 15.
Nymphensittich 181. 190. 238*.

Olivendrossel 330.
Orangehaubenkakadu 268. 361.
„ pfäffchen 147. 151*.
„ weber 49. 274. 275*. 279*.
Orixweber 47. 225. 227*. 274. 275*. 281.
Orpheusgrasmücke 361.

Palaeornis cubicularis *(Hasselqu.)* 118.
Papagei 129. 136. 284. 328.
Papstfink 177. 284.
Paradiesvogel 16.
„ wida 47. 49. 331.
Pariser Trompeter 68.
Parus atricapillus rhenanus *Kl.* 142.
„ palustris *Baldst.* 142.
Passer griseus *(Vieill.)* 13.
Pennantsittich 329.
Perissornis carunculatus *(Gm.)* 204.
Pernis apivorus *(L.)* 208.
Pfeifsittich 25.
Pfäffchen 128. 146. 152.
Pfau 232.
Pieper 164.
Pionias menstruus *(L.)* 353.
„ sordidus *(L.)* 353.
Pirol 142. 169.
„ weber s. Gilbweber.
Pitpit s. Zuckervogel.
Plattschweifwidafink 347.
Plocepasser *A. Sm.* 250. 306.
„ melanorhynchus *A. Sm.* 250. 306.
„ pectoralis *(Ptrs.)* 251.
Ploceus capitalis *(Lath.)* 160.
„ cucullatus abyssinicus *(Gm.)* 236.
„ „ nigriceps *(Lay.)* 212.
„ galbula *Rüpp.* 243.
„ heuglini *Rchw.* 243.
„ reichardi *Rchw.* 243.
Policephalus fuscicapillus *(Verr.)* 269. 277.
„ robustus *(Gm.)* 276.
„ „ fuscicollis *(Kuhl)* 269. 276.
„ rufiventris *(Rüpp.)* 269.
Poliospiza tristriata *(Rupp.)* 178.
Poospiza withii *Sclater* 6.
Prachtfinken 160. 192. 284. 300. 318. 335. 338.
„ glanzstar 75*. 77. 304.
Prunella collaris collaris *(Scop.)* 1.
Psittacula cyanopygia *Bp.* 48. 66.
„ deliciosa *Ridgw.* 66.
„ guianensis *(Sw.)* 66.
Ptilopus coronulatus *G. R. Gr.* 303.
Purpurreiher 143.
„ tangare 119*. 133. 353.
Pycnonotus arsinoe somaliensis *Rchw.* 172.
„ nigricans *(Vieill.)* 172.
Pyctorhis sinensis *(Gm.)* 118.
Pyromelana *Bp.* 274.
„ afra *(Gm.)* 282.
„ flammiceps *(Sw.)* 281.
„ franciscana *(Isert)* 274.
„ orix *(L.)* 281.
„ taha *(A. Sm.)* 282.
„ „ intercedens *Erl.* 282.
„ „ ladoensis 282.
„ „ stricta *(Hartl.)* 282.

Quelea *Rchb.* 273.
„ sanguinirostris aethiopica *(Sund.)* 273. 287.
„ „ intermedia *Rchw.* 273.
„ „ var. russii *(Finsch)* 273.

Rabe 159. 197.
Rabenkrähe 72. 110. 128. 142. 198.
Raubwürger 73. 142. 168. 361.
Rauchschwalbe 56. 111. 128. 169. 256. 263.
Reisvogel 182. 191. 308.
„ weißer 353.
Rephuhn 72.
Riesenhabia 219*. 228.
Ringeltaube 127.
Rohrammer 56. 128.
„ dommel 159.
„ sänger 128. 185.
„ weih 128.
Rosakakadu 353*.
Rosellasittich 329.
Rosenpapagei 50. 57. 59*. 89. 97. 170. 328.
Rosttaubchen 125. 126*. 132.
Rotachselkuhstärling 31. 36.
„ bauchmohrenkopf 269.
„ bugamazone 201. 316. 329.
„ fußfalk 164.
„ haubenkakadu 329.
„ kehlchen 33. 41. 61. 111. 128. 135. 141. 142. 148. 169. 185. 201. 215. 217. 219. 227. 235. 254 255. 261. 275.
„ kehlfliegenschnäpper 309*.
„ rückenwürger 8. 56. 73. 111. 142. 208. 217. 263. 280. 316. 326. 333. 336*. 351*. 361.
„ schenkel 71.
„ schulterwidafink 348.
„ schwanz 185. 255.
„ schwingenglanzstar 84.* 107*.
„ „ gehäubter 190*. 204.
„ stirnbartvogel 102*. 104.
Rufirallus cajennensis *(Gm.)* 117.
Rußköpfchen 16. 129. 191. 284.
„ weber 273.

Saatkrähe 72. 110. 128. 153. 198.
Safranfink 296.
Saltator grandis *(Lcht.)* 228.
„ magnus *(Müll.)* 229.
„ magnoides magnoides *Lafr.* 229.
Schamadrossel 15. 120. 192. 293. 320.
Schilfrohrsänger 142.
Schmalschnabelkardinal 231*. 232.
Schmätzer 185 192.
Sammetlingsfink 50. 181. 191 220.
Schmuckbartvogel, geperlter 99*. 101.
„ lori 328.
Schnurrbärtchen 47. 50. 306.
Schönbürzelchen 177. 223.
Schopfwachtel, kalifornische 254*. 256.
Schreiadler 208.

Schuppenköpfchen 353.
Schwalbe 159.
Schwanzmeise 56. 128. 142. 148. 155. 163.
Schwarzbrustzeisig 128.
„ flügelweber 305.
„ kappenlori 329.
„ „ pfäffchen 128. 147. 149*.
„ „ tangare 133.
„ „ timalie 15.
„ kopfweber 205*. 212.
„ „ nonne 182.
„ ohrpapagei 47. 353.
„ specht 128. 135. 142.
„ stirnweber 297.
Seeadler 128.
„ regenpfeifer 71.
Seidenkuhstärling 31. 286.
„ schwanz 361,
Serinus sulfuratus *(L.)* 235.
Siedelweber 89.
Silbermöwe 71.
„ ohrsonnenvogel 15.
„ schnäbelchen 181. 191. 224.
Singdrossel 48. 56. 74. 78. 86. 111. 128. 142. 163. 165*. 169. 215. 228. 254.
Siphia *Hdgs.* 309.
„ strophiata *Hdgs.* 309.
Sitagra vitellina *(Lcht.)* 290.
Sittiche 88. 184. 239. 285.
Soldatenara 329.
„ stärling 353.
Somalibülbül 172. 195*.
„ lärmdrossel 258. 259*.
Sonnenvogel 104. 152. 181. 191.
Specht 154.
Sperber 143. 269. 293.
„ grasmücke 217. 354. 361.
Sperlingspapagei 57. 65. 67*. 170. 220. 284. 302. 361.
„ „ grünbürzel. 66. 303.
„ „ mexikan. 48. 66. 303.
„ täubchen 125*. 131.
„ „ von Ekuador 125. 131*. 132.
„ weber 250. 306.
Spiegelwidafink s. Witwe, weiß gezeichnet.
„ trupial 271*.
Spitzschwanzamandine 284. 312. 318. 346.
Sporaeginthus flavidiventris *(Wall.)* 240.
Sporophila castaneiventris *(Cab.)* 147.
„ falcirostris *Tem.* 70.
„ hypoleuca *(Lcht.)* 146.
„ minuta *(L.)* 146.
„ nigroaurantia *(Bodd.)* 147.
„ plumbeiceps *(Salvad.)* 146.
Sporopipes *Cab.* 306.
„ squamifrons *(A. Sm.)* 306.
Spottdrossel, amerikan. 168.
„ braune 168.
Spreo superbus *(Rüpp.)* 77. 304.
Sprosser 185. 217. 235 361.
Staffelschwanzfliegenschnäpper 85. 87*.
Star 53. 72. 103. 104. 111. 112. 136. 160. 194. 254. 263. 305.
Stärling 287.
Stahlfink 314.
Steganura paradisea *(L.)* 332.
„ „ aucupum *Neum.* 332.
„ „ verreauxi *(Cass.)* 332.
Steinadler 154. 292.
„ kauz 143. 262. 361.
„ rötel 301.
„ schmätzer 56. 128.
Stelzen 185.
Steuostira scita *Vieill.* 85.
Stieglitz 30. 48. 61. 78. 107. 111. 128. 152. 153. 162. 168. 181. 190. 221. 231. 254. 261. 307. 354.
Stockente 143. 162.
Storch 128. 143. 153. 310*.
Strauchammerfink 303*.
Strichelblaurake 173. 178. 179*.
Stringops habroptilus *(G. R. Gr.)* 121.
Stummelschwanzwidafink 348.
Sturmmöwe 71.
Sumpfhuhn 16.
„ meise 111. 128. 142. 148. 166*. 215. 263.
„ rohrsänger 24. 82. 111. 142. 287. 275. 320. 361.
Surinumamazone 329.

Tachyphonus rufus *(Bodd.)* 133.
Tafelente 157. 164.
Tahaweber 49. 282. 287*. 289. 353.
Tanagra abbas *Licht.* 187.
Tanagrella cyanomelana *(Wied.)* 133.
Tangare 132.
„ meerblaue 353.
„ schwarzblaue 133.
Tannenmeise 106. 111. 128.
Tanygnathus mülleri *(Tem.)* 280.
Teichhuhn, grünfüßiges 127. 128.
„ rohrsänger 142.
Tetraenura regia *(L.)* 332.
Textor albirostris *(Vieill.)* 313.
Textorweber 297. 298.
Thamnobia cambajensis *(Lath.)* 176.
Thamnolaea *Cab.* 268.
„ albiscapulata *Rüpp.* 268.
„ „ subrufipennis *Rchw.* 268.
„ semirufa *Rüpp.* 268.
Tigerfink 50. 182. 191. 240.
„ gelbbäuchiger 240.
Tirikasittich 48.
Tovisittich 47. 285. 353. 361.
Trachyphonus margaritatus *(Cretzschm.)* 101.
Trauerfliegenschnäpper 128. 142. 169.
„ tangare 133. 163*.
Tricholaema leucomelan *(Bodd.)* 104.
Triel 56.
Trupial 287.
„ Scotts 52. 53*. 69.
Tüpfelsumpfhuhn 228.
Turdus albicollis *(Vieill.)* 354.
„ amaurochalina *(Cab.)* 354.
„ flavipes *(Vieill.)* 354.
„ famigatus *(Lct.)* 354.
„ fuscescens *Steph.* 130.
„ merula *L.* 73.
„ mustellinus *Gm.* 130. 139.
„ olivaceus *L.* 330.
Turmfalk 56. 127. 128. 143.
Tyrann, schwefelgelber 353.
Tyrannus tyrannus *(L.)* 207.

Uferschnepfe 143.
„ schwalbe 56. 154.
Uhu 154
Unzertrennliche 57. 65. 170.
„ tarantinische 65. 75. 127*, 175. 191. 284. 309. 330. 361.
Uraeginthus bengalus schoanus *Neum.* 252.
Uralkauz 16.
Urobrachia *Bp.* 348.
„ axillaris *(A. Sm.)* 348.

Vidua *Cuv.* 323.
„ hypocherina *(Verr.)* 323.
„ serena *(L.)* 323.
Viehstelze 24. 142. 153. 162.
„ weber s. Weißkopfviehweber.

Wachtel 308. 312. 361.
„ astrild 15.
Walddrossel 130. 139*.
„ hüttensperling 13. 83. 85*.
„ kauz 143. 169.
Waldlaubvogel 169.
„ ohreule 169.
„ wasserläufer 164.
Wanderdrossel 140. 141*. 353.
„ elster 191*. 192.
„ falk 104. 244. 269. 291. 293*.
Wasserstar 348. 355. 357*.
Weber 107. 177. 265. 273. 347.
„ dottergelber 290. 297*.
„ Heuglins 77*. 248. 248.
„ Reichards 242. 243*.
„ rotbrauner 31*. 32. 305.
Weidenlaubvogel 56. 111. 128. 162. 169. 255. 262. 280.
„ meise 142.
Weißbauchpapagei 25. 27*. 47. 213. 361.
„ buidendrosselschmätzer 267*. 268.
„ flügelschmätzerdrossel 51*. 52.
„ häherling 353.
„ haubenkakadu 129. 343. 345*. 353.
„ kehlpfäffchen 50. 95*. 96. 128. 182. 308.
„ „ drossel 354.
„ kopfviehweber 78. 79*. 178. 313. 320. 353.
„ stirnpfäffchen 90*. 96. 128. 147.
Wellensittich 36. 48. 49. 62. 87. 97. 104. 112. 152. 180. 189. 195. 208. 220. 224. 272. 320. 328. 338. 345. 353. 360.
„ blauer 36. 71. 191. 195. 353.
„ gelber 36. 50. 353.
„ olivgrüner 36. 353.
„ satingrüner 36. 353.
Wendehals 78. 86. 128. 142. 162. 164. 262.
Wespenbussard 128. 169. 208.
Widafink 49. 265. 273. 314. 323. 347.
„ weißgezeichneter 49. 347. 349*.
Wiedehopf 6. 159. 164.
Wiesenpieper 24. 128. 142. 153. 162. 263. 361.
„ schmätzer, braunkehl. 128. 142. 162. 263. 275. 361.
Winterammerfink 6.
Würger 185.

Xanthophilus *Rchb.* 289.
„ galbula *(Rüpp.)* 290.

Yorkhire-Kanarien 43.

Zaungrasmücke 56. 78. 111. 128. 169. 262.
„ könig 6. 56. 111. 128. 142. 154. 163. 169 185. 217. 244. 245*. 361.
Zebrafink 180. 190. 220. 222*. 224. 300. 318.
„ täubchen 361.
Zitronenzeisig 160 208.
Zucke vogel 346. 354. 361*.
Zügelastrild 29*. 32. 251.
Zwergelsterchen 191.
„ fliegenfänger 343.
„ maskenweber 361.
„ pfäffchen 146.
„ „ graurückiges 147. 150*.
„ seeschwalbe 71.
„ täubchen 330.
timalie 15.

Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Jahrg. 53 | Den 3. Januar 1924 | Heft 1

(Druckort: Burg, Bezirk Magdeburg.)

An die Freunde der „Gefiederten Welt".

Zu den vielen Opfern der Nachkriegszeit zählt auch unsere Zeitschrift. Trotz hoher Abonnentenzahl mußte sie infolge der Unsicherheit der Währungsverhältnisse ihr Erscheinen einstellen. Die voraussichtlich dauernde Festigung unserer wirtschaftlichen Verhältnisse schuf auch für sie die Möglichkeit des Wiederauflebens. Immerhin wird sie noch mit Schwierigkeiten zu kämpfen haben, zu deren Überwindung sie der tatkräftigen Hilfe ihrer Freunde bedarf.

Die bildliche Ausstattung und die Beigabe farbiger Tafeln legen dem Verlage Opfer auf, die für ihn allein nicht tragbar sind. Kommen wir ihm zu Hilfe!

Viele Verehrer unseres Fachblattes haben sich bereit erklärt, Mittel zur Schaffung eines Stützungsfonds herzugeben in der festen Zuversicht, daß ihr Beispiel unter den zahlreichen Vogelfreunden des In- und Auslandes Nachahmung finden werde. An alle diejenigen, denen an dem Weiterbestehen und dem Ausbau unserer Zeitschrift gelegen ist, ergeht daher die dringende Bitte um tatkräftige Beteiligung an diesem Stützungswerk!

Beträge und Zuschriften sind zu richten an den Schriftleiter Karl Neunzig in Berlin-Hermsdorf, Neue Bismarckstraße 42. Der Empfang wird in der Zeitschrift bestätigt.

A. Krabbe, Anklam. Theodor Vandenhoff, Köln. Walter Raimann, Freiwaldau.

Die Alpenbraunelle — Prunélla colláris colláris (s. Abb. S. 3).

Von A. Troschütz.

(Nachdruck verboten.)

Von den 60 Bewohnern meiner Vogelstube sind die beiden Alpenbraunellen die ruhigsten und anspruchlosesten. Zeige ich meine Schar einem Vogelfreund, muß ich auf diese zwei besonders aufmerksam machen. Das stille Wesen und das unscheinbare Kleid lassen das immerhin recht stattliche Paar leicht übersehen.

Merkwürdigerweise werden die Flüevögel, wie sie in Österreich und der Schweiz genannt werden, von deutschen Vogelfreunden nur selten gepflegt. In Hannover hat m. W. nur Herr K. eine Alpenbraunelle 13 Jahre lang gehalten. Das Tier war im Alter fast erblindet, sang aber noch fleißig.

Ich bin vor 10 Jahren durch Zufall zu dieser Vogelart gekommen. Bei einer Nachfrage nach der immer seltener werdenden älteren ornitholog. Literatur erfuhr ich von einem Tiroler Antiquar, daß der Bruder des betr. Herrn, der Bürgermeister in einem von hohen Bergen umgebenen Tiroler Städtchen ist, auch Vögel an deutsche Vogelfreunde, Raubvögel an zoologische Gärten liefert. Ich erhielt damals von dem Herrn Bürgermeister 2 tadellose Blaudrosseln, 1 Steinrötel und 2 Alpenflüevögel. Das war lange vor dem Kriege. Manche von diesen Tieren habe ich 6—8 Jahre gepflegt und später immer wieder versucht, die Lücken in meinem Bestande auszufüllen. Erst Anfang 1919 gelang dies. 3 schöne Alpenbraunellen, 2 ♂ und 1 ♀, sandte mir der Herr, als Zwischenstation den Zoologischen Garten in Nürnberg wählend, zu. Davon erhielt Herr K. wieder ein Männchen, das ihm leider im Vorjahre, ein Zeichen der Zeit, gestohlen wurde.

Mein Paar gewöhnte sich rasch ein, bezog in der Vogelstube hoch oben ein ruhiges Eckplätzchen, das es auch jetzt noch bevorzugt, nur dort manchmal von den Seidenschwänzen verdrängt. Still und ruhig wickelt sich das Leben der beiden dort oben ab. Selten kommen sie nach unten, trippeln oben hin und her, sitzen, immer aufmerksam die Umgebung musternd, auf den Steinen, suchen manchmal im Torfmull nach Futter, baden nur selten. Sie drängeln nicht am Futternapf, beißen und zanken nicht mit den Mitbewohnern, äußern keinerlei Eifersucht. Beide halten treulich zusammen, vertragen sich gut, aber keins der Paare, die ich in 10 Jahren gepflegt, hat je Anstalten zum Nisten getroffen. Es ist bei der Art wie mit den Seidenschwänzen, die auch in großen mit

Gebüsch, Nadelhölzern u. a. bepflanzten Außenräumen nicht zur Fortpflanzung in der Gefangenschaft zu bringen sind.

Die Verpflegung beider Vögel macht keine Schwierigkeiten. Neben dem Körnerfutter wird ein gutes Weichfutter gereicht; im Sommer daneben Ameisenpuppen, im Winter Mehlwürmer, die gern genommen werden.

Äußerlich sind die Alpenbraunellen stets schmuck und glatt. Das sehr dichte Gefieder wird locker getragen, verleiht dem Vogel ein behäbiges Aussehen, das gut zu seinem ruhigen Wesen paßt. In der ersten Zeit der Gefangenschaft wirkte es drollig, zu sehen, wie der Vogel bemüht war, am Abend „Deckung" zu suchen, sich unter Kiefernzweige, in dichtes Gebüsch einzuschieben, immer besorgt, schützende Zweige über sich, freie Aussicht vor sich zu haben. Der Aufenthalt im unwirtlichen Hochgebirge, auf den Geröllhalden und zwischen Kieferngestrüpp wird diesen echten Gebirgsvogel oft zwingen, vor Wind und Wetter in Löchern, unter Büschen Zuflucht zu suchen. Meine Vögel haben diese Gewohnheit jahrelang beibehalten.

In ihrem Wesen sind sie klug, vorsichtig, aufmerksam, nie aufgeregt und ängstlich. Zahm sind sie aber nie geworden. Ich kann in der Vogelstube dicht an sie herantreten, sie weichen erst dann aus, wenn ich den Versuch mache, einen von beiden zu greifen. Im vergangenen Jahre mußte ich dies leider öfter. Beide waren von einem aufgezogenen Dompfaff mit den sog. „Kalkbeinen" angesteckt worden. Beim Weibchen zeigten sich auch Anschwellungen im Fußgelenk. Durch Pinseln mit Perubalsam, Sozojodol wirkt nicht nachhaltig, habe ich das Übel vollständig beseitigt. Die Pinselungen ertrugen sie mit rührender Geduld. Die Regelmäßigkeit, mit der beide an einem bestimmten Platze oder Wege festhalten, verunreinigt die Füße stark. Statt der Torfstücke habe ich jetzt gereinigten Flußsand und Steine als Bodenbelag gewählt und habe nun die Freude, daß beide Tiere dauernd gesund auf den Füßen sind.

Kräftig und flink im Laufen, sind die Flüevögel auch gewandte Flieger, die in dem engen Raum der Vogelstube nie anrempeln, stets geschickt nach oben und unten gelangen.

Allerliebst ist der Gesang des Männchens, den es mit Vorliebe bei Lichte, am Abend, vorträgt. Wie Grasmückengesang, wie das Lied der Haubenlerche klingen die flötenartigen Töne. In diesem Jahre überraschte mich die Zunahme der Klangstärke, aber auch eine größere „Härte" im Ton, die nicht unangenehm wirkt, von dem weichen lieblichen Gesang der Vorjahre aber abweicht.

Kommt auch die Alpenbraunelle im Herbst herab in die Dörfer, sucht im Winter in Scheuern und auf Miststätten nach Futter, so wird sie doch nur selten gefangen. Der Vogel, der nie auf Baum und Strauch zu finden ist, dem in den Bergen kein Wetter etwas anhaben kann, ist für den engen Käfig in warmer Stube nicht geeignet. Erst in der Vogelstube kommt sein liebenswürdiges Wesen zur Geltung, erst da gewinnt man ihn, trotz seines unscheinbaren Kleides, bald lieb.

Exakte Vererbungsversuche bei Kanarienvögeln.

Von Dr. H. Duncker, Bremen.

(Nachdruck verboten.)

I.

Seit vier Jahrhunderten ist der Kanarienvogel ein Haustier geworden. Seine Abstammung vom wilden Kanarienvogel, Serinus canariensis, der auf den Kanarischen Inseln beheimatet ist, steht außer Zweifel. Alle Ableitungsversuche von heimischen Finkenarten sind abwegig. Hätten wir nicht ganz bestimmte historische Belege, so würden auch seine gestaltlichen Eigenschaften dies erweisen. Wie alle domestizierten Formen zeigt auch unser Kanarienvogel zahlreiche Rassen und Abweichungstypen von seiner Stammform. Bereits im Jahre 1713 unterscheidet Hervieux 29 verschiedene Rassen des Kanarienvogels, und heute dürften deren auf der ganzen Welt noch bei weitem mehr aufgestellt werden können. Zwei Fragen stoßen dem denkenden Züchter hierbei sofort auf:

1. Wie sind diese verschiedenen Rassen aus der Stammform entstanden?

2. Wie kann man mit Sicherheit solche Rassen unterscheiden und rein züchten?

Die erste Frage stellen ist leicht, sie beantworten ungeheuer schwierig, denn sie ist identisch mit dem in der Wissenschaft noch immer strittigen Problem der Entstehung der Arten überhaupt. Vor 50 bis 60 Jahren glaubte der große englische Forscher Darwin des Rätsels Lösung gefunden zu haben. Die Variabilität der Formen sollte nach seiner Ansicht der Natur die Möglichkeit geben, im Kampf ums Dasein stets die Plusvarianten einer Population überleben zu lassen. Deren Nachkommenschaft sollte dann die von ihren Eltern überkommenen günstigen Eigenschaften wiederum in einzelnen ihrer Vertreter steigern und so eine weitere Verschiebung in der Richtung einer noch besseren Anpassung an die Umweltsbedingungen hervorrufen. So sei langsam eine Veränderung des Artbildes zustande gekommen, und zwar im Sinne einer immer besseren Anpassung. Darwin hat sich zu dieser Lehre anregen lassen durch die Methode der Züchter bei der Erzielung neuer günstiger Formen unter den domestizierten Tieren und Pflanzen. Und in der Tat, ein Kanarienzüchter, welcher rein gelbe Vögel in seinem Stamme haben will, paart auch heute noch stets möglichst helle Formen miteinander. Stehen ihm durch Zufall nur grüne Vögel zur Verfügung, so wird er etwa in dem Sinne verfahren, wie Altmeister Ruß es für die Erzielung gelber Kanarienvögel vorschlägt. Nach einigen Generationen wird er sein Ziel erreicht haben. Die Erfahrungen der Kanarienzüchter geben also anscheinend der Darwinschen Auffassung von der Entstehung neuer Formen recht. Der Gesangskanarienzüchter verfährt daher auch nach diesem Rezept und wählt unter seinem Zuchtmaterial stets die besten Sänger zur Nachzucht aus und hofft auf diesem Wege, den Gesang innerhalb seines Stammes immer mehr und mehr in der gewünschten Richtung zu veredeln.

Nun weiß aber jeder Züchter, daß nicht alle Merkmale auf diesem Wege zu erzüchten sind. Z. B. dürfte ein Züchter, welcher Haubenvögel, weiße Vögel, Isabellen usw. züchten will, lange auf einen Erfolg

warten müssen, wenn er sie auf diesem Wege gewinnen wollte. Hier verfährt der Züchter denn auch ganz anders: Er kreuzt in seinen Stamm die betreffende Eigenschaft hinein. Bei der Erklärung der Entstehung aller dieser Formen versagt die Darwinsche Selektionstheorie. Es ist auch nicht anzunehmen, daß in den Zuchten der früheren Jahrhunderte diese Charaktere auf dem von Darwin beschriebenen Wege entstanden seien, man würde sonst darüber etwas wissen, und es müßte für den einen oder den andern Charakter eine solche Entstehung auch heute noch nachzuweisen sein. Alle diese abweichenden Formen, so nimmt man heute im Gegensatz zu Darwin an, sind in irgendwelchen Zuchten plötzlich und unmittelbar, fix und fertig aufgetaucht und haben sich dann durch Vererbung dieser abweichenden Eigenschaft bis heute erhalten. Ein amerikanischer Züchter von einer

Alpenbraunelle (s. S. 1).

rein zu wissenschaftlichen Zwecken gezüchteten Insektenart, der „Taufliege", Drosophila melanogaster, hat in seinen Zuchten bereits über 200 solcher plötzlich entstehender abweichender Formen mit durchaus vererblichem Charakter in den letzten 20 Jahren festgestellt. Es ist kein Zweifel, daß solche Abweichungen auch in unseren Kanarienzuchten heute noch vorkommen, aber selten für die Nachzucht Verwendung finden, weil sie nicht den Wünschen der Züchter entsprechen und daher wieder verschwinden. Man nennt solche plötzlich auftauchenden, aber völlig erblichen Abänderungen Mutanten, die Veränderung eine Mutation. Die von Darwin für die Erklärung der Artbildung herangezogenen individuellen Abänderungen innerhalb der gleichen Nachkommenschaft nennt man dagegen Modifikationen. Ihre Erblichkeit stellt man durchaus in Zweifel.

Seit etwa 20 Jahren hat man unter Wiederaufnahme der Versuche des Pater Gregor Mendel aus den 60er Jahren, welche der unverdienten Vergessenheit anheimgefallen waren, bezüglich der Erforschung der Artbildung gerade den umgekehrten Weg eingeschlagen, den Darwin gegangen ist. Während er die Modifikationen in erster Linie als die Grundlagen für die Artbildung ansah, wurden jetzt gerade die Mutationen einem eingehenden Studium unterzogen. Durch die Kreuzung von Rassen, welche sich in einem, zwei oder mehr Merkmalen deutlich unterscheiden, aber unbeschränkt fruchtbar miteinander sind, hat man erkannt, daß zahlreiche äußerlich in die Erscheinung tretende Eigenschaften ihre Entstehung sogenannten Erbfaktoren verdanken, die ihren Sitz in dem Kern der befruchteten Eizelle haben. Für jede äußerliche Eigenschaft sind 2 Erbfaktoren vorhanden, deren einer väterlichen, deren anderer mütterlichen Ursprungs ist. Bei der Entwicklung der Geschlechtszellen spalten sich diese Erbfaktoren wieder, so daß jede Geschlechtszelle (Sperma bzw. unbefruchtetes Ei) für jede Eigenschaft nur einen Erbfaktor enthält. Bei der Befruchtung kombinieren sich dann die Erbfaktoren wieder von neuem. Dieser Mechanismus der Verteilung der Erbfaktoren auf die Nachkommenschaft hat sich als zahlenmäßig erfaßbar erwiesen. In tausendfältigen Versuchen ist diese auf den Pater Gregor Mendel zurückgehende exakte Forschungsmethode als richtig erkannt worden. Dabei hat sich dann freilich ergeben, daß die Anschauungen Darwins über die Vorgänge bei der Entstehung neuer Rassen nicht haltbar waren. Das scheinbare Übereinstimmen des Züchterverfahrens z. B. bezüglich der gelben Kanarienvögel mit seiner Theorie hat ebenfalls im Sinne der Mendelforschung seine Erklärung gefunden. Da die dabei vorwaltenden Vorgänge erst verständlich sind, wenn einfachere Verhältnisse begriffen sind, so muß ich die Erklärung des Vorganges bei der Züchtung gelber Kanarienvögel vorläufig noch zurückstellen. Ich wende mich daher zunächst den einfachsten bisher durchforschten Merkmalen bei Kanarienvögeln zu.

1. Das Entstehen der Haube ist zurückzuführen auf einen Erbfaktor, welcher die Federfollikel auf dem Scheitel aufrichtet, so daß die dort befindlichen Federn

sich nicht dachziegelförmig decken, sondern auf der Mitte des Scheitels ein Wirbel entsteht, um den sich die Federn in mehr oder weniger regelmäßiger Weise anordnen. Wir wollen diesen Erbfaktor einmal mit „H" bezeichnen. Dem glattköpfigen Vogel fehlt dieser Erbfaktor. Wir deuten dieses Fehlen mit „h" an. Paare ich nun einen Haubenvogel mit einem Glattkopf, so finden wir im befruchteten Ei des Bastardes (2. Generation) die Erbfaktoren „Hh" vor, was besagt, daß der betreffende Vogel von seinem einen Elter den Haubencharakter, von seinem andern Elter denselben nicht überkommen hat. Bei der Ausbildung der Geschlechtszellen dieses Bastardes entstehen nun zweierlei Arten von Geschlechtszellen, nämlich einmal solche, welche den Haubencharakter enthalten (H), und zweitens solche, welche ihn nicht enthalten (h). Paare ich nun zwei Bastarde miteinander, so müssen in der 3. Generation in einem Viertel der Nachkommenschaft die Haubenfaktoren zweimal auftreten, in der Hälfte der Nachkommenschaft muß der Haubenfaktor nur einmal vorhanden sein, in einem Viertel der Nachkommenschaft muß er ganz fehlen. Wir erhalten drei Gruppen mit verschiedenen Erbeigenschaften in ganz gesetzmäßiger Zahl, nämlich 25 % „HH", 50 % „Hh" und 25 % „hh". Die erste und dritte Gruppe enthält nur Formen mit gleichartigen Erbfaktoren. Man nennt sie „homozygot" oder reinrassig, die mittlere Gruppe enthält zwei verschiedenartige Erbfaktoren. Man nennt sie „heterozygot" oder Bastarde. Es ist klar, daß die Homozygoten in ihrer Nachkommenschaft rein weiterzüchten müssen. Die „HH" können nur Haubenvögel hervorbringen, die „hh" nur Glattköpfe. Die „Hh" spalten wieder wie 1 : 2 : 1 oder 25 % : 50 % : 25 %. Es wäre nun ein leichtes, dieses Zahlengesetz nachzuweisen, wenn sich die drei Gruppen auch äußerlich dokumentierten. Bei der japanischen Wunderblume, Mirabilis jalapa, ist dies auch wirklich der Fall. Kreuzt man eine rote Rasse dieser Pflanze mit einer weißen, so entstehen 25 % rote, 50 % rosa und 25 % weiße Formen, wobei offenbar die rosa Form den Bastard darstellt. Bei sehr vielen studierten Merkmalen ist dieses aber nicht der Fall. Vielmehr unterscheiden sich die beiden ersten Gruppen nicht voneinander. Und gerade diese Fälle hat Mendel zuerst untersucht: Es waren Erbsen. Kreuzte er eine Erbse mit grünem Samen mit einer solchen mit gelbem Samen, so zeigten 75 % der Nachkommen gelbe Samen, wovon aber nur 25 % reingelb weiterzüchteten, während 50 % wieder spalteten. Mendel erkannte daraus richtig, daß sich die bezüglich des einen Charakters homozygoten Formen von den Bastarden äußerlich nicht unterscheiden müßten. Außerdem stellte er fest, daß stets dieselben Merkmale sich im Bastarde durchsetzten. Er nannte solche Erbfaktoren „dominant". Die nicht in die Erscheinung tretenden Erbfaktoren nannte er „rezessiv".

Wenden wir diese Erkenntnisse auf unsere Haubenvögel an, so müßten wir erwarten, daß bei einer Kreuzung von Haubenvogelbastarden miteinander jedesmal 75 % Haubenvögel und 25 % Glattköpfe in die Erscheinung treten, wobei wir voraussetzen, daß natürlich die Anwesenheit eines Faktors über das Nichtvorhandensein desselben dominiert, was wohl ohne weiteres verständlich ist. Solche Versuche sind nun verschiedentlich angestellt worden. Zunächst hat Davenport 1908 solche systematisch durchgeführten Versuche veröffentlicht und ist tatsächlich zu dem Ergebnis gekommen, daß bei Paarung von 2 Haubenvögelbastarden, die beide gehäubt waren, 75 % Haubenvögel und 25 % Glattköpfe fielen. Der englische Züchter Galloway hat in Beantwortung der Davenportschen Arbeit über seine langjährigen Zuchten ebenfalls zahlenmäßiges Material herbeigebracht, kam aber zu dem Ergebnis, daß ganz regelmäßig die Nachkommenschaft zweier Haubenvögelbastarde 66$^2/_3$ % Haubenvögel und 33$^1/_3$ % Glattköpfe ergaben. Die beiden Ergebnisse widersprachen sich also, Anlaß genug, die Versuche noch einmal zu wiederholen. Ich habe dieses im vorigen Jahre im Verein mit Herrn Reich-Bremen getan und habe genau wie Galloway bei 13 Paarungen von Haubenvogel mit Haubenvogel das Verhältnis 2 : 1 bzw. 66$^2/_3$: 33$^1/_3$ % erhalten*).

Dieses widersprach anscheinend den Anschauungen Mendels bezüglich der Verteilung der Erbfaktoren auf die Nachkommenschaft, erfuhr aber bei näherer Nachprüfung eine überraschende Erklärung im Sinne der Mendelschen Theorie. Es stellte sich nämlich heraus, daß die homozygoten Haubenvögel nicht lebensfähig waren und jedesmal bei der Aufzucht zugrunde gingen. Die Nachprüfung der Davenportschen Ergebnisse zeigte, daß auch diesem Züchter genau 25 % seiner Haubenvogelnachkommenschaft auf sehr jugendlichem Stadium eingegangen waren, aber von ihm nicht besonders berücksichtigt waren, ebenso wie in unsern Versuchen. Die Verteilung der Erbfaktoren war also nach den Mendelschen Regeln genau erfolgt, aber die 25 % „HH" starben stets vorzeitig ab. Nur die Bastardvögel blieben am Leben. Derartige Fälle des Absterbens homozygoter Formen sind in der modernen Vererbungslehre in der letzten Zeit immer zahlreicher bekannt geworden. Man sagt, ein solcher Erbfaktor sei mit einem Lethalfaktor (Todesfaktor) gekoppelt. Dieser Lethalfaktor sei aber rezessiv und trete daher nur in Wirksamkeit, wenn er ebenfalls homozygot auftrete. Drücken wir dies einfacher aus, so können wir sagen: Der Erbfaktor, in diesem Falle der Haubenfaktor, wirkt auf irgendwelche lebenswichtige Organe in ungünstigem Sinne ein. In der Einzahl ist er aber nicht stark genug, um zum Tode zu führen, in der Zweizahl hat er die tödliche Wirkung.

Diese Feststellung des jedesmaligen Absterbens der homozygoten Haubenvögel zeitigt nun einige bemerkenswerte Folgerungen: 1. Es kann nur heterozygote Haubenvögel geben. Es kann also nicht vorkommen, daß ein Haubenvogel nur Haubenvögel als Junge hat. Freilich gilt dieser Satz absolut nur für den Fall großer Nachkommenschaft, da die oben genannten %-Zahlen sich auch nur auf große Nachkommenschaften beziehen. Es darf also nicht ein Vogel als homozygot bezeichnet werden, wenn unter den 4 Vögeln seines Geleges nur Haubenvögel waren. Es muß dann das zweite Gelege noch abgewartet werden, und wenn auch hier alle 4 Vögel Haubenvögel sind, was, wenn auch selten, vorkommen wird,

*) Eingehender wird demnächst darüber von mir im Journal f. Ornithologie berichtet.

muß auch das dritte Gelege zur Entscheidung herangezogen werden. Mitunter ist zur Prüfung der Heterozygotie eines Vogels eine Brutperiode nicht ausreichend. In allen Fällen hat es sich aber gezeigt, daß es keine Haubenvögel gibt, welche nur Haubenvögel als Junge hervorgebracht haben. Daraus ergibt sich nun 2., daß es unmöglich ist, eine reine Haubenvogelrasse zu züchten. (Forts. folgt.)

Neueinführungen und Seltenheiten.

Von Karl Neunzig.

(Nachdruck verboten.)

Ungeachtet des schweren wirtschaftlichen Druckes, der auf unserem deutschen Vaterlande lastet und der gestörten oder doch noch mangelhaft wiederhergestellten Verbindungen mit fremden Ländern hat es

Whites Ammerfink (Text umstehend).

der deutsche Vogelhandel verstanden, Vögel ferner Zonen in reichlicher Menge nach Deutschland einzuführen, vielfach leider nur zu kurzem Aufenthalt. Letzteres ist besonders von den selteneren Arten und solchen Vögeln zu sagen, welche zum ersten Male nach Europa oder nach Deutschland kamen. Die leider bis vor kurzem schwankende deutsche Währung und unerschwinglich erscheinende Preise, welche für seltene Vögel gezahlt werden mußten, gingen meist weit über das hinaus, was selbst eifrige und vermögende Liebhaber zu zahlen in der Lage waren. So kam es denn, daß der größte Teil der prächtigen Vögel in die Käfige der Liebhaber des zahlungskräftigen Auslandes abwanderte. Wir müssen uns vorerst mit dieser Tatsache abfinden und erwarten, daß auch wir bald in der Lage sein werden, neue und seltene Arten reichlicher in unseren Käfigen und Vogelstuben zu sehen als in den letzten Jahren. Wir hoffen, daß die Vogelpfleger im Ausland ihre Beobachtungen an den neueingeführten Arten in den Fachschriften ihres Landes wie auch in der „Gefiederten Welt“ veröffentlichen werden, wie wir das in früheren Jahren stets gewohnt waren. Ich erinnere nur an die ausgezeichneten Arbeiten des verstorbenen „langjährigen Vogelliebhabers“, des Herrn Wiese in Veile (Dänemark) und des sehr geschätzten Herrn Dr. Adlersparre in Stockholm, an den ich schon jetzt die Bitte richte, möglichst eingehend über die von ihm gepflegten seltenen Arten in der „Gef. Welt“ zu berichten. Daß unsere deutschen Vogelpfleger uns alles Wissenswerte und Neue über ihre Pfleglinge mitteilen werden, ist wohl selbstverständlich.

Soweit mir Neueinführungen und die Einführung von Seltenheiten bekannt geworden sind, will ich sie in Wort und Bild den Lesern schildern und hoffe, daß meine Mitteilungen von denjenigen Lesern, welche die beschriebenen seltenen Vögel gehalten oder gar gezüchtet haben, ergänzt und berichtigt werden.

Aus jener Gruppe von Finkenvögeln, welche gemeinhin „Ammerfinken“ genannt werden und in einer Anzahl von einigen hundert Arten den amerikanischen Kontinent bevölkern, hat Aug. Fockelmann in Hamburg-Großborstel eine sehr schöne Form auf den Markt gebracht. Die Ammerfinken erfreuen sich trotz ihrer Vielgestaltigkeit und ihrer meist schönen Färbung leider immer noch nicht der Beliebtheit bei den Vogelpflegern, auf welche sie Anspruch haben. Ich erinnere mich immer wieder gern eines Flugkäfigs, welcher in dem früheren alten Vogelhause des Berliner Zoologischen Gartens stand und eine ziemlich zahlreiche Sammlung dieser so außerordentlich verschieden und farbenprächtig gefiederten Finken enthielt. Über die Züchtbarkeit der Ammerfinken in der Gefangenschaft liegen noch wenig Erfahrungen vor. Das mag seinen Grund darin haben, daß es meist schwer ist, Weibchen zu erlangen. Wenn das aber einmal möglich ist, sollte der Versuch gemacht werden, Zuchterfolge zu erzielen. Der Versuch ist nicht aussichtslos. So wurde der schöne Dinkafink mehrfach

gezüchtet, mit gleich günstigem Erfolg das langschwänzige Grundrötel, das in seiner Färbung fast mit der der Schamadrossel übereinstimmt. Mit dem Morgenammerfink und dem schönen Weißkopfammerfink wurden Mischlinge erzielt. Dr. Ruß erzielte in seiner Vogelstube mit dem Winterammerfink, dem Junko der Amerikaner, mehrere erfolgreiche Bruten. Der schöne Lerchenfink zeigte bei verschiedenen Pflegern Neigung zur Fortpflanzung. Der Gesang vieler besteht aus angenehmen wohllautenden Tönen, wird fleißig gebracht, und manche von den Ammerfinken sind Nachtsänger. Einen schlicht, aber sehr schön gefärbten Grasammerfinken führte August Fockelmann im November 1923 ein, den Whites Ammerfinken — Poospiza whitei *Sch.* — aus Argentinien, der bisher wohl kaum nach Deutschland gebracht wurde.

Die Gefiederfärbung von Whites Ammerfink ist folgende: ♂ oberseits dunkelschiefergrau; die Stirn, ein Streif oberhalb des breiten weißen Augenbrauenstreifes, welcher von der Schnabelwurzel bis hinter das Auge reicht, Zügel und Ohrdecken schwarz; vorderer Teil der Wangen und Kinn weiß; die Fortsetzung des Augenbrauenstreifes wie der Wangen ist tiefkastanienbraun wie der Vorderhals, Vorderbrust, Hals- und Brustseiten; übriger Unterkörper weiß, Flanken und Schenkel schiefergrau; Unterschwanzdecken hell ockerfarben; Flügeldecken wie Rücken, die mittleren und großen dunkler bis auf die Ränder; Handdecken und Schwingen sind schwarz mit breiten Säumen von der Farbe der Oberseite; Afterflügel schwarz mit hellen Säumen und weißen Spitzenflecken; Unterflügeldecken, Achselfedern aschgrau mit weißen Spitzen bzw. Säumen; die Schwanzfeder schwarz, die vorletzte jederseits mit großem weißen Keilfleck auf den Innenfahnen, die äußersten jederseits außen fast bis zum Grunde weiß und großer weißer Keilfleck auf den Innenfahnen; Schnabel schwarz; Augen braun; Füße dunkelhornfarben; Länge 275, Fl. 72, Schw. 75 mm. ♀ unscheinbarer und kleiner, alle Farben matter, die Federn der Unterseite mit helleren Säumen, das Grau der Oberseite mehr bräunlich; Verbreitung: Teile Argentiniens. (Fortsetzung folgt.)

Der Wiedehopf.

Von Alwin Pedersen, Münster.

(Nachdruck verboten.)

Es hat wohl kaum Zeiten gegeben, in denen sich die Vogelfauna einer Gegend so schnell verändert hat, wie in unserem Zeitalter der Kultur. Der Mensch von heute hat beinahe so umwälzend gewirkt, wie es sonst nur Erdrevolutionen vermögen. Unbeirrt um das Machwerk der Menschen gehen die Naturgesetze ihren Weg weiter — Anpassung oder Vernichtung. Nur wer sich im Kampf ums Dasein zu behaupten weiß, bleibt bestehen. Der Mensch nahm bestimmten Tieren ihre Lebensbedingungen, folglich mußten sie aussterben, trotz Schutz und Schaffung neuer Existenzbedingungen. Auf der anderen Seite aber finden die anpassungsfähigen Arten einen günstigen Nährboden, können sich, zumal es ihnen an Feinden fehlt, überreich vermehren und füllen entstandene Lücken wieder aus. Das beste Beispiel dafür bildet die Vogelfauna jener Gegend, wo der Mensch mit seiner Kultur sich breitmacht. Von Jahr zu Jahr können wir deutlich die Zunahme bestimmter Vogelarten beobachten; sind sie wirtschaftlich indifferent, dann bleibt ihre Vermehrung dem Menschen gleichgültig, zeigen sie sich aber als schädlich in dessen Haushalt, gleich setzt ein rücksichtsloser Kampf gegen sie ein; der Mensch übernimmt die Rolle der von ihm ausgerotteten Raubvögel —, andere Vogelarten dagegen werden selten und seltener; ihr Bestand hält mit dem Fortschreiten der Kultur gleichen Schritt. Alle Schutzmaßregeln, sie zu halten, weisen nur einen engbegrenzten Erfolg auf. Unsere schönsten und ästhetisch am höchsten bewerteten Vogelarten zählen zu ihnen. Naturdenkmäler nennt man sie, und zu diesen gehört auch der herrliche Wiedehopf.

Unseren Vorfahren war er ein bekannter und beliebter Vogel. In Gemeinschaft mit der farbenprächtigen Blauracke und den buntscheckigen Spechten belebte er in anmutiger Weise die hohen Eichenraine. Damals noch stand und lag der Wald, wie er gewachsen, hohle Bäume waren die Menge vorhanden und bildeten ein Dorado für alle Höhlenbrüter, die nicht dazu geschaffen, sich selbst eine Wohnung im kernfaulen Stamm zu meißeln. Als dann die Völker seßhaft wurden, lernten sie es, dem Boden ungekannte Werte abzuringen. Der wilde Wald wurde planmäßig durchforstet, alles Faule, Anbrüchige beiseite geschafft, um Licht und Sonne dem gesunden Nachwuchs zu gewähren. So kam es, daß die Blauracke ausgerottet wurde, die Hohltaube seltener ward und auch der Wiedehopf in nur noch wenigen Paaren an alter Stelle nistet. Anfangs kam es ihm zustatten, daß weite Rodungen allmählich zu Weideland wurden, denn mit Vorliebe schritt er zwischen dem gutmütigen Vieh, in deren Dung er die fettesten Larven und dicksten Würmer fand. Auch gaben ihm die schmalen Eichenraine, die die Bauern zum Schutze ihrer Äcker stehen ließen, noch notdürftigen Unterschlupf und Nistgelegenheit. Und er gewöhnte sich daran. Als dann aber auch die schwanden und Drahtzäune an ihre Stelle traten, ward ihm die alte Heimat verleidet. So verließ er manche Gegend ganz, häufig ist er nirgends mehr in Deutschlands Gauen, und da, wo er noch vorhanden, führt er ein scheues und verstecktes Dasein. Nur wenige kennen ihn, und wer ihn zufällig einmal sieht, hält ihn für einen Fremdling unserer Fluren und ist erstaunt über die Schönheit der Gestalt und die Farbenmannigfaltigkeit des Gefieders.

*

Ein schöner Apriltag ist's. Auf hohlem Faulstumpf, lustig und keck sitzt Zaunkönig, macht Bücklinge in einem fort und singt und zetert er in den herrlichen Sonnentag hinein. Kohlmeischen ist eifrig bemüht, in geräumiger Höhlung auf Mulm und Erde warme Niststoffe zu schichten, und kuckuck, kuckuck ruft's aus dem Wald.

Über die Wiese fliegt ein Vogel gar wunderlich bunt, so vielfarbig, scheckig wie das Rindvieh, an dessen Seite er soeben noch über die Wiese stelzte. Jetzt blockt er auf dem uralten Eichenstubben auf, am Rande der Roggenbreite, hoch oben auf der Spitze des morschen Astes. Lang und hoch steht er da, dreht den Kopf, äugt und lauscht. — Als alles still ist umher, nichts ein Mißtrauen erregt, bläht er unter sonderbaren Gebärden die rotbraune Kehle auf, breitet die Haube, sein schönster Schmuck zu einem bunten Fächer, senkt den Schnabel, und läßt einen wunderlichen Liebesgesang erschallen. Der

klingt wie hup—hup, hup—hup, und der einsame Wanderer, der über die Landstraße geht, meint fernes Hundegebell zu hören.

Soviel er auch ruft und dabei nickt und dienert und die schöne Bänderung seiner Flügel und des Schwanzes zur Schau trägt, sein Balzgesang bleibe unerhört. Da fliegt er wieder davon, durchsucht eine Ackerfurche nach Insekten und Larven, und als sie ihm nicht mehr ergiebig genug erscheint, streicht er auf die nächste Wiese. Hier schreitet er stolz unbedächtig durch das kurze Gras, immer eifrig umherspähend, ob nicht ein Feind sich naht. Die großen bunten Tiere fürchtet er nicht, auch nicht die Kuhmagd, die täglich zum Melken über die Wiese kommt; aber der Habicht ist sein Feind. Vor ihm hat er eine solche Angst, daß schon eine Schwalbe genügt, ihn maßlos zu erschrecken. Überrascht ihn sein Todfeind auf freier Fläche, ist es zu spät zum rettenden Flug, dann wirft er sich wie tot zu Boden, breitet Flügel und Schwanz rund um sich aus, legt Kopf und Hals zurück und streckt den Schnabel gradeauf in die Höhe. So mag es ihm manchmal gelingen, dem Habicht einen achtlos hingeworfenen Lumpen vorzutäuschen. Vor dem Menschen in seiner nordischen Heimat flüchtet er schon aus weiter Ferne; im Süden dagegen stört er ihn wenig, denn dort noch schützt ihn ein alter Glaube.

Vor einem Kuhfladen macht er halt, durchstochert bedächtig mit dem langen Schnabel die schwarzbraune Masse. Plötzlich ein Ruck, eine fette Fliegenmade schnellt empor, wird geschickt wieder aufgefangen und gleitet die Kehle hinab. Nicht anders ergeht es einem Mistkäfer, den verlockender Duft heranzog; nur werden ihm vorher die harten Flügeldecken gebrochen und er so mundgerechter gemacht. Dem langen Feuerwurm hilft alles Sträuben und Drehen nichts, er wird emporgeworfen und teilt das Schicksal seiner Vorgänger.

Den Wiedehopf aber läßt's nicht ruhen; seitdem die Sonne so warm scheint, muß er immer wieder rufen und locken. Bald hört man ihn hoch oben in den Eichenkronen, bald von der Spitze eines Weidepfahles, dann wieder aus der Waldecke; da aber ist er am liebsten und die meiste Zeit des Tages.

Am dritten Tage bekommt er Antwort, und von da an ist er nicht mehr allein. Ein Weibchen hat sich zu ihm gesellt, etwas kleiner als er von Gestalt, auch ist der Federschopf nicht so schön. Im übrigen ist es im Gefieder ihm vollständig gleich. Jetzt schreiten sie zuzweit über die kurzgrasige Wiese, trippeln vertraut zwischen dem Vieh umher, schnappen Fliegen und Bremsen aus der Luft und stochern in den Kuhfladen nach Maden und Käfern. Dabei achten sie aber stets auf den Neuntöter, der in der nahen Dornhecke wohnt; sobald er warnt, ist es höchste Zeit, sich in Deckung zu begeben. Manchmal fliegen sie auch an die Ufer des nahen Flusses. Da gibt es so schöne saftige Wiesen, und der Boden ist da so weich, und es wimmelt da von fetten Regenwürmern und allerlei schwimmendem, kriechendem und fliegendem Geschmeiß. Aber es ist da nicht so heimlich und still wie auf den Wiesen zwischen den Wallhecken; darum zieht es sie dahin immer bald wieder zurück.

In den Morgen- und Abendstunden und manchmal auch über Tag muß das Männchen immer wieder auf eine Erhöhung fliegen und seinen eintönigen Balzgesang vortragen. Wenn dann die Sonnenstrahlen sein buntes Gefieder treffen, sieht er recht schön und stattlich aus, der einsame, scheue Vogel.

Bald macht sich das Weibchen recht auffällig lange in der Wallhecke zu schaffen, schlüpft in jedes Loch, durchsucht jede Höhle. Endlich hat es eine gefunden, deren Eingang so eng ist, daß es nur mit Mühe ein- und ausschlüpfen kann, aber der innere Raum ist trocken, groß genug und mit Erde und Mulm angefüllt. Und hoch liegt sie, in der Spitze des höchsten Eichenstumpfes; denn die Erfahrung lehrte es, daß außer Itlis, Wiesel und Eichhorn auch Menschen Vogelnester plündern. Im letzten Jahre warf ein Sturm den Faulstumpf um, in dem das Weibchen vor hatte zu brüten, und als plötzlich Legenot es plagte, nahm es mit der ersten besten Höhle vorlieb. Aber da fehlten eines Tages die Eier, und es sah einen Menschen alle Eichenstümpfe durchsuchen. Heuer aber wird ihm das nicht gelingen, denn die Höhle liegt tief im Stamm, und ihr Eingang ist hoch und eng.

Während der Brütezeit ist das Männchen heimlich und still, hält sich stets in der Nähe des Nestes auf und dehnt seine Ausflüge nicht bis über die Wiesen zwischen den Wallhecken hin aus. Sind aber erst die Jungen da, dann gibt's gemeinsame, unermüdliche Arbeit. Sechs Stück sind es, die brauchen viel, bis sie satt sind, aber auch draußen wimmelt es jetzt von Larven und Würmern, und bei der reichlichen Nahrung wachsen die Jungen schnell heran.

Bei andern Vögeln ist es Sitte, daß die Alten den Unrat ihrer Kleinen aus dem Neste oder der Höhle schaffen. Das aber tut der Wiedehopf nicht, sein langer Schnabel ist wenig geeignet dazu, auch scheint er für häusliche Sauberkeit keinen Geschmack zu haben. So kommt es, daß man ihm nachsagt, er baue sein Nest aus Kuhfladen und Pferdemist.

Sind die Jungen beflogen, dann lernen sie schnell von den Alten, was sie brauchen für ihr späteres Leben. Nur kurze Zeit streifen sie noch in der Gegend umher und sind plötzlich über Nacht verschwunden. Davon merkt aber niemand etwas, denn keiner wußte, daß sie da waren. So kommt es auch, daß fast niemand ihn kennt und noch weniger ihn einmal gesehen haben. Diejenigen, die einen seltsamen Liebesgesang im Frühjahr hörten, meinten fernes Hundegebell zu vernehmen. — — —

(Fortsetzung folgt.)

Kleine Mitteilungen.

Über den unseren Lesern wohlbekannten **chinesischen Bülbül — Pycnonotus s. sinensis** *(Gm.)* teilt Herr Mell im Journal für Ornithologie 71. Jahrg. H. 4 S. 384 folgendes mit: Wenn man Unglück hat, können vier Fünftel aller Vögel, die man an einem Tage im Gebiete zu sehen und zu hören bekommt, Bülbüls der gleichen Art sein, denn Pycnonotus s. sinensis *(Gm.)* ist der wirklich gemeine China-Bülbül, dessen nach Klangfarbe und Intervallen gleich langweilige Strophe man öfter hören muß, als einem lieb ist.

Meist sitzt er paarweise oder in kleinen Flügen zusammen, zuweilen 7—8 m hoch auf einem isolierten oder trockenen Ausguckaste, und stößt nach vorüberfliegendem Getier, nicht nur schnäpperartig in kurzen Stößen, sondern auch in relativ längeren, wenn auch nicht gerade geschickten Rundflügen (8. III., 18. III. und später). Vom November bis Anfang März sind seine an sich schon zu großen Scharen durch Zuggäste verstärkt, und in Ficus-Bäumen, in Zäunen aus Büschen der östlichen Eisbeere (Sageretia theezans) oder des Wachsbaumes oder in Loranthusen-Haufen sind volksversammlungshafte Massen, mehr Vögel als Blätter; das knarrt und knackt und schwatzt und flattert: wie größter Sonntagsbetrieb in einem großstadtnahen Sommergarten. Der Weißbackenbülbül („Pak tao long") zeigt bei Kanton eine Vorliebe für die viskösen Früchte der genannten Hölzer, und seine außerordentliche Häufigkeit und die der angeführten Gewächse scheinen einander parallel zu gehen; die eine ist vielleicht bedingt durch die andere, und es scheint nicht ungerechtfertigt, letztere als „Bülbülpflanzen" zu bezeichnen. Tiere von der wirklich unsympathischen Häufigkeit dieses Plebejers müssen sushaft omniphag sein: Januar und Mitte Februar saßen täglich Scharen von 40—50 Stück in den zu Sümpfen gewordenen Sagittaria-Teichen, hackten da an den absterbenden, fleischigen und schon halbverfaulten Strünken der Blätter herum und fraßen anscheinend nicht nur diese, auch die Insektenlarven und Schnecken darin.

Über die **Elsterdrossel — Copsychus saularis** wird folgendes mitgeteilt: Scharf und schon kontrastreich weißschwarz bzw. aschgrau, schlank, lebhaft und dabei immer graziös, und immer heiter gegen seinen Partner vom anderen Geschlecht, gegen andere aber mutig bis zur Tollkühnheit, hellstimmig, wie man es von vornherein von seinem heiteren Wesen erwarten konnte, und ein vorzüglicher Sänger. . . Ich sah die Paare im April, von Ende Juni bis Ende Juli und auch Oktober bis Mitte November balzen und sich jagen; ist auch diese letzte Balz erzeugt durch die „physiologische Freude" am wiedergekommenen Sonnenschein nach der zweiten kleinen Regenzeit, eine zweite Brut im Juni—Juli ist wohl die Regel. . . Copsychus ist für mein Ohr auch der beste Sänger unter den Standvögeln Südchinas: hell, lieblich, abwechslungsreich. Er wird auch von den Chinesen vielfach als Käfigvogel gehalten, aber doch weit weniger geschätzt als Brillenvogel, Brillenlachdrossel oder Lerche. Und sein chinesischer Name? „Song si" = „Liebessehnsucht" heißt Zosterops, „Wah me" = „die elegante Augenbraue" ruft man die Brillenlachdrossel, „Yat tsi fah" = „eine ganze Blüte" redete ein blumenreicher Chinese Terpsiphone princeps *(Temm.)* an.

Hahnenfedriges Weibchen vom Rotrückenwürger. Mitte Mai vorigen Jahres erhielt ich von Herrn Schöndube ein Weibchen vom Rotrückenwürger, das sich durch Hahnenfedrigkeit auszeichnete. Der Vogel sah einem Männchen sehr ähnlich. Die Sektion ergab einwandfrei, daß es sich um ein Weibchen handelte. Der Eierstock war normal ausgebildet. Anfang Mai wurde in der Sitzung der Ornithologischen Gesellschaft ebenfalls ein hahnenfedriges Weibchen von Herrn Böhme lebend gezeigt. Dieses wurde wie das meinige zusammen mit einem Männchen gefangen. R. N.

Partiell flavistischer Zeisig. In der Vogelhandlung von E. Schöndube sah ich im November einen teilweise gelben Zeisig. Mit Ausnahme der Flügel war er rein gelb gefärbt.
R. N.

Sprechsaal.

(Steht den Abonnenten kostenlos zur Verfügung.)

Zur gefälligen Beachtung. Von den Aufgaben, welche der Leitung einer Fachschrift obliegen, ist keine so mühsam und schwierig wie die Beantwortung der aus dem Leserkreis gestellten Fragen. Auch die Gefahr der Einseitigkeit, durch die Beantwortung der Fragen von einer Stelle, ist nicht zu unterschätzen; um dem abzuhelfen, wenden wir uns an den Gemeinsinn der Leser und bitten die Sachverständigen des gerade vorliegenden Falles, ihre Erfahrungen und ihr Wissen dem Fragesteller wie der Allgemeinheit zugute kommen zu lassen. Die an die Schriftleitung der „Gefiederten Welt" zu richtenden Auskünfte werden, wie die Fragen allgemeiner Bedeutung, veröffentlicht werden. Wenn wir auf diesem Wege die große Menge praktischer Erfahrung und vielseitigen Wissens, welche im Kreise unserer Leser vorhanden, für diese selbst nutzbar machen, glauben wir auch dem Ratsuchenden die denkbar beste Auskunft zugänglich zu machen.

Frage 1. Wie verhält es sich mit der Fruchtbarkeit bzw. Unfruchtbarkeit der Bastarde? A. B., Leipzig.

Aus den Vereinen.

An die Mitglieder der A. Z. Die am 9. Dezember 1923 in Hermsdorf bei Berlin stattgefundene Besprechung der interessierten Kreise, bei der auch der Unterzeichnete auf Einladung der Exotenliebhaber zugegen war, hat das Resultat gezeitigt: Die „Gef. Welt" erscheint ab 1. Jan. 1924 in Vorkriegsausstattung anfangs vierzehntäglich, später allwöchentlich. Unter Berufung auf die vielen Zuschriften aus dem Mitgliederkreise habe ich die dadurch gewonnene Überzeugung ausgesprochen, daß das Erwachen unserer so lieb gewordenen, schmerzlich vermißten „Grünen" allseitig und insbesondere von den Mitgliedern der A. Z. freudig begrüßt werden wird. Für 200 Abonnenten aus unserm Kreise glaubte ich gutsagen zu können, und ich weiß von vornherein, daß ich mich darin nicht getäuscht habe. Ich hoffe, daß binnen kurzem jedes Mitglied wieder die „Gefiederte" halten wird, weil sie eben nicht zu entbehren ist. Haben wir die gegenwärtige schwere Wirtschaftskrise glücklich durchlaufen, so blühen uns bessere Zeiten. Bis dahin aber wollen wir unsere liebe „Gefiederte Welt" durchhalten, damit sie nicht wiederkehrt, „die zeitungslose, die schreckliche Zeit!" Unsere Veröffentlichungen erscheinen wieder, und hat der Verlag in liebenswürdiger Weise einen ausreichenden Platz dafür kostenlos zur Verfügung gestellt. Eine Änderung ist insofern getroffen, als die Anzeigen der Mitglieder, also Kauf- und Tauschgesuche, nicht mehr innerhalb unserer Vereinsnachrichten gebracht werden können, sondern direkt an den Verlag eingesandt werden müssen. Ich weiß wohl, daß dies manchem Mitglied bitter sein wird, doch habe ich im Interesse der Zeitschrift gern dieses Opfer gebracht und bitte, den Verlag in der Herausgabe durch Inserate zu unterstützen. Eine anderweitige Regelung kann auf der nächsten Jahresversammlung besprochen werden. Da bei Ausbietungen zweifellos eine Bevorzugung einem Mitglied gegenüber stattfinden wird, so ist die Angabe der Mitgliednummer empfehlenswert. Den Aufruf zur Schaffung eines Fonds an der Spitze des ersten Heftes, der die Herstellung der beliebten Farbentafel gestattet, bitte ich auf das wärmste zu unterstützen. Zuwendungen, die durch die A. Z.-Kasse gehen, werden an dieser Stelle quittiert. Einige Mitglieder haben für unsere Kasse erhebliche Beträge zur Verfügung gestellt, für die ich recht herzlich danke. Ich werde mir gestatten, die Nummern der Spender im nächsten Heft bekannt zu geben. Des ferneren kann ich noch mitteilen, daß den immer wiederkehrenden Anforderungen der Mitglieder nach gemeinsamem Einkauf von Futtermitteln entsprochen worden ist in der Gründung der „Futterbeschaffungsstelle der A. Z.", die ihren Sitz in Hamburg hat. Briefliche Zuschriften mit Rückmarke sind an Mtgl. 247 zu richten, welches die Verteilung durch eine verpflichtete Person ausführen läßt. Anmeldungen neuer Mitglieder werden an dieser Stelle bekanntgemacht und der Prüfung empfohlen. Begründete Einsprüche gegen die Aufnahme sind sofort zu erheben. Aufnahmegebühr und Jahresbeitrag betragen je 1,50 Gmk. einschl. Lieferung der Jahrbücher. Mit den besten Wünschen für ein gedeihliches neues Vereinsjahr
A. Krabbe.

Verband deutscher Farben-, Gestalt-, Bastardkanarien- und Exotenzüchter e. V. (Sitz München). An unsere Mitglieder! Durch das Wiedererscheinen unserer Fachzeitschrift, der „Gef. Welt", sind wir in der Lage, unseren Mitgliedern wieder über die Tätigkeit des Verbandes berichten zu können. Es ist Ehrenpflicht jedes einzelnen, unser Verbands-Organ zu halten und die „Gef. Welt" über die schwere Zeit des Überganges hinwegzuhelfen. In der letzten Versammlung wurde auch über unser Fachorgan und die Einstellung desselben beraten und der „Gef. Welt" einstimmig das Vertrauensvotum erteilt. Des weiteren setze ich die Mitglieder von dem Neuerscheinen des Werkes „Farben- und Gestaltkanarien" in Kenntnis, das unser Mitglied A. Aschenbrenner geschrieben und die Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in liebenswürdigster Weise

in Verlag genommen hat. Das Buch, das von Züchtern für Züchter geschrieben wurde, dürfte jedem Sportliebhaber ein willkommenes Nachschlagewerk sein, noch dazu, da selbes von alten Züchtergrößen, wie Herrn Ziegler und Heinemann usw., unter Korrektur genommen wurde, deren Namen wie Züchterruf ja bis weit über die deutschen Grenzen hinaus einen guten Klang haben. Ich erachte es als einen glücklichen Moment, daß gerade der deutsche Verband dazu berufen war, in dieser Weise an die Öffentlichkeit zu treten, und wir dürfen und können stolz sein auf dieses junge, aber doch zielbewußte Unternehmen. Es sind außerdem noch weitere Artikel über Zucht und Zuchtbetrieb, Vererbungslehre, Stammbuchführung usw. in Vorbereitung, die wir ebenfalls nach und nach in der „Gef. Welt" zum Abdruck bringen, hoffen dadurch auch unseren auswärtigen Mitgliedern, denen ja der Versammlungsbesuch vorenthalten, etwas zu bieten, getreu unserer Devise, daß der, der rastet, rostet. Der Anfang zum Guten ist gemacht, und der Endappell heißt: Abonnieren Sie wieder die „Gef. Welt", und Sie werden stets auf dem laufenden sein und auf Ihre Rechnung kommen. Der Verband ist außerdem auch bei der A. Z. als korporatives Mitglied angemeldet, und ist uns nun auch nach dieser Seite hin Gelegenheit geboten, Tausch- und Kreuzungsmaterial zu bekommen und und Verbindungen mit Gleichgesinnten anzuknüpfen. Am 19. Januar 1924 findet im Verbandslokal „Pschorrbräuhaus," Bayerstraße 30, unsere diesjährige Generalversammlung statt, und sind Anträge hierzu unserem Generalsekretär Herrn Max Pfaller, München, Auenstraße 781, einzureichen. Mit deutschem Züchtergruß und guten Erfolgen im Jahre 1924 Leopold Keidel, 1. Vorsitzender.

Verein der Vogelliebhaber Königsberg i. Pr. Sitzung an jedem Freitag nach dem 1. und 15. des Monats, abends 8 Uhr, im Vereinslokal Kaiser-Café, Kaiserstraße, Ecke Schnürlingstraße. Vogelliebhaber sind als Gäste stets willkommen. J. A.: Reinholdt, Ehrenvorsitzender, Königsberg i. Pr., Insel Venedig 1 II.

Vom Vogelmarkt.

Von seltener auf den Vogelmarkt kommenden Vögeln werden angeboten:

Lenger, Berlin NO, Schönhauser Allee: Klarino.
Schöndube, Berlin N, Elisabethkirchstraße 1: Zwergfliegenfänger, Goldhähnchen, Drosselrohrsänger.



Bücher- und Schriftenschau.

Friedrich von Lucanus, Die Rätsel des Vogelzuges. Ihre Lösung auf experimentellem Wege durch Luftfahrt und Vogelberingung. Langensalza, Verlag von Hermann Beyer & Söhne (Beyer & Mann). Großoktav; 254 Seiten, 4 Textabbildungen und 1 Tafel; Preis 16 M., geb. 22,50 M.

Im Laufe des Jahres erschien die zweite Auflage der Rätsel des Vogelzuges. Der Verfasser des Buches gibt darin eine eingehende Schilderung des wissenschaftlichen Standes der Vogelzugforschung, an welcher er hervorragend mitgearbeitet hat. Neben dem geschichtlichen Überblick werden alle die wichtigen Fragen, die damit im Zusammenhang stehen, behandelt, wie die Orientierung, die Richtung, die Höhe, die Ursachen, die Entstehung, die Beringung u. a. Der Inhalt ist durch Karten der Zugstraßen erläutert. Neben eigener Forschung hat der Verfasser in der neuen Auflage die ausländische Literatur benutzen können, was bei der ersten infolge des Weltkrieges unterbleiben mußte. Jedem, der sich über den heutigen Stand der Vogelzugforschung unterrichten will, gibt das Buch eingehende Auskunft darüber, ja es regt auch zu eigener Mitarbeit an, sei es durch Beobachtung der Zugrichtung, sei es durch Beringung, sei es auf einem anderen Gebiete. Es ist dem Buch eine weite Verbreitung zu wünschen, damit es alle die vielen Irrtümer, die über dieses Problem bestehen, zunichte macht. R. N.

W. Barth, Bastard-Kanarienvogelzucht, mit 20 Abbildungen im Text und 1 Farbentafel. 8°. Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Der Herausgeber des Büchleins hat hier eine Zusammenstellung über die Haltung, Pflege, Züchtung zur Mischlingszucht des Kanarienvogels mit anderen Finkenarten, wie Zeisig Stieglitz usw., gegeben. Es gibt demjenigen, der sich mit der Kanarienmischlingszucht beschäftigen will, manche Winke und Anregung dazu. So werden in einzelnen Abschnitten die zur Mischlingszucht geeigneten Finken, die Auswahl der Zuchtvögel, die Einrichtung der Käfige und Vogelstube usw. kurz geschildert. Wie es bei einem so kleinen Büchlein kaum möglich ist, sind leider die wissenschaftlichen Ergebnisse der Kanarienmischlingszucht nicht berücksichtigt worden. Es soll ja eigentlich nur der praktischen Mischlingszucht dienen. Hoffentlich wird dieser Mangel bei einer Neuauflage, die wir dem Büchlein recht bald wünschen, nachgeholt.

Anzeigenteil

Käfige u. Gerätschaften

ogel-Fangkäfige ℳ 2,80 und 4,90. **chlagnetze** f. kl. schädl. Vögel ℳ 2,50, gr. ℳ 2,80 u. 3,20. Ill. Preisl. grat. **Tannen, Gronau 58** (Westf.). [1

Futtermittel

Vogelfutter [2
Kanarien, Waldvögel, Exoten, pageien, Weichfresser. Anfragen gegen Rückporto. Liste 13 über gelfutter, Liste 5 über Vogelkäfige, chtgeräte usw. mit etwa 400 Abbild.
W. Göpel, Leipzig,
öndlinring 1. Telephon 14958.

Mehlwürmer
Einsend. v 1.50 Rentenmark 1/4 Pfd. ko versend. **D. Waschinski & Co.,** Biesenthal I (Mark). [3

Johann Götz, Südd. Vogelexporthaus
Neu-Ulm a. D. (Bayern)
liefert [4
exotische Vögel
zu mäßigen Preisen.
(Liste gegen Rückantwortkarte.)

Kaufe **gelb. o. gr. Wellensittichhahn** aus 1923er April-Juli-Zucht; gebe auch Glanz dafür. **Erich Richter,** Bernstadt i. Sa., Troggasse. A. Z. Mitgl. 235. [6

Verkaufe
Brehms Tierleben, II. Auflage, 10 Bände, kompl. in Halbleder gebunden und sehr gut erhalten, gegen Höchstgebot.

Suche
1,2 **Gestaltskanarien, Pariser-trompeter oder Holländer,** gar. gute Zuchttiere. [5
Fritz Leppert, Kaufmann, **Schopfheim i. Baden.**

Geweihsammlung!
80 Rehkronen, schädelecht, **16 Damschaufler,** schädelecht, **6 Rothirsche,** schädelecht, **5 Rothirsche,** künstlicher Schädel, **1 großer Hirschkopf,** aus Holz geschnitzt mit aufgesetzten tadellosen Stangen (Prachtstück), **40 Hirschspießer.** Alle Gehörne sind tadellos aufgesetzt. Besichtigung jederzeit erwünscht. Preis nach Übereinkunft billigst. Verkauf am liebsten geschlossen.
E. W. Lenger, Berlin N 58, Schönhauser Allee 70a. [7

Prima Deutsche Ameisenpuppen
reine helle Ware, **per Pfund M. 6.—** gibt ab
Hermann Arold, Zool. Handlung, Berlin N 58, Fransecky-str. 4. [8
Bei Anfragen Rückporto erbeten. Postscheckkonto: Berlin 149951.

Kolbenhirse . .	**Pfund 1,20**	ℳ
Senegalhirse . .	„ 0,80	„
Futterhirse . . .	„ 0,60	„
Spitzsamen . . .	„ 0,80	„
Ameiseneier . .	„ 6,00	„
Weißwurm . . .	„ 6,00	„
Muska	„ 7,00	„

empfiehlt in best gereinigter Ware
E. W. Lenger, Berlin N 58, Schönhauser Allee 70a. [9

Gelegenheitskauf!
Gut erhaltene Bücher über **Naturw., Jagd usw.** zu 2/3 Friedenspreisen. Anfr. unter **M. N. 100** an den Verlag dieses Blattes. [10

„Prosit Neujahr!"
meinen Freunden. **Louis Sztachovics, Wien XVI,** Seeböckgasse 36, III./47. A. Z. Mitgl. 26. [11

Vögel

Senegalfinken

Astrilden . . .	à Paar	4,50 ℳ
Amaranten . .	„	5,00 „
Atlasfinken . .	„	5,00 „
Bandfinken . .	„	5,00 „
Schmetterlingsfinken . . .	„	5,00 „
Silberfasänchen	„	5,00 „
Paradieswitwen . .	„	8,00 „
Grauedelsänger	„	8,00 „
Blutschnabelweber . . .	„	5,00 „
Orangeweber .	„	5,00 „
Orangeweber in Pracht .	„	10,00 „

Versand per Nachnahme; Porto und Verpackung 3,50 ℳ.

E. W. Lenger, Berlin N 58, Schönhauser Allee 70 a. [12

Aus meinen Freivolieren gebe eine große Anzahl Zuchtpaare

Wellensittiche

ab. Tausch gegen **prima Kanarien, Amazonen, Graupapageien.** [13

S. Lichtenstaedt,
Berlin-Johannisthal, Nieberstraße 10.

Goldhähnchen . .	Stck.	4,— ℳ
Zaunkönige . . .	„	4,— „
Braunellen . . .	„	2,50 „
Stieglitze ♂ . . .	„	4,— „
2 Dorngrasmücken	„	3,— „
Getr. d. Ameisenpuppen . . .	Pfd.	6,— „

E. Schöndube, Berlin N 4, Elisabethkirchstraße 1. [14

Verkaufe Umstände halber

meine

1,1 Nymphensittiche,
1,1 Alexandersittiche,
1,1 Goldstirnsittiche

und einige Paare

Wellensittiche.

Sämtliche Ia Tiere. Ferner

zwei Photo-Apparate

9×12 und 13×18. [15

Anfragen an **Friedr. Gauter**, Steinen, Amt Lörrach (Baden).

Verkaufe **11 Kanarienhähne, 2 Kanarienweibchen.** B. Anfr. Rückporto. **Hirsch**, Aubstadt (Unterfrk.). [16

Sofort zu kaufen gesucht:

Naumanns Naturgeschichte der Vögel Mitteleuropas

12 Foliobände, Jubiläums-Prachtausgabe

Die Bezahlung geschieht auf Verlangen in Holländischer Geldwährung

17] Offerten an: **P. Moeskops,**
Den Haag, Loosduinscheweg 613 — Holland

Silberhirse, Senegalhirse, gelbe Hirse, Glanz u. sonstige **Futterarten**

liefert preiswert [18

Joh. Götz, Neu-Ulm (Bayern)

Empfehle meine
durch den Großen Preisrichtertag
in Cassel weltbekannt gewordenen

Nachtigall-Edel-Kanarien

mit edlen Nachtigalltouren

ausgewählte Ia Sänger 45 Mk.
Vorsänger bis 85 Mk.

8 Tage Probezeit

Nachnahme oder Vorauseinzahlung

Karl Reich, Bremen
19] Theaterberg

Graupapagei

guten Sprecher, sowie

Exoten, Sittiche, Prachtfinken,

Tiere aller Arten

kauft (Angebote erbeten)

J. Müller, Hanau,
Gärtnerstr. 44. [21

Sprosser und Schwarzplättchen oder anderen Lautschläger sowie **Nutz, einheimische Stubenvögel** kauft **Bley**, Stadtoberinspektor, Berlin-Steglitz. Angebote erbeten. [22

Einen Grau-, zwei Amazonenpapageien, Buchfinken, Zeisige, Kanarien, weiße Ratten u. Mäuse verkauft **Beck**, Tierimport, Stuttgart. Anfr. bitte Marke. [23

Suche 1 Wellensittichmännchen, grün, Ia-Tier, 1 Zuchtpaar gr. Wellensittiche, zahle höchsten Preis, ferner 1,3 gelbe Kanarien, 23 er. Angebote mit Preisangabe an **Louis Köther**, Hildesheim, Jacobistraße 11 I. [24

Inserate

für das am 17. Januar 1924 zur Ausgabe gelangende Heft 2 der Gef. Welt erbitten bis 11. Jan. 1924 früh.

Die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit **20 Goldpfennig** berechnet.

Suche zu kaufen
in gesunden Exemplaren

Kanarienhähne [20
Kanarienweibchen
Gestalts- u. Farbenkanarien
Papageien / Wellensittiche
Jap. Mövchen usw.

Tausche auch Käfige u. Vogelfutter

Paul Tzornack
Berlin NO 55, Prenzlauer Allee 189
Telephon: Humbold 2063

Willy Odenwald, Fulda

Vogel- und Tierexport

Fernsprecher 363 — Telegramm-Adresse: Zoologist Fulda

empfiehlt sich allen Vogelliebhabern zur Lieferung von

in- u. ausländischen Vögeln

25] Vorratsliste auf Wunsch

Vogelliebhaber

finden ihre Wünsche in der altrenommierten Handlung von

W. Hiltmann, Berlin C 14, Dresdener Str. 24

In- und ausländische Vogelarten
Prima Vogelfutter für Weich- und Körnerfresser

26] Preisliste gegen Rückporto

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Hermsdorf bei Berlin; für den Anzeigenteil: Franz Wunderlich, Magdeburg, Postschließfach 148.
Verlag der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck: August Hopfer, Burg Bz. Magdbg.

Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Jahrg. 53 | Den 17. Januar 1924 | Heft 2

(Druckort: Burg, Bezirk Magdeburg.)

An die Freunde der „Gefiederten Welt".

Zu den vielen Opfern der Nachkriegszeit zählt auch unsere Zeitschrift. Trotz hoher Abonnentenzahl mußte sie infolge der Unsicherheit der Währungsverhältnisse ihr Erscheinen einstellen. Die voraussichtlich dauernde Festigung unserer wirtschaftlichen Verhältnisse schuf auch für sie die Möglichkeit des Wiederauflebens. Immerhin wird sie noch mit Schwierigkeiten zu kämpfen haben, zu deren Überwindung sie der tatkräftigen Hilfe ihrer Freunde bedarf.

Die bildliche Ausstattung und die Beigabe farbiger Tafeln legen dem Verlage Opfer auf, die für ihn allein nicht tragbar sind. Kommen wir ihm zu Hilfe!

Viele Verehrer unseres Fachblattes haben sich bereit erklärt, Mittel zur Schaffung eines Stützungsfonds herzugeben in der festen Zuversicht, daß ihr Beispiel unter den zahlreichen Vogelfreunden des In- und Auslandes Nachahmung finden werde. An alle diejenigen, denen an dem Weiterbestehen und dem Ausbau unserer Zeitschrift gelegen ist, ergeht daher die dringende Bitte um tatkräftige Beteiligung an diesem Stützungswerk!

Beiträge und Zuschriften sind zu richten an den Schriftleiter Karl Neunzig in Berlin-Hermsdorf, Neue Bismarckstraße 42. Der Empfang wird in der Zeitschrift bestätigt.

A. Krabbe, Anklam. Theodor Vandenhoff, Köln. Walter Raimann, Freiwaldau.

Einiges über Vitamine und Vogelhaltung.

Von A. Adlersparre.

(Nachdruck verboten.)

Seit Liebigs Tagen bis vor etwa anderthalb Jahrzehnt meinte man, daß es für das Wachstum und für die Erhaltung eines Tierorganismus ausreichend war, wenn ihm als Futter ein passendes Gemisch von Eiweiß (nach den Untersuchungen des Nobelpreisgewinners Emil Fischer, Abderhaldens u. a. richtiger: von gewissen Arten Eiweiß), Fett, Kohlehydraten, gewissen anorganischen Salzen und Wasser zugeführt wurde. Das war das Zeitalter der Kalorien in der ernährungsphysiologischen Forschung. Immer genauere Arbeitsmethoden bewiesen aber, daß dauernd etwas fehlen mußte. Die Versuchstiere — aus praktischen Gründen oft Ratten — hörten zu wachsen auf, magerten ab, zeigten eine Reihe Krankheitserscheinungen und gingen nach einigen Wochen oder Monaten ein. Wurde aber zuvor die Versuchskost („Grundnahrung") durch gewöhnliche Futterstoffe ersetzt, so erholten sich meist die Tiere bald, und die Entwicklung wurde wieder normal.

Welche Stoffe konnten es sein, die fehlten? Daß es gewisse unterstützende Nahrungsstoffe waren, welche im natürlichen Futter vorhanden waren, das war ja offenbar, und auch daß diese Stoffe in äußerst geringen Mengen vorkommen und doch wirken mußten, sonst hätten sie der Entdeckung nicht so lange entgehen können. Aber deren chemische Natur? Und deren Aufgabe innerhalb des Organismus? Das sind Fragen, die wegen des überaus schwer bearbeitbaren Materiales trotz Jahren intensiver Arbeit noch nicht ihre endgültige Lösung gefunden haben. Zwar glaubte sich einmal der polnische Chemiker Casimir Funk, einer der Vorkämpfer der Vitaminforschung, einen dieser Stoffe in Form einer stickstoffhaltigen chemischen Verbindung, eines Amins, isoliert zu haben. Daher der Name Vit(a)-amine. Es war dies aber nur eine jener trügerischen Hoffnungen, die den Weg des Forschers nach dem Ziele hin ebnen.

Es gibt aber andere Fragen, ebenso oder vom rein praktischen Gesichtspunkt vielleicht noch bedeutungsvollere als die angedeuteten, und in ihnen ist unser Wissen bedeutend bereichert worden, nicht zum mindesten während der letztvergangenen Zeit, seitdem die allgemeine Lebensmittelnot der Forschung auf diesem Gebiete vermehrte Aktualität und reicheres Material geschenkt. Schon vor einem Jahrzehnt konnte man die Vitamine in zwei Hauptgruppen, fettlösliche und wasserlösliche, teilen und somit auch eine Andeutung

von der Art des Vorkommens geben. Zur ersten Gruppe wurde dann gezählt, was man A-Vitamine benannte, zur zweiten die B- und C-Vitamine. In letzter Zeit ist es indessen nachgewiesen worden, daß A-Vitamine wenigstens drei selbständige Vitamine in sich einschließen, ein antirachitisches, ein zuwachsförderndes (auch D-Vitamin genannt) und ein Vitamin (Mc Collum), welches der Augenkrankheit, Xerophthalmie, entgegenwirkt. Auch B-Vitamin sieht man sich nunmehr genötigt, aufzuteilen, nämlich in ein antineuritisches und in ein zuwachsförderndes, das letzte mit dem D-Vitamin der A-Gruppe wahrscheinlich verwandt, vielleicht sogar identisch. Daß das C-Vitamin so ganz einheitlich ist, dürfte demnach wohl anzuzweifeln sein; bis auf weiteres müssen wir es jedoch als einzig und allein antiskorbutisch bezeichnen. Diese verschiedenen Vitamine, die einander nicht ersetzen können (möglicherweise mit Ausnahme der beiden D-Vitamine), hat man in wechselnder Menge in sehr vielen natürlichen Futterstoffen aus dem Pflanzen- und Tierreich gefunden. Wahrscheinlich werden sie jedoch nur in Pflanzen produziert, von diesen sind sie mit dem Futter den Pflanzenfressern zugeführt und so weiter den Fleischfressern.

Ihre verschiedenen Namen haben die Vitamine in der Regel nach den Krankheiten erhalten, die vom Mangel an dem einen oder anderen Vitamin in der Nahrung bewirkt werden. Wenn auch in ihren Anfangsstadien nicht selten von wechselndem und schwer zu deutendem Charakter, sind diese Vitaminmangelkrankheiten („Avitaminosen") in ihren typischen Erscheinungen nunmehr ziemlich genau bekannt. Eine kurze Übersicht dürfte deshalb für uns von einleitender Bedeutung sein können.

Beginnen wir also mit den Vitaminen der A-Gruppe, so bewirkt Mangel an diesen, wie es z. B. der Fall während der Fettnot des Krieges war, Aufhören des Wachstums bei Jungen (eine Art von Zwergwuchs), rasche Abmagerung trotz heißhungriger Freßlust und schließlich den Tod entweder durch Kräfteverfall oder durch verringerte Widerstandskraft gegen Bakterieninfektionen — man erinnere sich der Epidemien, die den Spuren des Krieges folgten. Gewöhnlich sind bei A-Vitaminmangel gewisse Lungenkrankheiten, Darmentzündungen (Durchfall), Hautentzündungen (Eiterbeulen), bisweilen auch Ohr- und Nasenkrankheiten. Diese verminderte Widerstandskraft gegenüber Infektionen will man von einer kürzlich festgestellten, augenfälligen Abnahme gewisser geformter Bestandteile des Blutes, die uns gegen Bakterieninvasionen schützen, ableiten (Cramer, Drew, Mottram). Andere Folgen einer allzu geringen Zufuhr von A-Vitaminen sind teils eine an die englische Krankheit (Rachitis) erinnernde, mit ihr aber nicht identische Knochenkrankheit, die jedoch unter Mitwirkung gewisser anderer Faktoren (Mangel an Phosphaten, an Bewegung, an ultravioletten Strahlen) sich zur echten Rachitis entwickeln zu können scheint, teils auch Xerophthalmie, eine bösartige Hornhautkrankheit, die, wenn nicht rechtzeitig behandelt, zu Blindheit führt. Unter gewöhnlichen Umständen in Europa ziemlich selten, trat die Xerophthalmie während des Krieges in manchen Gegenden fast allgemein auf, so z. B. in Österreich und Rumänien. Erwähnt zu werden verdient schließlich auch, daß gemäß neueren Untersuchungen an Tieren (Sherman, Mc Leod) schon geringere Grade von A-Vitaminmangel, die noch nicht das Wachstum hemmen können, Sterilität (Unfruchtbarkeit) bewirken.

Ist die Nahrung in bezug auf B-Vitamine unbefriedigend, ist der Erfolg ebenfalls gehemmter Zuwachs, Gewichtsabnahme, bisweilen auch Sterilität. Jetzt stellen sich aber zudem eine ganze Reihe direkter und indirekter Erscheinungen seitens des Nervensystems ein: Mattigkeit, unsichere Bewegungen, Lähmungen, Kreislaufstörungen, Wassersucht, Atemnot u. a. m., kurz diejenigen Krankheitserscheinungen, die bei Vögeln seit langem unter dem Namen Polyneuritis, beim Menschen unter Beriberi*) zusammengefaßt werden. Über die Polyneuritis der Vögel wurden sehr verdienstvolle Untersuchungen vom holländisch-javanischen Arzt Eijkmann ausgeführt und im Jahre 1874 veröffentlicht („Polyneuritis gallinarum"). Er wies in diesen nach, daß Hühner, die einseitig mit glattpoliertem Reis gefüttert und krank geworden, nach Zusatz von der wegpolierten Reiskleie zum Futter wieder gesundeten**).

Ist es schließlich das C-Vitamin, welches in der Kost fehlt, verursacht dies Mattigkeit, geringe Freßlust, Abmagerung, Kreuz- und Gliederschmerzen, Zahnfleischentzündung bei Säugern, Blutungen in Haut, Schleimhäuten und Bindegewebe, Neigung zur Geschwürbildung, gelbgraue, schuppende Haut, Herzschwäche, Atemnot usw. Auch dieser Symptomkomplex (Skorbut) ist seit alters her bekannt, wo die Diät zu arm in bezug auf frische Nahrungsstoffe wurde, wie bei langen Seereisen, Polarexpeditionen, Belagerungen, in Gefängnissen und — so unglaublich es auch im ersten Augenblick erscheinen mag — bisweilen auch bei Tropenexpeditionen (engl. Armee in Mesopotamien 1918). Skorbut faßt man nunmehr als eine reine Avitaminose auf, und der Experimentalphysiologe kann nach Belieben diese Krankheit hervorrufen und heilen.

Nun fragt sich vielleicht jemand, wo man am besten Zugang zu den für Gesundheit und Wohlbefinden offenbar so überaus wichtigen Vitaminen erhält. Im Handel werden von Zeit zu Zeit fabrikmäßig hergestellte Vitaminpräparate angeboten, und einige von ihnen (wie z. B. Fischlebertran) sind von unzweifelhaftem Wert. Es ist indessen nicht immer so leicht, unter Spreu und Weizen zu unterscheiden. Am sichersten und wohl auch ökonomisch am vorteilhaftesten dürfte es deshalb in der Regel sein, daß man sich mehr auf die natürlichen Futterstoffe einstellt, in welchen Vitamine der einen oder der anderen Art in reichlicherer Menge vorzukommen pflegen.

Die Vitamine der A-Gruppe findet man in Eiern (reichlich im Gelb, Weiß vitaminlos), in Butter, frischer Milch, Herzen, Leber, bes. reichlich in Fischlebertran, ferner, wenn auch nicht sehr reichlich, in Fleisch, Blut, Tierfetten (in der Regel jedoch nicht in

---

*) Beriberi soll nebenbei schon in einem 5000 Jahre alten chinesischen Schriftwerk beschrieben worden sein.

**) Über ähnliche Beobachtungen auch an Fledermauspapageien berichtet Dr. O. Heinroth in „Ornithologische Ergebnisse der I. deutschen Südsee-Expedition" (Journal für Ornithologie 1903, Januarheft). R.

Schweinespeck), reichlicher dagegen in verschiedenen grünen Pflanzenblättern wie Spinat und in Wurzelgemüsen wie Möhre, in pflanzlichen Ölen (Margarine) dagegen nur selten; auch nicht in Kleie. Wärme vertragen die A-Vitamine ziemlich gut, werden aber in Luft leicht oxydiert und dann unwirksam. Um ein infolge A-Vitaminmangels unterbrochenes Wachstum bei Ratten (die in bezug auf Größe unseren Stubenvögeln ziemlich nahekamen — 60—70 g) wieder in Gang zu bringen, waren täglich nur 2 ccm frischer Milch (kaum $^1/_2$ Teelöffel) oder 0,3 g Butter (nicht Margarine!) oder 0,002 g Lebertran erforderlich.

Die B-Vitamine sind in der Natur die allgemeinsten. Man findet sie in Eigelb, Milch, Herzen,

Norwichkanarienvogel.

Leber (nicht aber in Lebertran), wohl auch, wenigstens in geringerer Menge, in Insekten, reichlich in den äußeren Teilen der Samenkörner (Kleie) und bes. reichlich in gekeimten Körnern (nicht aber in feinmehlgebendem Kern), ferner in Weintrauben, Apfelsinen, Zitronen, Äpfeln, in einer großen Zahl grüner Pflanzen, bes. in Spinat, auch in Möhren, Kartoffeln, Löwenzahn (Taraxacum), ferner in Hefe u. a. m. Die Vitamine der B-Gruppe sind gegen Sauerstoff und Wärme ziemlich widerstandskräftig.

C-Vitamin kommt in verschiedenen säuerlichen Obstsorten vor, bes. in Apfelsinen und Zitronen (in Bananen nur spurenweise und auch in Äpfeln nicht sehr reichlich), ferner, wenn auch nur in geringeren Mengen, in roher Leber (nicht in Lebertran) und in ungekochter Milch, reichlicher dagegen in verschiedenen Beeren, wie Himbeeren und Weintrauben, in rohen Kartoffeln, Möhren, Rüben, in Löffelkraut (Cochlearia, altes Antiskorbutikum), in Salat, Löwenzahn u. a. Pflanzen. C-Vitamin fehlt in den Samenkörnern der Getreidearten, wird aber bei deren Keimung in reichlicher Menge neugebildet. C-Vitamin ist weit unbeständiger als A- und B-Vitamin und verträgt weder Wärme noch Dörren gut.

Versucht man für unseren speziellen Zweck irgendwelche Schlüsse aus Vorausstehendem zu folgern, stellt sich zunächst heraus, daß eine ganze Reihe von den seit alters her für die Vogelhaltung angepriesenen und in derselben gerne benutzten Futterstoffen minderwertig sind, indem sie durch die Behandlung, welcher sie meistens unterworfen werden, ihres ursprünglichen Vitamingehalts größtenteils beraubt werden. So z. B. dürften alle gemahlenen, geschroteten und pulverisierten Futterstoffe höchstens einen geringen Bruchteil ihres ursprünglichen A-Wertes beibehalten haben. Dies gilt u. a. von gemahlenen Pflanzensamen (Hanf, Mohn), geschroteten und pulverisierten Insekten, allerlei Universalfuttern, kondensiertem Eigelb in Flocken, Eipulver, natürlich auch von aus den beiden letzten hergestelltem Eierbrot. Die Ursache ist, daß die A-Vitamine bei und nach dem Mahlen resp. Pulverisieren mit dem Sauerstoff der Luft in allzu intimen Kontakt kommen, oxydieren und wirkungslos werden.

(Schluß folgt.)

Exakte Vererbungsversuche bei Kanarienvögeln.

Von Dr. H. Duncker, Bremen.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

II.

2. Man wird mir hier vielleicht aus Züchterkreisen entgegenhalten, daß eine solche reine Haubenvogelrasse doch in den Norwichvögeln existiere.

Doch ist dies nicht richtig, wie die Untersuchungen von Galloway auch zeigen. Bei der eigentümlichen Federbildung der „Norwich crested birds“ haben wir es mit zwei Erbfaktoren zu tun. Der eine besorgt eine Verdichtung und Verlängerung des Scheitelgefieders, ohne Aufrichtung der Federfollikel und Wirbelbildung. Der andere Erbfaktor ist unser Haubenfaktor. Nennen wir die beiden Erbfaktoren wieder mit großen Buchstaben, und zwar:

den Haubenfaktor „H“, die Abwesenheit „h“,

den Verdichtungsfaktor „D“, die Abwesenheit „d“,

so können wir das Zahlengesetz der Mendelschen Vererbung bei Paarung zweier Bastarde für beide Eigenschaften, die also mit der Erbformel „Hh Dd“ behaftet sind, folgendermaßen erhalten:

Die Geschlechtszellen solcher Bastarde können sein: „HD“ oder „Hd“ oder „hD“ oder „hd“. Jede Geschlechtszelle kann sich mit jeder der gleichen Art oder einer der drei andern Arten bei der Befruchtung vereinigen. Es müssen daher folgende Typen erscheinen, zu deren Errechnung man sich heute allgemein des „Punnet“schen Schemas*) bedient.

Geschlechtszellen-Gameten	HD	Hd	hD	hd
HD	(HHDD)	(HHDd)	HhDD	[HhDd]
Hd	(HHDd)	(HHdd)	[HhDd]	[Hhdd]
hD	HhDD	[HhDd]	hhDD	[hhDd]
hd	[HhDd]	[Hhdd]	[hhDd]	[hhdd]

Die vier entstehenden Typen sind in der Diagonale von oben links nach unten rechts ersichtlich. „HHDD“ enthält beide Erbfaktoren homozygot. Die Vögel müssen sowohl die verdichteten und verlängerten Scheitelfedern tragen als auch die Wirbelbildung zeigen. Sie sind nicht lebensfähig, da „HH“ tödlich wirkt; „HHdd“ dürfte nur die Wirbelbildung zeigen, also unsere gewöhnliche Haube, auch diese Vögel sind nicht lebensfähig aus dem gleichen Grunde; „hhDD“ zeigt nur den Verdichtungsfaktor. Es sind die „nichtgehäubten Norwichvögel aus dem Haubenstamm“. Sie sind lebensfähig, weil der Faktor D nicht mit einem Lethalfaktor gekoppelt ist; schließlich entstehen die Typen „hhdd“, das sind die „gewöhnlichen Norwichvögel“, welche selten im Norwich-Haubenstamm auftreten, von den Norwichzüchtern aber stets ausgemerzt werden.

Da sich die heterozygoten Formen von den im entsprechenden Faktor dominant-homozygoten Vögeln nicht unterscheiden, so läßt sich auch das Aussehen der Bastarde ohne weiteres aus der Tabelle ersehen: „HHDd“ tritt zweimal auf, sie müßten dichte, lange Scheitelfedern und Wirbelbildung zeigen, sind aber nicht lebensfähig wegen „HH“; „HhDD“ sind die gehäubten Norwichvögel, welche der Züchter erstrebt, und welche in den guten Norwichstämmen allein zur Nachzucht verwandt werden. „HhDd“ sind ebenfalls gehäubte Norwichvögel, welche aber nur entstehen, wenn „gehäubte Norwichvögel“ mit „glattköpfigen Norwichvögeln ohne verdichtete und verlängerte Scheitelfedern“ gekreuzt werden. Da dies der Züchter nicht macht, so finden sie sich auch nicht unter den Vögeln des gehäubten Norwichstammes. Im andern Fall müßten sie bei solchen Zuchten von Bastarden in beiden Erbfaktoren zu 25 % auftreten. „Hhdd“ tritt zweimal auf; sie kommen ebenfalls niemals im gehäubten Haubenstamm der Norwichvögel vor, weil der Züchter auf Homozygotie von D hin züchtet, das gleiche gilt für die letzte Form „hhDd“, die an sich auch zweimal unter 16 Fällen auftreten müßte. Der besseren Übersicht für den Leser halber habe ich die mit doppelten Lethalfaktoren und daher regelmäßig absterbenden Formen rund eingeklammert, die vom Züchter gehäubter Norwichvögel wirklich gezüchteten Vögel sind unterstrichen, die infolge des Vermeidens der Kreuzung „gehäubter“ und „gewöhnlicher Norwichvögel“ nicht erzielten Typen sind eckig eingeklammert, die ungehäubten Norwichvögel von der gewöhnlichen Rasse sind eckig eingeklammert und gestrichelt. Nun sieht man deutlich, daß der Züchter gehäubter Norwichvögel nur Vögel mit verdichtetem und verlängertem Scheitelgefieder züchtet. Von diesen sind stets $66^2/_3$ % gehäubt (d. h. mit Wirbelbildung versehen) und $33^1/_3$ % ungehäubt. Wir erhalten also das Verhältnis 2 : 1, wie es Galloway bei seinen jahrelangen Zuchten auch wirklich nachgewiesen hat. Dieses Beispiel der Norwichvögel ist deswegen so interessant, weil wir hier zwei verschiedene Erbfaktoren vor uns haben, die bezüglich der Lethalwirkung sich verschieden verhalten. „HH“ ist tödlich, „DD“ nicht. Infolgedessen ist eine Rein-Züchtung von Haubenvögeln nicht möglich, wohl aber eine Rein-Züchtung von solchen Vögeln, die nur den Verdichtungsfaktor zeigen (Crested-bred-plainhead). Da die letzteren aber nicht als marktfähige Ware gelten, so wird ihre Zucht nicht betrieben, sie werden stets mit „Crested-konvich“ gepaart.

Unter den englischen Gestaltskanarien haben wir noch eine Rasse, welche die beiden Faktoren „D“ und „H“ enthält. Es ist dies der Lancashire-Vogel (Lancashire coppy). Die Vererbungsverhältnisse dieser Vögel scheinen genau dieselben zu sein wie bei den Norwichvögeln. Man benutzt gern die Lancashire coppy zur Auffrischung der Norwich-Haubenvögel, was zeigt, daß in dem „Lancashire coppy“ derselbe Erbfaktor D enthalten ist. Im übrigen müssen natürlich die Norwichvögel und Lancashirevögel noch weitere unterschiedliche Erbfaktoren enthalten, da man sonst die beiden Rassen nicht unterscheiden könnte. Über diese Erbfaktoren ist aber nichts bekannt. Einen Weg, um Genaueres über diese Erbfaktoren zu erfahren, wäre die systematische Kreuzung von Lancashire- und Norwichvögeln unter genauer Beobachtung der dabei auftretenden verschiedenen Typen und ihrer Zahlenverhältnisse.

3. Im vergangenen Jahre ist ein weiterer Erbfaktor von mir und Herrn Reich-Bremen untersucht worden. Es ist der Weißfaktor, welcher bei Vertretern der deutschen Kanarienvogelrasse die Weißfärbung hervorruft. Ich nenne diesen Faktor „W“. Die Wirkungsweise dieses Weißfaktors besteht darin, daß die Gelbfärbung bis auf verschwindende Bruchstücke nicht zur Entwicklung kommt. Die dunklen Farbstoffe dagegen, nämlich die schwarzen und braunen Melanine, werden von diesem Weißfaktor nicht beeinflußt. Wir erhalten demgemäß bei allen den Vögeln,

*) Punnet ist ein englischer Vererbungsforscher, welcher dieses leichtverständliche Schema einführte.

welche den Weißfaktor enthalten, Formen, die entweder reinweiß sind (sie entsprechen den reingelben Vögeln) oder neben dem weißen Grundgefieder schwarze und braune Farben an den Körperstellen aufweisen, wo auch bei den Schecken und grünen Vögeln diese Farben besonders gern auftreten. Das Vorhandensein des Weißfaktors dominiert natürlich über die Abwesenheit des Weißfaktors („w"). Wenn ich nun einen weißen Vogel mit einem zweiten weißen Vogel paare, so erhalte ich stets neben weißen Vögeln noch gelbe Vögel, welche den Weißfaktor nicht mehr enthalten, und zwar stellt sich auch hierbei wieder das Verhältnis 2 : 1 ein. Ähnliche Untersuchungen wie Reich und ich sie bei den Haubenvögeln durchgeführt haben, haben gezeigt, daß auch die weißen Vögel den Weißfaktor stets nur heterozygot enthalten, und daß das doppelte Auftreten des Weißfaktors tödliche Wirkung hat; daher das Verhältnis 2 : 1 statt 3 : 1. Die Erbformel für die weißen Vögel lautet daher „Ww", für die gelben, Schecken bzw. grünen Vögel „ww". An diesem Beispiel der weißen Vögel möge ein weiteres Kriterium für die Richtigkeit der Mendelschen Zahlengrößen durchgesprochen werden, welches man die „Methode der Rückkreuzung" nennt. Wenn ich z. B. einen weißen Vogel mit einem gelben Vogel paare, so führe ich eine Kreuzung zwischen einem Bastard (weißer Vogel „Ww") und einem im rezessiven Merkmal homozygoten Vogel (gelb „ww") aus. Solche Kreuzungen werden allgemein Rückkreuzungen genannt. In Formeln ausgedrückt, paare ich „Ww" mit „ww". Nur der Bastard bildet dabei verschiedenerlei Arten von Geschlechtszellen, nämlich solche, welche „W" enthalten, und solche, welche diesen Erbfaktor nicht enthalten („w"). Der homozygote Vogel hat nur Geschlechtszellen ohne diesen Faktor („w"); es muß demnach bei der Befruchtung in der Hälfte der Fälle in der befruchteten Eizelle „W" mit „w" zusammentreffen, in der Hälfte der Fälle „w" mit „w", d. h. wir müssen 50 % weiße Vögel und 50 % gelbe bzw. Schecken oder grüne Vögel erhalten. Unsere Versuche haben diese Erwartung vollauf bestätigt. Es sei hierbei erwähnt, daß auch bezüglich des Haubencharakters von uns solche Rückkreuzungsversuche mit gleichem erwarteten Erfolg vorgenommen sind, also 50 % Haubenvögel und 50 % Glattköpfe ergaben*).

(Fortsetzung folgt.)

Neueinführungen und Seltenheiten.

Von Karl Neunzig.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Unter den Vögeln eines größeren Importes der Firma E. W. Lenger, Berlin, meist westafrikanischer Webefinken, befanden sich auch einige Exemplare der von den Liebhabern

Waldhüttensperling — Passer griseus *(Vieill.)*

genannten kleineren Form des afrikanischen Sperlings, dem von den Vogelpflegern größere Verträglichkeit

Nacktaugenstärling.

nachgerühmt wird als seinem größeren Gattungsgenossen, dem Swainsonssperling, der als sehr bösartig mit anderen Vögeln kaum zusammengehalten werden kann. Mit dem Waldhüttensperling können derbere Finkenarten, Ammern, Weber und dgl. im selben Raum beherbergt werden.

Der Waldhüttensperling ist über das ganze afrikanische (äthiopische) Tiergebiet — Afrika südlich der Sahara — verbreitet mit Ausnahme des Kaplandes südlich vom Oranjefluß und des Nordostens. In letzterem Gebiet wird er durch Swainsonssperling vertreten. Ein Vogel, der ein so weites Gebiet bewohnt wie das äthiopische Afrika, neigt zu meist wohl örtlich bedingten Schwankungen in der Gefiederfärbung und in den Größenverhältnissen. Reichenow fand bei diesem Sperling im allgemeinen keinerlei Unterschied zwischen westlichen, östlichen oder südlichen Vögeln, hält es aber für möglich, daß in einzelnen enger begrenzten Gebieten ständig Nebenformen vorkommen, die durch Abweichungen in der

*) Über den „Weißfaktor" bei Kanarienvögeln wird demnächst ein Artikel von mir in der Zeitschrift für induktive Abstammungs- und Vererbungslehre erscheinen.

Färbung und in den Maßen kenntlich sind. Anders scheint es sich mit seinem Benehmen und seinen Gewohnheiten zu verhalten.

Es lag für die Beobachter seines Freilebens nahe, Vergleiche zwischen ihm und den heimischen Sperlingsformen zu ziehen. In Benehmen, Stimme und auch in der Fruchtbarkeit vergleicht ihn Reichenow mit unserem Haussperling. Das tut auch Emin, der berichtet, daß er furchtlos zu den Hütten außerhalb der Station kam, sich einzeln hielte, nicht so viel zirpe wie die europäischen Verwandten und auch nicht so unverschämt sei wie der Haussperling. Nach Böhm gleicht er in Benehmen und Lebensweise unserm Feldsperling, sein zirpender Lockruf sei dem unserer Spatzen sehr ähnlich, und gleich diesen fahren die Männchen mit halbgebreiteten Flügeln und gestelztem Schwanz aufeinander los. Fischer sieht in ihm nicht den Vertreter unseres Haussperlings. Er sei viel weniger zutraulich und dreist als dieser, was auch Emin bestätigt.

Zu seinem Aufenthalt wählt der Waldhüttensperling die Umgebung von menschlichen Ansiedlungen und Kulturen anscheinend nur in der Ebene. Im Gebirge fand ihn Reichenow nicht. Im ihm zusagenden Gelände ist er gemein. Während Emin (Sudan) ihn kaum oder nur im Innern der Gehöfte fand, beobachtete ihn Reichenow (Kamerungebiet) auf jedem Hüttendach. Fischer (Ostafrika) dagegen sah ihn in Ortschaften, in denen sich aus Steinen erbaute Häuser befanden, höchst selten, in solchen, in denen nur Hütten standen, niemals. Auch nach Böhm (Ostafrika) und Stark (Südafrika) hält er sich mehr außerhalb der menschlichen Niederlassungen auf, in den Pflanzungen und auf Feldern. Er meidet Städte und Dörfer. Wie unsere Sperlinge, ist er Allesfresser. Zur Nachtruhe wählt er in kleineren Flügen vereinigt Gebüsche und dicht belaubte Bäume. Auch in bezug auf die Wahl des Nistortes verhält er sich verschieden. In den Pflanzungen baut er das Nest auf Dumpalmen oder in hohlen Bäumen. Falls aber aus Steinen erbaute Gebäude in den Pflanzungen stehen, benutzt er diese gern zum Nisten. Die Nistzeit ist nach dem Wohngebiet eine sehr verschiedene. Als Beispiel seiner Fruchtbarkeit teilt Reichenow mit, daß er demselben Paare am 10. August drei Eier fortnahm, am 25. August fünf Eier und daß das Paar gegen Ende September große Junge im Neste hatte.

Gefiederfärbung: Oberkörper braun, ins Rötlichbraune gehend, am lebhaftesten auf dem Bürzel; Kopf, Hals, Unterseite bräunlichgrau, nach unten heller, Kehl-, Bauchmitte, Unterschwanzdecken weiß, die größeren zuweilen mit graubrauner Mitte; Flügeldecken wie Bürzel lebhaft rostbraun, die Spitzen der mittleren nach innen mit weißem Spitzenfleck; Schwingen, Schwanz braun mit hellen Säumen, die inneren Armschwingen mit rotbraunem Saum; Unterflügeldecken weiß; Schnabel schwarz, Auge braun; Füße hornbraun; Lg. 140—165; Fl. 76—80; Schwanz 60—75 mm.

Jugendkleid: verwaschener; auf dem Rücken verwaschene schwarzbraune Flecke; Schnabel hornbraun.

Unter den im Jahre 1923 angebotenen ausländischen Vögeln befand sich ein gleichfalls von der rührigen Firma Lenger, Berlin, zum Verkauf gestellter Stärling, der bisher noch nicht lebend nach Deutschland gelangt ist, der

Nacktaugenstärling — Gymnomystax melanicterus *(L.)*

Sclater (Brit. Catal. XI) stellt ihn zu den Trupialen, und zwar zu der Gattung Gymnomystax, die sich von der Gattung Icterus, der alle die bisher eingeführten Trupiale angehören und von der die Gattung Gymnomystax nur durch das Fehlen der Befiederung in der Umgebung des Auges und des Zügels abweicht. Früher habe man diese auffallende Form zu den Hordenvögeln (Agelainae) gestellt, aber die leicht gebogene Schnabelfirste, das linienförmige Nasenloch habe ihn veranlaßt, den Vogel zu den Trupialen zu stellen, wofür auch der Charakter der Befiederung, sein Wesen und Benehmen sowie seine Nistweise sprächen. Die älteren Autoren und neuerdings auch Reichenow stellen ihn wohl mit Recht zu den eigentlichen Stärlingen, von denen Reichenow sagt, daß sie freieres Gelände bewohnen, Wiesen und Grassteppen sowie Rohrbestände, im Gegensatz zu den Trupialen, welche Waldbewohner sind und sich hauptsächlich in Baumkronen aufhalten. Nach Pelzeln (Ornithol. Brasiliens S. 197) wurde der Nacktaugenstärling im September paarweise oder in kleineren Scharen am niedrigen mit Sumpfgras und niederem Gestrüpp besetzten Ufer des Amazonenstromes beobachtet, was den Gewohnheiten der Stärlinge, nicht denen der Bäume bewohnenden Trupiale entsprechen würde. Aber nach Reichenow ist auch die Schnabelform nicht die der Trupiale, welche sich durch sehr spitzen Schnabel auszeichnen, vielmehr ähnelt sie dem des schönen Rotkopfstärlings — Amblyrhamphus holosericeus (*Scop.*), dessen sehr langer Schnabel eine abgeflachte Firste und eine breite spatelförmige Spitze hat. Der Nacktaugenstärling gleiche auch sonst in mancher Beziehung dem Rotkopfstärling. Der eingeführte Vogel und auch die Schnäbel der im Berl. Museum befindlichen Bälge zeigen die von Reichenow geschilderte Schnabelform nicht. Die Schnäbel sind genau so spitz wie die der Trupiale.

Gefiederbeschreibung: Leuchtend gelb, Flügel, Schwanz, Rücken schwarz, Unterflügeldecken grau, kleine z. T. schwarz; Flügelrand oberhalb des Buges z. T. gelb. Die unbefiederten Stellen (Umgebung des Auges, Zügel, Streif jederseits der Kehle) schwarz; Schnabel, Füße schwarz; Auge braun; Lg. 250, Fl. 130, Schw. 108 mm. Bei jüngeren Vögeln ist das Gelb matter, das Schwarz bräunlicher, und auf dem Scheitel befindet sich bei beiden Geschlechtern ein schwarzer Fleck; die unbefiederten Teile sind nicht schwarz, sondern fahl schmutziggelb.

Verbreitung: Amazonien, Guiana, Peru.

Der eingeführte Vogel zeigte noch die schwarze Kopfplatte. Frl. Dr. Snethlage fand den Vogel nicht selten an den Ufern des Amazonenstromes und seiner südlichen Nebenflüsse in einem Gebiet, das im Sommer einer niederen Marsch- und Waldlandschaft, im Winter einem ungeheuren See mit einigen trockenen inselartigen Erhebungen ähnlich ist. Häufig wurde der Vogel in Gärten und in den Waldinseln des Marschgebietes gesehen. Nach einer Mitteilung von Sclater und Salvin (Proceedings 1873 S. 267) wurde der Stärling am oberen und unteren Lauf des Niayali und bei S. Cruz überall auf den niederen morastigen Sandbänken der Wasserlachen Nahrung suchend gefunden. Anscheinend verzehrt er reichlich Insekten, was auch der Mageninhalt eines erlegten Stärlings erwies. Über die Nistweise liegt mir nur die Mit-

teilung im Brit. Catalog vor, laut der er Nester wie die Trupiale, also beutelförmig an Zweigen der Bäume hängend, baut. Ob diese Mitteilung zutreffend, bedarf der Bestätigung. Er brütet im März. Im April erhielt Salvin junge Vögel, die gerade beim Ausfliegen waren. Wie so viele, ja fast alle neu eingeführten Vögel, welche nach Deutschland gelangen, so wird auch dieser schöne Stärling wohl sein Heim im valutastarken Ausland gefunden haben.

(Fortsetzung folgt.)

Ein Besuch beim Welthause L. Ruhe, Alfeld.

Von Castellamare.

(Nachdruck verboten.)

Ich verdanke geschäftlichen Verbindungen die Nachricht, daß ein großer Transport Tiere von Sumatra eingetroffen ist. Mehrstündige Schnellzugs- und kurze Personenzugsfahrt bringt mich ans Ziel. Das Städtchen Alfeld, freundlich zwischen bewaldeten Bergen liegend und von der Leine durchflossen, gewährt so recht den Anblick tiefsten Kleinstadtfriedens. Nach viertelstündiger Wanderung bin ich angelangt. Schon von weitem zeigt das Geschrei vieler Vogelstimmen, vermischt mit dumpfbrüllenden Tierrufen, an, daß alle Räume und Ställe gefüllt sind. Nach freundlicher Begrüßung seitens des Chefs des Welthauses, Herrn Herm. Ruhe, geht es zur Besichtigung. Überall herrscht peinlichste Sauberkeit, die direkt wohltuend berührt und was in Anbetracht der riesigen Bestände an Vögeln und Tieren größte Hochachtung herausfordert. Mancher sogenannte „Liebhaber" könnte sich da ein Beispiel nehmen und nicht zuletzt die englischen Händler mit ihren oft vor Schmutz starrenden Käfigen. Zuerst besichtigen wir ein Zimmer, worin sich noch Teile eines indischen Vogeltransportes befinden, da das Welthaus direkt selbst von Indien importiert. Da sind an den Wänden hochgestapelt, in sauberen Holzkäfigen, eine große Menge Schamas! Alle in bester Verfassung! Ein ununterbrochenes Schmettern und Singen, eine solche Klangfülle, daß die Ohren schmerzen. Alle im feurigsten Gesang! Ein zweites Zimmer erschließt weitere Schätze Indiens. Es sind da vorhanden in stattlicher Anzahl: Dama-, Dayaldrosseln, Goldstirnblattvögel, blaubärtige Blattvögel, die äußerst prächtigen Niltavafliegenschnäpper, braunbrüstige Blauschnäpper, Silberrohrsonnenvögel, Schwarzkappentimalien; eine Menge Pieper, Stelzen, Drosseln usw. In einem Käfig befinden sich zwei allerliebste winzige Vögel von Zaunköniggröße, wohl Zwergtimalien. Alle und alles in bester Gesundheit! Ein weiteres Zimmer zeigt größere indische Vögel, wie Würger, Häher, Pirole, Elstern usw. Die Menge des Geschauten wirkt direkt betäubend. Dies alles bergen Räume im Erdgeschoß.

Nun geht es zum ersten Stock. Das erste Zimmer öffnet sich. Ich pralle erschrocken zurück. Was ist das? Kleine schwarze Menschen? — So sieht es für den ersten Moment aus. Nein, Menschenaffen sind es, die da wie kleine Kinder auf Decken sitzen. Sechs an der Zahl. Verwundert schauen sie den Eintretenden an, die großen Augen fragend auf ihn gerichtet. Von Herrn Ruhe verteilte Apfelschnitten lösen allgemeine Befriedigung aus. In diesem Zimmer haben schon Eichhörnchen von Sumatra ihren Platz gefunden. Der große Transport von dort ist z. T. schon untergebracht, z. T. noch von der Bahn her im Anrollen begriffen. Ein weiteres Zimmer birgt Graupapageien und Amazonen in großer Zahl und Artenreichtum. Auch prächtige Aras und Araraunas sind vertreten. Ist das ein Geplapper und Geschrei! — Der Wärter ist gerade dabei, jedem einzelnen Weißbrotschnitten zu verabfolgen. Jeder will zuerst haben, keiner will warten. Der empfangende Teil ist dann für einige Zeit beruhigt. Originell ist es mit anzusehen, wie die meisten ihr Brot ins Wasser tauchen, ehe es verzehrt wird. Wieder andere Zimmer bargen ungezählte Mengen von Kanarien, hat doch die Firma im Winter 1922/23 Hunderttausende davon exportiert, eine Rekordziffer, die wohl von keiner anderen Firma des Kontinents, ja der ganzen Erde, auch nur annähernd erreicht wird.

Weitere Zimmer im zweiten Stock enthalten in großen Mengen gelbe und grüne Wellensittiche. Senegalfinken, Weber und Widas in allen nur denkbaren Arten. — —

Nun geht es aus dem vorderen Gebäude zum Hof, wo lebhaftes Treiben herrscht, gilt es doch, die neu eingetroffenen Tiere sachgemäß unterzubringen und zu verpflegen. Im Hofe selbst erblickt man zuerst langgestreckte Volieren, die mit allerlei größeren Vögeln besetzt sind, so z. B. seltene Kraniche, Sultanshühner, Pfauen usw. Man ist soeben dabei, 10 große Kisten zu öffnen, die riesige Gitterschlangen, Leguane usw. enthalten. Dann geht es weiter zu dem ausgedehnten Raubtierhaus. 10 prächtige Königstiger von unbeschreiblicher Wildheit haben hier ihren Einzug gehalten. Dann Nebelpanther, Sonnenbären usw. Wieder andere Stallungen beherbergen Tapirs, Stachelschweine, riesige Affenherden aller Arten, Elefanten, Pumas, Luchse usw. Alles zeugt von riesigem Unternehmungsgeist des Inhabers und von Verbindungen, die über den ganzen Erdball reichen. Ich hatte auch Gelegenheit, mit einigen der Wärter zu reden, meist alte, im Dienst ergraute Leute, die schon in ganz jungen Jahren auf Fang und Kauf in allen Weltteilen, z. T. auch schon bei der Firma C. Reiche, die im Jahre 1914 einging, im Dienst standen. Hochinteressante Sachen vernahm man da. So z. B. erzählte mir einer, dessen „Spezialität" die Australienfahrt war, wie er bei Port Darwin im Norden Australiens sich inmitten von riesigen Gouldsschwärmen befunden habe. Dann die beschwerliche und mühevolle Fahrt mit all den Vögeln gen Süden nach Sydney, um den Europadampfer zu erreichen. Fast alle bekannten Tiere und Vögel hat der Mann seinerzeit von Australien herübergebracht, von viel Verlusten wußte er zu sagen, aber auch von gut beendeten Expeditionen. Wohl die ganze australische Küste kannte er, sogar bis Noumea, der Hafenstadt New Caledoniens, war er vorgedrungen, um von dort die schon seinerzeit so sehr begehrten Papageiamandinen zu holen. Ein anderer erzählte mir von Südafrika, wohin er lange Jahre gefahren ist. All die seltenen Arten, wie Bunt-, Elfen-, Granat- und Wachtelastrild usw., hat er in großen Scharen nach Europa gebracht. Zur Eingewöhnung, besonders obengenannter vier Arten,

werden von dort aus Termiten mit an Bord genommen, was die Annahme bestätigt, daß diese Vögel mehr Insekten- als Körnerfresser sind. Der Reisende ist auch derjenige gewesen, der s. Zt. die ersten Rußköpfchen nach Europa brachte. Eine sechstägige Fahrt mit dem Ochsenwagen ins Innere von Rhodesia hatte ihn zum Ziele gebracht. Die Rußköpfchen sollen nur dort an wenigen Stellen und nicht sehr zahlreich vorkommen. Gegenwärtig ist dieser ehemalige Südafrikareisende in Abessinien, um von einer Tierfangexpedition, die von der Firma Ruhe ausgerüstet ist, Tiere und Vögel abzuholen. Die zoologischen Gärten und die Liebhaber können sich da auf allerlei Seltenheiten gefaßt machen, da gerade dieser Teil Afrikas noch sehr wenig von seiner Fauna nach Europa sandte.

Mein Rundgang ist beendet! — Viel Schönes und Interessantes habe ich gesehen und gehört und scheide dankerfüllten Herzens. Mit großem Stolz erfüllt es mich, muß es jeden erfüllen, der deutsch denkt und fühlt, daß dieses Geschäft, das wohl in seiner Art und Größe einzig und allein auf der Welt dasteht, ein deutsches ist!

Kleine Mitteilungen.

In den Schriften für Süßwasser- und Meereskunde, Heft 12 S. 215, findet sich folgende kleine Mitteilung: „Die zu den kleinen Antillen gehörige Insel Klein-Tobago, welche sich im Privatbesitz eines Engländers befindet, ist dadurch bekannt geworden, daß der Besitzer hier mit Erfolg **Paradiesvögel** eingebürgert hat. Vor 12 Jahren setzte er einige Paare aus, die in dem tropischen Klima vortrefflich gediehen und sich bereits auf einige hundert Stück vermehrt haben sollen. Da größere Schiffe an dem Felsgestade der Insel nicht landen können und auch kleinere wegen der hohen Brandung stets gefährdet sind, so will der Besitzer die Insel für 2000 englische Pfund verkaufen. Die zoologische Gesellschaft in New York wird diese Insel vielleicht erwerben."

Nach einer anderen Mitteilung in derselben Zeitschrift soll der **Uralkauz** bereits bis zur schwäbischen Grenze vorgedrungen und in Bayern nicht selten sein.

Ein **Grünling** mit weißen Wangen- und Kehlfedern sowie einigen weißen Federn am Oberkopf befand sich in der Handlung von Arold. Der Vogel war weiblichen Geschlechts.

Birkenzeisige und Berghänflinge scheinen uns in diesem Winter in größeren Mengen zu besuchen. Sie sind in den Handlungen Berlins zahlreich vertreten und selbst innerhalb der Stadt beobachtet worden. Dagegen scheinen Alpenlerchen selten zu sein, während sie in den beiden vorangegangenen Wintern des öfteren gefangen wurden. R. N.

Sprechsaal.

(Steht den Abonnenten kostenlos zur Verfügung.)

Antwort.

Auf Frage 1. Der kleine Raum, der dem Sprechsaal zur Verfügung steht, läßt es nicht zu, über die Frage mit wenigen Worten hinwegzugehen. Ich behalte mir vor, auf diese Frage in einer längeren Abhandlung zurückzukommen. R. N.

Bücher- und Schriftenschau.

Zoologica palaearctica, eine Zeitschrift für paläarktische Wirbeltierkunde, in Verbindung mit namhaften Zoologen des In- und Auslandes herausgegeben und verlegt von Rud. Zimmermann in Dresden. Organ der Zoologischen Gärten sowie der Internationalen Gesellschaft zur Erhaltung des Wisents. 1. Band Heft 1, 2, 3.

Diese neue Zeitschrift dient hauptsächlich der Erforschung der paläarktischen Wirbeltiere, insbesondere der Säugetierkunde. Daneben werden keineswegs die anderen Gebiete der Wirbeltierkunde, die Ornithologie, Herpetologie und Ichthyologie vernachlässigt. Gleichzeitig ist sie Organ der Zoologischen Gärten Deutschlands und der Internationalen Gesellschaft zur Erhaltung des Wisents. — Inhalt des 3. Heftes des 1. Bandes: O. Harnisch, Die Doppelnatur des Begriffs „Häufigkeit" und Bernh. Hoffmanns Vorschläge der Staffelung des Vorkommens von Lebewesen. — Dr. A. B. Szalay, Rotbüffel. — L. Benick, Über die Verbreitungsgrenze unserer Schläfer (Myoxidae) in Nordwestdeutschland. — O. Harnisch, Zum Vorkommen von Mus rattus in Schlesien. — Ilmari Hildén, Mus agrarius karelicus *Ekström*, ein der Wissenschaft bisher unbekanntes Kleinsäugetier Finnlands. — Rud. Zimmermann, Über die animalische Kost unserer Mäuse. — Dr. J. Gengler, Die Gebirgsvögel des Wiesent-Jura. — Kleine Mitteilungen. — Bücher- und Schriftenschau. Der Zoologische Garten: Prof. Dr. J. Vosseler, Zur Fortpflanzung und Aufzucht der Nilpferde. Mitteilungen der Internationalen Gesellschaft des Wisents. — Folgende ornithologische Aufsätze sind in dem 1. und 2. Hefte der Zoologica palaearctica erschienen: Prof. Dr. B. Hoffmann, Über Abstammung und Bedeutung der wissenschaftlichen Namen Perdix, Corax, Querquedula und Serinus sowie des deutschen Namens „Schwunsch" (= Grünfink). — Rud. Zimmermann, Zur Biologie der Rohrsänger. — Ilmari Hildén, Über die Vogelfauna verschiedener Waldtypen Finnlands. — Werner Sunkel, Wohngebiete und Verbreitung einiger Vogelarten in Hessen. — Rud. Zimmermann, Einige Beobachtungen des Halsband- und des Trauerfliegensängers. — Dr. Ivar Hortling, Tragen Vögel ihre gefährdeten Jungen fort? R. N.

Ornithologische Monatsberichte, 32. Jhrg. Nr. 1, Januar/Februar 1924, herausgegeben von Dr. E. Stresemann. Berlin N 4, Invalidenstraße 43. Im ersten Hefte der Ornithologischen Monatsberichte finden sich eine Reihe interessanter Abhandlungen. Als erste eine von Paul Robien über Beobachtungen an dem kleinen Sumpfhuhn (Porzana parva) in Pommern. Der Verfasser beobachtete erstmalig am 9. Juni 1921 das Sumpfhuhn an den Torfstichen im Borkenbruch, 10 km nördlich von der Löcknitz. Die anhaltenden Lautäußerungen waren gick görrr. Es wurden 4 Stück an einem Tage beobachtet, die über die mit Wasserlinsen bedeckte Decke der Tümpel umherliefen, an einem Binsenstengel ¾ m in die Höhe klettern und dann wieder ins Wasser tauchen, um ein Insekt zu fangen. Ferner fand es der Verfasser am Neuendorfer See, 20 km nordwestlich von Stettin und die Südbucht im Bereich der Naturwarte Mönne, sowie am Möllensee, einem verlandeten See gegenüber der Warte. Über die Bedeutung der verschiedenen Rufstouren, die der Verfasser hörte, ist er sich nicht ganz im klaren. — Beobachtungen an einem Mischsänger von Certhia familiaris × brachydactyla machte L. Dobbrick im Westerwald südlich von Altenkirchen an einem Baumläufer, der in seinem Liedchen die Gesangsteile der beiden bei uns heimischen Arten vereinigte. Die Strophe des Mischlingssängers war: „zi ßä zi ßä zroidit, zi zi zi zi zi zissi zissi zissi zissi zissi zissi zissi zewit". Im Frühjahr 1911 begegnete er einen derartigen Vogel in Sworoschni (Westpr.). Der Verfasser kommt zu dem Ergebnis, daß es sich um einen Mischling beider Arten handelte, bei dem familiaris-Typ überwog. Die Stimmäußerungen waren von beiden Arten, die äußeren Unterscheidungsmerkmale waren nicht klar festzustellen. — Über Accipiter castanilius *Bonaparte* — einen seltenen westafrikanischen Raubvogel — berichtet E. Stresemann und vergleicht ihn mit anderen verwandten Arten. Über die Formenkreise von den im Himalayagebiet lebenden Phylloscopus trochiloides und Ph. davisoni gibt E. Stresemann eine Übersicht und kurze Beschreibung der einzelnen Unterarten, die zu den beiden Formenkreisen gehören. Über ornithologische Beobachtungen am Drausensee bei Elbing berichtet Dr. Hans Lüttschwager-Zoppot. Der Verfasser beobachtete in diesem Gebiet den Nachtigallrohrsänger (L. luscinoides), Brutkolonien vom Schwarzhals-

taucher, Lachmöwen, Zwergmöwen (L. minutus), Trauerseeschwalben und Flußseeschwalben. Ferner wurde das Brüten der Sturmmöwe (L. canus) festgestellt. Beobachtet wurden Pfuhlschnepfen (Limosa limosa), verschiedene Entenarten, Höckerschwäne, Kraniche, Rohrdommel und Rohrweihe, sämtliche Taucherarten, Sprosser, Blaukehlchen, Flußschwirl und die verschiedenen Rohrsänger-Arten.

Unter „Kurze Mitteilungen" wird unter anderem über einen weiteren Baumläufer-Mischsänger, der in Erfurt beobachtet wurde, berichtet. Ferner wird über ein Pärchen von Bergmeisen (Parus atricapillus montanus) berichtet, von dem sich ein Vogel durch besondere Zahmheit auszeichnete. Er flog auf die Hand, entnahm einen Haselnußkern und zerhämmerte ihn auf der Hand. R. N.

Aus den Vereinen.

A. Z. Angemeldet sind die Herren: Dr. Steiner, Zürich (Schweiz), Bolleystr. 40; A. Wahlström, Kunstmaler, Diessen am Ammersee; F. Illig, Betr.-Ing., Hohenofen, Bez. Potsdam; W. Kracht, Ing., Duisburg, Bechemstr. 10; Julius Sauer, Sportshaus, Leipzig, Petersstr. 15.

Für den Stützungsfonds der „Gef. Welt" sind abgeliefert: Frau Neugebauer, Steinau, 7 M.; Krabbe, Anklam, 10 M., insgesamt 17 M. — Die Mitgl. 5, 27, 38, 56, 65, 203, 255, 330 bitte ich, die aufgegebenen Bekanntmachungen an die Verlagsbuchhandlung direkt als Inserat aufzugeben. — Den Mitgl. 2, 11, 14, 23, 29, 36, 41, 65, 72, 83, 88, 93, 113, 117, 120, 122, 134, 142, 148, 155, 161, 178, 179, 190, 203, 226, 227, 237, 247, 255, 263, 280, 299, 306, 336 für die frdl. gespendeten eine Mark übersteigenden Sonderbeiträge und Mtgl. 272 für frdl. gestiftete 50 Mark herzlichen Dank. Quittung aller Zuwendungen im nächsten Jahrbuch. Die Beiträge der aufgeführten Mitglieder belaufen sich von 1—20 Mark. Eine ausf. Quittung an dieser Stelle ist nicht möglich. — Jahrbuch IV dürfte bei Erscheinen dieser Bekanntmachung bereits zur Ausgabe gelangen. Die rückständigen Beiträge werden vor Versendung des Jahrbuches eingefordert.

A. Krabbe, Anklam, Demminer Str. 10.

Bayerischer Vogelliebhaber-Verein (e. V.) (Sitz München). Samstag, dem 26. Januar 1924, im Vereinslokal Pschorrbräu (Bayerstraße) General-Versammlung; aus der Tagesordnung: Jahresbericht, Neuwahl des Ausschusses, Festsetzung des Mitgliederbeitrages. Um zahlreiches Erscheinen wird gebeten.

Rudolf Engel, 1. Schriftführer.

Vom Vogelmarkt.

Von seltener auf den Vogelmarkt kommenden Vögeln werden angeboten:

Lenger, Berlin N 58, Schönhauser Allee 70a: Astrilden, Amaranten, Atlasfinken, Bandfinken, Schmetterlingsfinken, Silberfasänchen, Paradieswitwen, Grauedelsänger, Blutschnabelweber, Orangeweber.

Schöndube, Berlin N 4, Elisabethkirchstraße 1: Goldhähnchen, Zaunkönige, Braunellen, Dorngrasmücken, Birkenzeisige.

Ganter, Steinen, Amt Lörrach (Baden): Nymphensittiche, Alexandersittiche, Goldstirnsittiche.

Reich, Bremen, Theaterberg: Nachtigall-Edelkanarien.

Herrn L. M., München. Man verhütet das Aufkommen von Mehlmilben in dem Mehlwurmzuchtkasten dadurch, daß man die Weizenkleie, bevor man sie in den Kasten schüttet, hoher Wärme (im Backofen) aussetzt. Die Milben werden auf diese Weise getötet. Wärme und Trockenheit vertragen sie nicht, Feuchtigkeit befördert ihre Vermehrung. Im Kleieansatz vorhandene Milben vertreibt man aus der Zuchtkiste durch Erwärmen der Kiste vom Boden aus. Man stellt zu diesem Zweck die geöffnete Kiste auf den erwärmten Ofen, legt darüber ein weißes Tuch, in welches sich die Milben, welche der Wärme entgehen wollen, flüchten. Am besten legt man, sobald ein Tuch von Milben besetzt ist, ein zweites darüber und so fort. Meist ist diese Prozedur mehrmals zu wiederholen.

Herrn O. B., Dresden. Ein Paar der kahlen Vögel wird aus dem Flugkäfig herausgenommen und in einem besonderen Käfig untergebracht. Der Käfig muß in einem von dem bisherigen Aufenthaltsraum entfernten Zimmer aufgestellt werden. Die kahlen Stellen, welche der Vogel mit dem Schnabel nicht erreichen kann, besonders Kopf, Nacken, sollen etwa 3 Wochen hindurch wöchentlich zweimal mit einprozentigem Karbolsäureöl bestrichen werden. Badewasser ist stets zu reichen. Der Käfig wird mit häufig zu benetzenden Blattpflanzen umstellt. Neben dem üblichen Futter wird reichlich Grünkraut gereicht. Wenn bei diesem Verfahren die Wiederbefiederung erreicht wird, werden die anderen Vögel in derselben Weise behandelt. Unterdessen wird der Flugkäfig gründlich mit heißer Seifenlauge, Lysoform oder dergleichen gereinigt.

Herrn Dr. St., Böblingen. Das Weibchen Sperlingspapagei ist einer schweren Lungenentzündung erlegen. Sperlingspapageien nisten zu jeder Jahreszeit im Wellensittichnistkasten. Orangegesichtige Unzertrennliche sind ruhige, anmutige Vögel; meist friedfertig, sind sie zuweilen mit anderen kleinen Papageien unverträglich. Der Käfig ist so auszustatten wie der der Sperlingspapageien. Sie sind zuweilen, aber nicht häufig gezüchtet. Sie bauen in Wellensittichnistkasten ein Nest. Zu diesem Zweck zerschleißen sie dünne Zweige, Rindenstücke, Halme, gern Weidenblätter in etwa 6—8 cm lange Stücke, die sie zwischen die Federn des Bürzels und Unterrückens stecken und so in den Nistkasten eintragen. Durch Sträuben des Gefieders und Schütteln werden sie entfernt. Sobald die Vögel mit dem Legen beginnen, sind Nestbaustoffe nicht mehr zu reichen.

Anzeigenteil

Weichfresserkäfige,
ft neu, 4 Stück gleiche, 40×30×20 cm, nz Eichenholz, Seiten geschl., abhmb. Tuchdecken, Zinkschieber, Porz.-inschiebnäpfe, Federtüren, saubere Arit, vert. geg. **2,2 Kanarien.**
egen Gebot gebe ab: **2,0 Wellentiche,** Brut Jan. und Sept. 1923, t Zuchttiere. Angebote an [27
dart. Schöll, Garmisch (Bayern).

Prima Eierbrot
gen Einf. von 1,50 vier Pfd. franko, usche auch geg. Rübsen, Kanariensaat w. **Georg Rose,** Pyritz i. P., Bahnhofstraße.

Verkauf oder Tausch.
Helena-Fasänchen Stück 6.— M,
0 Silber-Fasänchen 3.— M,
0 kleiner Kuba-Fink 15.— M,
1 Sonnen-Astrild 60.— M,
0 Bandfink 2.50 M. Nehme jap. öwchen in Tausch. [29
roße, Magdeburg, Sieverstorstr. 42.

Bestellungen für Februar sofort der Post übergeben!
Bestellzettel für Deutschland.

Postbestellzettel.
Hiermit bestelle ich für den Monat **Februar 1924**
1 „Die Gefiederte Welt"
(eventuell mit Nachlieferung). — Erscheinungsort **Burg** Bz. Mgdb.

Name: .....

Wohnung: .....

Postquittung: .....Mk. .....Pf. sind heute bezahlt worden.

Ort: ..... den .....

Postannahme

.....

Prima
Deutsche Ameisenpuppen
reine helle Ware, **per Pfund M. 6.—**
gibt ab
Hermann Arold, Zool. Handlung,
Berlin N 58, Franseckystr. 4. [30
Bei Anfragen Rückporto erbeten.
Postscheckkonto: Berlin 149 951.

Kolbenhirse . .	**Pfund**	**1,20 M**
Senegalhirse . .	„	**0,80** „
Weißwurm . .	„	**6,00** „
Muska	„	**7,00** „
Ameiseneier (deutsche)	„	**6,00** „
Weichfutter, prima Qualität . .	„	**1,00** „
Weichfutter (Primus)	„	**2,75** „

Hanf, Rübsamen, Spitzsamen, Kanarisamen, Mohn, Negersamen, Sonnenblumenkerne, Erdnüsse, Zirbelnüsse, Karottengrieß zum Anfeuchten für Weichfutter liefert zu den billigst berechneten Tagespreisen
E. W. Lenger, Berlin N 58,
Schönhauser Allee 70a. [31

Vogelfutter [32

für Kanarien, Waldvögel, Exoten, Papageien, Weichfresser. Anfragen nur gegen Rückporto. Liste 13 über Vogelfutter, Liste 5 über Vogelkäfige, Zuchtgeräte usw. mit etwa 400 Abbild.

W. Göpel, Leipzig,
Tröndlinring 1. Telephon 14958.

Exoten

Chines. Nachtigallen
prachtvolle Sänger, Paar 10.— ℳ,

Hochrote Tigerfinken
Paar 6.— ℳ
und sonstige ausländische Vögel. [33

Willy Odenwald, Fulda.

Offeriere in tadellosen Exemplaren:

Kleine Beos, Seidenstare, Chopiestare, Braunflügelstare, Dominikaner-Kardinäle, Goldstirnsittiche, Safranfinken, Brillenpfäffchen, Schwarzkappenpfäffchen, Weißstirnpfäffchen, Schwarzköpfige Gouldsamandinen, Zebrafinken, Mövchen, Liebestäubchen, kurzschwänzigen Langflügelpapagei, Zwergara (Maracana), Nachtaffen, Rhesusaffen, Meerkatzen.

E. W. Lenger, Berlin N 58,
Schönhauser Allee 70a. [34

Verkaufe:

1,1 schwarz-weiße Nbg. Schwalbentauben, 1,1 rot-weiße Nbg. Schwalbentauben. Heckkäfig, fast neu, System Schindler, Größe: 82 cm l., 40 cm br., 51 cm tief. Vogelkäfig, fast neu, System Schindler, Größe: 25 cm l., 18 cm br., 27 cm tief. Schlagnetzfalle, fast neu, gut funktionierend, Größe 46×63, gibt billig ab [35

Joh. Eßmann,
Ossendorf (Kreis Warburg).

Biete an

Grünfinken, paarweise, Paar 2,— ℳ
Bergfinken . . . . Paar 2,50 ℳ
einzelne Hähne 1,50 ℳ, Weibchen 50 ₰
Ia Singdrossel . . . . . 15 ℳ
1,0 Eichelhäher . . . . . 10 ℳ
1,1 Lachtauben . . . . . 10 ℳ
Suche deutsche Nachtigall, gesundes Tier, unter Garantie für Männchen.
36] **Pfarrer Schwabe,**
Großenbehringen b. Gotha.

Waldvögel

Vogelfutter, Vogelleim usw. beziehen Sie vorteilhaft und prompt von der seit Jahren bestens bekannten Firma

Max Jaumann [37
Großbreitenbach i. Thür.

Ein Urteil meiner Kunden: Heute, den 14. (Samstag früh), die Heidelerche und Buchfink gut und fidel angekommen. Spreche Ihnen hiermit für die ehrliche und fachmännische Bedienung meinen besten Dank aus. Man sieht schon an der Art der Verpackung, daß man es mit einem verständnisvollen Vogelkenner zu tun hat. Hochachtend Fr. Weik.

Dieses Anerkennungsschreiben liegt hier vor. Die Redaktion.

Verk: 1 Zuchtp. gr. Wellensittiche, 4,4 Grünlinge. [38
Suche: Die Gefied. Welt Jahrg. 1917–20 einschl. Rückp.
A.-G. v. Zitzewitz, Berlin W 50,
Kurfürstendamm 243. A. Z. Mtgl. 308.

Suche zu kaufen

0,1 Mozambikzeisig [39
0,1 Zitronenzeisig
1,1 Bachstelzen
1,1 Seidenschwanz
und bitte um Angebot.

Max Kriegeskorte
Hedelfingen - Stuttgart

Silberhirse, Senegalhirse, gelbe Hirse, Glanz u. sonstige Futterarten

liefert preiswert [40

Joh. Götz, Neu-Ulm (Bayern)

Willy Odenwald, Fulda

Vogel- und Tierexport

Fernsprecher 368 Telegramm-Adresse: Zoologist Fulda

empfiehlt sich allen Vogelliebhabern zur Lieferung von

in- u. ausländischen Vögeln

41] Vorratsliste auf Wunsch

---

v. Heuglin, Ornithologie Nordostafrikas

„Gefiederte Welt" Jahrgang 1905 u. 1913

zu jedem annehmbaren Preise zu kaufen gesucht. [42

Eduard Schütze, Eystrup (Weser).

Von meinem bekannten tiefen Stamm habe noch einige

Kanarienhähne und -weibchen

Ia Vorsänger und tadellose Zuchthähne, abzugeben. [43
Tausche evtl. gegen Meistergeige, Bratsche oder Cello, nur Ia Instrument.
Gebe außerdem ab an Exporteur oder Auslandsinteressenten
50 Stück tadellose Hähne und 150 Stück Weibchen.
Streng reell. Garantie für vollste Gesundheit und lebende Ankunft.
Ia Referenzen des In- und Auslandes. Erbitte Rückporto.

A. Schellenberger, Leipzig-Neuschönefeld, Melanchthonstraße 1.

Johann Götz, Südd. Vogelexporthaus

Neu-Ulm a. D. (Bayern)

liefert [44

exotische Vögel

zu mäßigen Preisen.

(Liste gegen Rückantwortkarte.)

Suche:

Pa. Schwarzplatte
(Überschläger)
lautsingende Feldlerche,
evtl. gebe Grasmücke, Stieglitz u. Hänfling in Tausch. [45

Paul Oehme, Freiberg Sa.

1,1 Amethystglanzköpfchen
kerngesund, akklimatisiert, prachtvoll, für 110 ℳ verkäuflich. [46
Offerten a. d. Exp. d. Gefiederten Welt.

Tausche auf [47

1,0 Zebrafink, 0,1 Bandfink, 0,1 Tigerfink, 1,0 Astrild
einige gute K.-Weibchen, gute Singdrossel.
Syré, Lehrer, Biernau i. Thür.

Kaufe:

Sprosser / Nachtigall
Gelbspötter / Schwarzplättel / Steinrötel.

Dr. te Kamp,
Bad Salzschlirf. [48

Gebe ab: Pr. Schwarzkopf u. Heckenbraunelle;
nehme in Tausch: Sonnenvog., Kanarien-Bastard oder Brehm, Gef. Vögel. [49
H. Eberhardt, Nordhausen-Altendorf 36

Wir kaufen laufend

antiquarische Werke sowie Bibliotheken über **Ornithologie.**

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung
Magdeburg. Postschließfach 148.

Selteuer Gelegenheitskauf!

Von der berühmten Naumannschen

Naturgeschichte der Vögel

kann ich den 2. Band, enthaltend: **Grasmücken, Timalien, Meisen u. a.,** in tadellos neuen Stücken, gut gebunden mit 30 herrlichen Chromo-Tafeln für **21 M.** portofrei liefern, soweit der kleine Vorrat reicht. Für das Ausland ist 1 M. = 1.25 schw. Frk. Porto extra.

Alfred Troschütz, [50
Hannover, Große Aegidienstr. 4.
(Postscheckkonto: Hannover 200. Cruses Buchhandlung.)

1,0 rotköpf. Inseparables und 0,1 Blaubürzel
zusammen gewöhnt, vollkommen gesund, zu verkaufen. Nehme in Tausch:
51] **0,1 Singsittich.**
Gustav Rambauseck,
Wien XVIII, Martinstraße 88.

Gefiederte Welt

verschiedene Jahrgänge, am liebsten in Originaleinband, zu kaufen gesucht. Angebote mit Preisangabe an [52

Hans Lohmar, Ing., Köln,
Blumenstraße 1.

Verkaufe

9 Bände Gefiederte Welt,
Jahrgang 1907—1915, sauber eingebunden, je Band mit 4 Buntdruckbildern, à Stück 6 ℳ, und 3 Bücher, Singvögel v. Schaeff, Unsere Papageien v. Dr. Ruß u. Gef. Sängerfürsten v. Rausch, alles zusammen 60 ℳ, auch einzeln. [53
Oberpostschaffner a. D. W. Isaaks,
Harburg (Elbe).

Wir sind beauftragt worden, folgende

Seltenheiten

anzubieten:

Gefiederte Welt. I. Jahrgang 1872—1923 außer 1904, 1910, 1911. Fast alles gebunden (11 Jahrgänge in Heften).
Journal f. Ornithologie. II. Jahrgang. 1854—1904 außer 1870 bis 1872. Es fehlen in älteren Jahrgängen einige Tafeln sowie in 1869 ein Bogen. Dazu gehörig: Ornithologisches Zentralblatt. I. Jahrgang 1876—1882. Komplett. Zum großen Teil gebunden.
Ornithologische Monatsschrift. I. Jahrgang. 1876—1879, 1883—1899, 1901—1922. Zum großen Teil gebunden.
Zeitschrift für Oologie. I. Jahrgang. 1911. Komplett.
Ornitholog. Rundschau. I. Jahrgang 1905. Komplett.
Zeitschrift für Oologie und Ornithologie. XV. Jahrgang. 1905—1910, 1912, 1920, 1921. Komplett. Von Jahrgang 1911, 1912, 1913, 1914, 1923 fehlen diverse Hefte.

Lieferbarkeit freibleibend — Irrtum vorbehalten. Liebhaber, die sich bewußt sind, daß derartige Seltenheiten I. Ranges einen angemessenen Preis erfordern, wollen sich mit uns in Verbindung setzen. Die einzelnen Reihen können nur in sich geschlossen abgegeben werden.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung
Magdeburg
Postschließfach 148.

Inserate

für das am 2. Februar 1924 zu Ausgabe gelangende Heft 3 der Ge Welt erbitten bis 27. Jan. 1924 frü

Die viergespaltene Nonpareillezeile ode deren Raum wird mit 20 Goldpfenni berechnet.

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Hermsdorf bei Berlin; für den Anzeigenteil: Rolf Kretschmann, Magdeburg, Postschließfach 148.
Verlag der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck: August Hopfer, Burg Bz. Mgdbg.

Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Jahrg. 53 | Den 7. Februar 1924 | Heft 3

(Druckort: Burg, Bezirk Magdeburg.)

Einiges über Vitamine und Vogelhaltung.

Von A. Adlersparre.

(Schluß.) (Nachdruck verboten.)

Der B-Wert ist bei allen gekochten Futterstoffen, wie Herz, Leber, Fleisch usw., höchst wesentlich verringert. Der Grund hierzu ist, daß die B-Vitamine wasserlöslich sind und deshalb bei Wegschüttung des Kochwassers natürlich größtenteils verlorengehen. Außer Vitaminen gehen nebenbei beim Kochen auch mehrere andere wertvolle Substanzen verloren; ausgelaugt werden z. B. Basenträger, die für Bindung und Wegtransport der Säuren des Tierorganismus (Kohlen-, Schwefelsäure u. a.) sehr bedeutungsvoll sind, ferner auch gewisse für den Aufbau des Körpers wichtige Eiweißstoffe und gewisse auf Drüsenarbeit und Verdauung förderlich einwirkende Geschmacksstoffe; durch die Wärme zerstört werden gewisse die Verdauung unterstützende Enzyme.

Der C-Wert fehlt oder wird wenigstens stark herabgesetzt bei allen gekochten, gedörrten oder in anderer Weise konservierten Nahrungsstoffen, wie Obstarten, Beeren, Pflanzenblätter, Wurzelgemüse und tierische Stoffe. C-Vitamin wird nämlich besonders nach längerer Wärmeeinwirkung zerstört, von Luft oxydiert und zudem in Wasser gelöst.

Schließlich ist zu bedenken, daß feines weißes Mehl und daraus hergestelltes Gebäck, wie Semmel, Zwieback u. dgl. praktisch genommen ohne Vitaminwert jeder Art sind, weil feingemahlenes Kernmehl (Weizen, Mais, Reis usw.) vitaminlos ist (im groben Mehl gehen dagegen auch die vitaminreichen Keime ein). Gleichartig ist das Verhältnis zwischen dem glattpolierten, kostspieligeren Karolinareis und dem rauhen, wohlfeileren Burmareis.

Ein erster Blick auf vorstehendes zeigt uns, daß die hier genannten mehr oder minder vitaminlosen Nahrungsstoffe oft den Hauptbestandteil des Weichfresserfutters ausmachen, und daß die Körnerfresser ein klein wenig glücklicher daran zu sein scheinen. Es sind also in erster Linie die Weichfresser, bei welchen wir die Erscheinungen einer oder mehrerer Avitaminosen zu erwarten haben.

Wie verhalten sich denn diese in vorliegender Hinsicht. Hält man im allgemeinen Weichfresser für schwieriger zu verpflegen und für hinfälliger als Körnerfresser? Fallen sie nicht öfter allerlei „rätselhaften" Stoffwechselkrankheiten, Befiederungsstörungen und Fußgeschwüren anheim? Sind sie nicht in der Regel der Züchtung minder zugänglich? — Nun wäre es in allen denjenigen Fällen der Literatur, die darauf hindeuten können, gewiß eine Übertreibung, zu folgern, daß auch Vitaminarmut vorgelegen. Krankheiten und deren Symptome sind Ausdrücke der Reaktion des Organismus gegen gewisse äußere Reize, und ein und dasselbe Symptom kann bisweilen ganz verschiedenen Reizen entsprechen. Aber gewiß sollten uns die wiederholten Klagen ernstlich mahnen, zu versuchen, in unserer Pflegetechnik denjenigen Krankheitsfaktor zielbewußt auszuschalten, der in Vitaminarmut liegen kann und in vielen Fällen sicher auch liegt.

Die Körnerfresser scheinen, wie gesagt, etwas bessergestellt. Ihr Hauptfutter dürfte wenigstens in der Regel Vitamine der A- und B-Gruppen und ihr Nebenfutter C-Vitamine enthalten. Es wäre denn möglicherweise während des Winterhalbjahres mit seinem eintönigeren Speisezettel, während welches dem Vitaminzugang nach üblichen Vorschriften gepflegter Körnerfresser eine genauere Aufmerksamkeit gewidmet zu werden brauchte.

Weit wichtiger ist es, den Jungen eine reichliche Vitaminzufuhr zu sichern. Schon einfaches Nachdenken sagt uns, daß die Entwicklungsprozesse weit größere Anforderungen auf Vitaminzugang als der ausgewachsene Organismus stellen müssen. In der Natur ist auch hierfür bestens gesorgt, indem Knospen und zuwachsende Organe einen bedeutend höheren rel. Vitamingehalt als nach beendeter Entwicklung aufweisen. Aber wie viele Züchter arbeiten nach dieser Anweisung? Wie viele sind klar darüber, daß wenigstens die Vitamine der A- und B-Gruppen vom Weibchen in reichlicher Menge auf das Ei übergeführt worden müssen, damit die normale Entwicklung des Embryos nicht leidet und Avitaminosen schon im Ei aufkommen? Man sollte also beim Weibchen (am besten vielleicht auch beim Männchen) schon einige Zeit vor dem Nisten auf eine vitaminreichere Diät halten, als für deren eigenen Bedarf sonst notwendig war. Alle Klagen über unbefruchtete Eier, im Ei abgestorbene Embryonen, verkümmerte Junge usw. werfen ein Blitzlicht auf diese Verhältnisse, und sicher haben — selbstverständlich nebst anderem — Avitaminosen ihren großen Anteil an dem als Erklärung gerne gebrauchten, aber jedoch

hauptsächlich in unklarem Denken und offenbaren Mißverständnissen begründeten tierpflegerischen Begriff „Inzuchtdegeneration".

Wie werden wir denn bei Bedarf die Vitaminzufuhr einigermaßen verbessern können? In eigener Praxis pflege ich seit einer Anzahl von Jahren den A-Wert durch Zusatz von geriebener Möhre, frischgekochtem Eigelb, frischgemolkener Milch oder einem Tropfen gutem Lebertran (nicht aber Lebertranemulsion, weil wahrscheinlich oxydiert!) zu erhöhen. Der B-Wert kann durch Zusatz von beispielsweise Eigelb, Möhre und angekeimten Samenkörnern gesteigert werden. Der C-Wert durch ein paar ccm frisch ausgepreßten Apfelsinensaft (Zitrone dürfte wohl den meisten Vögeln allzu säuerlich sein), Möhre und angekeimte Körner. Zudem gebe ich, wenn möglich, viel Grünfutter.

Betreffend die Anwendung einiger dieser Zusätze, wie Möhre, ist die Praxis dem theoretischen Verstehen vorausgegangen. Aber wie so oft in derartigen Fällen, wo man nur instinktiv empfunden, daß das eine oder andere von Wert war, ohne zugleich eine klare Einsicht zu bekommen, worin das Wertvolle lag, so hat man sich auch zu wiederholten Malen auf Irrwege locken lassen. Das ist z. B. der Fall, wenn Mathias Rausch in den „Sängerfürsten" Auspressung und Wegschüttung des Saftes der geriebenen Möhre befürwortet, eine Methode, die nach ihm von zahlreichen Weichfresserpflegern geübt wird. Dies ist ein vernunftwidriges Verfahren, indem nicht nur die wasserlöslichen B-, C- und D-Vitamine und wertvolle Basenträger, sondern auch kalorische Nährstoffe (lösliche Stärke und Zuckerarten) weggeschüttet werden und der Rückstand also hauptsächlich aus (für Stubenvögel) unverdaubarer Zellulose (die man in solchem Falle bequemer technisch fertiggestellt bekommen kann) besteht. Möhre enthält nämlich: verdaubares Eiweiß 0,9 %, Kohlenhydrate 9,2 %, Zellulose 6,7 %, Wasser 86,1 %, Basenüberschuß in Milligrammäquivalenten 9. — Kaum besser ist es, Weichfutter, wie es auch oft geschieht, mit gedörrtem Karottengrieß und Wasser zuzubereiten. — Auch ist man auf falschem Wege, wenn man befürwortet, den Vögeln für längere Zeit — bis auf mehrere Wochen — bei täglicher Wassererneuerung gequellte Sämereien zu reichen. Das verbietet sich einmal, weil gequellte Sämereien im allgemeinen nicht besonders wünschenswert sind, wohl aber ab und zu gekeimte (die Quellung ist nämlich ein sich auch nach der Keimung und dem Absterben der Körner fortsetzender physikalischer Prozeß ohne praktischen Nutzen für unsere Stubenvögel), einmal auch, weil die B-, C- und D-Vitamine, wie schon mehrmals gesagt, wasserlöslich sind und aus den abgestorbenen Körnern ausgelaugt bei der täglichen Wassererneuerung weggeschüttet werden. Der günstigere Erfolg, welchen man durch eine langdauernde Quellung glaubt erreicht zu haben, dürfte ziemlich sicher auf einer nicht immer leicht vermiedenen Verwechslung von post hoc und propter hoc beruhen. — Schließlich sei hier bemerkt, daß auch Ruß einem kleinen Irrtum in hierhergehörenden Fragen anheimgefallen war. Er glaubte nämlich, daß der Apfel hochobenan unter dem Fruchtfutter stände und daß die Apfelsine mehr als Notfallsfutter zu betrachten wäre (Fremdl. Stubenvögel Bd. IV S. 209 u. f.). Hinsichtlich des Futterwertes verhält es sich nach dem, was wir jetzt wissen, gerade umgekehrt; die Apfelsine und die Zitrone stehen als die vitaminreichsten aller gewöhnlicheren Obstsorten in erster Reihe, der Apfel ist wegen seines geringeren Vitamingehaltes eher dann ein Notfallsfutter, von welchem man, um annähernd gleichen Vitaminwert zu erreichen, mindestens 3—4-mal größere Gaben als von Apfelsinen reichen muß (der Kalorienwert ist bekanntlich bei beiden etwa ebenso gering, der Basenwert dagegen bei Apfelsine bedeutend höher; Apfelsine: verdaubares Eiweiß 0,7 %, Kohlenhydrate 13,7 %, Zellulose 0,5 %, Wasser 84,2 %, Basenüberschuß 10; Apfel: verdaubares Eiweiß 0,3 %, Kohlenhydrate 13,9 %, Zellulose 1,3 %, Wasser 84,2 %, Basenüberschuß 1).

Zuletzt ist es mir eine angenehme Pflicht, festzustellen, daß die Bedeutung der Vitamine für Vögel schon früher einmal in dieser Zeitschrift besprochen wurde, nämlich in einer Arbeit (1919), aus der, ich gehe sicher nicht fehl, wenn ich sage, von allen Lesern der „Gef. Welt" sehr geschätzten Feder H. Lauers. Dieser Verfasser scheint vor allem die große Sterblichkeit gewisser Körnerfresser mit Vitaminarmut in Verbindung bringen zu wollen, lenkt aber auch die Aufmerksamkeit auf das Risiko für Weichfutterfresser; die außerordentliche Bedeutung der Vitamine für die Entwicklung der Jungen scheint dagegen seiner Aufmerksamkeit entgangen zu sein. Betreffend die Weichfutterfresser bin ich natürlich seiner Meinung, gebe auch zu, daß gefährliche Vitaminarmut unter gewissen Umständen auch für Körnerfresser aufkommen kann. Wie z. B. betreffend die von L. angeführte lauchgrüne Papageiamandine, die ja oft ziemlich hartnäckig bei sehr einseitiger Kost (Reissamen) aushält. Aber bei den anderen Körnerfressern scheint mir die Sache etwas anders zu liegen. Diese Arten sind wohl im allgemeinen nicht so eintönig in der Futterwahl, und da sehr geringe Vitaminquantitäten erforderlich sind, um eine Avitaminose von Erwachsenen fernzuhalten, dürften die Vögel sich wohl diese leicht in ausreichender Menge aus den verschiedenartigen natürlichen Futterstoffen holen können, die bei vorschriftsmäßiger Pflege gereicht werden.

Wollen wir z. B. an die von Lauer besonders erwähnten beiden Gouldvarietäten denken. Während anderthalb Jahrzehnten habe ich vorzugsweise aus vererbungswissenschaftlichen Gründen diese beiden gezüchtet und gepflegt, zeitweise in einer Anzahl von 20—30 Stück auf einmal — eine jetztzeitige Vererbungsuntersuchung ist bekanntlich ebensosehr ein mathematisch-analytisches wie ein züchterisches Vornehmen. Na, während des Krieges nahm schließlich mein Hirsevorrat ein Ende, die Zufuhr vom Ausland war seit langem versperrt, und Hirse konnte in Schweden wegen der nördlichen Lage nicht geerntet werden. Also mußte ich während zirka $1^1/_2$ Jahren meine Goulds (unter ihnen auch Individuen auf der Schwelle des Greisenalters) mit vollkommen fremdem Notfutter füttern, was mir ohne irgendwelchen vom Futterwechsel verursachten Todesfall gelang. Ein Teil dieser jüngeren und älteren Kriegsüberleber —

vorsichtshalber, da Mitten im hiesigen Winter, nur ein halbes Dutzend — wurden dann vom 6.—9. Februar 1920 in Stockholm im alten Gebäude der Akademie der Wissenschaften öffentlich ausgestellt. Hatte nun jenes hartnäckige Festhalten bei einer einzelnen zugewöhnten Futtersorte, die wohl die einzig denkbare Voraussetzung einer unbeabsichtigten Avitaminose bei erwachsenen Körnerfressern ist, bei dieser Art vorgelegen, so wäre mir natürlich der Übergewöhnungsversuch vollständig mißlungen oder hätte wenigstens der Mehrzahl das Leben gekostet! Jemand wird mir vielleicht hiergegen einwenden, daß dies nur ein einzelner Fall ist. Mag es so sein, das verringert die Beweiskraft nicht, denn es handelt sich ja nicht um ein einzelnes Individuum, sondern um eine ganze Sammlung. Dies nur als ein Beispiel, mit dem ich nicht habe verneinen wollen, daß die Goulds und die anderen schwer zu verpflegen sind — „Schmerzenskinder der Liebhaber", schreibt Bauer —, sondern nur nachweisen, daß die Ursache dieses bedauerlichen Mißverhältnisses, was erwachsene Körnerfresser betrifft, in der Regel in anderen krankmachenden Reizen als im Vitaminmangel liegen muß.

Hiermit habe ich eine wichtige Seite der Vogelhaltung für die Leser klarzulegen versucht. Viel anderes gibt es selbstverständlich, auf welches Rücksicht genommen werden muß, schon innerhalb der Fütterungstechnik — Kalorienwerte, Basenwerte u. a. —, und noch viel mehr gibt es innerhalb der Vogelhaltung als Ganzheit, ehe man sagen kann, daß die Pflege korrekt ist. Das heißt, daß sie derart ist, daß sie den Tieren nicht vollkommen unnötig Leiden und Krankheit verursacht! Hierfür ist aber vor allem erforderlich, daß die Vogelhaltung nicht in alten mehr oder minder unverstandenen Formen und inhaltlosen Phrasen erstarrt. Jede Pflege lebender Geschöpfe, sei es Mensch oder Tier, ist und muß sein Entwicklung, erweitertes Wissen, vertieftes Verstehen der biologischen Kausalzusammenhänge. Aber jede Entwicklung fordert auch den Tod vieler alten Formen und Vorstellungen!

Stockholm, den 1. August 1923.

Exakte Vererbungsversuche bei Kanarienvögeln.

Von Dr. H. Duncker, Bremen.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

III.

4. Mit der Besprechung der weißen Vögel kamen wir bereits auf das sehr schwierig zu behandelnde Farbenproblem. Die Farbe des Kanarienvogelgefieders setzt sich aus drei verschiedenen Farbstoffen zusammen, von denen zwei, nämlich der schwarze und der braune Farbstoff, der chemischen Gruppe der Melanine angehören und in der Form kleiner Körnchen oder Brocken in der Feder zur Ablagernng gelangen. Man nennt diese Farbstoffe auch „Schollen"-Pigmente. Während die schwarzen Melanine mehr in der Nähe des Schaftes zur Ablagerung gelangen, sind die braunen Melanine mehr in den Außenteilen der Fahne niedergelegt. Auf diese Weise kommt die Schaftstrichelung vieler Federn vor allem auf dem Rücken, den Flügeln und den Seiten zustande.

Crested-bred Norwich
(s. S. 12, Heft 2).

Die Körnchen beider Melanine können dichter oder weniger dicht angeordnet sein, je nachdem entstehen dunklere oder hellere Töne. Die schwarzen Melanine zeigen bei dichter Lagerung ein sattes Schwarz, die braunen Melanine ein dunkles Schokoladenbraun. Bei weniger dichter Ablagerung geht die schwarze Tönung in eine schieferfarbene, mehr graue Tönung über, die schokoladenbraune in eine mehr zimtbraune Tönung. Die Ablagerungsweise der Melanine, ob dichter oder weniger dicht, muß durch einen besonderen Erbfaktor hervorgerufen werden. Bei den grünen Kanarienvögeln, den Schecken mit gelber Grundfarbe und den gelben Vögeln tritt ein diffus in den Federn verteilter Farbstoff auf, das sogenannte Zooxanthin (Gelbfarbstoff), welcher der chemischen Gruppe der Lipochrome angehört. Dieser gelbe Farbstoff erzeugt an den Teilen des Körpers, wo die Melanine fehlen, die kanariengelbe Färbung, dort, wo die Melanine vorhanden sind, treten Farbenmischungen auf, die für unser Auge je nach der Stärke der vorhandenen Melanine und ihrer Art gelblichgrüne oder olivenfarbene und braune Tönungen hervorbringen. Auch die gelbe Farbe tritt in zwei Abarten auf, dem Strohgelb (engl. „buff") und dem Hochgelb (engl. „yellow"). Es sind dies, so scheint es, nicht zwei verschiedene Lipochrome, sondern sie verdanken ihre Unterschiedlichkeit wahrscheinlich nur einer Verschiedenheit der Stärke der Federstrahlen, in denen diese Lipochrome abgelagert sind.

Ist der einzelne Federstrahl dicker, so erscheint der Gelbfarbstoff dunkler, ist der Federstrahl dünner, so erscheint die Feder hellgelber. Da nachgewiesen ist, daß auch im männlichen Geschlecht die Federstrahlen stärker sind als im weiblichen Geschlecht, so erklärt sich daraus die allen Züchtern bekannte lebhafter gelbe Tönung des Hahns gegenüber der Henne.

Wir kommen demnach zu einer großen Liste von Erbfaktoren, deren Aufzählung hier zum Verständnis des Folgenden nötig ist.

1. Der Schwarzfaktor „S". Er veranlaßt die Ausbildung der schwarzen Melanine.

2. Der Braunfaktor „B". Er veranlaßt die Ablagerung der braunen Melanine.

3. Der Massierungsfaktor „M". Er verdichtet die Ablagerung der Melanine beiderlei Art.

4. Der Gelbfaktor „G". Er veranlaßt die Entstehung des Zooxanthins.

5. Der Federstrahlenverdickungsfaktor „F". Er verwandelt die strohgelbe Farbe ins Hochgelbe.

Nun wissen wir aber aus chemischen Untersuchungen, daß die Entstehung der Melanine die Anwesenheit eines an sich farblosen Stoffes voraussetzt, den der Chemiker „Chromogen" nennt. Durch den Einfluß gewisser Fermente auf dieses Chromogen entstehen die Melanine. Diese Fermente gehören der Gruppe der Oxydasen an und werden Tyrosinasen genannt. Eine Art der Tyrosinase erzeugt die schwarzen Melanine, eine andere Art die braunen Melanine. Wenn das Chromogen fehlt, so kann selbst beim Vorhandensein dieser Tyrosinasen, deren Bildung durch den Schwarzfaktor bzw. den Braunfaktor veranlaßt wird, kein Melanin entstehen. Wir müssen daher als weiteren Erbfaktor hinzufügen:

6. Den Chromogenfaktor „C". Er veranlaßt die Bildung der Melanine, nicht aber die des gelben Lipochroms.

Hierzu tritt nun als fernerer Faktor der uns bereits bekannte:

7. Weißfaktor „W". Dieser unterdrückt die Entwicklung des gelben Farbstoffes.

Der Leser ersieht daraus schon, wie kompliziert die Kombinationsmöglichkeiten dieser 7 Erbfaktoren sind, welche die verschiedene Färbung der Vögel hervorrufen. Ich will versuchen, einige der bekanntesten Typen auf ihre Erbformel zu prüfen.

a) Der Chromogenfaktor fehlt: Es können sich keine Melanine entwickeln. Wir erhalten gelbe Vögel mit roten Augen. Rote Augen deswegen, weil die Melanine, welche sonst den Augenhintergrund schwarz färben, fehlen, und daher der blutreiche Augenhintergrund durch das Sehloch sichtbar wird. Da der Chromogenfaktor die Voraussetzung der Entstehung der Melanine ist, so können natürlich solche gelbe Vögel mit roten Augen den Schwarzfaktor wie auch den Braunfaktor, wie auch den Massierungsfaktor enthalten, ohne daß ihr Vorhandensein äußerlich bemerkt wird. Gelbe Vögel mit roten Augen können daher noch immer sehr verschiedene Erbformeln haben. Z. B.: „SBMc", „SBmc", „SbMc" usw. Stets muß aber der Chromogenfaktor bei diesen Vögeln fehlen. Auch der „Weißfaktor" muß diesen Vögeln stets fehlen, da sonst die gelbe Gefiederfärbung unterdrückt würde.

b) Der Chromogenfaktor fehlt, der Weißfaktor ist vorhanden: Die Vögel sind weiß mit roten Augen. Dies sind die eigentlichen Albinos. Man bezeichnet oft auch die gelben Vögel mit roten Augen als Albinos. Dies ist nur dann richtig, wenn man das Fehlen des Chromogenfaktors als Ursache zur Albinobildung anspricht, wie es für alle die Formen zutrifft, welche keine Lipochrome enthalten, z. B. die Mäuse oder die Hühner. Da das Vorhandensein von Melaninen im Gefieder stets auch das Vorhandensein vom Chromogenfaktor zeigt, so kann es Schecken oder grüne Kanarienvögel mit roten Augen nicht geben. Es gibt also nur weiße oder gelbe Kanarienvögel mit roten Augen.

c) Der Schwarzfaktor S fehlt: Hierher gehören beim Vorhandensein des Chromogenfaktors die sogenannten Isabellen. Da diesen Vögeln die schwarzen Melanine fehlen, können sie auch im Augenhintergrunde nicht auftreten. Nun entwickelt sich das „braune Melanin" anscheinend später als die „schwarzen Melanine". Wenn der junge Vogel aus dem Ei schlüpft, sind die braunen Melanine noch nicht im Augenhintergrund zur Ablagerung gekommen. Die Augen sehen daher beim Ausschlüpfen rot aus. Später nach Auftreten der braunen Melanine werden die Augen dunkler und unterscheiden sich beim erwachsenen Vogel kaum von den normalen Augen. Da die schwarzen Melanine fehlen, kann die Schaftstrichelung bei den Isabellen nicht in die Erscheinung treten, die Vögel sehen bei gleichmäßiger Verteilung der braunen Melanine über den ganzen Körper gleichmäßig braun aus. Wenn die braunen Melanine auf bestimmte Körperteile beschränkt bleiben, entstehen die Isabellschecken, da an den Stellen, wo die braunen Melanine fehlen, die gelbe Federfarbe zum Vorschein kommt. Es entzieht sich meiner Kenntnis, ob es zwei Arten von Isabellen gibt, nämlich schokoladenfarbene und zimtfarbene. Erstere müßten den Massierungsfaktor enthalten, letztere nicht. Ich habe noch keine Isabellen gezüchtet, finde auch nichts in der Literatur. Anscheinend sind die gewöhnlichen Isabellen nicht mit dem Massierungsfaktor behaftet. Noorduijn erwähnt dunkel- bis hellbraune Isabellen.

d) Der Braunfaktor fehlt, der Chromogenfaktor ist vorhanden: Der Schwarzfaktor und der Gelbfaktor sind ebenfalls vorhanden. Es müssen nunmehr die olivfarbenen und braunen Töne verschwinden, nur die grünlichen, schwarzen und grauen Farbtöne treten auf. Tritt bei solchen Vögeln außerdem der Weißfaktor hinzu, so müssen auch die grünlichen Töne verschwinden. Bei Verteilung der schwarzen Melanine über den ganzen Körper müssen schiefergraue Vögel entstehen, wenn der Massierungsfaktor fehlt; schwarze Formen entstehen bei Vorhandensein des letzteren. Solche Vögel sind tatsächlich gezüchtet worden.

e) Der Weißfaktor ist vorhanden: Da der Weißfaktor nur auf die Lipochromentwicklung (Gelb) einwirkt und diese bis auf ein verschwindend geringes Maß zurückdrängt, so können diese Vögel entweder reinweiß aussehen oder an den Stellen, wo sonst die Melanine auftreten, schwarze und braune Farben zeigen. Wir er-

halten dadurch Weißschecken oder weißbunte Vögel. Sind die Melanine sehr stark vertreten, so entstehen graubraune Vögel. Man erhält solche, wenn man möglichst dunkle Weißschecken mit grünen Vögeln paart.

f) Der Federstrahlenverdickungsfaktor (F) ist vorhanden: Die Züchter unterscheiden schon seit alter Zeit „hochgelbe (yellow)" und „strohgelbe oder weißgelbe (buff)" Vögel. Erstere enthalten den F-Faktor, letztere dagegen nicht. Anscheinend sind die hochgelben Vögel aber stets heterozygot, da bei einer Paarung von hochgelben mit hochgelben Vögeln immer wieder strohgelbe vorkommen, bei einer Paarung von strohgelben mit strohgelben aber nicht. Dies beweist, daß hochgelb über strohgelb dominiert. — Galloway hat bei Paarungen von „hochgelben" mit „hochgelben" Vögeln das Verhältnis von 3 : 1 von „hochgelb" : „strohgelb" gefunden. Es stimmt dies aber jedesmal zum Vorschein kommt, wenn er homozygot wird. Die mit diesem homozygoten Faktor behafteten Vögel sterben jedesmal ab. Ein „hochgelber" Vogel hätte dann die Erbformel: LlFf. An Geschlechtszellen werden dann vier verschiedene Typen erzeugt, nämlich LF, Lf, lF, lf. Bilden wir uns wieder das „Punnet"sche Schema, so erhalten wir:

Gameten	LF	Lf	lF	lf
LF	(LF LF)	(LL Ff)	(Ll FF)	Ll Ff
Lf	(LL Ff)	(LL ff)	Ll Ff	Ll ff
lF	(Ll FF)	Ll Ff	(ll FF)	ll Ff
lf	Ll Ff	Ll ff	ll Ff	[ll ff]

Blauwangenblauhäher (s. S. 23).

mit den Mendelschen Regeln überein, vorausgesetzt, daß Galloway nur heterozygote Vögel besaß. Er erhielt 48 hochgelbe und 16 strohgelbe Vögel. Nimmt man nun aber an, daß nur ein Faktor für die Erzeugung der hochgelben Vögel in Betracht kommt, so müssen $^1/_3$ der hochgelben Vögel homozygot sein. Dann müßten sich aber „hochgelbe" Vögel rein züchten lassen, was nicht der Fall ist. Man könnte nun sagen, daß bei der geringen Zahl der Nachkommenschaft in den Gallowayschen Versuchen (18 Paarungen) diese Zahlen nur ein zufälliges Ergebnis sind, und daß bei einer größeren Zahl von Versuchstieren sich auch das für die Haubenvögel und die weißen Vögel infolge Absterbens der Homozygoten herausstellende Verhältnis 2 : 1 einstellen würde. Es läßt sich aber der Fall auch unter der Annahme, daß die homozygoten „hochgelben" Vögel stets absterben und trotzdem das Verhältnis 3 : 1 gewahrt bleibt, auf folgende Weise erklären. In den gelben Vögeln steckt ein heterozygoter Faktor (L), welcher an sich mit der Färbung nichts zu tun hat,

Von diesen Formen sind alle diejenigen nicht lebensfähig, welche den Faktor L oder F doppelt enthalten. Es sind dies die Fächer 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11. Es bleiben übrig mit dem F-Faktor: „LlFf" (4 mal) und „llFf" (2 mal), im ganzen also 6 „hochgelbe" Vögel. An Formen ohne den F-Faktor verbleiben: „Llff" (2 mal) und „llff" (1 mal). Es wären dies 3 Formen. Nehmen wir nun an, daß die Kombination llff nicht auftritt, weil sich die beiden Faktoren l und f in doppelter Anzahl nicht vertragen, sich gleichsam „abstoßen"*), so muß das Verhältnis der hochgelben zu den strohgelben sich wie 3 : 1 verhalten, obwohl die homozygoten hochgelben Vögel stets absterben. Es würde dies auch die Angabe Noorduijns erklären, welcher davon abrät, dauernd hochgelbe Vögel miteinander zu paaren, weil erfahrungsgemäß die Nachkommenschaft solcher Vögel nach verschiedenen Richtungen hin degeneriert. Für die

*) Ein solches scheinbares „Abstoßen" von Gameten ist eine auch bei andern Tieren häufig gemachte Beobachtung. Die Erklärung hierfür erfolgt weiter unten.

weißgelben Vögel tritt diese Degeneration bei fortgesetzter Paarung auch ein, wenn auch in geringerem Maße. Nun hat Galloway aber auch Rückkreuzungen vorgenommen, indem er hochgelbe Vögel mit strohgelben Vögeln paarte. Er erhielt dabei auf je 5 Vögel 3 hochgelbe und 2 strohgelbe. Für den Fall, daß bei dieser Paarung eine einfache Mendelsche Spaltung bezüglich eines einzigen Merkmals vorläge, müßte dieses Verhältnis, wie oben an anderer Stelle bereits erwähnt worden ist, das Verhältnis 1 : 1 ergeben und nicht wie 3 : 2. Diese Feststellung von Galloway mit der geringen Zahl der Nachkommenschaft erklären zu wollen, geht sicher nicht an. Galloway erhielt bei seinen Versuchen 167 Jungvögel, von denen 101 hochgelb, 66 strohgelb waren. Es läßt sich dieses Verhältnis aber leicht durch die gleichen Annahmen erklären, die wir soeben bei der Paarung von hochgelb mit hochgelb machten. Die Hochgelben haben die Erbformel „LlFf", die strohgelben die Formel „Llff". Erstere bilden die Geschlechtszellen LF, Lf, lF, lf, die letzteren die Geschlechtszellen Lf und lf. Bilden wir wieder das Punnetsche Schema, so erhalten wir:

Gameten	LF	Lf	lF	lf
Lf	(LLFf)	(LLff)	LlFf	Llff
lf	LlFf	Llff	llFf	[llff]

Davon sind wiederum alle mit dem doppelten L-Faktor begabten Jungvögel nicht lebensfähig, also 1 und 2. An hochgelben Vögeln bleiben übrig: „LlFf" (2mal) und „llFf" (1mal), im ganzen 3. An strohgelben Vögeln ergibt es: Llff (2mal). Dies sind auch die einzigen, da die Kombination „llff" nicht möglich ist. Es müssen daher sich die hochgelben Vögel zu den strohgelben Vögeln verhalten wie 3 : 2, wie es Galloway gefunden hat. Das Wesen des L-Faktors ergibt sich später.

(Fortsetzung folgt.)

Von meinem Baumpieper.

Vortrag, gehalten im Verein für Vogelschutz und -pflege zu Dresden.

Von Bernhard Kühn.

(Nachdruck verboten.)

Der Baumpieper, im Volksmund Spitzlerche genannt, ist keine alltägliche Erscheinung in den Käfigen der Vogelliebhaber. Aus diesem Grunde will ich einiges über das Käfigleben des Piepers berichten. Was mir den Vogel besonders lieb und wert machte, war seine Zahmheit und Zutraulichkeit, die er aber nur zeigte, wenn man in der alltäglichen Erscheinung ihm gegenüber trat. Gegen alles Fremde war er scheu und ängstlich. Der beste Käfig für diesen Vögel ist der Stelzenkäfig mit zwei dicken Sitzstangen, dessen Standort, wenn irgend möglich, ein den Sonnenstrahlen zugänglicher Platz im Zimmer sein sollte. Er liebt die Sonne mehr als viele andere Vögel. Wenn im Juli die Sonne am höchsten stand und die Strahlen nicht mehr seinen Käfig erreichten, so galt bei seinem täglichen Zimmerflug der erste Besuch dem sonnebeschienenen Fensterbrett. Hier sah man ihn in den wunderlichsten Stellungen. Bald breitete er diesen Flügel, bald jenen, sperrte den Schnabel auf und ließ eigenartige Töne erschallen. Wenn das Schwinden des Tages zur Nachtruhe mahnte, paddelte dieses Tierchen in der reichlich mit Sand gefüllten Schublade eine nestartige Mulde, um darin zu übernachten. Auch nahm er gern ein Bad, an das ich ihn gewöhnte, indem ich etwas Mohn und Hirse aufs Wasser streute. Um die Samen zu erreichen, ging er ins Wassergefäß. Mohn und Hirse ist seine Lieblingsnahrung, daneben wird Weichfutter gereicht, das er zeitweilig nicht gern fressen will. Reine Körnerfütterung ist jedoch nicht ratsam, da der Vogel dabei zu fett wird. Er fraß auch Hanf und mit Vorliebe Mehlwürmer. Rübsen wurde dagegen nie angenommen. Dagegen fraß er sehr gern den Samen vom Timothygras, welcher sich im Sommer leicht sammeln läßt.

Was den Gesang anbetrifft, so ist das Liedchen der Spitzlerche unstreitig der schönste von allen Piepergesängen. Im ersten Jahre seiner Käfigung währte der Gesang von Ende April bis Mitte August und war trotz Fütterung frischer Ameisenpuppen nicht gerade fleißig zu nennen. Im August erfolgte dann regelmäßig die Mauser des Groß- und Kleingefieders. Das Herbstkleid war stets düsterer als das durch die Kleingefiedermauser Mitte Januar bis Mitte März erzeugte Sommerkleid, in welchem vor allem die Kehle und gehämmerte Brust schön goldgelb hervortrat*). Im zweiten Jahr begann der Vogel vier Wochen früher mit der Wintermauser und auch mit dem Gesang, und im dritten Jahr begann die Kleingefiedermauser schon am 2. Januar, und am 3. März habe ich die ersten Gesangsstrophen vernommen. Er fing somit im dritten Frühjahr acht Wochen früher an zu mausern und auch zu singen.

Der Schluß der Gesangszeit war regelmäßig Mitte August, sobald die Herbstmauser begonnen hatte. Von September bis Mitte Februar hörte man nichts von seinen Strophen.

Während dieser Zeit schenkte dann der Vogel seine ganze Aufmerksamkeit dem Futternapf. Außer seiner Lieblingsnahrung Mohn und Hirse sprach er auch in dieser Periode dem Mischfutter tüchtig zu. Und es dauerte nicht lange, so hatte er das doppelte Körpergewicht, 40—45 g, während das Normalgewicht 23 g beträgt, aufzuweisen.

In den ersten beiden Jahren fütterte ich den Vogel gegen Weihnachten hin nur mit trockenen Ameisenpuppen und erreichte auch bei ungefähr vierwöchiger Fütterung damit sein Normalgewicht. Im letzten Jahre kam er mir zuvor, er unterzog sich einer freiwilligen Hungerkur, wie das vielfach Grasmücken tun, fraß eine Woche so gut wie nichts, wurde schlank und ging kurz darauf in die Mauser. Es bestätigt sich immer wieder, daß in vielen Fällen die Natur sich eben selber hilft.

Wie so mancher unserer lieben gefiederten Haus-

*) Pfleger von Piepern werden ersucht, darauf zu achten, ob diese Vögel stets eine Wintermauser des Kleingefieders durchmachen, also ob sie Federn abwerfen und dafür neue Federn erscheinen. R.

freunde, wurde zu meinem Bedauern auch dieser Vogel mit der Zeit fußkrank. Im ersten Winter habe ich nichts bemerkt, jedoch im zweiten Winter fing das Übel an, ich habe damals alle bekannten Heilmittel versucht. Ich habe die Füße wochenlang täglich in lauwarmem Wasser gebadet, nur trockene Ameisenpuppen, Mohn und Hirse gefüttert, bald wurde diese Zehe dick, bald jene. Erst bei Eintritt des Frühjahrs heilten die Füße völlig aus. Aber im dritten Herbst resp. Winter trat das Leiden bedeutend schlimmer auf, er verlor in dieser Zeit von zwei Zehen das vorderste Glied mit der Kralle. Wenn an der einen Zehe die Kralle abgefallen war, ging die Geschwulst zurück, und in einiger Zeit begann dasselbe Leiden an dem andern Fuße. Ich war froh, als das Frühjahr kam, der Vogel anfing zu singen und ich hoffen konnte, ihn bald in Freiheit setzen zu können.

An einem schönen Sonntagmorgen in den ersten Tagen des Mai habe ich ihn in unserer Heide in Freiheit gesetzt. Er besaß das volle Flugvermögen, und trotz des Verlustes der beiden Zehenglieder war nichts Auffallendes an seinem Gang zu bemerken. Er war körperlich normal und tadellos im Gefieder. Auch sein Wandertrieb hatte während der drei Winter keine Einbuße erlitten. Er tobte im dritten Jahre während der Zugzeit noch genau so wie im ersten Jahr, ohne daß dabei sein sauberes Gefieder gelitten hätte.

Und nun nochmal zurück zu dem Fußleiden. In Liebhaberkreisen und Literatur wird angegeben als Grund ungeeignete, zu hitzige Fütterung, vor allem zu viel Mehlwürmer, zu früh erwachte Brunst, ungeeignete Sitzstangen usw. Meinen Baumpieper habe ich gefüttert, außer mit frischen Ameisenpuppen im Sommer, im dritten Winter ausschließlich mit Mohn, Hirse und trockenen Ameisenpuppen. Mischfutter fraß er selten und Mehlwürmer hat er nicht zu sehen bekommen. Ein natürlicheres Futter kann man wohl nicht reichen. Er hatte einen Käfig von 70 cm Länge, ging wenig auf Sitzstangen, bewegte sich vorwiegend im Sand, schlief auch im Sand, ging tagtäglich baden selbst mit noch kranken Füßen und hatte alle Tage seinen freien Zimmerflug, mauserte regelmäßig und ließ zur vorgeschriebenen Zeit laut und fleißig seinen Gesang erschallen, und trotz alledem im Winter kranke Füße.

Ich war ratlos. Anfang März begann im dritten Winter der Gesang, wiewohl er den einen Fuß noch schonte, wurde jedoch von Tag zu Tag temperamentvoller und lauter, die Geschwulst am Fuß ging allmählich zurück bei derselben Fütterung. Und so hat er mich noch acht Wochen erfreut, bis ich ihm die Freiheit schenkte aus Bangen vor den kranken Füßen im kommenden vierten Winter.

Nachdem ich so manche trübe Erfahrung betreffs Fußkrankheiten gemacht habe, vor allem mit Vögeln, welche der Gattung Rotschwanz angehören, bin ich heute der Meinung, neigt ein Vogel im Winter zu kranken Füßen, und tritt im Frühjahr keine Wendung ein, dann bleibt nichts übrig, als ihn in Freiheit zu setzen, wenn es sonst der Zustand des Vogels erlaubt. Die Natur wird sich immer am ehesten helfen. Von dieser Überzeugung ausgehend, beschloß auch ich, meinen Baumpieper auszusetzen, nachdem ich drei Jahre dieses äußerst zahme und zutrauliche Tierchen gepflegt hatte.

Cinamon-Norwich (s. S. 20).

Neueinführungen und Seltenheiten.

Von Karl Neunzig.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Einen hübschen Blauhäher, etwa von Drosselgröße, brachte August Fockelmann, Hamburg-Großborstel, im Jahre 1923 auf den Markt. Er gehört zu jener Gattung der Blauhäher, welche sich von den andern Blauhähergattungen dadurch unterscheidet, daß der Kopf keine Haube trägt. Sie führt deshalb den Namen Aphelocoma (= mit schlichtem Haupthaar). Im Berliner Zoologischen Garten befand sich schon vor mehreren Jahren ein Angehöriger dieser Gattung, der Weißbauchblauhäher — A. sordida *(Sw.)*, der sich von der jetzt eingeführten Art, dem

Blauohrenblauhäher — Aphelocoma cyanotis *Ridgw.*

auch durch bedeutendere Größe unterscheidet. Man kennt etwa 9 Arten und einige Nebenarten dieser Gattung, welche die westlichen Staaten der Union,

Mexiko und das Hochland von Guatemala bewohnen, eine Art lebt in Florida. Es sind Baumvögel, deren napfförmiges Nest auf Büschen, kleinen Bäumen oder in Rankengewächsen steht und aus trockenen Zweigen, Halmen und ähnlichem Genist gebaut ist, während für die innere Mulde feines Material verwendet wird. Das Gelege besteht aus 3—6 grünlichen oder bläulichen, braun gesprenkelten Eiern, die Eier einer Art sind einfarbig grünlichblau. Der Blauohrenblauhäher ist in seinem Verbreitungsgebiet, dem Hochland von Mexiko, besonders in den Fichtenwäldern der Täler gemein, wird aber auch häufig in bedeutenden Höhen bis 11000 Fuß gefunden. In kleinen Flügen lebt er in den Bergen besonders auf Eichen, sofern sie in höheren Gebirgslagen noch fortkommen. Die Flüge werden aber auch häufig auf dem Erdboden beobachtet, wo sie heruntergefallenen Samen suchen, um ihn zu verzehren. Seine Stimme gleicht der der verwandten Arten und ist ziemlich weich.

Die Gefiederfärbung des blauwangigen Blauhähers ist folgende: Oberkopf, Hinterhals, Halsseiten dunkelazurblau, ebenso Oberschwanzdecken, Schwingen und Schwanz, am leuchtendsten auf dem Scheitel, der seitlich von einem meist verborgenen weißen Augenbrauenstreif begrenzt ist; Kopfseiten dunkler blau, Zügel, Augen- und Ohrgegend schwärzlich; Rücken und Schulterfedern satt mausgrau, z. T. blau verwaschen, zuweilen auch ganz blau, Bürzel mehr blaugrau; Vorderhals, Oberbrust weißlich, durch blaugraue Federränder besonders an der Oberbrust gestreift erscheinend; Hinterbrust, Seiten hell mausgrau, nach Bauchmitte hin heller, nach hinten und Unterschwanzdecken weiß; Schnabel, Füße schwarz, Auge braun; die Geschlechter sind gleichgefärbt. Lg. 287, Fl. 140, Schw. 143, Schn. 27, Lf. 40,5 mm.

Verbreitung: Mexikanische Hochebene, nördlich bis zum südwestlichen Texas

(Fortsetzung folgt.)

Zucht der Feldlerche in Gartenvoliere und anderes.

Von Georg Rose, Pyritz.

(Nachdruck verboten.)

Meinem Versprechen in Heft 14 vom 19. Juli 1923, betreffs Brütung meines Feldlerchenpärchens, nachkommend, werde ich mich bemühen, möglichst ausführlich hierüber zu berichten. Ein Weibchen erhielt ich im Juni 1921 auf einer Radtour von einem Bauernburschen. Es war wohl kaum 14 Tage alt. Zu Hause angekommen, schnappte es bald nach den auf einem Hölzchen vorgehaltenen frischen Ameisenpuppen. Da nun auch einige hierbei herunterfielen, nahm es auch bald diese auf und war somit noch am selbigen Tage selbständig. Nach einigen Tagen hielt es seinen Einzug in die Gartenvoliere, welche es bis jetzt, auch den Winter über, nicht verlassen hat. (Die Voliere ist vom Oktober bis Februar oder März, je nach Witterung, durch Glasfenster vollständig gegen Wind und Wetter geschützt.) Da es nun nicht die geringsten Gesangsübungen anstellte, wußte ich bald, daß es ein Weibchen war. Im Frühjahr 1922 beschäftigte es sich viel mit Nestbau. Sonderbarerweise hatte es sich in der Voliere den höchsthängenden Nistkasten (Blumentopf aus Kork) ausgesucht. Ob es zur Eiablage gekommen ist, weiß ich nicht. Mittlerweile war es Hochsommer geworden, und ein Freund brachte mir wieder eine ungefähr 14 Tage alte Feldlerche. Auch diese fraß am selben Tage noch allein. Nach einigen Tagen hielt auch diese ihren Einzug in die Voliere. Diese gab sich nun bald Gesangsstudien hin, war also ein Männchen. Inzwischen war der Winter vergangen. Vom Februar ab hatte es täglich Gelegenheit, seine zurückkehrenden Artgenossen im Gesang zu hören, so daß es im Naturgesang recht Befriedigendes leistete. Nachdem es nun März geworden, hielt auch mein Schwarzplättchen, seit 1917 in meinem Besitz, und einige andere, wie gelbe Bachstelze, auch diese besitze ich seit Frühjahr 1917, sowie Nachtigall, Rotkehlchen, Müllerchen, Baum- und Wiesenpieper ihren Einzug in die Gartenvoliere. Den Überschlag meines Schwarzplättchens brachte die Feldlerche schon am dritten Tage ebenso schön wie das Schwarzplättchen selbst, ebenso den Schlag des Buchfinken und vieles andere. Wer von den Liebhabern einen Spötter haben will, welcher ihm betreffs Mauser und Fütterung keine großen Schwierigkeiten macht, versuche es nur mit einer Feldlerche, es wird ihm nicht leid sein. Inzwischen war es Juni geworden. Männchen macht Weibchen fleißig den Hof. Einseitiges Flügelzittern. Weibchen trägt wieder in den Blumentopf zu Neste. Jetzt wird ihr dieses aber vom Grünfinkenpärchen streitig gemacht. Nun baut sie hinter einem etwas von der Wand abstehenden größeren Feldstein. Nachdem sie sich eine kleine Vertiefung gescharrt, wird diese mit kurzen Halmen und einigen Federn ausgelegt. Männchen beteiligt sich nicht am Nestbau, zeigt sich aber jetzt gegen sämtliche Volierenins assen sehr angriffslustig. Am Freitag, dem 15. Juni, lag das erste Ei im Neste. Vom dritten Ei ab brütet Weibchen fest. Männchen beteiligt sich nicht am Brutgeschäft. Weibchen verläßt am Tage häufiger das Nest, um dann auch jedesmal ein tüchtiges Sandbad zu nehmen. Nachdem Weibchen fest brütet, stellt Männchen den Gesang vollständig ein. Gegen die anderen Volierenbewohner ist es nicht mehr so bösartig. Donnerstag, den 28. Juni, morgens 6 Uhr, sind bereits drei Junge geschlüpft. Gelege bestand aus vier Eiern. Viertes Junge schlüpfte Freitag, den 29. Juni. Brutzeit hat also nur 11 Tage gedauert. Nehme nun hiernach bestimmt an, daß die Feldlerche im Freien auch nur 11 Tage brütet. Weibchen füttert vom ersten Tage an fleißig mit frischen Ameisenpuppen. Vom zweiten Tage hilft hierbei auch das Männchen. Die Jungen entwickeln sich zusehends. Noch nicht acht Tage alt, krabbeln sie aus dem Neste. Da nun die Witterung direkt kalt ist, verklamt eines nach dem andern. Das Letzte ist dann noch im Wasserbassin ertrunken. Am 9. Juli legt Weibchen abermals, und zwar an derselben Stelle. Da Männchen nicht mehr im Gesang, hatte ich auf eine Befruchtung der Eier nicht mehr gerechnet, und diese waren dann auch tatsächlich unbefruchtet. Gelege bestand diesmal aus drei Eiern. 2. August. Nachtigallpärchen füttert auf dem Friedhof noch Junge. Gelbspötter hat sogar noch Nestjunge, ungefähr 10 Tage alt. Ebenso findet am 8. August mein Freund beim Roggenmähen noch das Nest mit drei Sumpfrohrsängern (ungefähr 14—15 Tage alt). Segler konnte man noch am 16. August beobachten. Frische Ameisenpuppen, welche sonst in diesem Monat im Haufen nicht mehr viel zu finden waren, waren jetzt noch ebenso zahlreich wie sonst im Juni.

Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Jahrg. 53 | Den 21. Februar 1924 | Heft 4

(Druckort: Burg, Bezirk Magdeburg.)

Weißbauchpapagei — Caica leucogaster *(Kuhl)*.

Von Fritz Pölz.

(Nachdruck verboten.)

Im Juli vorigen Jahres ist bei Herrn August Fockelmann in Großborstel einer jener Massenimporte an Vögeln und sonstigen Tieren eingetroffen, der überaus reich an Arten war. Von all den angekommenen Tieren erregten vier der so überaus seltenen Weißbauchpapageien mein Interesse, und kurz entschlossen erwarb ich zwei dieser Exemplare.

Anscheinend hat Herr Fockelmann sein Haus in Bahia auf den Weißbauchpapagei ganz besonders aufmerksam gemacht, denn schon im November vorigen Jahres wurde von dort gedrahtet, daß eine beträchtliche Anzahl dieser Papageien von Para zum Versandt kommen würde, die dann auch Anfang Januar in Europa eintraf. Wie gewöhnlich wurde der größte Teil des Transportes bereits von Rotterdam aus nach England verkauft, und um auch einigen deutschen Liebhabern den Weißbauchpapagei zugänglich zu machen, brachte Herr Fockelmann trotz der großen Kälte, die hier seiner Zeit herrschte, neben anderen Tieren acht Stück dieser Art mit nach Hamburg. In dem geräumigen Vogelhause dieser Importfirma wurden die Papageien zu je zwei Stück in einen Käfig gesetzt. Die Käfige standen nebeneinander, und zu possierlich sah es aus, wie die Vögel mit ihren klugen Augen alles, was in ihrer Nähe geschah, betrachteten und beim Herantreten an ihre Käfige keine Scheu zeigten.

Auch von einer Scheu meiner beiden Vögel konnte ich nie reden. Während der ersten Zeit, wo die Tiere in meinem Besitz waren, und ich an ihren Käfig herantrat, zogen sie sich ganz behutsam in eine Ecke des Käfigs zurück und gingen wieder an ihren alten Platz, als die Gefahr behoben war. Nachdem ich die Weißbäuche drei Monate in meinem Besitz hatte, war von einer Ängstlichkeit nicht mehr zu reden, und heute sind die Tiere bereits so weit, daß sie die ihnen gereichten Apfelstücke aus der Hand nehmen.

Sie entwickeln einen ganz ausgezeichneten Appetit und fressen drei gewöhnliche Papageiennäpfe vollkommen leer. Eine Verschwendung von Futter ist mir bei diesen Vögeln bislang nicht vorgekommen; es wird jedes Korn vollkommen enthülst. Sonnenblumenkerne, Erdnüsse und Mais bilden ihre Hauptnahrung, und wird Mais, wenn gut aufgeweicht, bevorzugt. Hanfsaat wird ab und zu von ihnen gefressen, während Hafer ganz verschmäht wird. Die ihnen täglich gereichten Apfelscheiben, Feigen oder sonstigen Früchte nehmen sie willig aus der Hand und knabbern sehr gerne an einem Stückchen Zuckerrohr.

Innige Liebe herrscht zwischen beiden Tieren, und nie ist es mir zu Gesicht gekommen, daß die Vögel sich gegenseitig gebissen haben. Aus ihrem Benehmen ist zu schließen, daß es sich um ein Pärchen handelt. Durch Farbenunterschiede lassen sich die Geschlechter nicht feststellen, denn nach den ornithologischen Werken sind Männchen und Weibchen gleich gefärbt. So zärtlich diese Art unter sich ist, so unverträglich ist sie mit andern Vögeln, und ich möchte diesbezüglich folgendes berichten:

Wegen Platzmangel war es mir nicht möglich, die Neuankömmlinge allein in einen Käfig zu setzen, und ihrem gutmütigen Aussehen zufolge sah ich darin keinen Argwohn und setzte sie zu den Petz- und Goldstirnsittichen. Schnell wurde ich eines Besseren belehrt, denn schon am Mittag desselben Tages mußte ich sehen, wie sie die Petzsittiche im Genick packten und zu Boden warfen. Die beiden Petzsittiche waren auf der Stelle tot, und um nicht auch noch den Verlust der Goldstirnsittiche beklagen zu müssen, nahm ich kurz entschlossen die beiden Weißbäuche aus diesem Käfig heraus und setzte sie zu meinen Bartsittichen. Diese Vögel sind gutmütig und greifen keinen andern an, es sei denn, daß sie von andern Vögeln bedrängt werden. In diesem Falle zeigen sie sich von einer anderen Seite und fanden bis jetzt keinen, der sie besiegte. Als meine Weißbäuche eine gute Stunde im Käfig waren, wurden ihnen die beiden Sittiche anscheinend unangenehm, und langsam näherte sich der eine „Leucogaster" dem Bartsittichweibchen. Dieses ahnte die Gefahr noch nicht, die es bedrohte, als der Weißbauch auch schon von seinem Schnabel Gebrauch machte und den Sittich zu Boden warf. Glücklicherweise schadete diesem der Angriff nichts, und im Verlaufe einer weiteren Stunde waren die Weißbäuche ständig hinter den Sittichen her, welche jedoch mit einem kurzen Schrei immer wieder an eine gefahrfreie Stelle flüchteten.

Es ist daher nicht ratsam, die Weißbauchpapageien mit andern Vögeln zusammenzuhalten, denn

wie vorstehend erwähnt, sind meine beiden andern Vögeln gegenüber sehr bösartig, und es dürfte doch anzunehmen sein, daß auch alle andern von diesem Laster, dem einzigen, welches sie haben, befallen sind.

Die Heimat der Caica leucogaster ist das nördliche Brasilien, und die Tiere leben laut mir zur Kenntnis gekommenen Nachrichten in Waldungen, wo man sie sehr wenig zu Gesicht bekommt.

Der Weißbauchpapagei bildet zusammen mit drei weiteren Arten, die bisher bekannt geworden sind, die Gattung Caica, *Bp.* (auch Pionites, *Heine*), welche zu der Unterfamilie Psittacinae (Stumpfschwanzpapageien) gehört.

Die Färbung der in meinem Besitz befindlichen Tiere ist wie folgt: Rücken, Flügel, Schwanz und Schenkel metallschillernd grün; Oberkopf und Nacken gelbbraun; Zügel, Kehle, Steiß und Unterschwanz gelb; Brust und Bauch grauweiß; Schnabel weißlich; Füße gelbbraun. Nach den ornithologischen Werken ist der Schwanz halb so lang wie die Flügel, was ich an meinen Tieren jedoch nicht beurteilen kann, da ihnen, wie es bei Importtieren leider üblich ist, die Flügel beschnitten worden sind, und dürften die Tiere erst mit Ablauf dieses Jahres in ihrer vollen Pracht erscheinen.

Ich hoffe, daß meine Ausführungen dazu beitragen werden, die Papageienliebhaber auf diesen Vogel ganz besonders aufmerksam zu machen; denn kurz zusammengefaßt: sein ruhiges Wesen, die Zärtlichkeit der Tiere untereinander, die lebhafte Färbung und zuletzt die wohlklingenden Töne, welche nur von dem einen Vogel hervorgebracht werden, und der nach meiner Beurteilung das Männchen sein müßte, sollten ihn zu einem sehr begehrenswerten Vogel machen. Es ist nur zu wünschen, daß es Herrn Fockelmann gelingen wird, diesen Vogel öfters lebend nach Deutschland zu bringen, und somit den deutschen Liebhabern auch Gelegenheit gegeben ist, sich diesen seltenen Vogel anzuschaffen.

Hamburg, im Januar 1924.

Exakte Vererbungsversuche bei Kanarienvögeln.

Von Dr. H. Duncker, Bremen.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

5. Wir haben hiermit eine Übersicht über die bisher bekannt gewordenen Farbenfaktoren gegeben. Nur bezüglich eines kleinen Teiles sind bislang exakte Versuche angegeben worden (Weißfaktor, F-, bzw. L-Faktor), und auch dies haben nur zum Teil befriedigende Resultate erzielt. Es liegt dies daran, daß anscheinend eine große Zahl dieser Faktoren, soweit sie die ursprüngliche Wildfärbung des Kanarienvogels abändern, im homozygoten Zustande tödlich wirken, woraus sich erklärt, daß der Züchter nicht geneigt ist, gleichartig gefärbte Vögel miteinander zu paaren (mit Ausnahme der grünen Vögel, da sie ja der Färbung der Wildlinge gleichen, also solche Domestikationsfaktoren nicht enthalten). Noordujin rät, auf jahrelange Zuchterfahrung gestützt, direkt von einem solchen Verfahren ab. Herr Reich und ich können in diesem Punkte auf Grund unserer Zuchtversuche, die in diesem Jahre gerade darauf ausgingen, für unsere weiteren Vererbungsversuche möglichst homozygotes Material zu bekommen, die Erfahrungen Noordujins nur bestätigen. Die Verluste an Jungvögeln häuften sich in den Gelegen, bei denen Vater und Mutter die gleiche Zeichnung aufwiesen. Da man aber für eine genaue Feststellung der Vererbungszahlen zunächst einmal gleichartiges und in seinen Erbformeln völlig bekanntes Material in Händen haben muß, was nur dadurch zu erreichen ist, daß man Gleiches mit Gleichem paart, so erklärt dieser Umstand ausreichend die Tatsache, daß wir über die Vererbung der Färbungsfaktoren des Kanarienvogels noch so wenig unterrichtet sind.

In einer Spezialfrage haben wir allerdings seit den exakten Arbeiten von Miß Durham eine Aufklärung erhalten. Es handelt sich dies um das Isabellenproblem. Wie bereits oben ausgeführt worden ist, entstehen die Isabellen dadurch, daß das schwarze Melanin fehlt und nur das braune Melanin vorhanden ist. Dies macht sich an den Augen der eben ausgeschlüpften Jungen am besten bemerkbar, indem diese rotbraun aussehen. Später verwischt sich dieser Unterschied infolge der Verdichtung des braunen Melanins auf dem Augenhintergrund. Eine mikroskopische Untersuchung beweist aber sehr leicht die Richtigkeit dieser Auffassung. Wir können daher alle Isabellen als rotäugig bezeichnen, alle Vögel, welche mit dem Schwarzfaktor, wenn auch nur heterozygot, versehen sind, als schwarzäugig. Nun ist es in Züchterkreisen bekannt, daß ein rotäugiges Weibchen mit einem schwarzäugigen Hahn gepaart nur schwarzäugige Junge erzeugt, daß dagegen ein schwarzäugiges Weibchen mit einem rotäugigen Hahn gepaart, nur schwarzäugige Männchen, aber Weibchen von beiderlei Art ergibt. Es ist offensichtlich, daß diese eigentümliche Vererbung geschlechtsbedingt ist. Ihre Erklärung kennen wir seit 1908. Sie ist geliefert durch Miß Durham und Miß Marryat in Anlehnung an ähnliche Ergebnisse, welche durch Loncaster bei den Stachelbeerspannern gefunden worden sind. Um diese eigentümliche Vererbungsweise verstehen zu können, muß erwähnt werden, daß die Erbfaktoren in den Kernen der Eizelle in gewissen stärker sich färbenden Körnchen, den Chromosomen, gelagert sind. Die Zahl der Chromosomen beim Kanarienvogel ist noch nicht bekannt. Groß ist sie jedenfalls nicht. Für diejenigen Tierformen, für welche bereits Zählungen der Chromosomen stattgefunden hat, haben sich meist Zahlen, wie 2, 4, 6, 8, und so weiter bis 48 und wenig darüber hinaus ergeben. Immer sind es jedenfalls gerade Zahlen, was ja selbstverständlich ist, wenn man bedenkt, daß ja bei der Befruchtung von den beiden Elterntieren die gleiche Anzahl von Chromosomen als Erbfaktorenträger durch die Geschlechtszellen in das befruchtete Ei eingeführt werden müssen, die sich dann später bei der Geschlechtszellenbildung wieder aufspalten. Nun hat sich aber herausgestellt, daß auch die Geschlechtsmerkmale der Tiere, ob männlich oder weiblich, zum großen Teil durch Erbfaktoren bedingt werden, die ebenfalls in einem dieser Chromosome gelagert sind. Dieses Chromosom wird als das „Geschlechtschromosom" bezeichnet. Während aber alle sonstigen Chromosome bei reinen, homozygoten Rassen paarweise gleich ge-

baut sind, so ist dies bei dem Geschlechtschromosom nicht der Fall. Nur in dem einen Geschlecht wenigstens nicht. Bei den Vögeln sind z. B. die Geschlechtschromosome nur in dem männlichen Geschlecht homozygot, im weiblichen Geschlecht dagegen heterozygot. Paare ich daher ein Männchen mit einem Weibchen, so nehme ich gleichsam eine Rückkreuzung vor in dem Sinne, daß ich einen Bastard mit einem homozygot-rezessiven Elter paare. In der modernen Vererbungslehre ist es üblich geworden, die Geschlechtschromosome des homozygoten Gatten mit X zu bezeichnen. Die Erbformel desselben wäre also „XX". Bei den Vögeln wie bei den Schmetterlingen wäre dies das Männchen, bei vielen andern Insekten ist dies das Weibchen. Die Geschlechtschromosome des heterozygoten Ehegatten werden mit X und Y bezeichnet. Die Erbformel der Vogelweibchen wäre demnach „XY". Nur diese bilden also zweierlei Geschlechtszellen aus, nämlich X-Eier und Y-Eier. Bei der Befruchtung muß nun in der Hälfte der Fälle X mit X zusammentreffen, in der Hälfte der Fälle X mit Y. Es muß daher 50 % Männchen und 50 % Weibchen ergeben, was ja der allgemeinen Erfahrung auch entspricht.

Nun hat es sich herausgestellt, daß gewisse körperliche Erbfaktoren in diesen Geschlechtschromosomen liegen. Diese Erbfaktoren müssen natürlich sich ebenso wie das „Geschlecht" vererben. Sie sind geschlechtsgebunden. So enthält das X-Chromosom bei den Kanarienvögeln auch den „Schwarzfaktor S", das Y-Chromosom dagegen nicht. Da nun das Vorhandensein des Schwarzfaktors natürlich über sein Fehlen dominiert, so sind alle Vögel mit schwarzen Augen versehen, wenigstens in den Rassen, in welchen der Schwarzfaktor überhaupt vorhanden ist. Bei den Isabellen ist dieser Schwarzfaktor nicht vorhanden, das X-Chromosom enthält ihn demnach nicht. Das Y-Chromosom ist stets ohne Schwarzfaktor zu denken. Bezeichnen wir wieder den Schwarzfaktor mit S, sein Fehlen mit s, so hat ein schwarzäugiges Männchen die Erbformel: (XS) (XS), wobei die Klammern jedesmal die in einem Chromosom gekoppelten Erbfaktoren andeuten, das schwarzäugige Weibchen die Erbformel (XS) (Ys). Das rotäugige oder Isabellenmännchen die Erbformel: (Xs) (Xs) und das rotäugige Weibchen die Erbformel: (Xs) (Ys).

a) Paare ich nun ein schwarzäugiges Männchen mit einem rotäugigen Weibchen, so bildet das schwarzäugige Männchen nur einerlei Geschlechtschromosome aus, welche die beiden Faktoren „XS" enthalten. Die rotäugigen Weibchen dagegen bilden zweierlei Arten Geschlechtszellen, nämlich einmal Xs und ferner Ys. Bei der Befruchtung müssen daher zweierlei Formen auftreten.

1. Solche mit der Erbformel: (XS) (Xs) und 2. solche mit der Erbformel: (XS) (Ys). Beide Formen sind schwarzäugig, da natürlich die Anwesenheit des Schwarzfaktors über seine Abwesenheit dominiert. Die ersteren aber sind Männchen, da sie X zweimal enthalten, die letzteren Weibchen, da sie neben X auch Y enthalten.

b) Setze ich nun meine Paarungen fort und paare ein solches schwarzäugiges Weibchen mit einem soeben erlangten schwarzäugigen Hahn, so bilden beide Formen zweierlei Arten von Geschlechtszellen, nämlich das schwarzäugige Weibchen solche mit der Erbformel: (YS) und solche mit der Erbformel: (Ys), der schwarzäugige Hahn dagegen

Weißbauchpapagei (s. S. 25).

Geschlechtszellen mit der Erbformel: (XS) und solche mit der Erbformel (Xs). Jetzt müssen vielerlei Typen entstehen, nämlich:

1. (XS)(Ys), es sind schwarzäugige Weibchen.
2. (Xs) (Ys), es sind rotäugige Weibchen.
3. (XS) (XS), es sind schwarzäugige Hähne, welche den Schwarzfaktor homozygot enthalten.
4. (XS) Ys), es sind dies ebenfalls schwarzäugige Hähne, die aber den Schwarzfaktor heterozygot enthalten.

c) Paare ich nun eine soeben erhaltene rotäugige Henne wiederum mit einem schwarzäugigen Hahn mit heterozygotem Schwarzfaktor, so bilden wiederum beide zweierlei Arten von Geschlechtszellen, nämlich das Weibchen einmal solche mit (Xs), das andere Mal solche mit (Ys). Der schwarzäugige Hahn dagegen bildet die Geschlechtszellen: (XS) und (Ys). Es müssen wiederum

vier verschiedene Typen in der Nachkommenschaft auftreten von folgenden Erbformeln:

1. (XS) (Ys) (schwarzäugige Weibchen).
2. (Xs) (Ys) (rotäugige Weibchen).
3. (XS) (Xs) (schwarzäugige Männchen).
4. (Xs) (Xs) (rotäugige Männchen).

Nunmehr sind also auch männliche Isabellen mit roten Augen zu verzeichnen.

d) Paare ich nunmehr solche Männchen wiederum mit einem schwarzäugigen Weibchen, so bildet letzteres wiederum zweierlei Art Geschlechtszellen, nämlich: (XS) (Ys), das rotäugige Männchen dagegen bildet nur einerlei Geschlechtszellen, nämlich: (Xs). Es können daher nur zweierlei Arten von Formen entstehen, die einen mit der Erbformel: (Xs) (Ys) (rotäugige Weibchen), die andern mit der Erbformel: (XS) (Xs) (schwarzäugiges Männchen).

Damit der Leser die Richtigkeit des eben Ausgeführten selbst nachprüfen kann, und zugleich, um ihm Gelegenheit zu geben, sich in der Methode des Nachdenkens über die Spaltungen und Wiederneukombinierungen zu üben, was für jeden Züchter, der sich das moderne Verfahren zu eigen machen will, unerläßlich ist, setze ich die Ergebnisse der Miß Durhamschen Versuche hierher.

Paarungsarten	Nachkommenschaft			
	Weibchen (XY)		Männchen (XX)	
	Augen		Augen	
	schwarz (XS) (Ys)	rotbraun (Xs) (Ys)	schwarz (XS) (Xs) oder (XS) (Xs)	rotbraun (Xs) (Xs)
1. (XS) (Ys) # (XS) (XS)	7	—	19	—
2. (XS) (Ys) # (XS) (Xs)	19	15	26	—
3. (Xs) (Ys) # (XS) (Xs)	24	21	5	19
4. (XS) (Ys) # (Xs) (Xs)	(4)	39	34	—

Die Ergebnisse des Versuches stimmen ausgezeichnet mit der theoretischen Erwartung überein, allerdings bis auf einen Punkt. Die in der Tabelle aufgetretenen und von mir eingeklammerten 4 schwarzäugigen Weibchen im 4. Versuch durften nicht auftreten. Sie stammen von 2 Weibchen, deren Abstammung Miß Durham nicht kannte. Ob hier nur ein Versehen bei der Zucht oder sonstige Besonderheiten vorliegen, läßt sich nicht mehr sagen. Jedenfalls können diese Unstimmigkeiten nicht die allgemeine Regel umstoßen, wie sie auch von andern Züchtern von Isabellen, z. B. von Noorduijn, Groningen und Biberach, Aschersleben, bestätigt worden ist. (Fortsetzung folgt.)

Erzgebirgische Vogelliebhaberei u. a.

Von Stöß, Lößnitz.

(Nachdruck verboten.)

Wenn ich von erzgebirgischer Vogelliebhaberei spreche, so denke ich an jene Liebhaber gekäfigter einheimischer Singvögel, wie ich sie im Erzgebirge und im angrenzenden Vogtlande aus eigener Anschauung gründlich kennengelernt habe und zu deren eifrigsten ich mich selbst ohne Scheu seit etwa einem Vierteljahrhundert zähle. Nur wenige einheimische Vögel sind mir bekannt, die in dieser Zeitspanne nicht längeren oder kürzeren Aufenthalt in meinen Käfigen oder Volieren genommen haben, seien es Sperlinge oder Nachtigallen, Rebhühner oder Rabenvögel, um nur einige extreme Vertreter zu nennen. Ohne Scheu, sagte ich, bekenne ich mich offen zu den Liebhabern gekäfigter Vögel. Ja, es gibt Menschen, die nicht nur beim Anblicke eines eingebauerten Vogels, sondern schon beim Wort Vogelliebhaber sofort ihr gutes, mitleidiges Herz entdecken, während sie für die wirklichen Leiden anderer Tiere — ich denke an Zugtiere, insbesondere Hunde, rohen Händen verfallener Schlachttiere und an von nicht weidgerecht ohne guten Hund jagenden Schützen angeschossenes und elend verblutendes Wild — und für die himmelschreiende Not ihrer Mitmenschen entweder gar kein oder weit weniger Verständnis aufbringen können. Der Grund für ihre Gefühlsduselei liegt darin, daß sie in völliger Verkennung des tierischen Wesens demselben menschliche Gefühle unterschieben. „Der arme Gefangene!" Als wenn sich der gekäfigte Vogel zurückerinnern könnte an die „goldene Freiheit", die er, kaum wiedergewonnen, in zahlreichen, auch von mir selbst erlebten Fällen schnellstens freiwillig wieder aufgesucht hat, sobald er den Verlust der „Fleischtöpfe Ägyptenlands" zu spüren bekam. Das sicherste Zeichen, daß sich der Gefangene mit den neuen Verhältnissen abgefunden hat, ist der früher oder später einsetzende Gesang. Wer seinen Pfleglingen nicht die dazu nötigen Lebensbedingungen bieten kann, der wird nicht viel Freude an ihnen erleben und bald die Finger von dieser opfererheischenden Liebhaberei lassen. — Ein anderer Teil dieser Gefühlsmenschen zetert nun über die Käfigung speziell einheimischer Vögel, während sie fremdländische Vögel in vielen mir bekannten Fällen ohne die geringsten Gewissensbisse selbst käfigen. Sie kennen offenbar nicht, wie viele dieser unglücklichen Geschöpfe auf dem Massentransport aus ferner Zone infolge unsachgemäßer und mangelhafter Pflege zugrunde gehen oder als Todeskandidaten in die Hände der Händler und Liebhaber gelangen und hier über kurz oder lang ein klägliches Ende nehmen. Diese Kämpfer für Vogelschutz — von den Kanarienzüchtern, die auch mit Schrift und Wort für den Schutz der einheimischen Sänger eintreten aus dem durchsichtigen Grunde, beim Absatz ihrer Produkte nicht unnötige Konkurrenz zu haben, will ich schweigen — sind mehr Nützlichkeitsfanatiker, indem sie in vollständiger Verkennung der Tatsachen meinen, durch die durch die Vogelliebhaberei bedingte Vogelstellerei werde der Natur und damit nicht zuletzt wohl gar ihrem Geldbeutel Schaden zugefügt. Sie wissen nicht oder wollen es nicht wissen, daß in früheren Zeiten, da die Vogelstellerei auch in unserer Heimat im großen, auf umfangreichen Vogelherden mit mächtigen Zugnetzen und zahlreichen Lockvögeln auch zu Nahrungszwecken betrieben wurde, im Lenze unsere Wälder und Fluren widerhallten vom vieltausendstimmigen Gesange der edelsten unserer einheimischen Sänger, die sich heute der gesangskundige Liebhaber nur ausnahmsweise noch einmal in befriedigenden Exemplaren nach tage-, ja wochenlangem und oft viele Stunden weitem Suchen und Mühen verschaffen kann. Diesen Falschorientierten sei immer wieder gesagt, daß nicht die

Vogelliebhaberei zu Liebhaberzwecken der Ruin unserer Vogelwelt ist — wie könnten sonst die fast nie gekäfigten und überall geschützten Schwalben und — Störche immer weniger werden, während man bei den häufig gefangenen und als Bodenbrüter vielen Gefahren ausgesetzten Lerchen und den vielverfolgten Sperlingen keine Abnahme spürt —, sondern Schuld an der Verminderung vieler Vogelarten die moderne Feld- und Waldwirtschaft trägt. Erhaltet das schützende Raingebüsch! Vernichtet nicht alles Unterholz und jeden hohlen Baum! Sorgt für Anbringung künstlicher Nistgelegenheiten, die mit Rücksicht auf unsere teuere Zeit nicht nur in den wenn auch sehr empfehlenswerten Berlepschschen Nisthöhlen zu bestehen brauchen. Auch die, wenn allerdings falsch ausgeführt, zweifelhaft wirkende Winterfütterung kann dazu dienen, Vögel an eine bestimmte Gegend zu fesseln. Nähere Ausführungen über praktischen, erfolgverheißenden Vogelschutz zu bringen, ist mir an dieser Stelle leider nicht möglich. — Fühle ich sehr wohl, daß es bald Zeit wird, auf das eigentliche vorgesetzte Thema zurückzukommen, so sei mir trotzdem erlaubt, noch ein paar mir wichtig erscheinende Gedanken und Anregungen über den sittlichen Wert der Vogel- wie Tierpflege überhaupt einzufügen. Die sog. Vogelliebhaberei stellt das sicherste Bindeglied zu der besonders dem Großstädter immer fremder werdenden Natur dar. Denken wir dabei an einen kleinen Handwerker oder an einen des weiteren Laufens unfähigen oder gar ans Bett gefesselten Kriegsinvaliden, der den ganzen Tag durch sein vielleicht recht bescheidenes Kellerwohnungsfenster nichts weiter sieht als die kahlen, kalten Mauern des gegenüberliegenden Häuserblocks. Lassen ihn ja seine vier Wände einmal auf Stunden frei, so sucht er in den meisten Fällen sein Elend in nächster Nähe durch allerlei zweifelhafte Genüsse und Vergnügungen zu betäuben. Ganz anders der wirkliche Vogelliebhaber! Er hat dazu keine Zeit. Mit Sehnsucht wartet er auf den Augenblick, wo er sich einmal, der Brotpflicht ledig, so recht von ganzem Herzen seinen gefiederten Freunden widmen kann. Und wer durch Pflege von Tieren von Jugend auf mit deren Wesen und Bedürfnissen vertraut geworden ist, der wird auch nicht achtlos an den Geschöpfen der freien Wildbahn vorübergehen oder gar aus Unbedachtsamkeit oder Gleichgültigkeit zu Tierquälereien fähig sein oder diese und andere Naturschändungen auch nur dulden. Um ein Beispiel zu nennen, sehen wir uns einmal die Führer der Vogelschutzbewegung an: Brehm, Liebe, Ruß, v. Berlepsch, Flöricke, und wie sie alle heißen mögen, waren und sind zum Teil heute noch eingefleischte Liebhaber gekäfigter Vögel. Dieser Betätigung verdanken sie auch ihr erfolgreiches Wirken auf genanntem Gebiete. „Ein Mensch, der mit Liebe und Verständnis Vögel in der Gefangenschaft pflegt, wird in gleicher Weise auch für die Vögel im Freien sorgen." — Nun aber zur Sache! Von erzgebirgischer Vogelliebhaberei wollte ich plaudern. Die lernen wir am besten kennen, wenn wir einen gemeinsamen Gang durch ein solches „Vogelstellerneſt" unternehmen. Schon die ersten Häuser in verführerischer Nähe des Waldes verraten uns, wes Geistes Kinder ihre Bewohner sind. „Gib, gib, gib, gib!" tönt es uns in eintöniger Weise entgegen, obwohl dieser Vogel auch noch über andere, aber seltener vernehmbare, flötenartige, pfeifende und zwitschernde Strophen verfügt. Gib, gib mir die goldene Freiheit wieder! würde vielleicht ein zarter Besaiteter wie wir deuten, obgleich der Kenner unseres Kreuzschnabels — um einen solchen handelt es sich hier — weiß, daß gerade dieser Vogel augenfälligerweise sich sehr leicht in die Gefangenschaft findet und in zahlreichen Fällen, frei geworden, sich in dieselbe wieder zurückgefunden hat. Das Kennerauge erblickt unsern Krummschnabel mit blutrotem oder grüngelbem Federschmucke bald in einem winzigen Drahtbauer herumturnend. Diese „Drahtkappe", wohl gar mit einigen fängerisch gestellten Leimruten geschmückt, hängt an einer Stange, die wenig über einen höheren Strauch oder niedrigen Baum im Hausgärtchen hinausragt.

Zügelastrild.

Die Kreuzschnäbel zigeunern nach beendeter Brut, die sie, dem Reifen der Zapfen und somit dem reinen Erhaltungstrieb folgend, bereits im Christmonate trotz Eis und Schnee begannen, in größeren oder kleineren Flügen durch unsere Nadelholzwälder. Die gar zu geringen Dimensionen seines Drahthäuschens und die oft übliche einseitige Hanffütterung, eines Ölgesämes, das durch seine Fetthaltigkeit zumal bei der geringen Bewegungsfreiheit zu Fettsucht und als deren Folgen zu Krämpfen und Schlaganfällen führt, sind es, was ich an der Käfigung dieses Vogels auszusetzen hätte. Hier wäre ein dankbares Kampfgebiet für verschiedene Tierschützer. Damit aber das „dankbares" nicht falsch verstanden wird, will ich aus eigener, langjähriger Erfahrung heraus gleich von vornherein verraten, daß man, wenn man bei unseren Vogelliebhabern gegen die althergebrachte Käfigungs- und Fütterungsweise vorgeht, zumeist tauben Ohren predigt. Diese handliche Behausung braucht der Gebirgler auch für seinen „Grienitz", um bequemer seinem unausrottbaren Aberglauben frönen zu können. Nach diesem soll unser Kreuzschnabel, der der Sage nach bereits den Heiland vom Kreuze befreien wollte, wobei er sich seinen verbogenen Schnabel und seinen blutbefleckten Brustlatz als Ehrenschilde erworben hat, heilkräftig sein. Die „rechtsgeschlagenen" Kreuzschnäbel sollen die Leiden

männlicher Personen und die „linksgeschlagenen" die weiblicher Kranker an sich ziehen und dann des Opfertodes sterben. Zu diesem Zwecke wird der Vogel mitsamt dem kleinen Käfig unter, hinter oder wohl auch gar in das Bett besonders Reißenkranker oder an Krämpfe leidender Kinder gebracht. Empfohlen wird dazu noch das Einnehmen des kotbeschmutzten Trinkwassers des Vogels. Ob es etwas hilft, weiß ich nicht; aber der Glaube heilt bekanntlich alle Dinge. An den Fenstern der niedrigen Hütte hängen noch mehrere der meist grün gestrichenen „Drahthauben". Der Insasse einer derselben scheint ein besonders höflicher Kerl zu sein, denn er stellt sich uns mit deutlicher Stimme vor als: „Stieglitt! Stieglitt!" In Abwechslung damit bringt der buntfarbige Distelfink, an dem der Sage nach der vergeßliche Herrgott bei der Schöpfung nur noch die Reste in seinen Farbennäpfen abgewischt hat, noch schmetternde, zwitschernde und finkende Strophen. Besonders das dreimalige Finken am Schlusse jeder Strophe, das durchaus nicht sich im Gesangsschatze eines jeden Stieglitzes befindet, macht dem stimmenkundigen Liebhaber seinen Vogel besonders wertvoll. Das Wort im Vogelorchester führt im gelbgrünen Röckchen der lockere Bursche Erlenzeisig mit seinem unermüdlichen „Dideldideltätsch". Wohl weiß sein kundiger Herr auch an seinem Gesange Feinheiten zu würdigen, wie gerade wieder das bereits beim Stieglitz gewürdigte Finken, aber seine allgemeine Beliebtheit auch bei Laien in der Vogelpflege verdankte der Zeisig seiner baldigst an den Tag gelegten Zutraulichkeit, um nicht Frechheit zu sagen. Während dieser Vogel im Freien ziemlich vorsichtig ist, daß wenigstens sein Nest zu finden zu den größten Seltenheiten gehört — die Sage berichtet, daß in demselben ein Stein liege, den es unsichtbar mache —, ist er gekäfigt bald „Hans Dampf in allen Gassen". Er läßt sich ohne besondere Schwierigkeiten sogar als alter Wildfang an freien Aus- und Einflug gewöhnen, was mir persönlich bisher nur noch bei dem schon erwähnten Kreuzschnabel gelungen ist. Was bei Gelegenheit des Kreuzschnabels über die blanke Fütterung mit Hanf, der zudem in halbreifem Zustande ein betäubendes Gift enthält, gesagt worden ist, gilt auch für die letztgenannten beiden Vogelarten, nur noch in erhöhtem Maße. Ohne an dieser Stelle auf die Fütterungsweise erschöpfend eingehen zu können, sei nur betont, daß sich dieselbe bemühen muß, der Natur möglichst nahezukommen. Neben den verschiedensten Sämereien gehört zum dauernden Wohlbefinden des körnerfressenden Stubengenossen regelmäßig allerlei Grünkraut, scharfer Sand und reines Wasser. — Aus dem Konzert der gekäfigten Musikanten heraus vernehmen wir besonders wohltuend das „Wickeln" des Bluthänflings, das wohl einen Vergleich mit dem Rollen eines Kanarienvogels aushält. Da der Hänfling auch sonst nur flötende Strophen bringt, die sich vorteilhaft von den oft spitzen und scharfen Lautäußerungen seiner Verwandten Stieglitz und Zeisig abheben, ist er wohl allgemein bei den Liebhabern als der beste Sänger unter den einheimischen Körnerfressern anerkannt. Leider ist es allen Bemühungen der erfahrensten Vogelwirte noch nicht gelungen, diesem Vogel seinen roten Stirn- und Brustschmuck auch nach der Mauser zu erhalten, der ihn in der Freiheit schmückt. Dieses Schicksal teilt er mit seinem nächsten Verwandten, dem nordischen, aber wenig gekäfigten Birkenzeisig und dem schon genannten Kreuzschnabel. Anders ist es bei dem gelehrigen Dompfaff. Gerade sein wenn auch in der Gefangenschaft etwas verblassendes rotes Unterkleid, sein blauer Mantel und seine schwarze Kappe machen den Gimpel oder Blutfink zu einer Käfigzierde. So stimmbegabt sich dieser Vogel im Nachpfeifenlernen menschlicher Melodien zeigt, so wenig taugt sein Naturgesang. Wenig flötende Töne wechseln mit Geräuschen ab, die an ein ungeschmiertes Wagenrad erinnern. Im Vogelquartett vertritt der Gimpel den Baß. — Seltener als die genannten Arten trifft man bei unseren Liebhabern den Buchfink im Käfig an. Das hat wohl seinen Hauptgrund darin, daß die edlen Finkenschläge, an deren Spitze von alters her der „blanke Reitzug" stand, fast ausgestorben sind. Die Blütezeit des Finkensports, wo man wenigstens in Thüringen auf einen begehrten Schläger die beste Kuh im Stalle getauscht haben soll, ist wohl ein für allemal vorüber. Dagegen soll derselbe heute noch mit allen seinen Auswüchsen in Belgien bestehen. Unser gefühlvoller Nachbar soll es fertigbringen, seinem Pflegling mit kalter Hand und glühendem Stahl das Augenlicht zu rauben, ihn zu blenden, nur aus Eigennutz, damit sein Fink bei den veranstalteten Wettgesängen, durch äußere Einflüsse nicht mehr abgelenkt, in einer vorgeschriebenen Zeit die meisten Schläge bringt und somit seinem Herrn die „Palme" erwirbt. — Die eigentlichen Sängerfürsten finden wir in der Werkstatt eines biederen Tischlermeisters, dessen ganzes Denken und Sorgen neben seiner Familie und seinem Berufe seinen zarten gefiederten Hausfreunden gilt. Zu einer Morgenstunde, an der sich andere gewöhnliche Sterbliche noch ein paarmal in den Federn herumdrehen und ehe er noch ein Handwerkszeug anrührt oder auch nur an sein persönliches leibliches Wohl gedacht hat, ist er mit der Verpflegung seiner Lieblinge beschäftigt. Da werden die saftige Möhre und das harte Weißbrot gerieben. Je nach Vogelart und Körperbeschaffenheit des einzelnen Individuums oder Jahreszeit werden die kostbaren Ameisenpuppen, Weißwurm, klar gehacktes Eigelb, Bröckchen rohen oder gekochten Fleisches, Hirschholunder-, Ebereschen- oder auch andere Beeren, als Ersatz für dieselben kleine Rosinen oder süßes Obst dazu gemengt. Dieses Futtergemisch wird mit einer für jeden Vogel bestimmten Anzahl der begehrten Mehlwürmer garniert. Die gereinigten Trinknäpfe werden mit frischem klaren Wasser gefüllt. Kaum sind die größten Leckerbissen verschlungen, so setzt das allseitige Jubilieren und Musizieren ein und währt, vielleicht mit einer kurzen Atempause um Mittag, bis zum späten Abend. So herrscht in dem schmucklosen Raume mit Ausnahme der Mauserzeit eine sich zu beiderseitigem Fleiße anregende Stimmung das ganze Jahr über, die auch den verknöchertsten Pessimisten mit fortreißen würde. Das schlanke Schwarzplättchen läßt unermüdlich seine Jodler steigen. Das Gegenstück zu dieser lustigen Wirtshausmusik bilden die feierlichen Weisen des rotbrüstigen Rotkehlchens,

die uns mehr in Kirchenstimmung versetzen. Mit einem artigen Knix leitet es jede Strophe ein. Dabei blickt es mit seinen klugen Perlenaugen gleichsam beifallheischend auf uns herab. Dazwischen orgelt ununterbrochen die schlichte Gartengrasmücke mit vollem, wohltönendem Organ. Die goldschnäblige, schwarzbefrackte Amsel flötet ihre süßen Weisen. Die genügsame Feldlerche läßt im niedrigen Laufkäfig ihr himmelerstürmendes Lied erklingen. Das zarte Lullen ihrer Base, der lieblichzutraulichen Heidelerche, versetzt uns im Geiste auf sonnige Waldblöße. Und die Singdrossel, unsere Zippe, die Sängerkönigin unserer Nachtigallschlag entbehrenden erzgebirgischen Wälder, spottet mit kräftiger Stimme: „David! David! Dürre Ficht! Dürre Ficht! Hack se weg! Hack se weg! Jäger kimmt! Jäger kimmt! Grünrock! Grünrock!“

Neueinführungen und Seltenheiten.

Von Karl Neunzig.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Blauraben sind wie alle Rabenvögel Allesfresser, bevorzugen aber tierische Stoffe, die kleinen unter ihnen Kerfe und Würmer, die großen kleine Wirbeltiere, daneben verzehren sie alle auch Samen und Früchte. Den Gefangenen wird ein gröberes Insektenfresserfutter gereicht mit den mannigfaltigsten Beigaben. Bei ihrer Anspruchslosigkeit und leichten Zähmbarkeit sollten diese schönen Vögel häufiger in den Käfigen der Vogelliebhaber zu finden sein. Ihr Benehmen in der Gefangenschaft gleicht ungefähr dem unserer zahmen Dohlen und Häher.

Gleichfalls eine Ersteinführung der Fa. Aug. Fockelmann im Jahre 1923 war der

Rotachselkuhstärling — Molothrus rufo axillaris *Cass.*.

Die Kuhstare sind Bewohner des gemäßigten und des tropischen Amerika, mit Ausnahme Mittelamerikas und Westindiens. Der Rotachselkuhstärling lebt in Argentinien südlich bis zum Rio Negro. Er weicht von dem Typus der Gattung insofern ab, als die Länge der Flügel und des Schwanzes im Verhältnis zum Körper größer ist als bei den anderen Angehörigen der Gattung. Auch die starke Rundung des Schwanzes ist abweichend, ebenso die Dicke und Kürze des Schnabels. Er ist auch die einzige Art der Gattung, bei der die Geschlechter gleichgefärbt sind.

Die Lebensweise einiger Arten der Kuhstärlinge ist kaum völlig erforscht. Von den drei in Argentinien lebenden Arten ist bekannt, daß der Seidenkuhstar — M. bonariensis und der Rotachselkuhstärling ihre Eier in die Nester anderer Vögel legen und das Erbrüten der Eier sowie die Aufzucht der Jungen diesen überlassen, genau wie der bekanntere nordamerikanische Kuhstärling — Molothrus ater, während die dritte argentinische Form, der in der Vorkriegszeit ziemlich häufig eingeführte braune Kuhstärling — M. badius selbst das Nest baut und das Brutgeschäft wie die Aufzucht der Jungen selbst übernimmt.

Das Gefieder des Rotachselkuhstärlings ist glänzend schwarz mit purpurnem Glanz, Flügel und Schwanz matt grünlich glänzend; an den Achselfedern ein kastanienrotbrauner Fleck; Schnabel und Füße schwarz, Auge braun; Lg. 200, Fl. 110, Schw. 83; ♀ kleiner.

Jugendkleid fahlbraun, die Schwingen mit rotbraunen Säumen.

Der Rotachselkuhstärling ist, wie White (Proc. Z. S. 1882) berichtet, in der Umgegend von Buenos Aires ein ziemlich häufiger Bewohner der Hecken und höheren Bäume, welche an den Rändern der Espartograsfelder stehen. Er fand die Eier des Vogels in dem großen Nest des Anumbi — Anumbius anumbi *(Vieill.)* auf einem hohen Eukalyptusbaum.

(Fortsetzung folgt.)

Rotbrauner Weber.

Drecklerche, Schmierfink und Genossen.

Von Emil Kaforke, Berlin.

(Nachdruck verboten.)

Wer aufklären will, muß sich selbst aufklären lassen. Das ist ein Gebot der Stunde. Dementsprechend mag es mir vergönnt sein, alle, welche sich berufen fühlen, die Jugend zu belehren, auf die nicht sinngemäße Bedeutung und irrtümliche Anwendung einiger dem Tierreiche entlehnter, volkstümlicher Bezeichnungen hinzuweisen.

Vergleicht man einen kleinen etwa vier Zentner schweren, in eine formlose, fette Fleischmasse verwandelten Menschen mit einem Mastschwein, so erübrigt sich jede nähere Erörterung, nennt aber ein Erzieher seine unaufmerksamen Zöglinge Schafe und der Vater ein wenig anstelliges Söhnchen Kamel, dann entstehen unwillkürlich Rückschlüsse. Der Schafherde kann ein Schafhirte oder Leithammel vorgesetzt sein und dem kleinen jungen Kamel ein großes altes. Nun, die Situation wird erhellt, wenn wir uns klarmachen, daß Schafe, Kamele, Esel, Ochsen nicht die verkörperte Dummheit bedeuten, sondern wie der

Mensch über die Menge Verstand verfügen, die unerläßlich, um den Platz an der Sonne zu behaupten.

Den vor Lebenslust überschäumenden Sprößlingen kann man auf tausendfältige Art das Törichte ihrer Handlungsweise vor Augen führen, ohne unsere Mitgeschöpfe in dauerndem Verruf zu erhalten. Ein Gymnasialprofessor begann einmal den Unterricht mit folgenden Worten: „Es ist Beschwerde geführt worden, daß ich gelegentlich den Schülern gegenüber den Ausdruck Rindvieh gebraucht habe; gut, ich werde jetzt nicht mehr Rindvieh zu Ihnen sagen, sondern ich werde Ihnen eine Fünf anschreiben." Und diese Fünf war viel wirksamer als das Rindvieh.

Als ich an einem prächtigen, mildsonnigen Frühlingsmorgen über das historische Tempelhofer Feld schlenderte, wurde mir von einer jungen Mutter mit ihrem kleinen Töchterchen ein fröhlicher Gruß entboten. Im Weitergehen fragte plötzlich die Kleine: Mutti, was ist das für ein Vogel, der da oben so schön singt? Das ist die Himmelskünderin, die Lerche. Zehn Minuten später hörte ich die Worte: Anneliese, wo hast du dich schon wieder schmutzig gemacht, du bist eine richtige Drecklerche. Nur mit großer Mühe konnte ich mich des Lachens enthalten. Ganz merkwürdig ist die Art, den kleinen Abcbeflissenen einen Tintenklex im Schreibheft oder einen Staubfleck im reingewaschenen Sommerkleidchen dadurch zu veranschaulichen, daß ein Name der Vogelwelt entnommen und mit dem Vorwort Dreck oder Schmier vereint wird, z. B. Drecklerche, Schmierfink usw. Es gibt nichts Widersinnigeres als einen Vogel, der ohne das reinste Gefieder auf die Dauer gar nicht einmal lebensfähig bleibt, zum abschreckenden Beispiel für unsaubere Kinder zu wählen. Gerade die mannigfaltige Pflege des Federkleides durch Staub und Wasserbäder müßte zum Denken anregen und den Schluß zeitigen, daß das Federvolk das Ideal der Reinlichkeit repräsentiert. Haben Lerche und Fink gebadet, dann wird jede Feder in Bewegung gesetzt, bis die letzte Spur der Fremdkörper wieder beseitigt ist. Sobald auf einem frischbeschriebenen Blatt Papier der schmuckeste Buchfink herumspaziert, wird die Schrift natürlich verwischt, wenn die zarteste Damenhand mit dem Schreibwerk in allzu intime Berührung kommt, geschieht dasselbe. Ja, richtig beobachten ist nicht jedermanns Sache, liebenswürdig, aber gedankenlos trotten die guten Leutchen auf der schönen Erde umher.

Nicht nur über dumme Säugetiere, sondern auch über dumme Vögel äußern sich gelehrte und ungelehrte Köpfe. Nennt doch ein naturwissenschaftlicher Schriftsteller die „Pfauen die eitelsten und darum auch — dümmsten der Vögel!" — Gott sei Dank, Gustav Schubert rettet die Ehre der herrlichen Tiere bei einer Schilderung von Tigerjagden: „Von großem Interesse sind die Jagden, welche der Tiger auf die in den Dickichten zahlreich wohnenden Pfauen anstellt. Letzterer ist aber ein äußerst kluger Vogel und als solcher stets auf seiner Hut. Oft genug überlistet er seinen Jäger." Und wer in aller Welt will denn behaupten, daß Eitelkeit immer Dummheit im Gefolge haben muß? Einer unserer größten Geistesheroen war bekanntlich nicht wenig eitel. Dann möchte ich wissen, woher jener Gelehrter die Eitelkeit der Pfauen leitet. Der gravitätisch erscheinende Gang wird durch den langen federreichen Schwanz bedingt, das blitzsaubere Gefieder ist allen Vögeln eigen, sie mögen gefärbt sein, wie sie wollen. Ein blauer Pfau erregt mehr Aufsehen als eine graue Nachtigall, damit ist die große Eitelkeit erledigt.

Ein weitverbreiteter Titel für Mädchen mit langsamer Auffassungsgabe heißt „dumme Gans". Schleierhaft, daß ein durch Wachsamkeit und Mut bekanntes Tier als Typ der Dummheit herhalten muß. Gänse retteten den Römern das Kapitol, dreist greift auf dem Wirtschaftshofe der Gänserich den Fremdling an, und dressierte Gänse sind keine Seltenheit. Wer Martinsvögel — d. h. ungebratene — richtig beurteilen will, der muß sie auf dem Felde hüten, er wird da ungeahnte Geistesgaben entdecken.

Oft hört man auch den Ruf „dumme Pute". Dieses epitheton ornans verdankt seine Entstehung der Erregung, in welche ein Truthahn durch grell rot oder gelb gefärbte Tücher und Kleider versetzt wird. Man hält das Gebaren des Puters für höchst einfältig, während in Wirklichkeit die lebhafte Farbe die Erinnerung an einen früheren tigerähnlichen Feind wachruft, gegen den eine Kampfstellung notwendig erscheint. Gerechter Zorn bringt das Blut in Wallung.

Noch viele sinnentstellende Aussprüche könnte ich anführen, allein ihre Erwähnung verspricht noch keinen Erfolg ihrer Beseitigung. Nur der ernste Wille aller Jugenderzieher, auf falscher Beobachtung beruhende Redensarten auszumerzen und durch passende zu ersetzen, vermag unsere bilderreiche Muttersprache von schädlichem Ballast zu befreien. In der Jetztzeit, wo man einerseits mit aller Gewalt den deutschen Sprachschatz förmlich durchwühlt, um ihn zu „reinigen", andererseits im täglichen Leben die blödsinnigsten Namen zusammenstellt, erscheint es mir geboten, einer nützlichen Änderung das Wort zu reden. Wer aufklären will, muß sich selbst aufklären lassen.

Kleine Mitteilungen.

„Der Händler Cattaneo in Mailand erwarb diesen Herbst von einem italienischen Offizier, der aus Abessinien zurückkehrte, 9 Paare der überaus seltenen **Zügelastrilde** (s. S. 29). Es gelang dem Unterzeichneten, einen Teil dieser Vögel durch Vermittlung eines Freundes zu erwerben. Diese Zügelastrilde, die nicht weichlich zu sein scheinen, von den 9 Paaren ging nicht ein Tierchen ein, gleichen in ihrem Benehmen dem Granastrild. Die Geschlechter sind schwer zu unterscheiden. Das Männchen zeichnet sich durch größere Ausdehnung der weißen Kehle aus, außerdem sind dessen Unterschwanzdecken etwas dunkler wie beim Weibchen. Mit diesen Vögeln kamen ferner zwei ebenfalls seltene Männchen **Rotbraune Weber** (s. S. 31), deren Gesang mit dem Hin- und Herziehen einer Kette über eine harte Kante nachgeahmt werden kann, außerdem ein Weber gleicher Größe, der am ehesten mit Symplectus bicolor *(Reichenow)* angesprochen werden darf. Mitglied 190 A. Z."

Der **Zügelastrild** — Estrilda rhodopyga *(Sund)* (Abb. s. S. 29) gelangte zuerst 1817 nach Europa, 1903 zog eine Vogelpflegerin in Italien Mischlinge Grau- × Zügelastrild und 1913 gelangte ein Paar der seltenen Vögel in den Zool. Garten in Berlin. Er lebt in Nordostafrika. — Der **Rotbraune Weber** — Melanopteryx rubiginosa *(Rupp.)* (Abb. s. S. 31) in Ostafrika von Abessinien bis zum Pangani verbreitet, wurde zuerst 1913 von Ang. Fockelmann eingeführt. Es ist wenig wahrscheinlich, daß es sich bei dem noch nicht sicher bestimmten Weber um Symplectus bicolor handelt, da dieser in Abessinien nicht vorkommt. Er lebt in Südwestafrika. N.

Aus den Vereinen.

A. Z. Angemeldet sind die Herren: H. Schröder, Tierarzt, Treptow a. Tollense: Kurt Wermbter, Dr. med. vet., Hamborn a. Rh., Kaiser-Friedrich Str. 103; R. Langenbuch, Siems b. Lübeck, Post Waldhusen; Erwin Zaar, Friedek i. Ostschl. (Tschechoslowakien), Stadtplatz 9; Rudolf Müller, Gemeinderat, Wien V, Margaretenstraße 166; Richard Müller, Kaufmann, Schwenningen a. N., Spittelstr. 9. — Aufgenommen sind die Herren: Mtgl. Nr. 356 Enno Hibbeler, Schortens i. Oldenburg, Post Heidmühle; Mtgl. 357 Major Carl Rempe, Bonn a. Rh., Rittershausstr. 21. — An den Stützungsfond der „Gef. Welt" sind abgeführt: Bilfinger, Schwenningen, 5 M., Rose, Pyritz, 1 M. — Es ist von einigen Mitgliedern angeregt, Briefbogen, Umschläge und Postkarten mit unserm Klischee herstellen zu lassen und gegen Kostenerstattung an die Mitglieder abzugeben. Es kosten je 100 Briefbogen 1,25 M.; Kuverts 0,85 M., weiße 1,45 M.; gr. Postkarten 1 M. Bei größerem Sammelauftrag ermäßigen sich die Preise. Gegen besondere Berechnung kann die Adresse des Bestellers aufgedruckt werden, was von 500 Stück aufwärts empfehlenswert ist. Ich bitte um Angabe der gewünschten Anzahl; linierte Bogen zirka 20 % mehr. — Wir beklagen den Tod zweier Mitglieder. Am 12. Februar 1922 verstarb Herr Samereier, Luderbach, Mtgl. 67, und am 25. Januar 1923 Herr Rauscher, Augsburg, Mtgl. 230. — Einige Adressenänderungen zum Nachtrag in der Mitgliederliste gebe ich im nächsten Heft bekannt und bitte bei Wohnungswechsel stets um sofortige Angabe der neuen Adresse. A. Krabbe.

Verband deutscher Farben-, Gestalts-, Bastard-Kanarien- und Exotenzüchter, München (E. V.) Gegründet 1917. Unter zahlreicher Beteiligung der Mitglieder wurde am 19. Januar 1924 die 3. Generalversammlung abgehalten. Der 1. Vorstand, Herr Leopold Keidel, erstattete einen umfassenden Bericht über die Verbandstätigkeit im abgelaufenen Jahr. Aus diesem sind zunächst hervorzuheben: Die Verlegung des Verbandslokales aus dem „Amberger Hof" in das „Pschorrbräuhaus" und der korporative Austritt des Verbandes aus der Weltbundesgruppe Oberbayern und damit auch aus dem Weltbunde selbst. Was die eigentliche Verbandstätigkeit betrifft, so konnte sich dieselbe bei den unsicheren, sich überstürzenden Verhältnissen in unserem Vaterlande nicht in der wünschenswerten Weise entwickeln. Die Mitgliederzahl ist von 63 am Schlusse des vorigen Berichtsjahres durch 8 Neuaufnahmen und 4 Austritte auf 67 (einschließlich 1 Ehrenmitglied) angewachsen. Die Verbandsgeschäfte wurden in 3 Ausschußsitzungen, 12 Monatsversammlungen und 1 Generalversammlung erledigt. In den Monatsversammlungen wurden neben internen Verbandsangelegenheiten Vorträge und Literaturreferate gehalten, sowie Aussprachen über züchterische Probleme herbeigeführt. Der Besuch der Versammlungen, der sportliche Geist und das Interesse in den einzelnen Sparten der Spezialzucht waren recht rege. Der Kassenverkehr litt naturgemäß trotz reichlicher außerterminlicher Zuwendungen unter der allgemeinen Lage, so daß der Verband mit einem Bestande von weniger als einem Goldpfennig in das neue Vereinsjahr eintritt. Die Merkblätter- und Plakettenfrage konnte ebenfalls wegen der Geldmisere keine gedeihliche Entwicklung nehmen, obwohl oft an die Mitglieder um finanzielle Zuschüsse herangetreten wurde. Aus dem gleichen Grunde blieb auch die Angelegenheit der Ausstellungskäfige ungelöst. Der Bücherbestand ist unverändert geblieben, da Neuanschaffungen nicht vorgenommen werden konnten. In der Vorbesprechung zur Generalversammlung wurde die „Gef. Welt", Magdeburg, wieder zum Verbandsorgan gewählt und der korporative Anschluß an die Austausch-Zentrale beschlossen. Im vierten Jahrbuch 1924, das auch einen Aufruf des Verbandes zum Zusammenschluß in Form eines Inserates enthält, ist der Verband unter der Mitgliedsnummer 77 aufgeführt. Durch diesen Anschluß ist den Mitgliedern Gelegenheit geboten, Kreuzungs- und Tauschmaterial zu erhalten, Verbindungen zu Gleichgesinnten anzuknüpfen, Absatzgebiete zu sichern usw. Besonders der letztere Punkt scheint vordringlich zu werden, da das Exportgeschäft abzuflauen beginnt und in der Folge nur der zum Zuge kommen wird, der Rasse und Qualität zum Aufwurf bringt. Uns und unsere Vögel vor der großen Öffentlichkeit bekannt zu machen, ist unser ureigenstes sportliches und wirtschaftliches Interesse und unsere vornehmste Pflicht. Als hervorragend dazu angetan erscheint das von unserem Mitglied Aschenbrenner geschriebene Büchlein über den Gestalts- und Farbenkanarienvogel, das alles Wissenswerte enthält über die Geschichte des Kanarienvogels, die niederländischen und englischen Figuren- und Farbenvögel, über Vererbung und namentlich über die Münchner Form des Gestaltskanarienvogels, sowie über die Gesangsfarbenkanarien. An dem Zustandekommen des Werkchens haben unsere Züchterkollegen Ziegler und Heinemann hervorragenden Anteil genommen. An geselligen Veranstaltungen im abgelaufenen Jahr ist das Stiftungsfest im Kolosseumskeller zu nennen, das unter der allgemeinen wirtschaftlichen Depression nicht gut besucht war, aber doch in guter Harmonie verlief. Anläßlich des Turnerfestes war der Besuch des Mitgliedes Schlusche, Jägerndorf, angesagt, der beim Verbandskassierer Pfaller wohnte, aber keine Gelegenheit fand, mit uns zusammenzutreffen. Unser Mitglied Bibrack, Aschersleben, wohnte einer unserer Versammlungen bei. Weiter konnten wir das Mitglied Tzornak, Berlin, in unserer Mitte begrüßen. Der Vorsitzende schloß diesen Rückblick auf das verflossene Verbandsjahr mit Dankesworten an den Kassierer Herrn Pfaller, diese treueste Stütze des Verbandes, und an die Herren Ziegler und Heinemann, die redlich mithalfen, ihm sein Amt zu erleichtern und gab hinsichtlich des Programms für 1924 bekannt, daß er die im Verband vertretenen einzelnen Sparten unter fachkundigen Obmännern zu spezialisieren und im Verein mit diesen schriftstellerisch zu wirken gedenke, um das Fachorgan zum unentbehrlichen Nachschlagewerk auszugestalten und gleichzeitig der Wissenschaft zu dienen. Weiter sollen Vorträge, Referate, Führungen, Ausstellungen, Ausflüge ornithologischer Natur für alle Sparten in bunter Reihenfolge abwechseln. Abhandlungen in der „Gef. Welt", Vereinsberichte, Merkblätter müssen den Verband literarisch auf der Höhe erhalten und Führungen in der Staatssammlung unter fachmännischer Leitung sollen das geschriebene und gesprochene Wort veranschaulichen. Das Verbandsstammbuch soll ausgearbeitet werden und heuer zur Einführung kommen. Wir müssen daran denken, unter Außerachtlassung einer Massenzucht nur nach Qualität zu züchten. Auch das gesellschaftliche Moment soll schließlich nicht unbeachtet bleiben. Herr Keidel legt nun den Vorsitz in die Hände der Versammlung zurück und wünscht allen Mitgliedern ein gutes, reich an Erfolgen gesegnetes Zuchtjahr 1924. (Lebhafter Beifall.) Im Anschlusse an den Tätigkeitsbericht erstattete Herr Pfaller den Kassenbericht für 1923. Die Einnahmen bezifferten sich auf 979 730 239 66 M., die Ausgaben betrugen 834 065 472 M., so daß am 31. 12. 23 ein Bestand von 145 664 767 66 M. verbleibt. Dieser Kassenbericht wurde von den Kassenprüfern Friedrich Frank und Johann Ortner geprüft und für richtig, sowie in Übereinstimmung mit dem Kassenbuch befunden, worauf der Vorsitzende Herrn Pfaller den Dank für seine Mühewaltung zum Ausdruck bringt. Zum nächsten Punkt der Tagesordnung „Ehrung von Mitgliedern" überreicht der Vorsitzende unter liebenswürdigen Worten den Mitgliedern Aschenbrenner eine Urkunde über dessen Ernennung zum Ehrenmitgliede und Pfaller die erste Verbandsplakette in Anerkennung ihrer Verdienste um den Verband. Nach einer Pause, während der sich der Wahlausschuß, bestehend aus den Herren Guassold, Baumgartner und Dellinger konstituierte, wurde die Neuwahl der Vorstandschaft mittels Stimmzettel vorgenommen. Es wurden gewählt: zum 1. Vorstand Herr Leopold Keidel, zum 1. Kassierer Herr Max Pfaller, zum 1. Schriftführer Herr Anton Aschenbrenner. Durch Zuruf wurden weiter gewählt zum 2. Vorstand Herr Benno Ziegler, zum 2. Kassierer Herr Louis Heinemann, zum 2. Schriftführer Herr Max Schimang, zu Beisitzern die Herren Redl und Diem, zu Kassenprüfern die Herren Friedl und Dellinger. Der wiedergewählte 1. Vorstand Herr Leopold Keidel übernimmt den Vorsitz und fährt nach Dankesworten für das durch die Wahl bekundete Vertrauen in der Erledigung der Tagesordnung durch Verlesen des Einlaufes fort. Als Mitglieder wurden neu aufgenommen Herr Bruno Matern, Königsberg i. Pr., und folgende fünf dem Bayerischen Vogelliebhaberverein angehörende Herren: Martin Hettiger, Max

Zierer, Johann Kurz, Peter Egger und N. Greindl. Als Beitragsleistung für 1924 wurden 4 M. festgesetzt. Die Aufnahmegebühr beträgt 2 M. Auf Antrag des Vorsitzenden wurden zu Obmänner der Spezialzüchter gewählt; für Figurenkanarien (Holländer) Herr Benno Ziegler, Frauenstraße 1, für Gestaltsfarben- und Gesangsfarbenkanarien Herr Louis Heinemann, Balanstraße 16, für Bastarden Herr Martin Hettiger, Winzererstraße 48, für Exoten Herr Max Zierer, Khidlerstraße 22. Von Verbandswegen werden folgende Fachblätter bestellt: „Kanaria", „Der Kanarienzüchter", „Der Kanarienvogel".

Bayerischer Vogelliebhaber-Verein (e. V.) (Sitz München). Bericht über die Generalversammlung vom 26. Januar 1924. 1. Jahresbericht des 1. Vorsitzenden: Eingangs seines Berichts bedauert Herr Flierl, daß den Mitgliedern im verflossenen Jahre wenig geboten wurde, was jedoch auf die unsicheren, sich überstürzenden wirtschaftlichen Verhältnisse in unserem Vaterlande zurückzuführen war, die ja jedes geordnete Vereinsleben unterbinden mußten. Der Mitgliederstand ist von 198 am Schlusse des Jahres 1922 durch 17 Neuaufnahmen und 9 Austritte auf 203 angewachsen. Bei der Generalversammlung meldeten sich 5 neue Mitglieder, so daß wir mit einem Mitgliederstand von 208 in das Jahr 1924 eintraten. Die Vereinsgeschäfte wurden in 4 Ausschußsitzungen, 11 Monatsversammlungen und 1 Generalversammlung erledigt. Vier Vorträge wurden gehalten, und zwar 1 Vortrag von Freiherrn v. Besserer über unsere Tagraubvögel, 3 Vorträge von unserm 1. Vorsitzenden Herrn Flierl, und zwar 2 über die Rätsel des Vogelzuges und 1 Vortrag über die geistigen Fähigkeiten und die Veranlagung der Vögel. Ein Ausflug wurde nach der Reiherkolonie Ismannig veranstaltet. Was den Vogelschutz betrifft, wurde eine Eingabe an die zuständigen Behörden gemacht, obige Reiherkolonie unter den Schutz des Staates zu stellen. Ferner eine Eingabe an Ministerium und Landtag zwecks Aufhebung der staatlich autorisierten Vogelschutzkommission. Herr Flierl bedauert, daß im vergangenen Jahre keine Ausstellung stattfinden konnte und gibt der Hoffnung Ausdruck, eine solche in diesem Jahre wieder abhalten zu können. Den Herren Schimang und Rosenberger übergab der 1. Vorsitzende in Anerkennung ihrer Verdienste gelegentlich der Ausstellung 1922 je eine von Herrn Keidel gestiftete Plakette. Die Kasse schließt mit einem Baarbestand von 27 Goldpfennigen ab, und wurde Herrn Rosenberger für seine Mühewaltung der Dank des Vereins zum Ausdruck gebracht. 2. Neuwahl: Die Neuwahl der Vorstandschaft ergab folgende Besetzung: 1. Vorsitzender Herr Fritz Flierl, München, Tangstr. 41; 1. Schriftführer Herr Rud. Engel, München, Baaderstraße 3 III r.; 1. Kassierer Herr Jos. Rosenberger, München, Hirschbergstr. 1; 2. Vorsitzender Herr Leopold Keidel; 2. Schriftführer Herr Max Pfaller; 2. Kassierer Herr Peter Egger; Beisitzer die Herren Engel sen. und Ziegler, Revisoren die Herren Mader und Zipper, Bücherwart Herr Zierer. 3. Der Jahresbeitrag wurde auf 4 Goldmark, die Aufnahmegebühr auf 1 Goldmark festgesetzt. Die Mitglieder des d. V. sind von der Entrichtung der Aufnahmegebühr entbunden. Mitglieder, welche mit dem Beitrag 1923 im Rückstand sind, sollen hierfür ½ Jahresbeitrag leisten. 4. Ferner wurde eine Pressekommission gewählt, bestehend aus den Herren Engel jun., Keidel und Zierer; ein Vergnügungsausschuß, die Herren Egger, Keidel und Ziegler; eine Ausstellungskommission, die Herren Keidel, Pfaller und Rosenberger. 5. Endlich wurde Herr Georg Sigl unter Anerkennung seiner langjährigen Verdienste um den Verein einstimmig zum Ehrenmitglied ernannt. Rud. Engel, 1. Schriftführer.

Bayerischer Vogelliebhaber-Verein (e. V.) (Sitz München). Nächste Monatsversammlung Samstag, den 23. Februar, im Vereinslokal Pschorrbräuhaus, Bayerstraße. Rud. Engel, 1. Schriftführer.

Kanarien- und Vogelschutz-Verein von Pyritz und Umgegend. Unter diesem Namen wurde am Sonntag, dem 27. Januar, 4 Uhr nachmittags, in der Konditorei des Herrn Georg Rose, Bahnhofstraße, ein Verein gegründet, dessen Zweck und Ziele die Heranzüchtung erster und edelster Kanarienvögel, sowie Ausübung praktischen Vogelschutzes sein soll. In den Vorstand gewählt wurden: zum 1. Vorsitzenden Herr Kaufmann Kämmerer, zum 2. Vorsitzenden Herr Töpfermeister Pätz, zum Kassierer Herr Friseur Reinke, zum Schriftführer der Unterzeichnete. Der Vereinsbeitrag wurde auf 50 Pf. für den Monat festgesetzt. Als Vereinslokal wurde das Café des Herrn Georg Rose gewählt. Nach Besichtigung der Vögel, Heckbauer, Futterarten und Utensilien unseres Vereinskollegen Rose, sowie nach angeregtem Meinungsaustausch schloß der 1. Vorsitzende um 6½ Uhr die Versammlung. Ist unser Verein auch noch klein, wir zählen 12 Mitglieder, so hoffen wir doch, daß noch viele Liebhaber unserer edlen und gerechten Sache beitreten. Vogelliebhaber sind als Gäste stets herzlich willkommen.

Erich Mundt, Schriftführer.

Alte Vereinigung der Vogelliebhaber zu Dresden. Am 4. Oktober v. Js. fand die erste Generalversammlung der am 21. September 1922 neu gegründeten Vereinigung statt. Diese ist seit dem Gründungstag auf 18 Mitglieder gestiegen. Die Wahl des Vorstandes zeitigte folgendes Ergebnis: Herr Ritschel 1., Herr Dietrich 2. Vorsitzender, Herr Groß, Schriftführer, Herr Frohberg, Kassierer. In den darauffolgenden Monatsversammlungen, von denen je eine am 1. 11., 6. 12. 1923 und 3. 1. 1924 abgehalten wurde, machte der Herr Vorsitzende Mitteilung von verschiedenen Eingängen, insbesondere davon, daß unsere „Gefiederte Welt", die bekanntlich mit September v. J. ihr Erscheinen einstellte, seit Anfang dieses Jahres wieder vorliegt. Hierüber wird allgemein Freude bekundet. Ein Appell an unsere Mitglieder, auf unser Fachblatt auch persönlich zu abonnieren, hatte guten Erfolg. Die vom Schriftführer verlesenen Protokolle über die einzelnen Versammlungen wurden allenthalben genehmigt und vollzogen. Ein Vortrag von ihm aus Liebes Ornithologische Schriften über „Meisen", ebenso ein solcher des Herrn Huhn über „Bastardzucht mit Stieglitz und Gimpel" fanden großen Beifall. Auf Beschluß der letzten Monatsversammlung wird mit Wirkung vom 1. Januar d. J. ein monatlicher Mitgliedsbeitrag von 50 Pf. wieder erhoben.

Groß, Schriftführer.

Vom Vogelmarkt.

Von seltener auf den Vogelmarkt kommenden Vögeln werden angeboten:

Beck, Tierimport, Stuttgart: 1,1 Alpenflüevögel.

E. Cordier, Zürich 4, Werdgutstraße 7: 1,0 Regenwachtel, 1 Paar Zuckervögel, 2,1 Weißbauchamazonen, 3,0 abessinische Weber, 1 fingerzahme Zwergohreule.

N. Diesterweg, Magdeburg, Kaiser-Otto-Ring 3: A. Z. Mtgl. 227: 1,1 Schnurrbärtchen, 1,0 Königswitwe, 1,0 Paradieswitwe.

E. W. Lenger, Berlin N 58, Schönhauser Allee 70a: Hochrote Tigerfinken, Zebrafinken, Safranfinken, Kardinäle, Stärlinge, Rosenstare, Liebestäubchen, Sonnenvögel, Schamadrosseln, Dayaldrosseln, Bartvögel, Mangopirol, Schwarzwangenbülbül, Goldaugentimalien, ind. Kronenmeisen, Senegalfinken, Wellensittiche, gelb.

Ludwig, Halle (Saale), Merseburger Straße 20: Mexikanische Drosseln (Graysdrossel).

Eugen Müller, Küllstedt, Eichsfeld. A. Z. Mtgl. 65: Jap. Möwchen, gelbe Wellensittiche.

E. Schöndube, Berlin N 4, Elisabethkirchstraße 1: Seidenschwänze, Kernbeißer, Sonnenvögel, Senegalvögel.

E. Stümcke, Vegesack (Bremen). A. Z. Mtgl. 258: 0,2 gelbe Wellensittiche.

Paul Tzornack, Berlin NO 55, Prenzlauer Allee 89. Tel. Humboldt 2063: China-Nachtigallen, Reisfinken, rote Tigerfinken, Bandfinken, rotgehäubte Kardinäle, gelbe Wellensittiche.

Wilckens, Tierarzt, Bogel bei Nastätten i. T. A. Z. Mtgl. 203: 0,4 Isabellkanarien, 1 eingewöhnter Eichelhäher.

Stützungsfonds.

Es gingen ein durch die A. Z. von Herrn Rose-Pyritz 1 R.M., Dr. Bilfinger-Schwenningen 5 R.M. — Bei der Schriftleitung von Herrn F. Bösch-Hamburg 6,43 R.M., Herrn Thiele-Leipzig 2 R.-M.

(Fortsetzung auf der 3. Umschlagsseite.)

Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Jahrg. 53 | Den 6. März 1924 | Heft 5

(Druckort: Burg, Bezirk Magdeburg.)

Das Rotkehlchen.

Vortrag, gehalten in der „Alten Vereinigung der Vogelliebhaber zu Dresden".

Von Paul Groß.

(Nachdruck verboten.)

Meine Herren! Ich habe mir zur Aufgabe gemacht, Sie heute ein Weilchen über unser Rotkehlchen zu unterhalten, über einen Vogel, von dem man sagen möchte, er ist zu bekannt, als daß es nötig wäre, ihn noch weiter zum Gegenstand näherer Betrachtungen zu machen. Wenn auch in unserem Kreise wohl wenige vorhanden sind, die sich das Rotkehlchen nicht schon zu ihrem Stubengenossen gemacht und es gepflegt haben, wenn es also für die Mehrzahl von uns nichts Neues sein kann, was ich Ihnen auftragen will, diejenigen Liebhaber aber unter uns, die sich mit der Pflege des kritischen Vogels noch nicht oder wenigstens noch nicht allzulange befaßt und schließlich ihre Rechnung noch nicht gefunden haben, werden es begrüßen, einmal Eingehendes über ihn zu hören, und ihnen hauptsächlich sollen ja auch nur meine Worte gelten.

Zunächst etwas Allgemeines.

Wie das Rotkehlchen aussieht, meine Herren, wissen wir alle und es bedarf keiner großen Beschreibung: ein orangeroter Latz zieht sich über Gesicht, Kehle, Halsseiten und Oberbrust, abgegrenzt durch einen aschgrauen Streifen, der von den Schläfen über die Hals- und Brustseiten verläuft. Unterbrust und Bauch weiß, an den Flanken ein zart bläulicher Anflug, Unterschwanzdecken braungelblichweiß, Unterflügeldecken fahl rostgelb, die ganze Oberseite olivbraun, Schwung- und Steuerfedern ebenso, mit rostgelblichen Außensäumen. Die großen Flügeldeckfedern haben zuweilen am Ende ebenfalls rostgelbe dreieckige Fleckchen, wodurch eine undeutliche Binde hergestellt wird, bei uns gewöhnlich Spiegel genannt; Schnabel und Füße hornbraun bis schwarz, Augen dunkelbraun.

Das Männchen ist vom Weibchen schwer zu unterscheiden, mit aller Sicherheit nur im Frühjahr, und zwar am Steißzäpfchen, das beim Männchen zu dieser Zeit (Brunstzeit) deutlich hervortritt. Ein geübtes Auge kann wohl auch im Herbste Männchen vom Weibchen unterscheiden, namentlich wenn es mehrere Rotkehlchen vor sich hat, doch wird selbst der Geübteste keine Garantie übernehmen wollen; alle Merkmale am Gefieder sind trügerisch! Im allgemeinen hat das Weibchen einen trüber gefärbten, nicht so ausgedehnten Brustlatz, auch das Aschgraue ist weniger schön und deutlich, und zumeist lassen auch dunklere Füße auf weibliches Geschlecht schließen. Doch, wie gesagt, es möchte besser niemand in dieser Richtung garantieren. Den jungen Rotkehlchen fehlt der Brustlatz ganz. Sie sind dort gelbbraun mit dunklerer Fleckung, die olivfarbene Oberseite ist rostbraun gefleckt, der Schwanz braungrau, die Füße fleischfarben. Das Gelege des Rotkehlchens sind 5—7 Eier von gelblichweißer Grundfarbe mit violettgrauen und rostgelben Flecken, die bald fein, bald grob und verwaschen, bald dunkler sind und dann nicht selten einen Kranz am stumpfen Ende bilden, während sie gewöhnlich gleichmäßig verteilt erscheinen. Das Rotkehlchen brütet zweimal im Jahre. Erfahrungsgemäß zeitigt das erste Gelege hauptsächlich Männchen, das folgende in der Mehrzahl Weibchen.

Das Rotkehlchen ist ein Vogel unserer Laubwälder, wo es dichtes Unterholz und feuchten Boden verlangt. Gern ist es in Stangenhölzern mit viel Moos, paßt sich aber den verschiedensten Verhältnissen an, geht auch im Gebirge ziemlich hoch aufwärts, scheut die Menschen keineswegs und findet sich deshalb nicht selten auch in öffentlichen Anlagen und größeren Gärten ein, wie ihm überhaupt ein parkartiger Charakter der Landschaft sehr zuzusagen scheint. Auf dem Zuge findet man es an allen Orten, wo überhaupt ein Vogel vorzukommen vermag.

Es ist ein wetterharter Vogel, der schon Mitte März bei uns einzutreffen und erst gegen Mitte bis Ende Oktober wieder abzuziehen pflegt. Einzelne Rotkehlchen harren auch den Winter bei uns aus. Wahrscheinlich ziehen sie überhaupt nicht weit, denn die meisten sollen schon in Südeuropa Halt machen und nur wenige über das Mittelländische Meer setzen. Ein schneereicher Vor- oder Nachwinter bringt sie aber oft in eine böse Lage. Sie kommen dann bettelnd in die Nähe menschlicher Wohnungen, um dort mühselig ihr Leben zu fristen. Die Rotkehlchen sind ausgesprochene Nachtwanderer und ziehen im Herbst in großen, aber nur lose zusammenhängenden Gesellschaften, die sich während des Tages zur Nahrungssuche zerstreuen und erst abends schnickernd wieder zusammenlocken. Sowohl in körperlicher wie in geistiger Beziehung müssen die Rotkehlchen als hochentwickelte

Vögel gelten. Dies spricht sich schon in ihrem ganzen äußeren Gebaren deutlich und unverkennbar aus. Hochbeinig, in steiler, selbstbewußter Haltung mit vorgewölbter Brust, hängenden Flügeln und aufgestelztem Schwänzchen stehen sie da und sehen mit ihren großen Augen keck und munter in die Welt hinein. Auf dem Boden hüpfen sie in großen raschen Sätzen dahin. Macht das Rotkehlchen Halt, so läßt es seinen Schwanz wie in Selbstvergessenheit nachlässig herabhängen. Reizend sind die knixenden Bewegungen, die das Rotkehlchen bei der geringsten Erregung, namentlich aber beim Nahen eines Menschen zu vollführen pflegt. Beim Singen erwählt es sich gewöhnlich einen erhöhten Sitz, oft im Wipfel eines mittelgroßen, ja selbst des höchsten Baumes. Sein Gesang ist nicht erstklassig, aber überaus ansprechend und anmutig. Er hat etwas ausgesprochen Melancholisches, unendlich Süßes, Weiches und Wehmütiges. Die zartesten Töne werden hervorgesucht und schwingen sich in lieblichen Trillerchen an unser Ohr. Dieser, namentlich beim Lampenscheine im Zimmer so heimisch anmutende Gesang hat deshalb viele Liebhaber gefunden. Die sogenannten Wipfelpfeifer singen bedeutend besser, viel lauter und mannigfaltiger, mit wechselvollen Wirbel- und Trillertönen. Während des Gesanges, dem sich das Rotkehlchen mit ganzer Seele hinzugeben scheint, nimmt es eine förmlich andächtige Stellung ein und scheint alles um sich herum zu vergessen. Der sonst so kecke und übermütige Vogel ist gar nicht wiederzuerkennen.

Ich behaupte, die Rotkehlchen sind nicht nur in der Natur, sondern auch im Zimmer, sofern sie richtig gekäfigt, passend platziert und sachverständig gefüttert werden, mit wenig Ausnahmen sehr fleißige Sänger und lassen sich namentlich frühzeitig und in der Abenddämmerung gerne hören, singen auch nach überstandener Mauser im Herbste, wenn auch nur leise, fleißig fort. Auch während eines Gewitters, wo alle anderen Vögel verstummen, singt das Rotkehlchen unbekümmert weiter. Einzelne stellen hinsichtlich des Beginnes mit dem Gesange die Geduld ihres Pflegers wohl auf eine harte Probe und nicht selten setzt dieser den Dickkopf deshalb wieder in Freiheit. Ich kann aber von meinem schon oft geäußerten Standpunkt nicht abgehen: es war hier einfach nicht alles in Ordnung; ein Futter- oder Platzwechsel hätte mit Wahrscheinlichkeit zum Ziele geführt, vorausgesetzt, daß nicht etwa ein Weibchen den Käfig zierte.

Der gewöhnliche Lockton des Rotkehlchens ist ein metallisches Schnickern, das sich mit „Schnickerickickik“ recht gut verdeutlichen und auch leicht künstlich nachahmen läßt und oft vielmals hintereinander wiederholt wird, der Warnruf ein leiser, aber durchdringender langgezogener Ton wie „tziie“.

Das Rotkehlchen sucht seine Nahrung zumeist auf dem Erdboden, wo es gern nach Drosselart das halbverfaulte Laub umwendet und nach etwas Genießbarem durchstöbert. Es ist ein tüchtiger Insektenvertilger, mit gewaltigem Appetit, der aber die Larven und Eier lieber als die ausgebildeten Würmer oder Käfer nimmt. Die Nahrung fliegend zu erhaschen, versucht sich das Rotkehlchen meist vergeblich. Im Herbste verspeist es sehr viel Beeren, die dann zeitweise seine Hauptnahrung ausmachen, namentlich solche vom Faulbaum und Holunder. Auf rote Holunderbeeren ist das Rotkehlchen weniger erpicht als auf schwarze. Dem Menschen gegenüber ist es in freier Natur ziemlich harmlos und zutraulich; unter sich sind die Rotkehlchen aber zänkisch und sehr unverträglich. Die Männchen liegen während der Brutzeit in ununterbrochener Fehde, die nicht selten mit dem Tode des Schwächeren endigt. Deshalb ist es auch unmöglich, zwei Rotkehlchen gleichen Geschlechtes in einem Käfig zu halten. Es jagt und beißt sich auch gerne mit anderen Vögeln herum, ist eben ein heißblütiger Bursche, dessen überschäumendes Temperament sich Luft schaffen muß. Wie schon erwähnt, brüten die Rotkehlchen zweimal im Jahre; bei beiden Bruten beteiligen sich auch die Männchen eifrig am Brutgeschäft, das 13—14 Tage in Anspruch nimmt. Gewöhnlich findet man das erste Gelege des Rotkehlchens Ende April. Sein Nest steht stets sehr niedrig, oft auch ganz auf der Erde. Es ist nicht leicht, ja sogar außerordentlich schwer aufzufinden. Es steht im dichten Gebüsch in einem ausgefaulten Baumstumpf oder zwischen dem Wurzelwerk alter Bäume, in Mauer- und Erdlöchern, kurz, in Halbhöhlungen aller Art, denn der besorgte Vogel verlangt immer von oben her Deckung und stellt sich diese im Notfalle durch einen backofenförmigen Bau selbst her, soweit sie nicht schon von Natur aus vorhanden ist.

Der Bau des Rotkehlchens stellt sich als ein ziemlich lockeres Gefüge dar und setzt sich von außen nach innen aus dürren Blättern, Moos, Halmen, Rispen und Würzelchen zusammen, während die Mulde gewöhnlich mit Tierhaaren ausgefüttert ist. Manche Nester bestehen auch fast ganz aus Waldmoos. Die Brut des Rotkehlchens wird hauptsächlich durch Wiesel und Katzen gefährdet. Die Jungen verlassen ihr Heim sehr früh, huschen im Dickicht herum, werden aber von den Alten noch längere Zeit mit großer Hingebung gefüttert und beschirmt.

(Schluß folgt.)

Exakte Vererbungsversuche bei Kanarienvögeln.

Von Dr. H. Duncker, Bremen.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

V.

6. Ich hatte oben darauf hingewiesen, daß die rotbraunen Augen der Isabellen ganz anderen Erbfaktoren ihr Entstehen verdanken als die roten Augen der gelben und weißen Kanarienvögel. Den Vögeln mit rotbraunen Augen fehlt der Schwarzfaktor, den Vögeln mit roten Augen dagegen der Chromogenfaktor, während sie den Schwarz- und Braunfaktor besitzen können. Der Beweis für die Richtigkeit dieser Auffassung ergibt sich aus einer Paarung, welche Noorduijn 1906 angestellt hat. Er hat ein Isabellmännchen mit einem rotäugigen gelben Weibchen gepaart und erhielt schwarzäugige Männchen und Weibchen mit braunroten Augen. Schreiben wir dasselbe in Erbformeln noch einmal hin, so wird es sofort klar sein, daß das Ergebnis nicht anders lauten konnte. Die Erbformel für das braune „Isabell“-Männchen war „ssBBCCGG“. Das rotäugige Weibchen

hatte die Erbformel SsBBccGG. Die beiden zur Kreuzung verwandten Vögel unterscheiden sich also nur durch den S-Faktor und den C-Faktor. Das braune Männchen enthält den S-Faktor nicht, das rotäugige Weibchen hat, da das Y-Chromosom stets leer ist, nur einen S-Faktor. Ferner enthält das braune Männchen den C-Faktor zweimal, das rotäugige Weibchen besitzt keinen C-Faktor. Daraus ergibt sich, daß bezüglich des S-Faktors wir eine Rückkreuzung vor uns haben. Es müssen also die Hälfte der Formen den S-Faktor enthalten, und bei Vorhandensein des C-Faktors schwarzäugig sein. Da der in diesen Formen vorkommende S-Faktor aber stets im X-Chromosom liegt und vom Weibchen herrührt, müssen alle diese schwarzäugigen Formen Männchen sein. Die andere Hälfte der Formen enthält den S-Faktor nicht. Sie besitzen daher braunrote Augen und sind stets Weibchen. Bezüglich des C-Faktors haben wir eine einfache Kreuzung einer dominant-homozygoten Form und einer rezessiv-homozygoten Form vor uns. Da dann naturgemäß der Bastard den C-Faktor stets enthält, wird in keinem derselben die Melaninentwicklung unterdrückt. Formen mit roten Augen können also nicht vorkommen. Sie können erst in der nächsten Generation wieder auftreten, wenn der C-Faktor in einzelnen Vertretern herausspaltet. Noorduijn hatte seine dahinzielenden Ergebnisse versprochen im Archiv für Rassen- und Gesellschaftsbiologie zu veröffentlichen. Es ist aber bisher nicht geschehen.

7. Wir kommen nunmehr zu dem am schwierigsten zu erklärenden Problem der ganzen Lehre von der Vererbung der Färbung bei den Kanarienvögeln. Es ist die Erklärung der Tatsache, daß bei einer Paarung von grünen mit gelben Vögeln grünbunte Vögel entstehen. Es muß hier ein besonderer Erbfaktor am Werk sein, den wir einmal vorläufig den „P-Faktor" nennen wollen, weil er das Auftreten der Pigmente am Vogelkörper reguliert. Seine Wirkung ist derartig, daß die Pigmente durch ihn an einzelnen Körperstellen zurückgedrängt werden; auf die gelbe und weiße Färbung des Gefieders wirkt dieser P-Faktor nicht ein. Über diese schwierige Frage der Wirkung des P-Faktors hat schon einmal Davenport Klarheit zu gewinnen versucht. Er hat folgende Paarungen vorgenommen, welche die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Ergebnisse brachten:

Paarungen	Grün	Grünbunt	Gelb mit wenig Pigmentflecke	Gelb
Grün # Grün	21	—	—	—
Gelb # Gelb	—	—	6	28
Grün # Gelb	—	37	—	—
Grün # Grünbunt . .	16	22	—	2
Gelb # Grünbunt . .	—	32	8	22
Grünbunt # Grünbunt	6	34	2	11

Die Erklärung, welche Davenport für diese Zahlen gab, lief darauf hinaus, daß er annahm, daß die einen den „Melanin-Faktor" (Davenport trennt noch nicht den Schwarzfaktor von dem Braunfaktor) enthielten, den Scheckungsfaktor, den ich als P-Faktor bezeichnet habe, dagegen nicht; daß die gelben Vögel dagegen zwar den P-Faktor enthalten, nicht aber den Melanin-Faktor (Davenport nennt diesen Faktor N, wobei wir bleiben wollen, da der Buchstabe N noch nicht vergessen ist, also keine Verwechslung entstehen kann). Und in der Tat, es würde bei dieser Annahme die Grünbuntheit aller bei einer Kreuzung von Grün mit Gelb entstehenden Bastarde erklären. In diesen würde dann der N-Faktor mit dem P-Faktor zusammentreffen, wodurch nach Davenports Ansicht die grünbunten Vögel entstünden. Es hätten dann die Bastarde die Erbformel: NnPp. Paaren wir nun zwei solcher Bastarde wieder, also zwei grünbunte miteinander, so müssen nach dem Punnetschen Schema 9 Grünbunte, 3 Grüne und 4 Gelbe entstehen, von welch letzteren 3 die Erbformel nnPP bzw. nnPp besitzen und einer die

Lancashire-Kanarienvogel.

Erbformel nnpp. Tatsächlich stimmen Davenports Resultate zahlenmäßig mit dieser Erwartung nahezu überein. Allerdings ist es auffällig, daß bei Paarung „Grünbunt" mit „Grünbunt" etwas zu viele „Grünbunte" und zu wenig „grüne" Vögel entstanden sind. Wenn Davenports Erklärung richtig wäre, so dürfte aber eine Paarung von „Grün" mit „Grünbunt" nur „grüne" und „grünbunte" Vögel zu gleichen Teilen ergeben, da ja der Melaninfaktor im grünen Vogel homozygot, der P-Faktor dagegen im „grünbunten" Vogel heterozygot ist, in den „grünen" Vögeln aber fehlt. Da Davenport aus der Paarung von „Grün" mit „Grünbunt" auch noch 2 gelbe Vögel erhält, so widersprechen diese seiner Erwartung. Ebenso müßten bei einer Paarung von „Grünbunt" mit „Gelb" zu gleichen Teilen „grünbunte" und „gelbe" Vögel ent-

stehen, was auch eingetroffen ist, wenn man die Vögel mit „wenigen Pigmentflecken" einfach zu den gelben Vögeln hinzuzählt.

Um den verschiedenen Unstimmigkeiten zwischen Davenports Erklärungen und seinen Resultaten auf den Grund zu gehen und außerdem eine Übereinstimmung mit den aus sonstigen Kreuzungen sich ergebenden Tatsachen, wie ich sie oben auseinandergesetzt habe (z. B. Vorhandensein des S- und B-Faktors in den gelben Vögeln), zu erzielen, habe ich im vorigen Jahre mit Herrn Reich die Davenportschen Versuche noch einmal wiederholt. Ich erhielt:

Paarungen	Grün	Grünbunt	Gelb mit Zeichen	Gelb
Grün # Grün	Wurde nicht ausgeführt, da hinreichend geklärt.			
Gelb # Gelb	—	2	3	14
Grün # Gelb	1	13	—	—
Grün # Grünbunt . .	20	13	3	2
Gelb # Grünbunt . .	2	22	5	22
Grünbunt # Grünbunt	9	32	5	18

Wir sehen daraus, daß im großen und ganzen unsere Zahlen mit denen von Davenport übereinstimmen, nur zeigt sich bei Paarung von Grün mit Gelb ein grüner Jungvogel, der bei Davenport nicht in die Erscheinung trat und nach seiner Erklärung auch nicht treten konnte. Ferner ist bei Paarung von „Grünbunt" mit „Grünbunt" die Zahl der „gelben" Vögel viel zu hoch und bei Paarung von „Grünbunt mit „Gelb" dürften nach Davenports Erklärung keine grünen Vögel auftreten, während ich 2 grüne Vögel bekam. Ebenso sind die beiden grünbunten Vögel aus der Paarung von „Gelb" mit „Gelb" nach dem Davenportschen Erklärungsversuch nicht zu verstehen. Die Dinge müssen also wohl etwas komplizierter liegen. (Fortsetzung folgt.)

Nochmals die Farbenzucht der Wellensittiche.

Von S. Lichtenstädt.

(Nachdruck verboten.)

Auf meinen Artikel in der „Gefiederten Welt" über obiges Thema und meine Mitteilung über die gelungene Zucht blauer Wellensittiche sind mir eine große Anzahl interessanter Mitteilungen, besonders auch aus dem Ausland, zugegangen, welche wohl auch für andere Wellensittichzüchter, welche sich der Farbenzucht zuwenden wollen oder Farbensittiche schon züchten, von großem Interesse sind.

Zuerst möchte ich an dieser Stelle anregen, sich noch mehr der Farbenzucht dieses reizenden Sittichs zuzuwenden, da ich aus den Auslandsmitteilungen ersehen habe, in wie hoher Blüte diese Zucht speziell in Belgien und Frankreich steht, und wie wenig sie bei uns in Deutschland gepflegt wird. Leider, leider verbietet der schlechte Stand unserer Mark Anschaffung von Zuchtmaterial aus dem Auslande, um so mehr aber muß jeder Besitzer von Farbensittichen bestrebt sein, sein Material in Deutschland zu lassen, um wenigstens ein Tauschobjekt für Neuanschaffungen zu haben. Ich wäre für Mitteilungen, bei welchem Liebhaber ein Bestand an Farbensittichen vorhanden ist, sehr dankbar, und empfehle dringend in gegenseitigen Austausch von Jungtieren zur Vermeidung von Inzucht zu treten.

Alle Farbensittiche stehen heute hoch im Wert. Für meine Nachzucht olivgrüner Sittiche wurden mir vom Ausland 50—60 Franken per Paar geboten, d. h. z. Zt. 8—9000 Mark. Blaue Wellensittiche kosten 30—35 000 Mark per Paar, gelbe 1—5000 Mark, und selbst für gewöhnliche grüne werden mir 3—4 Schilling per Stück geboten, d. h. 900—1000 Mark.

Leider wird auch die Futterbeschaffung immer schwieriger. Wenn man 80—100 hungrige Wellensittichmäuler satt zu machen hat, so kann man sich ungefähr eine Vorstellung machen, was heute eine Wellensittichzucht für Futterkosten verursacht. Ich konnte häufig in ganz Berlin keine weiße Hirse auftreiben, und ist der Preis heute für diese 45—50 Mark per Pfund. Spitz kostet zirka 85 Mark, wenn diese Zeilen im Druck erscheinen, ist der Preis wahrscheinlich schon lange überholt. Die Großhändler zeichnen die Preise gewöhnlich lustig mit dem Dollar herauf, vergessen sie aber regelmäßig herunter zu zeichnen, wenn die Mark steigt.

Nun zu meinen Farbensittichen. Meine blauen Sittiche waren leider eine Enttäuschung, wie mir auch verschiedene Züchter vorausahnend mitteilten.

Die blaue Färbung verschwand mit zunehmender Verfärbung immer mehr, das Grün trat immer stärker hervor, und schließlich blieb nur noch am Unterleib eine schwach bläuliche Färbung bestehen. Trotz dieser Enttäuschung war mir dieses Experiment hochinteressant. „Ich habe häufig," schreibt mir ein Liebhaber, „solche „blauen" Sittiche gezüchtet, nie hat sich die Farbe gehalten."

Meine Annahme, daß es reinblaue Wellensittiche überhaupt nicht gibt, ist jedoch irrig. Die Firma Odenwald, Fulda, bot mir reinblaue, d. h. himmelblaue Wellensittiche an. Leider waren sie bald (wohl ins Ausland) verkauft, Herr Otto Ludwig, Halle, soll ein solches Paar erworben haben und ist vielleicht so liebenswürdig, über die Färbung etwas an dieser Stelle zu berichten.

In der französischen Zeitschrift „L'Acclimatation" werden fast regelmäßig himmelblaue Wellensittiche angeboten, ebenfalls in belgischen Zeitschriften.

Fast alle Farbensittiche sind empfindlicher und hinfälliger als die Naturvögel. So berichtet Herr Freytag, Wiesbaden, im A. Z.-Jahrbuch, daß die blauen Wellensittiche des Londoner Zoos alle im Laufe des Winters eingegangen sind.

Auch meine oliv- und satingrünen Vögel sind hinfälliger als die grünen. In den letzten Wochen gingen mir drei Vögel an jener rätselhaften Schwindsucht oder Auszehrung ein, gegen die kein Kraut gewachsen ist.

Die Vögel werden schwächer und schwächer, das Brustbein wird spitz und spitzer, der Vogel schwindet dahin. Eifutter, Sonne, Wärme, alles war vergeblich, die Vögel gingen im Laufe von 3—4 Wochen ein.

Trotzdem habe ich von meinen Paaren reichliche Nachzucht erhalten. 21 junge Farbensittiche sind in meinem Besitz, und werden z. T. mit gelb und anderen Farben gepaart. Acht Tage alte Mischlinge, gelboliv, sind geschlüpft, Gefiederbeschreibung mache ich später bekannt.

Interessante Berichte über Farbensittiche erhielt ich von Herrn J. Henninger, Brüssel, welchem ich an dieser Stelle nochmals dafür bestens danke. Herr Henninger schreibt mir: „Die blaue Abart des Wellensittichs ist schön himmelblau an Stelle des Grün gefärbt. Die schwarzen Wellenlinien bleiben genau so wie bei den Grünen bestehen. Anders ist es bei den weißen Wellensittichen. Hier sind die schwarzen Wellenlinien ebenfalls weiß, aber mattweiß, nicht grau. Das Tier ist also ganz weiß, was grün war, ist glänzend weiß, und was schwarz, mattweiß.

Ich habe wohl schon an 80 Pärchen rein himmelblau (das Blau ist ein wunderbares Blau) gesehen in den Züchtereien Südfrankreichs. Möchte aber im Gegensatz zu Ihnen bemerken, daß die blauen Wellensittiche, wie auch die weißen, bedeutend kleiner als grüne und besonders gelbe sind. Eine Züchterei in Carbos hatte 1916 zirka 10 Pärchen blaue Wellensittiche zwischen ihren grünen und klagte der Züchter über die Hinfälligkeit. Dieselbe Klage hörte ich von Züchtern, die blaue Wellensittiche hatten.

Reizend ist der Anblick solch schön himmelblauer Vögel mit weißen Wellensittichen in einer Voliere, ich konnte mich nicht satt sehen.

Letzten Sonntag sah ich hier auf dem Vogelmarkt eine ganze Anzahl grüner Wellensittiche mit blauem Unterleib.

Kleinelsterchen. Heuglins Elsterchen.

Wellensittiche mit marineblauem Anflug hatte ich schon vor 15 Jahren gezüchtet, und hatte diese von Höfflin, Freiburg (Breisgau), der Großzüchter war, erhalten."

Hierzu möchte ich bemerken, daß ich nie behauptet habe, daß blaue Wellensittiche größer als grüne waren, da ich blaue Tiere noch nie besessen habe. Meine satingrünen dagegen sind stärker und größer als gewöhnliche grüne.

Aus diesen Mitteilungen ist jedenfalls zu ersehen, welche interessante Zukunft die Farbenzucht des Wellensittichs noch haben kann, wenn es uns gelingt, Zuchtmaterial zu bekommen. Die Farben grün, gelb, oliv, satin, hellblau, weiß und marine sind also einwandfrei erwiesen.

Ebenfalls interessante Mitteilungen verdanke ich Herrn Freytag, Wiesbaden.

„Ich fürchte", schreibt mir Herr Freytag in bezug auf meine „blauen" Wellensittiche, „daß Ihre Jungvögel, wenn völlig ausgefärbt, den blauen Schein verlieren. Der hellblaue Unterleib bleibt aber auch später noch bestehen. Die meisten meiner „blaublütigen" besitzen den hellblauen Unterleib, auch besitze ich zwei junge Weibchen, die schwach blau überpudert waren, doch sind dies noch keine blauen Wellensittiche.

Blaue Wellensittiche, wie ich sie in London sah, besitzen keine Spur von Grün oder Gelb, das Blau ist tief himmelblau und das Gelb am Kopf reinweiß, manchmal auch grau. Es sind wirklich herrliche Tiere. Ein Jade-Wellensittich gleicht dem gewöhnlichen gelben, doch sind die Eltern reinblau-gelb.

Ich habe meinen Jadesittich nun mit blaublütigem Weibchen gekreuzt, die Jungen sind grün mit hellblauem Unterleib."

Aus allen diesen Mitteilungen ist zu ersehen, ein wie ungeahnt weites Feld sich dem Farbenzüchter bei der Wellensittichzucht auftut. Hoffen wir, daß es uns bald vergönnt sein möge, Material zu erschwinglichen Preisen in unsere Käfige zu bekommen, und diese interessante Zucht bei uns mehr und mehr zunimmt.

Zuletzt möchte ich hier noch einige interessante Mitteilungen von Herrn Henninger, Brüssel, folgen lassen.

Betreffs des Mohrenkopfsittichs schreibt mir Herr H. in Anschluß an meinen Mohrenkopfartikel in Nr. 21 „Gef. Welt" 1922:

„Ich unterscheide zwei verschiedene Arten. Solche mit breitem, dickem Kopfe, und solche mit kleinem, elegantem Kopfe. Ich hielt erstere für Männchen, letztere für Weibchen.

Bis heute spricht mein Dickköpfiger zirka 40 Worte, auch pfeift er verschiedene Signale. Der Kleinköpfige blieb immer etwas scheu, lernte nicht sprechen, pfiff jedoch mit derselben Leichtigkeit. Als ich beide kaufte, glaubte ich in dem Dickköpfigen ein Männchen zu haben, in dem anderen ein Weibchen. Es stellte sich heraus, daß beide Weibchen waren.

Ich unterscheide drei Varietäten. Solche mit starkem Kopf und sehr langen Flügeln, solche mit kleinem Kopf und kurzen Flügeln, so daß sich die äußeren Federn kaum kreuzen, und solche, die in der Mitte beider stehen.

Die dick- und kleinköpfige Art finde ich immer in Marseille, die andere in Antwerpen.

Ein Sittich, der gut sprechen lernt, und ebenfalls sehr zahm wird, ist der kleine Alexandersittich, und zwar die Art, die aus Afrika stammt, mit der schwarzen Oberschnabelspitze.

Es sind hier auf dem Vogelmarkt: Soldatenstare, Braunkopfstärlinge, Kuhstare, Sonnenvögel, Blumenausittiche, Kanarienflügelsittiche, Guatemala-Amazonen, Graukardinäle, rote Kardinäle."

Soweit Herr Henninger. Vielleicht kann Herr H. einmal als Vermittler für uns Sittichliebhaber dienen,

und uns im Tauschverkehr Farben- und andere Sittiche beschaffen?

Außer den oben angeführten Farben in Wellensittichen sollen noch nach mir zugegangenen Mitteilungen in Frankreich kobaltblaue Sittiche gezüchtet werden. Es ist dieses anscheinend eine Nuance, welche zwischen hell- und dunkelblau liegt. Die Preise für diese Sittiche sollen noch doppelt so hoch sein, als für die himmelblauen. Ein Paar dieser Vögel dürften also heute einen Preis haben, wie im Frieden ein kleines Rittergut.

Leider drohen unserer schönen Exotenliebhaberei immer mehr Gefahren. Die Preise für Importen sind für den Durchschnittsliebhaber nicht mehr zu erschwingen, die Händler bieten Neuheiten gar nicht mehr an, in der richtigen Voraussetzung, daß sie doch nicht gekauft werden, und der Händler Zahlung in ausländischen Devisen haben muß, da er selbst in solchen bezahlt. Vogelfutter ist fast unbezahlbar, und so werden leider unsere Exotenbestände mehr und mehr zusammenschrumpfen.

Die Existenzmöglichkeit wird immer schwieriger, so daß eine Liebhaberei immer mehr zurücktreten muß. Hoffen wir, daß es nicht gar zu schlimm kommt, doch sind die Aussichten für unsere Liebhaberei trübe, trüber als mancher Liebhaber denkt. In kurzer Zeit wird kaum Vogelfutter unter 2- bis 300 M. per Pfund mehr aufzutreiben sein. Wer wird dann noch seine Lieblinge halten können?*)

Neueinführungen und Seltenheiten.

Von Karl Neunzig.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Der Anumbi ist ein kleiner schilfsängerartiger Vogel, der Gruppe der Buschkriecher angehörig. Er baut ein auffallend großes Nest aus verhältnismäßig großen Reisern auf einzeln stehenden höheren Bäumen im freieren Gelände. Mit großer Mühe holt der kleine Vogel die Reiser zum Nestbau heran, indem er sie mit dem Schnabel in der Mitte ihrer Länge ergreift und sie so, mühsam das Gleichgewicht haltend, zum Neste trägt. Das Nest hat eine Höhe von 50 cm und einen Durchmesser von 30 cm. Der Eingang zur unten gelegenen, mit Gras und Baumwolle gepolsterten Nistkammer befindet sich oben, und ein schräger oder spiralförmiger Gang führt zu ihr herab. Es ist klar, daß ein so großes, leicht auffindbares Nest gern von den Kuhstarweibchen zur Ablage des Eies benutzt wird. Meist haben die Weibchen damit große Eile, und das Anumbinest enthebt sie der Mühe, erst in Hecken und Gebüsch ein Nest suchen zu müssen, welchem sie das Ei anvertrauen können.

Der Rotachselkuhstärling ist später als die anderen Arten als besondere Art erkannt und beschrieben worden. Hudson erklärt (Proc. Z. S. 1873) das damit, daß man ihn, obgleich er ebenso zahlreich vorkomme wie der Seidenstar, mit diesem zusammenwarf und daß er infolgedessen lange Zeit unerkannt blieb. In seinem Brutgebiet Jahresvogel, streicht er in kleineren Flügen umher, die aber selbst im Winter nicht mehr als fünf bis sechs Vögel vereinigen, im Gegensatz zu nordamerikanischen Arten, die sich zu großen Flügen zusammenscharen. Einen einzelnen Vogel dieser Art bekomme man aber auch nicht zu Gesicht. Eine seiner hervorstehendsten Eigenschaften ist ein ungewöhnliches Hasten bei allen seinen Bewegungen und sein geräuschvolles Benehmen. Wenn er von einem Zweig zu einem anderen hüpft, so erschüttern zuckende Bewegungen seinen ganzen Körper unter heftigem Aneinanderschlagen der Flügel. Bei der Rückkehr von einem Besuch der Felder kommt die Schar in wildem, sausendem Flug kreischend einher, um sich in den Zweigen eines Gebüsches oder eines Baumes niederzulassen. Man möchte glauben, die Vögel wollten sich vor einem sie verfolgenden Raubvogel retten. Wie ihre Bewegungen sind auch die von ihnen hervorgebrachten Laute jäh und unverbunden. Das Männchen versucht allerdings, wenn auch selten, anscheinend unter großer Anstrengung, eine Art von Gesang hervorzubringen. Es werden aber nur ein paar kurze unmelodische Töne hörbar. Mit einem schmatzenden Ruf lockt er das Weibchen, wie Hudson sagt, mit einem Laut, der so klingt, als ob jemand einem einen lauten, recht herzhaften Kuß gibt. Der einzige angenehme Ton, den er hervorbringt, ist der Warnruf in der Zeit der Fortpflanzung. Am häufigsten und charakteristischsten für den Rotachselstärling ist ein Ruf, der anfänglich hohlklingend gebracht wird und dann zu einem scharfen metallisch klingenden Ton anschwillt. Beim Hervorbringen dieses Rufes wird das ganze Gefieder gesträubt, ähnlich dem Gebaren eines balzenden Truthahns, die Flügel und der Schwanz hängen dabei gebreitet nach unten, dabei springt der Vogel tänzelnd auf und nieder. Diesem Balzgesang des Männchens folgt unmittelbar ein kreischender Ruf eines Weibchens, hart und unangenehm. Dabei hat man den Eindruck, als ob auch dieses Gekreisch von dem Männchen hervorgebracht wird.

Ein Gesangsliebhaber wird nach allem über den Besitz des seltenen Vogels nicht gerade erfreut sein. Aber auch dem Vogelfreund, der den doch recht interessanten Vogel hält, wird die Freude beeinträchtigt durch den ziemlich strengen Moschusgeruch, der von dem Vogel ausgeht und der ja auch sonst bei größeren Stärlingen die Annehmlichkeit ihrer Haltung nicht gerade erhöht.

Seine Ernährung ist nicht schwierig. Er ist in der Freiheit fast ausschließlich Körnerfresser. Gelegentlich verzehrt er auch Kerfe, besonders Käfer und Spinnen.

Daß der Stärling Brutparasit ist, ist eingangs erwähnt. Ein nicht gerade schätzenswertes Verhalten zeigt er aber darin, daß er seine Eier nicht nur von anderen ihm fernstehenden Vögeln erbrüten läßt, sondern daß er auch die Nester seines Vetters, des Braunkuhstärlings, der ja nicht oder wenigstens nicht immer Brutparasit ist, mit seinen Eiern belegt und ihm die Erhaltung der Art Rotachselstärling wenigstens z. T. überläßt.

*) Die Arbeit ist um die Mitte des vorigen Jahres geschrieben. Daß sich inzwischen die Verhältnisse geändert haben und wir mit ausländischen Vögeln reichlich versorgt sind, ist den Lesern bereits bekannt. N.

Im Jahrgang 1922 unserer Zeitschrift berichtet unser geschätzter Mitarbeiter Herr Dr. Adlersparre über

Heuglins Elsterchen — Spermestes scutata (*Heugl.*)

und bringt auch photographische Abbildungen des Vogels, der sich vom bekannten Kleinelsterchen nur durch das Fehlen der stahlgrünglänzenden Flecke auf den Brustseiten unterscheidet. Seine Verbreitung erstreckt sich über Ostafrika von Abessinien bis Natal, Angola. Im Wesen scheint es sich wenig vom Kleinelsterchen zu unterscheiden. Es lebt in kleinen Familien von 4—8 Stück. Die Flüge halten eng zusammen und schwärmen nach Heuglin, emsig Grassamen suchend, beständig umher. Sie fliegen dicht beieinander in raschem Fluge unter blitzschnellen Wendungen und Zickzackbewegungen zur Tränke, wo sie schwatzend baden, um dann wieder ihre Standorte aufzusuchen. Diese sind nach der Natur ihres Verbreitungsgebietes sehr verschieden. Böhm sah sie nach beendetem Nisten unter lustigem Gezirpe in den Feldern umherschwirren, Heuglin fand sie in Westabessinien im Bambusgebüsch, und im Inneren mehr im Hochgrase und auf niedrigen Bäumen in der Nähe von Lichtungen und Büschelmaisfeldern. Das kunstlose aus Gras und Rispen gebaute Nest steht auf dornigen Bäumen (Mimosen u. dgl.). Heuglin sah sie namentlich in den Abendstunden, hart aneinandergedrängt, schwirrend und schwatzend auf schwankenden Zweigen sitzend. Grote und andere berichten, daß das Nest des Elsterchen häufig auf Bäumen oft unmittelbar in der Nähe von Wespennestern gebaut ist. Im Wesen und Benehmen ist es kaum verschieden von dem bekannten Kleinelsterchen (s. Abb. S. 37).

(Fortsetzung folgt.)

Mit einem „Fockelmannschen" Tiertransport.

Von Rudolf Ewald.

(Nachdruck verboten.)

Am 3. Dezember 1923 bestieg ich in Lissabon den Dampfer „Madeira" zur Rückfahrt nach Hamburg.

Als mein Kabinensteward den von mir aus Lissabon mitgebrachten Graupapagei erblickte, erzählte er mir, daß in Bahia (Brasilien) im Vorderschiff ein großer Tiertransport der Firma August Fockelmann, Hamburg-Großborstel, untergebracht worden wäre. Keine Nachrichten hätten mir größere Freude bereiten können, da es schon längst mein Wunsch war, einen derartigen Transport mitmachen zu können.

Schnell brachte ich mein Gepäck in meiner Kabine unter und begab mich dann auf die Suche nach dem Transport. Der Weg war leicht zu finden, denn schon von weitem hörte man das Geschrei der Papageien. Durch eine Luke gelangte ich in den großen Raum, in dem der Transport fachmännisch verstaut war.

Es bot sich mir nun ein eigenartiger Anblick. An kleinen Bänken saßen Hunderte von grünen Papageien (Blaustirnamazonen), teils beim Futtern, teils einen heidenmäßigen Lärm vollführend. Erst allmählich konnte ich mich an die Umgebung und insbesondere an den Lärm gewöhnen.

Dank dem liebenswürdigen Entgegenkommen des Transportführers und Pflegers, Herrn Eggert, war es mir möglich, mich täglich während der etwa acht Tage dauernden Seereise beim Transport aufzuhalten und viel Interessantes und Wissenswertes zu erfahren.

Und es war interessant! Waren die angeketteten Papageien an sich schon komisch, so ging doch nichts über eine ausgesuchte Gesellschaft von vier Stück, die an einer einzelnen Bank angekettet waren. Man glaubte sich in eine äußerst lebhafte Kaffeegesellschaft versetzt, denn solch ein Schwadronieren, Drehen, Wenden könnte meiner Ansicht nach nur noch von einer überaus angeregten Kaffeegesellschaft übertroffen werden. Und wie konnten die Kerle lachen! Ein Menschenfeind hätte hier nicht widerstehen können.

In den großen, an den Seiten des Raumes aufgestellten, sehr praktischen Käfigen befanden sich viele Hundert Weich- und Körnerfresser, unter denen sich, wie aus nachstehender Aufstellung hervorgeht, viele Seltenheiten befanden. Es waren vertreten: 150 div. Kaktus-, Goldstirn-, Gras- und Yendayasittiche, über 100 blaubürzelige Sperlingspapageien, 400 Purpur-, Palm-, Meerblaue- und Trauertangaren, 50 Organisten und viele kleine seltene Tangarenarten, wie Siebenfarbige-, Isabell-, Maskentangaren, viele Gelb- und Rotsteißkassiken, schwefelgelbe Tyrannen, sowie Jamaikatrupiale, einige 100 verschiedene kleine Täubchen, Dominikanerkardinäle, Saffranfinken, Ammern, Seiden- und Braunkopfstare, Kronfinken und Pfäffchen, 1 Hyazintharara als große Seltenheit, rote Arara und außerdem Raubvögel, Schlangenreiher, Strauße und div. Wassergeflügel.

Herr Eggert hatte den Versuch unternommen, drei Kolibris durchzubringen. Dieser Versuch wäre auch wohl gelungen, wenn wir nicht in der Biskaya mehrere Tage sehr schweren Sturm gehabt hätten. Erst in Rotterdam ist der letzte Kolibri eingegangen.

Für mich besonders interessant waren noch über 100 verschiedene Drosseln, wie Kehlstreif-, Rotbauchdrosseln, Küstenspötter usw. Ein anderer Hamburger Liebhaber und ich haben von diesen Drosseln verschiedene erworben, doch sind wir uns nicht darüber klar, um was für Drosseln es sich handelt. Die im „Neunzig" angeführten Beschreibungen wollen nicht so recht passen. Eine Drossel ist bei mir schon im sehr lauten Gesang, der äußerst angenehm wirkt. Ich werde mir erlauben, evtl. später auf die Erfahrungen zurückzukommen, die wir mit diesen Drosseln gemacht haben.

Ferner führte der Transport an anderen Tieren noch mit: Affen, große Schlangen, große Echsen, Chamäleons usw.

In Rotterdam kam der Inhaber der Firma August Fockelmann an Bord, um den Transport in Empfang zu nehmen und den größten Teil direkt nach England weiter zu verladen. Auch Herrn Fockelmann möchte ich an dieser Stelle meinen Dank für sein Entgegenkommen aussprechen. Als Liebhaber dürfte es interessieren zu erfahren, daß die Firma August Fockelmann jetzt 11 Reisende zum Ankauf und Herüberbringen von Vögeln im Auslande unter-

wegs hat, und daß in diesem Jahre mit verschiedenen großen Transporten aus Argentinien, Süd-, Mittel- und Nordbrasilien, Mexiko-Cuba, sowie Vorderindien und Südafrika gerechnet werden kann. Im ganzen hat die Firma August Fockelmann allein aus Bahia 28 Transporte erhalten, und zwar bereits 5 Transporte mit Dampfer „Madeira".

Als Liebhaber habe ich mit ganz besonderer Genugtuung festgestellt, daß alle Tiere in einwandfreien, vor allem sehr sauber gehaltenen Käfigen untergebracht waren (seltene Tangare usw. in besonderen Käfigen), und daß auch die Fütterung individuell, reichlich und sehr kräftig verabreicht wurde, so daß die Verluste auf diesem Transport verhältnismäßig gering waren. Dieses dürfte vor allem auch der Liebe und Sorgfalt, mit der sich Herr Eggert der Tiere angenommen hat, zu verdanken sein.

Jedenfalls ist ein solcher Transport, wie ich ihn kennen gelernt habe, was Sauberkeit und Sorgfalt anbetrifft, als ein Mustertransport anzusehen und zweifellos ein Ruhm für deutsche Tüchtigkeit und Tatkraft.

Kleine Mitteilungen.

Sind die Sperlinge Finken- oder Webervögel? Die meisten, d. h. fast alle Ornithologen rechnen die Sperlinge als ganz selbstverständlich zu den Finkenvögeln (Fringillidae). Es hat aber schon seit langem einzelne Forscher gegeben, welche in unseren Spatzen Vertreter der altweltlich-tropischen Familie der Webervögel (Ploceidae) sahen. Als einziger durchgreifender Unterschied zwischen Finken- und Webervögeln gilt das Fehlen bzw. Vorhandensein einer 10. Handschwinge, d. h. eigentlich der ersten, nämlich der äußersten. Den Finken fehlt diese, die Weber besitzen sie, und zwar in bald stärkerer, bald schwächerer Ausbildung. Die Sperlinge nun besitzen diese erste Handschwinge, wenn auch nur in schwacher Ausbildung, so doch immerhin ganz deutlich, und sie müßten auf Grund dieses Merkmals zu den Webervögeln gerechnet werden. Unter den Finken belassen, bilden sie die „Ausnahme von der Regel". In der Lebensweise unterscheiden sich die Finken von den stets gesellig, in großen Scharen lebenden Webern dadurch, daß sie zur Brutzeit einsam paarweise leben und erst im Herbst sich zu etwas größeren Gruppen zusammenschließen und umherstreifen. Auch in dieser Lebensweise unterscheiden sich die eigentlichen Finken deutlich von den Sperlingen, die, wie allgemein bekannt, immer, auch zur Brutzeit, sehr gesellig sind und hierin den Webern gleichen. Die Finken bauen ferner offene muldenförmige Nester, während die Sperlinge stets in der Art verschiedener Webefinken (Ploceinae, Spermestinae) große runde, kugelförmige, oben geschlossene Nester mit seitlichem Zugang errichten. Besonders deutlich wird diese webefinkenartige Nistweise bei dem Weidensperling (Passer hispaniolensis), während unser Haussspatz dort, wo er es vorfindet, Baum- und Mauerlöcher bezieht, sonst aber auch runde, oben geschlossene Nester errichtet. Ein Sperling (Philaetherus socius) wurde seiner kolonieartigen Nistweise sogar früher von den anderen Sperlingen getrennt und den Webern zugerechnet, obwohl er doch ein ganz echter Spatz ist. Auch die Stimme der Sperlinge hat mit der gewisser Webervögel viel größere Ähnlichkeit als mit irgendeiner Finkenstimme! Besonders das allgemeine „Schilpen" ist ganz weberartig und findet bei den Finken nichts Gleichartiges. Wer Webervögel, Flammenweber z. B. und gewisse Prachtfinken, draußen in der Freiheit beobachten konnte, wird mir beistimmen, wenn ich behaupte, daß das ganze Betragen dieser Vögel ungemein sperlingsähnlich ist. Andererseits erinnern in der Gefangenschaft gehaltene Sperlinge in ihrem ganzen Wesen weit mehr an die Weber als an die echten Finken. Wenn man Finken und Weber überhaupt trennen und in zwei Familien sondern will, was wohl doch zu empfehlen ist, so müßte man m. E. die Sperlinge unbedingt zu den Webervögeln stellen, wohin sie ihrer Körpergestaltung nach, sowie durch ihre Lebens- und Nistweise und ihr ganzes Betragen und Gebaren ganz natürlich hingehören.

Hans v. Boetticher.

Über Eingewöhnung von Erlenzeisigen. Seit längerer Zeit schon habe ich Gelegenheit, Erlenzeisige einzugewöhnen. Durch Erfahrung in der Eingewöhnung dieser Vögel kann ich wohl behaupten, daß nicht, wie in vielen Büchern zu lesen ist, Mohn, sondern Erlensaat dabei unumgänglich nötig ist. Hauptsächlich bei den Männchen hatte ich das Unglück, daß mindestens die halbe Anzahl der Frischlinge nicht gleich Mohn fraßen. Ich fütterte zuerst immer Mohn, Spitz-, Lein- und Negersaat. Dabei bemerkte ich, daß die Vögel nur eine Unmenge Leinsaat fraßen, wahrscheinlich weil der Same die braune Farbe der Erlensaat hat. Am nächsten Morgen saßen die Zeisige dick. Über Nacht hatten sie erbrochen, weil sie den vielen, fetten Samen nicht vertragen konnten, und nur dadurch, daß ich einige Tage hindurch ihnen Erlensamen gab, erhielt ich sie am Leben. Nach und nach erst fingen sie an, Mohn zu fressen. Ich denke mir, daß die Tiere die Saat nicht kennen und sie deshalb auch nicht eher fressen, als bis sie sie nach einigen Tagen kennen gelernt und probiert haben. Selbst wenn ich die Frischlinge mit eingewöhnten Zeisigen zusammen in die Voliere setzte und ihnen Mohn gab, so sahen sie die Tiere um sich herum Mohn fressen und selbst fraßen sie keinen, sondern hungerten lieber. Hat jemand Ähnliches bei Zeisigen beobachtet? Herm. Bösel.

Ein **Schizochroismus vom Blumenaufsittich** (Tirica tirica *(Gm.)*) wird im Revista do Museo Paulista Tomo XII, 1920 S. 81 beschrieben und abgebildet. An Stelle der grünen Gefiederfärbung, die beim Blumenaufsittich vorherrscht, ist blau getreten. Es fehlt das gelbe Pigment. Ein ähnlicher Fall ist die Färbung der blauen Wellensittiche. R. N.

Sehr oft litten im vorigen Jahre meine Vögel an **Legenot.** Ich habe durch ein einfaches Mittel die Vögel vor dem sicheren Tode gerettet. Sobald ich sah, daß ein Weibchen an Legenot litt, griff ich es aus seinem Käfig heraus, nahm es in die hohle Hand, blies die Federn vom Bauche weg und ließ langsam einige Minuten kaltes Wasser auf den Bauch tropfen. Nach etwa einer Stunde konnte der Vogel das Ei legen, welches leider fast immer entzwei ging. v. Z.

Aus den Vereinen.

A. Z. Angemeldet sind die Herren: Rudolf Neunzig, Hermsdorf b. Berlin, Neue Bismarckstr. 42; Graf von Leutrum, Nippenburg, Post Schwieberdingen, Württbg.; Wilhelm Casteel, Laurensberg b. Aachen; Rudolf Ewald, Prokurist, Wandsbek b. Hamburg, Mansteinstr. 11; Arnold G. Weber, Hamburg 1, Raboisen 56; Paul Göbel, Oschersleben a. Bode, Bruchstr. 25; Artur Zielowski, Köppelsdorf b. Sonneberg i. Thür., Kurgarten; H. Brandes, Redakteur, Halle a. S. (Nochmalige Adressenangabe erbeten); Heinrich Sauer, Kaufmann, Sundern, Kr. Arnsberg, Hauptstr. 103. — Aufgenommen sind die Mitglieder Nr. 358 H. Schröder, Tierarzt, Treptow a. d. Tollense; Mtgl. 359 Kurt Wermbter, Dr. med. vet., Hamborn a. Rh., Kaiser-Friedrich-Str. 103; Mtgl. 360 R. Langenbuch, Siems b. Lübeck, Post Waldhusen; Mtgl. 361 Erwin Zaar, Friedek i. Ostschl. (Tschechoslowakien), Stadtplatz 9; Mitglied 362 Rudolf Müller, Gemeinderat, Wien V, Margaretenstraße 166; Mtgl. 363 Richard Müller, Kaufmann, Schwenningen a. N., Spittelstr. 9. — Wieder beklagen wir den Tod eines Mitgliedes; Herr Albert Kaiser, Todtnauberg, Mtgl. Nr. 128, verstarb nach schwerer Krankheit in Luzern. — Im Mitgliederverzeichnis bitte ich eine Änderung vorzunehmen: Mtgl. 8 Erlemann, Wiesbaden; Mtgl. 9 Johann Fritzen, Mannheim-W., U. d. Birken 19; Mtgl. 97 Herm. Gilges jr., Neuß a. Rh., Büchel 52/54; Mtgl. 319 wohnt jetzt Kongevijen 98. — Ende März/Anfang April soll anläßlich des Eingangs eines großen Südafrikatransportes eine zwanglose Zusammenkunft in Hamburg stattfinden. Da der Termin noch nicht feststeht, eine öffentliche Bekanntmachung an dieser Stelle vorher kaum recht-

(Fortsetzung auf der 3. Umschlagsseite.)

zeitig möglich sein wird, so bitte ich diejenigen Mitglieder, die sich an der Hamburgfahrt beteiligen möchten, dies durch Postkarte kundzutun. Die Benachrichtigung und Programm wird dann mittels Drucksachenkarte zu gegebener Zeit erfolgen. A. Krabbe.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei zu Hamburg. 1. Vorsitzender Arnold Weber, Raboisen 56. Geschäftsstelle daselbst. 1. Schriftführer Herr R. Evers, Hamburg, Friedrichsberger Str. 47. — Sitzungen jeden 1. und 3. Dienstag im Monat, abends 8¼ Uhr, in Hüttmanns Hotel, Hamburg, Ecke Poolstraße und Holstenplatz. Der Verein bietet stets interessante Aussprachen sowie regelmäßig Vorträge und Vorlesungen aus der Ornithologie. Gäste sind stets willkommen. Beiträge monatlich G.M. 0.50.

Vereinigung der einh. Waldvogelliebhaber von Görlitz und Umgegend. Am 19. Januar d. Js. feierte obige Vereinigung ihr 2. Stiftungsfest im Hotel „Brauner Hirsch", Görlitz. Es war dies eine Feier, wie man sie von echten Vogelliebhabern gewöhnt ist und echte Vogelliebhaber charakterisiert. Nachdem einige ansprechende Musikstücke die Veranstaltung eingeleitet hatten, gelangte ein von unserem verehrten Mitglide Herrn Photograph Jäschke sinnreich verfaßter Prolog „Rübezahl und Elfchen" von Fräulein Lücker und Herrn Klupsch jun. zum Vortrag, für welchen sie reichen Beifall ernteten. Auch die Ansprache unseres 1. Vorsitzenden Herrn Lücker verdiente besondere Anerkennung. Er entrollte ein fesselndes Bild des ganzen Werdeganges und Aufbaues der Vereinigung. Die Vorzüge, die uns Vogelliebhabern vor andern Sterblichen innewohnen, wurden von Herrn Lücker in besonders warmherzigen Worten zum Ausdruck gebracht. Er ermahnte ferner, das große angefangene Werk des Zusammenschlusses aller Vogelliebhaber Deutschlands fest im Auge zu behalten und uns durch nichts von dem einmal beschrittenen Wege abbringen zu lassen, denn nur Einigkeit macht stark. Weiter erwähnte der Redner, daß es nicht nur unsere Pflicht und Parole sei, die edle Liebhaberei zu fördern, sondern wir haben es uns auch zur Aufgabe gemacht, uns intensiv an der Durchführung eines zweckentsprechenden Vogelschutzes zu betätigen. Nachdem Herr Lücker noch unserem Bruderverein aus Weißwasser, welcher unserer Einladung Folge geleistet hatte, ein herzliches Willkommen zurief, schloß er seine zu Herzen gehende Rede mit dem Wunsche, daß die Vereinigung weiter blühe und gedeihe. Anhaltender Beifall der Festversammlung war der Lohn für die treffenden Worte unseres 1. Vorsitzenden. An dem guten Verlauf des Abends haben auch noch verschiedene Mitglieder Anteil durch das Vortragen von Ernstem und Heiterem, vor allem an dem Gesangsduett „Die drei Vogelhändler", verfaßt von Herrn Lücker. Auch hier erntete er reichen Beifall. Den Hauptvogel des Abends schoß natürlich ein Schauspieler vom hiesigen Stadttheater, Herr Plusche r, ab durch seine sämtlichen sehr gut gelungenen Aufführungen. Einen besonders schönen Anblick bot die Verlosungstafel. Nachdem die Verlosung zu Ende war, war es an der Zeit, das Tanzbein zu schwingen, und die Teilnehmer kamen voll und ganz auf ihre Rechnung. Erst in vorgerückter Stunde trennte man sich mit dem Bewußtsein im Herzen, den anwesenden Gästen gezeigt zu haben, was Idealismus zu leisten vermag und auch die Ansicht so manchen stillen Gegners beeinflußt zu haben. Auch an dieser Stelle sei allen Mitwirkenden, welche den Abend verschönern halfen, viel Dank ausgesprochen; insbesondere aber gebührt der Dank der Vergnügungskommission, speziell aber Herrn Jäschke, welcher sich die größte Mühe gegeben hat, um uns ein paar genußreiche Stunden zu bereiten. — Ferner hatte die oben bezeichnete Vereinigung am 26. Januar d. Js. im Vereinslokal „Zum Schwobeland" ihre Generalversammlung abgehalten. 1. Jahresbericht für 1923. Bei Beginn des Jahres 1923 hatte die Vereinigung eine Mitgliederzahl von 26, neu eingetreten sind im Laufe des Jahres 5, ausgeschieden 2, so daß gegenwärtig die Mitgliederzahl 29 beträgt. In dem verflossenen Vereinsjahr wurden den Mitgliedern eine größere Anzahl interessanter und belehrender Vorträge geboten. Vereinsversammlungen fanden 11 statt. Es wurden zwei Ausflüge unternommen. Ferner wurde auch die Vereinsbibliothek durch Stiftung einiger Bücher wieder etwas erweitert. 2. Vorstandswahl. Der bisherige Vorstand wurde einstimmig wiedergewählt und besteht derselbe aus folgenden Herren: 1. Vorsitzender W. Lücker, Mühlweg 14; 2. Vorsitzender A. Klupsch, Gobbinstraße 3; 1. Kassierer A. George, Bahnhofstraße; 2. Kassierer P. Tomaszewski, Melanchtonstraße; 1. Schriftführer E. Rothe, Goethestraße 24; 2. Schriftführer Seibt, Brautwiesenstraße; Bibliothekar A. Joppa, Obermarkt; Beisitzer A. Jäschke, Postplatz, Mummert, Gartenstraße; Kassenprüfer Kubon, Breite Straße; B. Picka, Prager Straße. 3. Beitragsfestsetzung. Der monatliche Beitrag beträgt gegenwärtig 40 Goldpf. und das Eintrittsgeld 2 Gmk. 4. Verschiedenes. Die Versammlung beschloß, am 2. Februar im Vereinslokal einen Katerbummel zu veranstalten, und zwar in Form eines kleinen Kostümfestes. Zu der am 8. März stattfindenden Monatsversammlung hat sich Herr Jäschke bereit erklärt, einen Vortrag mit Lichtbildern über unsere gefiederten Lieblinge zu halten. Nachdem noch verschiedene Fragen ihre Beantwortung fanden, schloß der Vorsitzende die Sitzung um 11 Uhr.

Görlitz, den 1. Februar 1924.

Erich Rothe, Schriftführer.

Verein der Vogelfreunde Leipzig-Plagwitz. Vereinslokal „Gosenschlößchen", Leipzig-Plagwitz. Sitzungen finden jeden 1. und 3. Montag des Monats, abends 8 Uhr, daselbst statt Vogelfreunde sind jederzeit willkommen.

Karl Scholtissek, 1. Vorsitzender,
Leipzig-Plagwitz, Lauchstädter Str. 30.

Vom Vogelmarkt.

Von seltener auf den Vogelmarkt kommenden Vögeln werden angeboten:

W. Hiltmann, Zoologische Handlung, Berlin S 14, Dresdener Straße 24: Schamadrosseln, Goldstirnblattvögel, grauer Kardinal, Singdrosseln, Gartenrotschwanz, Safranfinken, Berghänflinge, Sonnenvögel, Rot- und Blaukehlchen, Feld- und Heidelerchen, Haus- und Gartenrotschwänze, Bachstelzen, Pieper- und Schmätzerarten, Sprosser, Nachtigallen, Gelbspötter, Würger, Sperber, Mönch-, Garten-, Dorn- und Müllergrasmücken.

Hirsch, Aubstadt (Unterfr) A. Z. Mtgl. 233: Stieglitzkanarienhähne und -weibchen.

M. Kleinert, Berlin, Strausberger Str. 13: Schamadrosseln, Dayaldrosseln, Rotohrbülbül, Goldstirnblattvögel, chin. Nachtigallen, Kardinäle, gelbe Wellensittiche.

Hans Kramer, Heidewilxen, Post Obernigk (Schl.): Zahme Dohle.

E. W. Lenger, Berlin N 58, Schönhauser Allee 70a: Rote Kardinäle, Spottdrosseln, Katzendrosseln, Trupiale, Kubatangare, Pabstfinken, Orangeblaufinken, Kubafinken, Schwarzbrustzeisige, Karmingimpel, Lerchenfinken, Zedernvögel, abessin. Glanzstare, Chopistare, Seidenstare, Gelbbauchammern, Saffranfinken, abessin. Bartvögel, Schwarzwangenbülbül, Goldaugentimalien, ind. Kronenmeisen und Bergmetsen, Elfenbeinsittiche, Sperlingspapageien, tarant. Unzertrennliche.

Karl Reich, Bremen, Am Wall 171: Nachtigall-Edelkanarien, weiße und hermelingezeichnete.

Schlößchen Allersberg b. Nürnberg: Eichelhäher.

E. Schönoube, Zoolog. Handlung, Berlin N 4, Elisabethkirchstraße 1: 1 Wachtel.

A. Troschütz, Hannover, Gr. Aegidienstraße 4; 2 Wachteln, 1,0 Feldsperling, 1.0 Braunelle, 0,1 Haubenlerche, 1 Drosselrohrsänger, 1 Flußregenpfeifer.

Max Wischendorff, Lübeck: 1,0 Ohrflecktaube.

An die Leser!

Die Rätsel des Vogelzuges. Der Vorsitzende der Deutschen Ornithologischen Gesellschaft, Friedrich von Lucanus, hält am Montag, dem 17. März, abends 8 Uhr, im Hörsaal der Urania, Berlin, Taubenstraße 48, einen Vortrag über die **„Rätsel des Vogelzuges"** mit Lichtbildern von der Ausführung der Vogelberingung, den Zugwegen der Vögel und den Vogelwarten Rossitten und Helgoland. Der Vortragende wird über die neuesten Forschungen des Vogelzuges, die mit Hilfe der Luftfahrt und Vogelberingung erreicht sind, ausführlich berichten.

Schamadrosseln, Dayaldrosseln, Goldstirnblattvögel, Blaubärtige Blattvögel

Rote Kardinäle, Spottdrosseln, Kubatangaren, große und kleine Kubafinken, Lerchenfinken, abessinische Bartvögel, tarant. Unzertrennliche, Singsittichweibchen, Elfenbeinsittiche, grüne Wellensittiche, Saffranfinken, Textorweber, Orixweber, Schönbürzelchen, Grauedelsänger.

168] Reflektanten erteile gern Preisauskunft. Fernruf Humbold 5730.

E. W. Lenger, Berlin N 58, Schönhauser Allee 70 a

Futtermittel

Sämtl. Sämereien sind in eigener Anlage maschinell gereinigt und nicht mit üblicher Handelsware zu vergleichen.

Ameiseneier	1 kg ℳ 8.—	
	1 Postpkt. franko inkl.	pro 50 kg
Kanariensamen (Glanz)	4.20	28.—
Karottengrieß	14.30	130.—
Charpie, weiß	13.30	120.—
„ grau	6.30	50.—
Erdnüsse	5.30	40.—
Hanfsamen	6.10	48.—
Hafer, geschält	3.60	22.—
Hafergrütze	3.80	24.—
Hirse, gelbe	3.—	16.—
„ Senegal	4.20	28.—
„ geschält, Ia	3.40	20.50
„ Leinsamen	4.20	28.—
Mohn, blau prima	6.10	48.—
Negersamen	4.20	28.—
Reis (Bruchreis)	3.30	19.50
Rübsamen I	4.40	30.—
„ II	4.20	28.—
Sonnenblumenkerne	4.—	26.—
Elbsand, gesiebt	—.—	3.—

Ossa-Sepia, 12—14 cm 10 Stck. —.75, 100 Stck. 6.—
Ossa-Sepia, 14—16 cm 10 Stck. 1.40, 100 Stck. 12.—
Ossa-Sepia, 16—18 cm 10 Stck. 1.80, 100 Stck. 16.—
Kanarienkorbuester 1 Dtz. 1.—, 10 Dtz. 9.—
Fischnetze 1 „ 1.10, 10 „ 10.—

Sinnfutter	4.40	30.—
Papageienfutter	5.30	40.—
Waldvogelfutter	4.40	30.—
Stieglitz- u. Zeisigfutter	5.30	40.—
Prachtfinkenfutter	4.40	30.—
Sittichfutter	4.40	30.—
Weichfutter für Insektenfresser mit Ameiseneiern	7.30	60.—

Bei allen Aufträgen ist Lieferungsmöglichkeit vorbehalten. Die Preise verstehen sich rein netto Kasse, ab Lager hier, in Goldmark. Zahlung sofort bei Empfang der Rechnung. Postpakete per Nachnahme. [169

H. Fockelmann,
Hamburg 6, Catharinenstr. 25.
Gegründet 1863.
Postscheckkonto Hbg. 9632.

Kolbenhirse . .	**Pfund**	1,20 ℳ
Senegalhirse . .	„	0,80 ℳ
Weißwurm . .	„	6,00 ℳ
Muska	„	7,00 ℳ
Ameiseneier (deutsche)	„	6,00 ℳ
Weichfutter, prima Qualität . .	„	1,00 ℳ
Weichfutter (Primus)	„	2,75 ℳ

Hanf, Rübsamen, Spitzsamen, Kantussamen, Mohn, Negersamen, Sonnenblumenkerne, Erdnüsse, Zirbelnüsse, Karottengrieß, Agavefasern zum Anfeuchten für Weichfutter liefert zu den billigst berechneten Tagespreisen

C. W. Lenger, Berlin N 58,
Schönhauser Allee 70 a. [170

Schamadrosseln, Dayaldrosseln, Rotohrbülbül, Goldstirnblattvögel, Schlagende chin. Nachtigallen, Kardinäle, Wellensittiche, grün u. gelb, verkauft billig

M. Kleinert, Berlin, Straussberger Str. 13.
Alex 3313 [171

Ein Urteil über Anzeigenwirkung der „Gefiederten Welt"

Wir freuen uns, daß die „Gefiederte Welt" endlich wieder erschienen ist, denn wir waren mit dem Erfolge der Inserate immer sehr zufrieden, nehmen Sie deshalb in die nächste Nummer bitte folgendes Inserat auf: . . .

Vogelfutter

Sommer-Rübsen, beste Qualität, à Pfund 0,35 ℳ
Kanariensaat, Marokko prima à Pfund 0,35 ℳ

Mohnsaat, blau, bester,	à Pfd.	0,44 ℳ
Sonnenblumenkerne	„ „	0,35 ℳ
Erdnüsse, große China	„ „	0,45 ℳ
Zirbelnüsse, neue	„ „	0,65 ℳ
Negersaat, prima	„ „	0,35 ℳ
Hirse Senegal, das Beste	„ „	0,40 ℳ
Hirse Marokko für Sittiche und größere Finken	à Pfd.	0,30 ℳ
Karottengrieß, schön rot	„ „	1,50 „
Mohnmehl,	„ „	0,30 ℳ
Ameiseneier, prima	„ „	4,50 ℳ
Zwiebackmehl, rein	„ „	0,45 ℳ
Ossa-Sepia-Schalen	à Stück	0,11 ℳ

(für Weichfutter)

Auch alle Sorten Mischfutter für jeden einheimischen sowie ausländischen Vogel, ob Körner- oder Weichfresser, in nur besten Qualitäten.

Es kommen nur rein gesiebte Saaten in besten Qualitäten zum Versand. Zu den obigen Preisen kommt beim Postversand noch Porto hinzu, Verpackung ist in dem Preise einbegriffen. Bei größeren Mengen, eventuell Vereinsbezügen, komme ich mit Sonderofferte weitestens entgegen. [172

H. Bäke, Hildesheim.

Reichenow,

Papageien

sucht [173

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg. Postschließfach 148.

„Ornis"

Freie Bezugs-Vereinigung der Waldvogel-Liebhaber Deutschlands

bestand von 1912 bis 1. Oktober 1920. Durch **sachgemäße** und **reelle** Belieferung der Mitglieder mit **Vogelfutter** und **Bedarfsartikeln** erwarb sie sich einen Ruf, der noch fortbesteht. — Auf **vielseitigen** Wunsch bringe ich diese Tatsache in Erinnerung, auch allen denjenigen, die von dem Bestehen derselben noch keine Kenntnis haben. — Das Ornis-Haus ist nach wie vor bestrebt, die besten von allen am Markt erhältlichen Artikel zu liefern; das mir geschenkte Vertrauen werde ich weiter zu erhalten wissen. — Über meine Tätigkeit gibt das **„Ornis-Buch"** Auskunft. Bei Anfragen erbitte ausreichendes Rückporto und Angabe der vorhandenen Vogelarten. — Auskunft bereitwilligst.

Ornis-Haus, Halle a. S.
Fernruf 4198 [174

„Reform-Normal"-Weichfutter nach Angaben des Herrn Apotheker Adalbert Jena-Biberach-Riß. Moderner elektr. Betrieb. Gleichmäßige Körnung, restloser Verbrauch garantiert.

„ORNIS Buch" (90 S.) M. 1.—

Biete an:

M. Brisson, Ornithologie, Paris 1760. Band 1—5. Mit 207 prachtv. Kupfern. 200 M. **Naumann,** Allgemein. Teil. Gera 1905. 15 M. Band I: Drosseln inkl. Tafelband 25 M. Grasmücken, Timalien, Meisen, Baumläufer 25 M. Lerchen, Stelzen, Waldfänger, Finkenvögel 25 M. Off. unter **M. G. 87** a. d. Geschäftsst der „Ges. Welt". [175

A. Troschütz,
176] Buchhändler und Antiquar,
Hannover, Große Aegidienstraße 4.
(Postscheck Hannover 200. Cruse's Buchh.)

Biete an: Floericke, Vogelbuch. 1907. 403 S., 30 farb. Taf., gebd., 6.50 M. Hennicke, Handb. d. Vogelschutzes. 1912. 468 S., 200 Bilder, Leinenbd. 6.50 M. Wolf, Harnier, Gefiederte Baukünstler. Nestbauart d. V. Gebd. 2.80 M. Riesenthal, Raubvögel. 1876. 522 S., 5 Taf. gebd., 10 M. (ohne Atlas). Lenz, Naturgesch. d Vögel. 1861. 8 Taf., gebd. 2 M. A. u. K. Müller, Wohnungen, Leben u. Eigentüml. i. d. höh. Tierwelt. 1869. 125 Bild., gebd. 12 M. (selten!) A. u. K. Müller, Gefangenleben der Singvögel. 1871. 180 S., gebd., 4.60 M. Bade, Pflege, Abrichtung, Zucht 2 M. Chr. L. Brehm, Kanarienvögel, Sprosser u. a. 1863. 7 Taf., 3.50 M. Fischer, Leben der Vögel, naturpsych. Skizze, 1 M. Floericke, Vogelliebhaber. 117 Seiten. 4 Tafeln, 1.20 M. — Porto besonders.

Suche: 1 Zuchtpaar [177
Kleinelsterchen zu kaufen.
A. G. v. Zitzewitz, Berlin W 50,
Kurfürstendamm 243. A.Z. Mitgl. 308.

Sittiche, Araras, Kakadus, Amazonen, Edelpapageien, Zwergpapageien, Kragenpapageien, Loris, kleine Affen für eigene Sammlung zu kaufen gesucht. Angebote mit genauer Beschreibung und Preis an **Fliegner,** Lehrte-Hannover. [178

Ia. Stieglitzkanarie

selten schön, Hals, Brust, Bauch goldgelb gezeichnet, gibt ab auch geg. Tausch **weiße Kanarie.** [179
R. Thiele, Leipzig, Bornaische Str. 24.

Vertausche vorzügl. Schwarzplattel gegen echten Reitzugfink od. 2 Stieglitze und Rothänfling. **Riedel, Gittersee,**
180] Dresdener Straße 19.

Rosa- oder Sukakakadu,

nur Ia im Gefieder, gesundes u. garant. zahmes Tier zu kaufen gesucht. Äußerste Angebote an [181
R. Kretschmann, Magdeburg.
Postschließfach 148.

Gebe für

1,0 jap. Mövchen od. 0,1 Zebra; 1,0 Zebra od. 0,1 Mövchen. 0,1 Hamb. Silberlack-Kanarien od. Wellensittiche.
Gerh. Lücke, Badbergen (Hann.)
A. Z. Mitgl. 125. [182

2,2 Wellens., grün, 1928er Zucht, zus. 25 ℳ; Die ges. Welt, Jahrg 1920, 21, 22 u. 23, zus. 16 ℳ. In Tausch nehme 0,1 gelb. Wellensittich. **Jos. Porzelt,** München, Klarastraße 3. [183

Suche 0,1 Zebrafink zu kaufen, eventl. geg. junge Wellensittiche zu tauschen.
Saller, Planegg b. München,
Christinestraße 7. [184

Achtung!

Welch gleichgesinnter Vogelliebhaber beabsichtigt mit mir in Austauschverkehr einheimischer und ausländischer Vögel und Zeitschriften treten zu wollen? [185
Suche Sprosser und Schwarzköpfe!
Syré, Lehrer, Viernau i. Thür.

Dr. Ruß, Die fremdl. Stubenvögel, Band 1—4, in hdgearb. Künstlereinb., tadellos, für 120 M. Einz. Bd., à 30 M. Versch. Bände d. „Ges. Welt", tadellos geb., à 6 M. **Johann Rohbogner,**
186] München, Herbststr. 10 III

Papageien / Affen!

Große Werke mit guten Abbildungen, auch in fremden Sprachen, zu kauf. ges.
187] **Fliegner, Lehrte-Hannover.**

Inserate

für das am 20. März 1924 zur Ausgabe gelangende Heft 6 der Ges. Welt erbitten bis 14. März 1924 früh.

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Hermsdorf bei Berlin; für den Anzeigenteil: Rolf Kretschmann, Magdeburg, Postschließfach 148.
Verlag der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck: August Hopfer, Burg Bz. Mgdbg.

Die gefiederte Welt.



Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Jahrg. 53 | Den 20. März 1924 | Heft 6

(Druckort: Burg, Bezirk Magdeburg.)

Das Rotkehlchen.

Vortrag, gehalten in der „Alten Vereinigung der Vogelliebhaber zu Dresden".

Von Paul Groß.

(Schluß.) (Nachdruck verboten.)

Das Rotkehlchen ist wohl der am leichtesten im Käfig zu haltende Insektenfresser, und auch seine Eingewöhnung macht namentlich im Herbst, wo frische Holunderbeeren zur Verfügung stehen, in der Regel keine große Schwierigkeiten. In zu kleinen Käfigen fühlen sich die Rotkehlchen nicht wohl. Für die geringe Mühe, die ihre Pflege verursacht, sind sie ungemein dankbar, denn, wie bereits erwähnt, singen sie nicht nur das ganze Jahr hindurch, mit Ausnahme der Mauser natürlich, sondern werden auch, wenn sie im Zimmer ihren Platz unter Augenhöhe des Menschen haben, sehr zahm und machen dann besondere Freude. Dem großen Badebedürfnis des Vogels ist in genügendem Maße Rechnung zu tragen.

Nun zur Verpflegung selbst: Diese ist hier wie bei allen Insektenfressern vom Stubenvogelliebhaberstandpunkt nicht so umständlich, wie viele annehmen; aber immerhin erfordert sie ein liebevolles Herz und viel Aufmerksamkeit. Ich habe meine diesbezügliche Schule im Vogtlande durchgemacht, wo die Liebhaberei stets geblüht hat und noch blüht, und ein hiesiger alter Meister der Stubenvogelpflege usw. tat das seinige noch dazu. Ein einfaches Gemisch von je zur Hälfte geriebener Möhre und geriebener Semmel mit einem Drittel trockener Ameisenpuppen vermischt, genügt wohl in der Hauptsache für das Rotkehlchen. Das Gemisch darf aber nicht naß oder klitschig sein, sondern muß sich wollig anfühlen. Täglich noch 6—8 Mehlwürmer dazu und man wird den Vogel lange am Leben erhalten. Im Frühjahr gefangenen Rotkehlchen bringt man anfangs unter dieses Futter noch etwas hartgesottenes, klargehacktes Hühnerei und etwa 20—30 geschnittene Würmer, legt auch solche oben auf, und in der Regel erfolgt in kurzer Zeit die Nahrungsaufnahme. Das Futter stellt man in den ersten Tagen am besten auf den Boden des Käfigs und verdunkelt diesen mit Reisigästchen. Frißt der Vogel erst, hebt er mit dem Gesang sehr bald an, meist schon nach wenigen Tagen.

Im Herbste, wie ich es schon zum Ausdruck gebracht habe, hängt man dem Vogel einen Büschel frische schwarze Holunderbeeren in den Käfig, die je nach dem Individuum sofort oder mindestens später gern genommen werden und den Vogel in einem normalen Zustand erhalten. Das Rotkehlchen ist an sich weniger zur Fettsucht geneigt, wie beispielsweise die Grasmücken, wahrscheinlich eine Folge davon, daß es sich mehr wie jene Bewegungen macht, die der Fettanlage steuern.

Aufgabe des Vogelpflegers ist es namentlich auch, sein Augenmerk fortgesetzt auf den Gesundheitszustand des Vogels zu richten, wozu gehört, daß man seinen Vogel vor den Augen hat. Bei Gelegenheit der Fütterung, die morgens so zeitig wie möglich stattzufinden hat, weil da der Vogel naturgemäß ausgehungert ist, besehe ich mir das Tier. Ich sehe, ob es gesund, oder ob es krank ist. Es heißt in dieser Richtung, „selbst muß man sehen."

Die Bedienung, sofern eine solche zur Fütterung des Vogels herangezogen werden sollte, bemerkt das Unglück gewöhnlich erst dann, wenn dieser tot oder wenigstens dem Tode nahe ist. Zur Feststellung, ob er gesund ist, gehört auch die Beobachtung der Entleerungen. Wippt der Vogel beim Entleeren viel mit dem Schwanze und sind die Entleerungen zu dick und zu fest, so gibt man ein- bis zweimal in Öl ertränkte Mehlwürmer, die regelmäßigen Stuhlgang in kurzer Zeit zur Folge haben werden. Sind die Entleerungen dagegen dünnflüssig, so gebe man etwas geriebenen Mohn zum Mischfutter. Helfen diese Mittel nicht, dann wird gekochtes Wasser bzw. Hafergrütze, diese recht dünn, acht Tage hintereinander als Getränk gereicht. Dieses Getränk wird kühl aufbewahrt. Hafergrütze besonders deshalb, damit sie nicht sauer wird. Besser erneuert man diese aller drei Tage. Säure im Magen des Vogels ist sehr nachteilig, weshalb auch das Mischfutter jeden Tag neu hergerichtet werden muß. Zuweilen sieht man auch, daß der Vogel beim Fressen einen gewissen Widerwillen hat und das Futter mit dem Schnabel hin- und herschleudert. Man muß dann die Ursache zu ergründen suchen. Gewöhnlich ist in diesem Falle ein Futterteil verdorben. Ameisenpuppen dürfen nicht dumpfig riechen, müssen den kräftigen Kiefernnadelgeruch haben, wie die Mohrrübe nicht schimmlich sein darf. Es heißt also hier überall tüchtig aufpassen, und wer das nicht kann, soll sich

keine Insektenfresser halten. Im Sommer können dem Rotkehlchen frische Ameiseneier gegeben werden, die ihm als alleinige Nahrung vollkommen genügen würden. Manchem wird das eben beschriebene Futter nicht nur zu kostspielig sein, er wird auch nicht gern Mohrrübe oder Semmeln reiben wollen, weil es ihm zu zeitraubend ist; er wendet sich einem der zahlreich angebotenen Universalfutter zu, deren sich die Händler seit einer Reihe von Jahren bemächtigt haben. Ihre Aufgabe war, ein Trockengemisch in den Handel zu bringen, das alle möglichen Bestandteile enthält, das einfach nur angefeuchtet zu werden braucht — mit Wasser oder Mohrrübe —, um das Naturmischfutter, wie es eben beschrieben, völlig zu ersetzen. Dadurch hofften sie die Liebhaberei für Insektenfresser nicht nur zu erhalten, sondern auch bei diesem leichten Fütterungsverfahren zu vergrößern. So meinten sie, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen: sie lieferten die Vögel, sie lieferten auch ein Universalfutter für alle Vögel. Überall tauchten solche Mischungen als Universalfutter auf und fast in allen Städten haben die Fabrikanten Niederlagen errichtet. Ob aber ihr Universalfutter zweckentsprechend, d. h. ausreichend für die Vögel ist, das ist eine andere Sache. Jeder Händler hat natürlich seine eigene Mischung, so daß kein Mischfutter dem andern ganz gleich ist. Sie sind ihrer Zusammensetzung nach stets verschieden und betreffs des Nährgehaltes ebenso verschieden. Ich habe selbst sehr zahlreiche Arten dieser Mischfutter bei meinen Vögeln durchprobiert, habe aber keins gefunden, mit dem sie zufrieden waren. Sie fraßen keins von ihnen auch nur annähernd so gern, wie das, was ich ihnen reiche, was ich von alters her ihnen gereicht habe. Durch Schleudern und mangelhaftes Fressen brachten sie mir diesen Beweis. Bei der Zusammensetzung und Mischung all dieser Universalfutter spielt oft auch Geheimniskrämerei mit. Woraus die Gemische bestehen, ist eines jeden Lieferanten Geheimnis, und dieses aufzuklären ist um so schwieriger, als in der Regel alle Bestandteile fein gemahlen oder gepulvert sind. Unreellen Händlern ist jedenfalls Tür und Tor geöffnet. Die Hauptsache ist aber, daß die Vögel schwer an die Masse zu gewöhnen sind. Stirbt der Vogel, so heißt es, daß der Liebhaber die Sache doch nicht richtig gemacht hat, und es wird ihm empfohlen, sich einen neuen Vogel zu beschaffen. Mit manchem Universalfutter wird viel Unfug getrieben, das Futter kostet vielen edlen Sängern das Leben. Was ist nicht alles während des Krieges dem Tode verfallen. Es erschien selten ein Heft unserer „Gefiederten Welt", in dem wir nicht lesen konnten, zuweilen mehrfach: „ist an Ernährungsstörungen zugrunde gegangen" oder ähnlich. Können wir auch im allgemeinen jetzt bessere Mischungen feststellen als zur Kriegszeit, erwärmen kann ich mich dennoch nicht für die Fütterung mit Universalfutter; bei mir findet es sicher keinen Platz, mögen die Anpreisungen auch noch so verlockend klingen.

Das Rotkehlchen beendet seinen Gesang etwa Ende Juli oder Mitte August, um dann in die Mauser zu gehen. Ich habe die Beobachtung gemacht, daß manche Rotkehlchen recht schwer mausern und lange brauchen, bis sie ihr neues Federkleid angelegt haben. Im vergangenen Herbste dagegen mauserte ein Rotkehlchen bei mir innerhalb vier Wochen vollständig ab. Die Fütterung frischer Ameisenpuppen oder mindestens recht vieler frischer schwarzer Holunderbeeren während der Mauserzeit beschleunigt den Federwechsel. Die Holunderbeeren werden nicht einzeln unter das Futter gemischt, sondern in Büscheln im Innern des Käfigs aufgehängt, wo sie der Vogel sich selbst abreißt und frißt. Im Futter sich vorfindende oder auf den Boden gefallene Beeren nimmt der Vogel nicht auf.

Auffällig bei den Rotkehlchen ist, daß sie sich selten das Gefieder, insbesondere den Schwanz, bestoßen. Recht ungestüme Vögel verletzen sich wohl zuweilen an der Stirn, der Schwanz aber bleibt. Käfige, deren Gitter aus Holz-, nicht aus Drahtstäben besteht, vermögen in der Regel einer solchen Verletzung zu begegnen. Gleichwohl wird Drahtgitter allgemein vorgezogen, weil die Vögel in Käfigen mit solchem besser in die Erscheinung treten, zumal wenn es schwarz gestrichen ist. Findet zu dem Gitter noch ziemlich starker Draht Verwendung, dürfte es sicher auch wenig oder gar nicht hinter dem Holzgitter zurückstehen. Die letzte Leipziger Ausstellung zeigte uns Käfige mit starkem Drahtgitter und haben in dieser Richtung allgemeinen Beifall ausgelöst.

Vielfach wird das Rotkehlchen in Käfigen gehalten, die nicht zweckmäßig, die zu klein sind. Das Rotkehlchen verlangt einen geräumigen Käfig und repräsentiert sich in ihm auch viel schöner, als beispielsweise in einem Käfig von 45 cm Länge, wie ihn unser Rausch so warm empfiehlt. Meiner Meinung nach kann er namentlich für ein Rotkehlchen gar nicht groß genug sein, und wenn es der Platz meiner Häuslichkeit vertrüge, würde ich für meine Rotkehlchen Käfige herstellen, die mindestens einen Meter lang wären und in dem nicht nur drei oder vier Sprungstangen, sondern weit mehr angebracht sein würden, wie man dies namentlich im Erzgebirge zu beobachten allenthalben Gelegenheit hat.

Erwähnenswert scheint mir noch, daß beim Rotkehlchen zuweilen Farbenveränderungen vorkommen. Sie sind aber, wie man mit Sicherheit festgestellt haben will, keineswegs von Einfluß auf den Gesang. Dagegen ist es möglich, daß dieselben Ursachen, die Farbenveränderungen hervorgebracht haben, auch die eine oder andere Änderung im Wesen des Vogels und damit im Gesang bewirken konnten. So habe ich beispielsweise in diesem Jahre bei denkbar bester Fütternng unter meinen zahlreichen Rotkehlchen eins durch die Mauser gehen sehen mit weißen Flügeln. Wie gesagt, auf die Fütterung sowohl, als auf sonstige äußerliche Verhältnisse wie Luft, Licht und Wärme kann ich es nicht zurückführen, es hängt in demselben Zimmer, in dem die anderen Rotkehlchen hängen, und wird von den anderen durchaus nicht verschieden gefüttert. Worin die Ursachen dieser widernatürlichen Veränderungen zu suchen sind, bleibt für mich ein Rätsel.

Und nun, meine Herren, will ich Ihre Aufmerksamkeit nicht länger in Anspruch nehmen. Wenn Sie aus meinen Darlegungen etwas mit fortzunehmen vermögen, so würde der Zweck, zu dem ich sie gemacht, erfüllt sein.

Exakte Vererbungsversuche bei Kanarienvögeln.

Von Dr. H. Duncker, Bremen.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

VI.

8. Vergleicht man nun die verschiedene Ausdehnung des Pigments innerhalb eines in sich geschlossenen Kanarienvogelstammes miteinander, so erkennt man, daß bestimmte Stellen des Körpers von dem Pigmente besonders bevorzugt werden, andere wieder zuerst frei davon sich zeigen. Man kann die vom Pigment besonders bevorzugten Stellen geradezu als Rückzugszentren bei allmählich fortschreitender Aufhellung des Vogelkörpers bezeichnen. Die Aufhellung des Vogels unter dem Einflusse des „P-Faktors" erfolgt zumeist zunächst an den mittleren Schwanzfedern, wobei die äußeren Schwanzfedern sich als solche Rückzugszentren erweisen, an denen die Melanine sich besonders hartnäckig erhalten. Ebenso ist die Schwanzwurzel ein solches Rückzugszentrum. Die Aufhellung des Flügels erfolgt von den äußersten Handschwingen aus und schreitet nach dem Körper zu fort, wobei sich einerseits die Armschwingen, andererseits die „Schulter" als solche Rückzugszentren bemerkbar machen. Die Aufhellung des Bauches beginnt meist mit den Flanken, greift dann auf die Mitte des Bauches von der Aftergegend angefangen über, wobei aber das Untergefieder des Bauches ungemein hartnäckig die Melanine in den sogenannten „Becherzellen" der lockeren Federstrahlen der Bauchfedern festhält*), so daß sich hier das Melanin, und zwar ausschließlich das schwarze Melanin noch erhält, wenn mitunter schon der ganze Vogel gelb geworden ist. Auf dem Rücken ist der „Sattel" ein solches Rückzugszentrum. Häufig treffen wir bei bereits recht hellen Vögeln noch einen deutlichen „Brustlatz", selten ist ein dunkel pigmentierter „Halsring" bei sonst hellen Vögeln zu beobachten. Meist setzt gerade an dieser Stelle die Aufhellung schon frühzeitig ein. Am Kopfe beobachtet man die Aufhellung zuerst am „Kinn". Es zeigen dies mitunter schon sonst noch ganz grüne Vögel. Dann schreitet sie zur „Kehle" fort. Ferner hellt sich die „Wange" mit Ausnahme der „Ohrdecken" oder umgekehrt auf. Als Rückzugszentren am Kopfe beobachtet man „Zügelstreifen", Flecken, welche vom Auge rückwärts verlaufen, vor allem aber den „Scheitel", der mitunter noch ganz dunkel ist, wenn schon der ganze übrige Vogel gelb erscheint. Die weitere Aufhellung des Kopfes führt mitunter zu sehr „bizarren Färbungsmustern" auf Hinterkopf, Scheitel und Stirn. Schließlich finden wir nur noch an einzelnen Körperstellen, besonders gern am Vorderkörper, einzelne kleine schwarze Flecken, die bei den reingelben Vögeln dann endlich auch noch verschwinden. An dieser Stelle mag übrigens auf die interessante, auf langjähriger Erfahrung beruhende Beobachtung von Herrn Reich hingewiesen werden, daß niemals bei gehäubten Vögeln eine völlige Entpigmentierung des Scheitelgefieders vorkommt. Die Federn der Haube sind niemals reingelb, immer zeigen sie zum wenigstens ein schwach meliertes Aussehen. Die Scheitelfedern der Haube sind also die letzten Rückzugszentren für das Pigment, wenn man von dem Augenhintergrund absieht, der immer pigmentiert ist, so lange überhaupt noch der Chromogenfaktor vorhanden ist.



Yorkshire-Kanarienvogel.

Um nun eine gewisse Übersicht in die Vererbungsvorgänge bei der Scheckzeichnung zu erhalten, habe ich die Vögel des vergangenen Jahres in 7 Klassen eingeteilt, und zwar sowohl die Eltern als auch die Jungvögel.

Klasse 0 enthält die ganz grünen Vögel ohne jede Verringerung der Melanine.

Klasse 1 zeigt Aufhellungen am Schwanz und Handschwingen, sowie Flanken und Kinn.

Klasse 2 dazu noch Aufhellungen auf dem Rücken, jedoch ist noch stets ein Sattel vorhanden und die Flügel sind zur größeren Hälfte pigmentiert. Der Kopf ist grün.

Klasse 3 enthält die Vögel, welche auf beiden Seiten pigmentierte Armschwingen haben, dazu Kopfzeichnung oder scharf begrenzten Sattel auf dem Rücken.

Klasse 4 hat höchstens auf einer Seite pigmentierte Armschwingen, oder nur einen Sattel, der Kopf kann noch gezeichnet sein.

*) Beim Aufblasen des Bauchgefieders sofort zu erkennen.

Klasse 5 ist im wesentlichen gelb, nur kleinere oder größere Pigmentflecke sind am Körper, vor allem am Kopf zu sehen.

Klasse 6. Der Vogel ist reingelb, nur bei Haubenvögeln ist eine schwach pigmentierte Haube vorhanden.

Die im vorigen Jahre vorgenommenen Paarungen mögen nunmehr in einer Tabelle zur Anschauung gebracht werden. Die Reihenfolge der Paarungen ist nach ihrem Helligkeitswert angeordnet. Die Paarungen mit dem größten Helligkeitswert, der sich aus der Quersumme der beiden zur Paarung verwandten Elterntypen ergibt, stehen oben, die Paarungen mit dem geringsten Helligkeitswert unten. Die Anzahl der erzielten Jungvögel ist in den Rubriken der einzelnen Typen eingetragen:

Vererbung der Pigmentverteilung bei den Reichschen Vögeln im Zuchtjahr 1922.

Paarungen	0	1	2	3	4	5	6
6 # 6 . . .				2	1	15	36
6 # 5 . . .				3	1		4
6 # 4 . . .	1	1	1	4	2		3
5 # 5 . . .							
6 # 3 . . .				10	2	12	14
5 # 4 . . .				1		1	
6 # 2 . . .							
5 # 3 . . .				1	2		
4 # 4 . . .							
6 # 1 . . .				8	5		
5 # 2 . . .							
4 # 3 . . .				11		6	3
6 # 0 . . .			1				
5 # 1 . . .				1	1		
4 # 2 . . .							
3 # 3 . . .		9	2	19	4	6	11
5 # 0 . . .							
4 # 1 . . .		2		1	1	1	
3 # 2 . . .							
4 # 0 . . .		3	1		2		
3 # 1 . . .		10	3	3	3	2	
2 # 2 . . .							
3 # 0 . . .	1	2		2	1		
2 # 1 . . .							
2 # 0 . . .							
1 # 1 . . .							
1 # 0 . . .							
0 # 0 . . .							

Man erkennt aus dieser Tabelle deutlich eine Beziehung zwischen der Aufhellung der Eltern und der ihrer Jungvögel. Die Zahlen gruppieren sich um eine von oben links nach unten rechts verlaufende Diagonale. Die recht abweichenden Ergebnisse der 6 # 4-Paarung dürften vielleicht auf irgendwelche Unstimmigkeiten zurückzuführen sein, welche sich leider heute nicht mehr feststellen lassen. Ferner beobachten wir aber, daß es zwar die Paarungen mit hohem Helligkeitsgrade, ebenso wie die Paarungen mit niedrigem Helligkeitsgrade eine Neigung zum Massieren an den extremen Stellen der Tabelle zeigen, die Paarungen in den mittleren Helligkeitsgraden aber eine ebenso deutliche Streuung über alle Gruppen zeigen. Besonders ist die Verteilung der Jungvögel bei der 3 # 3-Paarung zu beachten, wo wir eine Verteilung der Jungvögel in der Weise erkennen, daß in den Gruppen 1, 3 und 6 sich die Vertreter verhalten wie 1 : 3 : 1. Dieses ist die Mendelsche bekannte Spaltung, und zeigt, daß die 3-Gruppe keine einheitlichen Typen enthält. Es erhellt daraus aber wieder, warum es nicht möglich ist, gleichgezeichnete Vögel zu erhalten. Die 19 Vertreter der Gruppe 3 würden sich bei einer weiteren Paarung untereinander wiederum nach der gleichen Regel aufspalten, die gelben und grünen Vögel tun dies nicht, sie züchten mehr oder weniger rein. Das ist der Kern der auch von Davenport bereits gemachten Beobachtung. Falsch ist nur Davenports Interpretation dieser Tatsache, indem er annimmt, daß den gelben Vögeln die Melaninfaktoren fehlen, was nicht der Fall sein kann, da ja „gelb" mit „gelb" gepaart unter Umständen auch pigmentierte Vögel geben kann.

Ich führe die Aufhellung der domestizierten Kanarienvögel im Gegensatz zu Davenport auf eine Reihe von Aufhellungsfaktoren (P-Faktoren) zurück, welche alle im gleichen Sinne wirken; die Zahl der im Vogel vorhandenen Aufhellungsfaktoren entscheidet über den Grad der Aufhellung. Im gelben Vogel sind sämtliche P-Faktoren vorhanden, im grünen keine. Das Vorhandensein eines Aufhellungsfaktors ist über sein Fehlen dominent, folglich ist ein grüner Vogel aus der Klasse 0 vollständig ohne Aufhellungsfaktoren und kann nur wieder grüne Vögel von der Klasse 0 ergeben. Die Vögel der Klasse 6 enthalten sämtliche Aufhellungsfaktoren, können sie aber sämtlich heterozygot enthalten; solche Vögel haben natürlich eine große Neigung, wieder pigmentierte Vögel abzuspalten, wenn sie mit andern gelben Vögeln gepaart werden, welche auch in der Mehrzahl der P-Faktoren heterozygot sind. Erst die in allen P-Faktoren homozygoten Formen züchten Reingelb weiter. Da die Homozygotie der gelben Vögel sicherlich erst in einer Reihe von Generationen zu erreichen ist, so erklärt es sich von selbst, daß die Reinheit eines Stammes in der gelben Farbe erst mit der Zeit zu gewinnen ist. Um diese Reinheit im gelben Stamme allmählich zu erzielen, ist der Züchter natürlich gezwungen, da sich die homozygoten Vögel von den heterozygoten Vögeln nicht unterscheiden, aufs Geradewohl reingelbe Vögel zur Nachzucht herauszugreifen. Hat er dann zufälligerweise mit einer sehr geringen Zahl von heterozygoten P-Faktoren gegriffen, so hat er darin verhältnismäßig leichtes Spiel und wird schnell zu einer reineren gelben Rasse kommen. Hat er dabei kein Glück, und greift er, wie wir einmal annehmen wollen, stets nur reingelbe Vögel, welche sämtliche P-Faktoren nur heterozygot enthalten, so wird er niemals zum Ziele kommen. Die Wahrscheinlichkeitslehre zeigt uns, daß unter der Annahme von 6 P-Faktoren die beiden extremen Fälle, nämlich daß der Züchter für die Nachzucht seiner gelben Vögel einen Vogel gefaßt hat, der alle 6 P-Faktoren homozygot enthält und den Fall, daß alle 6 P-Faktoren heterozygot sind, gleich selten vorkommen müssen, daß die beiden Fälle, in denen 5 Faktoren homozygot sind, oder 5 P-Faktoren heterozygot sind, schon etwas häufiger vor-

kommen werden. Noch häufiger wird der Züchter solche Vögel greifen, welche in 4 Faktoren homozygot bzw. heterozygot sind, und am häufigsten werden vom Züchter solche Vögel durch Zufall gegriffen werden, die in 3 P-Faktoren homozygot und in 3 P-Faktoren heterozygot sind. Es lassen sich darüber ganz genaue rechnerische Aufstellungen machen, die zeigen, daß in der weit überwiegenden Masse der Fälle die beiden zur Nachzucht ausgewählten Vögel den beiden mittleren Gruppen, also den mit 3 bzw. 4 homozygoten P-Faktoren behafteten Gruppen angehören werden. Aus solchen Paarungen werden dann immer noch auch solche Formen entstehen können, welche weniger als 6 P-Faktoren enthalten, demnach nicht reingelb sein können. Niemals können dann allerdings Formen auftreten, die überhaupt weniger als 3 P-Faktoren besitzen, also etwa schwerbunte Vögel, welche ich in der obigen Tabelle in die 2. Klasse verwiesen habe. Ich will allerdings damit nicht behauptet haben, daß die Zahl der im Kanarienvogel wirksamen P-Faktoren tatsächlich 6 beträgt, wenn auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür nicht abzusprechen ist, daß die Zahl der P-Faktoren etwa diese Größenordnung aufweist. Aber die mir bisher zur Verfügung stehenden, genau bezüglich ihres Farbenkleides genau analysierten Vögel reichen der Zahl nach durchaus noch nicht aus, um darüber mit Sicherheit Schlüsse aufbauen zu können. Die Zahl der wirklich vorhandenen P-Faktoren muß daher noch in der Schwebe bleiben. Eins geht mir aber aus diesen Aufstellungen bereits mit Sicherheit hervor: Die reingelben Vögel können niemals sämtliche P-Faktoren homozygot enthalten, da es noch nicht gelungen ist, reingelbe Stämme zu erzielen. Es liegt dieses offenbar wiederum daran, daß einzelne von den P-Faktoren mit Lethalfaktoren gekoppelt sind, oder anders ausgedrückt, daß die Homozygote dieser P-Faktoren tödlich wirkt. Es stimmt mit der allen Züchtern bekannten Beobachtung überein, daß bei einer fortgesetzten Reinzucht reingelber Vögel die Lebenskraft des Stammes rasch abnimmt. Auch wir haben in unsern diesjährigen Zuchten diese Erfahrung wieder bestätigt gefunden. Es können aber nicht alle P-Faktoren mit solchen Lethalfaktoren gekoppelt sein, denn sonst müßte der Ausfall ein viel größerer sein, als er zahlenmäßig in Wirklichkeit ist, außerdem müßten sehr viel weniger reingelbe Vögel aus den Paarungen „Gelb#Gelb" entstehen. Der mit einem P-Faktor gekoppelte Lethalfaktor ist uns oben als L-Faktor bei der Kreuzung von „Hochgelb" mit „Strohgelb" entgegengetreten. Weiteres über dieses schwierige Problem der P-Faktoren mitzuteilen, muß ich mir vorderhand versagen. Ich hoffe aber, später darauf noch einmal zurückzukommen

(Fortsetzung folgt.)

Neueinführungen und Seltenheiten.

Von Karl Neunzig.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Von der etwa 200 Arten umfassenden Familie der Kuckucke finden wir bei den Liebhabern ab und zu wohl unsern gemeinen Kuckuck, selten einmal den

Glanzkuckuck.

schwarzen metallischglänzenden Koel aus Indien, der weniger träge im Käfig hockt, als die meisten anderen als Stubenvögel bekannten Kuckucke. In den zoologischen Gärten sind Sporenkuckuckarten und Guirakuckuck meist vorhanden. Für den Käfig des Vogelliebhabers sind die krähen- bis haushuhngroßen Vögel wenig geeignet.

Einen sehr schönen Kuckuck hat Herr Dr. Adlersparre als Käfiggast in seinem Bericht (s. oben) erwähnt, einen Glanzkuckuck, der sowohl seines prächtigen Gefieders wegen wie infolge seiner kleinen schlanken Gestalt eine hervorragende Zierde einer Vogelstube oder eines geräumigen Flugkäfigs wäre. Ob er sich seinem Wesen nach dazu eignet? Vielleicht hat der oben erwähnte Pfleger des Vogels die Güte, uns darüber Mitteilung zu machen.

Der **Glanzkuckuck — Chrysococcyx cupreus** *(Bodd.)* gehört einer Gattung an, welche drei in Afrika lebende Arten umfaßt. Die Gattungsmerkmale sind denen des eigentlichen Kuckucks — Cuculus ähnlich. Abweichend ist hauptsächlich die prächtig metallisch glänzende Färbung des Gefieders der Oberseite und die Form des Schwanzes, welcher kürzer ist als der Flügel. Während der Schwanz der Cuculus-Arten

stark gestuft ist, sind bei den Glanzkuckucken nur die beiden äußeren Schwanzfedern jederseits verkürzt, die mittleren sechs Schwanzfedern aber gleich lang. Die Verbreitung des Glanz- oder Kupferkuckucks, wie ihn Heuglin nennt, erstreckt sich über das ganze athiopische Tiergebiet. Zu seinem Aufenthalt wählt er entsprechend dem verschiedenen Charakter des Geländes des weitern Gebietes verschiedene Örtlichkeiten, selbstverständlich immer solche, welche ihm Nahrung in genügender Menge und Gelegenheit zur Unterschiebung der Eier bieten. Glanzkuckucke sind, wie die eigentlichen Kuckucke, Brutschmarotzer. Im gebirgigen Abessinien sind es die sonnigen bewaldeten Berghänge, bis 6000 Fuß hoch, im Süden die Mimosengebüsche an den Flußufern. In der Stadt Sansibar belebt er die kleinen mit Melonenbäumen und Rizinus bepflanzten Gärten, auf denen viele Raupen leben. In den Obstgärten der Ortschaften Südafrikas jagt er auf den Apfelbäumen nach Baumheuschrecken. Er besucht die verkrauteten Sümpfe, in denen Feuerweber und Rohrsänger nisten, gern durchstreift er niederes Gebüsch und lebende Hecken, hält sich auf Viehweiden auf und wird häufig am Erdboden beobachtet.

Haarige Raupen, welche von allen schmarotzenden Kuckucken hauptsächlich gefressen werden, bilden neben anderen größeren Kerfen und deren Maden seine Hauptnahrung. Im Kropf eines erlegten Glanzkuckucks wurden Reste eines Eies vom Kapsperling gefunden.

Unruhig und unstet ist sein Wesen wie das aller Kuckucke. Die pfeifenden, schrillen, weithin schallenden Rufe der lebhaften Vögel hört man in der Brutzeit, in der sie weniger scheu sind, überall. Der Ruf hat nichts gemein mit dem volltönenden Rufe des europäischen Kuckucks. Er klingt wie „di di di diric" oder wie Böhm mitteilt, wie der Ruf des ägyptischen Milans „kik-ki ki kikik". Anfänglich habe er geglaubt, den Milan zu hören. In Südafrika nennt man ihn nach seinem Ruf Diric.

Der Ruf eines auf dem kahlen Wipfel eines Baumes sitzenden Männchens wird meist von einem, zuweilen auch von mehreren in der Nähe befindlichen Männchen beantwortet. Die Rufer stürzen aufeinander los, verfolgen und balgen sich weidlich herum, indem sie heftig aufeinander stoßen und auch im Fluge ihre gellenden Rufe hören lassen.

Wie der paarungslustige männliche Glanzkuckuck von einem kahlen Zweige aus die in der Nähe befindlichen artgleichen Männchen durch seine Rufe zum Kampfe reizt, so gehen auch von dieser Warte aus die Liebesspiele vor dem Weibchen vor sich. Die Begattung schildert Fischer nach einer Beobachtung, welche er in Nordostafrika im Mai machte. Die Begattung ging in einem niedrigen Strauch vor sich. Unruhig hüpfte das Männchen mit gesträubten Federn umher, während das Weibchen mit hängenden Flügeln abwartend dasaß. Nach der Begattung flogen beide in schnellem Fluge davon. Als Pflegeeltern des Glanzkuckucks sind bekannt Feuerweber, Kapsperling, goldgelber Weber (Pl. aureoflavus), Kapstelze, Parisoma subcaeruleum. Das Eindringen eines Paares Glanzkuckucke in die Nestkolonie des goldgelben Webers schildert Fischer wie folgt: „Ich sah einen Goldkuckuck, der Stimme nach ein Weibchen, in einen Kokosbaum fliegen, in dem zahlreiche Nester des Ploceus aureoflavus sich befanden; bald darauf kam noch ein zweiter. Die Webervögel wurden augenscheinlich durch Erscheinen der Kuckucke in Aufregung versetzt, indem sie um die Störenfriede schreiend herumflogen. Der zuerst angekommene Kuckuck schlüpfte bald in ein Weberнest, während es der andere nicht so leicht hatte; er mußte sich den Eingang erst erkämpfen. Der Eigentümer des bedrohten Nestes flog schreiend auf den Eindringling los und stieß ihn von dem Neste herunter; doch zog er bei dem darauffolgenden kurzen Kampfe in der Luft den kürzeren, so daß der Kuckuck nunmehr ungehindert in das Nest eindrang. Beide Kuckucke verweilten nur wenige Minuten in den Nestern, worauf sie in raschem Fluge den Baum verließen ...."

Reichenow gibt in „Die Vögel Afrikas" Bd. 2 folgende Beschreibung des schön gefiederten Vogels:

Oberseits erzgrünglänzend, mit mehr oder weniger kupferrotem Schimmer, besonders auf dem Oberrücken; ein weißes Band längs der Stirnmitte und weißer Augenbrauenstreif; der mittlere Teil der Flügeldecken mit weißen Flecken (die einzelnen Federn erzgrün mit weißen Flecken oder weiß und erzgrün gebändert); Schwingen, mit Ausnahme der letzten ganz erzglänzenden Armschwingen, auf der Außenfahne erzgrün, auf der Innenfahne schwarz mit weißen Querbinden, die Armschwingen auch mit weißen Randflecken am Außensaume; Schwanzfedern mit weißen Randflecken und weißem Endflecke, die mittelsten ganz erzgrün; Unterseite weiß mit erzgrünen Querbinden auf Körperseiten, Hosen, Unterschwanz- und Unterflügeldecken; ein mehr oder weniger deutlicher erzgrüner Bartstrich jederseits der Kehle; Auge dunkelrot bis orangerot; Augenlid rot; Schnabel schwarz, an der Wurzel des Unterkiefers grau; Füße dunkelgrau bis schwarzbraun. Lg. 165—200, Fl. 110—123, Fl./Schw. 25—40, Sp. 300, Schw. 80—93, Schn. 17—20, Lf. 16—17 mm.

Das Weibchen ist dem Männchen ähnlich, aber der Glanz der Oberseite rötlicher und matter, der Oberkopf oft graubräunlich mit Metallglanz; Randflecken der Schwingen und Schwanzfedern rotbraun oder doch zum Teil rotbraun verwaschen; Vorderhals rostfarben verwaschen.

(Fortsetzung folgt.)

Importbericht.

Von Fritz Pölz, Hamburg.

(Nachdruck verboten.)

Angespornt durch die vielen, aus Liebhaberkreisen bei mir einlaufenden Anfragen, welche sich seit Erscheinen des A. Z.-Jahrbuches 1923 noch vermehrt haben, und zwar über zu erwartende Importe und Besorgung von Tieren, so dürfte es für die Leser der „Gefiederten Welt" nicht uninteressant sein, etwas über die in diesem Jahre eingetroffenen Tiertransporte zu erfahren.

Vielen Herren scheint es völlig unbekannt zu sein, daß bereits die führenden Hamburger Tierhandelshäuser, die Firmen Carl Hagenbeck und August Fockelmann, ihre alten Verbindungen gleich nach dem Kriege wieder aufgenommen haben. Nur derjenige, welcher an der Quelle sitzt, kann sich ein Bild machen, welch große Mengen an Säugetieren, Vögeln, Reptilien, Amphibien und Zierfischen wieder eingeführt werden, und ich habe im vergangenen Jahre bei der Firma August Fockelmann Vögel gesehen, die ein Zoologischer Garten selbst vor dem Kriege

nicht aufzuweisen hatte. Den schönsten Genuß bietet es, wenn man gleich nach Ankunft eines Transportes die eingetroffenen Tiere bewundern kann, denn meistens nach zwei Tagen ist bereits vieles schon wieder weitergegangen.

Nach dem Kriege kamen vorerst nur kleinere Transporte an, die im Laufe der Zeit ständig an Größe zunahmen, und ich habe im vorigen Jahre bei der Firma Fockelmann nicht weniger als drei Transporte aus Südamerika und Mexiko zusammen eintreffen sehen. Viele Selten- und Neuheiten wurden in den Nachkriegsjahren eingeführt und werde ich die im letzten Jahre eingeführten neuen und seltenen Tiere zum Schlusse besonders erwähnen.

Die ständige Verschlechterung der Mark war schuld daran, daß die meisten eingeführten Tiere ins Ausland wanderten, und nur ein ganz winziger Bruchteil wurde der deutschen Liebhaberei zugänglich gemacht, was sich jedoch durch die jetzt erfolgte Stabilisierung der Mark geändert hat, denn ich konnte in Erfahrung bringen, daß bereits wieder sehr viele Tiere in Deutschland bleiben.

Nicht nur über Vögel, sondern auch betr. Säugetiere laufen bei mir ständig Anfragen ein, und ich werde über die in Hamburg eingeführten nachstehend mit in Erwägung ziehen.

Als erster in diesem Jahre brachte der Dampfer „Rio de Janeiro" eine Kollektion Vögel und Sänger für die Firma August Fockelmann nach hier. Trotzdem Herr Fockelmann die meisten Tiere bereits in Rotterdam verkauft hatte, so war die Anzahl der auf Hamburg gekommenen doch überaus reichhaltig. Ich konnte Gelegenheit finden, dem Eintreffen dieses Transportes beizuwohnen. Bei meiner Ankunft in Groß-Borstel waren bereits alle Käfige, die die Neuankömmlinge aufnehmen sollten, hergestellt. Von den Wärtern wurden noch die im Hause befindlichen Tiere gefüttert, und ich nahm die Gelegenheit wahr, die zwischen Weihnachten und Neujahr eingetroffenen Elefanten zu bewundern. Es waren wunderbare Exemplare, diese Kinder Indiens, und einer derselben dürfte wohl der größte bisher in Europa lebend eingeführte sein, denn er hat die Größe von 2,80 Meter.

Ich hatte noch gar nicht lange gewartet, als auch schon zwei vollbepackte Lastwagen die eingetroffenen Tiere anbrachten. Im Hause war alles zur Hand, und man ging gleich daran, die Wagen zu entladen und die Tiere aus den Versandkisten zu nehmen. Nachdem alles ausgepackt und an Ort und Stelle war, ging es unter Leitung des Herrn Otto Fockelmann, des jetzigen Inhabers dieser Firma, an die Besichtigung. Dieser Transport übertraf wiederum alle früheren, und an Säugern stellte ich hochinteressante Affenarten, wie Woll-, Spinnen-, Kapuzineraffen und Marmosettäffchen fest, und unter letzteren befand sich sogar ein sehr seltener Albinomarmosett. In einem einzelnen Exemplar kam ein Satansaffe an, der später in den Besitz eines Wiener Liebhabers überging. Die letzte Einführung des Satansaffen dürfte m. E. vielleicht vor 20 Jahren gewesen sein. Außerdem waren noch einige kleine Raub-, Nagetiere und Riesenschlangen eingetroffen.

Was die Vogelwelt anbelangt, so waren Kletter-vögel in großer Zahl, Körner- und Weichfresser jedoch nur wenig vertreten. Auch die Liebhaber von Hühner- und Wasservögeln konnten aus diesem Transport wunderbare Sachen erwerben. Ich sah unter den Klettervögeln große Exemplare des Gelb- und Grünflügelarara, der Mülleramazone, die durch ihre Größe ein schönes Schaustück bildeten. Ein Pärchen Fächerpapageien strotzte vor Gesundheit. Von den vielen Weißbauchpapageien, die in Rotterdam gelandet wurden, brachte Herr Fockelmann acht Stück mit nach Hamburg, welche jedoch, wie ich leider später erfahren mußte, nach Nordamerika verkauft worden sind, und ist dieser schöne Vogel somit den deutschen Liebhabern vorläufig wieder verloren gegangen. Wie üblich, enthält jeder Transport aus Südamerika Sittiche, und ich konnte Kanarienflügel-, Tovi-, Yendaya- und Goldstirnsittiche feststellen. Auch zwei Seltenheiten befanden sich bei diesem Transport. So ein Schwarzohrpapagei und drei Kurzschwanzpapageien, wovon ersterer und zwei der letzteren in meinen Besitz übergingen. Ich werde es mir angelegen sein lassen, demnächst auf diese Vögel näher einzugehen.

Groß war die Zahl der Wasservögel. Ich gewahrte selten so schöne, rote Ibisse, Löffelreiher, Schwarzkopfreiher und Rallen. Von letzteren seien einige Sonnenrallen ganz besonders hervorgehoben, denn diese Tiere sind nicht nur wegen ihrer Seltenheit und prächtigen Färbung begehrenswert, sondern zeichnen sich durch große Zahmheit aus und nehmen ihrem Pfleger das Futter aus der Hand. Drei Kahnschnäbel machten einen ganz merkwürdigen Eindruck. Außerdem gab es an Hühnervögeln Hockos, Penelope- und Guanhühner.

Den nächsten Transport brachte der Dampfer „Frauenfels" nach Hamburg, und zwar bestand dieser aus neun Elefanten, einem Schweinshirsch, fünf Tigern, einem Bär und einem Leoparden, und sind diese Tiere für die Firma Karl Hagenbeck bestimmt; sie sollen dem Zirkus dieser Firma einverleibt werden.

Es folgte dann am 17. Januar der Dampfer „Urundi", aus Südafrika kommend. An Bord hatte er neben 235 Stück lebenden Ochsen einen Transport, bestehend aus diversen Affenarten, Antilopen und Zebras für die Firma Karl Hagenbeck. Aber auch für Herrn Fockelmann war mit diesem Dampfer eine große Menge lebender Vögel eingetroffen, welche eine Vorsendung seiner in Südafrika weilenden Expedition sind. Der Import bestand ferner aus vielen Ammern, Orix- und Maskenwebern, Goldbrüstchen, dunkelroten Amaranten, Schnurrbärtchen, Helenafasänchen, Mosambikzeisigen, Elfen-, Bunt-, Granat- und Blauastrilden, Hahnenschweif-, Paradies-, Königs- und Dominikanerwitwen. Außerdem waren unter dem Transport ein Haubenperlhuhn und zwei Kappapageien, welch letztere einen ganz bezaubernden Eindruck machten, und diese Vögel dürften ohne Zweifel den Clou des Jahres 1924 bilden.

Die letzten Tiere des ersten Januartransportes der Firma August Fockelmann sind so ziemlich in alle Welt verkauft worden, und der Draht meldete schon wieder die Ankunft des nächsten Südamerikatransportes an, welcher denn auch am 21. Januar mit dem Dampfer „Bilbao" in Bremen eintraf, von wo Herr Fockelmann die Tiere abholen ließ. Mit diesem Transport trafen nur bekannte Tiere ein.

Sehr schöne Marakane seien hier besonders erwähnt. Eine große Anzahl Blaustirnamazonen, annähernd 150 Sperlingspapageien und verschiedene Arten Sittiche, wie Yendaya-, Goldstirn-, Blaustirn- und Tirikasittiche enthielt der Transport. Es befanden sich dann noch verschiedene Stare und Tangaren, Kardinäle, Safranfinken, Bischöfe und Glockenvögel unter den Eingetroffenen. An Reptilien waren wiederum Riesenschlangen angekommen.

Dieses sind die bis heute angekommenen Transporte, und soweit mir zu Gehör gekommen ist, erwartet die Firma Fockelmann in diesem ersten Vierteljahr noch verschiedene andere Transporte aus Mittel- und Südamerika, Südafrika und Indien, so daß wir noch viele schöne Tiere zum Sommer erwerben können.

Es sei mir noch ein kurzer Rückblick auf das verflossene Jahr gestattet, und werde ich nur die besonders bemerkenswerten Vögel, soweit mir erinnerlich, aufzählen.

Erstmalig importierte Herr Fockelmann eine neue Art Sperlingspapagei aus Mexiko, und zwar eine hellblaue Art, die den wissenschaftlichen Namen Psittacula cyanopygia trägt. Obgleich eine beträchtliche Anzahl eingeführt wurde, so sind leider nur zwei Paare in Deutschland geblieben, während die restlichen nach England wanderten. Wahre Prachtexemplare des Hyazinth-, Lears- und Spixarara konnte ich im Fockelmannschen Vogelhause bewundern. Auch war es mir vergönnt, zum ersten Male lebende Kolibri zu sehen. Es waren vier Stück eingetroffen, die in ihrem Käfige munter herumschwirrten. Über den ferneren Lebensweg dieser kleinen Tiere konnte ich, nachdem dieselben verkauft worden waren, nichts erfahren. Auch wurden verschiedentlich Honigsauger aus Afrika eingeführt, welche gar nicht weichlich zu sein scheinen, denn die Vögel machten einen sehr schönen Eindruck. Seltene Amazonen in verschiedenen Arten wurden öfters neben den Blaustirnamazonen eingeführt, und ich schätze diejenigen vom vorigen Jahre, welche allein von der Firma Fockelmann eingeführt wurden, wenig gerechnet auf zirka 2500 Köpfe.

Schimpansen werden fast ständig in Gr.-Borstel zum Kauf angeboten und immer wieder kann ich mich über die munteren Tiere, die nicht nur durch ihre Gutmütigkeit, sondern auch tollen Spielereien viel Interessantes bieten, amüsieren.

Hamburg, Januar 1924.

Kleine Mitteilungen.

Nesterfunde aus Leipzig und Umgebung im Jahre 1923. Hänfling, 12. 4., Südfriedhof, ? Eier. — Singdrossel, 20. 4., Ratsholz zwischen Paußnitz und Pleiße, 2 Eier. — Singdrossel, 20. 4., Pfarrholz, 4 Eier. — Amsel, 20. 4., Haken a. d. Pleiße, 3 Eier. — Singdrossel, 20. 4., Pleißenhochflutbett, 5 Eier. — Singdrossel, 20. 4., ebenso, 2 Eier. — Singdrossel, 20. 4., ebenso, 3 Eier. — Singdrossel, 20. 4., Raschwitz, 2 taube Eier und 1 Junges. — Amsel, 20., 4., ebenso, 4 Junge. — Amsel, 22. 4., Ratsholz, ? Eier (Vogel brütet sehr fest). — Singdrossel, 22. 4., ebenso, 4 Eier. — Kleiber, 22. 4., Ratsholz, Linie, ? Junge. — Singdrossel, 23. 4., Ratsholz b. d. Stadtgärtnerei, 3 Eier. — Singdrossel, 23. 4., ebenso, 4 Eier. — Singdrossel, 24. 4., ebenso, 5 Eier. — Singdrossel, 14. 4., ebenso, ? Eier. — Singdrossel, 24. 4., ebenso, 4 Eier. — Singdrossel, 24. 4., Beipert, Pleißenwehr, ? Eier. — Singdrossel, Ratsholz zwischen Pleiße und Paußnitz, 5 Eier. — Singdrossel, 24. 4., Blümleinsteg, Linie, 4 Eier. — Singdrossel, 24. 4., ebenso, 4 Eier. — Singdrossel, 24. 4., Elsterhochflutbett, ? Eier. — Singdrossel, 24. 4., ebenso, 5 Eier. — Singdrossel, 25. 4., Südfriedhof, 5 Eier. — Singdrossel, 26. 4., Pleißenhochflutbett, 3 Eier. — Amsel, 26. 4., Pleiße, Wassergott, 4 Eier. — Amsel, 27. 4., Bahndamm bei der Augustabrücke, ? Eier. — Goldammer, 27. 4., Völkerschlachtdenkmal, ? Eier. — Singdrossel, 1. 5., Pleißenhochflutbett, 2 Eier. — Mänssebussard, 1. 5 Rosental, ? Eier. — Kupferfasan, 1. 5., Lauer, 6 Eier. — Hausrotschwanz, 2. 5., Papestraße, Neubau, ? Eier. — Amsel, 3. 5. Ratsholz zwischen Pleiße und Paußnitz, 3 Eier. — Singdrossel, 3. 5., Pfarrholz, 2 Eier. — Singdrossel, 4. 5., Neue Linie, 2 Eier. — Mäusebussard, 4. 5., Naunhofer Wald, ? Eier. — Dohle, 5. 5., Hirschpark, ? Eier. — Buchfink, 6. 5., Waldschenke bei Oetzsch, 3 Eier. — Heckenbraunelle, Pleißenhochflutbelt, 6. 5., 4 Eier. — Singdrossel, 6. 5., ebenso, 5 Eier. — Feldsperling, 6. 5., Pleißenhochflutbett, ? Eier. — Singdrossel, 6. 5., ebenso, 5 Eier. — Hänfling, 8. 5., Südfriedhof, 4 Junge. — Grünfink, 8. 5., ebenso, 5 Eier — Hänfling, 8. 5., ebenso, 5 Eier. — Hänfling, 8. 5., Südfriedhof, 3 Eier. — Singdrossel, 8. 5., ebenso, 5 Eier. — Singdrossel, 8. 5., ebenso, 4 Junge. — Kirschkernbeißer, 8. 5., Anlagen vom Südfriedhof, ? Eier. — Amsel, 8. 5., ebenso, ? Eier. — Hänfling, 11. 5., Südfriedhof, 3 Junge. — Hänfling, 11. 5., ebenso, 3 Eier. — Hänfling, 11. 5., ebenso, 5 Eier. — Hänfling, 11. 5., 3 Junge, Südfriedhof. — Hänfling, 11. 5., Südfriedhof 1 Ei. — Hohltaube, 11. 5., Pleißenhochflutbett, ? Eier. — Hänfling, 11. 5., Südfriedhof, 5 Eier. — Hänfling, 11. 5., ebenso, 4 Junge. — Grünfink, 11. 5., ebenso, 4 Eier. — Hänfling, 11. 5., ebenso, 4 Junge. — Hänfling, 11. 5., ebenso, 1 Ei, 3 Junge. — Buchfink, 12. 5., Johannapark, 2 Eier. — Singdrossel, 14. 5., Elsterhochflutbett, 5 Eier. — Buchfink, 15. 5., Ratsholz, Linie, 5 Junge. — Singdrossel, 15. 5., Ratsholz, Stadtgärtnerei, 5 Eier. — Singdrossel, 15. 5., Pleiße, Wassergott, 5 Eier. —

(Schluß folgt.)

Sprechsaal.

(Steht den Abonnenten kostenlos zur Verfügung.)

Frage 2: Worauf ist es zurückzuführen, daß mein Stieglitz nach der Mauser die Handschwingen wiederholt abgeworfen hat? Der Vogel ist seit vier Jahren gekäfigt, hat stets gut gemausert und ist immer glatt im Gefieder. Seit der letzten Mauser hat das Tier nun bereits viermal die Handschwingen abgeworfen. Kaum sind die Federn nachgewachsen, so wirft sie der Stieglitz auch schon wieder ab, und zwar nicht nacheinander, sondern stets auf einmal. Mein Zeisig hat die Handschwingen einmal direkt nach der letzten Mauser, mein Dompfaff dagegen vor einigen Wochen abgeworfen. Woran liegt dies nun? Die Vögel werden in einem Gesellschaftskäfig gehalten und bekommen als Futter ein Gemisch von Rübsen, Mohn, Spitzsamen, Hanf und Negersamen, letzteren vorwiegend. Ich habe nun angenommen, daß der Übelstand auf die Verfütterung des Negersamens zurückzuführen sei, und habe diesen daher jetzt ganz fortgelassen. Ich bemerke noch, daß ich Negersamen in größeren Mengen erst seit dem letzten Herbst verfüttere, während ich vorher nur ein geringes Quantum dem Futtergemisch zugesetzt habe. Früher habe ich auch von einem Abwerfen der Schwingen mit Ausnahme zur Mauserzeit nichts bemerkt, obschon ich seit 20 Jahren Vögel halte. Ich wäre daher sehr dankbar, wenn mir jemand einen Weg zeigen könnte, wie dem Übelstande abzuhelfen wäre. C. Baumgarten.

Frage 3: Eine große Wald- oder Baumeule, die sich fast jede Nacht an meiner mit Wellensittichen besetzten Freivoliere einfindet, hat mir schon großen Schaden angerichtet. Die Voliere mit Tücher zuhängen, hat keinen Wert, da sie daran herumzerrt und die Vögel dadurch doch beunruhigt. Ein doppeltes Gitter anbringen wäre demnach auch zwecklos. Wie kann ich diese Eule am besten unschädlich machen?

Heinrich Erdmann, Darmstadt, Nieder-RamstädterStr. 47
Mitgl. 118 A. Z.

(Fortsetzung auf der 2. Umschlagsseite.)

Aus den Vereinen.

A. Z. Angemeldet sind die Herren: Georg Ekelund, Kopenhagen (Dänemark), Sölvgade 75 (2,80 M. dankend erhalten); Gustav Merz, Fabrikant, Königsberg i. Franken; Sebastian Engl, Schneidermeister, München, Baderstr. 3III, rechter Aufg.; Max Pätzold, Fabrikant, Münchner, Max-Weber-Platz 3III; Bernhard Gondolph, Bensheim a. B., Hügelstr. 23; Joseph König, Küllstedt; G. H. Wentzlau, Hoya a. Weser; Max Schmidt, Hoteldirektor, Köln a. Rh., Marsplatz 8. — Aufgenommen sind die Herren Mtgl. Nr. 364 Rudolf Neunzig, Hermsdorf b. Berlin, Neue Bismarckstr. 42; Mtgl. 365 Graf v. Leutrum, Nippenburg, Post Schwieberdingen, Württbg.; Mtgl. 366 Wilhelm Casteel, Laurensberg b. Aachen; Mtgl. 367 Rudolf Ewald, Prokurist, Wandsbek b. Hamburg, Mansteinstr. 11; Mtgl. 368 Arnold G. Weber, Hamburg 1, Raboisen 56; Mtgl. 369 Paul Göbel, Oschersleben a. Bode, Bruchstr. 25; Mtgl. 370 Artur Zielowski, Köppelsdorf b. Sonneberg i. Thür., Kurgarten; Mtgl. 371 H. Brandes, Redakteur, Halle a. S.; Mtgl. 372 Heinrich Sauer, Kaufmann, Sundern, Kr. Arnsberg, Hauptstr. 103; Willi Möhring, jetzt in Limbach i. S., Königsstr. 12III bei Bräunig, hat seine frühere Mtgl.-Nr. 320 wieder erhalten; ich bitte um Vermerk. Mtgl. Nr. 223 wohnt jetzt Nienburg a. Weser, Bismarckstraße 22II. — Bezüglich der Zusammenkunft in Hamburg erfahre ich, daß der im vorigen Heft erwähnte Transport nicht vor Mitte April eintrifft, so daß die Fahrt voraussichtlich in die Osterfeiertage fällt. Im Anschluß daran soll ein Rundschreiben ergehen, zu deren Beteiligung noch aufgefordert wird. A. Krabbe.

Verein der Vogelliebhaber zu Mannheim. Nach einer kleinen Weihnachtsfeier fand am 27. Januar 1924, nachmittags 5½ Uhr, im Lokale zum „Goldenen Falken", S. 1. 19., die diesjährige Generalversammlung statt. Die Versammlung war gut besucht. Auf der Tagesordnung standen 5 Punkte. 1. Verlesung des Protokolls der Generalversammlung vom 21. Januar 1923; 2. Jahresbericht; 3. Kassenbericht; 4. Ausscheiden und Neuwahl des Gesamtvorstandes; 5. Vereinsangelegenheiten. Bei Punkt 1 wurde das Protokoll der Generalversammlung vom 21. Januar 1923 verlesen und für richtig anerkannt. In Punkt 2 gab der 1. Vorsitzende den Jahresbericht bekannt. Er erklärte, daß das verflossene Jahr ein sehr schweres war, um für unsere lieben Sänger das nötige Futter beschaffen zu können, und daß es dieses Jahr hoffentlich besser werde. Unter Punkt 3 gab der Kassierer den Kassenbestand bekannt, welcher 54 M. beträgt. Unter Punkt 4 legte der Gesamtvorstand sein Amt nieder und es wurde zur Neuwahl geschritten. Unser langjähriger 1. Vorsitzende, Herr Ludwig Frank, wurde zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Der neue Vorstand setzt sich folgendermaßen zusammen: 1. Vorsitzender Konrad Stang; 2. Vorsitzender Ludwig Frank; Kassierer August Sommer; 1. Schriftführer Friedrich Rüschle, 2. Schriftführer Johann Daubmann; Revisoren Johann Levendawicz, Anton Hoffmann; Materialverwalter Johann Levendawicz; Vereinsdiener Alois Precht. Der neue Vorstand nahm das Amt an und der neue 1. Vorsitzende leitete die Versammlung weiter. Unter Punkt 5 kam der Monatsbeitrag zur Sprache, welcher auf 30 Pf. und Aufnahmen auf 1,50 M. festgesetzt wurden. Der 1. Vorsitzende hielt dann noch eine kleine Ansprache an die Mitglieder und wünschte dem Verein ein glückliches Gedeihen im neuen Jahre. Da keine Anträge mehr einliefen, schloß der 1. Vorsitzende die Versammlung um 8 Uhr. Der Vorstand. J. V.: Fried. Rüschle, 1. Schriftführer.

Vereinigung hannoverscher Vogelliebhaber. Jahresbericht 1923. Es fanden 10 Mitgliederversammlungen, und zwar bis zum Oktober im Schulmuseum, Am kleinen Felde, vom 1. November ab im Vereinszimmer der Wirtschaft Karl Krause, Mehlstraße 1, statt, die neben Anregungen, Verlesungen, Tausch- und Besorgungsfragen aller Art eine Reihe von Vorträgen brachten, darunter: Determann, „Züchtung und Aufzucht von Vögeln"; Eskuche, „Sonderbare Nistplätze", „Zweckmäßige Käfige"; Troschütz, „Die Alpenbraunelle", „Unsere Bachstelzen". Dr. Heinroth, Berlin, hielt uns einen gut besuchten Lichtbildervortrag über „Unsere Eulen und Tagraubvögel". Dann fanden im Schulmuseum in Gemeinschaft mit dem Arbeitsamt der Jugendbünde 7 Vorträge „Wandern und Schauen" statt, vier von Rektor Wehrhahn, je einer von Lehrer Ottens, Eilvose, Dr. Peßler, Dr. Jakob, Friesen, Dr. Müller hielt uns im Leibniz-Kino einen Lichtbildervortrag über „Nesterbau der Vögel", außerdem hatten wir unter Prof. Fritze eine Führung durch die Vogelsammlung des Provinzialmuseums. Es wurden ferner 10 Beobachtungsausflüge gemacht, über die im Vereinsschrank ein ausführlicher Bericht liegt. — Den Kassenbericht können wir uns bei dem Zahlenwirrwarr des letzten Jahres sparen. Wir fingen am 1. Januar 1924 mit einem kleinen Kassenbestande von wenigen Mark an. — Unser Mitgliederbestand ist augenblicklich 93, darunter 1 Ehrenmitglied, 7 Vorstands-, 9 auswärtige und 76 hannoversche Mitglieder. Es sind im Laufe des Jahres 1923 28 hinzugekommen und 20 bei Aufstellung dieser Liste ausgeschieden. — Vogelbestand. Trotz rechtzeitiger Mahnung ist nur von einem Teil der augenblickliche Vogelbestand eingegangen, die übrigen müssen in der folgenden Aufstellung als Mitglieder geführt werden, die keine Vögel halten. Hoffentlich bekommen wir im nächsten Jahre die Angaben rechtzeitiger und vollständiger. Keinen Bestand angegeben haben die 48 Mitglieder: 5, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 28, 33, 35, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 46, 49, 50, 52, 54, 57, 58, 64, 65, 68, 70, 72, 78, 78, 80, 82, 83, 84, 86, 88, 90, 93, 95, 97, 99. 100, 107, 108, 136, 137. Von den übrigen 45 sind angegeben zusammen: 117 Körnerfresser, 138 Weichfresser, 29 Kanarienvögel und Kreuzungen, 76 ausländische Vögel, zusammen 360. Von diesen halten folgende 7 Mitglieder die meisten:

Mitgl.-Nr.:	Körnerfr.	Weichfr.	Kan. u. Kreuz.	Ausl.	zus.
92	2		2	47	51
7	11	30	—	6	47
76	8	17	—	5	30
81	5	4	2	10	21
73	8	7	1	—	16
48	11	—	5	—	16
4	—	15	—	—	15

Wer genau wissen will, welche Arten gehalten wurden und von wem, der kann in den Versammlungen die darüber aufgestellte genaue Liste einsehen. Wir bitten erneut auch die zahlreichen Mitglieder, die nur Vogelfreunde und nicht Vogelhalter sind, uns treu zu bleiben. Wir werden im Laufe des Jahres auch ihnen genügend Stoff bringen, um ihre Naturfreude zu vertiefen. — Anteilnahme am Vereinsleben. Die folgende Statistik zeigt, daß sich die meisten Mitglieder viel zu wenig um die Vereinigung kümmern. Das muß entschieden anders werden, wenn einmal die Mitglieder etwas von ihrer Mitgliedschaft haben wollen, und wenn zweitens der Vorstand sich die viele Arbeit, die der Verein mit sich bringt, nicht umsonst machen soll. Also hoffentlich sehen diese Zahlen in der nächsten Statistik wesentlich anders aus. Es sind an den 10 Vereinsabenden keinmal erschienen folgende 32 (die Auswärtigen sind als entschuldigt mit A bezeichnet): Nr. 5, 11, 17, 18A, 21, 23, 26, 28, 33, 38, 39, 41, 44, 48, 50A, 51, 52, 57, 61, 64, 72A, 76A, 79, 81A, 83, 86, 90, 92A, 95, 101, 107A, 108; einmal folgende 16: 2, 14A, 15, 16, 19, 27, 43, 46, 54, 65A, 88, 93, 97, 99, 102A, 136; zweimal folgende 8: 11, 36, 53, 66, 113, 131, 132, 135; dreimal folgende 10: 6, 25, 49, 58, 68, 78, 104, 130, 133, 134; viermal folgende 6: 42, 69, 70, 80, 100, 106; fünfmal folgende 6: 12, 37, 40, 84, 87, 109; sechsmal folgende 6: 3, 22, 29, 35, 71, 89; siebenmal: 74; achtmal folgende 5: 1, 4, 63, 73, 82; neunmal: 7; zehnmal: 13. Der Vorstand.

Verein der Vogelfreunde Leipzig-Plagwitz. Jahresbericht vom 21. Januar 1924. Da sich einige Herren mit dem Gedanken trugen, im Vorort Leipzig-Plagwitz einen Verein für Waldvogelfreunde zu gründen, fand am 1. August 1923 die erste Besprechung in dieser Sache statt. Dazu trafen sich die Herren Otto Kliebe, Wenzel Kucher, Kurt Seidel, Richard Michaelis, Richard Müller und Karl Scholtissek bei Herrn Wilhelm Maresch, Plagwitz, Gleisstraße 26II. Alle Herren waren von gleichen Gedanken und demselben Ziele beseelt. Auf Grund vorhandener Unterlagen waren Zweck und Ziele, sowie Statuten des Vereins bald durchgesprochen, und es konnte nun zur Taufe geschritten werden. Da nun in Leipzig schon zwei Vereine für Vogelliebhaber vorhanden sind, wurden sich alle Herren einig, den Verein mit folgendem Namen zu taufen: „Verein der Vogelfreunde", Leipzig-Plagwitz. In den Vorstand wurden einstimmig folgende Herren gewählt: Karl Scholtissek, 1. Vorsitzender, Leipzig-Plagwitz, Lauchstädter Straße 20II, r.; Wilhelm Maresch, 1. Schriftführer, L.-Plagwitz, Gleisstraße 26II; Richard Michaelis, 1. Kassierer, L.-Lindenau, Odermannstraße 11, prt. Um nun der wirtschaftlich und finanziell ungünstigen Zeit Rechnung zu tragen, wurde vorläufig von einem Vereinslokal Abstand genommen. Herr Wilhelm Maresch stellte dem Verein ein geräumiges entsprechendes Zimmer zur Verfügung, welches von allen Herren mit Dank angenom-

Ornis-Haus
Halle-Saale

Gegründet 1912

Spezialität:
Individuelle Weichfresserpflege nach Angaben des Herrn Apotheker Adalbert Jena-Biberach-Riß. (Alleiniges Herstellungsrecht.)

Reform-Normal I
Volieren-Mischung

Reform-Normal II
Grasmücken, Rotkehlchen usw.

Reform-Normal III
Nachtigallen, Schama usw.

Reform-Normal IV
Sprosser, Gelbspötter usw.

Reform-Normal V
Drosseln, Staare usw.

Restloser Verbrauch.

Ameisenpuppen
Weißwurm
Karottengrieß
Kondensiertes Eigelb
Dr. Lahmann's Nährsalz
Dr. Riege's Nährsalz
„Sperlings-Normalin"
— neutraler Kalkzusatz —
Pohl's Vogelmedizinen
Körnerfutter Ia für jede Vogelart. [201

Inhaber, langjähriger Fachmann, siehe „Ornis-Buch" (90 S.) Mk. 1

Preisliste auf Wunsch!

Auskunft bereitwilligst geg. Freim.

Senegalfinken und Goldfische

liefert dauernd zu billigsten Preisen
H. Behrke (vorm. **Mätje**),
Braunschweig, Sophienstr. 35.
Gegr. 1874. — Fernruf: 1281. [202

---

2 Rotkehlchen

zu vertauschen
gegen **Vogelfutter.**
Joh Fischer, Waldsassen,
Mitterteicherstraße 54. [203

Gould-Amandine

Weibchen, zu kaufen oder gegen
Pärchen kl. Kubafinken
zu tauschen gesucht. [204
Friedr. See, Frankfurt a. M.,
Bahnhofsplatz 8.

Tausche

1,1 Dompfaffen gegen 1,0 Stieglitz und 0,2 Kanarien, gute Zuchttiere, gegen 1,0 Bluthänfling. [205
O. Gulich,
Großschönau i. Sa., Mühlwiese 16.

Senegalfinken,

Bandfinken, Amaranten, Schmetterlingsfinken, Arlafinken à Paar 3 ℳ, Schönbürzel, Astrilden, Silberschnabel à Paar 4 ℳ, weißbäuch. Lerchen, Edelsänger, Dom. Witwe à Stück 4 ℳ. Von 10 Paaren an für Händler bedeutend billiger. Ferner Schamadrosseln à 60 ℳ, Goldstirnblattvögel à 45 ℳ, Kronen- und Macaber-Affen Stück 70 ℳ. Zum Versand kommen nur Ia gesunde Tiere.
Paul Tzornack,
Berlin NO 55,
Prenzlauer Allee 189. [206

Suche [207

10 zuchtfähige **grüne Wellensittich-Weibchen** für Freivoliere und **1,1 kalifornische Schopfwachteln.**
Alfred Fichtner, Oetzsch-Leipzig.

Die mir zahlreich unaufgefordert zugehenden Anerkennungsschreiben, insbesondere die im Heft 4 der „Gef. Welt" erschienene Empfehlung veranlassen mich, nochmals auf meinen bekannten erstklassigen tiefen und tourenreichen Stamm hinzuweisen. Von meinen

Kanarien

habe ich noch einige **Ia Vorsänger, ausgezeichnete Zuchthähne** und **dto. Weibchen** abzugeben. **Garantie für vollste Gesundheit und lebende Ankunft. Streng reell. Keine Phantasiepreise.**
Glänzende Referenzen des In- und Auslandes. [208
A. Schellenberger, Leipzig-Reudnitz, Melanchthonstraße 1.

Blaue Honigsauger!

(Türkisvögel)	Stück	50 ℳ, Paar 100 ℳ
solche im Gefieder etw. def.	„	25 ℳ
Schwarzblaue Tangaren	Stück	45 ℳ
Schwarzkappen-Tangaren	„	50 ℳ
Violettblaue Organisten	„	36 ℳ
Purpur-Tangaren	„	45 ℳ
Schamadrosseln (nur fehlerfreie Exempl.) durchgefärbte Gesangskünstler	Stück	60 ℳ
Dayaldrosseln im Gesang	„	45 ℳ
Blaubärtige Blattvögel im Gesang	Stück	60 ℳ
Goldbauchtimalien im Gesang	Stück	40 ℳ
Schwarzwangenbülbül im Gesang	Stück	36 ℳ
Indische Kronen- und Bergmeisen	Stück	30 ℳ
Rote Kardinäle im Gesang	„	40 ℳ
Katzendrosseln	„ „	22 ℳ
Goldstirnrupiale	„ „	40 ℳ
Schwarzbrustzeisige im Gesang	Stück	25 ℳ
Lerchenfinken	„	8 ℳ
Goldgelbe Safranfinken	Paar	10 ℳ
Kubafinken	„	25 ℳ
„ kleine	„	42 ℳ
Schwarzkappenpfäffchen	„	12 ℳ
Weißkehlpfäffchen	„	15 ℳ
Erzpfäffchen	„	14 ℳ
Graupfäffchen	„	12 ℳ
Weißstirnpfäffchen	„	18 ℳ
Jacarinifinken	„	15 ℳ
„ einzelne ♂♂	Stück	6 ℳ
Grassittiche	Paar	20 ℳ
Kaktussittiche	„	22 ℳ
Goldstirnsittiche	„	24 ℳ
Blaustirnsittiche	Stück	22 ℳ
Zwer ara (marakana)	„	40 ℳ
Dunkelblaue Bischofe	Paar	15 ℳ

Blaustirn-Amazonen,
tadellose junge sprechende und fingerzahme Vögel Stück 50 ℳ

Graupapageien,
große helle vom Congo, fingerzahm, jung und sprechend Stück 120 ℳ
Marmosettäffchen, jung u. fingerzahm Stück 28 ℳ
Resusaffen, gesunde u. kräftige Tiere, jung und gelehrig Stück 60 ℳ
Versand per Nachnahme oder Voreinsendung. Porto u. Verpackung 3.50 ℳ.

E. W. Lenger,
Berlin N 58,
Schönhauser Allee 70a.
Fernruf Amt Humbold 5730. [209

Suche

0,2 Schamas od. 2,2 Schamas.
Auf Wunsch Tausch gegen prima Zuchtpaare **Wellensittiche.**
S. Lichtenstaedt,
Berlin-Johannisthal,
Nieberstraße 10. [210

Vert.: 8 Goldammer-Männch. u. -Paare, sowie 3,3 Dompf. gegen Kardinal, Kanarien usw. [211
Schlöß, Allersberg bei Nürnberg.

Verkaufe:

Kanarien rein Seifertscher Abstammung, Hähne à 15 ℳ, **Weibchen** à 5 ℳ. Nehme **Königswitwen** o. **Exoten** in Tausch.
Johannes Clauß,
Grimma i. Sa. [212

Abgabe im Tausch gegen andere Exoten: 1,1 Gelbscheitelweber; 0,1 Oryxweber; 2,0 jap. Mövchen; 1,0 Kanarie 1923 gelbbunt; 1,0 Bandfink. [213
Eugen Müller, Küllstedt, A.Z. Mtgl. 65.

Wellensittiche,

prima Zuchtpaare:
1,1 gelbe 17 ℳ, **1,1 grüne** 15 ℳ, **1,1 Bandfink** 6 ℳ, **1,1 Feuerweber,** **1,1 Blutschnabelweber** je 6 ℳ.
Garantie lebende Ankunft.

Ganz neue, prächtige
Zucht-Voliere,
2 m lang, 85 hoch, 50 tief, innen weiß lackiert, Gitter Eiche, abnehmbar, zweiteilig, Glassockel. **Preis 90 ℳ.**

Heckennetz
zum Ausspannen, zirka 3 m lang und 2 m hoch, gut erhalten, vertausche gegen **gelbe Kanarien** oder **zerlegbare Drahtkäfige.**
Martin Schöll, Garmisch 46 (Oberbayern). A. Z. Mtgl. 327. [214

Vogelfutter

für alle Arten Vögel,
Vogelkäfige
in solider Ausführung sowie sämtliche Geräte zur **Vogelzucht und -pflege.**
Exoten wieder in großer Auswahl. [215
Kaufe
jeden Posten
junger Eichhörnchen.
A. Haffner, Zoologische Handlung, Leipzig-Gohlis, Menckestr. 2.

Bestellungen für April sofort der Post übergeben!
Bestellzettel für Deutschland.

Postbestellzettel.

Hiermit bestelle ich für den Monat April 1924
1 „Die Gefiederte Welt"
(eventuell mit Nachlieferung). — **Erscheinungsort Burg Bz. Mgdb.**

Name: .....

Wohnung: .....

Postquittung: .....Mk. .....Pf. sind heute bezahlt worden.

Ort: ..... den .....

Postannahme

.....

Die beste Zeit zum Beobachten im Freien

ist da. Nun ist es ratsam, ein Buch mitzunehmen, das zuverlässig über das Gesehene Auskunft gibt. Für Mitteldeutschland ist dies: „Kantor Schacht, **Die Vogelwelt des Teutoburger Waldes".** Die Erfahrungen und Beobachtungen eines langen Lebens in einem kleinen Gebirgsorte an einer Vogelzugstraße sind auf 269 Seiten geschildert, Freileben und Gefangenschaft, Wesen, Art und Pflege beschrieben. 30 sehr gute farbige Tafeln schmücken den stattlichen in Leinen gebundenen Band, der beste Vorkriegs-Ausgabe ist. Solange der Vorrat reicht, wahrscheinlich nur noch einige Monate, kann ich das Buch portofrei für 3.30 ℳ liefern. (Der Neupreis war etwa 5 ℳ.)
Alfred Troschütz,
Buchhändler und Antiquar,
Hannover, Gr. Aegidienstraße 4.
Postscheck-Konto: Hannover 200.
(Cruse's Buchhandlung.) [216

Infolge Abreise

äußerst billig: [217
Richtiges Paar Zwerg-Weißbauchamazonen Stück 30 ℳ, 1,0 blauer Wellensittich, groß und kräftig 70 ℳ, 1,0 **reinweiße Dohle,** äußerst zahm 75 ℳ, 1 Paar Pariser Trompeter-Kanarien 60 ℳ, 1,0 weißbrüstiger Schilffink 18 ℳ, 1,1 Zügelastrilde 32 ℳ, 1 rotbrauner und 1 Hordenweber-Männch., je 12 ℳ. Porto und Verpackung gratis.
C. Cordier, Zürich,
Werdgutstraße 7. A. Z. Mtgl. 130.

„Resusaffen",

Marmosetts, Graupapageien, Grünpapageien, Zwergarara, Sperlingspapageien, tarant. Unzertrennliche, gelbe Wellensittiche, Grassittiche, Yendayasittiche, gehaubte Kardinäle, Schamadrosseln, Spottdrosseln, Glanzstare, Purpurtangaren, Saffranfinken. [218
Kanarienhähne und -weibchen gibt preiswert ab
Kleinerts „Tierhandlung", Berlin NO 18, Straußberger Str. 13. Alex. 3313.

Suche mit einem Züchter, welcher
Kanarien
züchtet und dieselben exportieren kann,
Verbindung.
Wm. Haase Cleveland Bird Co.
Cleveland Ohio, Amerika.
7605 Aberdeen Ave. [219

Papageien / Affen!

Große Werke mit guten Abbildungen auch in fremden Sprachen, zu kauf. ges. 220] **Fliegner, Lehrte-Hannover.**

Suche

das **Muster-Entenbuch** von **Dr. Maar** und den **Entenband** von **Naumann, Naturgeschichte der mitteleuropäischen Vögel.** [221
Alfred Fichtner, Oetzsch-Leipzig.

Gef. Welt 73, 82, 89, 90, 96 gesucht
Schmitz & Hilburg, Duisburg, Prinzenstr. 36. [222

---

2 haltb. Strohkanariennester, 1 haltb. Prachtfinkennest (Kugelform), engem Schlupfloch, liefere franko bei Einsendg. v. 1 ℳ. 4,4 Stiegl.-Kanarien à 15 ℳ. Goldg. Harzer Kanariensänger à 15 u. 20 ℳ. Bei Anfr. Rückporto. **Hirsch,** Aubstadt (Unterfr.). A.Z.Mtgl. 2-3. [223

Inserate
für das am **3. April 1924** zur Ausgabe gelangende Heft 7 der Ges. Welt erbitten bis **28. März 1924** früh

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Hermsdorf bei Berlin; für den Anzeigenteil: Rolf Kretschmann, Magdeburg, Postschließfach 148.
Verlag der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck: August Hopfer, Burg Bz. Mgdbg.

Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Jahrg. 53 | Den 3. April 1924 | Heft 7

(Druckort: Burg, Bezirk Magdeburg.)

Ein Sonntagmorgen in der Vogelstube.

Von A. Krabbe.

(Nachdruck verboten.)

Nicht jeder unter uns kann sich des Wochentags so seinen Pfleglingen widmen, wie er es wohl gerne möchte. Man freut sich eben doppelt auf den schönen Sonntag, an dem jede Plage und Mühe abgeschüttelt wird und der Vogelliebhaber bei seinen Lieblingen Erholung und Zerstreuung sucht. Auch bei mir reicht die karge Zeit des Alltags gerade, um Fütterung und Wartung in der Vogelstube vorzunehmen, die bei den Gefiederten von noch größerer Wichtigkeit ist als beim Herrn der Schöpfung. Am Sonnabendnachmittag ist Großreinemachen, damit der Sonntag besonders festlich begangen werden kann.

Schon am Freitag wird Ausschau nach dem Wetter gehalten, um daraus auf Sonnenschein oder Regen zu schließen. Diesmal waren alle Vorboten günstig, und so konnte ich an einem schönen Augusttage bei herrlichstem Sonnenschein erwachen und nach schnell eingenommenem Frühstück in die Vogelstube eilen, um mit viel Zeit und in behaglicher Ruhe dem Leben und Treiben meiner Lieblinge zuzuschauen. Vielleicht interessiert es die verehrten Leser, mir hierbei ein Stündchen Gesellschaft zu leisten.

Kaum betreten wir den Raum, so hängen sich die Wellensittiche an die Gittertüre, um ihren gequellten Hafer und, wenn möglich, die täglich in großer Menge gereichte Vogelmiere zu erhalten. Der Hafer wird abgegossen und vom Wasser befreit, gequellte Hirse und Kolbenhirse — Aufzuchtfutter für die Prachtfinken in der kleineren Voliere — ebenfalls und hineingestellt, einige Mehlwürmer in die dafür bestimmten Gefäße gegeben, und unsere Arbeit ist beendet, da die Tagesfütterung für den Sonntag abweichend stets am Abend nach der Reinigung erfolgt. Schmausend sitzen die Wellensittichväter, -mütter und -kinder an dem Hafer. Derweilen setzen wir uns umständlich im alten Großvaterstuhl zurecht, wobei der alte Herr dermaßen knackt und krachzt, daß der ganze Schwarm rauschend davonfliegt. Verdutzte Stille. In die Stille hinein ertönt lieblicher Gesang von einem Grauedelsänger, der himmetternd seinen Morgengruß vorträgt, eine zweite Stimme fällt ein; sein Vetter, der Gelbbürzelgirlitz, in der großen Voliere will nicht nachstehen mit seinem fast noch schöneren und volleren Gesange. Der gelbe Bürzel leuchtet im Fluge. Der Lärm ist wieder allgemein geworden, da jeder dem Morgen und der Sonne entgegenjubelt. Geräuschlos bäumt ein großer Vogel mit wallenden Schwanzfedern und auffallend weiter Flügelspannung auf, die Hahnschweifwitwe, fast eingefärbt. Orange- und Flammenweber im Hochzeitskleid bilden zwei leuchtende Farbenflecke, zu denen der schwarzgelbe Tahaweber vorzüglich paßt. Der kleine Kerl schwirrt wie eine Hummel hinter einem grauen Weber her, bis ihn der Gelbrückenwidafink aufnimmt und so aus dem Verfolger ein Verfolgter wird. Gönnen wir dem unruhigen Geist die Lektion. Der Gelbrückenwidafink gibt die Verfolgung auf und setzt sich vor mir auf das Badegefäß, ein herrlicher sammetschwarzer Vogel mit leuchtend gelbem Rücken. Nun balzt er, spreizt den Schwanz wie einen Fächer, sträubt die Halsfedern zu einem Kragen auf und tanzt mit weit geöffnetem Schnabel — ein absonderlicher Anblick — auf einen der drei jungen Goldsperlinge zu, um einen Begattungsversuch zu wagen. Der Spatz kennt den Schwindel und fliegt fort, was die Erregung des Widafinken sofort dämpft. Zischender und schnarrender Gesang läßt uns auf den dottergelben Weber aufmerksam werden, der weniger schön als laut seinen in einem Kunstwerk von Nest brütenden Weibchen zum Zeitvertreib vorsingt. Dessen Köpfchen guckt aus dem engen Schlupfloch hervor, und nicht ohne Mühe folgt der Körper, um schnell zum Mehlwurmnapf zu huschen und sodann von dem gestrengen Eheherrn getrieben seinen Platz auf den Eiern wieder einzunehmen. Meine besten Wünsche begleiten es. Vor dem Fenster rechts sitzt eine reizende Gesellschaft, voran die schönen Königswidafinken; der eine, schon halb im Hochzeitskleid, läßt seinen angenehmen Gesang auffallend laut erschallen. Daneben singt ein Dominikanerfink in abgerissenen Strophen, in dessen Nähe ein zweiter aus Südafrika im grauen Kleid sitzt. Weiterhin sehen wir dort die schöne Paradieswitwe in ihrem schmucken Hochzeitskleid und eine weitere im grauen Kleid. Ein halbverfärbter Atlasfink vervollständigt die bunte Gesellschaft. Ein grauer Vogel, der bisher auffallend still im Gebüsch gesessen hat, fesselt plötzlich durch sein wundervolles Flugbild, breite weiße Flügelstreifen lassen die Schwingen wie durchsichtig erscheinen, von einem gelben Streif begrenzt. Es ist die weißgezeichnete oder Spiegelwitwe im

grauen Gefieder. Die Franzosen nennen den Blutschnabelweber „Arbeiter" und nicht mit Unrecht, denn er ist von morgens früh bis abends spät mit Nestbau und Webekünsten beschäftigt und wird dennoch niemals fertig. Ich zähle ein Dutzend halb- und ganzfertiger Nester, die der äthiopische Blutschnabelweber und der Rußweber erbaut haben. Diese beiden sind unzertrennlich wie Max und Moritz, bauen gemeinsam an einem Nest, schlafen nebeneinander, tuten sich ihre mit Anstrengung vorgetragenen Lieder in die Ohren, wobei sie sich fast mit den Schnäbeln berühren, und vertragen sich nach jedem Streit wieder vortrefflich. Der Braunrückengoldsperling trägt noch emsig weiche Nestpolster ein, obgleich das Weibchen bereits auf Eiern sitzt. Dicht über mir brüten die Girlitze in einem Harzer Bauer, und wir beobachten mit Vergnügen, wie emsig das Männchen sein Weibchen füttert, ein rührendes Bild traulichen Familienlebens. Sie waren in der Wahl ihrer Nestanlage glücklicher als die Hänflinge, die lediglich drei zerstörte Nester aufzuweisen haben, eines davon in und eines hinter einem Wellensittichkobel. Ein herrlicher Stieglitz von der russischen Grenze umtänzelt sein Weibchen, ohne von jeher ernstere Absichten gehabt zu haben. Auf dem Futtertisch wird es noch immer nicht leer. Familie Goldspatz hat einen Futternapf für sich reserviert und läßt sich weder durch die Wellensittiche noch durch einen Angriff der Dominikanerwitwe, die mit erhobenem Schweif und nach vorn gestellten Flügeln ihren Zweck zu erreichen sucht, beirren. Dompfaffweibchen hält den Mohn besetzt und verteidigt ihn erfolgreich gegen den hübschen Zitronenzeisig und die zeternden Stieglitze. Besseren Erfolg den Goldspatzen gegenüber hat jetzt der dicke Oryxweber, welcher hinwiederum zwei großen, noch nicht mit Sicherheit bestimmbaren Schwarzkopfwebern — ich erhielt sie als Textorweber, welche Bestimmung nur für das Weibchen gelten könnte — weichen mußte. Auffallend flink sind die grauen Kronfinken, die im Wesen unserer Heckenbraunelle gleichen, und starke Konkurrenten beim Mehlwurmempfang. Ein Wettgesang aller Insassen ist eine vorzügliche Nervenprobe für manche Besucher, für mich ein Vergnügen. Jetzt fällt hinter uns eine laute hohe Stimme in den allgemeinen Lärm ein. Wir drehen uns um und gewahren, daß die Rosenpapageien in Meinungsverschiedenheiten geraten sind, was Wunder, wenn sich ein Weibchen zwischen zwei Männchen teilen soll. Doch geht es schließlich, einen zur Rechten, einen zur Linken, wie die Rose zwischen zwei Dornen, so kann sich jeder der beiden Vertreter der Gunst der rosenköpfigen Schönen erfreuen. Zwischen lichtgrünen Weidenbüschen umherkletternd, bieten diese schönsten aller Unzertrennlichen einen reizenden Anblick.

In der Nebenvoliere bei den gelben Wellensittichen ist es ruhiger, da die Weibchen brüten und so emsig bemüht sind, ihre bisherigen Mißerfolge auszugleichen, was ihnen hoffentlich gelingt. Weiter rechts, in der mit den kleinen Prachtfinken besetzten Voliere, ertönt schriller Balzgesang; ein Helenafasänchen, welches nach längerer Abwesenheit wieder bei mir ist, sucht in einem Amarantenmännchen Ersatz für das fehlende Weibchen. Ein zweiter schön dunkelrot ausgefärbter Amarant sitzt bei dem verwitweten Tigerfinken und bildet mit dem himmelblauen Schmetterlingsfinken mit sonnenbeleuchtetem Gefieder ein farbenprächtiges Bild. Die Schmetterlingsfinken haben schon wieder einige erfolgreiche Bruten hinter sich; im vorigen Jahre brachten sie es auf sieben. Mövchen sind beim Bau eines zweiten Nestes, nachdem sie von den Schnurrbärtchen aus der bisher innegehabten Behausung vertrieben sind. Bei den Malabarfasänchen beobachten wir eine Begattung und hoffen von neuem auf Nachwuchs, nachdem das eine Weibchen der beiden Paare der stets verhängnisvollen Legenot erlegen ist. Der Zebrafink scheint seine neue Gattin von der Notwendigkeit einer Brut überzeugt zu haben und schlüpft auffallend viel in eine Ecke hinter dichtem Gesträuch, wo sich mit Stroh umkleidete Harzer Bauer befinden. Ein Orangebäckchen hat sich jetzt des Helenafasänchens erbarmt und krault es im Gefieder, was sichtbares Behagen auslöst. Grau- und Weißkehlpfäffchen lieben die Behaglichkeit und haben sich ihre Tageszeit auf das angenehmste eingeteilt. Im Eingewöhnungskäfig für junge Wellensittiche ist Aufruhr ausgebrochen. Alle toben wie ungezogene Buben umher, ein besonders rüpelhafter will den Schwanz seines Vordermannes nicht loslassen, was Zetergeschrei des Hilflosen auslöst, daraufhin die ganze Gesellschaft in Aufruhr geriet.

Inzwischen ist die Sonne hochgestiegen und hat den Tau von den Gräsern getrocknet. Wir können jetzt aus dem Garten in reichlicher Menge Vogelmiere holen und locken damit die ganze bunte Schar vor unsere Füße, ein Bild, das unvergleichlich bleibt.

Das, verehrter Leser, ein Stündchen aus Liebhabers Sonntagmorgen.

Exakte Vererbungsversuche bei Kanarienvögeln.

Von Dr. H. Duncker, Bremen.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

VII.

Wir wenden uns nun dem letzten der Vererbungsprobleme bei Kanarienvögeln zu: Es bezieht sich dieses auf den Gesang der Kanarienvögel, der uns deutschen Züchtern ja ganz besonders am Herzen liegt. Wir betreten aber hier leider einen ganz besonders unsicheren Boden, da es bisher noch nicht gelungen ist, wirkliche Erbfaktoren für ganz bestimmte Gesangstypen verantwortlich zu machen. Wir hören deutlich den Unterschied zwischen dem Gesang eines Kanarienwildlings, eines Angehörigen der deutschen Landrasse, eines Seiferthvogels, eines Gluckervogels, eines Wasserrollers und der Reichschen Nachtigalledelkanarien. Es sind aber noch keinerlei Versuche darüber angestellt, wie solche Vögel sich entwickeln, die aus einer Paarung von Individuen dieser verschiedenen Stämme entstanden sind. Es ist sehr die Frage, ob wir auch hierbei zu einer Klassifizierung kommen werden und kommen können, etwa so wie wir die Haubenvögel von den Glattköpfen oder die weißen Vögel von den gelben Vögeln trennen können. Um hierüber Erfahrungen zu machen, genügt es nicht, solche Paarungen vorzunehmen, sondern es müßten die sämtlichen Nachkommen einer solchen Paarung einzeln isoliert werden, und die Gesangs-

typen dieser einzelnen Vögel müßten einer genauen Analyse unterzogen werden. Es würde auch nichts nützen, solche Paarungen nur einzeln vorzunehmen; nur eine größere Anzahl gleichartiger Paarungen kann uns brauchbare Resultate geben, da nur innerhalb einer größeren Population die bestimmten Zahlenverhältnisse auftreten, die das Vorhandensein von bestimmten Erbfaktoren andeuten. Wir erkennen daraus die Schwierigkeiten dieser Versuche oder, sagen wir es ruhig, die Unmöglichkeit für einen einzelnen Züchter, auf dem Wege der modernen Mendelforschung hier zu Resultaten zu gelangen. Es wird sich kein Züchter finden, welcher in solchem großen Maßstabe Vögel lediglich zu Isolierzwecken heranzuzüchten opfert, ganz abgesehen davon, daß kaum irgend ein Züchter über

die dazu notwendigen Räumlichkeiten verfügt. Denn das ist klar, daß keiner der isolierten Vögel einen andern Vogel hören darf, da ja in solchem Falle sofort infolge des Nachahmungstalentes unserer Gelbköcke das Bild verschleiert wird. Wir müssen also auf einem andern Wege zu irgendwelchen greifbaren Resultaten zu gelangen suchen. Der einfachste Weg scheint zunächst der zu sein, daß man unter der Annahme, daß ein anderer Gesang auch eines anderen Instrumentes bedarf, man statt des Gesanges die Kehlköpfe untersucht. Das geht einmal nicht, weil man die Vögel nicht reihenweise abtöten kann. Dazu sind sie wirtschaftlich zu wertvoll. Andererseits hat das aber auch keinen Zweck, da die fraglichen Abänderungen des Kehlkopfes gar nicht oder nur in nicht nachweisbarem Grade vorhanden sind, unterscheiden sich doch die Kehlköpfe der verschiedenen Singvogelarten mit ihrem so verschiedenen typischen Gesang nicht einmal genügend, um systematisch-morphologische Erscheinungen dadurch zu begründen.

Es ist eine allen Züchtern bekannte Tatsache, daß der Kanarienvogel seinen Gesang zum Teil als Jungvogel von seinen Eltern überkommen erhält, zum Teil in der darauf folgenden Schule sich erwirbt. Diese beiden Komponenten des Gesanges müßten bei einem exakten Vererbungsversuch erst einmal getrennt werden. Dazu dient der Isolationsversuch einzelner Vögel. Ein hochwertiger Sänger irgendeines Stammes wird mit einem Weibchen von bester Abstammung im Isolationsraume gepaart, der Hahn sofort nach der Paarung entfernt, und die Jungen werden von dem Weibchen allein aufgefüttert. Sobald die Jungen zu studieren anfangen, trennt man zwei Hähne des isolierten Geleges. Den einen hält man im Isolationsraum zurück, den andern gibt man in die normale Schule. Ist der Stamm, in dem man diesen Isolationsversuch macht, einigermaßen durchgezüchtet, so kann man mit einiger Wahrscheinlichkeit darauf rechnen, daß die beiden Junghähne dasselbe Erbgut in gesanglicher Beziehung mitbekommen haben. Nun analysiert man möglichst täglich den von beiden hervorgebrachten Gesang und verfolgt die Entwicklung desselben. Herr Reich und ich haben einen solchen Isolationsversuch mit seinen Nachtigall-Edelkanarien durchgeführt. Wir haben dabei festgestellt, daß keineswegs die Touren eines Kanarienwildlings oder der deutschen Landvogelrasse, oder irgendeiner andern Kanarienvogelrasse zum Vorschein gekommen sind, sondern daß von den Isolationsvögeln ein Gesang gebracht wurde, der in gewissem Grade an den Gesang der Nachtigalledelsänger entschieden erinnert. Natürlich kann man an solch einem einzelnen Isolationsversuche nicht einwandfrei die ererbten Elemente von dem angenommenen Beiwerk trennen. Der metallische Klang

und die gestoßene Art des Vortrages unserer Isolationsvögel können schon dem Erbgut angehören. Es wäre wichtig, wenn auch die Züchter von Seifertvögeln, Gluckern oder Wasserrollern derartige Isolationsexperimente mit ihren Vögeln' machten und darüber berichteten. Nur muß man sich über eine Methode für solche Experimente einigen, damit man die Ergebnisse wirklich vergleichen kann. Der Verfasser dieses Artikels würde es sehr begrüßen, wenn dieser Anregung von möglichst vielen Lesern dieses Blattes auch für andere Vögel Folge gegeben würde und bei ihm Vorschläge nach dieser Richtung eingingen. Ich bitte dieselben zu richten an meine Adresse: Dr. H. Duncker, Bremen, Wernigeroder Straße 22. Diese Isolationsversuche sind nämlich für die weitere Erkenntnis auf dem Gebiete der Vererbung von ganz ungemeiner Bedeutung, da sie unter Umständen geeignet sind, in das schwierige Problem der Vererbung erworbener Eigenschaften ein Licht zu werfen. Es möge über dieses Problem wenigstens nur kurz einiges gesagt sein.

(Schluß folgt.)

Neueinführungen und Seltenheiten.

Von Karl Neunzig.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Herr Dr. Adlersparre macht in dem an dieser Stelle schon wiederholt angezogenen Bericht u. a. auch Mitteilungen über eine bisher noch nicht eingeführte Schmätzerdrossel, die er

Weißflügelschmätzerdrossel — Cossypha humeralis *Sm.*

nennt. Von der etwa 30 Arten umfassenden Gattung Schmätzerdrossel — Cossypha, deren Verbreitung auf Afrika beschränkt ist, wurde zuerst im Jahre 1909 und dann vereinzelt auch später eine Art des Kaprötel — Cossypha caffra (*L.*) von Fockelmann eingeführt. Sie erwarb sich sehr bald die Gunst ihrer Pfleger, die ihr reichlich zuteil wurde wegen ihres munteren, zutraulichen, dabei aber vorsichtigen Wesens. Auch der angenehme Gesang befriedigt nicht allzu anspruchsvolle Liebhaber. Er wurde besonders bei Sonnenschein vorgetragen, die Töne folgen sehr schnell und erinnerten einen Pfleger an das „silberne Plätschern eines Bächleins". Auch von anderen Vertretern der Gattung berichten Reisende über den Gesang, den sie dem des Steinrötels ähnlich schildern. Von einer Art sagt Heuglin (Ornithologie NO.-Afrikas), „das Männchen singt mit viel Abwechslung recht angenehm", und Krüger berichtet, daß er zwischen den Gesängen verschiedener Grasmücken (rueppelli, passerina, orphea) hindurch die helle und reintönende Stimme einer Cossypha gehört habe. Über den Gesang der weißflügeligen Schmätzerdrossel liegen leider keine Mitteilungen vor. Auch das, was über das Freileben berichtet wird, ist recht spärlich. Es geht aber daraus hervor, daß der Vogel im wesentlichen in seiner Lebensweise mit den Gattungsverwandten übereinstimmt. So berichtet Stark (Vögel Südafrikas 1901 Bd. II S. 214): „Wenig ist über das Benehmen dieses Vogels, der überall selten zu sein scheint, mitgeteilt. Er bewohnt dichtes Gebüsch oder Buschwald, selten fern vom Wasser. Er lebt von Insekten, welche er, wie das Kaprötel, in den Gebüschen erbeutet." Stark weist dann auf die Gewohnheit des Vogels, mit dem Schwanz auf- und abwärts zu schlagen und die Flügel hängen zu lassen, hin, eine Gewohnheit, die ja auch vom Kaprötel bekannt ist. Über die Art des Nistens sei nichts bekannt. Ein anderer Berichterstatter, Buckley, teilte im „Ibis" 1874 S. 370 mit, daß er ein Paar dieser Vögel verfolgt habe. Sie seien nicht sehr scheu, hielten sich aber immer im dichtesten Gebüsch auf, in welchem sie Futter suchten, das offene Gelände schienen sie zu meiden, im Magen eines erlegten Vogels habe man Insekten gefunden.

Das Verbreitungsgebiet der Weißflügelschmätzerdrossel ist Südostafrika.

Gefiederbeschreibung: oberseits schiefergrau, Bürzel rotbraun verwaschen, Oberschwanzdecken rotbraun; Kopf- und Halsseiten und ein von letzteren ausgehender bogenförmiger Streif auf den Seiten der Kropfgegend schwarz; Augenbrauenstreif von der Stirn bis auf die Schläfen, Kinn, Vorderhals, Brust weiß; Bauch, Körperseiten, Unterschwanzdecken rostgelblich; Flügeldecken schwarz mit weißer Binde, gebildet durch die weißen Spitzen der mittleren und einigen der inneren großen; Schwingen grauschwarz, außen fein weiß gesäumt; Unterflügel weiß, Flügelrand schwarz; Schwanzfedern braunschwarz, mit Ausnahme der mittleren und häufig auch der Außenfahne der äußersten an der Wurzelhälfte rotbraun; Auge nußbraun, Schnabel schwarz; Füße schwarzbraun; Lg. 170—180, Fl. 85, Schw. 85; Schn. 15—16, Lf. 27 mm.

Die Maße des von Herrn Dr. Adlersparre gehaltenen Vogels waren etwas geringer als die oben angegebenen, nämlich: Lg. 165, Fl. 83, Schw. 82, Schn. 14, Lf. 29 mm.

Der im Jahre 1886 erschienene Band XI des Brit. Catalog kennt 38 verschiedene Trupiale, der etwa zwei Jahrzehnte später erschienene 5. Band der Handlist kennt 55 Arten der schönen über das gemäßigte und tropische Amerika verbreiteten Gattung Icterus. Inzwischen mag noch hier und da eine neue Form entdeckt oder erkannt worden sein. Der Zahl der bisher lebend nach Europa gebrachten 21 Arten reiht sich als 22. Art der einem Fockelmannschen Import aus Mexiko entstammende und durch Lenger, Berlin, in den Handel gebrachte

Scotts Trupial — Icterus parisorum *Bp.*,

ein prachtvoller Vertreter seiner Gattung, an, an welchem wir neben anderen Vorzügen wiederum die schöne Färbung bewundern, die für die ganze Gattung kennzeichnend ist, vor allem die starken Gegensätze der prächtigen, fast immer scharf begrenzten, satten Farben des Gefieders. Daneben kommt seine Kleinheit und Zierlichkeit besonders für den Vogelpfleger in Betracht. Er ist etwa so groß wie eine Haubenlerche, steht demnach in der Größe den kleinsten Trupialformen nahe, etwa dem Gartentrupial, mit dem er den schlanken, leicht gebogenen Schnabel und den gestuften Schwanz gemeinsam hat.

Nun zu dem Namen des Vogels. Die Amerikaner nennen ihn „Scotts Oriole", nach dem Ornithologen Scott, der das Leben dieses Vogels am eingehendsten erforscht hat. Wir werden wohl am besten diesen Namen beibehalten, denn das Taufen der Vögel ist eine schwierige Sache, besonders wenn man einen Namen finden möchte, der für den Vogel bezeichnend ist. Merkwürdig mutet der wissenschaftliche Artname „parisorum" an. Da der Prinz Lucien

Bonaparte den Vogel benannt hat (1837), liegt die Annahme nahe, daß er den Namen mit Rücksicht auf die heimatliche Hauptstadt Paris und deren Einwohner gewählt hat. Der Name müßte dann allerdings „parisiorum" heißen. Aber derartige Fehler sind bei den wissenschaftlichen Namen keine Seltenheit. Die Sache verhält sich aber doch anders, und Bonaparte berichtet in Proc. Zool. Soc. London 1837 S. 110, daß es ihm sehr viel Vergnügen bereitet habe, den Vogel zu Ehren der Brüder Paris in Mexiko, anscheinend die Inhaber einer großen mexikanischen Handelsfirma, in deren wissenschaftlichen Sammlung er den bisher unbekannten Vogel vorfand, zu benennen. Es handelt sich bei dieser Namengebung um eine verdiente Ehrung der Herren Paris, die bei allen ihrer schwierigen Unternehmungen in Mexiko keine Gelegenheit vorübergehen ließen, das Interesse der Wissenschaft zu fördern. (Fortsetzung folgt.)

Scotts Trupial.

Nur ein Star.

Von A. Krüger, Graskau (Kreis Allenstein).

(Nachdruck verboten.)

Wenn ich ehemals als Neunjähriger meinen seligen Vater durch Feld und Wald begleiten durfte, war für mich immer ein Festtag erster Ordnung. Immer wieder mußte er erzählen vom Rotkehlchen, das beim kühlen Regenwetter so fest auf seinen Jungen saß, daß es sich mit der Hand fassen ließ, und von der Singdrossel, vom Wiedehopf und von der Elster, die er in jungen Jahren als Nestlinge aufgezogen hatte. Mein Hauptinteresse richtete sich auf die Speisekarte der Vögel, die mir der Hauptfaktor aller Vogelpflege zu sein schien. Immer wieder mußte mir mein seliger Vater bestätigen, daß er die Vögel mit Käfern, Würmern, Brot, Kartoffeln und Quark gefüttert habe. Der Inbegriff seines Sehnens war die Singdrossel, die er mir wegen ihres herrlichen Gesanges als das Ideal eines Vogels schilderte. Gern hätte er sich sein arbeitsreiches Alter noch durch Drosselgesang verschönen lassen; wie sehr bedauerte er die Abnahme der Drosseln wegen der empfindlichen Eingriffe in die Bestände der Gemeindewälder, wo nun, wie er zu meinem Leidwesen versicherte, kaum noch ein Drosselnest aufzufinden sei.

Das war so etwa der Grundstock meiner ornithologischen „Kenntnisse", als ich an einem Maitage einen jungen halbnackten Star fröstelnd an der Hauswand kauern sah. Er war aus dem Neste unter den Dachziegeln herausgefallen.

Es sei mir hier zuerst eine kleine Abschweifung gestattet.

Der Star ist in Ostpreußen wohl neben Schwalbe, Sperling und Krähe der populärste Vogel. Nach hohlen Bäumen und Starkasten Umschau zu halten, hat er bei uns nicht nötig; er hat sein Brutbedürfnis ganz der Bauart unserer Dächer angepaßt. Auf den Sparren liegt zunächst eine Lage halbzölliger „Schalbretter", über diesen an jedem Sparren herunter eine „Strecklatte", quer zu diesen in einem Abstande, der der Länge der „Dachpfannen" entspricht, die „Querlatten". An letzteren hängen mit kleinen Zapfen die durch seitliche Aufwölbungen übereinandergreifenden „Dachpfannen", die in hohlen Rinnen das Regenwasser ableiten. Die untere Dachkante ist durch die geschweifte „Buntlatte" abgeschlossen. Die aufgebogenen Ränder der Dachpfannen lassen über der Abschlußlatte kleine Öffnungen frei, die treffliche Einschlupflöcher bilden zu dem zwischen Verschalung und Dachziegeln entstehenden etwa 10 Zentimeter hohen Hohlraum. Hier ist die Kinderwiege unserer Stare, Segler und — Sperlinge, und unser Gassenjunge hat es gar nicht nötig, mit den Staren in Wohnungszwist zu treten. Fünf Starbruten unter einem einzigen Dache dürfen nicht als Seltenheit angesprochen werden. Ja, der Star ist unser Hausfreund, und jeder aufmerksame Schuljunge kennt hierzulande genau seinen Lebensgang. Mitte April tragen die Vögel in den Morgenstunden Strohhalme, Quecke und ähnliches Material zu Neste, worauf es dann einige Zeit ganz still unter dem Dache zugeht. Dann eines Morgens ein zaghaftes Zirpen, das mit jedem

Tage stärker und gemessener wird, bis Ende Mai jung und alt Abschied von dem lieben Dache nimmt. Was soll man nun dazu sagen, wenn in Lesebüchern immer wieder steht: „Die Alten reinigen die Wohnung und richten sie aufs neue behaglich ein für die zweite Brut," und selbst ornithologische Schriften sich zu der Behauptung versteigen: „Unterdessen sind die älteren Vögel zu einer zweiten Brut geschritten, die Ende Juni oder in den ersten Tagen des Juli flügge wird — es sind dies die sogenannten Brachstare —, während die einjährigen Vögel nicht immer noch ein zweites Mal brüten, vielleicht sogar nur ausnahmsweise, d. h. wenn man ihnen die Jungen geraubt hat, oder wenn der Brut sonst ein Unfall zugestoßen ist." Wenn Stare in manchen Gegenden — was ich bei dem in Ostpreußen zu beobachtenden ausnahmslosen Festhalten an einer Brut bezweifeln möchte — tatsächlich zu einer zweiten Brut schreiten sollten, so ändert das nichts daran, daß vorstehende Behauptungen in ihrer allgemeinen Form altüberkommener Unsinn sind, mit dem endlich aufgeräumt werden muß.

An der Hauswand also kauerte fröstelnd ein junger halbnackter, dem Neste entfallener Star. Das Tierchen sperrte das Schnäbelchen auf, als ich es berührte, und nahm auch willig Futter an, als ich alsbald mit einem Regenwurm herangesprungen kam. Ich hatte eine hohe Meinung von der Hinfälligkeit der Vögel, und das Lexikon der Stubenvögel war bei mir mit den vom Vater gehaltenen eingangs erwähnten Arten, zu denen allenfalls noch Kanarienvogel und Stieglitz kamen, von denen ich doch schon anderweitig gehört hatte, erschöpft. Aber die durch fleißiges Sperren sich zeigende Lebensbetonung des jungen Geschöpfes gab mir Mut und ließ mich in meiner Meinung wankend werden. Ich trug den Vogel in die Stube und setzte ihn auf Leinwandläppchen in eine deckellose Zigarrenkiste. Mein Vater schien anfangs meinem Vorhaben etwas mißtrauisch gegenüberzustehen, unterstützte mich aber alsbald durch Zutragen von Insekten und Gewürm, als er sah, daß der Vogel gesegneten Appetit entwickelte. Aber meine Freude war von kurzer Dauer. Als ich am dritten oder vierten Tage aus der Schule kam, kam mir meine Mutter mit der Trauerbotschaft entgegen, Nachbars Katze — unsere rote Katze verhielt sich vornehm zurückhaltend — sei durch die offene Tür hereingeschlichen und habe den Vogel sogleich erwischt. So war mein erster Vogel dahin, auf den ich schon so große Hoffnungen gesetzt hatte.

Unser guter Nachbar aber hatte Mitleid. Bald brachte er einen andern Star, den er wohl dem Neste entnommen hatte, und ich tröstete mich schnell. Der Vogel war beinahe flügge und wich vor meiner futterspendenden Hand scheu zurück in eine dunkle Ecke. Am andern Tage wurde er jedoch williger und nahm das Futter an. Nach einigen Tagen lernte der Vogel fliegen und hatte jede Spur von Scheu abgelegt. Er flog mir auf Kopf, Schulter und Hand, spreizte den Schnabel zwischen den Fingern und bettelte nach Futter. Seine Lieblingsnahrung waren die kleinen Wiesenheuschrecken, die es in jenem Jahre in Unmenge gab, während er Regenwürmern, eine Beobachtung, die ich auch an anderen Staren gemacht habe, weniger Geschmack abgewinnen konnte, sie später sogar einfach aus dem Schnabel schleuderte. Käfer nebst Quark, Brot, Kartoffeln ergänzten seinen Speisezettel.

„Hänsel", auf welchen Zuruf der Vogel alsbald prompt mit dem bekannten „Stoar" antwortete, und ich wurden nun unzertrennliche Freunde, ich zog ihn allen Spielkameraden meinesgleichen vor. Als Dank für diese Freundschaft ließ er sich auch wochenlang päppeln und war lange Zeit nicht an selbständige Futteraufnahme zu gewöhnen. Füllte ich am Morgen mein Waschbecken, so kam mir mein Star zumeist zuvor (das Käfigleben behagte ihm nicht recht und beschränkte sich zum Ärger meiner Mutter mehr oder weniger auf die Nachtzeit) und nahm ohne langes Besinnen ein Vollbad, ehe ich ans Waschen denken konnte. Nun suchte er sich nach Möglichkeit ein sonniges Plätzchen aus, wo er sein Gefieder unablässig mit dem Schnabel ordnete. Der dritte im Freundschaftsbunde war, so absurd es auch klingen mag, unsere rote Katze. Possierlich war es anzusehen, wenn sie auf der Ofenbank schlief und der Starmatz anfing ihr mit dem Schnabel den Kopf zu bezirkeln. Wurde ihr die Sache zu arg, so drohte sie ihm fauchend mit der Pfote, was meist den Erfolg hatte, daß sie einige Zeit nicht bezirkelt wurde. Stundenlang konnte das Tier in Gesellschaft des Vogels allein im Zimmer sein, ohne ihm auch nur das geringste Leid zuzufügen.

Neben seinem bettelnden „Stoar" ließ nun der Vogel auch ab und zu, besonders wenn er in beschaulicher Ruhe sich selbst überlassen war, kreischende und pfeifende Laute vernehmen. Ich hatte bald herausgefunden, daß er auf Geräusche reagiere, und machte fleißig scharrende Bewegungen mit einem Hölzchen auf einem Brett. Unter dieser „Anleitung" entwickelte sich der Vogel in einigen Wochen zu einem allerliebsten Schwätzer.

Eines Tages wagte ich nun mit Hänsel, der jetzt schon völlig selbständig war, auch einen Ausflug ins Freie. Neugierig flog er auf den Gartenzaun, auf das Dach und kam dann wieder zu mir geflogen, unbefangen wie sonst. Einmal schnitt er aber eine Kurve, wobei ich ihn beinahe aus den Augen verlor, stellte sich aber nach Ablauf weniger Sekunden in einem strammen Bogen wieder bei mir ein. Als ich ihn so als fernen Punkt im Ätherblau erblickte, fing ich doch an, mir über die Folgen seines möglichen Verlustes Rechenschaft zu geben, und wir begaben uns fürs erste wieder ins schützende Obdach. Bald jedoch hatte ich herausgefunden, daß solche Ausflüge harmlos seien, und wir ergingen uns fortan täglich im Freien. Im Grase suchten wir Heuschrecken und unter Steinen Käfer und Puppen der kleinen Wiesenameisen.

Mein Lieblingsaufenthalt war der Wald, warum sollte mich nicht auch mein Hänsel dorthin begleiten? So traten wir denn an einem warmen Nachmittag den $1^1/_2$ Kilometer weiten Weg zum Walde an. Der Vogel folgte auf dem eingezäunten Feldwege von Pfahl zu Pfahl, etwas hinter mir zurückbleibend und dann mich wieder mit kleinem Vorsprung überholend. Am Ziele angekommen, suchten wir ein vom Walde eingefriedigtes Kartoffelstück gründlich

nach Insekten ab und begaben uns nach etwa zwei Stunden auf den Heimweg. Etwa 200 Meter hatten wir uns vom Walde entfernt, als Hänsel auf einmal lautlos umkehrte und in gerader Linie zum Walde zurückflog. Ich folgte ihm mit klopfendem Herzen, rief an der Stelle, wo ich den Vogel einfallen sah, immerfort seinen Namen, aber diesmal antwortete mir kein „Stoar". Nach langem Suchen mußte ich allein den Heimweg antreten; wo hätte ich in dem verworrenen Fichtendickicht auch noch suchen sollen? Wehmütig betrachtete ich die Pfähle am Wege, auf denen mir mein Liebling noch vor kurzem so willig gefolgt war. Sollte das nun das Ende sein? Kaum konnte das Kinderherz diesen Gedanken fassen.

Mein Vater, der gegen Abend heimkehrte, ging selbst noch hin und suchte vor der Abenddämmerung die Waldkante — auch vergeblich — ab. Hänsel antwortete nicht, und schon sah ich im Geiste die Krallen des Habichts sich dem Unerfahrenen in den Leib bohren.

Müde stieg die Abendsonne hinter eine schwarze Wolkenwand, in der es von Zeit zu Zeit schwefelgelb aufflackerte. Alle Hoffnung hatte ich jedoch noch nicht begraben, als ich mich mit dumpfem Kopfe zu Bett legte; morgen war ja auch noch ein Tag — und dazu noch der schulfreie Sonntag. Nach kurzem Schlafe erwachte ich; um das Fenster des Stübchens rauschte und toste es, als fahre die wilde Jagd vorüber, und bläulich-weiße Flammenruten zuckten über den schwarzen Nachthimmel. Ein Glück noch, daß ich meinen Star, den Weltfremden, jetzt wenigstens im schützenden Walde wußte. Trüb stieg der Morgen herauf. Der Himmel hatte seinen grauen Regenmantel angezogen, und melancholisch träufelte es ununterbrochen zur Erde nieder. Der Vormittag ging hin; nur wenige lichte Augenblicke hatte es gegeben, die ich dazu ausnutzte, um in der Umgebung des Hauses nach dem Verlorenen auszuschauen. Da, um 2 Uhr nachmittags — sitzt denn da nicht etwas Graues auf dem Gartenzaun? „Hänsel!" rufe ich durch das geöffnete Fenster, „Stoar!" tönt es zurück. Willig schlüpfte der nasse Geselle in meine Hand, und Hunger hatte er mitgebracht zum Steinerweichen.

Muß man nicht staunen über die Intelligenz des Tieres, den mindestens 1500 Meter weiten Weg, dazu noch bei dem unsichtigen Wetter wieder zurückzufinden? Neuland hatte er entdecken wollen, aber die Sehnsucht nach den alten Verhältnissen trübte bald seine Forscherfreude. Möchten doch jene „Vogelschützler", die das Halten von Stubenvögeln in jedem Falle kurz mit „Freiheitsberaubung" und „Tierquälerei" abtun, sich einmal ein wenig in dieses Vogelidyll vertiefen! — Vielleicht dämmerte manchem doch die Überzeugung auf, wie haltlos das kritiklose Arbeiten mit Schlagwörtern ist.

Es ist ein alter Erfahrungssatz, jedem Vogelliebhaber genügend bekannt, daß Vögel, die sich viel außerhalb des Käfigs aufhalten, über kurz oder lang Opfer eines Unfalls werden. So fand auch dieser treue Vogel ein Ende, das seinen hohen Eigenschaften nicht entsprach. Seine Vorliebe zum Bade mußte er mit dem Leben büßen.

Vater und Mutter waren abwesend, und ich hatte mich auch für einige Zeit entfernt. Als ich bei meiner Rückkehr den Flur betrat, war es so unheimlich still im Hause, und das gewohnte „Stoar" tönte mir nicht entgegen. Ich ahnte Schlimmes. „Hänsel!" rief ich, aber in der Stube blieb es still. In einem halbgefüllten Eimer schwamm der leblose Vogel mit ausgebreiteten Flügeln. Infolge des tiefen Wasserstandes hatte er den Rand des Eimers nicht erreichen können und so ein frühes Ende gefunden.

Anhang.

In jenen Kindertagen habe ich eine gewisse ehrfürchtige Scheu vor unsern intelligenten Staren erworben, andererseits hat mich das tragische Ende des Vogels, das in der Tat ein schlechtes Omen für meine spätere Starliebhaberei geworden ist, lange davor zurückgehalten, wieder einen Starmatz zu meinem Hausfreunde zu machen. Es war mehrere Jahre später, ich besuchte wohl das letzte Jahr die Dorfschule, als ich im Roggenfelde einen Jungstar fand, der nicht recht fluggewandt war. Ich fing den flatternden Vogel mühelos ein und setzte ihn in den alten Starkäfig. Er nahm bereits selbständig Futter an, war auch für die Verhältnisse durchaus zahm; leider ging er nach einigen Tagen ein. Er hatte sich wohl ein Leiden mitgebracht, wofür auch seine Flugunfähigkeit sprach.

Arbeitsreiche Jahre gingen dahin, ohne daß ich meiner angeborenen Neigung zur Vogelwelt nachgehen konnte. Endlich wurde ich im Frühjahr 1919 Vogelwirt, begann aber nicht mit dem Star. Meine junge Ehehälfte jedoch, von der Lebensgeschichte meines ersten Vogels ergriffen, wollte gar zu gern einen Star in unserer Häuslichkeit sehen. Im ehemaligen Posen, wo ich damals Heimatrecht genoß, sind Starbruten geradezu eine Seltenheit, und es gelang mir nicht, eines Nestlings habhaft zu werden, darum fing ich auf den Zweigen der Frühkirschen drei Stare. Es waren sämtlich Vögel im Jugendkleide. Mit Kirschen ließen sie sich leicht ans Mischfutter bringen. Der erste, ein kleiner schmucker Vogel, entpuppte sich schon am zehnten Tage als sicheres Männchen, worauf ich die andern beiden wieder in Freiheit setzte. Der Vogel war ein immer munterer Schwätzer, wollte aber nicht mehr so zutraulich werden wie ein aufgepäppelter Nestling. Eines Tages hatte er das locker sitzende Türchen des Käfigs geöffnet und war durchs offene Fenster verschwunden. Durch nachstehende Notiz am Käfig soll sein Andenken gewahrt bleiben: „Star vom 11. 7. 1919 bis 31. 8. 1919." Es sei auch erwähnt, daß dieser Vogel meine viertägige Flüchtlingsreise aus Posen mitgemacht hat.

In diesem Frühjahr (1921) nun versuchte ich es noch einmal mit einem halbbefiederten Nestling, der wegen der dunkeln Gefiederzeichnung und weißen Kehle mit großer Wahrscheinlichkeit als Männchen anzusprechen war. Durch seine Zahmheit und Anhänglichkeit hatte er bald unsere Herzen erobert, aber — es schwebt nun einmal ein Unstern über meiner Starliebhaberei. So vorsichtig der Vogel auch stets bei einem Fluge durchs Zimmer auf der Fenstersprosse Platz nahm, so flog er doch einmal wie durch Zufall gegen die Scheibe und brach sich das Genick.

Obgleich er nur kurze Zeit in meinem Besitz war, hat der Vogel doch meine gesamten Erinnerungen an seinesgleichen geweckt und mich zu diesen Zeilen angeregt.

Kleine Mitteilungen.

Nesterfunde aus Leipzig und Umgebung im Jahre 1923. (Schluß.) Gartenrotschwanz, 15. 5., Probstei, 7 Eier. — Buchfink, 15. 5., Probstei, 1 Ei. — Heckenbraunelle. 15. 5., Ratsholz, Linie, 3 Eier. — Singdrossel, 15. 5., ebenso, 5 Eier. — Singdrossel, 15. 5., ebenso, 3 Junge. — Buchfink, 15. 5., ebenso, 6 Eier. — Singdrossel, 15. 5., ebenso, 1 Junges, 3 Eier. — Buchfink, 15. 5., ebenso, 3 Eier. — Star, 15. 5., ebenso ? Junge. — Star, 15. 5., Pleißenhochflutbett, ? Junge. — Star, 16. 5., Schwägrichenstraße, ? Junge. — Gartenrotschwanz, 16. 5., Hakenbrücke, Pleiße, 6 Eier. — Buchfink, 16. 5., Wolfswinkel, Neue Linie, 2 Eier. — Schwanzmeise, 16. 5., ebenso, 6 Eier. — Singdrossel, 16. 5., ebenso, 4 Eier. — Buchfink, 16. 5., ebenso, 5 Eier. — Singdrossel, 16. 5, Sportplätze, Neue Linie, 4 Eier. — Uferschwalbenkolonie, 17. 5., Sandgrube am Stachelnußteich b. Lübschütz, teils Eier, teils Junge. — Grünfink, 18. 5., Südfriedhof, 5 Eier. — Hänfling, 18., 5., ebenso, 3 Eier. — Rotrückiger Würger, 18. 5., ebenso, 3 Eier. Zaungrasmücke, 18. 5., ebenso, 4 Eier. — Rohrammer, 19. 5., Rohrbach, Mittelteich, 5 Eier. — Feldlerche, 19. 5., Rohrbach, Wiese am Großteich, 4 Eier. — Rohrammer, 19. 5., Rohrbach, 1 Ei. — Star, 19. 5., Störmthal, ? Junge. — Weiße Bachstelze, 20. 5., Südfriedhof, ? Junge. — Hausrotschwanz, 25. 5., am Eilenburger Park, ? Junge. — Uferschwalbenkolonie, 25. 5., Mulde bei Eilenburg, teils Eier, teils Junge. — Dohle, 25. 5., im Turm der alten Kirche zu Eilenburg, ? Junge. — Elster, 25. 5., an der Mulde bei Eilenburg, 2 Eier. — Rohrammer, 25. 5., Hainichen bei Eilenburg, 4 Eier. — Flußregenpfeifer, 25 5., Gruna bei Eilenburg, 2 Eier. — Rohrammer, 25. 5., Mulde bei Hainichen, 5 Eier. — Flußregenpfeifer, 25. 5., Mulde bei Eilenburg, 3 Eier. — Gartenrotschwanz, 26. 5., Gautzsch, 7 Eier. — Gartenrotschwanz, 26. 5., Ötzsch, 6 Junge. — Gartenrotschwanz, 27. 5., Lauer, Kirschallee, 6 Eier. — Gartenrotschwanz, 27. 5., Kirschallee bei Lauer, ? Eier — Buchfink, 27. 5., Kospuden, 5 Junge. — Zaungrasmücke, 27. 5., Kospuden, 4 Eier. — Singdrossel, 1. 6., Großzschocher, 5 Eier. — Buchfink, 2. 6., Großzschocher, ? Junge. — Eichelhäher, 2. 6., Ratsholz an der Linie, ? Eier. — Amsel, 2. 6., ebenso, 6 Eier. — Singdrossel, 2. 6., ebenso, 5 Eier. — Weidenlaubsänger, 2. 6., ebenso, 6 Junge. — Singdrossel, 2. 6., ebenso, 2 Eier. — Turmfalk, 2. 6., im Turm der Lutherkirche, 5 Eier. — Singdrossel, 3. 6, Großzschocher, 5 Eier. — Goldammer, 5. 6., Südfriedhof, 1 Ei. — Kohlmeise, 5. 6., Papestraße, 12 Junge. — Hausrotschwanz, 6. 6., Waisenhausstraße, ? Junge. — Grünfink, 6. 6., Anlagen um die Connewitzer Kirche, ? Junge. — Gartenspötter, 8. 6., Knauthainer Park, ? Eier. — Singdrossel, 8. 6., ebenso, 5 Eier. — Zaungrasmücke, 8. 6., ebenso, 4 Junge. — Singdrossel, 8. 6., ebenso, 5 Eier. — Singdrossel, 8. 6., ebenso, 5 Junge. — Amsel, 8. 6., ebenso, 4 Eier. — Steinschmätzer, 10. 6., Eilenburg, 2 Junge. — Flußregenpfeifer, 10. 6, Mulde bei Hainichen, 4 Eier. — Steinschmätzer, 12. 6., Grubnitz bei Wurzen, 2 Junge. — Buchfink, 14. 6., Knauthainer Park, 1 Ei. — Steinschmätzer, 18. 6., Grubnitz, 2 Junge. — Amsel, 22. 6., Ratsholz an der Linie, 4 Junge. — Steinschmätzer, 23. 6., Leipzig, Augustabrücke, 1 Junges. — Turmfalk, 24. 6., Dübener Heide bei Rotes Haus, ? Junge. — Steinschmätzer, 24. 8., Gruna b. Eilenburg, 3 Junge. — Uferschwalbe, 24. 8., Mulde bei Lausitz b. Düben, etwa 30 besetzte Röhren. — Triel, 24. 6., Dübener Heide, 2 Eier. — Hausrotschwanz, 25. 6., Kaiser-Wilhelm-Straße, ? Junge. — Buchfink, 26. 6., Knautkleeberg, 5 Eier. — Turmfalk, 26. 6., ebenso, 3 Junge. — Hänfling, 29. 6., Südfriedhof, 5 Eier. — Rauchschwalbe, 30. 6., Schenkendorfstraße, 2 Junge. — Hausrotschwanz, 1. 7., Macherner Park, 5 Eier. — Weiße Bachstelze, 1. 7., Sandgrube b. Lübschütz, 6 Junge. — Gartengrasmücke, 3. 7., Schrebergärten am Germaniabad, 3 Eier. — Amsel, 3. 7., ebenso, 3 Eier. — Mönchgrasmücke, 3. 7., Ratsholz bei der Stadtgärtnerei, 4 Eier. — Singdrossel, 3. 7., Ratsholz beim Pleißenwehr, 4 Junge. — Weidenlaubsänger, 3. 7., Nonne bei Schleußig, 5 Eier. — Singdrossel, 6. 7., Pleißenhochflutbett bei Gautsch, 4 Junge. — Zaunkönig, 10. 7., ebenso, 3 Junge. — Grünfink, 14. 7., Südfriedhof, 3 Eier, 1 Junges. — Grünfink, 14. 7., ebenso, 1 taubes Ei, 3 Junge. — Hänfling, 14. 7., ebenso, 3 Eier. — Weiße Bachstelze, 14. 7., Pleiße bei Oetzsch, 3 Junge. — Pirol, 20. 7., Pleißenhochflutbett beim Wildpark, 2 Junge. — Girlitz, 23. 7. Südfriedhof, 4 Junge. — Hänfling, 23. 7., Südfriedhof, 2 Eier. — Amsel, 23. 7., ebenso. 2 Junge. — Star, 31. 7., Wald beim Pleißenwehr, 3 Eier,

Die oben genannten Nester, zusammen 161 Stück, sind stets nur einmal aufgezählt.

Mit Herrn S. Haubold beringte ich im Jahre 1923 mit Rossitener Ringen folgende Vögel: 20 Singdrosseln, 16 Kohlmeisen, 11 Bluthänflinge, 11 Haussperlinge, 10 Uferschwalben, 10 Amseln, 8 Grünfinken, 6 Schwanzmeisen, 6 Gartenrotschwänze, 6 Weidenlaubsänger, 4 Mönchgrasmücken, 4 Girlitze. 3 Zaunkönige, 2 Buchfinken, 2 Turmfalken, 2 weiße Bachstelzen, 2 Gartengrasmücken, 2 Rauchschwalben, 1 Feldsperling, 1 Pirol.

S. H. Voerkel, Leipzig.

Vom Vogelmarkt.

Von seltener auf den Vogelmarkt kommenden Vögeln werden angeboten:

C. Cordier, Zürich, Werdgutstraße 7 (A. Z. Mtgl. 130): Paar Zwerg-Weißbauchamazonen, 1,0 blauer Wellensittich, 1,0 reinweiße Dohle, 1 Paar Pariser Trompeterkanarien, 1,0 weißbrüstiger Schilffink, 1,1 Zügelastrilde, 1 rotbrauner und 1 Hordenwebermännchen.

J. Horn, Bremen, Fedelhören 101 (Fernruf Hansa 1996): Mohrenkopfpapageien, ganz zahm.

Kleinerts „Tierhandlung", Berlin NO 18, Straußberger Straße 13 (Alex. 3313): Graupapageien, Grünpapageien, Zwergara, Sperlingspapageien, tarant. Unzertrennliche, gelbe Wellensittiche, Grassittiche, Yendajasittiche, gehäubte Kardinäle, Schamadrosseln, Spottdrosseln, Glanzstare, Purpurtangaren, Safranfinken.

E. W. Lengner, Berlin N 58, Schönhauser Allee 70a: Blaue Honigsauger (Türkisvögel), schwarzblaue Tangaren, Schwarzkappentangaren, violettblaue Organisten, Purpurtangaren, Schamadroffeln, Dajaldrosseln, blaubärtige Blattvögel, Goldaugentimalien, Schwarzwangenbülbül, indische Kronen-, Bergmeisen, rote Kardinäle, Katzendrosseln, Goldstirntrupiale, Schwarzbrustzeisige, Lerchenfinken, goldgelbe Safranfinken, Kubafinken, kleine Kubafinken, Schwarzkappenpfäffchen, Weißkehlpfäffchen, Erzpfäffchen, Graupfäffchen, Weißstirnpfäffchen, Jakarinifinken, Grassittiche, Kaktussittiche, Goldstirnsittiche, Blaustirnsittiche, Zwergara (Marakana), dunkelblaue Bischöfe, Blaustirnamazonen, Graupapageien.

Eugen Müller, Küllstedt (A. Z. Mtgl. 65): 1,1 Gelbscheitelweber, 0,1 Oryxweber, 2,0 jap. Mövchen.

Martin Schöll, Garmisch 46 (Oberbayern) (A. Z. Mtgl. 327): 1,1 gelbe Wellensittiche, 1,1 Feuerweber, 1,1 Blutschnabelweber, weißbäuchige Lerchen, Edelsänger, Dominikanerwitwe, Schamadrosseln, Goldstirnblattvögel.

Paul Tzornack, Berlin NO 55, Prenzlauer Allee 189: Grassittiche, Jendajasittiche, Safranfinken, Purpurtangaren, Zuchtpaar gelbe Wellensittiche.

(Fortsetzung auf der 3. Umschlagsseite.)

Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Jahrg. 53 | Den 10. April 1924 | Heft 8

(Druckort: Burg, Bezirk Magdeburg.)

Über Unzertrennliche und Sperlingspapageien.

Von Eduard Schütze.

(Nachdruck verboten.)

Im nachstehenden beabsichtige ich nicht ein allgemeines Lebensbild über Unzertrennliche und Sperlingspapageien überhaupt zu geben, sondern ich will nur meine Erfahrungen, die ich in der Pflege und Zucht gewisser Arten gemacht habe, bekannt geben. Ich tue das in der Hoffnung, daß andere Liebhaber, die diesen oder jenen von diesen Vögeln gepflegt resp. gezüchtet haben, uns ihre Erfahrungen nicht vorenthalten. Diese kleinen Papageien haben es mir von jeher angetan. Mit einem Paar der leider heute so seltenen Grauköpfchen habe ich vor nunmehr 12 Jahren meine Laufbahn als Vogelliebhaber begonnen und bin diesen reizenden Tieren bis heute treu geblieben.

Beginnen wir mit dem Rosenpapagei — Agapornis roseicollis. Färbung, Heimat usw. setze ich als bekannt voraus. Wer sich darüber orientieren will, möge im neuen Neunzig nachschlagen. Von dieser seltenen und begehrten Art konnte ich im Herbst 1922, anläßlich der ersten A. Z.-Tagung, ein einzelnes, wie sich nachher herausstellte, Weibchen von einem Berliner Händler erwerben. Dieses Tier habe ich, da kein Männchen zu erhalten war, ½ Jahr allein gekäfigt. Der Vogel wurde so zahm, daß er auf seinen Namen „Peterle" sofort ans Käfiggitter kam und ein Schnittchen Apfel aus der Hand nahm. Im Frühjahr 1923 erhielt die rühmlichst bekannte Firma August Fockelmann, Hamburg, den ersten Transport aus Südafrika, wo unter anderen seltenen Sachen auch Rosenköpfchen dabei waren, und ich erwarb ein Paar im Tausch gegen ein Paar orangeköpfige Unzertrennliche. Erstere kamen wohlbehalten in meinen Besitz. Ich wies ihnen einen 1 m langen Flemmingkäfig als vorläufigen Aufenthalt an und hängte denselben, nichts Böses ahnend, neben dem Käfig, in dem sich der einzelne Rosenpapagei befand, und kümmerte mich vorläufig nicht weiter darum. Als ich nach zirka zwei Stunden das Vogelzimmer betrete, finde ich einen der Neuankömmlinge auf dem Käfigboden sitzend und aus einer starken Kopfwunde blutend vor. Das Tier war förmlich skalpiert! Ich konnte mir den Vorgang nicht erklären, nahm den verletzten Vogel heraus und setzte ihn einzeln, wo er sich erholte. Nach einigen Tagen teilte mir Herr Fockelmann unter anderem folgendes mit: „Es wird Sie interessieren, daß von den mir gesandten Unzertrennlichen bereits am nächsten Tage nach Eintreffen das Weibchen von seinem eigenen Männchen totgebissen wurde, und zwar nehme ich an, daß es aus Eifersucht geschah, da das Männchen im Nebenkäfig zwei andere Weibchen sah." Herrn Fockelmann war es also ähnlich wie mir ergangen, nun wußte ich Bescheid. Bei mir lag der Fall umgekehrt! Hier hatte das Weibchen das Männchen gebissen, da sich im Nebenkäfig auch ein Weibchen befand. Nachdem ich das einzelne Weibchen aus dem Zimmer entfernt hatte, setzte ich das inzwischen geheilte Männchen wieder zu dem Übeltäter und fortan herrschte Frieden. Also so eifersüchtig ist die kleine Gesellschaft.

In der „Gef. Welt" ist seit 1899 keine gelungene Züchtung der Rosenpapageien bekannt gegeben, das beweist erstens, daß diese Vögel selten eingeführt werden und zweitens, daß die Zucht nicht so leicht ist, wie vielfach angenommen wird, denn sonst müßte in dem Zeitraum von 24 Jahren doch hier und da über eine gelungene Züchtung berichtet sein, denn die Art war, wenn auch nicht häufig, immer ab und zu im Handel zu haben. Auch mir ist die Züchtung im vorigen Jahre nicht gelungen! Nachdem ich den Käfig mit zwei von außen angehängten Nistkasten versehen und Niststoffe in Form von beblätterten Weidenzweigen gereicht hatte, konnte ich am 20. März die erste Begattung beobachten. Am folgenden Tage die zweite. Am 31. März bemerkte ich, wie das Männchen das Weibchen aus dem Kropfe fütterte, und am 9. April saß das Weibchen auf zwei Eiern. Niststoffe waren nur wenig eingetragen, auch nie während meiner Anwesenheit im Zimmer, trotzdem die Tiere absolut nicht scheu waren. Sie waren auch nicht im geringsten aufgeregt, wenn ich den Nistkasten zur Kontrolle abnahm, was allerdings nicht oft geschah. Das Weibchen blieb ruhig auf den Eiern sitzen und ließ sich mit einem Stöckchen zur Seite schieben. Es brütete fest, wurde in bekannter Weise vom Männchen gefüttert und verließ täglich nur einmal für fünf bis zehn Minuten den Nistkasten, um sich zu entleeren, aber ohne zu fressen. Am 24. April sah ich wieder nach; immer noch zwei Eier, also war das Gelege mit zwei Eiern voll. Das Männchen zeigte sich, wenn

das Weibchen außerhalb des Nistkastens war, ziemlich aufgeregt und trieb es schließlich unter Schnabelhieben wieder hinein. Am 5. Mai brütete das Weibchen immer noch.

Ich untersuchte nun die Eier, Resultat: ein Ei klar, das andere enthielt ein ziemlich ausgebildetes, abgestorbenes Junges. Dieses Paar wurde nachher in eine eigens dafür hergerichtete, nach Osten gelegene, geschützte Freivoliere (Größe 4 × 2 × 2), zusammen mit drei Paaren Grauastrilden, ein Paar Orangebäckchen und ein Paar Tigerfinken, gesetzt. Ich will gleich vorausschicken, daß sie sich um die kleinen Astrilde nicht kümmerten. Ich hatte diese Gartenvoliere mit einer hohlen Kopfweide von zirka 35 cm Stammdurchmesser versehen, in der Hoffnung, daß die Tiere darin brüten würden. Wie sich nachher herausstellte, benutzten sie den Baum, auf dem sie sonst gern herumturnten, nicht zur Brut, sondern zogen einen gewöhnlichen Wellensittichnistkasten vor.

Zu dem anderen einzelnen Weibchen konnte ich kein Männchen bekommen. Herr Krabbe war so liebenswürdig, getreu den Grundsätzen der A. Z., mir sein einzelnes Männchen (das Weibchen war entflogen) zur Verfügung zu stellen, wofür ich ihm an dieser Stelle herzlich danken möchte. Dieses Paar erhielt nun obigen Käfig, den anfangs Paar Nr. 1 bewohnte, angewiesen. Innerhalb 14 Tagen hatten sie sich begattet, trugen in der bekannten Weise Nistmaterial ein, als das Weibchen plötzlich Legenot bekam. Das Ei aufzustechen, dazu war ich nicht geschickt genug. Ich machte ein Dampfbad, wo das Tier leider, wahrscheinlich infolge Herzschlages, vor meinen Augen verendete, trotzdem das Wasser nicht zu warm war. Mitte August merkte ich, daß Paar Nr. 1 wieder brütete. Ich kümmerte mich dieses Mal wenig um die Tiere, sah auch absichtlich nie den Nistkasten nach, um nicht zu stören. Ich überzeugte mich jeden Tag, daß das Männchen gut fütterte, und damit war ich vorläufig zufrieden. Die Brut verlief im übrigen genau wie die erste. Das Weibchen bekam ich sehr selten, und dann auch nur für Augenblicke, zu Gesicht. Am 30. August, die Jungen mußten nach ungefährer Berechnung tagtäglich schlüpfen, benimmt sich das Männchen außerordentlich aufgeregt, und ich sehe, wie das Weibchen in einer Birke sitzt oder vielmehr hängt. Das Tier hält sich mit dem Schnabel und einem Fuß mühsam an den Zweigen fest, kann sich nicht halten und fällt zur Erde. Dieser Vorgang wiederholt sich mehrere Male. Schließlich fange ich es heraus, was gar nicht so leicht war, denn es konnte gut fliegen, befühle die Füße, Beine, kann aber nichts entdecken. Ich dachte, der Vogel würde vielleicht einen Fuß gebrochen haben, was nicht der Fall war. Ich wußte keinen Rat, sondern nahm das Weibchen, hielt es vor den Nistkasten und es schlüpfte auch hinein. Wie ich zu meiner Beruhigung feststellte, fütterte das Männchen nach $^1/_2$ Stunde wieder. (Eine ähnliche Beobachtung machte Herr Walter, Worms, an einem Weibchen Sperlingspapagei. „Ges. Welt" 1909, Seite 335.) Am 31. August mußte ich leider verreisen und am 1. September saß das Männchen mit untergestecktem Köpfchen auf der Weide. Ich sah den Nistkasten nach, das Weibchen war nicht darin, wohl aber vier Eier. Letztere waren alle befruchtet und enthielten vollständig ausgebildete Junge, die sicher in wenigen Tagen geschlüpft wären. Das Weibchen fand ich hernach tot hinter der Weide liegen. Es war schon in Verwesung übergegangen, so daß ich es Herrn Neunzig zur Untersuchung nicht mehr senden konnte. Dieses Mal hatten die Vögel aus zersplissenen, dünnen Birkenruten ein sorgfältig überwölbtes Nest gebaut, so daß die Eier, wenn man den Deckel aufhob, nicht zu sehen waren. Die Einschlupföffnung lag nicht vor dem Flugloch, sondern obenauf, in der äußersten Ecke an der Rückwand des Nistkastens. Nun noch ein Wort über die Ernährung der Rosenpapageien. Die Tiere fraßen bei mir hauptsächlich ungeschälten Hafer, Glanz, Sonnenblumenkerne, wenig Hirse und Hanf: im Sommer halbreife Hirse. Vogelmiere, die in der Voliere genügend wuchs, nahmen sie viel. Sie badeten häufig und gründlich! Das Geschrei ist mir, selbst im Zimmer, nie zuviel geworden, aber ich weiß wohl, daß andere Vogelliebhaber darüber anders denken. Jedenfalls hat Herr Adlersparre darin recht, daß vier Rosenköpfchen von sechs bis sieben Wellensittichen überschrien werden. Die Geschlechter kann man meiner Ansicht nach äußerlich nicht unterscheiden. Daß das rosafarbene Gefieder beim Weibchen fahler sein soll und der Schnabel kleiner, ist nicht stichhaltig. Bei meinem Paare Nr. 1 waren in der Farbe und Schnabelgröße absolut keine Unterscheidungsmerkmale zu finden, das Weibchen war aber beträchtlich größer wie das Männchen. Beim Paar Nr. 2 dagegen (Männchen des Herrn Krabbe) war es umgekehrt. Jedenfalls sind auch erfahrene Händler, wie Herr Fockelmann, meiner Ansicht.

Es war mir leider nicht möglich, zu meinem einzelnen Männchen inzwischen ein Weibchen zu bekommen. Da aber Aussicht vorhanden ist, daß im Frühjahr wieder Rosenköpfchen importiert werden, werde ich mir wieder 1,2 anschaffen und die Zucht in diesem Jahre, hoffentlich mit besserem Erfolge, erneut versuchen. (Schluß folgt.)

Exakte Vererbungsversuche bei Kanarienvögeln.

Von Dr. H. Duncker, Bremen.

(Schluß.) (Nachdruck verboten.)

VIII.

9. Wenn wir uns über einen schmackhaften Apfel freuen und den Träger dieses Apfels in unsern Garten anpflanzen möchten, so dürfen wir nicht einen Kern dieses Apfels aussäen, denn wir würden nur einen bitteren Wildling erzeugen; wir müssen vielmehr ein Reis des edlen Apfelbaumes auf eine Unterlage, die ihm den Nährstrom zuzuführen in der Lage ist, aufpfropfen, also gleichsam das Leben des edlen Apfelbaumes verlängern. Die edlen Eigenschaften des schmackhaften Apfels sind also nicht erblich, es sind Modifikationen. Wenn wir dagegen eine gute Karotte, deren Abstammung von der wilden Möhre unzweifelhaft ist, anpflanzen wollen, so können wir uns Samen von der guten Möhre nehmen und aussäen. Die guten Eigenschaften der Karotte sind also erblich. Es sind Mutationen. Daß wir Modi-

fikationen erzeugen können durch gute Ernährung und Pflege, oder daß der Organismus selbst durch Gebrauch oder Nichtgebrauch seiner Organe — man denke an die Muskulatur — diese kräftigen oder schwächlich werden lassen kann, was doch auch Modifikationen darstellt, steht außer allem Zweifel. Auch der Kunstgesang ist sicherlich zum größten Teil eine Modifikation, die durch die „Schule" in jedem Jungvogel neu erzeugt wird. Aber ebenso klar ist es, daß es uns niemals möglich sein wird, auf dem Wege über die erzielten Modifikationen zu neuen Rassen zu kommen, wenn nicht diese erzielten Modifikationen ihrerseits wieder auf das Erbgut in gleich gerichtetem Sinne einzuwirken in der Lage sind. Bevor die Mendelforschung einsetzte, also zuzeiten Darwins und Häckels zweifelten nur wenige Forscher an der Möglichkeit, daß solche Modifikationen zu Mutationen



Rosenpapageien.

werden könnten, beruht doch die ganze Selektionstheorie Darwins auf dieser Annahme. Zahlreiche exakte Versuche wurden angestellt, um diese Übertragung von Modifikationen auf das Erbgut zu beweisen, aber alle diese Versuche haben entweder einen negativen Verlauf gehabt, oder die Versuchsbedingungen waren nicht so einwandfrei, daß eine direkte Beeinflussung des Erbgutes ausgeschlossen war. Daher stehen heute die meisten Forscher auf dem Standpunkt, daß wir zwar Modifikationen schaffen können, daß wir aber nichts dazu tun können, diese Modifikationen zu Mutationen werden zu lassen. Andererseits können wir Änderungen in der Lebensweise vornehmen, unter derem Einfluß sich Mutationen einstellen, wir können aber lediglich dieses Eintreten von Mutationen beobachten und registrieren, niemals aber richten, geschweige denn vorhersagen. Da dieses letztere aber das unbedingt zu erstrebende Ziel für alle Züchter sein muß, die Erzeugung von Mutationen in die Hand zu bekommen, sind alle Beobachtungen, welche in dieser Richtung liegen, von allerhöchstem Wert. Ob der Gesang des Vorsängers ein solcher richtender Einfluß auf das Erbgut darstellt, welcher auf dem Wege über die durch den Vorsänger erzeugten Modifikationen in den Versuchsvögeln solche gewünschten Mutationen erzeugt, daß dadurch neue Gesangstypen entstehen, mag zweifelhaft erscheinen, ausgeschlossen ist es aber nicht. Das von uns durchgeführte Isolationsexperiment spricht nicht dagegen, wenn es auch kein Beweis für eine solche Mutation ist. Dazu fehlt die für jede Mutation unerläßliche Durchforschung nach der Mendelschen Methode.

10. Zum Schluß meiner Arbeit sei es mir gestattet, kurz die Ergebnisse der bisher gemachten exakten Vererbungsversuche an Kanarienvögeln zusammenzustellen.

1. Die äußerlich wahrnehmbaren Eigenschaften des Kanarienvogels verdanken ihre Entstehung gewissen im Kern der befruchteten Eizelle in den Chromosomen gelagerten Erbfaktoren.

2. Solche Erbfaktoren sind:

a) Der Haubenfaktor: Er erzeugt eine Aufrichtung der Scheitelfederfollikel und dadurch Wirbelbildung. Er ist dominant über die Abwesenheit dieses Faktors bei den glattköpfigen Vögeln. Er ist mit einem Lethalfaktor gekoppelt, so daß homozygote Haubenvögel nicht lebensfähig sind. Bei Paarung von Haubenvogel mit Haubenvogel stirbt jeder vierte Vogel. Eine reine Haubenvogelrasse ist nicht erzielbar.

b) Der Scheitelfederverdichtungs- und Verlängerungsfaktor (Norwich und Lancashirevögel): Er ist mit keinem Lethalfaktor gekoppelt, homozygote Vögel sind lebensfähig. Die Rasse züchtet rein.

c) Der Chromogenfaktor C: Er erzeugt an sich keine Farbe, ermöglicht aber erst die Melaninbildung. Alle Vögel, denen der Chromogenfaktor fehlt, haben rote Augen. Sie müssen entweder reingelbes oder reinweißes Gefieder haben. Der Chromogenfaktor ist auch dem Wildling eigen.

d) Der Schwarzfaktor S: Er liegt im Geschlechtschromosom X. Er veranlaßt bei Anwesenheit des Chromogenfaktors die Bildung des schwarzen Melanins und damit die Schaftstrichelung. Bei seiner Abwesenheit tritt nur das braune Melanin in die Erscheinung. Die Vögel zeigen dann Isabellenfarbe. Infolge der Lage des Schwarzfaktors im Geschlechtschromosom ist die Vererbung der Isabellfarbe geschlechtsgebunden.

e) Der Braunfaktor B: Er erzeugt bei Anwesenheit des Chromogenfaktors den braunen Melaninfarbstoff. Sein Fehlen ist nur selten bekannt geworden.

f) Der Gelbfaktor G: Er erzeugt die Entstehung des diffus verteilten Gelbfarbstoffs (Lipochrom). Sein Fehlen ist bisher nicht zur Beobachtung gekommen.

g) Der Weißfaktor W: Er verhindert die Entstehung des Gelbfarbstoffs bzw. beschränkt ihn auf ganz minimale Teile des Körpers (Handschwingen und Schulter) ein. Er ist mit einem Lethalfaktor gekoppelt. Homozygote weiße Vögel gibt es nicht, eine reine weiße Rasse ist daher nicht heranzuzüchten. Auf die Melanine hat der Weißfaktor keinen Einfluß.

h) Federstrahlenverdickungsfaktor F: Er verwandelt die strohgelbe Färbung in eine hochgelbe Färbung. Darum ist Hochgelb dominant über strohgelb. Der Faktor F ist mit einem Lethalfaktor gekoppelt. Hochgelbe Vögel sind nicht rein zu züchten.

i) Der freie Lethalfaktor L: Er ist in allen hochgelben und strohgelben Vögeln vorhanden, die ihn aber nur heterozygot enthalten. In diesem Zustande wirkt er nicht tödlich. Sobald er aber homozygot wird, wirkt er tödlich. Dieser Lethalfaktor ist nichts anderes als ein Lethalfaktor, der mit einem der „P-Faktoren gekoppelt ist.

k) Die Aufhellungsfaktoren P1, P2, P3, P4 usw.: Sie drängen die Pigmentbildung, soweit die Melanine in Betracht kommen, um so mehr zurück, je mehr solcher P-Faktoren im Vogel enthalten sind. Sind sämtliche P-Faktoren, die es gibt, vorhanden, ist der Vogel rein gelb. Es können niemals alle P-Faktoren homozygot sein, da sie teilweise mit Lethalfaktoren gekoppelt sind. Reine gelbe Rassen lassen sich daher nicht züchten. Der Haubenfaktor muß auf einen P-Faktor hemmend einwirken, da Haubenvögel stets eine gering pigmentierte Haube haben. Die Zahl der P-Faktoren ist unbekannt.

3. Die den Gesang bestimmenden Erbfaktoren kennen wir nicht. Hier sind weitere Versuche sehr erwünscht, aber sehr zeitraubend und kostspielig. Sie können nur durch das Zusammenwirken vieler Interessen erzielt werden. Meldungen über Bereitwilligkeit zur Beteiligung an solchen Versuchen an den Verfasser Dr. H. Duncker, Bremen, Wernigeroder Str. 22.

4. Die Frage der Vererbung erworbener Eigenschaften ist noch ungelöst. Bisher zur Klärung dieses Problems angestellte Versuche sind entweder negativ verlaufen oder auch noch einer andern Erklärung zugänglich. Solange diese Frage nicht geklärt ist, gilt der Satz: Modifikationen sind durch äußere Einflüsse im Organismus hervorgerufene Abänderungen, welche nicht erblich sind. Sie können vom Züchter willkürlich hervorgerufen werden. Mutationen sind Abänderungen des Erbgutes. Sie verdanken ihre Entstehung ebenfalls wenigstens zum Teil äußeren Einflüssen und sind erblich. Der Züchter hat keinen Einfluß auf die Entstehung und den Charakter dieser Mutationen. Die Regelung des Auftretens von Mutationen durch die Hand des Züchters ist anzustreben.

Bremen, den 9. Juli 1923.

Aus dem Böhmerwald.

Von Johann Fischer.

(Nachdruck verboten.)

Wer im Böhmerwald das Licht der Welt erblickt hat, ist erblich belastet mit der Liebe zur Vogelwelt und der Neigung, Vögel im Käfig zu halten. Warum sollte es mir als Waldler anders gehen? Am Stieglitz und Zeisig lernte ich's und am Rotkehlchen. Es gelang mir anfangs nicht, lauten Gesang vom Rotbart im Käfig zu hören. Alle, die ich hielt, wurden wieder ausgelassen, weil sie nicht befriedigten. Endlich gelang es. Ich bekam ein noch nicht vermausertes Rotkehlchen im Jugendkleid, es war ein Männchen. Im Kistenkäfig gehalten, wurde es bald zahm, und das größte Vergnügen schien es ihm zu machen, wenn es mit meiner Hand beim Futtergeben und Reinigen des Käfigs tüchtig raufen konnte. Es biß kräftig in meine Hand. Ab und zu sah es mich mit den prächtigen Augen anscheinend fragend an: „hast du noch nicht genug", bald biß es dann mitleidlos weiter auf meine Hand ein. Es wurde ein herrlich lautsingender Vogel, den mir ältere Liebhaber, die oft ins Haus kamen, um den Vogel zu hören, endlich abschwatzten. Man hatte fast den Eindruck, als hing ihre irdische Glückseligkeit vom Besitz gerade dieses Vogels ab.

An einem schönen Morgen im Frühjahr „gelangte ich in den Besitz" einer Singdrossel. Am 3. Tage schon sang sie laut. Sie erfreute mich durch ihre schönen, deutlich und klar ausgesprochenen Rufe wie Biawit — Sophie — Ida — Eimer — Kaffee — Stieglit — Wohin — Tatata und andere mehr. Ich besitze sie jetzt 3 Jahre und halte sie in einem Flugkäfig von 130 × 100 ⊥ 178 cm. Der große Käfig beeinträchtigt ihren Gesangsfleiß nicht. Sie hat auch noch nie während der Zugzeit des Nachts getobt.

Als Gebirgler bin ich ein besonderer Verehrer des Schwarzplättchens und käfige stets etliche schöne Schläger aus dem Gebirge, womit ich durchaus nicht

sagen will, daß es nur im Gebirge gute Schläger dieser Art gibt, denn ich habe auch schon recht gute Schwarzplättchen in den Niederungen ge- und abgehört. Wie bei meinem unvergeßlichen Rotkehlchen kommen auch jetzt alte Liebhaber zu mir, um meine Schwarzplättchen abzuhören, innerlich sicher mit dem heißen Wunsche, mich zur Abgabe des einen oder anderen Vogels zu bewegen. Das gibt's aber nicht mehr. Es ist nicht leicht, das weiß ich wohl, gute Mönchgrasmücken zu bekommen, und ich fühle mit Dir, lieber Schwarzplattlfreund, wie gern Du bei der Schriftleitung meine Adresse erfragen möchtest, damit Du von mir ein gutes Plättchen erhalten könntest. Aber der Erfolg muß Dir leider versagt bleiben, da die Schriftleitung meine Adresse nicht kennt. Und wenn die alten Gebirgler dann bei mir sind, dann wird abgehört und der Gesang kritisiert und diskutiert, als gäb' es weiter nichts auf der Welt als Schwarzplättchen und den Böhmerwald. Man ist sich da völlig einig, den besten Gesang gibt's nur in „unserm" Bergwald. Ich selbst scheue keine Kosten für gute Plättchen, ganz gleich, woher sie stammen. Während ich diese Zeilen schreibe, läßt neben mir eins sein tiefes, feuriges „Dihu-dihu-dia-huli-dia-du" ertönen.

Die Frage, warum der Gesang der einzelnen Schwarzplättchen so sehr voneinander abweicht, ist wohl nicht ganz leicht zu beantworten. Es hat wohl bisher noch niemand zwei gleichschlagende Plättchen gehört, während man bei anderen Vögeln, die auch „Mischer" sind, doch nicht selten völlige Übereinstimmung feststellen kann, wenn sie derselben Gegend entstammen. Ich bin im Besitz einer Mönchgrasmücke, eines echten Gebirgsvogels, den ich von einem alten Liebhaber im Böhmerwald erwarb, der durch seine eigenartig wohltönende Stimme immer aus einer größeren Menge singender Vögel herauszuhören ist. Der Vorbesitzer versicherte mir, es wäre bisher das einzige Schwarzplättchen gewesen, das über eine solche Stimme verfüge unter den vielen, die er gehört und besessen habe. Es ist ja unmöglich, den Gesang durch Silben wiederzugeben, ich will es trotzdem versuchen. Der Vogel wiederholt einige Gesangstouren oft mehrmals hintereinander, bei den Endauslauten tut er das regelmäßig drei- bis viermal. So ungefähr lautet der Gesang: „duhüa duhüa wü wü" — „duhüa duhüa wü wü wü wü" — „dui dui dui duhü hawü" — „wü wü wü wü hawü" — „Zü hü hü hü duhü" — „duwit duwit duwit wü hawü duhüa duhüa wü, wü wü wü" — „Züha wüha wü" — „düha düha dulü ü ha" — „hui hui hui ühü" — „hoü hoü biwa wiwa ühü". Diese und ähnliche Laute bringt der Vogel hervor, aber nicht immer in derselben Reihenfolge. Er wird aber schon Ende April und im Mai so scharf im Gesang, daß er nicht mehr alle Strophen bringt. Der Vogel ist auch sonst eigenartig. Käfigwechsel verträgt er nicht gut, z. B. verschmäht er das Futter, ab und zu verzehrt er jetzt einen Mehlwurm, den er im vorigen Jahr überhaupt nicht beachtet hat. Als Herbst- und Winterfutter erhalten meine Schwarzplattel hauptsächlich gequollene rote Holunderbeeren mit Ameisenpuppen und Reformnormalfutter.

Sehr beliebt ist hier natürlich auch der Kreuzschnabel. Über einen schönen „Roten" geht nichts. Über die Wertschätzung dieses Vogels hört man hier die ergötzlichsten Geschichten. Ging da ein eifriger Kreuzschnabelliebhaber mit seinen Lockvögeln hinaus auf den Fang. Es waren schöne rote Vögel auf dem Fangplatz beobachtet. Er mußte hinaus, selbst die Erkrankung seiner einzigen Milchziege und deren notwendige Pflege hielt ihn nicht zu Haus. Die arme Ziege war, während er am Fangplatz saß, verendet. Die Frau des Kreuzschnabelfreundes wußte wohl, wo er sich aufhielt und ging auch hinaus, um dem Mann den schmerzlichen Verlust der Ziege zu klagen. Von weitem sah sie ihn schon, der gespannt den Bewegungen eines schönen „Roten" folgte. Sie rief ihm herüber, daß die Ziege verendet sei. Ärgerlich über die Störung und befürchtend, daß der „Rote", der fast in seinem Besitz war, wieder abfliegen würde, schrie er zu seiner Frau hinüber: „Halt deine Gusche (Mund), ein Roter".

Der rote Kreuzschnabel war ihm lieber als seine Milchziege. Vom Vogelfang, dem die alten Herren, welche mich häufig besuchen, als junge Männer eifrig und mit Liebe oblagen, erzählen Sie mir dann mancherlei. Besonders beliebt war bei ihnen eine Fangart, die sie „auf den Reisbaum gehen" nennen. Da wird im Walde an einer ziemlich lichten Stelle eine passende freistehende Fichte ausgesucht, deren untere Äste gekürzt und mit Leimruten besteckt werden. Um den Stamm wird von dem abgeschnittenen Grün eine Hütte gebaut, in welche sich die Fänger verbergen. In etwa 3 m Entfernung von der Hütte werden rings um diese mit Leimruten besteckte Stangen, sog. Rotkehlchenstangen, aufgestellt. Ist alles fertig, so verschwinden die Fänger in den Hütten, lassen das Wichtel (Steinkauz) los und warten der Dinge, die da kommen sollen. Diesmal war's auf Häher und Raubvögel abgesehen, und schon glaubte man, da man in der Hütte auffallende Geräusche hörte, ein größerer Raubvogel sei auf den Leim gegangen. Groß war aber die Enttäuschung. Ein böhmischer Gendarm war mit dem wallenden Federbusch seines Hutes an den Ruten der Rotkehlchenstangen haften geblieben. Froh, daß wir ihn

Falzschnabelpfäffchen.

von den klebrigen Leimruten befreit hatten, zog er seines Weges.

Zum Schluß möchte ich darauf hinweisen, daß man jetzt überall beobachten kann, in Stadt und Land, daß die Holunderbüsche aus den Gärten ausgerottet werden, wohl weil die schnellwüchsigen Sträucher viel Schatten geben und auch ihre Wurzeln weit hinein in die Gärten entsenden. Die Entfernung der Gebüsche ist außerordentlich bedauerlich im Interesse der Vögel, denen sie Nistgelegenheit und Nahrung geben und die mit ihnen verschwinden.

Ein rettender Eingriff bei Legenot.

Von Dr. Hans Krösl, Innsbruck.

(Nachdruck verboten.)

Im Frühjahr vorigen Jahres waren mir einige Wellensittichweibchen an Legenot eingegangen, trotzdem ich die mir bekannten Hilfen (Kaltwasserstrahl auf den Unterbauch, Einführen von Öl in die Legeröhre) ihnen stets rechtzeitig angedeihen ließ. Diese betrübliche Tatsache brachte mich auf den Gedanken, die Sache anders anzugehen und die Entfernung des ganzen Eies auf dem natürlichen Wege zu versuchen. Gleich beim ersten Versuch gelang der Eingriff tadellos, und seither habe ich schon mehrmals Wellensittiche und einmal auch ein Silberfasänchen in der weiter unten angeführten Weise behandelt, ohne daß ich ein einziges Mal einen Mißerfolg zu verzeichnen gehabt hätte. Im Gegenteil, ich führe es nur auf das angewendete Verfahren zurück, daß mir ein schwächliches Wellensittichweibchen, das sehr jung zu legen begann, erhalten blieb, denn es bekam bei allen sechs Eiern, die es legte, Legenot, und bezweifle ich nach meinen Erfahrungen, daß hier jedesmal Wasserstrahl usw. geholfen hätten.

Der Eingriff ist äußerst einfach und meiner Ansicht nach, wenn er mit etwas Vorsicht gemacht wird, vollkommen gefahrlos für den Vogel. In ein bis zwei Minuten ist alles vorüber und kurze Zeit darauf der Vogel vollkommen wohlauf.

Ich lege das Tierchen auf den Rücken in die linke Hand und umschließe es nun mit dieser so, daß die Bauchgegend frei bleibt. Mit zwei Fingern der rechten Hand umfasse ich nun das Ei am oberen Pol, um es in der Richtung nach außen herauszudrücken. Bald sieht man die Legeröhrenöffnung sich weiten, und gleich darauf tritt das vom Darm — der sich umstülpt — überzogene Ei zutage. Man sieht nun sofort die sternförmige Öffnung des Darmes und sieht mitunter auch schon den Eipol weiß herausschauen. In den meisten Fällen genügt nun ein ganz leichter Druck, um das Ei herausspringen zu lassen. Ist die Darmöffnung nur als kleinste sternförmige Öffnung zu sehen, dann schiebe ich mit einem reinen Tuch den Darm gleichmäßig nach allen Seiten zurück, und dann kommt auch in diesen Fällen das Ei leicht zutage. Den nachher prolabierten Darm schiebe ich mit dem kleinen Finger oder mit dem Glaskopf einer Stecknadel wieder zurück, setze den Vogel in einen Nistkasten, und eine halbe Stunde nachher ist er wieder frisch und munter.

Der Vorzug des geschilderten Verfahrens liegt meiner Ansicht nach in der Kürze, wodurch dem Vogel längeres Leiden erspart bleibt, und in der Zuverlässigkeit desselben, denn ich habe, wie erwähnt, seitdem ich die Legenot so behandle, noch nicht einen einzigen Todesfall an Legenot gehabt.

Eine Gefahr liegt wohl nur darin, daß bei zu geringer Vorsicht, zu raschem Druck der Darm verletzt werden kann. Diese Gefahr besteht besonders dann, wenn das vom Darm überzogene Ei schon heraußen ist, die Darmöffnung aber geschlossen bleibt und man dann nicht den Darm am Ei zurückschiebt, sondern das Ei herausdrücken will.

Ich hoffe, daß meine kleine Anregung für manchen Züchter eine Hilfe ist, wenn einer seiner Lieblinge an Legenot erkrankt.

Am Niederrhein.

Von C. G., M.-Gladbach.

(Nachdruck verboten.)

Als ich vor nunmehr fast 20 Jahren — nach vielen Wanderfahrten im In- und Auslande — ein Heim im schönen Rheinland gründete, nahm auch die Liebe zur Natur und zu ihren Geschöpfen, den Vögeln, bei mir feste Formen an.

Nichts konnte auch meine angeborene Schwäche für die gefiederten Sänger der Fluren und Wälder mehr begünstigen, als der dauernde Aufenthalt am linken Niederrhein, wohin ich verschlagen wurde. Hier, bei den sangesfrohen Rheinländern, war ja die Vogelliebhaberei zu Hause, und bald zogen auch die ersten gefiederten Freunde in mein Heim ein.

Welche Gegend im deutschen Vaterlande vereinigt auch bei allen Reizen der Natur die Üppigkeit und Fülle in der Pflanzen- und Vogelwelt! Hier kommt eins das andere entgegen, indem die Natur den Lebewesen Lebensmöglichkeiten bietet und die Geschöpfe die Natur ausfüllen. Ausfüllen in des Wortes schönster Bedeutung. Hier ist auch das Dorado der Nachtigallen!

Denn welcher Natur- und Vogelfreund, dem die niederrheinische Ebene bekannt ist, gedächte (im verzeihlichen Egoismus) nicht besonders der Sängerkönigin des rheinischen Waldes!

Und welcher sinnige Naturfreund und Liebhaber könnte sich wohl dem Zauber eines einzigen Sommermorgens verschließen, den ich hinausführen wollte, dorthin, wo im taufrischen Bruch der Nachtigallen Minnelied erschallt! Er würde nicht nur in Bewunderung des herrlichen Schlages verharren, dem die rheinische Nachtigall ihren Ruhm verdankt, sondern er würde auch staunen, aus wie viel Kehlen es ihm entgegenjubelt — aus dem Bruch am Niederrhein.

Was gibt es für den Natur- und Vogelfreund auch Schöneres, als die Zeit herbeisehnen, wo nach trüben Wintertagen die Sonne an Kraft gewinnt, wo neue Hoffnung Natur und Mensch beleben, wo tausend Blümlein zu neuem Leben erwachen: dann ist auch die Zeit nahe, daß unsere gefiederten Freunde aus weiter Ferne zurückkehren, zur alten lieben Heimat, um uns den Frühling zu künden — den deutschen Frühling!

Aber erst die Nachtigall ist des Rheinländers wahrer Frühlingsbote. Der erste Schlag des Finken, der Ruf der Drossel oder des Rotkehlchens träumerische Weise können auf sein Gemüt diese Wirkung nicht ausüben, als wenn es von Mund zu Mund geht: die Nachtigall ist wieder da! In allen Blättern des Niederrheins wird ihr Wiedererscheinen angekündigt und mit Freuden begrüßt.

Daher findet auch das Bestreben eifriger Naturfreunde, die Nachtigall, den Schmuck und die Krone eines jeden Waldes, dort wo sie fehlt, anzusiedeln, volles Verständnis. Dazu gehört aber vor allen Dingen eine Örtlichkeit, die ihrer Natur und ihrem ganzen Wesen angepaßt ist. Nur eine Gegend, wo sie genügend Unterholz findet, durchsetzt mit dichtem Buschwerk und Dornengestrüpp, kann sie auf die Dauer fesseln. Dort findet sie auch, was sie zum Leben und zur Erhaltung ihrer Art gebraucht: Schutz, Nahrung und Nistgelegenheit. Hat sie in der Nähe noch ein Wässerchen oder durcheilt gar ein Flüßchen dies Gebiet, dann dürfte der Erfolg der Ansiedelung dadurch noch bedeutend erleichtert sein; denn am Wasser, am Wasser da bin ich zu Haus!

Ebenfalls werden die Klagen in der „Gefiederten Welt" über das Verschwinden der Nachtigall aus manchen Gegenden meines Erachtens auch auf den Mangel an geeignetem Wald zurückzuführen sein, und das Vertreiben derselben durch andere Vögel — vorausgesetzt daß die Örtlichkeit nicht zu eng bemessen ist — sind Kombinationen, die durch die Tatsache aus anderen Gegenden, wo beide Vogelarten, Nachtigall und Amsel, ihr Fortkommen finden, hinreichend widerlegt. Hat die Nachtigall an Orten, die sie auf ihrem Zuge berührt (und natürlich auch schlägt), eine Nistgelegenheit nicht gefunden, dann zieht sie weiter, und ihr Verschwinden wird in den meisten Fällen grundlos zwei- oder vierbeinigen Räubern zur Last gelegt oder gar der Amsel angedichtet.

Aber auch am Niederrhein, wo ich meine Betrachtungen anstelle, ist die Häufigkeit der Nachtigallen in den einzelnen Jahren großen Schwankungen unterworfen. Genau wie bei einer guten und schlechten Ernte. Ich habe hier Jahre gesehen, wo nicht nur jedes Brutrevier des Waldes besetzt war, sondern auch jedes kleine Feldgehölz ein Paar aufwies. Sogar Sandgruben, die mit Brombeergerank und Gesträuch bestanden waren — Vögel und Wind waren hier vielleicht einmal die Gärtner —, waren von einem Pärchen Nachtigallen als Heim auserkoren.

Die schlechten Erntejahre im Vogelleben können nun einen verschiedenen Grund haben, deren Ursache wir nur vermuten, aber mit Bestimmtheit nicht nachweisen können; sie können in einem schlechten Brutjahr begründet sein oder auch durch Verunglückung vieler Sänger von und nach dem Süden.

Aber auch der Massenfang des Südländers kann hier eine Rolle spielen; denn solange diese Volkssitte geübt wird, ist an einen rechten Vogelschutz nicht zu denken. Sehr häufig waren die Nachtigallen, wie auch andere Vogelarten, in den letzten Kriegsjahren. Sollte dies etwa ein Beweis der letzten Anschauung sein, daß die Männer zum großen Teil verhindert, dem Vogelfang — meist zu kulinarischen Zwecken — nicht obliegen konnten — wer weiß es?

Jedenfalls beherbergen aber auch heute noch die wasserreichen, fruchtbaren Rheinniederungen mit ihren herrlichen Laubwaldungen unseren lieblichen Sänger in reichem Maße. Zur Freude aller wahren Naturfreunde, die sich die rheinische Heimat ohne diesen Schatz nicht denken können, weil sie zusammen gehören — Rhein und Nachtigall!

Durch meine mehrjährigen Reisen im Ausland — besonders in den skandinavischen Ländern und in Rußland — hatte ich auch Gelegenheit, die berühmten nordischen Sprosser in der Natur zu hören.

Es wäre einem Vogel Unrecht geschehen, wollte ich hier Vergleiche in bezug auf den Vorrang eines dieser Sängerfürsten, Nachtigall oder Sprosser, anstellen.

Meine ornithologischen Kenntnisse in Beurteilung des Gesanges (Schlages) waren seinerzeit auch noch nicht so geschult. Auch hatte ich noch keine Nachtigall im Freien gehört. Ich kann nur sagen, daß der Gesamteindruck, den ich damals hatte, als ich im Sommer 1903 in einer kleinen Parkstadt unweit Petersburgs wohnte, ein überwältigender für mich war. Kaum 2 Minuten vom Park entfernt, konnte ich abends den Schlag der Sprosser, von meiner Veranda aus, voll und deutlich hören. Hier habe ich meine schönsten Stunden verlebt, und unvergeßlich sind mir seither Ort und Zeit geblieben. In Andacht und Bewunderung verweilte ich hier oft halbe Nächte im Genuß des herrlichen Schlages. Die Sprosser bewohnten dort die großen Weidenbüsche, welche die Schloßparkwiese bestanden.

Von dieser Zeit datiert auch wohl meine besondere Zuneigung für die Sprosser, die mir in späteren Jahren ein Freund aus Königsberg, ein hervorragender Kenner und Pfleger, sandte. Er ist leider im vergangenen Jahre gestorben.

Wenn nun der Sprosser in meiner Sammlung gefiederter Sänger fast nie fehlte, so konnte er der lieblichen Nachtigall den Platz in meinem Herzen doch nicht streitig machen: als Käfigvogel steht sie vermöge ihrer guten Eigenschaften und ihrer seelenvollen Weisen bei mir sogar an erster Stelle.

Wer auch den Eindruck ihres herzerquickenden Schlages mit jedem Frühjahr immer wieder neu empfängt — denn nur die umgebende Natur gibt ihm erst die richtige Weihe und kann ihn erst voll zur Geltung bringen —, dem verblassen auch die schönsten Erinnerungen: die rheinische Nachtigall hat bei mir den Sprosser verdrängt.

Kleine Mitteilungen.

Einen kalten Wasserstrahl auf den Leib eines legenotkranken Weibchens zu lassen, ist eine Roßkur und ganz verkehrt. Kein Wunder, wenn das Ei vor Schreck herauskommt und zerbricht. Ich habe ein Kanarienweibchen, das jedesmal nach dem ersten Ei beim zweiten Legenot bekommt, und rettete ich es folgendermaßen: Ich erwärme feingesiebten Sand im Ofen auf der Platte, schütte ihn in einen Blumenuntersatz, probiere, ob er handwarm ist, ja nicht heiß, und setze das Weibchen darauf, lege ein dünnes Gazetuch darüber, damit es sich sicherer fühlt. Durch die wohlige Wärme bekommt es Wehen, man sieht, wie es sich unter dem Tuch aufbäumt, und das Ei ist gelegt und bleibt ganz. Dieses lege ich nun vorsichtig ins Nest, während ich das Weibchen noch eine Weile auf dem Sand lasse, bis es sich ganz erholt hat. Die übrigen Eier legt es ohne

Beschwerden ins Nest. Dieses Weibchen ist mir besonders wertvoll, es ist beim Stieglitz und hat mir schon mehrere helle Stieglitzkanarien gebracht. Vom Sommer 1923 habe ich sogar einen Stieglitzkanarien, der Schulter, Brust, Bauch und Schwanz weinweiß hat, und diesen seltenen Stieglitzkanarien habe ich jetzt mit einem gelben Kanarienweibchen gepaart, welches schon auf 4 Eiern brütet. Falls ich Erfolg habe, werde ich berichten.

L. Hirsch, Aubstadt.

Ein praktischer Sockel für Käfige. Jeder, der im Wohnzimmer seine Vögel zu pflegen genötigt ist, weiß, wie unangenehm das Aufwirbeln von Samenhülsen und Federn ist. Besonders bei der Mauser sieht der Boden im Zimmer gerade nicht schön aus. Wenn der Käfig noch dazu Vögel beherbergt, die wie z. B. die Wellensittiche sehr kräftige Flügelbewegungen machen, fliegen Federn und Hülsen trotz des hochgebauten Sockels und trotz der Glasscheiben massenhaft hinaus ins Zimmer. Um dies zu verhindern, habe ich einen Sockel konstruiert, der diesen Nachteil beseitigt. Weil ich ähnliche Konstruktionen in keinem Käfigkatalog, auch nicht in der Liebhaberliteratur gefunden habe, mag es vielleicht andere Liebhaber interessieren, von der Konstruktion Gebrauch zu machen, um sie auszuprobieren.



Die Sockelwände, die am liebsten, je nach der Größe des Käfigs, hoch sind, werden in der gewöhnlichen Weise nach innen gebogen (s. die Figur). Der obere Teil der äußeren Wand ist entweder fein perforiert oder mit einer von feinmaschigem Gitter (g) gedeckter Spalte versehen. Das Gitter soll so feinmaschig sein, daß die Samenhülsen nicht hindurch können.

Der Sandschieber (a) wird durch die von der Klappe (b) bedeckte Öffnung eingeschoben. Er liegt nicht direkt auf dem Sockelboden, sondern läuft auf besonderen, von starkem Eisendraht hergestellten Schlittenkufen (c), die je nach der Größe des Käfigs zwei oder mehrere in derselben Reihe (wie in der Figur) sind, und je nach der zu tragenden Schwere in so vielen Reihen nebeneinander angeordnet sind, wie es nötig erscheint, aber höchstens in einer Entfernung von 25 cm voneinander. Wenn man mit bloß zwei Reihen von Schlittenkufen, nämlich den seitlichsten, an einem größeren Käfig auskommen will, muß der Sandschieber entsprechend mit Eisen oder Holz verstärkt werden, um Einbiegungen zu verhindern. Für die seitlichsten Schlittenkufen sind auf dem Boden niedrige Schienen angebracht, welche den Sandschieber beim Ausziehen und Einschieben in der richtigen Lage halten. Dies kann auch durch seitlich angebrachte Puffer erreicht werden.

Die Lage des Sandschiebers im Sockel muß so berechnet werden, daß der Zwischenraum c und d wenigstens 1 cm weit ist.

Wenn nun die Vögel im Käfige fliegen, werden die Samenhülsen usw. nach und nach in die Ecken des Bauers gedrängt. Von da werden sie mit dem Luftstrom (Pfeilrichtung in der Figur) gegen das Gitter (g) fortgerissen, und während der Luftstrom durch das Gitter geht, fallen die Hülsen durch den Zwischenraum e in den Bodenzwischenraum f, der als Abfallbehälter dient, ab, und können gelegentlich daraus leicht entfernt werden. Die Klappe b muß selbstverständlich ganz genau schließen.

Die Konstruktion ist sehr einfach, verunziert den Käfig gar nicht und gestattet die Reinigung desselben ebenso leicht wie jeden anderen Käfigs

A. V. Munsterhjelm, Finnland.

Sprechsaal.

(Steht den Abonnenten kostenlos zur Verfügung.)

Frage 4: Mehrere Jahre habe ich Erlenzeisige gezogen, leider starben dieselben stets an einer Darmkrankheit, wenn sie einige Zeit selbständig waren. Ich fütterte gequellten Rübsen, der aber gar nicht beachtet wurde, hartgekochtes Ei mit Zwiebackmehl und frische Ameisenpuppen. Wie kann ich dieselben wohl am Leben erhalten.

K. Rinke.

Vom Vogelmarkt.

Von seltener auf den Vogelmarkt kommenden Vögeln werden angeboten:

N. Diwersy, Merzig (Saar): Mexikanischer Karmingimpel.

Rich. Huth, Perleberg, Wollweberstraße 3: 2,2 gelbe Wellensittiche.

Max Kleinert, Berlin NO 18, Strausberger Straße 13: Schamadrosseln, Schamaweibchen, Dajaldrosseln, Spottdrosseln, Rotohrbülbül, Goldaugentimalien, Purpurtangaren, Weißhaubenhäher, Weißkehlhäher, indische Wanderelster, großer Beo, rotgehäubte Kardinäle, rote Kardinäle, Textorweber, Blaustirnamazonen, Zwergara, tarant. Unzertrennliche, gelbe Wellensittiche.

E. W. Lenger, Berlin N 58, Schönhauser Allee 70a: Schwarzblaue Tangaren, Schwarzkappentangaren, Purpurtangaren, Katzendrosseln, Goldstirnrupiale, Zedernvögel, Schwarzkappenpfäffchen, Weißstirnpfäffchen, Weißkehlpfäffchen, Schwarzbrustzeisige, Lerchenfinken, Safranfinken, Sperlingspapageien, Schamadrosseln, Goldstirnblattvögel, Dajaldrosseln, Goldaugentimalien, Schwarzwangenbülbül, indische Kronen- und Bergmeisen, 1 Paar Blaustirnsittiche, 1 Paar Zwergara.

Dr. Rauchbaar, Ölzschau bei Leipzig: 1 kleiner Beo.

Julius Sauer, Leipzig, Genandgasse V: Blaustirnamazone, 1 Alexandersittich, 1 Rotstirnamazone, Zuchtpaar gelbe Wellensittiche.

H. Vehrke, Braunschweig, Sophienstraße 35: Schamadrosseln, Rotohrbülbüls, Schwarzschwanzsteinschmätzer, schwarze Buschschmätzer, Braunrückenstrauchschmätzer, Grays Drosseln, Grauedelsänger.



Herrn G. L., Nassau. Die Frage ist sehr schwer zu beantworten Die provinziellen und örtlichen Namen der Vögel sind so verschieden, daß man nicht sagen kann, was mit dem oder jenem Namen an diesem oder jenem Ort gemeint ist. Den Grünling beschreiben Sie ganz richtig. Er wird in manchen Gegenden grüner oder gelber Hänfling genannt, obgleich er mit dem Hänfling, der z. B. am Niederrhein auch Flachsfink und in anderen Gegenden auch Stockhänfling genannt wird, nichts gemein hat. Der Hänfling ist oberseits schön zimmetbraun mit kaum wahrnehmbar dunkleren Federmitten; Kopf und Hals sind hellbräunlichgrün dunkel gefleckt. Unterseits ist er weißlich, an den Seiten bräunlich mit dunklen Schaftflecken. Im Brutkleid sind Stirn, Scheitel, Vorderbrust und Kropfgegend schön karminrot. Die Schwingen und Schwanzfedern sind schwarz mit weißen Säumen. Das Weibchen des Grünlings ist oberseits bräunlichgrün, unterseits graugrünlich, die gelben Zeichnungen auf Flügel und Schwanz sind von geringerer Ausdehnung als beim Männchen.

Herrn Stadtarchitekt P., Düsseldorf; Herrn W. B., Göttingen; Frl. L. H., Anbstadt; Herrn E. G., Mühlhausen i. Baden; Herrn R. Th., Altona: Beiträge dankend erhalten.

Herrn C. M. Die Krankheit ist sehr schwer zu heilen. Mehlwürmer darf der Vogel nicht erhalten, dagegen reichlich Obst. Weißwurm bleibt fort. Der Vogel ist kühl zu halten und so aufzustellen, daß er von jeder Beunruhigung oder Erregung verschont bleibt. Mehr läßt sich nicht tun.

Herrn P. Sch., Metternich, ist brieflich Bescheid zugegangen.

(Fortsetzung auf der 3. Umschlagseite.)

Aus den Vereinen.

Aufgenommen ist Mtgl. Nr. 381 Albert Herrmann, Rechtsanwalt, Leipzig, Fichtestr. 13; Mtgl. 382 Arthur Collignon, Verlag, Berlin W 62, Kurfürstenstraße 108 I; Mtgl. 383 Edwin Paugritz, Zittau i. S., Neustadt 9; Mtgl. 384 Georg Wulff, Prokurist, Kiel, Hebbelstr. 7; Nr. 385 Georg Haase, Grohn-Vegesack, Lange Str. 32. — Mtgl. 375 muß heißen Engel. — Von der Münchener Gruppe ist eine Richtpreisliste für Selbstzuchten ausgearbeitet, die im wesentlichen die Zustimmung des Ausschusses gefunden hat. Ich bitte, sich der Richtpreise im Verkehr unter den Mitgliedern zu bedienen. Dieselben können selbstredend keinen Zwang ausüben, sondern nur einen Anhalt bieten, der allseitig Anklang finden dürfte. Durch den Handel erworbene Tiere werden hiervon nicht berührt. Die Gültigkeitsdauer der Liste ist beschränkt. A. Krabbe.

„Aegintha", Verein der Vogelfreunde zu Berlin. Am Donnerstag, dem 20. März, fand im „Aquarium", Kurfürstendamm, die diesjährige Generalversammlung statt. Im verflossenen Vereinsjahr fanden 18 Mitgliederversammlungen und 1 Generalversammlung statt. Es wurden 6 Tagespartien und 2 Nachtpartien veranstaltet. In den meisten Sitzungen hatten wir interessante Vorträge, teilweise mit Lichtbildern. Die meisten Vorträge hielt uns unser Ehrenmitglied Herr Dr. Heinroth, welcher fast immer anwesend war und uns auch sonst mit Rat und Tat unterstützte. Hochinteressant waren auch die lebenden Studienobjekte, welche uns Herr und Frau Dr. Heinroth in jeder Sitzung während der Aufzucht vorführten. Es sei auch hier noch einmal, wie es schon an anderer Stelle geschehen, dem Ehepaar unser herzlichster Dank ausgesprochen, und wünschen wir ihrem im Erscheinen begriffenen Werk „Die Vögel Mitteleuropas" vollen Erfolg. Der Verein zählt zurzeit 74 Mitglieder und 1 Ehrenmitglied. In der Wahl wurde der alte Vorstand wiedergewählt: 1. Vorsitzender H. Gottschlag; 2. Vorsitzender Alf. Ploetz; 1. Schriftführer O. Vorbrodt; 2. Schriftführer Wilke; Kassierer F. Zimmermann; Bücherwart Hammer; Revisoren Gumprich und Karbe. Auch die Futter- und Besiedelungskommission blieben in derselben Besetzung bestehen. Verschiedene Anträge wurden durchberaten und zum größten Teil angenommen. Auch im neuen Vereinsjahr finden unsere Sitzungen an jedem 1. und 3. Donnertag im Monat abends pünktlich 8 Uhr im „Aquarium", Kurfürstendamm, statt. Auch Tages- und Nachtpartien werden wieder veranstaltet werden. Die erste Tagespartie findet am Karfreitag nach dem Truppenübungsplatz Döberitz statt. Abfahrt Lehrter Hauptbahnhof vormittags 9^{16} Uhr. Gäste sind zu Sitzungen und Partien herzlich willkommen. Da nun ja auch die „Gef. Welt" im neuen Vereinsjahr wöchentlich wieder erscheint, können wir auf ein interessantes Vereinsjahr rechnen.

J. A.: Otto Vorbrodt, 1. Schriftführer,
Berlin O 112, Scharnweberstraße 18.

Vereinigung der Vogelliebhaber Landesverband Sachsen und Großthüringen. Am 27. April 1924, vormittags 10 Uhr, soll in Berlin in den Posthörsälen, Artilleriestraße 10, 1. Geschoß, die Gründungsversammlung des Reichsverbandes stattfinden. Das Werk in schwerer Zeit in Angriff genommen, soll an diesem Tage feste Form und festen Fuß erhalten, sofern es alle Liebhaber unserer schönen und idealen Sache tatkräftig unterstützen, nicht nur mit Worten, sondern mehr noch mit der Tat. Der obige Landesverband gibt sich die Ehre, alle seine Mitglieder nochmals zur regen Teilnahme einzuladen. J. A.: Peters, 1. Schriftführer.

Vereinigung hannoverscher Vogelliebhaber. Mitgliederversammlung am 21. März 1924. Anwesend waren 28 Personen. Neuaufgenommen wurde: Nr. 138 Dr. Hugo Weigold, Abteilungsleiter am Provinzialmuseum. — Unser Ehrenmitglied Herr Becker hat kürzlich in voller Frische seinen 70. Geburtstag gefeiert, er wird von Herzen beglückwünscht. — Von Troschütz und Appel werden Bücher und Zeitschriften für den Schrank gestiftet. — Eine rege Aussprache über Futter, demnächst stattfindende Naturfilmvorführungen und über eine ganze Reihe von Eingängen leiten den Abend dann ein. Böhmischer unmittelbar bezogener Weißwurm wird verkauft und beschlossen, nachzubestellen. Der Verein will für Besetzung und Unterhaltung eines Vogelhauses für einheimische Vögel in dem neuen Zoo sorgen. Den Beschluß des Abends machte ein sehr sachkundiger und eingehender Vortrag unseres Ehrenmitgliedes über „Hühnerartige Vögel in Deutschland". Nacheinander wurden unter Herumgebung guter Bilder über das Rebhuhn, das hin und wieder in Scharen auftretende Steppenhuhn, das bei uns selten gewordene Haselhuhn (nur in Thüringen kommt es häufiger vor), das Birkhuhn, das in Schlesien und in unserer Lüneburger Heide noch ständiges Wild ist, das stolze Auerhuhn, schließlich die Kreuzung der beiden letzteren, das Rackelhuhn und über Wachtel und Fasan gesprochen. Herr Klock ergänzte die Mitteilungen noch durch Erfahrungen, die er vor allem auf seinen Auslandsreisen über Hühner und ihre Erhaltung erworben hat. Appel.

Vögel

ierhandlung M. Kleinert
Berlin NO 18
trausberger Straße 13
Fernruf Alexander 3313.

Frisch eingetroffen!
Graupapageien, fingerzahme, echend. helle Kongovögel, Grünpageien, Marokkaner Zwerg-a, Goldstirnsittiche, Wellen-iche, 50 purpurrote Kardi-le, graue Kardinäle mit roter ube, Schamadrosseln, Dajal-osseln, Spottdrosseln, Blau-ngenblattvögel, Dreifarbige achtglanzstare, Rotohrbülbüls, ldaugentimalien, Purpur-zgaren sowie andere Seltenheiten. [267

Senegalfinken und Goldfische
ert dauernd zu billigsten Preisen
H. Behrke (vorm. Mätje),
Braunschweig, Sophienstr. 35.
Begr. 1874. — Fernruf: 1281. [268

Neu Achtung! Neu
Empfehlen werten Geflügelfreunden unter konkurrenzlos billigen Preisen:
Ausstellungs- und Transportbauer
jeden Posten.
Heck-, Flug-, Einsatzkäfige sowie Gesangsschränke, Vorsatzgitter (siehe Katalog) sowie Anfertigungen nach jeder Angabe, schnellste Lieferung.
Verlangen Sie bitte unsern reichhaltigen Katalog, welcher Ihnen kostenlos zugesandt wird. Sauberste Ausführung. Billigste Preise.
Um den Züchtern die Anschaffung des Zuchtgerätes zu erleichtern,
269] tauschen wir auf Singvögel aller Art.
Erzgebirgische Käfigfabrik und Kunsttischlerei
Barth & Co., Eibenstock i. Sa.
Telephon 171.

Wir haben für den Jahrgang 1923
Einbanddecken
anfertigen lassen. Dieselben tragen keine Jahreszahl, sind also auch für die anderen dünnen Nachkriegsjahrgänge verwendbar. Preis 1,50 G.-M. inkl. Porto und Verpackung. Für die Friedensjahrgänge halten wir auch solche mit starkem Rücken (auch ohne Jahreszahl) vorrätig. Preis 2 G.-M. inkl. Porto u. Verpackung. — Bei Bestellungen ist der Betrag beizufügen.
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg
Postschließfach 148 Postscheck: Magdeburg 3148

Kalif. Schopfwachteln
import. Zuchtpaare, verkauft [270
Frohn, Horst-Emscher.

Off. junge **Blaustirnamazonen**, große **Beo**, zu sprechen anfangend, **Schamadrosseln, Purpurtangaren, Dominikaner-Kardinäle, Goldstirnblattvögel, Seidenstare, Safranfinken, Zebrafinken, japan. Möwchen Wellensittiche in blau, gelb und grün, Pikuitäubchen, Sonnenvögel, Senegalfinken, Alexandersittiche und afrikanische Weißwangenlerchen** in großer Auswahl; **zahme Meerkatzen u. Drills, Schildkröten, Goldfische, Käfige, Utensilien, la Vogelfutter usw.** Bei Anfragen Rückporto beifügen. [271
Friedrich Frank, Zoolog. Handlung, München, Gabelsbergerstr. 9.

2,2 grüne, 1,1 gelbe zuchtf. Wellensittiche,
in ungeheiztem Zimmer überwintert, billig abzugeben. Nehme auch
1,1 Zebrafinken oder jap. Möwchen in Tausch.
Bost, Berlin N 4, Chausseestr. 26 [272

Sittiche, Araras, Kakadus, Amazonen, Edelpapageien, Zwergpapageien, Kragenpapageien, Loris, kleine Affen für eigene Sammlung zu kaufen gesucht. Angebote mit genauer Beschreibung und Preis an
Fliegner, Lehrte-Hannover. [273

Der heutigen Nummer der „Gefiederten Welt" liegt eine mit Bildern geschmückte Anzeige über das großartige Werk: **Herr und Frau Dr. Heinroth-Berlin: Die Vögel Mitteleuropas bei.** Ich versende auf Wunsch das erste Heft portofrei zur Ansicht auf einige Tage (auf dem Bestellzettel besonders angeben, wenn so gewünscht!). Da das Werk in mehrwöchigen Zeiträumen erscheint, ist der Bezug für jeden Vogelfreund möglich. In der ganzen Literatur des In- und Auslandes gibt es nichts Ähnliches. Mehr als 20 Jahre hat das Ehepaar Heinroth gebraucht, diese hochwichtigen Forschungsergebnisse zu ermitteln, zu sammeln und den Naturfreunden zugänglich zu machen.

Bestellzettel, wenn nur der Name darauf enthalten, im offenen Umschlag für 3 Pfg. verwendbar. Name gefl. recht deutlich. [274

Bestellungen zu richten an

Alfred Troschütz, Buchhändler und Antiquar, Hannover, Große Aegidienstraße 4.

(Postscheck-Konto: Hannover 200; Cruse's Buchhandlung.)

„Ornis"

Freie Bezugs-Vereinigung der Waldvogel-Liebhaber Deutschlands

bestand von 1912 bis 1. Oktober 1920. Durch **sachgemäße** und **reelle** Belieferung der Mitglieder mit **Vogelfutter** und **Bedarfsartikeln** erwarb sie sich einen Ruf, der noch fortbesteht. — Auf **vielseitigen** Wunsch bringe ich diese Tatsache in Erinnerung, auch allen denjenigen, die von dem Bestehen derselben noch keine Kenntnis haben. — Das Ornis-Haus ist nach wie vor bestrebt, die besten von allen am Markt erhältlichen Artikel zu liefern; das mir geschenkte Vertrauen werde ich weiter zu erhalten wissen. — Über meine Tätigkeit gibt das **„Ornis-Buch"** Auskunft. Bei Anfragen erbitte ausreichendes Rückporto und Angabe der vorhandenen Vogelarten. — Auskunft bereitwilligst.

Ornis-Haus, Halle a. S.

Fernruf 4198 [275

„Reform - Normal" - Weichfutter nach Angaben des Herrn Apotheker Adalbert Jena-Biberach-Riß. Moderner elektr. Betrieb. Gleichmäßige Körnung, restloser Verbrauch garantiert.

„ORNIS-Buch" (90 S.) M. 1.—

Vertausche Ia Schwarzplattl gegen echten Reitzugfink od. 3 Nachtigall-Männch. od. 3 Italiener Hennen od. 2 Rothänfl. u. 2 Stieglitz-Männch. [276

Gebe lautes Wipfelrotkehlchen gegen Orpheus.

Riedel, Gittersee, Dresdner Straße 19.

Suche im Umtausch gegen Nützliches

1,0 Orpheus-Grasmücke,
1,0 Blau-Merle,
1,0 Steinrötel,
1,0 Sprosser.

A. Weber, Hamburg,
Raboisen 56. [277

Zu verkauf. aus Privat!

Umstände halber **fast neuer Käfig**

Größe 60×40×30, zerlegbar, mit 1 Paar Ia Bandfinken, 1 Paar Schmetterlingsfinken, 1 Paar Atlasfinken, 1 Paar Astrilden, 1 Paar Feuerwebern. Preis nach Übereinkunft.

E. Grosse, Leipzig-Gohlis,
Meuskestraße 41. [278

Ges. Welt 1903—21 m. all. Taf. i. Orig.-Bd. tadell. neu, Jahrg. 22—23 lose mit Orig.-Decke f. 6 ℳ pro Jahrg. (auch einzeln) zu verkaufen. **P. Bernhardt,** Leipzig-R., Riebeckstraße 1. [279

Abzugeben fast sämtl. Jahrgänge

Ges. Welt 1872—1900.

Näheres auf Anfrage. [280

Kracht, Duisburg,
Bechemstraße 10.

Achtung!

Welch gleichgesinnter Vogelliebhaber beabsichtigt mit mir in Austauschverkehr einheimischer und ausländischer Vögel und Zeitschriften treten zu wollen? [281

Suche Sprosser und Schwarzköpfe!

Syré, Lehrer, Biernau i. Thür.

H. Fockelmann,
Hamburg 6

Catharinenstraße 25.

Postscheckkonto: **Hamburg 9632.**

Liste über Utensilien usw. zur Vogelzucht!

	10 Stück	100 Stück
Einsatzkäfig mit Schublade und Außenfütterung 20×15×18½	15.75 ℳ	136.50 ℳ
Einsatzkäfig mit drehbarem Futterkasten 20×15×18½	8.25 ℳ	71.50 ℳ
Monopolkäfig 18×13×18½ (Einsatzkäfig)	7.— ℳ	65.— ℳ
Weitbundkäfig 18×13×18½ (Einsatzkäfig)	7.— ℳ	65.— ℳ
Holznistkasten m. Drahtstäben ohne Haken	4.— ℳ	36.50 ℳ
dto. „ Holzstäben	2.80 ℳ	25.— ℳ
dto. „ Drahtstäben m. Haken	5.— ℳ	43.— ℳ
Verzinnte Kanariennester	7.— ℳ	69.— ℳ
Verzinnte Nistkörbe	1.85 ℳ	17.— ℳ
Salatraufen, rund, 35 mm breit	1.10 ℳ	10.50 ℳ
dto. „ 55 „ „	1.80 ℳ	17.— ℳ
dto. „ 70 „ „	2.90 ℳ	26.— ℳ
Scharpieraufen, eckig, 100 mm breit	3.80 ℳ	34.50 ℳ
dto. „ 130 „ „	5.80 ℳ	52.— ℳ
Sepiahalter, klein	0.55 ℳ	4.55 ℳ
dto. groß	5.— ℳ	43.— ℳ
Scharpie, weiß Ia Pfund	12.— ℳ	120.— ℳ
Agave und Kokosfasern Bund	4.— ℳ	38.— ℳ
Kanarienkorbnester	0.75 ℳ	6.50 ℳ
Kanarienfußringe, offen mit und ohne Lasche	0.10 ℳ	0.80 ℳ
Kanarienfußringe, geschlossen	0.20 ℳ	1.60 ℳ
Kanarieneier, bunt	0.35 ℳ	3.— ℳ
Ossa-Sepia, 12—14 cm	0.75 ℳ	6.— ℳ
dto. 14—16 „	1.40 ℳ	12.— ℳ
dto. 16—18 „	1.80 ℳ	16.— ℳ
Sitzstange, 1 m lang, 12 mm	0.60 ℳ	6.— ℳ
dto. „ 15 „	1.20 ℳ	11.— ℳ
Glasbadehäuser mit Haken	4.— ℳ	40.— ℳ
Wasserautomaten (sog. Pumpen) 1/16 Ltr.	3.— ℳ	30.— ℳ
dto. „ 1/10 „	3.— ℳ	30.— ℳ
dto. „ 1/8 „	3.50 ℳ	35.— ℳ
dto. „ 3/8 „	4.50 ℳ	45.— ℳ
dto. „ 1/2 „	5.50 ℳ	55.— ℳ
Außenfütterungsnäpfe ohne Draht	1.50 ℳ	15.— ℳ
Drähte für Außenfütterungsnäpfe	0.50 ℳ	5.— ℳ
Fischnetze	1.— ℳ	8.50 ℳ

Vogelnäpfe aus Porzellan: [282

Nr.	10 Stück	100 Stück	Nr.	10 Stück	100 Stück
F 44	1.20 ℳ	10.— ℳ	419 G	1.05 ℳ	8.75 ℳ
F 56	1.50 ℳ	12.50 ℳ	420	0.90 ℳ	7.50 ℳ
F 68	1.80 ℳ	15.— ℳ	**Vogeltränken**	2.05 ℳ	16.90 ℳ
F 80	2.40 ℳ	20.— ℳ	**Eiernäpfchen** 5305	0.55 ℳ	4.45 ℳ
F 92	3.— ℳ	25.— ℳ	**Papageienäpfe:**		
F 1398	1.80 ℳ	15.— ℳ	br. m. Knopf	3.60 ℳ	30.— ℳ
a/0	0.45 ℳ	3.75 ℳ	schmal mit Knopf	3.— ℳ	25.— ℳ
a/1	0.55 ℳ	4.40 ℳ	m. Stern	3.90 ℳ	32.50 ℳ
a/2	0.75 ℳ	6.25 ℳ	H	3.30 ℳ	27.50 ℳ
a/2½	0.90 ℳ	7.50 ℳ	A	2.70 ℳ	22.50 ℳ
a/2¾	1.20 ℳ	10.— ℳ	435	3.90 ℳ	32.50 ℳ
a/3	1.35 ℳ	11.25 ℳ			
a/4	1.80 ℳ	15.— ℳ			
a/5	2.25 ℳ	18.75 ℳ			
a/6	2.70 ℳ	22.50 ℳ			

Angebot freibleibend; Aufträge unter 5.— ℳ werden nicht ausgeführt. Abbildungen von Porzellannäpfen auf Wunsch.

P. Burghard, Dresden 29

Pennricher Straße 40.



Fabrikation **praktischer Vogelkäfige.** Speziell

Weichfresserkäfige.

Anfertigung von **Käfigen, Volieren usw.** nach allen Angaben in nur saubersten, solider und fachmännischer Ausführung bei billigster Berechnung. [283

Ia Referenzen. Goldene Medaille.

Neue Gelegenheitskäufe.

Dr. med. Otto: **Die Schamadrossel.** Naturgemäße Verpflegung, Ernährung und Zucht. Der Gesang, die Krankheiten, Behandlungsweise nach modernen Grundsätzen. 104 S. Statt 1.50 ℳ **nur 75 ₰.**

Dr. H. Müller: **Am Neste.** Das Leben und die Fortpflanzung einheimischer Körnerfresser. 178 Seiten. 284] Statt 1.50 ℳ **nur 75 ₰.**

Portofreie Zusendung, wenn Betrag auf mein Postscheckkonto, Cruse's Buchhandlung, Hannover 200 — eingezahlt wird.

Beide Bändchen bieten jedem Vogelpfleger wertvolle Ratschläge. Das Buch von Otto enthält auch Angaben über naturgemäße Fütterung einheimischer Weichfutterfresser, jenes von Müller für Körnerfresser. Der Preis ist **ungemein billig, der Vorrat nur klein.**

Alfred Troschütz,
Buchhändler und Antiquar,
Hannover, Große Aegidienstraße 4.

Preisausschreiben!



Kennen Sie diese Waldvögel?

So senden Sie uns deren Namen ein! Wir verlosen unter die richtigen Einsendungen, um unsere Vogelkäfige in weitesten Liebhaberkreisen bekannt zu machen,

100 Vogelkäfige, aus Hartholz aller Art,

wie Zuchtkäfige, Gesellschaftskäfige, Einsatzkäfige, Gesangskästen, Fangkäfige, Weichfresserkäfige usw.

Schluß f. Einsendungen ist der Poststempel des 28. April 1924.

Jeder Einsender wolle für Porto und Schreibgebühren 1 Reutenmark beifügen. Außerdem ist Bahn- und Poststation genau anzugeben, damit den Gewinnern die Preise bis zum 15. Mai übersandt werden können. [285

Illustrierte neueste Käfigpreisliste gegen Einsendung von 30 Pfg. zu Diensten.

Thür. Vogelkäfigfabrik
Adolf Vogt & Co.,
Ebeleben 52.

Inserate

für das am 17. April 1924 zur Ausgabe gelangende Heft 9 der Ges. Welt erbitten bis 12. April 1924 früh

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Hermsdorf bei Berlin; für den Anzeigenteil: Rolf Kretschmann, Magdeburg, Postschließfach 148.
Verlag der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck: August Hopfer, Burg Bz. Mgdbg.

Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Jahrg. 53 | Den 17. April 1924 | Heft 9

(Druckort: Burg, Bezirk Magdeburg.)

Über Unzertrennliche und Sperlingspapageien.

Von Eduard Schütze.

(Schluß.) (Nachdruck verboten.)

Der tarantinische Unzertrennliche — Agapornis taranta. Diese überaus seltene Art wurde zum ersten Male 1906 eingeführt, und zwar von italienischen Händlern, seitdem meines Wissens nicht wieder. Im Sommer vorigen Jahres gelangten einige Köpfe nach England, und Herr Fockelmann hatte die Liebenswürdigkeit, zwei Paare von dort mitzubringen, von denen ich ein Paar erhielt.

Die Vögel sind nicht sehr lebhaft, aber doch ansprechend gefärbt. Die Geschlechter sind leicht zu unterscheiden, da dem Weibchen die rote Kopfzeichnung fehlt. 1910/11 wurde diese Art von Herrn Rambausek, Wien, gezüchtet. (Siehe „Gef. Welt" 1911, Seite 184.) Nachdem ich meine Vögel erhalten, hatte ich mich, unter Beifügung von Rückporto, an Herrn Rambausek gewandt, um Näheres über den Brutverlauf zu erfahren, ohne indes Antwort zu bekommen. Es wäre wünschenswert, wenn Herr Rambausek sich an dieser Stelle darüber äußerte. Als ich mein Pärchen erhielt, war es stark erkältet. Sie schnarchten förmlich, erholten sich aber, nachdem ich 14 Tage hindurch einen Teelöffel Lindenblütenhonig in das lauwarm gereichte Trinkwasser gegeben hatte, allmählich. Es sind außerordentlich lebhafte, sehr zutrauliche Vögel, die häufig ihr angenehmes, den Orangeköpfchen ähnliches Geplauder hören lassen. Eigenartigerweise ist das Weibchen viel ruhiger als das Männchen, so daß ich anfangs dachte, ersteres sei krank. Sie baden auffallend viel! Selbst als sie noch kränklich waren und kein Badewasser gereicht wurde, konnte ich es doch nicht verhindern, daß sie in dem kleinen Näpfchen mit Honigwasser badeten. Das Baden ist ziemlich umständlich und sieht drollig aus. Sie baden nämlich nicht wie andere Vögel, indem sie sich ins Badehaus setzen und mit den Flügeln usw. sich benetzen, sondern sie setzen sich nur auf den Rand desselben, nehmen den großen Schnabel voll Wasser und bespritzen sich damit. Auf dem Rücken werden sie dabei kaum naß, aber Brust und Bauch gehörig. Nach dem Bade hängen sie sich stundenlang ans Gitter und fangen jeden Sonnenstrahl auf. Sonne scheinen sie überhaupt sehr zu lieben; sowie ein Sonnenstrahl den Käfig trifft, sind sie da. Um die Verträglichkeit zu erproben, setzte ich zu den in einem 1 m langen und $1^1/_2$ m hohen Abteil einer Zimmervoliere befindlichen Vögeln ein Paar Malabarfasänchen und 1,0 Silberschnäbelchen. Anfänglich wurden letztere mit aufgesperrtem Schnabel heftig verfolgt, nach einer $^1/_4$ Stunde hatten sie sich aber daran gewöhnt und kümmerten sich von da ab absolut nicht mehr darum. Noch heute ist mein einzelnes Weibchen mit den Tieren zusammen, und ich habe nie die geringste Verfolgung oder gar Bösartigkeit wahrnehmen können. Im neuen Neunzig ist angegeben, daß sie nur Hirse und Glanz fraßen. Bei mir rühren sie Hirse überhaupt nicht an, im Sommer ab und zu ganz wenig halbreife Kolbenhirse, die aber mehr zum Vergnügen zerbissen wurde. Sonnenblumenkerne, Glanz und Hanf sind ihr Hauptfutter; den Hanf ließ ich bald fort, und heute wird von meinem Weibchen kein Hanf mehr gefressen. Sehr erpicht waren die Vögel auf Feigen, die sie ohne Scheu aus der Hand nahmen. Das wurde meinem Männchen zum Verhängnis. Während meiner dreitägigen Abwesenheit, anläßlich der leider wegen der Kommunistenunruhen verunglückten zweiten A. Z.-Tagung in Hamburg, gab meine Frau den Vögeln wahrscheinlich zu viel Feigen. Bei meiner Rückkehr hatte das Männchen schweren Darmkatarrh und war nicht mehr zu retten. Von dem zweiten Paar, welches Herr Fockelmann mitgebracht hatte, wurde das Männchen unglücklicherweise totgequetscht, das Weibchen erwarb nachher der durch seine hervorragende Papageiensammlung in A. Z.-Kreisen bestbekannte Herr Pölz, Hamburg, wo es sich auch heute noch wohl befindet. Diese zwei Weibchen dürften zurzeit die einzigen dieser Art in Deutschland sein.

Meine Bemühungen, zu meinem einzelnen Weibchen ein Männchen zu beschaffen, waren bisher leider erfolglos. Sowie diese Tiere wieder irgendwo auftauchen, werde ich mein Paar ergänzen. Sie empfehlen sich durch ihr zutrauliches Wesen, ihre große Lebhaftigkeit und Verträglichkeit.

Der gemeine blaubürzelige Sperlingspapagei — Psittacula passerina. Diese allbekannten, von den Vogelliebhabern mehr oder weniger hochgeschätzten kleinen Papageien habe ich besonders gern. Leider gehen diese Vögel, manchmal noch, nachdem man sie schon längere Zeit besessen hat, plötzlich an kataplektischen Anfällen ein. Ich habe auf diese Weise in den letzten drei Jahren drei Vögel

verloren, jedes Jahr einen, sowohl Männchen wie Weibchen, so daß sie bei mir zu keiner erfolgreichen Brut kamen. Noch im Herbst schrieb mir ein befreundeter Hildesheimer Liebhaber, dem die Zucht im vorigen Jahre in einem größeren Kistenkäfig, in dem zwei Paare zusammengehalten wurden, gelungen war, daß ihm mehrere Tiere auf rätselhafte Weise starben. Ich konnte anfangs auch nicht ergründen, woran die Vögel eingegangen waren, bis mich Herr Neunzig, dem ich ein Tier zur Untersuchung eingesandt hatte, dankenswerterweise aufklärte. Den Vögeln ist im Augenblick nichts anzumerken, nach einer Stunde liegt einer tot im Käfig. Die Ursache soll in übermäßiger Hanffütterung zu suchen sein. Ich habe, nachdem ich Hanf, den ich wenig gefüttert, ganz weggelassen hatte, doch noch Tiere auf diese Weise verloren. Diese Art scheint besonders darunter zu leiden. Häufig wird darüber geklagt, daß die Sperlingspapageien unverträglich sind. Bei mir haben sie sich, es handelt sich um drei Paare, stets verträglich erwiesen. Im Sommer bewohnten sie zusammen mit Pfäffchen, Prachtfinken usw. eine große 4 m lange Gartenvoliere, aber auch jetzt im Winter, wo dieselben in einer mit 50 Köpfen besetzten 2 m langen Überwinterungsvoliere sich befinden, haben sie sich stets verträglich gezeigt. 1922 hatte ich in der Voliere ein einzelnes Schönbürzelchen, welches die merkwürdige Gewohnheit besaß, sich möglichst an die Sperlingspapageien anzukuscheln. Das wurde ihnen aber doch zu bunt! Sie faßten das Schönbürzel an einen Flügel, hielten es einen Augenblick in die Luft und ließen es fallen. Dieser Vorgang wiederholte sich mehrmals am Tage. Das Schönbürzel schrie jedesmal jämmerlich, wurde aber nie im geringsten verletzt. Im Futter sind die Sperlingspapageien äußerst anspruchslos. Hafer, ungeschält, und Glanz werden bevorzugt. Trockene Hirse wenig, aber sehr gern halbreife in Kolben und viel Vogelmiere. Bei mir naschten sie häufig von dem für ein Paar Gelbbürzelgirlitze bestimmten Mohnsamen. Nie habe ich gesehen, daß die Vögel gebadet haben, dagegen sah ich oft, wie sie im Sommer nach einem Regen durch die nassen Zweige eines Lebensbaumes schlüpften, von dem sie übrigens die meisten Triebe abgebissen hatten.

Mitte Juni d. J. war ich mal wieder bei Herrn Fockelmann in Hamburg. Einige Tage vorher war ein großer Transport aus Mexiko angekommen, enthaltend rote Kardinäle, Elfenbeinsittiche, Orangeblaufinken, Pabstfinken, Vielfarbenfinken, liebliche Pabstfinken, Schuppenwachteln und zirka 15 Köpfe Sperlingspapageien. Bei letzteren handelt es sich um eine neue, bisher noch nicht lebend eingeführte Art, nämlich den mexikanischen Sperlingspapagei — Psittacula cyanopygia.

Ich erwarb sofort ein Pärchen für einen für eine Ersteinführung verhältnismäßig billigen Preis und habe es nicht bereut. Von der passerina unterscheiden sie sich leicht durch das wunderbare Hellblau des Bürzels und der Flügelunterseite. Außerdem sind sie etwas größer. Die Stirn, Kopfseiten und Kehle sind gelblichgrün (Reichenow), der Schnabel ist an der Wurzel blaugrau, an der Spitze heller.

Ich hatte diese Vögel in die zweite Abteilung der Zimmervoliere, neben dem Weibchen taranta, zusammen mit einem Paar kleinen Elsterchen, gesetzt und konnte nach acht Tagen schon eine Begattung, trotzdem den Tieren die Flügel arg beschnitten waren, beobachten. Der Akt dauerte einige Minuten, dabei ließen sie fortgesetzt ein feines Zirpen hören, was ich sonst nie hören konnte. Das Weibchen wurde vom Männchen aus dem Kropfe gefüttert, zu einer Eiablage kam es jedoch nicht. Die Tiere sind viel lebhafter und lassen ihre Stimme häufiger hören als die blaubürzelige Art; auch sind sie längst nicht so scheu. Ich kann ruhig im Käfig herumhantieren, sie rühren sich nicht von der Stelle. Mit den kleinen Elsterchen, mit denen sie heute noch zusammensitzen, sind sie sehr verträglich, trotzdem sich diese, es sind nämlich zwei Männchen, fortwährend jagen, Nester bauen, wieder zerreißen und sich herumbalgen. Ernährung wie die blaubürzelige Art. Ich will diesen Vögeln im Frühjahr eine große Voliere einrichten und werde, falls sie zur Brut schreiten, nicht versäumen, darüber zu berichten.

Kaum habe ich diesen Bericht beendet, als ich von der Firma August Fockelmann die dritte Art Sperlingspapageien erhalte, nämlich ein Paar grünbürzelige Sperlingspapageien — Psittacula deliciosa.

Es ist dieses die kleinere in Unteramazonien beheimatete Art. Länge 120 mm. Von diesen Vögeln kamen leider nur fünf Pärchen nach Hamburg, darunter auch die größere Art P. guianensis. Von letzteren gelangte ein Pärchen in den Besitz des Herrn Krabbe (Anklam). Es ist ein großer Übelstand, daß diesen kleinen Papageien immer die Flügel sehr beschnitten sind und es dauert geraume Zeit, bis sie wieder flugfähig werden. Da aber die Importeure gegen diese Unsitte der Fänger machtlos sind, müssen wir sie eben mit in Kauf nehmen.

Ich besitze meine Grünbürzel erst drei Tage, kann also noch nichts weiter darüber berichten, als daß sie noch zutraulicher sind wie die mexikanische Art, denke aber, es gelegentlich nachzuholen.

Beschaffung und Aufbewahrung lebenden Futters.

Von A. Troschütz.

(Nachdruck verboten.)

Die fortschreitende Markentwertung brachte Futterpreise mit sich, die auch für den opferbereiten Vogelfreund immer unerschwinglicher wurden. Da galt es nun, sich nach Ersatz für überteuerte Futtermittel umzusehen, galt es, „Selbstversorger" zu werden. Der Quellen sind verschiedene. Einige will ich mitteilen. Hoffentlich nützen sie auch jetzt noch manchem Leser der „Ges. Welt".

Ameiseneier holen sich wohl viele Vogelfreunde jetzt selbst im Walde. Diesen Sammlern möchte ich die Ratschläge von J. Spalinger in der Juni-Nr. 1923 der „Schweiz. Tierwelt" zur Beherzigung mitgeben: Die Ameisenhaufen gut und pfleglich behandeln! Keinen Raubbau treiben! Jedem Haufen im Jahre nur zwei- oder dreimal Puppen entnehmen! Nicht sämtliche Puppen aussieben! Die großen Puppen im Frühjahr möglichst nicht sammeln! — Beachtet man dies nicht, rottet man diese Insekten

aus. Denn bei einem völlig ausgesiebten Ameisenhaufen ist selbst bei dem sprichwörtlichen „Ameisenfleiß" ein Veröden des Haufens unvermeidbar. Das Auslegen von Flaschen in die Haufen zur Herbstzeit muß möglichst beschränkt werden, so bekömmlich getrocknete Ameiseneier für viele Weichfutterfresser auch sind.

Lebende Insekten. Wenn frische Ameiseneier nicht mehr zu haben sind, beginnt draußen im Grase die Ernte lebender Insekten mit dem Schleppnetz. Diese Art und Weise habe ich in der „Gef. Welt" 1922, Nr. 16/17, beschrieben. Damals in erster Linie als Verfütterung in der von allen Seiten von Draht und Glas umschlossenen Vogelstube gedacht, ist solches vollwertige Futter auch für Käfigfütterung geeignet, wenn man die Beute in der Sammelbüchse in ein Säckchen schüttet, dieses in Wasser taucht und dann den flugunfähigen, aber noch lebenden Inhalt der Büchse in geeigneten Mengen auf den Käfigboden schüttet. Gefressen wird alles.

Erbsen- und Mohnmehl mit Fett angerührt. Mit diesem Futter bringen die großen Tierhandlungen die ausländischen Vögel in bestem Gesundheitszustande nach Europa. Ich habe Hunderte von Schamas gesehen, die nur so gefüttert wurden, glänzend aussahen und im vollen Gesange waren. Gebraucht wird meist das indische Erbsmehl, das leider hier nicht im Handel zu sein scheint. Versuche mit deutschem Erzeugnis konnte ich noch nicht machen. Von meinem kleinen Vorrat (den ich leider nicht ergänzen kann) rühre ich bei Bedarf eine Handvoll mit Margarine an. Das Futter riecht sehr angenehm, hält sich angerührt lange gut und wird, mit trockenen Ameiseneiern verstärkt, auch von Vögeln sehr gern gefressen, die nicht daran gewöhnt sind. Es ist sehr nahrhaft und bekömmlich. Mohnmehl allein scheint mir nicht empfehlenswert zu sein.

Sperlingspapagei.

Larven des Rosenkäfers. In kleinen, feuchten Ameisenhaufen findet man oft in ziemlicher Anzahl die fetten engerlingsartigen Larven des schönen grüngoldenen Rosenkäfers (Cetonia aurata L.). Wenn der Holunder blüht, wird man auf den Sträuchern den Goldkäfer oft antreffen. Er ist das Entzücken jeden Käfersammlers, für den Rosenfreund, den Forstmann ist er ein Schädling. Die Larven leben immer mit den Ameisen zusammen, halten sich, in mulmigen Holzabfällen des Ameisenhaufens aufbewahrt, wochen- und monatelang. Verfüttert werden sie möglichst sparsam, besonders da, wo starke Mehlwurmfütterung nicht möglich oder nicht angebracht ist. Sehr gern nehmen die Larven bei mir die Gebirgsbachstelze, der Kleiber, die indische Kronenmeise, die Schamas, die Sperbergrasmücke und die Goldammer. Aber auch andere packen gierig zu, wenn ich kleine oder größere davon in die Vogelstube werfe. Einen jungen Rotrückenwürger habe ich wochenlang damit völlig gesättigt. Vor einem Zuviel möchte ich warnen. Ein Ausrotten des schönen Käfers ist wohl nicht zu befürchten, da die Fundstätten gar nicht so leicht auffindbar sind.

Regenwurm-Zucht und -Aufbewahrung. Wo der Mehlwurm nicht ausgiebig genug oder gar reizend wirkt, kann man zur Regenwurmfütterung übergehen. Stare, Drosseln, Schamas und andere Vögel fressen Regenwürmer ganz gern, besonders wenn nicht regelmäßig damit gefüttert wird. Mit dem Sammeln des Regenwurms kann man schon im Frühjahr beginnen. Solche halten sich besser als die im warmen feuchten Sommer erbeuteten. An Wegrändern, in Parks und Gärten können abends mit der Taschenlampe Mengen gesammelt werden. Beim „Ziehen" ist leises Auftreten vonnöten. Der Regenwurm „hört" gut und verschwindet sehr schnell bei jedem Geräusch in der Erde. Hat man ihn gepackt, halte man fest, kneife und ziehe aber nicht. Nach einem Weilchen ermattet der Wurm in seinem Widerstande und kann leicht aus der Erde gezogen werden. Verletzte Regenwürmer gehen ein und riechen dann sehr unangenehm. Deshalb muß man beim Sammeln die Ausbeute auf die Erde des Blumentopfes schütten. Die gesunden verkriechen sich, die kranken bleiben oben und dienen zuerst als Futter. Was riecht, wird weggeworfen. Aufbewahren lassen sich Regenwürmer in Eimern mit Erde, auf deren Boden Kies und kleine Ziegelsteine die überflüssige Bodennässe abhalten. Dem Herauskriechen wehrt man durch Maschendraht. Frische Erde muß hin und wieder zugefüllt werden. Gefüttert werden die Würmer mit Kaffeesatz. Öfteres Nachsehen ist zweckmäßig. Riecht die Erde, verderben die Würmer, ist eine Verfütterung nicht mehr ratsam. W. Doose gibt in „Wild und Hund" an, wie Mooskästen für Regenwürmer hergestellt werden. Die Kästen müssen mit Deckel und Luftlöchern versehen sein. Auf den

Boden wird gut ausgewachsenes, dann getrocknetes Moos festgedrückt. Zwischen das Moos werden halbvermoderte Blätter gemischt. Die Würmer werden auf das Moos geschüttet. Wenn die gesunden sich verkrochen haben, werden die kranken entfernt. Eine alte Strohmatte auf dem Moos erhöht die Haltbarkeit des Kisteninhalts. — In Kisten mit Ackererde, auch in Töpfen, die zu unterst mit Kieselsteinbrocken, dann mit 5 cm lockerer Erde, dann trockenem Moos, darauf 5 cm Grasbülten gefüllt werden, halten sich, mit feuchter Sackleinwand zugedeckt und kühl aufbewahrt, die Regenwürmer recht gut. Man fülle nicht bis zum Rand und sehe öfter nach. Wer Gartenland besitzt, kann Regenwürmer züchten. In einem schattig gelegenen, einen halben Meter tiefen Graben wird angefeuchtetes Stroh reihenweise aufgestellt, die Zwischenräume mit Erde ausgefüllt und dann zugeschichtet. Nach 4 Wochen ist der Graben mit Würmern angefüllt. Daß man unter alten Strohdecken oft Massen von Würmern findet, weiß jeder Gärtner. Auch in Maulwurfshaufen sollen oft Mengen mit abgebissenen Köpfen gefunden worden sein. Der Regenwurm ist ein verträgliches ausgiebiges Futter für größere Vögel und sollte bei der jetzigen Futternot mehr als bisher Verwendung finden.

Der Holländerkanarienvogel.

Von Benno Ziegler, München.

(Nachdruck verboten.)

I.

Mit dem Abflauen des Kanarienexportgeschäftes nach Amerika und dem Eintreten stabiler Verhältnisse in Deutschland scheint sich allenthalben eine Bewegung breit zu machen, die dem Holländerkanarienvogel, wie überhaupt den Figuren- und Farbenkanarien, zu alten Rechten verhilft. Früher, Jahre vor dem Weltkriege, war die Figurenkanarienzucht hauptsächlich in Süddeutschland, Österreich und in der Schweiz verbreitet und hatten die Namen wie München, Stuttgart, Frankfurt, Wien, Wels, Graz, Innsbruck, wie auch Zürich, Bern, St. Gallen usw. einen guten Klang. Jedes Land züchtete in kleinen Abweichungen in bezug auf Stellung, Figur usw. seine Eigenart. Es haben sich in genannten Städten Vereine, Klubs gebildet, die sich zur Aufgabe machten, den Holländerkanarienvogel zu veredeln und, was schließlich die Hauptsache war, nach Ausarbeitung diesbezüglichen Rassefchemas zu spezialisieren. Warum sich die Holländerzüchter von den übrigen Kanarienzüchtern abgesondert haben, liegt ja eigentlich in der Natur der Sache, da Figuren und Gesangszucht eben nicht miteinander harmonieren, und somit ein gedeihliches Zusammenarbeiten von vornherein ausgeschlossen war. Aber trotzdem stellten die Figurenzüchter in den achtziger und neunziger Jahren eine ansehnliche Macht dar, und die Erzeugnisse ihres Züchterfleißes füllten damals ganze Ausstellungen. Das Urbild ist der sogenannte „Pariser Trompeter", ein Vogel, groß, mit aufrechter Haltung, Brust- und Halskrause, Ohrenhaken, Rückenauslage und Tragfedern. Den Kopf trägt er aufwärts, wie man in München sagt, „er schaut auf die Uhr"; der Schweif ist lang, am Ende leicht gegabelt und bildet mit dem übrigen Körper eine gerade Linie. Warum der Vogel „Pariser Trompeter" heißt, glaube ich damit zu begründen, daß seine Wiege in Frankreich stand und sein den deutschen Kanarien ähnlicher Gesang von Enthusiasten eben in schmetternde Trompetenstöße umgewandelt wurde. Überhaupt schwebt über die Geschichte des Holländerkanarienvogels einiges Dunkel und ist in der Literatur über dieselbe eigentlich wenig zu lesen; doch wurde in einem alten Werke, dessen Titel mir leider entschwunden ist, geschrieben, daß der Holländer nicht, wie sein Name sagt, aus Holland, sondern, was auch mir glaubwürdiger erscheint, aus Frankreich stammen muß. In der Tat, wer die Schlösser der französischen Sonnenkönige auch nur im Bilde gesehen hat, wird zugeben müssen, daß der Pariser Trompeter wie eine kleine Rokokodame dazu paßt. Das Zeitalter der Schnörkel- und Muschelformen entspricht vollständig dem ganzen Habitus des Vogels, und ist derselbe das getreue Spiegelbild des damaligen verweichlichten, französischen Rokoko. Später aber, als Revolutionsstürme die Ludwigsregenten mit all ihrem Luxus und den Schäferszenen vom Erdboden weggefegt haben, mögen Emigranten mit ihren Vögeln nach den Niederlanden und Brabant geflohen sein. Hier wurde der Pariser Trompeter mit dem dort heimischen Bossu gekreuzt, und so ist der Holländer entstanden, wie wir ihn heute kennen. Charakteristisch ist auch, daß die Zucht des Holländers vornehmlich in Nordfrankreich, wie Roubaix, Tourcoing, Lille usw., betrieben wird und von dort auch all die Subspezies, wie Schweizer, Wiener und Münchner Holländerkanarienvogel, stammen. Es mag ja dem Laien, der einen rassechten Holländer zum erstenmal sieht, unglaublich erscheinen, daß diese geradezu grotesken Formen vom Wildling Fringilla canaria stammen sollen — aber es ist doch so —, möge der Zweifler die vielen Spielarten der Tauben studieren und wissen, daß auch allen diesen Variationen die Felsentaube zugrunde liegt. Streng genommen unterscheiden wir 5 Abarten des Holländers: 1. den Pariser Trompeter; 2. den „Frisierten" von Roubaix; 3. den Schweizer; 4. den Wiener und endlich 5. den Münchner Holländer-Kanarienvogel.

Der Pariser Trompeter, den ich ja eingangs schon näher beschrieben habe, stellt also das Urbild dar, und sind durch Kreuzung mit dem belgischen Bossu die nachgenannten Arten entstanden. Der „Frisierte" von Roubaix muß eine leichte Beugung im Knie zeigen, so daß der Bürzel unter das Sitzstäbchen zu stehen kommt. Der Kopf sei möglichst klein, rund, der Hals lang und dünn. Die Brustkrause sei wohlgeformt und soll wie ein Körbchen aussehen. Der Rückenscheitel soll am Nacken beginnen und an der Kreuzung der Flügelfedern enden. Die Tragfedern befinden sich links und rechts oberhalb der Schenkel. Der Schwanz sei lang und schmal. Der Schweizer Holländer ruht auf hochgestellten Füßen in eleganter Ellipsenform und bildet in seiner Eigenart ein harmonisches Ganzes. Die einzelnen Federpartien sind nicht so üppig entwickelt wie bei den übrigen Arten, jedoch einzeln für sich genau abgegrenzt. Der lange, an seinem Ende leicht gegabelte Bürzel ist beim „Gangziehen" leicht an das Sitz-

stäbchen angedrückt, und macht so der Vogel in guten Exemplaren ein interessantes Bild. Der Wiener Holländervogel ist am nächsten mit der Münchner Form identisch, und wenn auch die Abbildung im „Noorduijn" zierlicher erscheint als die des Münchners, so glaube ich nicht daran, da mir auf Anfrage im dortigen Holländer-Klub erklärt wurde, sie wären selber froh, wenn sie Vögel hätten, wie sie genannte Abbildung zeigt. Der Münchener Holländer endlich ist im ganzen Habitus den vorigen Arten sicher ebenbürtig. Von einem erstklassigen Tier verlangt man einen möglichst kleinen flachen Kopf, der an den einer Schlange erinnert. Die Brustkrause sei vollentwickelt und muß den Bauch freilassen. Die Rückenauslage sei gerade, und soll der Kopf mit dem langen Halse wie aus dem Panzer einer Schildkröte herauswachsen. Der Bauch muß mit kleinen Federn bedeckt und beim Hochziehen eingezogen erscheinen. Die Ständer seien lang; die Schenkel leicht befiedert, doch sind nackte Schenkel bei hochgelben Tieren kein Fehler. Die Tragfedern oberhalb derselben seien links wie rechts sowohl gleichmäßig entwickelt. Der Schweif ist lang und am Ende leicht gegabelt. Die Zucht des Holländers ist selbstverständlich quantitativ nicht so ergiebig wie zum Beispiel bei der Landrasse und stellt dieselbe entschieden mehr Anforderungen an den Züchter. Fallen doch von guten Zuchttieren nicht immer gleich gute Jungvögel, so daß es manchmal sehr schwierig erscheint, nur eine einzige, erstklassige Kollektion aus seinem Bestande zu Ausstellungszwecken zusammenzubringen. Es bedarf auch bei der Zusammenstellung der Elterntiere einer gewissen Kenntnis der Vererbungslehre, um einigermaßen auf der Höhe zu bleiben, und spielen trotzdem oft Rückschläge eine lose Rolle. Näher auf die Zucht einzugehen, erübrigt sich dadurch, daß in dem demnächst beim Creutz'schen Verlage erscheinenden Werk „Die Farben- und Gestaltskanarien" von A. Aschenbrenner, München, erschöpfend in die Materie eingedrungen wurde. Immerhin, wenn die Zucht manchen auch schwierig erscheinen mag, so ist die aufgewendete Mühe doch reichlich belohnt, wenn einige hervorragende Exemplare den Züchter erfreuen und die Jury bei der Ausstellung die Tiere mit dem 1. Ehrenpreis bewerten. Mögen meine Zeilen so manchen alten ehemaligen Holländerzüchter aus seinem Dornröschenschlaf erwecken, seine Zucht wieder aufzunehmen, und möge sich auch die jüngere Zuchtgeneration begeistern für meinen Sportliebling, den „Holländer-Kanarienvogel".

Neueinführungen und Seltenheiten.

Von Karl Neunzig.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Die Verbreitung von Scotts Trupial erstreckt sich über die südwestlichen Staaten der Union, Unter-Kalifornien und die mexikanische Hochebene, nördlich bis zum westlichen Texas, Neumexiko und Arizona, den südlichen Teilen von Utah, Nevada und Kalifornien. Scott hat den Vogel eingehend in Arizona beobachtet. Hier hielt er sich hauptsächlich in den bewaldeten Gebieten der Cañons auf, jenen tief eingeschnittenen Flußbetten mit fast senkrechten Uferwänden, die am großartigsten und merkwürdigsten im Gebiet des westlichen Koloradostromes und seinen Quellflüssen, also in dem Gebiet, welches Scotts Trupial bewohnt, auftreten. Scott gibt von dem Aufenthaltsgebiet dieses Trupials folgende Schilderung: „Ein Cañon, welcher hoch oben im Katalinagebirge seinen Anfang nimmt, teilt Hügel und Tafelland durch seine tiefe Furche und vereinigt sich dann mit dem St. Pedrotal. Wir haben es mit dem höher gelegenen Teile des Cañon zu tun, mit einer Höhe von 4000—5000 Fuß. Die Berge zu beiden Seiten sind hoch, der Cañon oft ziemlich schmal. Immergrüne Eichen bedecken häufig die Berge in ihrer ganzen Höhe. In der Schlucht selbst wachsen Baumwollpappeln, Sykomoren und auch einige Zedern. Das Bett des jetzt ausgetrockneten Baches, welcher den Cañon durchfließt, ist mit Gras bewachsen. Schon im Mai trocknet gewöhnlich der Bach an den Stellen, welche der Sonne ausgesetzt sind, aus, doch finden sich in den dichten Baumwollpappelbeständen längere Strecken, in welchen beständig Wasser fließt, und auch während der heißesten Zeit bilden sich im Bette des Baches zahlreiche Wassertümpel. Hier ist die Vogelwelt reich vertreten, und recht zahlreich ist unter diesen der schöne Trupial." Im Frühjahr 1884 machte Scott die Bekanntschaft dieses noch wenig bekannten Vogels in dem oben näher beschriebenen Gebiet im Staate Arizona. Die Trupiale trafen dort im April ein und fielen sowohl durch ihr prächtiges Gefieder wie durch ihren schönen Gesang auf, von dem Scott folgendes berichtet: „Wenige Vögel singen eifriger, ja ich kenne in den Ost- und Mittelstaaten keinen einzigen Vogel, den man so häufig hört. Die Männchen sind selbstverständlich die fleißigsten Sänger, doch glaube ich in der Nähe des Nestes hin und wieder beobachtet zu haben, daß auch einzelne Weibchen dieselbe fröhliche Weise hören lassen, nur waren deren Töne sanfter und leiser. Vom frühesten Morgengrauen an und den ganzen Tag hindurch, selbst während der

Hitze des Nachmittags, ist der Gesang dieses Trupials einer der wenigen Vogelgesänge, welche man stets vernehmen kann." — Von dem Tag seiner Ankunft bis in die letzten Tage des Juli hörte Scott den Gesang täglich oft von vielen ringsumher zu gleicher Zeit. Gegen Ende des Monats Juli verstummt der Gesang und die Mauser setzt ein, welche nach Anthony (Auk 1892) so vonstatten geht, daß die Vögel eine Zeitlang kaum imstande sind, zu fliegen. In dieser Zeit sind die Trupiale besonders scheu. Nach der Mauser ziehen sie nach den südlichen Winterquartieren. Vereinzelt überwintern sie auch im Brutgebiet. Ihre Nahrung besteht wie die aller Trupiale in Insekten und Früchten. Anthony sah sie häufig die reifen Früchte von Kakteen verzehren, besonders die eines Säulenkaktus, Cereus gummosus.

Eingehende Mitteilungen über den Nestbau des Vogels verdanken wir Scott, der in einer Arbeit „Über Brutgewohnheiten einiger Arizonavögel" (Auk 1885) sehr genau über den Nestbau des Trupials berichtet. Die meisten Nester, welche Scott fand, waren auf Yukkas (Yucca baccata) gebaut. Sie wachsen an den Bergabhängen und erreichen im Beobachtungsgebiet nur eine Höhe von 10 Fuß. In einer solchen dicht am Walde in der Nähe eines Wassertümpels, wo Menschen täglich vorübergehen, wurde das erste Nest gefunden. Es war sorgfältig in den ganz oder halb trockenen, am Stamme herabhängenden Blättern der Yukka versteckt. Das Nest befand sich nur 4 Fuß über dem Boden und hing an fünf herabhängenden Yukkablättern. Es war „halbhängend" und bestand äußerlich aus feinen Yukkafasern und Gras, im Innern war es mit feinem Gras gerundet und mit solchem wie mit Pflanzenwolle ausgelegt; die leicht, aber fest gebaute dünne Wandung ist am Boden einen halben, an der Seite einen viertel bis einen achtel Zoll dick, der innere Napf hat einen Durchmesser von 4 und eine Tiefe von $3^1/_2$ Zoll. „Halbhängend" nennt Scott das Nest, weil die fünf Yukkablätter, an denen das Nest hing, nicht etwa mit ihren Spitzen mit dem Nest verwoben waren, sondern das Nest war nur an einer Seite an den fünf Blättern angeheftet, und zwar in einer Länge von $2^1/_2$ bis 5 Zoll. Die Anheftungsstelle befand sich etwa 7 Zoll unterhalb des Grundes des etwa 20 Zoll langen Blattes, so daß die Spitzen der herabhängenden schmalen Blätter noch etwa 8 Zoll über den Boden des Nestes hervorragten. Das Gelege besteht aus 3—4 Eiern von anscheinend sehr verschiedener Färbung. Die Grundfarbe war bei einem Gelege bläulichweiß mit einem Kranz schokoladenbrauner und veilchenfarbener Flecke am dickeren Ende, über die ganze Oberfläche waren helle und dunkelbraune Flecke verteilt. Alle Nester, welche Scott fand, waren aus Yukkafasern gebaut, nicht nur die etwa 4 Fuß vom Boden in Yukkas erbauten, sondern auch solche, welche auf höheren Bäumen standen, so auch eins auf einer Platane, etwa 18 Fuß über dem Boden. Dieses hing beutelförmig, ähnlich dem des Baltimoretrupials, an den äußersten Seitenzweigen des Baumes. Über eine andere Art des Nestbaues berichtet Anthony. Er fand das Nest häufig zwischen den dornartigen Zweigen, welche den Stamm des Cirio oder der Okatilla (Fouquiéria) bedecken. Die auf diesen Baum gebauten Nester sind durch die spitzen Zweige gut geschützt. Der Cireo ist die Charakterpflanze Südkaliforniens, wird bis 20 m hoch und ähnelt einem riesenhaften Säulenkaktus.

Kurz nach der Ankunft tummelten sich die sehr scheuen Vögel in großer Anzahl in den das Wohnhaus des Forschers überhängenden Eichenzweigen. Wenn sie längere Zeit beobachtet wurden, wurden sie ängstlich. Scott hofft, daß die Scheuheit der schönen Vögel sich verlieren würde und sie sich mit anderen nordamerikanischen Arten dem Menschen anschließen würden.

♂ Kopf, Hals, Brust, Rücken tief schwarz; übriges Körpergefieder tief zitronengelb, Bürzel und Oberschwanzdecken gelblich oliv oder olivgrau verwaschen; kleine Flügeldecken, Flügelrand tief zitronengelb; mittlere Flügeldecken heller gelb, häufig nach den Spitzen zu weiß; übrige Deckfedern und Schwingen schwarz, erstere mehr oder weniger breit weiß gesäumt, die inneren Schwingen mit schmalen weißen Säumen; Unterflügeldecken, Achselfeder zitronengelb; vier mittleren Steuerfedern schwarz, am Grunde hell zitronengelb, die übrigen an der Grundhälfte hell zitronengelb, die Spitzenhälfte schwarz mit mehr oder weniger breiten, weißen Spitzensäumen; Schnabel schwarz, unten am Grunde blaugrau; Auge dunkelbraun; Füße dunkelhornfarben. Nach der Mauser sind die hellen Flügelzeichnungen viel breiter, die Rückenfedern mit hellgrauen Säumen; Bürzel und Oberschwanzdecken stärker oliv oder grau verwaschen, ebenso die Körperseiten. Junges ♂ dem ♀ ähnlich, aber größer. ♀ oberseits olivgrau, nach hinten gelblich, an Scheitel, Rücken und Schultern mit dunklerer Federmitte, zuweilen schwarz mit olivgrauen Säumen; Flügel dunkelgraubraun mit hellgrauen Säumen; mittlere und große Deckfedern mit weißen Spitzen; Schwanzfedern dunkelgrauoliv, Grundhälfte des äußeren olivgelb; unterseits satt olivgelb, Brust-Bauchmitte hellgelb.

Jugendkleid ähnlich einem sehr hellgefärbten ♀, oben fahler, die Schwingen breiter hellgesäumt.

Lg. 184,2—210,8, Fl. 94,5—106,7, Schw. 79,2—91,9, Schn. 20,3—22,9, Lf. 22,9—25,4 mm.

Zu den recht selten eingeführten Vögeln gehört auch das

Falzschnabelpfäffchen — Sporophila falcirostris *Tem.*,

welches in Heft 8 S. 61 abgebildet ist. Sclater erkannte diese Art nicht an und hielt die als Falzschnabelpfäffchen bezeichneten Tiere für Weibchen von S. hypoleuca, während Cabanis sie für eine gute Art hält. Sie gleichen im allgemeinen dem Brauen- oder Riesenpfäffchen und unterscheiden sich von jenem hauptsächlich durch ihre etwas kleinere Gestalt.

(Fortsetzung folgt.)

Mellum, ein Vogelparadies in der Nordsee.

Nach einem Vortrag, gehalten von Studienprofessor Dr. Ammann im Bund für Naturschutz in Bayern.

(Nachdruck verboten.)

Im Laufe der letzten 50 Jahre ist im Mündungsgebiet der Weser eine Sandinsel in der Weise entstanden, daß im Wattenmeere eine Senkung ein-

trat und ein Teil des Grundes zum Vorschein kam, den einst die Wogen verschlungen hatten. Die Sage weiß zu berichten, daß hier einmal ein blühendes Land war mit reichen Dörfern und wohlhabenden Fischern und daß an der Stelle, wo heute im Meere eine Boje verankert ist, eine Burg gestanden hat. Durch eine ständige Meeresströmung wurden unablässig Sand und Strandgut in einer bestimmten Richtung angeschwemmt und dadurch der Boden immer höher und fester. Die Winde führten vom Festlande her Gras- und anderen Samen auf das Neuland. Es konnte sich eine schwache Vegetation entwickeln. Bald kamen Watvögel, die den lockeren Sandboden festtraten und durch ihre Exkremente düngten. In immer größeren Scharen siedelte sich die Vogelwelt an und erkor die neue, unbewohnte Insel zu ihrem Brutplatz. Aber die Idylle dauerte nur so lange, als der Mensch in seiner Brutalität nicht eingriff. Durch Eierräuber und Vergnügungsreisende, die die Vögel sinn- und zwecklos abschossen, wurde der Vogelbestand in einer Weise vermindert, daß es noch vor wenigen Jahren unmöglich erschien, die Vogelwelt dort noch einmal auf den früheren Stand zu bringen.

Da wandte sich der Bund für Vogelschutz in Stuttgart, der die Insel schon vor dem Kriege hatte, mit einer Eingabe an das Reich und erreichte es, daß Mellum — so heißt die Insel — als Vogelschutzgebiet erklärt und dem Bunde als Freistätte für brütende Vögel zur Verfügung gestellt wurde. Seitdem ist Mellum zu einem wirklichen Vogelparadies geworden, wo in unglaublich kurzer Zeit die Vogelfauna sich heimisch fühlte und vermehrte. Der genannte Bund ist befugt, auf der Insel Polizeigewalt auszuüben, und ohne die Erlaubnis des von ihm bestellten, während der Brutzeit dort stationierten Vogelwartes darf niemand das kleine Eiland betreten.

Der mit Vegetation bedeckte Teil der Insel ist ungefähr 15 Hektar groß. Bisher haben sich etwa 70 verschiedene Pflanzenarten angesiedelt, darunter der Strandhafer, die Stranddistel, die Strandnelke, die Strandaster und verschiedenes Gestrüpp, wie Queller, ein starres Gras, dessen Halme sich mit Wasser vollsaugen und aufquellen.

Das Grünland ist die Brutstätte der Vögel, die bei Ebbe zur Nahrungssuche an den Strand gehen. Bei Flut kommt es nicht selten vor, daß die Eier vom Wasser bespült werden. Das schadet aber nichts. Nur wenn Sturmflut eintritt und einige Tage anhält, erkalten die Eier. In diesem Falle kommt es zu einem zweiten Gelege, das in der Regel gesichert ist, weil im Sommer Sturmfluten nicht sehr häufig sind. Wenn aber schon die Brut aus dem ersten Gelege hochkommt, dann werden in den Sommermonaten keine Eier mehr gelegt.

Als Brutvögel kommen nach Lage der Dinge nur Schwimmvögel aus der Familie der Möwen und Stelzvögel in Betracht. Die dichteste Kolonie bilden die Brandseeschwalben mit rund 1500 Paaren, die mit ihrem ewigen Getreisch die Luft erfüllen. Das Nest, wenn man eine schwache Mulde im Sande so nennen kann, ist ganz kunstlos. Die zwei bis drei Eier unterscheiden sich in der Färbung nur wenig von ihrer Umgebung. Die Jungen sind Nestflüchter. Zwei bis drei Stunden, nachdem sie aus der Eischale gekrochen sind, ist das Gefieder trocken, und schon humpeln sie aus dem Nest und verstecken sich im Gestrüpp. Im Herbste ziehen die Brandseeschwalben nach dem Süden, bis nach Kapstadt, wo eines dieser Tierchen mit einem Aluminiumring der Zoologischen Station Helgoland abgeschossen wurde. Die Jungen werden nämlich vom Vogelwart auf Mellum mit den Ringen der genannten Station versehen.

Ebenfalls in großen Mengen nisten dort die Flußseeschwalben, die sich von ihren nächsten Verwandten, den oben erwähnten Brandseeschwalben, durch einen plumperen Körper und kürzere Füße unterscheiden. Sie legen ihre Nester auseinandergezogen mitten in der Vegetation an. Rührend ist bei diesen Vögeln die mütterliche Fürsorge für die Jungen.

Ein reizender schwarz-weiß-roter Vogel ist der Austernfischer, der jetzt wieder einen ansehnlichen Teil der Brutvögel auf unserer Insel darstellt. Der Name ist nicht allzu wörtlich zu nehmen. Wenn der Vogel keine Austern zur Verfügung hat, begnügt er sich auch mit allerlei anderen Muscheltieren und Würmern, welch letztere er mit seinem langen, spitzen Schnabel geschickt aus dem Sande herauszieht. Die Paare halten treu zusammen und lösen sich beim Brutgeschäft ab. Die drei braungefärbten Eier fallen schon am siebenten Tage aus.

Weiters hat sich auf Mellum die kleine Silbermöwe angesiedelt, die ihren Namen von dem Silberschimmer auf ihren Flügeln hat, ferner die Sturmmöwe, die eigentlich dem Ostseegebiet angehört und mehr Sorgfalt auf die Anlage und Ausstattung ihres Nestes verwendet als ihre Artgenossen, die hübsche Zwergseeschwalbe, in der Größe ein Zwischending zwischen einer Rauchschwalbe und Brandseeschwalbe, sorglos im Nestbau und stets bedacht, den unersättlichen Hunger ihrer Jungen zu stillen, der allerliebste Rotschenkel, der sich sein Nest in Grasbüschel hineinwühlt, die Brandgans, eine Wildentenart und ausgesprochener Höhlenbrüter, und schließlich verhältnismäßig selten der Seeregenpfeifer, in der Größe eines ausgewachsenen Stares.

In der Nachbarschaft von Mellum liegt eine andere Insel, auf der eine Kolonie von Kampfläufern nistet, die mit ihrer schönen weißen Halskrause einen eigenartigen Eindruck machen. Hochinteressant sind die Kampfspiele der herrlichen Vögel. Das ist ein Balgen und Stoßen, ein Raufen und Jagen in der leuchtenden Frühjahrssonne! Gar ernst geht es bei diesen Kämpfen nicht zu, denn mitten in der Balgerei kauern sich die Kämpfer nieder und stecken sogar den Schnabel in den kühlen Sand.

Möchte der praktische Naturschutz erreichen, daß wenigstens diese schönen Reste einer früher so reichen Vogelwelt noch recht lange erhalten bleiben!

Kleine Mitteilungen.

Meine ersten blauen Wellensittiche. Der langersehnte Wunsch ging in Erfüllung. Vor mir steht ein Beobachtungskäfig mit dem kostbaren Inhalt eines Pärchens reinblauer Wellensittiche. Wer sie sieht, ist von ihnen so

entzückt wie ich. Alle Befürchtungen, daß die Blauen von ihrer Urgattung in der Farbe wohl abweichen, daß die Färbung aber dem so sehr hübschen Urvogel doch nicht gleichgewertet werden könne, sind geschlagen. Die blauen Wellensittiche vereinigen die Schönheit des grünen Wellensittichs mit dem durch ein wunderbares Himmelblau ersetzten Grün. Das blaue Gefieder ist so ungewöhnlich schön, daß jeder Besucher immer nur noch blaue Wellensittiche begehrt. Werden diese Blauen mal so leicht zu züchten sein und dadurch zugänglicher und billiger, so mag sich das Urteil erfahrungsgemäß ändern. Ich denke an die farbenprächtigen Sonnenvögel, Tigerfinken, Amaranten usw. Was in Massen, und sei es noch so schön, auftritt, erleidet recht bald die übliche Mißachtung vieler Liebhaber. Wer sich die blauen Wellensittiche vorstellen will, beachte folgenden Vergleich. Neben mir stehen in einem großen Käfig 10 Blauastrilde. Das Blau dieser und das Blau der blauen Wellensittiche ist ganz ähnlich. Die Verteilung der Farbe beim blauen Wellensittich ist folgendermaßen: Wo der Urvogel grün ist, ist der blaue Kulturvogel blau. Auf den Schwanzdecken hat das Blau auch den metallenen Glanz des grünen Vogels. Wo der Urvogel gelb ist an Oberkopf, Kehle, an den Säumen der Schwingen, an den Flügeldeckfedern, an den Augenlidrändern, ist der blaue Wellensittich creme-weiß. An der Kehle am weißesten. Die Bärtchen sind tief dunkelblau, die Pünktchen auf den Kehlen noch tiefer blau. Die Schnäbel sind wie beim Urvogel, Geschlechtsunterschiede auch so gegeben. Die Füße sind zartrosa, durchscheinend fast. Die Krallen grau. Das Auge schwarz. Wo der Urvogel die seinen Namen gebenden Wellenlinien in schwarzer Farbe hat, ist der blaue Kulturvogel ganz zart grau gezeichnet, man könnte mausgrau sagen. Die langen Schwanzfedern sind dem grünen Vogel entsprechend, aber alles in Blau gefärbt. Der Gesang, das Gezwitscher, das gegenseitige Geplauder, das Kraulen im Gefieder, das Füttern der gegenseitigen Zuneigung — kurz, das ganze Benehmen wie beim Urvogel. Wie könnte es auch anders sein, wir haben den gleichen Körper, die gleichen Instinkte des Urvogels, die Kultur gab ihnen nur anderen Farbstoff oder enthielt einen Teil der Stoffe, oder mischte sie infolge von züchterischen Eingriffen anders. Das daraus hervorgegangene Produkt ist ein so entzückendes, daß, wie schon erwähnt, nicht nur ich begeisterter Anhänger bin. Mein langersehnter Wunsch, man vergleiche meine Berichte über farbige Wellensittiche aus früheren Jahren, ist in Erfüllung gegangen. Ein weiterer, diese Blauen zu züchten, geht hoffentlich bald in Erfüllung. Eben schüttelt der eine sein Gefieder, und zwischen den Flügeldecken werden Oberrücken, Bürzel und Oberschwanzdeckfedern sichtbar und zeigen ihre schimmernde blaue Pracht. Diese strahlenden Teile sind mit den leuchtenden Gefiederteilen des dahinschnellenden Eisvogels vergleichbar.

Düsseldorf, den 23. März 1924.

Stadtarchitekt Pracht.

Naturbeobachtungen infolge des harten und langen Winters. Jeden Abend können aufmerksame Naturfreunde von hier ungeheure Scharen von Krähen im Elbtale aufwärts ziehen sehen, und zwar sind es vorwiegend Saatkrähen (Corvus frugilegus), ebenfalls Dohlen (Coloeus monedula), wenig eingesprengte Rabenkrähen (Corvus corone) und hier und da Nebelkrähen (Corvus cornix), welche allabendlich ihrem gewohnten Schlafplatz, welcher sich zum größten Teil auf der Pillnitzer Elbinsel befindet, zustreichen. Scharen zu zehntausend bevölkern abends die Felder der östlichen Umgegend von Dresden, wo selbige bei eintretender Dunkelheit in ungeheuren Scharen ihrem Ziel zustreben. Diese Scharen bestehen zum größten Teil aus nordischen Krähen, welche ihre Heimat in Ostpreußen, Kur-, Liv- und Finnland haben, und zum Teil aus unseren, welche aus ihren südlichen Winterquartieren eingerückt sind. Unser Elbtal wird ja alljährlich von Krähen besucht infolge seines milden Klimas, aber in solchen Scharen können sich ältere Leute nicht erinnern. Allerdings werden bald die Tage kommen, wo alle verschwinden werden und der sogenannte Krähenzug einsetzen wird. Auch wurden hier von mir auf den Wiesen zwischen Seidnitz und Strießa zwei Pärchen Kiebitze beobachtet, welche in den zusammengeschmolzenen Schneewasserlaken nach Nahrung suchten.

Paul Heinrich,
ornith. Leiter vom Dresdner Vogelschutzverein.

Alte Vereinigung der Vogelliebhaber zu Dresden. Unser Mitglied, Herr Hermann Dietrich, berichtete im Vereinsabend, daß ihm am gleichen Tage gegen 2 Uhr nachmittags am Kauschaer Weg 2 Elstern, auf einem Baume sitzend, aufgefallen seien, die unverwandt nach einem in der Nähe stehenden Dornstrauch sahen. Um seine Neugierde zu befriedigen, ging Herr Dietrich auf den Dornstrauch zu. Etwa 20 Meter von ihm entfernt flog daraus ein Turmfalke (er will ihn genau als solchen erkannt haben) und verschwand in den Lüften. An den Strauch herangekommen, fand er am Boden das total abgefressene Gerippe eines Rebhuhns. Das Gerippe, das Herr Dietrich so, wie er es aufgefunden, vorzeigte, war in 2 Teile zerrissen, der Kopf, noch mit den Federn bedeckt, lag daneben. (Der Fund ist der Schriftleitung zur Kenntnisnahme eingesandt worden.) Ungefähr eine Stunde lang wartete Herr Dietrich auf die Rückkunft des Räubers, doch umsonst. Paul Groß, Schriftführer.

Sprechsaal.

(Steht den Abonnenten kostenlos zur Verfügung.)

Zum Artikel **„Nur ein Star“.** Die Ausführungen des Herrn Krüger, daß der Star nur in Ausnahmefällen zu einer zweiten Brut schreitet, sind nach meinen, auf einer zirka 40jährigen Beobachtung beruhenden Erfahrungen nicht richtig. Hier in der Lausitz ist der Star ebenso häufig vertreten wie der Sperling, und ich habe unmittelbar unter meinen Fenstern das Vergnügen, alljährlich von drei Paaren das Brutgeschäft zu beobachten. Immer nur konnte ich beobachten, daß der Star zweimal zur Brut schreitet. Nur vollzieht sich die zweite Brut geräuschloser und vielleicht auch schneller. Ende Mai, bzw. im Juni, sind die Ernährungsverhältnisse ganz andere, der Speisezettel also ungleich reichhaltiger als im April bzw. Mitte Mai, und aus diesem Grunde wird die zweite Brut meistenteils einer oberflächlichen Beobachtung entgehen. Erst nach Beendigung der zweiten Brut finden sich alt und jung zu größeren Flügen zusammen, um gemeinsam die Kirschenalleen usw. zu plündern. Über die Listigkeit des Stars könnte man Bände schreiben, und seine Frechheit grenzt ans Unglaubliche. Jedenfalls wollte ich mit meinen Zeilen nur Herrn Krüger darauf aufmerksam machen, daß die „Örtlichkeit“ bezüglich des Brutgeschäftes bei den Staren eine besondere Rolle spielt. Auch Dr. Ruß, den wir doch wohl zu unseren bedeutendsten Ornithologen zählen dürfen, spricht in seinem Handbuch „Unsere einheim. Stubenvögel“ von zwei Bruten der Stare.

Kottbus, den 3. April 1924. Ad. Selka.

Vom Vogelmarkt.

Von seltener auf den Vogelmarkt kommenden Vögeln werden angeboten:

Tierhandlung M. Kleiner, Berlin NO 18, Strausberger Straße 13 (Fernruf Alexander 3313): Graupapageien, Grünpapageien, Zwergara, Goldstirnsittiche, purpurrote Kardinäle, graue Kardinäle mit roter Haube, Schamadrosseln, Dajaldrosseln, Spottdrosseln, Blauwangenblattvögel, dreifarbige Prachtglanzstare, Rotohrbülbüls, Goldaugentimalien, Purpurtangaren.

Max Mettendorff, Berlin N 58, Sonnenburger Str. 9: Häufling × Kanarie.



Herrn L. Sch., Frankfurt a. M.: Die Gartengrasmücke ist infolge von Darmerweiterung in Verbindung mit Abzehrung eingegangen. Das Bläschen auf dem Bürzel ist keine Eiterblase, sondern die Fettdrüse, welche jeder Vogel hat. Das Aufquellen der trockenen Holunderbeeren ist nötig und nicht schädlich, wenn dieselben, bevor sie unter das Futter gemischt werden, mit einem Tuch abgetrocknet werden. Geschieht dies nicht, so machen sie das Futter naß und klumpig. Nasses Futter ist aber gerade für Grasmücken verderblich, und der Genuß desselben kann die Krankheit, an der die Gartengrasmücke eingegangen ist, verursachen.

(Fortsetzung auf der 2. Umschlagseite.)

hrgang 53 17. April 1924 Heft 9

DIE GEFIEDERTE WELT.

ZEITSCHRIFT FÜR VOGELLIEBHABER

Begründet von Dr. Karl Ruß

Herausgegeben von Karl Neunzig in Berlin-Hermsdorf

Inhalt:

Über Unzertrennliche und Sperlingspapageien. Von Eduard Schütze. (Schluß.)

Beschaffung und Aufbewahrung lebenden Futters. Von A. Troschütz.

Der Holländerkanarienvogel. Von Benno Ziegler-München.

Neueinführungen und Seltenheiten. Von Karl Neunzig. (Forts.)

Mellum, ein Vogelparadies in der Nordsee. Von Prof. Dr. Ammann.

Kleine Mitteilungen - Sprechsaal - Vom Vogelmarkt - Redaktionsbriefkasten - Aus den Vereinen.

Abonnement monatlich (4 Nummern) 1.50 Gm. — Einzelpreis des Heftes 50 Gpf.
vermittelt das nächste Postamt bzw. der zuständige Briefbote. / Postversand ab Burg Bez. Magdeburg.

utz'sche Verlagsbuchhandlung / Magdeburg / Postschließfach 148

Aus den Vereinen.

Angemeldet sind die Herren: Willy Eisenmenger, Brandenburg a. H., Neuendorfer Str. 47; Dr. H. W. Frickinger, München, Habsburgerplatz 2I; Ludwig Röbbelen, Hildesheim, Teichstr. 11I. — Die geplante Fahrt nach Hamburg wird nach dem mir zugegangenen neuesten Bericht Anfang Mai stattfinden; den angemeldeten Mitgliedern geht eine Einladung in Kürze zu. Im Anschluß daran wird ein Rundschreiben ausgegeben, wozu ich etwaige für die Mitglieder bestimmte Bekanntmachungen, Anzeigen und dergleichen bis zum 10. Mai erbitte. A. Krabbe.

Richtpreise für A. Z.-Mitglieder im Verkehr untereinander (s. Umschlagseite 3, Heft 8).

Arten	Junge à Stck. ℳ	Ausgefärbte ♂ und ♀ ℳ	Einzelne ♂ ℳ	Einzelne ♀ ℳ
Gelbe Wellensittiche	6,—	14,—	7,—	8,—
Grüne Wellensittiche	4,—	10,—	5,—	6,—
Nymphensittiche	7,50	20,—	9,—	12,—
Singsittiche	20,—	50,—	25,—	35,—
Zebrafinken	5,50	14,—	7,—	8,—
Mövchen	5,50	14,—	7,—	8,—
Schmetterlingsfinken	1,50	4,—	2,—	2,50
Amaranten	1,50	3,50	2,—	2,50

Verein für Vogelschutz und -pflege zu Jena. Jahresbericht 1923. Vorstand und Mitgliederbestand: Zu Anfang des Jahres gehörten dem Verein 27 Mitglieder an. Neueintritte fanden infolge der Ungunst der Verhältnisse leider nicht statt. Im Laufe des Jahres verließ uns infolge Fortzuges von Jena unser langjähriges und eifriges Mitglied Herr Dr. Jacobi, um unserem Verein als sogenanntes auswärtiges Mitglied auch weiter treu zu bleiben. Mit Beginn des neuen Jahres zählte der Verein 27 Angehörige. Die Hauptversammlung fand am 23. Januar statt. Zum Vorstand wurden gewählt die Herren: Herm. Jahn, 1. Vorsitzender; Dr. Alfred Sack, Kassierer und 2. Vorsitzender; Franz Borggreve, Schriftführer; H. Voigt sen., Bücher- u. Schrankwart. In Anbetracht der äußerst schweren wirtschaftlichen Lage, in der sich viele unserer Vereinsangehörigen befinden, wurde für dieses Jahr von der Festsetzung eines bestimmten Beitrages abgesehen. Es soll vielmehr jedes Mitglied je nach seinem „finanziellen Können" den von ihm zu zahlenden Beitrag selbst festsetzen, worüber der Kassierer zu strengstem Stillschweigen verpflichtet ist. Umzug: Da wir schon über ein Jahr unsere Zusammenkünfte in unserem alten Stammlokal, der Kulmbacher Bierstube (genannt die Hamsterkutsche), nicht mehr abhalten konnten und mit einer Besserung der wirtschaftlichen Lage auf längere Zeit hinaus nicht gerechnet werden kann, so war es endlich an der Zeit, unseren noch in der Hamsterkutsche befindlichen Vereinsschrank mit seinem für uns so kostbaren Inhalt abzuholen und ihn an seinen neuen Bestimmungsort im Hause unseres Vorstandes unterzubringen. Der Transport war reichlich gewürzt mit Humor, derben Flüchen und Schweiß, und als dieses Ungetüm von Schrank endlich nach schier unüberwindbaren Schwierigkeiten und nicht ohne im Treppenhaus des Gastgebers überflüssige Wandverzierungen hinterlassen zu haben, an seinem Bestimmungsort wieder stand, da gelobten sich die Festteilnehmer aus befreitem Herzen, sollte sich nochmals in später Zeit ein Umzug nötig machen, „diesen Schrank" lieber auf direktem Wege, nämlich durch das Fenster oder doch wenigstens in zersägtem Zustande, nach unten zu befördern. — Hierbei wollen wir noch der großen Liebenswürdigkeit unseres verehrten Vorstandes, des Herrn Jahn, und seiner nicht minder liebenswürdigen und gastfreien Gattin gedenken, die uns während der diesjährigen überaus strengen Wintermonate, an denen es dem Verein unmöglich war, für eigene Heizung und Beleuchtung des gegenwärtigen Vereinszimmers aufzukommen, in ihrer Wohnung einen behaglichen Aufenthalt bereiteten und die Mitglieder außerdem in freundlichster Weise bewirteten. Wir bitten daher unsere gütigen Gastgeber, den innigsten Dank des Vereins entgegennehmen zu wollen. Vorträge: Um unter unseren Mitgliedern das Verständnis und die Freude an unserer schönen Liebhaberei weiter zu fördern, wurde von einigen Herren eine Reihe von Vorträgen verschiedenen Inhalts gehalten. Es beteiligten sich hieran mit folgenden Themen die Herren: Borggreve, 1. „Über das Familienleben der Vögel" (2 Abende), 2. „Entstehung der Verschiedenartigkeit der Vogeleier" (2 Abende), 3. „Der Gesang der Vögel in anatomischer und biologischer Beziehung" (2 Abende); Jahn, 1. „Meine diesjährigen (1923) Erlebnisse im Ostpreußischen Sprossergebiet", 2. „Über Halten und Pflege des Schwarzplättchens"; Dr. Sack, 1. „Über Naturphotographie mit Demonstrationen", 2. „Einiges über den Vogelzug"; Voigt sen., 1. „Erinnerungen an meine Gartenvolieren", 2. „Zucht und Pflege von Wellensittichen". Außer diesen größeren Vorträgen fand eine bedeutende Anzahl Vorlesungen aus der bekanntesten wissenschaftlichen wie belletristischen Literatur sowie kleinere Vorträge statt. Anschauungsunterricht: Den Mitgliedern konnten im Laufe des Jahres nachfolgende Vögel lebend gezeigt werden: Waldohreule, Hühnerhabicht, Steinkauz, Schwarzplättchen, Sprosser, Nachtigall, Blaukehlchen, Sumpfrohrsänger und Rotkehlchen, welch letzteres, dies verdient besonders hervorgehoben zu werden, uns zu unseren winterlichen Versammlungsabenden durch einen selten schönen und feurigen Gesang erfreut. Vereinstätigkeit: Ein eigenartiges Mißgeschick waltet über der bereits im Vorjahre projektierten Anlage eines Vogelschutzgehölzes im Rosentale bei Jena. Trotz der grundsätzlichen Bereitwilligkeit uns zu diesem idealen Unternehmen Gelände und Geldmittel zu gewähren, ist die Ausführung unseres Planes für das verflossene Jahr leider dadurch unmöglich gemacht worden, daß der Syndikus der Carl-Zeiß-Stiftung wiederholt geschäftlich auswärts weilte und hierdurch der Anpflanzungstermin übergangen wurde. Wir hoffen, daß sich uns das kommende Jahr hierin günstiger erweisen wird. — Sehr erfreulich war dagegen für uns die Tatsache, daß sich das Thüringische Ministerium für Volksbildung, Abteilung Thür. Beratungsstelle für Heimatschutz und Denkmalpflege, in der Person des Herrn Regierungsrat Dr. Koch zukünftig allen Naturschutz betreffenden Fragen mit Interesse annehmen wird. Wir hatten bereits Gelegenheit, genanntem Herrn in längeren, eingehenden Ausführungen unsere besonderen Wünsche für unsere Thüringer Heimat im allgemeinen wie für Jena und Umgegend im besonderen zu unterbreiten. Es handelt sich dabei einmal um den Schutz folgender Vogelarten: Steinsperling, Uferschwalbe, Wachtel, Wasseramsel, Nachtigall, die Würgerarten, Eisvogel, Uhu, Birk- und Auerwild, dann aber auch für einen sogenannten Landschaftsschutz, z. B. für den bei Bürgel gelegenen Hainspitzer-See und die bei Klosterlausnitz-Hermsdorf gelegenen Sümpfe mit ihrer sehr interessanten Wasservogelwelt und schließlich nur eine Anregung das bei Jena gelegene floristisch wie faunistisch hochinteressante Rautal zum Naturschutzpark zu machen. Wir erhielten durch Herrn Regierungsrat Dr. Koch die Zusicherung, daß alle oben erwähnten Vogelarten nach dem neuen Thüringer Jagdgesetz geschützt werden sollten und daß bereits im Gesetzentwurf, der von Genanntem bearbeitet wurde, die Wachtel, die Würgerarten und der Uhu als jagdbare Vögel fehlen. — Da zukünftig zur Förderung unserer Liebhaberei ein Zusammenschluß aller Lokalvereine zu machtvollen Landesverbänden unbedingt notwendig ist, zögerten wir nicht lange, um uns dem bereits bestehenden Landesverband Sachsen anzuschließen und somit für Thüringen und Sachsen ein einheitliches Ganzes zu bilden. Zur Propagierung dieses Gedankens erließen wir in der „Gefiederten Welt" einen entsprechenden Aufruf und erhofften von demselben ein größeres Adressenmaterial, mit dem sich etwas anfangen ließe. Leider sollte unsere Hoffnung und gute Absicht völlig resultatlos verlaufen, denn nicht ein „Einziger" meldete sich. Gewiß kein gutes Zeichen für das Interesse an unserer Liebhaberei. Ein weiterer Aufruf in der „Gefiederten" galt der Linderung der finanziellen Not, in die sich durch die unglückseligen Zeitverhältnisse die Töchter unseres großen Alfred Brehm befinden. Wie wir zu unserer Freude hörten, soll diesem Aufruf eine wesentlich günstigere Aufnahme beschieden gewesen sein. Wir selbst gingen mit gutem Beispiel voran und konnten schon nach einigen Tagen das Ergebnis einer Kollekte an die Genannten abführen, des-

gleichen hat ein auswärtiger Gönner unseres Vereins, Herr Ulrich Beume in Groningen, angeregt durch unser Mitglied Herrn Voigt sen., einen größeren Betrag überwiesen. Allen hochherzigen Spendern möchten wir auch an dieser Stelle nochmals herzlichst danken. — Auf dem alten Friedhof der Stadt Jena können sich die meist vor vielen Jahren zum Schmuck der Gräber angepflanzten Bäume und Sträucher in einer für Vogelschutz geradezu idealen Weise unbehindert frei und üppig entwickeln. Die alten abgebröckelten Umfassungsmauern und zum Teil auch die alten Baumbestände sind mit einem dichten, fast undurchdringlichen Efeubehang umwachsen. Ein Bild, wie es einst die altgermanischen Wälder boten. Hier haben unsere Schützlinge Sommer wie Winter den besten Unterschlupf, und im Frühjahr bieten die jetzt reifen Efeubeeren unseren manchmal durch strengen Nachwinter ernstlich gefährdeten Sängern reiche Tafel. Daß dies Vogeleldorado aller Ordnungskunst moderner Friedhofskultur zum Trotz in seiner jetzigen Gestalt bewahrt bleibt, dafür sind wir in diesem Jahr eingetreten und werden es stets, sobald ernstlich Gefahr im Verzuge ist. — Einige Herren haben es sich auch dieses Jahr trotz „Personal-Gehaltsabbau" nicht nehmen lassen, besonders bei dem Ausgang Dezember herrschenden strengen Frost und Schnee in unseren öffentlichen Anlagen eine Reihe von Futterhäuschen täglich mit dem nötigen Körner- und Weichfutter zu beschicken. Besuch von Ausstellungen: Herr Alfred Bischoff hatte die Liebenswürdigkeit, uns auf der Vogelausstellung zu Leipzig, und die Herren Voigt sen. und jr. auf der großen in Berlin abgehaltenen Vogelschau wie auch bei der Versammlung der Austausch-Zentrale in Berlin zu vertreten. Über ihre dortigen Erlebnisse haben sie uns in sehr fesselnden Vorträgen Bericht erstattet. Geschenke: Herr Borggreve hatte im Laufe des Jahres wiederholt in seinen Bekanntenkreisen größere Geldbeträge gesammelt und zur Verwendung für Vogelschutz unserer Vereinskasse übergeben. Ebenso hatten die Herren Uhlmann und Voigt sen. des öfteren der Vereinskasse namhafte Beträge zur Verfügung gestellt. Herr Uhlmann hatte außerdem noch dem Verein ein Jahresabonnement der Ornithologischen Monatsschrift gespendet, wofür den Herren hiermit herzlichst gedankt sein soll. Borggreve, Schriftführer.

Verband deutscher Farben-, Gestalts-, Bastardkanarien- und Exotenzüchter München (E. V.). Gegründet 1917. In der letzten Monatsversammlung am 15. März 1924 hielt Mitglied Max Zierer, der Obmann der Exoten-Spezialzüchter, einen interessanten, teils durch Bälge aus der bayerischen Staatssammlung, teils durch Bilder unterstützten Vortrag über jene ausländischen Finkenarten, bei denen nachweisbar die Zucht mit Kanarienweibchen gelungen ist. Als Mitglieder wurden H. Brandes in Halle a. S. und M. Joh. Breuer in Elmpt bei Brüggen (Rhld.) einstimmig in den Verband aufgenommen. Die Versammlung beschließt, Vogelausstellungen auch außerhalb Münchens in corpore zu beschicken nach vorheriger Abmachung mit dem ausstellenden Verein, um dadurch der Farben- und Gestaltskanarienzucht neue Freunde zu gewinnen. (Anfragen sind an den 1. Vorstand Leopold Keidel, München, Schraudolphstr. 44III, zu richten.) a.

Vereinigung der Vogelliebhaber Landesverband Sachsen und Großthüringen. Vor der Gründungsversammlung des Reichsverbandes hielt der Landesverband noch eine Mitgliederversammlung ab. Obwohl es die Wichtigkeit der Tagesordnung erforderte, daß auch die Mitglieder außerhalb Leipzigs anwesend sein sollten, haben wir von einer Einladung abgesehen aus dem Gedanken heraus, daß die Aufwendungen, die die Mitglieder bei Abordnung eines Vertreters hätten erbringen müssen, dazu verwandt werden, daß jeder angeschlossene Verein einen Vertreter mit nach Berlin entsendet. Und was von den Vereinen erwartet wird, trifft auch bei unseren Einzelmitgliedern zu. Wohlgemerkt, das Vorhaben, was wir jetzt auszuführen haben, ist ein außerordentlich Wichtiges für die gesamte Liebhaberei. Der Landesverband gestattet sich wiederholt alle seine Mitglieder zur Teilnahme einzuladen. Die Versammlung findet am 27. April 1924, vorm. 10 Uhr statt. Die Vertretung des Landesverbandes wird am 27. April 1924 morgens nach Berlin fahren. Ein Anschluß der mitreisenden Herren und Abgeordneten ist sehr gut möglich. Die Ortsgruppe Leipzig bietet unentgeltliche Übernachtungsgelegenheit vom 26. zum 27. April und, wenn nötig, auch vom 27. zum 28. April 1924. Doch muß vorherige Anmeldung rechtzeitig erbeten werden. Der Landesverband hat ein wichtiges Interesse daran, daß der Sitz des Reichsverbandes nach Leipzig gelegt wird. Die stattgefundene Mitgliederversammlung hat die Vertreter der sächs. Liebhaber mit Wahrnehmung dieses Antrages beauftragt, wovon allen Liebhabern Kenntnis gegeben wird.

J. A.: Petters, 1. Schriftführer.

Anzeigenteil

Die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 20 G.-Pf. berechnet. Aufnahme erfolgt gegen Voreinsendung des Betrages in Reichsgeld per Brief od. auf unseren Zahlstellen: Postscheckkonto: Magdeburg 3148, Wien 156 687, Bern III 4326, Prag: Creditanstalt d. Deutschen unter Angabe des Zweckes.

Futtermittel

Ia Universalfutter:

Nachtigallen . . . Pfund 1,35 ℳ
Grasmücken . . . „ 1,20 „
Drosseln . . . . „ 0,90 „
K. Rinke, Stargard i. Pom. [286

Mehlwürmer Pfd. 6 ℳ, 5 Pfd. frc. **Jeitner, Breslau,** Weinstr. 12. [287

Vogelfutter [288
für Kanarien, Waldvögel, Exoten, Papageien, Weichfresser, Anfragen nur gegen Rückporto. Liste 13 über Vogelfutter, Liste 5 über Vogelkäfige, Zuchtgeräte usw. mit etwa 400 Abbild.
W. Göpel, Leipzig,
Tröndlinring 1. Telephon 14 958.

Mehlwürmer
prg. Einsend. v. 2.— Rentenmark 1/4 Pfd. franko versend. **D. Waschinski & Co.,** Biesenthal I (Mark). [289

Hirse gelb } 50 kg
Hirse bunt } 15 ℳ.
eine Abfallhirse, sondern saubere großkörnige Ware. Als Wellensittichfutter besonders zu empfehlen.
Muster versendet [290
Heinrich Erdmann,
Darmstadt, Nieder-Ramstädter Str. 47.
A. Z. Mtgl. 118.

Soeben erschien:
Titel und Inhaltsverzeichnis
zur
„Gefiederten Welt" 1923
Die alten Abonnenten des Jahres 1923 erhalten **auf Wunsch** ein Stück postfrei zugestellt. **Einbanddecken für 1923** stehen ebenfalls (1.50 ℳ und Porto) zu Diensten.
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg
(Postscheckkonto: Magdeburg 3148)

P. Burghard, Dresden 29
Pennricher Straße 40.

Fabrikation **praktischer** Vogelkäfige. Speziell
Weichfresserkäfige.
Anfertigung von **Käfigen, Volieren usw.** nach allen Angaben in nur saubersten, solider und fachmännischer Ausführung bei billigster Berechnung. [291
Ia Referenzen. Goldene Medaille.

„Ornis"
Freie Bezugs-Vereinigung der Waldvogel-Liebhaber Deutschlands
bestand von 1912 bis 1. Oktober 1920. Durch **sachgemäße** und **reelle** Belieferung der Mitglieder mit **Vogelfutter** und **Bedarfsartikeln** erwarb sie sich einen Ruf, der noch fortbesteht. — Auf **vielseitigen** Wunsch bringe ich diese Tatsache in Erinnerung, auch allen denjenigen, die von dem Bestehen derselben noch keine Kenntnis haben. — Das Ornis-Haus ist nach wie vor bestrebt, die besten von allen am Markt erhältlichen Artikel zu liefern; das mir geschenkte Vertrauen werde ich weiter zu erhalten wissen. — Über meine Tätigkeit gibt das **„Ornis-Buch"** Auskunft. Bei Anfragen erbitte ausreichendes Rückporto und Angabe der vorhandenen Vogelarten. — Auskunft bereitwilligst.
Ornis-Haus, Halle a. S.
Fernruf 4198 [292
„Reform-Normal"-Weichfutter nach Angaben des Herrn Apotheker Adalbert Jena-Biberach-Riß. Moderner elektr. Betrieb. Gleichmäßige Körnung, restloser Verbrauch garantiert.
„ORNIS-Buch" (90 S.) M. 1.—

Wellensittiche
Stück 22 ℳ, **Edelsänger** Stück 5 ℳ, **Virg. Nachtigall** Stück 22 ℳ, **pfeif. und sprechd. Nymphensittich** in Pracht 50 ℳ und ander Tiere verkauft
A. Schwarz, Tierhandlung, Weißenfels a. S., Klingenplatz 8. [293

Neu **Achtung!** **Neu**

Empfehlen werten Geflügelfreunden unter konkurrenzlos billigen Preisen:

Ausstellungs- und Transportbauer

jeden Posten.

Heck-, Flug-, Einsatzkäfige sowie Gesangsschränke, Vorsatzgitter (siehe Katalog) **sowie Anfertigungen nach jeder Angabe, schnellste Lieferung.**

Verlangen Sie bitte unsern reichhaltigen Katalog, welcher Ihnen kostenlos zugesandt wird. Sauberste Ausführung. Billigste Preise.

Um den Züchtern die Anschaffung des Zuchtgerätes zu erleichtern, 294] tauschen wir auf Singvögel aller Art.

Erzgebirgische Käfigfabrik und Kunsttischlerei

Barth & Co., Eibenstock i. Sa.

Telephon 171.

H. Fockelmann,

Hamburg 6

Catharinenstraße 25.

Postscheckkonto: **Hamburg 9632.** [296

Sämtliche Sämereien sind in eigener Anlage maschineli gereinigt und nicht mit üblicher Handelsware zu vergleichen.

	1 Postpaket franko inkl.
Scharpie, weiß	18.50 ℳ
Erdnüsse	5.40 ℳ
Hanfsamen	4.20 ℳ
Hafer, geschält	3.30 ℳ
Hirse, gelbe Ia	3.— ℳ
Hirse, gelbe (Kückenfutter)	2.60 ℳ
Hirse, geschält	3.— ℳ
Hirse, Senegal	4.20 ℳ
Hirse, weiße	9.40 ℳ
Kanariensamen (Glanz) großkörnig, Marokko	4.40 ℳ
Kanariensamen, holländischer	3.90 ℳ
Karottengrieß	11.40 ℳ
Leinsamen	4.20 ℳ
Mohn, blau, prima	6.20 ℳ
Negersamen	4.40 ℳ
Rübsamen, prima	4.40 ℳ

	1 Postpaket franko inkl.
Rübsamen, II	4.20 ℳ
Sonnenblumenkerne	4.— ℳ
Zirbelnüsse	6.40 ℳ
Elbsand, gesiebt	2.50 ℳ
Ossa-Sepia, bis 10 cm 10 Stück	0.40 ℳ
Ossa-Sepia, 10—12 cm 10 Stück	0.65 ℳ
Singfutter	4.40 ℳ
Papageienfutter	4.40 ℳ
Waldvogelfutter	4.40 ℳ
Stiegl.- u. Zeisigfutter	5.40 ℳ
Prachtfinkenfutter	4.40 ℳ
Sittichfutter	4.40 ℳ
Weichfutter für Insektenfresser mit Ameiseneiern	9.40 ℳ
Weichfutter für Insektenfresser	6.80 ℳ

Angebot freibleibend. Versand gegen Vorauszahlung, auf Wunsch per Nachnahme. Bestellungen unter 2½ kg von einer Sorte werden nicht ausgeführt (Sepia und Ameiseneier ausgenommen). Ausführliche Preislisten kostenlos.

Neueröffnung!

Erbitte Angebote **jeder Art**

Stuben- und Volieren-Vögel, kleine exotische Säugetiere, Käfige, Futter usw.

Alleräußerste Kassapreise an [295

Fernitz, Glienicke bei Berlin (Nordbahn) **Veldheimstraße 41.**

Ornis-Haus

Halle-Saale

Gegründet 1912

Spezialität:

Individuelle Weichfresserpflege nach Angaben des Herrn Apotheker Adalbert Jena-Biberach-Riß. (Alleiniges Herstellungsrecht.)

Reform-Normal I
Volieren-Mischung

Reform-Normal II
Grasmücken, Rotkehlchen usw.

Reform-Normal III
Nachtigallen, Schama usw.

Reform-Normal IV
Sprosser, Gelbspötter usw.

Reform-Normal V
Drosseln, Stare usw.

Restloser Verbrauch.

Ameisenpuppen
Weißwurm
Karottengrieß
Kondensiertes Eigelb
Dr. Lahmann's Nährsalz
Dr. Riege's Nährsalz
„Sperlings-Normalin"
— neutraler Kalkzusatz —
Pohl's Vogelmedizinen.
Körnerfutter Ia für jede Vogelart. [297

Inhaber langjähriger Fachmann, siehe „Ornis-Buch" (90 S.) Mk. 1

Preisliste auf Wunsch!

Auskunft bereitwilligst geg. Freim.

Suche

zwei zuchtfähige Weibchen Zebrafinken. Gebe evtl. junge Wellensittiche dafür in Tausch. [299

Apotheker Pistor, Oberaula, Bez. Cassel. A. Z. Mtgl. 38.

Schönes Blaukehlchen,

tadellos im Gefieder, **lautsingendes Rotkehlchen,** tadellos im Gefieder, vertausche gegen **Weißwurm.** [300

Johann Fischer in **Waldsassen,** Mitterteicher Straße 54.

Kanarienhähne, pr. Zuchtweibchen (höchstpräm.) verk. **Zazworka, Bln.-Lichtenberg,** Skandinavische Str. 26. Fernruf Bln.-Lichtenberg 3430. [301

Harzer Kanarien!

Prima tiefe flotte Zuchthähne à 15 ℳ, gesunde kräftige Stammblutweibchen à 5 ℳ. Porto und Verpackung 4 ℳ. **Harzer Gebirgs-Sommerrübsen,** prima süße milde Züchterware, Postkolli 4½ ℳ franko. [302

Rich. Heydenreich,

Bad Suderode (Harz).

Größte Harzer Kanarien-Feinzucht. Staatspreis, viele gold. Medaillen.

Gef. Welt Jahrg. 1913—21 in Orig.-Einband, 1922 bis 23 ungebd. verkaufe oder vertausche gegen Vögel oder Nützliches. Angebote an **Paul Friedrich, Meuselwitz i. Th.,** Fasanenstraße 19. [303

Wir sind beauftragt worden, folgende

Seltenheiten

anzubieten:

Gefiederte Welt. I. Jahrgang 1872—1923 außer 1904, 1910, 1911. Fast alles gebunden (11 Jahrgänge in Heften).

Journal f. Ornithologie. II. Jahrgang. 1854—1904 außer 1870 bis 1872. Es fehlen in älteren Jahrgängen einige Tafeln sowie in 1869 ein Bogen. Dazu gehörig: Ornithologisches Zentralblatt. I. Jahrgang 1876—1882. Komplett. Zum großen Teil gebunden.

Ornithologische Monatsschrift. I. Jahrgang. 1876—1879, 1883—1899, 1901—1922. Zum großen Teil gebunden.

Zeitschrift für Oologie. I. Jahrgang. 1911. Komplett.

Ornitholog. Rundschau. I. Jahrgang 1905. Komplett.

Zeitschrift für Oologie und Ornithologie. XV. Jahrgang. 1905—1910, 1912, 1920, 1921. Komplett. Von Jahrgang 1911, 1912, 1913, 1914, 1923 fehlen diverse Hefte.

Lieferbarkeit freibleibend — Irrtum vorbehalten. Liebhaber, die sich bewußt sind, daß derartige Seltenheiten I. Ranges einen angemessenen Preis erfordern, wollen sich mit uns in Verbindung setzen. Die einzelnen Reihen können nur in sich geschlossen abgegeben werden.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung

Magdeburg Postschließfach 148.

Abzugeben: Vogelbuch von Flöricke, 2. Auflage 1922 mit Abbildungen von Neunzig, Preis 15 ℳ. **Neumann,** München, Preysingstraße 29. [304

Junge Blaustirn-Amazonen,

sprechend, Ia Gefieder, à St. 50—70 ℳ, Grassittiche, Goldstirnsittiche à Stück 12 ℳ, ganz zahme Kapuzineraffen à Stück 90 ℳ, ganz zahme Resusaffen, an Leine zu führen, à 90 ℳ, Mamosettäffchen à Stück 28 ℳ, bei mehreren à Stück 25 ℳ, Weißscheitelpfäffchen à Paar 18 ℳ. Alles nur einwandfreie Tiere. Verpackung und Porto als „dringend" 3.50 ℳ. [298

P. Tzornack,

Berlin NO 55,
Prenzlauer Allee 189.

Zur gefälligen Beachtung!

§ 3 des am 1. September 1908 in Kraft getretenen „Vogelschutzgesetzes" lautet:

In **der Zeit vom ersten März bis zum ersten Oktober** ist das Fangen und die Erlegung von Vögeln sowie der Ankauf, der Verkauf und das **Feilbieten,** die **Vermittlung** eines hiernach verbotenen An- und Verkaufs, die Ein-, Aus- und Durchfuhr von lebenden sowie toten Vögeln der **in Europa einheimischen** Arten überhaupt, ebenso der Transport solcher Vögel zu Handelszwecken untersagt.

Dieses Verbot erstreckt sich für **Meisen, Kleiber, Baumläufer, Spechte, Eulen** und **verschied. Falken** für das **ganze Jahr.**

Auf Grund dieses können wir vom **1. März an** Inserate betreffend **Kauf** und **Verkauf einheimischer** Vögel nicht mehr zum Abdruck bringen und bitten, dies bei Aufgabe von Inseraten berücksichtigen zu wollen.

Unter Feilbieten ist das Anbieten zum Kaufe oder zu **sonstigem Erwerbe** zu verstehen. Somit ist ein strafbares Feilbieten auch dann anzunehmen, wenn in einer Anzeige zwar dem Wortlaut nach ein **Tausch** angeboten wird, der Anbietende aber tatsächlich zu kaufen bzw. zu tauschen beabsichtigt und die Form des Tauschangebots nur wählt, um sich gegen strafrechtliche Verfolgung zu sichern. In solchen Fällen machen sich sowohl die anzeigenden Personen wegen verbotenen Feilbietens als auch die die Anzeigen veröffentlichenden Zeitungsunternehmer der verbotenen Vermittlung eines An- und Verkaufs strafbar.

Bei Tauschanzeigen ist ausdrücklich anzugeben, was als Gegenleistung geboten oder gesucht wird. Eine Angabe des Wertes der zum Tausch angebotenen Vögel darf nicht erfolgen! Unter Chiffre können derartige Anzeigen nicht aufgenommen werden!

Die Geschäftsstelle der „Gefiederten Welt"

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Inserate

für das am 24. April 1924 zu
Ausgabe gelangende Heft 10 der Gef
Welt erbitten bis 19. April 1924 früh

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Hermsdorf bei Berlin; für den Anzeigenteil: Rolf Kretschmann, Magdeburg, Postschließfach 148.
Verlag der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck: August Hopfer, Burg Bz. Magdbg.

Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Jahrg. 53 | Den 24. April 1924 | Heft 10

(Druckort: Burg, Bezirk Magdeburg.)

Nachtigall und Amsel, eine Vogelschutzbetrachtung.

Von Franz Borggreve, Jena.

(Nachdruck verboten.)

Herr W. Marquardt-Salzhausen bringt in Nr. 2 der „Gef. Welt" Jahrg. 1923 eine Abhandlung, die dem Verschwinden der Nachtigall gewidmet ist. Herr M. ist darin der Ansicht, daß die Hauptschuld des Verschwindens unserer Nachtigall (Erithacus megarhynchos) auf das Konto der Schwarzdrossel oder Amsel (Turdus merula) zu setzen sei. Da ich beruflich in den Jahren 1898—1908, also in einem Zeitraum von 10 Jahren, in dem größten und bekanntesten deutschen Nachtigallengebiet am Rhein und dessen Nebentälern zu tun hatte und ich diesem Vogel meine ganz besondere Aufmerksamkeit schenkte, so glaube ich wohl berechtigt zu sein, zu dieser Angelegenheit auch etwas sagen zu dürfen.

Das von mir in dem angegebenen Zeitraum recht gründlich, besonders während der Brutperiode durchforschte Gebiet erstreckt sich von Bingen resp. Rüdesheim bis St. Goar resp. St. Goarshausen einerseits und von Bingen bis Kreuznach andererseits, einschl. der zu diesen Distrikten gehörenden Nebentäler. Gelegentliche Exkursionen auch nach entfernteren Punkten, z. B. an die Mosel, zeigten im wesentlichen das gleiche Beobachtungsresultat.

Im Gegensatz zu den Ausführungen des Herrn M. habe ich in diesem ausgedehnten Gebiet unbedingt feststellen können, daß die Nachtigall in sehr großer Anzahl, neben allerlei Arten anderer Weichfresser, wie Grasmücken, Laubsänger, besonders aber Amsel, Sing- und Misteldrossel, ja sogar neben Raubwürger (Lanius excubitor) und Neuntöter (Lanius collurio), welch letztere als Störenfriede wohl weit eher in Betracht kommen, ihrem Nahrungserwerb nachging und ihr Brutgeschäft verrichtete. Wäre also die Nachtigall wirklich so empfindlich gegen die Konkurrenz anderer größerer Vögel, so müßte innerhalb von 10 Jahren doch sicherlich eine Abnahme zu verzeichnen gewesen sein. Ich wage jedoch weit eher das Gegenteil zu behaupten. — Da sich in diesen, in enge Täler eingequetschten kleinen Städtchen, in deren Umkreis der „Wingert" die dominierende Rolle spielt, für Nachtigall und auch Amsel eine diesen zusagende Park- resp. Gartenkultur selten vorfindet, so haben beide Vögel ihre Brutplätze nach den von der Natur zu Vogelschutz in so verschwenderischer Weise ausgestatteten, mit dichtem, undurchdringlichem Wildrosen-, Weißdorn- und Schlehendickicht bewachsenen Felshängen verlegt. Die Nachtigall baut übrigens nicht immer ihr Nest unmittelbar auf den Boden. Abgesehen davon, daß eine ganze Anzahl als Nestunterlage vorjähriges Laub zusammenträgt, fand ich ihre Kinderwiege oft auch zwischen den unteren, dünner belaubten Ästen älterer Büsche und Sträucher und auf Baumstümpfen in zirka 30—40 cm Höhe über dem Boden. Daß die Nachtigall ein scheuer und zurückhaltender Vogel sein soll, kann ich auch nicht ohne weiteres unterschreiben. Im Laufe meiner langjährigen Beobachtungen habe ich mich der Nachtigall ungezählte Male bis auf lächerlich geringe Abstände nähern können, ohne daß sie sich in ihrem Gesangsvortrage oder bei der Durchstöberung alten Laubes nach Leckerbissen irgendwie stören ließe.

Bedauerlicherweise gibt es eine große Anzahl der Gattung homo sapiens, die leider auch durch sog. „Vogelliebhaber" bereichert wird, die der Amsel oder Schwarzdrossel nun einmal den Krieg erklärt hat. Daß sie gelegentlich Näschereien in unseren Gärten verübt, ist eigentlich ein Vergehen, daß, wenn wir ehrlich sein wollen, all unseren gefiederten Freunden zur Last zu legen ist. Ferner wird immer behauptet, die Amsel plündere Nester. Mir ist trotz jahrelanger objektivster Beobachtung kein einziger derartiger Fall vorgekommen, und ich habe sie alle seither in das Reich der Fabel verwiesen. Sollte aber dennoch jemand derartige Fälle wirklich einwandfrei festgestellt haben, so dürfte dieser Kannibalismus doch wohl zu den allergrößten Seltenheiten gehören. Als Beweis für meine Ansicht möchte ich erwähnen, daß hier in Jena ein kleines Geländeviereck, das aus einem öffentlichen Park, dem Botanischen Garten und einem alten, nicht mehr benutzten Friedhof gebildet wird, infolge dichten, zum Teil sehr verwilderten Wachstums jährlich einer Unmenge Singvögel aller Arten zu Aufenthalt und Brutstätte dient. Selbstredend ist auch unsere Amsel hier in genügender Anzahl als Brutvogel vertreten. Trotzdem werden aber jährlich, eine zwölfjährige objektive Beobachtung bestätigt dies, von allen übrigen dort brütenden Vogelarten bedeutende Mengen Jungbrut großgebracht. Das berüchtigte Nestplündern der Amsel kann also so schlimm nicht sein. Dagegen hat der Verwalter des

Friedhofes, nebenbei bemerkt ein eifriger Vogelschützer, seit Jahrzehnten einen ständigen Kampf gegen strolchende Katzen zu führen. Dieser erklärt aus seiner langen Praxis, daß eine Katze mehr Unheil unter der Singvogelwelt anrichtet als 10 Marder oder Eichhörnchen. — Im übrigen halte ich es durchaus für einen Trugschluß, wenn allseits behauptet wird, daß wir an einem Überfluß an Amseln litten. Diese Ansicht trifft wohl für unseren Buchfinken zu, der überall in gleich großer Anzahl anzutreffen ist. Es ist ja allbekannt, daß sich die sogenannte Waldamsel in den letzten Jahrzehnten, da ihr der Wald die notwendigen Lebensbedingungen nicht mehr bietet, in eine Stadtamsel umgewandelt hat, d. h. sie hat ihr Quartier in die Gärten, Friedhöfe, Parks und ähnliche Anlagen verlegt. Was wir also fälschlich für eine große Fülle halten, ist nichts weiter als ein Zusammengedrängtleben dieser Vögel auf kleinem Areal. Die gesangliche Leistung der Amsel steht in sehr vielen Stücken der der Singdrossel und oft der der Nachtigall gleich. Was sie aber als unbedingte Vorzüge vor letzterer hat, das ist ihre Winterhärte und absolute Anspruchslosigkeit. Sie ist daher bei sehr guter Gesangsleistung ein dankbarer Vogel und verdient weit eher den Schutz des Menschen. Er ist unser eigentlicher Frühlingsvogel, der mit seinem herrlichen Gesang schon beginnt, wenn andere Vögel noch schweigen. Im Anschluß hieran kann überhaupt nicht dringend genug vor einem corriger la nature gewarnt werden. Der moderne Vogelschutz hat ja schon längst die Strickstrumpftantensentimentalität in die Rumpelkammer verwiesen. Aber leider gibt es immer noch eine ganze Anzahl „übereifriger Vogelfreunde“ und „angeblicher Vogelschützer“ beiderlei Geschlechts, die in dem guten Glauben leben, etwas Edles und Gutes zu tun, wenn sie ihre Hand zu rücksichtsloser Verfolgung und Ausrottung aller sog. „schädlichen Vögel“ bieten. Daß z. B. der Raubvogel ebenso wie der Mensch und die von ihm so besonders betreuten Singvögel demselben Stoffwechsel unterworfen, die Befriedigung des Hungergefühls also für ihn dasselbe eherne Gesetz bedeutet, daran denkt in seiner Ausrottungswut jener Vogelfreund nicht. Da der Raubvogel, bleiben wir mal bei ihm, denn er stellt das Hauptkontingent aller sogenannten „Schädlichen“ dar, abgesehen von seinem hohen ästhetischen Wert durch seine herrliche Gestalt, im Haushalt der Natur durch die ja bekannte Rassengesundhaltung nur Nützliches schafft, so wird ihm jeder „wirkliche Vogelfreund und -schützer“ es nicht übelnehmen, wenn er sich seinen Tribut zum Teil auch aus der Singvogelwelt entnimmt. Solange sich der Mensch noch so gutmeinender Eingriffe in die Natur enthält, wird keine Vogelrasse aussterben, und darauf kommt es doch schließlich bei allem Vogelschutz in erster Linie an. Die Natur sorgt schon selbst aus sich heraus unter ihren Geschöpfen für das richtige Gleichgewicht. (Schluß folgt.)

Etwas vom Blaukehlchen.

Von Robert Thiele, Altona.

(Nachdruck verboten.)

Ein herrlicher Frühlingstag hat seinen Einzug gehalten. Der erste Vorortzug bringt uns von Hamburg nach Bergedorf. Von da geht es zu Fuß zu den Elbwiesen bei Börnsee, ein Weg von etwa einer Stunde. Wir sind im Hamburger Blaukehlchengebiet. Die Gegend ist so recht angetan, das Herz des Naturfreundes höher schlagen zu lassen. Zahlreiche Feldlerchen neben und über uns schmettern ihr Lied. Auch den schönen, sanften, einschmeichelnden Gesang der Heidelerche vernehmen wir. Der Kiebitz ruft hier und da. Der schöne Vogel verfolgt den Wanderer eine ziemliche Strecke Weges. Wir begegnen ziehenden Wiesenpiepern und einer großen Menge von Rotkehlchen, große Flüge von Wacholderdrosseln machen Rast, nur kurze Zeit, und verschwinden in nordöstlicher Richtung.

Nun zu den Blaukehlchen, die hier zur Zugzeit recht häufig vorkommen. Ich sah bisher nur die weißsternige Form und auch solche ohne Stern, sog. Wolffsche Blaukehlchen. Ab und zu kommen auch rotsternige Vögel vor, das beweisen zwei rotsternige Blaukehlchen, welche ein hiesiger bekannter Vogelfänger auf den Elbwiesen erbeutete. Ich will in diesem Jahr mein besonderes Augenmerk auf rotsternige richten. Es ist für das Auge des Vogelfreundes ein herrlicher Genuß, Blaukehlchen in ihrem Tun und Treiben in der Freiheit beobachten zu können. Das Blaukehlchen trifft man hier fast regelmäßig in den Wassergräben, an denen Weidengebüsch gedeiht. Am liebsten hält es sich in solchen Gräben auf, die ziemlich ausgetrocknet sind, sie müssen aber noch feucht sein und eben noch ein wenig Wasser enthalten. Hier kann man mit ziemlicher Gewißheit darauf rechnen, sie anzutreffen. Wie zierlich und mäuschenflink laufen sie, bis an die Fersen im Wasser, im Graben dahin, um im seichten Wasser Futter zu suchen. Eifrig stellen sie den in ihrem aus Schilf- und Rohrstückchen erbauten Gehäuse steckenden Larven der Köcherfliege nach. Mit welcher Zierlichkeit ziehen sie die Larven aus dem Gehäuse!

Und nicht minder schön als der Anblick des Vogels ist sein Gesang. Ein Genuß für Auge und Ohr, wenn er in die Luft steigt und sein Liedchen ertönen läßt, um sich dann mit gefächertem Schwanz auf der Spitze des Weidenstrauches niederzulassen. Ich habe das „In-die-Luft-Steigen“ bisher nur vom weißsternigen Vogel gesehen, niemals von dem Wolffschen Blaukehlchen. Haben andere Blaukehlchenfreunde andere Erfahrungen gemacht? Um Irrtümern vorzubeugen, möchte ich besonders darauf hinweisen, daß es sich bei dem Aufsteigen des Blaukehlchens nur um einen kurzen Flug, etwa 6—8 m hoch, handelt, nicht etwa um Höhenflüge, wie sie die Lerche ausführt.

Bei den Wolffschen Blaukehlchen handelt es sich nach meinen Erfahrungen um junge Vögel. Solche, die ich käfigte, waren stets kleiner als die Weißsternigen, und nach der Mauser kam jedesmal der weiße Stern zum Vorschein, den man aber auch schon vorher sehen konnte, wenn man das Gefieder lüftete. Im vorigen Jahr besaß ich einen weißsternigen Vogel, bei dem das schwarz-weiß-braune Band auf der Brust dieselbe Breite und Schärfe der Zeichnung aufwies wie bei der rotsternigen Form.

Es gibt hier vorzügliche Spötter unter den Blaukehlchen. Ich habe hier Sänger abgehört, die den Schlag des Buchfinken brachten genau wie der Buchfink, den Wachtelschlag, das Lied der Feldlerche, des Hänflings, den Lockruf von Wiesenschmätzer, Heide-

lerche, Fitis- und Weidenlaubvogel, letzteren lassen hier die meisten Blaukehlchen hören, die Rufe der Kohlmeise und anderes mehr. Ich empfehle das Blaukehlchen als vorzüglichen Stubenvogel. Das spinnradähnliche Schnurren lassen gute Spötter fast gar nicht hören, jedenfalls nicht in störender Weise. Ich besitze einen vorzüglichen Spötter, der sich noch durch die auffallende Größe des weißen Sternes auszeichnet.

Der Tarantinische Zwergpapagei und seine erste glückliche Züchtung.

Von Gustav Rambausek.

(Nachdruck verboten.)

Die von meiner Liebhaberei bevorzugten Exoten sind, wie bereits aus obigem zu ersehen, die Zwergpapageien und dann noch die Loris und Fledermauspapageien.

Prachtglanzstar.

Die für heute in Anspruch genommenen tarantinischen Zwergpapageien waren meine Lieblinge meiner sämtlichen Vögel. Selbe sind etwas größer als die rotköpfigen Inseparables, Männchen und Weibchen sind voneinander sehr gut zu unterscheiden. Ersteres ist grasgrün, am Vorderkopf nebst Zügel und Augenring zinnoberrot, unterseitige Flügel und breite Schwanzbinde schwarz. Sein kräftiger Schnabel ist dunkelrot und an der Spitze etwas lichter. Das Auge ist dunkelbraun. Das Weibchen, dem jede rote Färbung am Kopf fehlt, ist sonst gleich dem Männchen gefärbt. Ruß erwähnt in seinem großen Werk, daß nach Finsch und Heuglin beide Geschlechter gleich gefärbt sind, nur soll beim Weibchen das Rot der Stirn mehr gelblich und verwaschen sein. Auch soll Heuglin rotköpfige Vögel nur während der Paarungszeit und nicht in den Wintermonaten gefunden haben. Was die erste Angabe betrifft, ist selbe durch meine obige Mitteilung, wo dem Weibchen jede rote Färbung fehlt, richtiggestellt, und was die zweite Angabe betrifft, ist selbe auch auf einen Irrtum zurückzuführen, da Männchen und Weibchen, wenn einmal ausgefärbt, niemals die Färbung ändern. Die Tarantiner, wie ich sie kurzerhand immer nenne, sind sehr lebhafte Vögel, welche selten ruhig sitzen und immerwährend etwas zu schaffen wissen. Die Stimme, welche stellenweise in ein schärferes Kreischen übergeht, erschallt so ziemlich den ganzen Tag, außer, es ist das Weibchen im Nistkasten, dann hält auch das Männchen Siesta. Letzteres, welches von einer Scheuheit soviel wie gar nichts zeigt, ist ganz das Gegenteil vom Weibchen, speziell dann, wenn sich im Käfig ein Nistkasten befindet. Von Glück kann ich reden, wenn ich ins Zimmer trete und das Weibchen verschwindet nicht im Nistkasten, dem Männchen dagegen darf ich mit der Hand fast knapp vor den Schnabel langen, ganz frei Stangen befestigen oder sonst etwas im Käfig verrichten, selbes rührt sich nicht von seinem Platz. Die Nacht bringen regelmäßig alle beide im Nistkasten zu, und will dazu bemerken, daß sich das Weibchen bedeutend früher zur Ruhe begibt als das Männchen. Selbes wartet in der Dunkelheit so lange, daß ich schon öfters befürchtete, es wird nicht mehr hineinfinden, was aber noch nie der Fall war. Bleibt tagsüber das Weibchen zu lange im Nistkasten, so fordert das Männchen seine Ehehälfte durch eifriges Locken heraus, welches sie als Untergebene auch immer gleich befolgt. Das Paar bietet in der Tat ein Bild schönen Familienlebens. Dicht gedrängt sitzen sie nebeneinander, liebkosen sich gegenseitig und leben schon für gewöhnlich unendlich innig beisammen. Hier herrscht volle Harmonie zwischen dem beiderseitigen Wollen und Tun: Frißt der eine, so tut es auch der andere, badet sich dieser, so begleitet ihn jener, schreit das Männchen, so stimmt auch das Weibchen sogleich ein. Trotz dieser Anhänglichkeit kommt es vor, daß sie sich nicht selten erzürnen und dann gegenseitig ganz gehörig mit dem Schnabel aufeinander loshauen. Trotz all dieser großen Zärtlichkeit vereitelte das Weibchen bisher doch energisch jede weitere Annäherung vom Männchen.

So vergingen Monate, und ich konnte trotz meiner Ungeduld von einer Begattung nichts bemerken, obwohl schon des öfteren das Männchen sein Weibchen auffallenderweise viel aus dem Kropfe fütterte. Nun sollte es aber am Neujahrstage 1909 doch anders werden. Die Tarantiner überraschten mich mit ihrer

ersten Begattung. Sollte mir dies wirklich als Neujahrsgeschenk zugedacht gewesen sein, so wäre für mich als Liebhaber seltener Papageien von seiten dieser kleinen Afrikaner das Richtige getroffen worden. Nun wiederholte sich durch Wochen tagtäglich die Begattung, es kam aber nie zum Eierlegen. Da zur selben Zeit ihr Standort beim Fenster war, und der Käfig täglich beim Reinigen einer Bewegung ausgesetzt war, mußte ich für sie einen stabilen Platz ausfindig machen, welches, nebenbei bemerkt, bei mir keine leichte Arbeit ist, da bereits jeder halbwegs leere Platz mit einem Käfig ausgefüllt ist. Zusammensperren mit einem anderen Paar konnte ich sie nicht, da dem Weibchen, diesem enormen Raufbold, kein Papagei zu stark war. Mit einem jeden begann sie einen heftigen Federkrieg, aus dem das Tarantiner-Weibchen natürlich immer als Siegerin hervorging. Nun blieb mir nichts übrig, als auf einem Kasten beim Fenster Platz zu machen, um sie nun sich selbst zu überlassen.

So vergingen wiederum Monate, bis ich im Nistkasten am 20. Febr. 1910 endlich ein Ei erblicken konnte. Meine Freude war natürlich sehr groß, und die Vögel wurden durch mein Nachsehen nicht mehr belästigt, um sie ja nicht bei der Brut zu stören. Nachdem ich nun nach 6 Wochen noch immer kein Piepsen der Jungen vernehmen konnte, hatte meine Neugierde doch ihren Höhepunkt erreicht, und ich entschloß mich, Nachschau zu halten. Es waren drei Eier vorhanden, die meines Dafürhaltens nicht befruchtet sein konnten, da sonst schon längst die Jungen hätten ausschlüpfen müssen. Ich öffnete alle drei Eier und konnte nur konstatieren, daß alle unbefruchtet waren. So war auch diesmal meine Enttäuschung groß, und ich mußte mich wiederum für später vertrösten, was ich schließlich jetzt schon gewöhnt war.

Es dauerte auch nicht lange, so folgte auch schon wiederum eine Begattung, und am 11. April war auch das erste Ei im Nistkasten zu sehen, das Gelege wurde mit drei Stück beendet. Es vergingen abermals Wochen, und ich konnte noch immer nicht hören, daß Junge vorhanden waren, bis ich am 8. Mai Nachschau halten wollte und beim näheren Horchen ein ganz leises Piepsen hörte. Dies veranlaßte mich, von meiner Neugierde abzusehen, und verlegte selbe für den 18. Juni, wo ich zwei noch vollständig nackte Junge bemerken konnte. Ein Nachsehen im Nistkasten war meistens ohne Erfolg, da das Weibchen nicht wegzubringen war. Das Schlüpfloch konnte ich noch so gut zuhalten, jedesmal ist es ihr noch gelungen, sich durchzuarbeiten, um die Eier, und später die Jungen, zu schützen.

Nachdem nun die Jungen vorhanden waren, hieß es für ein kräftiges Aufzuchtfutter Sorge zu tragen. Sofort wurde ein Ei hartgekocht und mit einem Eibiskuit, das ich immer für meine Fkedermaus-papageien und Loris in Vorrat habe, gerieben und mit abgebrühten Ameiseneiern vermischt. Dieses Gemisch war von Anfang an gleich ihr Lieblingsfutter, und ich hätte davon nicht genug geben können. Trotzdem ein großer Futternapf mit diesem Futter voll angefüllt wurde, war in einer halben Stunde nichts mehr davon zu sehen, so daß sie dann den ganzen Tag mit Körnerfutter vorliebnehmen mußten. Frische Ameiseneier, die sie schon früher sehr gerne zu sich nahmen, leisteten ihnen jetzt für die Jungen großen Dienst, da sie nicht erst wie das Körnerfutter im Kropf aufgequellt werden mußten. Das Körnerfutter bestand aus Sonnenblumen, Rollhafer, Glanz, Hirse und ab und zu etwas Hanf sowie ein Stück Apfel oder Birne. Vom Obst wurde zur Zeit der Jungen wenig gereicht, da ich davon Durchfall befürchtete. Ein Leckerbissen für sie waren Wacholderbeeren, von denen sie nicht genug bekommen konnten.

Wie lange die Eier bebrütet wurden, ist mir leider nicht möglich anzugeben, da ich, wie bereits schon erwähnt, nicht stören wollte. Dagegen kann ich berichten, daß es gerade sechs Wochen dauerte, bis ein junger Tarantiner aus dem Nistkasten guckte, und nach weiteren drei Tagen denselben zum ersten Male ganz verlassen konnte, worauf ihm nach 2 Tagen auch der zweite folgte. Diese Miniatur-Kinderstube zu beschreiben, ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Ihre Bewegung besteht überhaupt nur im Klettern, vom Springen gar keine Rede, und probiert es trotzdem einer, so plumpst er herunter. Ihre Hauptbeschäftigung war, die Alten um Futter zu betteln, wo auch dann das Männchen fleißig mitfütterte.

Was die Färbung der Jungen betrifft, so sind selbe im Jugendkleid wie das alte Weibchen, nur blasser. Unter ihnen dürfte auch ein Männchen sein, da ich heute, am 29. August 1910, beim Nachsehen bemerken konnte, daß einer oberhalb des Schnabels schon einen kleinen roten Fleck hat. Regelmäßig übernachten die Jungen mit den Alten im Nistkasten. Der Käfig, in dem ich die Tarantiner züchtete, hatte eine Größe von 76×35×60 und der Nistkasten von 20×14.

Die hier beschriebenen jungen Tarantiner wurden infolge immerwährender Befehdung von seiten des alten Männchens am 29. Sept. von den Alten getrennt. Nach 10 Tagen begatteten sich letztere bereits wieder, und ich konnte am 8. Dez. beim Nachsehen wieder zwei Eier verzeichnen. Trotzdem beide Eier vollkommene Junge enthielten, wurde aus dieser Brut nichts.

Im darauffolgenden Jahr — im voraus gleich erwähnt das Unglücksjahr für meine Tarantinischen Zwergpapageien — wurden wieder fünf Eier gelegt, aus denen im März drei Junge entschlüpften. Der ganze Vorgang bei dieser Brut war gleich der ersten. Auch diesmal war es mir nicht möglich zu konstatieren, wie lange das Weibchen brütete. Warum für mich das Jahr 1911 ein Unglücksjahr war, will ich nur kurz hier erwähnen. Am 25. März d. J. gab ich von den selbstgezüchteten Tarantinern einen Jungen ab, worauf nach 17 Tagen der zweite einging. Nicht genug mit diesem Verlust, starb am Ostersonntag das alte Männchen. Nun war das alte Weibchen verwitwet und förmlich trostlos um die Ehehälfte. Sie rührte sich die ersten zwei Tage gar nicht aus dem Nistkasten, kam auch nicht zum Futter, bis es am dritten Tag, wahrscheinlich vom Hunger schon zu sehr gequält, den Kasten verließ. Mühsam schleppte es sich jetzt zum

Futternapf, nahm spärlich Futter zu sich und hockte sich wieder in die Nähe des Nistkastens hin. Am 20. April war es schon ganz erschöpft und starb auch noch denselben Tag. Jetzt blieben von der ganzen Familie nur noch die vier Wochen alten unbeholfenen Jungen über. Was möglich war, wurde nun getan. Selbe wurden gestopft mit Eibiskuit, Ei und Milch. Bei der Fütterung sperrten sie gut, so daß jedesmal der Kropf immer gut angefüllt werden konnte. Trotz alledem gingen nach zwei Tagen alle drei ein. Wahrscheinlich fehlte die Mutterwärme. Höchst rührend war es zuzusehen, die drei alten Tarantiner sterben zu sehen. Meiner Ansicht waren selbe nur durch Gemütserkrankung eingegangen, und könnte sich, nebenbei bemerkt, so mancher Mensch von diesen kleinen Vögeln ein Beispiel nehmen von der gegenseitigen Anhänglichkeit. Nicht umsonst gehören sie zur Gattung „Unzertrennliche".

Gelbscheitelweber.

Neueinführungen und Seltenheiten.

Von Karl Neunzig.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Eine bisher lebend nur einmal eingeführte Weberart

der Gelbscheitelweber — Hyphantornis spilonotus *Vig.*

kam in mehreren Stücken mit einem der südafrikanischen Importe Aug. Fockelmanns, Hamburg-Großborstel. Die im Jahre 1874 eingeführten Gelbscheitelweber gelangten in den Besitz des Herrn Friedrich Schneider, eines damals bekannten Pflegers von Ausländern, besonders von Webervögeln. Sie werden als auffallend scheu und still geschildert, betätigten sich auch nicht am Bau ihrer Nester. Da ein Teil der neuerdings eingeführten in den Besitz des Herrn Krabbe gelangte, sind genauere Mitteilungen über diese Vögel zu erwarten.

Aus den Berichten über das Freileben ist zu entnehmen, daß sie kolonienweise besonders auf Akazienbäumen nisten, die Nester hängen an den äußersten Zweigen in bedeutender Höhe. Kolonien von 50 bis 60 Nestern auf einem Baum sind keine Seltenheit. Die Nester haben die nierenförmige Gestalt wie die der verwandten Arten, aber keine Einschlupfröhre. Sie sind aus Streifen von Palmen- und Bananenblättern sowie aus Gras gebaut. Die Eier haben sehr verschiedene Färbung. Man kennt grünliche, bläuliche, weiße und auf weißem Grunde braun gefleckte Eier, deren Größe 14—15 × 19—23 mm beträgt. Die Verbreitung dieses Webers erstreckt sich über Südostafrika.

Gefiederbeschreibung: ♂ Oberkopf bis zum Genick, Halsseiten, Unterseitegelb; Kopfseiten, Kehle, Kropfmitte schwarz; übriger Oberkörper schwarz mit gelben Spitzen; Oberschwanzdecken gelb bis olivgelb; kleine Flügeldecken wie oberseits, große und Schwingen schwarzbraun mit blaßgelben, grünlichen oder weißlichen Säumen; Unterflügeldecken blaßgelb; Schwanzfedern olivbraun gelbgrün verwaschen, außen gelbgrün gesäumt; Auge rot; Schnabel schwarz; Füße rötlichbraun; Lg. 150—175, Fl. 85—95; Schw. 60—70; Schn. 21—23, Lf. 24—25 mm. ♀ Kopf, Nacken olivgelb dunkel gestrichelt; Kopfseiten hellgelb, oliv verwaschen; Augenbrauenstreif blaßgelb; Oberkörper graubraun, an Rücken und Schultern dunkel gestrichelt. Unterseite hellgelb, nach hinten weiß, Seiten braun verwaschen.

Wunderbare Vertreter tropischer Farbenpracht sind die Glanzstare, welche in den Kreisen der Vogelpfleger viel mehr Beachtung finden sollten, als es bisher der Fall war. Sie sind harte Vögel, die an Haltung und Pflege kaum höhere Ansprüche stellen als unser Star. Von ihrer Schönheit sind die meisten Forscher, welche sie im Freien sahen, begeistert, nicht minder die Italiener in Erythrea, welche die Glanzstare massenhaft abschießen, um sich in den Besitz dieser Schönheit zu setzen. Nach Heuglin sind die Glanzstare von ihrer Schönheit selbst begeistert, und des wunderbaren Anblicks, den sie dem Beschauer bieten, sind sie sich wohl bewußt!! „Wie alle Gattungsverwandten", so sagt Heuglin, „scheint dieser Vogel seine Farbenpracht zu kennen und prahlt damit recht artig im Sonnenlicht." Er spricht von dem neuerdings das erstemal eingeführten

Prachtglanzstar — Spreo superbus *(Rüpp.)*.

Viele Glanzstare sind Bewohner des kultivierten

Landes und schließen sich eng an den Menschen an. Von einer abessinischen Art — Lamprocolius cyaniventris *Blyth*, die häufiger und auch jetzt wieder im Handel ist, sagt Graf Zedlitz (J. f. O. 1911): „Dieser Star ist ein ausgesprochener Kultur- und Menschenfreund. Nirgends sah ich ihn so zahlreich wie in den Gärten und Höfen von Cheren." Ähnlich verhält es sich mit dem Prachtglanzstar. Meist ist er in der Nähe der Ansiedlungen zu treffen. So fand ihn Dr. Berger im Massaigebiet, am oberen Nil, v. Decken beobachtete in Somaliland zahlreiche Flüge, welche wie die Schwärme der indischen Mainastare den Viehherden folgten, was ihm bei den Somalis den Namen „Shimberload", d. h. „Kuhvogel", eintrug. Auf Äckern und Viehtriften in Schwärmen tagsüber sich umhertreibend, beobachtete Böhm unsern Glanzstar, der zum Rasten niederes Gebüsch, aber auch hohe Bäume, besonders Adansonien, aufsucht. Am ausführlichsten berichtet über ihn Heuglin: „Der Prachtglanzstar lebt in Gesellschaft auf Viehtriften und in der Waldregion und scheint Standvogel zu sein; ich beobachtete ihn nur während der trockenen Jahreszeit, bis zum April, und immer nur in kleinen Flügen sowohl im Gebüsch und auf Hochbäumen, sowie auf der Erde. ... Im Fluge ist er von seinem Verwandten, dem rostbäuchigen Glanzstar, sehr leicht zu unterscheiden, die weißen Unterflügeldecken und dunklen Innenfahnen der Schwingen kennzeichnen ihn schon auf größere Entfernungen." Aber nicht nur die weiße Befiederung der Unterflügel ist für den fliegenden Prachtglanzstar kennzeichnend, sondern auch seine im Fluge besonders gedrungen erscheinende Gestalt. Die Nahrung der Glanzstare ist die der Stare überhaupt, Insekten, Würmer, Schnecken und Früchte, die sie auch zeitweise wenigstens verzehren. Die Hauptnahrung des Prachtglanzstares bilden naturgemäß Insekten, die durch das Weidevieh angelockt werden. Ihr Wesen ist unruhig und lebhaft, sie durchstreifen in Flügen weite Gebiete, lassen sich auf Bäumen nieder und zerstreuen sich dann, auf dem Boden nach Starenart laufend und dem Insektenfange nachgehend, um sich bald wieder auf einem Baume zu sammeln und das Spiel von neuem zu beginnen. Dabei lärmen und schreien sie laut durcheinander. Nur während der heißen Strahlen der Mittagssonne halten sie sich still im dichten Laube der Bäume verborgen, die sie auch des Abends zur Nachtruhe aufsuchen. Die Männchen lassen dann ihr starartiges Geschwätz von den obersten Zweigen der Bäume herab ertönen, mit dem sie auch den Morgen begrüßen.

Über das Nistgeschäft teilt Philips mit, daß er im Somalilande den Prachtglanzstar im März und April in kleinen Kolonien nistend angetroffen habe. Die Nester waren auf den äußersten Zweigen hoher Mimosen erbaut und waren wie die des weißen Viehwebers — Dinemellia dinemelli von oben her durch Dornen geschützt und hatten den Eingang von unten her. Vermutlich benutzen die Prachtglanzstare die Nester dieser Weber (s. Abb. S. 79). Eine Bemerkung Dr. Bergers im J. f. O. 1911: „Auch wir konnten im Massailande und später am Nil die ausgesprochene Symbiose mit D. dinemelli beobachten", scheint diese Annahme zu bestätigen. Der Prachtglanzstar ist über Ostafrika von Abessinien bis zum Nyassasee verbreitet. Bei ihm, dem „herrlichen", wird der wunderbare Metallglanz des Gefieders, das bald rötlich kupferfarben, bald stahlblau, bald entengrün schimmert, je nach dem Lichteinfall, noch gesteigert durch die Farbengegensätze des Gefieders, durch das Sammetschwarz des Kopfes, das Rotbraun des Bauches, das reine Weiß der Unterschwanzdecken und der Brustbinde.

Gefiederbeschreibung: ♂♀ Kopf schwarz; übrige Oberseite stahlblau grünlich glänzend, ebenso Vorderhals; Unterkörper rotbraun; schmale Brustbinde, Unterschwanz, Unterflügeldecken weiß; Flügelfedern stahlgrün, die Deckfedern mit sammetschwarzem Endfleck; Schwanzfedern stahlblauglänzend; Auge blaßgelb; Schnabel schwarz; Füße bleigrau bis schwärzlich. Lg. 180—200, Fl. 115—125, Schw. 68—75, Schn. 18—20, Lf. 31—35 mm. (Fortsetzung folgt.)

Die gefiederten Bewohner meines Gartens 1920.

Von D. Rothenberg.

(Nachdruck verboten.)

Zunächst eine kleine Beschreibung des Gartens. Er ist ungefähr 10 Ar groß. Ringsum ist er mit Tannen, Büschen und Bäumen, 2—4 m in der Breite, bepflanzt. Außerdem befindet sich in der Mitte eine Anpflanzung von Himbeersträuchern. Einige Obstbäume sind hier und da angepflanzt. Den Vogelreichtum verdankt er wohl in erster Linie der Umgebung. Rechts befindet sich ein großer Privatpark und auf der anderen Seite der Seminarpark. Dann kommt wohl auch der Schutz ein wenig in Betracht, den die Vögel genießen. So sind mehrere Veigeliabüsche zu einer Hecke verschnitten, und das Laub bleibt zum größten Teil unter den Bäumen und Büschen liegen. In einer Ecke ist ein großer Reisighaufen aufgeschichtet. An fünf Bäumen sind Nistkasten für Meisen befestigt. Es haben als sicher zehn Vogelarten gebrütet, die ich mehr oder weniger beim Brutgeschäft und bei der Aufziehung der Jungen beobachtet habe. Von diesen zehn Arten haben mehrere Paare gebrütet. Es waren folgende Arten: Bluthänfling, Zaungrasmücke, Feldsperling, Grünfink, Stieglitz, Buchfink, Girlitz, Wendehals, Singdrossel und Nachtigall. Obenan steht der Bluthänfling. Von seiner Art haben fünf Paare gebrütet. Eine Brut kam um. Die 2. Brut machten drei Paare. Ob es dieselben waren, die das erstemal hier gebrütet hatten, oder nicht, kann ich nicht sagen. Ein einziges Paar begann Ende Juli mit der 3. Brut, die Mitte August flügge wurde. Die Eier wurden immer in den Morgenstunden bis 8 Uhr gelegt, und zwar jeden Tag nur ein Ei. Bei dem Nestbau war nur das Weibchen beschäftigt. Das Männchen begleitete es mit zärtlichen Lockrufen. Bei drei Paaren brachte das ♂ Niststoffe. Zwei Paare konnte ich eingehender beim Nestbau beobachten. Am 14. Juni nachmittags gegen 5 Uhr begann das eine Paar mit dem Nestbau. Zunächst brachten beide Gatten gröbere Baustoffe, wie Würzelchen und Reiserchen. Das Weibchen legte sie als Unterlage in einen Astquirl. Niedlich sah es aus, wenn es dem Männchen die Niststoffe abnahm. Beide lockten dabei leise „pipip". Dann am nächsten Morgen wurde eifrig weiter gebaut. Gegen 3 Uhr nachmittags war das Nest bis auf die Ausfütterung des Napfes vollendet. Nun

flogen beide fort und kamen erst nach einer Viertelstunde mit Roßhaaren und einem roten Wollfaden wieder. Aber viel bauten sie an diesem Tage nicht mehr. Erst am nächsten Tage war das Nest fertig. Während zweier Tage geschah nichts. Erst am Morgen des 19. lag das erste Ei im Nest. Jeden Tag wurde nun ein Ei gelegt, so daß am 22. vier Eier im Neste lagen. Am selben Tage begann auch das Weibchen mit Brüten. Mittags verließ es das Nest auf kurze Zeit. Sonst wurde es vom Männchen gefüttert. Dieses hielt sich viel in der Nähe des Nestes und unterhielt seine Gattin durch fleißiges Singen. Am 4. Juli schlüpften die Jungen aus den Eiern. Beide Gatten brachten nun ihren Kleinen eifrig Nahrung. Am 16. flogen drei Junge und am 17. das vierte aus. — Bei dem zweiten Paar verlief der Nestbau fast genau so. Dieses Mal brachte das Weibchen allein die Niststoffe. Das Männchen flog mit seiner Gattin mit und sang, während diese das Nest baute. Einigemal konnte ich beobachten, wie das Männchen sein Weibchen trat, nachdem dieses die Niststoffe verarbeitet hatte. — Das ♀ flocht die Hälmchen zunächst vom Rande aus ein, setzte sich dann in das Nest und drehte und wendete sich und bildete so die Form des Napfes. Nun noch etwas Zusammenfassendes über die Hänflingsbruten. Die Nester werden in 2—4 Tagen fertiggestellt. Bei schlechtem Wetter verzögert sich der Nestbau. Über die Neststoffe ist schon berichtet. Bei der ersten Brut beträgt die Zahl der Eier 4—6 Stück. Die Farbe ist weiß, und hellrosa bis dunkelbraunrote Punkte und Schnörkel befinden sich mehr oder weniger auf dem Ei. Bei der zweiten Brut finden wir 4—5, manchmal auch sechs Eier. Die Brutzeit beträgt 12 Tage, und in 12—14, einmal sogar in 15 Tagen werden die Jungen flügge. Dann werden die Jungen noch eine Zeitlang, bis 14 Tage, von den Eltern gefüttert und geführt. Haben die Jungen das Nest einmal verlassen, so kehren sie nie wieder dahin zurück.

Weißkopfviehweber.

Man findet die Nester von Ende April bis Ende Juli. Das höchste Nest befand sich 2 m, das tiefste 1,20 m über dem Erdboden. Im ganzen sind 36 junge Hänflinge in meinem Garten ausgeflogen. Das ist schon eine schöne Zahl. — An zweiter Stelle steht die Zaungrasmücke. Zwei Paar haben gebrütet und Junge großgezogen, und ein Paar baute wohl ein Nest, verließ es aber wieder. Das Nest des einen Paares fand ich am 5. Mai in einem wilden Rosenstrauch. Es war klein und sehr locker gebaut. Es bestand aus dünnen, feinen Würzelchen und war innen mit einigen Roßhaaren ausgelegt. Im Nest lag ein weißes, graugrün getupftes Ei. Am folgenden Tage lag das zweite und am 7. das dritte und letzte Ei darin. Nach 14 Tagen, am 21. Mai, waren drei nackte Vögelchen aus den Eiern geschlüpft. Man konnte sich dem Nest nähern, ohne daß die Alten aufgeregt wurden. Das Weibchen saß so fest auf den Eiern, daß man es fast greifen konnte. Nach 13 Tagen waren alle drei flügge. Ganz anders verhielt sich das andere Paar. Es ließ mich nicht in die Nähe des Nestes kommen, ohne daß sie mich mit lautem teck, teck empfingen. In dem Neste befanden sich drei junge Zaungrasmücken. — Über das Stieglitzpaar kann ich nicht viel berichten. Als eines Tages ein ziemlich starker Wind herrschte, hörte ich ein ängstliches didelit-Rufen. Dieses Geschrei rührte von fünf fast flüggen Stieglitzen her, die sich in einem Neste befanden, das 2,50 m hoch an den äußersten Zweigen eines Holunderbusches befestigt war. — Ebenso ging es mir mit dem Buchfinkennest. Ich entdeckte es erst, als die fünf Jungen fast flügge waren. Es war außen aus Moos, Hälmchen und weißgrauen, kleinen Filzstückchen gearbeitet. Innen bestand es aus feinen Hälmchen, einigen Federn und Tierhaaren. Es war 2 m über dem Erdboden auf einem wagerechten Ast befestigt. Zwei Tage nach der Entdeckung, am 5. Juni, flogen die Jungen aus.

(Schluß folgt.)

Sprechsaal.

(Steht den Abonnenten kostenlos zur Verfügung.)

Vorsicht beim Auslegen von Fallen. Im Garten meines Freundes, von welchem mir ein Teil zum Bepflanzen abgetreten ist, hatten wir zur Bekämpfung der Mäuse, die in den Erdbeeren einen beträchtlichen Schaden anrichteten, mehrere Schlagfallen aufgestellt. Eines Tages fanden wir wieder alle Fallen programmäßig von Mäusen besetzt, nur eine war verschwunden. Als wir dieselbe nach gründlichem Absuchen der Umgebung nicht fanden, ahnte mir gleich nichts Gutes. Beim Ausmachen der Kartoffeln fanden wir nun eine verweste Amsel mit der Falle an einem Bein. So hatte sich meine Befürchtung bestätigt. Moral: 1. Ist man genötigt, Fallen für Mäuse, Raubzeug oder sonstige Schädlinge auszulegen, verdecke man dieselben nach Möglichkeit so, daß ein anderes als das zum Fang bestimmte Tier nicht hineingeraten kann. 2. Befestige die Falle an einer Schnur oder Kette, damit das gefangene Tier, sofern es nicht sofort getötet ist, nicht mit der Falle entfliehen kann und elend zugrunde geht. 3. Kontrolliere die Fallen täglich mehrmals. Ist das wegen zu großer Entfernung nicht möglich, so doch wenigstens einmal am Tage. Ist es auch nur eine Maus, so vergiß nicht, daß derselben ein zerschmetterter Knochen oder gequetschtes Glied genau dieselben Schmerzen bereitet wie jedem anderen Tier oder dir selbst. Hätten wir den Grundsatz 2 befolgt, so hätte man das arme Tier vielleicht befreien, im schlimmsten Falle ihm aber durch schnelles Töten das qualvolle Ende ersparen können. Ich halte diese Beichte meiner Unterlassungssünden für meine Pflicht, um aus diesem traurigen Vorkommnis wenigstens das eine Gute zu ziehen — nämlich die gute Lehre für mich und andere, damit ähnliche Fälle vermieden werden. Ich hoffe, damit einen Teil meiner Schuld wieder gutzumachen. Im Anschluß hieran möchte ich nicht versäumen, für die als Obstschädling so verrufene Amsel ein Wort einzulegen. Ich selbst als Garteninhaber habe diese Untugend, wenn man es als solche bezeichnen darf, noch nie an unserer Amsel feststellen können, trotzdem dieselbe hier in Massen vorkommt. Um so schmerzlicher berührt es mich, wenn ich oft sehen muß, mit welch geradezu fanatischem Haß man die Amsel als Beerendieb verfolgt. Ich glaube vielmehr, daß dieselbe oft für den Schaden, den die Mäuse anrichten, verantwortlich gemacht wird. Was letztere für einen enormen Schaden machen können, habe ich in diesem Jahre wieder zu beobachten Gelegenheit gehabt. Ganze Hände voll zum Teil noch grüner Erdbeeren hatten sie unter einen Reisighaufen und in ihre Löcher geschleppt. Ebenso lagen unter den Stauden ganze Haufen von Beeren, die teilweise angefressen waren. Würden sie sich nur sattfressen und die übrigen Früchte hängen lassen, dann würde ich es ihnen nicht einmal verargen, aber der Unfug überstieg doch meine Tierliebe. Sieht ein Gartenbesitzer nun mal zufällig eine Amsel in den Erdbeeren, so muß diese den Schaden angerichtet haben, nur weil sie größer ist als eine Maus und der oberflächliche Beobachter sie darum sieht, während die Mäuse ihr Unwesen im Verborgenen treiben. Ich will dagegen nicht bestreiten, daß die Amsel hier und da mal eine Beere verspeist, aber, verehrte Leser, wer könnte ihr das verdenken? Ich würde es ihr direkt übelnehmen, wenn sie eine solche Gottesgabe nicht würdigte. Es mag nun in vereinzelten Fällen ein Individuum eine besondere Vorliebe für die eine oder die andere Obstart besitzen und dann einigen Schaden verursachen. In diesem Einzelfalle mag man denn, wenn der verursachte Schaden wirklich so erheblich ist, das betreffende Stück abschießen. Nicht aber die ganze Vogelart in Acht und Bann tun. Letzteres ist zwar sehr bequem, zeugt aber von wenig Sinn und Verständnis für die Natur. Wollte man mit dem Menschengeschlecht ebenso verfahren und jedem, der die Hand nach verbotenen Früchten ausstreckt, das Lebenslicht ausblasen, was in heutiger Zeit oft recht angebracht wäre, dann wären die „Herren der Schöpfung" recht spärlich vertreten, auf unserer Mutter Erde wäre es aber entschieden schöner. Darum, verehrte Gartenbesitzer, sehet nicht den Splitter in eures Mitgeschöpfes Auge. Lebt und lasset leben!

Fredenhagen.

Vom Vogelmarkt.

Von seltener auf den Vogelmarkt kommenden Vögeln werden angeboten:

A. Schwarz, Tierhandlung, Weißenfels a. S., Klingenplatz 8: Edelsänger, pfeifender und sprechender Nymphensittich, rote Kardinäle.

P. Tzornack, Berlin NO 55, Prenzlauer Allee 189: Junge Blaustirnamazonen, Grassittiche, Goldstirnsittiche.



Herrn L. N., Görlitz: Im allgemeinen wird die Benutzung messingener Vogelkäfige verworfen. Es besteht die Gefahr, daß sich am Messing Grünspan ansetzt, und Grünspanteile, welche in die Verdauungsorgane der Vögel gelangen, würden diese töten, ganz gleich ob es sich um Kanarienvögel, Papageien oder um sog. „Waldvögel" handelt. Die Käfigfabrikanten stehen allerdings auf einem anderen Standpunkt. Sie sagen, durch „Vernieren" des Messings, Überzug des Metalles durch einen besonderen Lack, wäre die Vergiftungsgefahr beseitigt, weil verniertes Messing keinen Grünspan aufkommen lasse. Ob dieser Überzug aber dauernd die Bildung von Grünspan verhindert, erscheint doch fraglich.

Herrn A. F., Hamburg: Der eine Vogel ist die Kajenneralle (Ortygometra cajennensis (*L.*), der andere der geperlte Schmuckbartvogel (Trachyphonus margaritatus (*Cretzschm*).

Frau P., Kolmar: Außer dem gereichten Futter muß die Amazone noch Mais, trocken oder in Wasser erweicht, erhalten. Die Mehlspeisen bleiben besser fort, ebenso Obst, solange der Durchfall andauert. Es wird sich dann auch Trinkbedürfnis einstellen. Als Getränk wird dann zweimal täglich (morgens und abends) erwärmter Haferschleim gereicht. Der Durchfall wird dann aufhören. — Die Erdnuß (Arachis) ist eine Leguminose. Die Früchte sind länglichrund. Die Schale ist hart, netzartig und enthält zwei bis drei ungleichförmige Samen, die von vielen Vögeln gern gefressen werden. Den Vogelhändlern ist diese Frucht bekannt.

Herrn E. Sp., Oldenburg: Beiträge dankend erhalten.

Herrn A. E., Berlin-Friedenau. Um Vogeleier aufzubewahren, werden sie, falls es nötig ist, zuerst vorsichtig mit Watte und lauem Wasser gereinigt. Dann werden sie an der Breitseite, nicht an einem der Pole, mit einem passenden Eierbohrer, der in Naturalienhandlungen aus Stahl gefertigt erhältlich ist, einmal angebohrt und unter Benutzung dünner gebogener Röhrchen, gleichfalls in Naturalienhandlungen erhältlich, ausgeblasen. Wenn das Ei gut gereinigt und trocken geworden, versieht man es mit einer Nummer, die sämtliche Eier desselben Geleges tragen. Die Eier werden in kleinen dünn mit Watte ausgelegten Pappkästchen, welche in einem gut verschlossenen Kasten stehen, gut etikettiert aufbewahrt.

Herrn E. R., Bernstadt i. Sa. Schamadrosseln sind Insektenfresser und rühren gequollene Sämereien nicht an. — Das Quellen der Sämereien geschieht in folgender Weise: Die Samen werden abends in ein Gefäß geschüttet und mit kaltem Wasser übergossen, so daß die Samen davon ganz bedeckt sind. Am folgenden Morgen wird die zu verabreichende Menge zwischen Leinentüchern lufttrocken gerieben und den Vögeln verabreicht. Da gequollene Samen, besonders in der wärmeren Jahreszeit, leicht verderben, wird immer nur soviel gegeben, wie die Vögel in nicht zu langer Zeit verzehren. Wie groß die Menge sein muß, muß der Pfleger erfahrungsgemäß feststellen. Die nicht sofort zu verabreichende Menge wird an einem kühlen Ort aufbewahrt. Es empfiehlt sich, nur soviel Samen zu quellen, wie an einem Tag verfüttert wird. Der Versuch könnte mit Reis-, Band-, Tigerfinken, Amaranten, Silberschnäbelchen, Elsterchen, Rotkopfamandinen, Zebrafinken gemacht werden.

(Fortsetzung auf der 3. Umschlagseite.)

Aus den Vereinen.

Aufgenommen sind Mitgl. Nr. 386 Willy Eisenmenger, Brandenburg a. H., Neuendorfer Str. 47; Mitgl. Nr. 387 Dr. H. W. Frickinger, München, Habsburgerplatz 2I; Mitgl. Nr. 388 Ludwig Röbbelen, Hildesheim, Teichstr. 11II. — Ich erinnere nochmals an die rechtzeitige Aufgabe von Bekanntmachungen bis zum 10. Mai für das zur Ausgabe gelangende Rundschreiben, welches als Drucksache an die Mitglieder zum Versand gelangt. Etwaige Adressenänderungen bitte ich sofort bekannt zu geben.

A. Krabbe.

Ornithologischer Verein Augsburg. Am 9. April 1924 geleiteten wir unseren hochgeehrten Ehrenvorsitzenden und Gründer des Vereins Herrn Benedikt Tischer, Privatier in Augsburg, zur letzten Ruhe. Als großer Freund unserer Vogelwelt gründete Herr Tischer vor 35 Jahren am 3. April 1889 mit gleichgesinnten Männern den Ornithologischen Verein Augsburg. Durch seine freundlich vornehme Gesinnung und dank seines reichen Organisationstalents brachte er den Verein rasch in die Höhe, so daß derselbe schon im Jahre 1891 mit einer großen Vogelausstellung vor die Öffentlichkeit treten konnte. Im gleichen Jahre nahm Herr Tischer als Vertreter des Vereins an dem 2. Internationalen Ornithologen-Kongreß in Budapest teil, woselbst er besonders die Interessen des Vogelschutzes mit großer Wärme und Sachlichkeit vertrat. Sein Haupt- und Lieblingswerk war die Organisation eines praktischen Vogelschutzes in hiesiger Stadt, welches er mit einer unter seiner Leitung im Jahre 1912 stattgehabten Vogelschutz-Ausstellung krönte, die, wohl einzig in ihrer Art, Bewunderung und Anerkennung fand. Wegen seines vorgerückten Alters legte Herr Tischer nach 25jähriger, von großen Erfolgen begleiteter Tätigkeit als 1. Vorsitzender die Vereinsleitung in bewährte jüngere Hände, und der Dank des Vereins war seine Ernennung zum Ehrenvorsitzenden. Mit allen Fasern seines Herzens lebte und strebte er nach wie vor für seinen geliebten Ornithologischen Verein. Noch kurz vor seinem Ableben gab der 73jährige sich der freudigen Hoffnung hin, einen der kommenden Beobachtungsausflüge führen zu können, aber das Schicksal hat es anders gewollt. Nach kaum achttägigem Krankenlager hat ihn der unerbittliche Tod heimgeholt. Nicht bloß unser Verein und unsere ideale Sache, sondern jeder, der ihm näher gestanden, hat einen schweren unersetzlichen Verlust erlitten. Herr Tischer war nicht nur ein warmherziger Vogelfreund, sondern auch ein edler Menschenfreund im wahrsten Sinne des Wortes. Ein echter kerndeutscher Mann, von heißer Vaterlandsliebe durchglüht, der nach dem Grundsatze lebte: „Sei ein Mann und sei stark!" Der Verein wird ihm ein stetes ehrendes Andenken bewahren und sein Werk, das er geschaffen, in seinem Sinne weiterführen und noch weiter ausbauen.

Karl Zertahelly, Schriftführer.

Vereinigung hannoverscher Vogelliebhaber. 40. Mitgliederversammlung am 4. April 1924. Nach reger Aussprache über Vogelbeschaffung, den Verkauf von verschiedenen Sorten billigen Futters und unter Hinweis auf unsere Naturfilmvorführungen am 14. und 15. April, für die Karten verkauft werden, hält unser Mitglied Klocke einen außerordentlich fesselnden Vortrag über „Das Seelenleben der Tiere". Er hat in seinem Leben in der Heimat und im Auslande Tiere aller Arten gehalten und beobachtet. Es ist notwendig, sich grundsätzlich davon freizumachen, die Tiere nach unserem Gefühl und unseren Empfindungen zu beurteilen oder ihnen solche gar unterzulegen. Man muß sie vielmehr als völlig andersgeartete Wesen betrachten, bei denen die meisten Handlungen nur durch Reflexe hervorgerufen werden. Es gibt bei höherstehenden eine gewisse Klugheit und auch ein Seelenleben, das aber mit unserem nicht zu vergleichen ist. Unterschiebe man den Tieren also nicht etwa Grausamkeit, Kindesliebe und dergleichen. Im einzelnen erwähnte er den sehr eigenartigen Ameisenlöwen, über den dicke Bücher geschrieben sind, ferner einen Vogelpfleger Braun, der 4000 Vögel in 40 Jahren seines Lebens gehalten und beobachtet hat, und schließlich Herrn v. Lucanus, dem es gelungen ist, Wellensittiche in ganz ungeahnter Weise zum Sprechen zu bringen. Unser Mitglied, Tierarzt Dr. Neuwerth, ist gern bereit, für Mitglieder kostenlos Untersuchungen vorzunehmen. Das ist wesentlich, damit man bei eingegangenen Vögeln die Todesursache kennt und später Fehler verhüten kann. Nötig ist, daß die Vögel sofort eingesandt werden und daß ein kurzer Bericht eingeschickt wird über Krankheitserscheinungen, Futter und die letzten Lebensäußerungen. Appel.



Bücher- und Schriftenschau.

Vogelleben und Vogelschutz (Schilderungen aus der Sing- und sonstigen Kleinvogelwelt). Allen, besonders der Jugend und ihren Erziehern zugeeignet von (O. v. Riesenthal). Dritte gänzlich umgearbeitete, vermehrte, mit 73 Abbildungen versehene Auflage von Eberhard von Riesenthal (Verlag von J. Neumann, Neudamm). 8/141 S.

Seit Jahren war die kleine Schrift Otto v. Riesenthals vom Büchermarkt verschwunden. Der Sohn des Verfassers hielt es für geboten, angesichts der üblen Folgen des Krieges und der Nachkriegszeit, die sich leider auch bei unserer Jugend nur allzusehr bemerkbar machen, die von Herzen kommenden und zu Herzen gehenden Worte des Vaters der Jugend und den Lehrern der Jugend wieder zugänglich zu machen. Veraltetes und durch neuere Beobachtungen Überholtes wurde ausgemerzt. Zusätze waren notwendig, um den heutigen Anforderungen, welche an eine solche Schrift zu stellen sind, zu genügen. Der Kern und der Geist der Schrift sind geblieben. Neu hinzugekommen sind die Abschnitte über den Vogelzug und den praktischen Vogelschutz sowie die Abbildungen.

Anzeigenteil

Die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 20 G.-Pf. berechnet. Aufnahme erfolgt gegen Voreinsendung des Betrages in Reichsgeld per Brief od. auf unseren Zahlstellen: Postscheckkonto: Magdeburg 3148, Wien 156 687, Bern III 4326, Prag: Creditanstalt d. Deutschen unter Angabe des Zweckes.

Futtermittel

Ia Universalfutter:
Nachtigallen . . . Pfund 1,35 M
Grasmücken . . . „ 1,20 „
Drosseln . . . „ 0,90 „
K. Rinke, Stargard i. Pom. [305

Mehlwürmer Pfund 7.50 M. **Jeitner, Breslau,** Weinstr. 12. [306

Vögel

Tausche 1,0 Isabell (rein) 23. geg. **rein gelben Zuchthahn.**
1,0 Münchner Holländer gegen **dito Weibchen.** [307
Karschalley, Lübeck, Lützowstraße 2 I.

P. Burghard, Dresden 29
Pennricher Straße 40.



Fabrikation **praktischer Vogelkäfige.** Speziell
Weichfresserkäfige.
Anfertigung von **Käfigen, Volieren usw.** nach allen Angaben in nur saubersten, solider und fachmännischer Ausführung bei billigster Berechnung. [308
Ia Referenzen. Goldene Medaille.

Sittiche, Araras, Kakadus, Amazonen, Edelpapageien, Zwergpapageien, Kragenpapageien, Loris, kleine Affen für eigene Sammlung zu kaufen gesucht. Angebote mit genauer Beschreibung und Preis an **Fliegner, Lehrte-Hannover.** [309

Gebe ab (evtl. auch Tausch):
1,0 Gelbsteißbülbül
310] (selten, da Ausfuhrverbot),
1,0 kl. Beo
(pfeift, wiehert, spuckt), je 35 Goldmark. Gesunde, tadellose Vögel.
K. Durau, Duisburg, Musfeldstr. 6 a.
Verpackg., Zoll und Porto je 5 M.

Ornis-Haus
Halle-Saale

Gegründet 1912

Spezialität:
Individuelle Weichfresserpflege nach Angaben des Herrn Apotheker Adalbert Jena-Biberach-Riß. (Alleiniges Herstellungsrecht.)

Reform-Normal I, Volierenm.,
Reform-Normal II, f. Rotkehlchen, Schwarzplatten usw.,
Reform-Normal III, f. Nachtigall., Sprosser usw.,
Reform-Normal IV, f. Gelbspött., Goldhähnchen usw.,
Reform-Normal V, f. Schama usw.,
Körnerfutter Ia für jede Vogelart. [311

Inhaber langjähriger Fachmann, siehe „Ornis-Buch" (90 S.) Mk. 1
Preisliste auf Wunsch!

1,0 Rosenpapagei,

2,1 Braunrückengoldsperling e. Z., 0,1 blaufedr. Wellensittich gibt ab
A. Krabbe, Anklam, Demminer Str. 10,
A. Z.-Mtgl. 14. [312

Großhändler oder Züchter wollen äußerste Offerte über

prima Papageien

einreichen unter **H. Henkel,** Vogelh., Gelsenkirchen, Schulstr. 7. [313

Umzugshalber

verkaufe, z. T. in erprobten Zuchtpaaren, Amaranten, Zebrafinken, Möwchen, Kubafinken, Grauastrilde, Orangebäckchen, grünb. Sperlingspapageien, Edelsänger, Mozambikzeisige, 0,1 Reisvogel, 1,0 Elsterchen, 1,0 Goldbrüstchen. Anfragen mit Rückporto unter **C. B. G.** an die Geschäftsstelle der „Gefiederten Welt". [314

Tarant. Inseparables,

2 Zuchtpaare à 100 ℳ, abzugeben.
S. Lichtenstaedt, Berlin-Johannisthal, Nieberstraße 10. [315

Zu verkaufen oder tauschen:

1 Wellensittichmännch.,

grün, in Freivoliere gezüchtet. [316
Erich Richter, Bernstadt O.L.
A. Z.-Mtgl. 235.

Lachtauben,

zuchtfähige Paare, gebe ab, auch tausche gegen deutsche Nachtigallen, Sprosser. Gebe auch Bruteier m. Edelzuchten: heller Brahmas, Emdener Gänse, indischer Lausenten gegen Edelsänger in Tausch. Pfarrer **Schwabe,** [317
Großenbehringen bei Gotha.

---

1 Dompfaff-Männch.,

2 Heidelerchen, 1 Stieglitz, 1 Singdrossel, prima Sänger, aalglat im Gefieder, vertauscht gegen Ameiseneier [318
Johann Fischer in Waldsassen,
Mitterteicher Straße 54.

Prima Stieglitzbastard,

Zucht 1923, gesundes und kräftiges Tier, gebe ab zum Tagespreis oder **tausche** gegen **Schindlerdrosselkäfig.** [319

Willi Reichel,
Dresden-Briesnitz,
Gottfried-Keller-Straße 7.

H. Fockelmann,
Hamburg 6

Catharinenstraße 25.
Postscheckkonto: **Hamburg 9632.** [320

Liste über Utensilien usw. zur Vogelzucht!

	10 Stück	100 Stück
Einsatzkäfig mit Schublade und Außenfütterung 20×15×18½	15.75 ℳ	136.50 ℳ
Einsatzkäfig mit drehbarem Futterkasten 20×15×18½	8.25 ℳ	71.50 ℳ
Monopolkäfig 18×13×18½ (Einsatzkäfig)	7.— ℳ	65.— ℳ
Weitbundkäfig 18×13×18½ (Einsatzkäfig)	7.— ℳ	65.— ℳ
Holznistkasten m. Drahtstäben ohne Haken	4.— ℳ	36.50 ℳ
dto. „ Holzstäben	2.80 ℳ	25.— ℳ
dto. „ Drahtstäben m. Haken	5.— ℳ	43.— ℳ
Verzinnte Kanariennester	7.— ℳ	69.— ℳ
Verzinnte Nistkörbe	1.85 ℳ	17.— ℳ
Saiatraufen, rund, 35 mm breit	1.10 ℳ	10.50 ℳ
dto. „ 55 „ „	1.80 ℳ	17.— ℳ
dto. „ 70 „ „	2.90 ℳ	26.— ℳ
Scharpieraufen, eckig, 100 mm breit	3.80 ℳ	34.50 ℳ
dto. „ 130 „ „	5.80 ℳ	52.— ℳ
Sepiahalter, klein	0.55 ℳ	4.55 ℳ
dto. groß	5.— ℳ	43.— ℳ
Scharpie, weiß Ia Pfund	12.— ℳ	120.— ℳ
Agave und Kokosfasern Bund	4.— ℳ	38.— ℳ
Kanarienkorbnester	0.75 ℳ	6.50 ℳ
Kanarienfußringe, offen mit und ohne Lasche	0.10 ℳ	0.80 ℳ
Kanarienfußringe, geschlossen	0.20 ℳ	1.60 ℳ
Kanarieneier, bunt	0.35 ℳ	3.— ℳ
Ossa-Sepia, 12—14 cm	0.75 ℳ	6.— ℳ
dto. 14—16 „	1.40 ℳ	12.— ℳ
dto. 16—18 „	1.80 ℳ	16.— ℳ
Sitzstange, 1 m lang, 12 mm	0.60 ℳ	6.— ℳ
dto. „ 15 „	1.20 ℳ	11.— ℳ
Glasbadehäuser mit Haken	4.— ℳ	40.— ℳ
Wasserautomaten (sog. Pumpen) 1/16 Ltr.	3.— ℳ	30.— ℳ
dto. „ 1/10 „	3.— ℳ	30.— ℳ
dto. „ 1/8 „	3.50 ℳ	35.— ℳ
dto. „ 3/8 „	4.50 ℳ	45.— ℳ
dto. „ 1/2 „	5.50 ℳ	55.— ℳ
Außenfütterungsnäpfe ohne Draht	1.50 ℳ	15.— ℳ
Drähte für Außenfütterungsnäpfe	0.50 ℳ	5.— ℳ
Fischnetze	1.— ℳ	8.50 ℳ

Vogelnäpfe aus Porzellan: [282

Nr.	10 Stück	100 Stück	Nr.	10 Stück	100 Stück
F 44	1.20 ℳ	10.— ℳ	419 G	1.05 ℳ	8.75 ℳ
F 56	1.50 ℳ	12.50 ℳ	420	0.90 ℳ	7.50 ℳ
F 68	1.80 ℳ	15.— ℳ	**Vogelwannen**	2.05 ℳ	16.90 ℳ
F 80	2.40 ℳ	20.— ℳ	**Eiernäpfchen** 5305	0.55 ℳ	4.45 ℳ
F 92	3.— ℳ	25.— ℳ	**Papageiennäpfe:**		
F 1398	1.80 ℳ	15.— ℳ	br. m. Knopf	3.60 ℳ	30.— ℳ
a/0	0.45 ℳ	3.75 ℳ	schmal mit Knopf	3.— ℳ	25.— ℳ
a/1	0.55 ℳ	4.40 ℳ	m. Stern	3.90 ℳ	32.50 ℳ
a/2	0.75 ℳ	6.25 ℳ	H	3.30 ℳ	27.50 ℳ
a/2½	0.90 ℳ	7.50 ℳ	A	2.70 ℳ	22.50 ℳ
a/2¾	1.20 ℳ	10.— ℳ	435	3.90 ℳ	32.50 ℳ
a/3	1.35 ℳ	11.25 ℳ			
a/4	1.80 ℳ	15.— ℳ			
a/5	2.25 ℳ	18.75 ℳ			
a/6	2.70 ℳ	22.50 ℳ			

Angebot freibleibend; Aufträge unter 5.— ℳ werden nicht ausgeführt. Abbildungen von Porzellannäpfen auf Wunsch.

Bitte!

In eigenem Interesse wollen die pp. Einsender beachten, daß

a) **alle für die Redaktion** der „Gefiederten Welt" bestimmten **Zuschriften** (Sprechsaal-Anfragen und -Antworten, Vereinsnachrichten usw.) und **Sendungen** (tote Vögel, Manuskripte) nur an **Herrn Karl Neunzig, Hermsdorf bei Berlin,** Neue Bismarckstr.,

b) **alle Bestellungen** auf **Abonnements,** auch vom Ausland, **nur durch die Post,**

c) **Inserate** und dergl. Geschäftliches nur an die **Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg,** Postschließfach 148,

zu richten sind.

Allen Vogelfreunden

zur gefl. Kenntnis, daß ich **meine Abteilung (Muster Rausch)** bedeutend vergrößert habe. Bestellungen werden schon jetzt entgegengenommen. Anfragen nur gegen 50 Pf. Rückporto. Bedienung streng reell. [321

Josef Pichler,
Wien III, Klimschgasse 18.

Austausch-Zentrale! [322

Welch gleichgesinnter Vogelliebhaber beabsichtigt mit mir in **Austauschverkehr einheimischer und ausländischer Vögel und Zeitschriften** zu treten?
Syré, Lehrer, **Biernau i. Thür.**

Wir sind beauftragt worden, folgende

Seltenheiten

anzubieten:

Gefiederte Welt. I. Jahrgang 1872—1923 außer 1904, 1910, 1911. Fast alles gebunden (11 Jahrgänge in Heften).

Journal f. Ornithologie. II. Jahrgang. 1854—1904 außer 1870 bis 1872. Es fehlen in älteren Jahrgängen einige Tafeln sowie in 1869 ein Bogen. Dazu gehörig: **Ornithologisches Zentralblatt.** I. Jahrgang 1876—1882. Komplett. Zum großen Teil gebunden.

Ornithologische Monatsschrift. I. Jahrgang. 1876—1879, 1883-1899, 1901—1922. Zum großen Teil gebunden.

Zeitschrift für Oologie. I. Jahrgang. 1911. Komplett.

Ornitholog. Rundschau. I. Jahrgang 1905. Komplett.

Zeitschrift für Oologie und Ornithologie. XV. Jahrgang. 1905—1910, 1912, 1920, 1921. Komplett. Von Jahrgang 1911, 1912, 1913, 1914, 1923 fehlen diverse Hefte.

Lieferbarkeit freibleibend — Irrtum vorbehalten. Liebhaber, die sich bewußt sind, daß derartige Seltenheiten I. Ranges einen angemessenen Preis erfordern, wollen sich mit uns in Verbindung setzen. Die einzelnen Reihen können nur in sich geschlossen abgegeben werden.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung
Magdeburg Postschließfach 148.

Inserate

für das am 1. Mai 1924 zur Ausgabe gelangende Heft 11 der Gefiederten Welt erbitten bis 26. April 1924 früh

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Hermsdorf bei Berlin; für den Anzeigenteil: Rolf Kretschmann, Magdeburg, Postschließfach 148.
Verlag der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck: August Hopfer, Burg Bz. Magdeburg.

Kohlmeise — Parus major major L.

Tannenmeise — Parus ater ater L.

Blaumeise — Parus caeruleus caeruleus L.

Haubenmeise — Parus cristatus mitratus Brehm

Sumpfmeise — Parus palustris communis Bldst.

Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Jahrg. 53 | Den 1. Mai 1924 | Heft 11

(Druckort: Burg, Bezirk Magdeburg.)

Nachtigall und Amsel, eine Vogelschutzbetrachtung.

Von Franz Borggreve, Jena.

(Schluß.) (Nachdruck verboten.)

Doch kehren wir zur Nachtigall zurück. Wenn wir von einem relativen Verschwinden dieses Vogels sprechen, so kommen doch wohl nur solche Gegenden in Frage, in denen die Nachtigall stets nur in geringer Anzahl auftrat. Für die ausgesprochenen Nachtigallenreviere dürfte auch heute die Befürchtung eines Bestandrückganges oder gar eines Verschwindens nicht gegeben sein. Denn hier sind die von der Nachtigall geforderten Lebensbedingungen aller Hochkultur zum Trotz noch unverändert geblieben, daher erklärt sich auch ihr massenhaftes Auftreten. In Distrikten dagegen, wo diese besonderen Lebensbedingungen an sich schon spärlich vorhanden waren und nunmehr durch einschneidende Veränderungen im Landschaftscharakter verlorengingen, da ist selbstverständlich mit einem weiteren Verweilen unserer Sängerin nicht mehr zu rechnen, und ist sie einmal verschwunden, ist auch ein Wiedereinbürgern sehr mühevoll, deshalb sollte man es nicht erst so weit kommen lassen. — Die Nachtigall liebt in der Hauptsache eine dichte, unterholzreiche Bepflanzung, in der sich eine starke Schicht alten vorjährigen Laubes befindet und unbedingte Wassernähe, ein Vegetationsbild, wie es uns alte Friedhöfe oder ähnliche Anlagen am typischsten zeigen. Da ja jedem Vogelkenner diese Lebensbedingungen der Nachtigall praktisch oder theoretisch wohl hinreichend bekannt sein dürften, so ergibt sich daraus für diejenigen, die ihr Verschwinden beklagen, die logische Konsequenz, den in manchen Gegenden noch vorhandenen spärlichen Resten entsprechende Daseinsbedingungen künstlich zu schaffen. Wie dies zu geschehen hat, hat uns ja unser Altmeister im Vogelschutz, Freiherr Dr. Hans von Berlepsch auf Burg Seebach bei Langensalza, in so trefflicher Weise gezeigt.

Mit dem Bedauern des Verschwindens allein ist es nicht getan, sondern es muß wirklich praktischer Vogelschutz ausgeübt werden. Davon dürfen uns auch die gegenwärtig finanziell so ungünstigen Zeitverhältnisse nicht zurückschrecken. Wo ein Wille, da ist auch ein Weg, dieser alte Wahrspruch gelte auch für uns. Wir Vogelschützer wollen es uns zur Pflicht machen, überall Vogelschutzgehölze nach Berlepschschem Muster ins Leben zu rufen oder doch wenigstens bereits vorhandene Anlagen, wie Friedhöfe, Parks usw., hierzu auszubauen. Diese Idee kann aber nur dann mit Erfolg durchgeführt werden, wenn sich alle Vogelfreunde und -schützer dort, wo dies bisher noch nicht geschehen ist, zu rührigen Propagandagemeinschaften (Vereinen) zusammenschließen. Das Ausbauen bereits vorhandener, zu Vogelschutz geeigneter Anlagen ist verhältnismäßig einfach und auch für heutige Verhältnisse nicht kostspielig. Bei einem älteren Friedhof z. B. wäre in der Hauptsache nur darauf zu achten, daß die auf den Gräbern stehenden üppig entwickelten Bäume und Sträucher nicht zugunsten einer modernen Gartenbautechnik gelichtet oder gar ausgerodet werden. Auch hier kann durch künstlichen Quirlschnitt viel Gutes geschaffen werden. Je nach der Größe des Geländes würde für einige Tränken, die auch in besonders heißen Tagen stets Wasser enthalten müssen, zu sorgen sein. Hierzu können recht gut ausrangierte Waschbecken aus Blech, deren schadhafte Stellen von einzelnen Vereinsmitgliedern selbst repariert werden können, benutzt werden. Ferner ist das Anbringen von Nistkästchen für unsere Höhlen- und Halbhöhlenbrüter von größtem Nutzen. Auch diese fertigt man sich heute aus einem hohlen Fichtenstamm selbst an. Durch Anpflanzen von futterspendenden Sträuchern, denn solche fehlen oft in derartigen Anlagen, wie Eberesche, Vogelkirsche, roter und schwarzer Holunder, wilde Stachelbeere und Johannisbeere, Pfaffenhütchen usw., würde zum Schutze unserer gefiederten Freunde zunächst genug geschehen sein. Einen derartigen Vogelschutz auszuüben, ist auch in der gegenwärtigen Zeit jeder in der Lage.

Eine weitere Ursache des Verschwindens der Nachtigall aus von ihr spärlich besetzten Gegenden ist zum nicht geringen Teil auch in der lebhaften Nachfrage aus Liebhaberkreisen zu suchen. Ich bitte wegen dieser Offenheit um Verzeihung, meine Herren, aber es ist schon so, und wenn die Kreise, die es angeht, daraus als „Vogelschützer" die nötige Nutzanwendung ziehen, dann ist der Zweck, der sich mit meiner Offenheit verknüpft, erreicht. Seit Jahren haben sich hier in Jena Nachtigallenfreunde unter zum Teil großen finanziellen Opfern der Mühe unterzogen, die Nachtigall wieder einzubürgern. Es wäre dies auch geglückt, wenn die edle Zunft der gewerbsmäßigen Vogelfänger nicht auf der Lauer läge und sofort jeden Vogel ins Garn brächte.

Im Frühjahr 1922 schienen sich 2 Pärchen hier wieder ansiedeln und zur Brut schreiten zu wollen. Der Friede sollte nicht lange dauern, die Männchen wanderten diesmal ohne die Händler-Zwischenstation direkt in die Vogelstube eines hiesigen Liebhabers, Ebenso erging es einem Männchen in diesem Frühjahr. Ich bin der Ansicht, daß gegen „derartige Liebhaber", die diesen Ehrentitel keineswegs verdienen, nicht scharf genug vorgegangen werden kann, und zwar muß dies in erster Linie aus den Vogelschützerkreisen selbst geschehen. Aber nicht allein gegen den Bestand der Nachtigall wütet die Besitzgier der Liebhaber, sondern diese wirkt ebenso dezimierend auf den Bestand des Gelbspötters oder Gartenlaubvogels (Hippolais icterina), Sumpfrohrsängers (Accrocephalus palustris) und des Blaukehlchens (Erithacus cyanecula). Jedem älteren Vogelwirt muß unbedingt die Hinfälligkeit dieser drei empfindlichen Sänger bekannt sein. Das „Durchbringen" gelingt ja doch nur in den seltensten Fällen, und auch dann ist die Lebensdauer dieser Tierchen im Käfig eine sehr beschränkte. Es sollte deshalb, wenn die drei Arten unbedingt zu wissenschaftlichen Zwecken gehalten werden müssen, dies nur von ganz besonders hierzu berufenen Fachleuten geschehen, die auch in unserer heutigen Zeit finanziell in der Lage sind, ihnen alles restlos bieten zu können, was zu ihrem Wohlbefinden nötig ist. Daß in manchen Gegenden der Gelbspötter auch schon seltener geworden ist, führe ich unbedingt auf das übertriebene Wegfangen zurück.

Zum Schluß möchte ich noch an alle einsichtsvollen und wirklichen Vogelliebhaber und -schützer die dringende Mahnung richten, es kann dies nicht oft genug geschehen, nicht nur sich damit zufrieden zu geben, wenn die von ihnen gekäfigten Stücke gut gedeihen, wohl und munter sind, sondern sich in allererster Linie mit größter Hingabe für die Erhaltung der in freier Wildbahn lebenden, durch allmähliche Ausrottung gefährdeten Ornis einzusetzen. Ich möchte mich ganz besonders an die Herren Lehrer wenden als diejenigen, die berufen sind, auf die heranwachsende Jugend in erzieherischer Hinsicht den größten Einfluß zu haben. Auch für unseren Vogelschutz gilt der jetzt in der Politik so volkstümlich gewordene Leitsatz: Wer die Jugend für seine Idee gewonnen hat, dem gehört die Zukunft. Wie ich schon sagte, ist es sehr nötig, die Jugend, ganz besonders aber die Landjugend, für den Vogelschutz zu gewinnen und sie z. B. auch auf die Ästhetik der Raubvögel hinzuweisen und sie vor allem den Unterschied wirklich schädlicher Raubvögel, wie z. B. Sperber usw., von dem nützlichen Bussard und Turmfalken unterscheiden zu lehren. Ebenso ist ein unbedingter Eulenschutz einzuprägen. Gerade auf dem Lande wird in dieser Hinsicht noch so sehr durch Unkenntnis gesündigt. Hier wird jeder Vogel mit krummem Schnabel als „Räuber" einfach abgeschossen und sein Horst durch die Jugend zerstört.

Meines Erachtens ist das Verschwinden von Uhu, Kolkrabe, Wanderfalk, Storch, Reiher, Rohrdommel, unseren herrlichen Meisenarten, Eisvogel, Blaurake, Bachamsel und wie sie alle heißen mögen ebenso beklagenswert wie das der Nachtigall.

Der Münchner Gestaltsfarbenkanarienvogel.

Von Leopold Keidel, München.

(Nachdruck verboten.)

Als Geburtsjahr des Münchner Gestaltsfarbenvogels, wenn man von einem solchen überhaupt sprechen kann, wäre das Jahr 1917 zu nennen, das auch mit der Gründung des deutschen Verbandes zusammenfällt. Obwohl die Ziele, durch Kreuzung des Holländers mit der Landrasse einen schönen, schnittigen, großen Vogel zu gewinnen, schon weit früher gesetzt waren (ich erinnere da an die Erstzüchtung der Münchner Edelgoldkanarien durch Benno Ziegler, München, die auch durch langatmige Abhandlungen in der „Gef. Welt" genügend gewürdigt wurden), so wäre das Jahr 1917 deshalb zu nennen, weil eben durch die Gründung des genannten Verbandes Normen geschaffen wurden, und ein zweckentsprechendes Rassefchema zur Ausarbeitung kam. Die Ursachen, die die damaligen Gründungsmitglieder zu dem Unternehmen zusammengeführt haben, dürften darin zu suchen sein, daß unser Vaterland durch den Weltkrieg isoliert war, und die englischen und belgischen Figuren- und Farbenkanarien durch ein deutsches Erzeugnis ersetzt werden sollten. Daß dieses voll und ganz gelungen ist, zeigen die Resultate, und dürften in dieser Hinsicht bei verschiedenen Züchtern tadellose Exemplare dieser Rasse als Idealvogel aufzuweisen sein. Der Kreis, der sich mit der Zucht dieses neuen Typs befaßt, ist sich seiner Arbeit wohl bewußt, und aus München hinausgegangene Vögel dieser Richtung haben auch anderwärts Eingang und Anerkennung gefunden. Wir hoffen unsern Münchner Vogel weiter zu verbreiten, als deutsches Erzeugnis den deutschen Markt zu beherrschen, um uns vom Auslande unabhängig zu machen. Was wir von englischen und belgischen Vögeln erhalten, ist nur Schußware, und können wir in dieser Hinsicht vom Auslande nur lernen. Der Repräsentant des Münchner Gestaltsfarbenvogels ist der Holländer, der mit der gewöhnlichen Landrasse gekreuzt, Generationen hindurch konstant durchgezüchtet, den Idealvogel bringen soll. Allerdings ist die Sache nicht so einfach, wie man schließlich annimmt, und muß unter den Elterntieren eine weise Auswahl getroffen werden und auch ein tieferes Eingehen in die Vererbungslehre voraussetzen. Was man auf einem Punkte gewinnt, verliert man andererseits wieder, und ist selbstverständlich ein genau geführtes Zuchtbuch eine unumgängliche Notwendigkeit. Diesem Umstande abzuhelfen, dienen die vom deutschen Verbande im Eigenverlag herausgegebenen Zuchtregister, Zuchtstammbücher und -karten, und ist an Hand derselben eine genaue Buchführung in der Hecke gewährleistet. Bei der Auswahl der Zuchttiere lasse man sich von dem Umstande leiten, daß die Henne die Größe und Farbe, der Hahn die Figur bringt, obwohl die Henne genau die Rassereinheit besitzen muß, richtiger, die Geschlechter im Werte gleichzustellen, da ja schöne Weibchen bekanntlich allerorts dünn gesät sind und gute Hähne durchweg leichter fallen. Schwächliche, schlecht- oder dünnbefiederte oder sonstwie mit groben Fehlern behaftete Tiere schließe man von vornherein von der Zucht aus und lasse sich von keiner das Exemplar schließlich günstig erscheinenden Eigenschaft beeinflussen.

Man züchte nur mit gesunden Tieren, mögen schmatzende oder sonstwie kränkliche noch so schön sein, ein Mißgriff in dieser Hinsicht wird sich bitter rächen. Es ist gut, wenn man den Weibchen vor Einwurf in die Hecken einen größeren Flug gewährt, um die ohnehin schwächlich konstituierten Tierchen muskulativ zu stärken und für das Brutgeschäft widerstandsfähiger zu machen. Etwa bestehende oder erzüchtete gute Eigenschaften sind durch abwechslungsweise Inzucht oder Linienzucht zu festigen, dabei aber maßzuhalten, obwohl man nicht zu ängstlich zu sein braucht. Eine systematisch betriebene, auf wissenschaftlichen Motiven aufgebaute Rassezucht ist ohne zeitweise angewandte Inzucht unmöglich und nur dadurch eine konstant bleibende Nachzucht sichergestellt. Rassenzucht ist keine Massenzucht, und möge sich das jeder Anfänger auf die Stirne schreiben. Natürlich sind, sollte sich vorübergehende Impotenz der Tiere zeigen, Mittel wie Johim-Vetol zu empfehlen. Auch Brennesselblätter getrocknet unter das Eifutter gemengt, leisten oft gute Dienste. Je rassiger eben das Tier schon durchgezüchtet ist, desto mehr werden die Anforderungen, die an den Züchter gestellt werden. Ebenso verhält es sich mit der Farbenzucht. Sollte irgendein Farbenschlag konstant durchgezüchtet werden, so ist ebenfalls bei der Zusammenstellung der Elterntiere die größte Rücksicht zu üben. Man merke, daß die Urfarbe „Grün" die pigmenthaltigste ist, und ist selbe, sollte sich gerade bei hochgelben Vögeln Federsprödigkeit zeigen, unbedingt einzuwerfen. Blaßgelbe Tiere, die zu dem Zwecke empfohlen werden, bringen oft nicht den gewünschten Erfolg, noch dazu, daß gerade blaßgelbe Vögel durch ihren Federreichtum robuster erscheinen. Es fallen dann von Hochgelb und Grün hochgelbe, grüne und bunte, von denen wieder erstere zu verwenden sind. Allerdings wird man in diesem Falle mit Rückschlägen zu rechnen haben, und es kommt vor, daß in dritter oder vierter Generation auf einmal ein grünes oder buntes Junges im Neste liegt. Wie gesagt, ist bei der Figuren- und Farbenkanarienzucht mit vielen Zufälligkeiten zu rechnen, die aber, genommen, wie sie sind, den Zuchtbetrieb nur noch interessanter gestalten. Weiter in die Materie einzudringen, verbietet mir die Raumfrage, halte ich aber auch für unnötig, da das vom Creutz'schen Verlage, Magdeburg, in Vorbereitung begriffene Werk „Die Farben- und Gestaltskanarien" von A. Aschenbrenner, Müuchen, den ganzen Zuchtbetrieb des Münchner Gestaltsfarbenvogels in lückenloser Fülle behandelt und auch das vom deutschen Verbande ausgearbeitete Rassenschema dieser schönen Spezies wiederbringt. Ich möchte meine Ausführungen schließen mit dem Wunsche, recht viele Liebhaber zu finden für die Zucht dieses deutschen Erzeugnisses, des „Münchner Gestaltsfarbenkanarienvogels".



Münchner Holländerkanarienvogel.

Ein paar Worte über das Gefangenleben des Waldhüttensperlings.

Von A. Adlersparre.

(Nachdruck verboten.)

In der sehr interessanten und wertvollen Übersicht über „Neueinführungen und Seltenheiten" in Heft 2 des laufenden Jahrganges begegnete mir der Name eines alten Bekannten: des Waldhüttensperlings. Da seine Gefiederfärbung, Verbreitung und Freileben ja schon a. a. O. in erschöpfender Weise behandelt sind, kann ich mich hier auf ein paar Worte über sein Gefangenleben beschränken.

Mein erstes Exemplar dieser Art, ein schlankes, aalglattbefiedertes Tier von einem trotz den schlichten Farben sehr ansprechenden Äußeren, fand ich vor zirka acht Jahren (also während des Krieges) in Englunds Vogelhandlung, Stockholm. Der Inhaber der Firma vermutete, daß der Vogel mit irgendeinem zurückkehrenden Seefahrenden ins Land gekommen war. Bei mir wurde der Sperling in einen Käfig, dessen Rauminhalt $100 \times 100 \times 55$ cm war, mitsamt Möwchen, Zebrafinken, Gouldamandinen, Sonnenvögeln, Männchen Madagaskarweber und vielleicht noch einigen anderen gesetzt. Sein Benehmen war da ganz artig, wenn er nur nicht selbst geärgert wurde. Die Kleinvögel wies er höchstens mit einem Schnabelhiebe zurück, wenn sie ihm zu

nahe kamen, wofür sie sich auch recht bald in acht nahmen. Verfolgt durch den Käfig wurden sie aber nie. Auch mit den Sonnenvögeln vertrug sich der Sperling gut; ich besitze noch heute ein Photo von ihm, friedlich sonnenbadend Seite an Seite mit einem Sonnenvogel, wo er während des Aktes das Gefieder lange nicht so stark sträubte wie letzterer. Der einzige, mit dem er in Fehde lebte, war der Madagaskarweber, aber der letztere konnte ihn auch nie in Ruhe lassen. Saß der Sperling friedvoll irgendwo, schwebte über ihm, ehe er sich's versah, der Kopf des müßigen roten Vögelchens, und bald war der Kampf im Gange — manchmal ein recht stattlicher Anblick, wenn der Waldhüttensperling umgekehrt auf der Sitzstange mit gespreizten Flügeln und Schwanz dem über ihm schwebenden Angreifer Widerstand leistete. Meist siegte der beweglichere Sperling über den ein klein wenig unbehenderen Weber, der dann ein paarmal im Käfig herumgejagt wurde, aber, soviel ich bemerkte, nicht einmal kahlgezupft oder verletzt wurde.

Eine Art Gesang gab der Waldhüttensänger ab und zu zum besten, war wohl deshalb vermutlich ein Männchen. War indessen die gesangliche Leistung meines Erachtens sehr unbedeutend, bin ich dagegen geneigt, seine Intelligenz weit höher einzuschätzen. Intelligenz der Tiere ist Fähigkeit psychisch-bedingter Anpassung, wie ich es schon in einer Mitteilung: „Zur Frage der Intelligenz der Gouldamandinen" im Jahrgang 1915 S. 204 dieser Zeitschrift angedeutet. Der Waldhüttensperling verfolgte alles um sich mit wacher Aufmerksamkeit und paßte sich der Umgebung immer geschmeidig und vorsichtig nach Belieben an. Hinsichtlich des Futters war er beinahe Allesfresser. Nahm Hirse allerlei Sorten, Spitzsamen, Mohn, Reis, Hanf, Grassamen, angekeimten Weizen, geschroteten Hafer und Mais, Insektenfresserfutter, Ameisenpuppen, Mehlwürmer, kleine Heuschrecken, Spinnen, rohes gemahlenes Fleisch, geriebene Möhre, Apfelsine, Apfel, Himbeeren, Vogelmiere, Spinatblätter u. a. m. In bezug auf Körpergewicht des Waldhüttensperlings weise ich auf meine Tabelle über Gewicht und Maße im Jahrgang 1922 dieser Zeitschrift hin.

Ein zweites Exemplar dieser Art wurde liebenswürdigst von einem hiesigen Mitglied der „Avikultur", freie Zusammenschließung für vogelpflegerische Information, zu meiner Verfügung gestellt. Es war dies anscheinend ein Weibchen (denn ich konnte keine zusammenhängende Lautäußerung bemerken) und war in England eingekauft. Bei mir saß dieses Weibchen in einem Käfig von 125 × 100 × 60 cm mit Weibchen von Rotschulterwitwe, Weißflügelwitwe, Tahaweber, Weibchen von schwefelgelbem Girlitz und einer geringeren Anzahl von Braunrückenelsterchen und Heuglins Elsterchen zusammen. Dieses Weibchen war nicht ganz so verträglich wie das vorhererwähnte Männchen. Zwar ging es den größeren Widas aus dem Wege, rupfte aber ab und zu die kleinen Vögel, die jedoch meist flink aus dem Wege zu gehen für das beste hielten. Mit dem großen Girlitzweibchen, das sonst friedlich war und selbst von den kleinen Elsteramandinen sich von dem Futternapf verjagen ließ, vertrug sich das Sperlingsweibchen nicht gut. Es kam des öfteren zu recht erbitterten Streitigkeiten. Daß aber auch Weibchen sich anders gegen nicht sehr entfernt stehende Finken verhalten können, beweist eine Mitteilung eines vielerfahrenen englischen Vogelpflegers (Butler) über ein von ihm erworbenes Waldhüttensperlingsweibchen: „being kept with Weavers and Buntings („Emberizinae") it proved harmless enough." Möglicherweise waren bei ihm keine anderen Weibchen in demselben Käfig vorhanden, es geht nämlich aus der Mitteilung nicht hervor, wie es sich in dieser Hinsicht verhielt. Ob die kleinere Waldhüttensperlingsform bisher irgendwo gezüchtet ist, weiß ich nicht, der größere Swainsonsperling ist ja bekanntlich schon mehrmals gezüchtet. Von nistenden Waldhüttensperlingspärchen dürfte man indessen kaum berechtigt sein, Verträglichkeit gegen kleinere oder gleichgroße Käfiggenossen zu erwarten. Deshalb benutze man für diesen Zweck am sichersten Einzelkäfig.

Als zusammenfassendes Urteil dürfte sich sagen lassen: Der Waldhüttensperling läßt sich, wenn besondere Friedensstörer ferngehalten werden oder er nur mit größeren Webern oder Witwen gehalten wird, wenigstens in einzelnen Exemplaren, sehr gut in größeren Gesellschaftskäfigen halten, da er, soweit bisher bekannt, kein ausgeprägter Streitsüchtiger ist. Ein Schmuck des Käfigs ist er immer wegen seiner schlanken anmutigen Gestalt, seiner stets aalglatten Befiederung und seines lebhaften Wesens.

Stockholm, den 1. März 1924.

Neueinführungen und Seltenheiten.

Von Karl Neunzig.

(Nachdruck verboten.)

Zu den Seltenheiten des Vogelmarktes gehört auch der mit den letzten Transporten nach Europa gelangte

Rotschwingenglanzstar — Amydrus morio *(L.)*.

Er gehört einer zwei Arten umfassenden Gattung an, welche hauptsächlich die zum größten Teil rotbraune Färbung der Handschwingen auszeichnet. Die beiden Arten unterscheiden sich nur wenig. Die südafrikanische Form hat braunschwarzen Schnabel, während der Schnabel der ostafrikanischen Form grau- bis tiefschwarz ist, und das Gefieder der letzteren Art hat weniger purpurnen Metallglanz.

Von der südlichen Form berichtet Stark, daß sie gesellig in Flügen das ganze Jahr hindurch lebe und auch in Kolonien, selten in einzelnen Paaren niste. Die östliche Form beobachtete Böhm am Ufer des Tanganjikasees. Sie flogen dort in Scharen unter eigentümlich melodischem Flöten hin und her und ließen sich auf kahlen aus dem Wasser hervorragenden Felsen nieder. Ihr Gebaren war ganz dem anderer Glanzstare ähnlich. Die hoch in der Luft mit kurzen Flügelschlägen hinstreichenden Vögel gewährten mit dem langen Keilschwanze und dem leuchtenden Rotbraun der Schwingen einen prächtigen Anblick. Heuglin sah ihn paarweise und in kleinen Flügen in felsigen mit Hochbäumen bestandenen Tälern und auf Viehtriften, und zwar nur während und unmittelbar nach der Regenzeit. Er ist wie seine Verwandten sehr lebhaft, von lärmendem Wesen,

mißtrauisch. Auf dem Boden läuft er elsterartig umher. Über die Nahrung des südlichen Rotschwingenstars berichtet Stark: „Während des größten Teils des Jahres nähren sich die Vögel von Insekten, zur Zeit der Fruchtreife aber auch von Weintrauben, Feigen und anderen weichen Früchten und Beeren." Einmal sah Stark, wie ein Paar die nackten Jungen eines Kapsperlings trotz der kräftigsten Verteidigung der Eltern verschlang; die Ernährung der ostafrikanischen Form wird kaum wesentlich von der der südafrikanischen abweichen. Beide Formen stimmen in der Nistweise anscheinend überein. Phillips fand sie in Ostafrika in den höchsten Regionen der Golisberge in den Löchern und Spalten der Felswände nistend, und Stark berichtet aus Südafrika, daß sie das Nest aus Reisern, Gras und anderen weichen Stoffen in Löchern und Felsritzen, gelegentlich auch unter Hausdächern bauen. Das Gelege besteht aus 4—5 Eiern. Neuerdings teilt in seinem Bericht über die Erforschung des Mt. Elgon (Brit. Ostasien)



Waldhüttensperling (Text s. S. 83).

der schwedische Forscher Hugo Granvik (J. f. O. 1923, Sonderheft) Bemerkenswertes über den Rotflügelglanzstar mit. Granvik begegnete dem Vogel an den bewaldeten Abhängen des Berges in großen Scharen sowohl auf niedrigen wie auf hohen Bäumen. Auf Schüsse, durch welche sie sich nicht verscheuchen ließen, antworteten sie mit schrillen Rufen, welche an das „Lachen" der Elster erinnerten. Die Vögel wurden in großen Höhen gefunden. Granvik konnte feststellen, daß die vertikale Verbreitung sich zum mindesten auf Höhen von über 13500 Fuß (etwa 3400 m) erstreckt. Er sah in dieser Höhe wiederholt alte Stare ihr Junges füttern, das laut kreischend auf einer Senecio johnstoni, einem baumartigen Kreuzkraut, welches die Abhänge des Elgon bis zum Gipfel bedeckt, saß, ein Zeichen, daß das Junge in dieser Höhe erbrütet war. Der Nistort konnte nicht festgestellt werden. Die Vögel waren sehr scheu. Auch über die Nahrung finden wir in dem Bericht Angaben. Granvik fand in dem Magen erlegter Stare, die in einer Höhe von 8000 Fuß geschossen waren, nur Früchte, bei denen, die am Rande des Kratersees des Elgon in einer Höhe von 13500 Fuß erlegt waren, nur Kerfe und Spinnen.

Gefiederbeschreibung: ♂ purpurglänzend blauschwarz; Zügel sammetschwarz; Ohrdecken mehr grünlich glänzend, Kehle mit matterem Glanz; kleine Flügeldecken wie Oberseite, große und Armschwingen matter; Handschwingen an den Spitzen oder Endsäumen sowie eine Schwinge schwarz, sonst rotbraun; Schwanz wie Oberseite, matter und mehr grünlich glänzend; Auge braun; nach außen rot; Schnabel braunschwarz; Füße schwarz; Lg. 290—310; Fl. 140—160; Schw. 130—140; Schn. 28—30; Lf. 33—35 mm. ♀ dem ♂ ähnlich, aber Kopf, Hinterhals eisengrau, alle Federn mit grünlich stahlglänzendem Mittelstrich. — Das Gefieder der ostafrikanischen Form — A. m. rueppelli *Verr.* — hat weniger Purpurglanz; der Schnabel ist kräftiger und grauschwarz oder schwarz.

In der schon wiederholt erwähnten Arbeit des Herrn Dr. Adlersparre wird ein „niedlicher kleiner Fliegenfänger" angeführt, den wir

Staffelschwanzfliegenschnäpper — *Stenostira scita Vieill.* (s. Abb. S. 87).

nennen wollen. Er ist der einzige Vertreter seiner Gattung, welche kenntlich ist an dem zierlich geformten Fliegenschnäpperschnabel, der von mäßig starken Schnabelborsten umgeben ist. Der Schwanz ist gestuft und etwas länger als die Flügel. Das Verbreitungsgebiet ist Südafrika. In der Literatur sind über das Freileben keinerlei Mitteilungen zu finden. Die Gefiederfärbung ist folgende:

Oberseits grau; über die Kopfseiten ein oben und unten durch einen weißen Strich begrenztes Band; Oberschwanzdecken schwarz; Kinn, vordere Kehle weiß, in der Mitte hellrötlich verwaschen; übrige Kehle, Kropfgegend, Körperseiten grau, Mitte des Unterkörpers, Unterschwanzdecken weiß, auf der Bauchmitte ein rötlicher Fleck; Schenkel schwarz; Flügeldecke schwarz, mittlere und große mit weißen Spitzen; Schwingen schwarz mit grauen Außensäumen, innere Armschwingen mit breitem weißen Außensaum; Unterflügeldecken weiß; Schwanzfedern schwarz, außer den mittleren mit nach außen hin größer werdender weißer Spitze, äußerste fast ganz weiß; Auge braun; Schnabel, Füße schwarz; Lg. 112—130, Fl. 50—55, Schw. 52—56; Lf. 18—19, Schn. 9—11 mm. (Fortsetzung folgt.)

Die gefiederten Bewohner meines Gartens 1920.

Von D. Rothenberg.

(Schluß.) (Nachdruck verboten.)

Das Singdrosselnest befand sich 3 m hoch in einem Holunderbusch. Das Nest war aus Halmen und Wurzeln erbaut. Der Napf war mit Mulm

ausgestrichen. In dem Neste befanden sich fünf junge Zippen, die nach drei Tagen ausflogen. Sie trieben sich noch zehn Tage im Garten umher. Ich hätte sie nie entdeckt, wenn sie nicht ihr Locken verraten hätte. Kam ich in die Nähe ihres Versteckes, so hüpften die Kleinen in großen Sätzen davon und riefen dabei ängstlich zip. Sie sahen zu komisch aus mit ihren langen Stelzen und dem Stummelschwänzchen. Einmal konnte ich eine hübsche Familienszene beobachten. Ich hörte andauernd die Kleinen rufen, konnte aber nicht ihr Versteck finden. Deshalb stellte ich mich hinter einen Busch, um die weiteren Vorgänge zu beobachten. Es dauerte nicht lange, da kam eine alte Zippe mit einer Raupe im Schnabel und hüpfte auf eine große Rhabarberstaude zu. In demselben Augenblick stürzten drei junge Singdrosseln aus ihrem Verstecke, der Rhabarberstaude, hervor, und drängten sich um die Alte, schrien laut und schlugen mit den Flügeln. Die Alte stopfte die Raupe der Kleinsten in den Schlund. Dann hüpfte sie ein Stück weiter, hielt einen Augenblick den Kopf schief, um einen Regenwurm zu beobachten, und zog diesen aus der Erde. Das größte der Jungen stürzte sich voller Begier auf den armen Wurm und verschlang diesen. Nach einer Weile flog die Alte davon, und die Jungen versteckten sich wieder unter den großen Rhabarberblättern. — Wie ich vorhin erwähnte, hatte ich fünf Berlepschsche Meisenhöhlen aufgehängt. Feldsperlinge nutzen natürlich diese günstige Gelegenheit, eine Wohnung zu bekommen, aus. So war bald jeder Kasten von einem Spatzenpaar bezogen. Eines Tages beobachtete ich ein Pärchen Blaumeisen, welches eifrig feine Niststoffe in eine Höhle brachte. Als ich nach zwei Tagen nachsah, war der Kasten voller Federn und enthielt ein Spatzenei. Ich säuberte ihn und die anderen Höhlen von den Spatzennestern. Doch es hatte keinen Zweck, die Feldsperlinge kamen immer wieder. Ich warf ihre Nester jedesmal hinaus. Als ich an einem Tage unter die eine Höhle trat, lagen drei ganze und zwei zerbrochene weiße Eier auf dem Boden. Ich bestimmte sie als Wendehalseier und legte die unbeschädigten hinein. Am andern Tage lagen sie wieder unten. Der Wendehals ließ sich das nicht länger gefallen. Er zog in eine andere Höhle ein und warf das Spatzennest hinaus. Sein Weibchen legte nun auf den nackten Boden sieben reinweiße Eier, und zwar jeden Tag ein Ei. Dann begann das Brüten. Da das Einflugsloch für einen Wendehals doch etwas eng war, so mußte er sich immer ordentlich durchzwängen. Das Weibchen saß so fest auf den Eiern, daß ich ruhig den Deckel abschrauben konnte. Nach 13 Tagen schlüpften die Jungen aus den Eiern. Die Eltern waren nun ängstlich um ihre Kleinen besorgt. Man durfte nicht in die Nähe der Höhle kommen, dann erhoben sie ein ängstliches Geschrei. Es wär ein ganz schnell gerufenes „gittgittgitt". Wurden sie gefüttert, so konnte man ein Schwirren bemerken, das die Jungen verursachten, die die Alten freudig begrüßten und sie um Futter anbettelten. Je älter die sieben Wendehälse wurden, desto übler roch es, wenn man nahe an die Höhle herantrat. Ich habe die Alten oft beim Verlassen der Höhle beobachtet; aber nie trugen sie den Unrat der Jungen fort. Nach genau 14 Tagen flogen die Jungen aus und trieben sich noch lange mit den Eltern in der Umgebung herum. Als ich die Höhle abnahm und öffnete, fand ich am Grunde eine Handvoll Unrat von Fliegenmaden durchsetzt. — Leider entdeckte ich das Girlitznest erst spät. So sind mir viele interessante Beobachtungen entgangen. Die Alten und auch die Jungen verhielten sich sehr still. Das ♂ sang nie auf dem Busch, in dessen Zweigen das Nest war. Es befand sich in einem Astquirl 3,50 m über dem Erdboden. Es war ähnlich wie das Hänflingsnest gebaut, nur etwas kleiner. Der Brutnapf war mit Roßhaaren und roten Wollfäden ausgepolstert. Als ich das Nest entdeckte, waren die vier Jungen schon ziemlich groß. Das Weibchen fütterte sie gerade. ♂ und ♀ fütterten die Jungen abwechselnd. Nach zwei Tagen waren die Jungen ausgeflogen. — Ein Grünfinkenpaar hatte sich in einem von Kletterrosen gebildeten Torbogen häuslich niedergelassen. Es hatte sein Nest auf ein vor neun Tagen verlassenes Hänflingsnest gebaut. Außen bestand es aus Moos, Halmen und Würzelchen. Innen war es mit feinen Wurzeln, Roßhaaren und etwas Wolle ausgefüttert. Innerhalb von sechs Tagen wurden sechs bläulichweiße, etwas ins Rötliche übergehende, mit dunkelbraunroten Tupfen sparsam besprengte Eier in das Nest gelegt. Ich konnte nur beobachten, daß das Weibchen brütete; aber es ist nicht ausgeschlossen, daß das Männchen sich manchmal am Brutgeschäft beteiligt. Nach 14 Tagen schlüpften die Jungen aus. Die Alten kommen immer gemeinsam zum Füttern. Nach 13 Tagen verließen vier Junge und am anderen Tag auch die beiden anderen das Nest. Am Anfang des Brütens verließ das Weibchen 10—15 Minuten lang in gewissen Zeiträumen das Nest, ohne daß nun das Männchen das Brüten übernahm. Das war aber nur in den ersten fünf Tagen und auch nur bei guter Witterung. — In einer Ecke des Gartens, wo ich das Laub liegen ließ, hatte ein Nachtigallenpaar sein Nest in einem niedrigen Busch 10 cm über der Erde gebaut. Es war aus altem Laub, Halmen und Wurzeln erbaut. Der ziemlich tiefe Napf war mit feinen Hälmchen, Roßhaaren und feinen Wurzeln glatt und sauber ausgelegt. Ich fand das Nest mit vier blaugrünen Eiern am 11. Juni. Am 14. waren drei Junge, am nächsten Tage das vierte aus den Eiern geschlüpft. Die Alten waren wenig scheu, und ich konnte sie gut beim Füttern beobachten. Beide Vögel fütterten die Jungen gemeinsam. War einer früher da als der andere, so wurde gewartet, bis der andere kam, das kann aber seine Ursache darin haben, weil sie merkten, daß sie beobachtet wurden. Als ich wieder einmal das Nest mit den Jungen beobachtete, raschelte es in dem Laub, und ein großes Wiesel huschte in dem Gebüsch hier- und dorthin, schließlich kam es in die Nähe des Nestes, schnupperte und verschwand in einem Reisighaufen. Am 26. verließen die Jungen das Nest. Nun waren die Alten ängstlich um ihre Kleinen besorgt. Sobald sich jemand in der Nähe zeigte, warnten sie laut tack tack oder huitknarr. Ich hoffte, daß sie dieses Jahr wieder brüten würden, und es hat sich auch erfüllt.

Über Wellensittichzucht.

Von Dr. Bilfinger, Schwenningen.

(Nachdruck verboten.)

Bisher pflegte ich immer meine jungen Wellensittiche dann aus den Heckkäfigen herauszufangen, wenn die Jungen der folgenden Brut zirka 14 Tage alt waren. Das sollte sich in diesen Tagen bitter rächen. Mittags heimgekommen fand ich in einem meiner Heckkäfige eines meiner besten gelben Zuchtweibchen, abgekämpft, und Blutflecken am Kopfe vor, im übrigen aber munter, ohne schwere Verletzung. In seinem Kasten schlüpfte ein noch grauköpfiges Weibchen der vorhergehenden Brut aus und ein; es war mit Blut über und über beschmiert. Die sofortige Kontrolle des Kastens ergab, daß die vier darin befindlichen zirka 10 Tage alten Jungen auf bestialische Weise hingemordet waren, Köpfe zerbissen und skalpiert. Bei meinem Weggang morgens waren die Jungen alle noch munter und unversehrt; ich hatte auch da kontrolliert. Im Käfig hatte bis dahin scheinbar tiefster Friede geherrscht. Nachmittags, als ich gerade vor dem Käfig stand, stürzte die gelbe Mutter, ein erprobter guter Zuchtvogel, plötzlich vor meinen Augen tot von der Stange — ein Herzschlag hatte ihrem Leben ein Ende gemacht, wohl infolge der erlittenen Aufregung, gewaltsamen Brutunterbrechung und Gram.

Folgerung: Junge gehören, sofort, wenn selbständig, rücksichtslos aus den Heckkäfigen heraus. Die brütenden Weibchen lassen sich durch das Herausfangen nicht stören. Es ist einfach unverständlich und widerspricht jeder Ordnung der Dinge, wie bald sich bei den jungen Wellensittichen der Geschlechts- und Nesttrieb regt!! —

Man kann nicht genug betonen, daß die erste Bedingung bei der Wellensittichzucht, abgesehen von peinlicher Reinlichkeit, in dauernder, sorgfältigster Überwachung der Gesellschaft besteht. Und auch diese kann versagen, da sich die unglaublichsten, meist mit Verlust endigenden Zwischenfälle, häufig geradezu blitzartig abspielen. Ich könnte noch manches derartiges anführen; doch ist dies der erste Fall, in dem ich mit meinem Eingriffe zu spät kam. Selbst gutartige Weibchen pflegen beim Wurfwechsel leicht bösartig zu werden und versuchen andere besetzte Kästen zu erobern.

Nun entschließt man sich schwer, einen guten Heckvogel herauszufangen. Da hatte ich im vorigen Jahr des öfteren glänzende Erfolge dadurch erzielt, daß ich den Bösewicht, allemal, wenn er Angriffe versuchte oder sich in den fremden Kästen einschleichen wollte, mit lauem Wasser windelweich spritzte. Nach zwei oder drei solcher Kuren weiß der Vogel, was verboten ist, und meidet den Kasten wie Feuer, legt brav sein Ei in einen unbesetzten oder seinen alten Kasten. Dann ist er gewonnen: Ich habe auch die Beobachtung gemacht, daß Weibchen, die schon ziemlich große Junge haben, sich ziemlich indifferent gegen andere Weibchen verhalten, die in ihren Kasten eindringen wollen. Folge ist dann leicht tötliche Mißhandlung der Jungen durch die fremde Mutter. Bösartig oder zu ernster Verteidigung bereit ist das Wellensittichweibchen in erster Linie dann, wenn es am Legen ist, oder kleine Junge hat.

Auf Grund vieler solcher übler Erfahrungen züchte ich schon längst Wellensittiche immer zu zwei Paaren in Einmeterkäfigen. Und selbst da hat man dauernd acht zu geben, und der Überblick ist viel leichter, die individuelle Unterscheidung der einzelnen Weibchen ebenso. Frisch ausgeflogene Junge wären mir dieses Jahr wiederholt getötet worden von anderen Weibchen, wenn ich sie nicht sofort entfernt und in andere Käfige gesteckt hätte, wo sie sofort weiter gefüttert wurden. — Oft gibt es Fälle, wo es nur bei längerer Erfahrung möglich ist, eine sich vorbereitende oder schon im Fluß befindliche Katastrophe rechtzeitig zu bemerken.

Staffelschwanzfliegenschnäpper (s. S. 85).

Kleine Mitteilungen.

Sammeln von Ameisenpuppen nach dem in den Büchern meist angegebenen Verfahren, einen leeren Blumentopf auf den Ameisenhaufen zu stülpen, damit die Ameisen die Puppen unter diesen legen, ist zu umständlich und zu wenig ergiebig. Auch die anderen Verfahren scheinen mir weniger einfach als das von mir geübte. Ich bediene mich dabei zweier Siebe, die ineinander passen. Das größere Sieb besteht aus einem viereckigen Holzrahmen aus 1 cm starken Leisten. Es ist 60×30 cm und 8 cm hoch. Das zweite Sieb paßt in dieses hinein. Das Drahtgeflecht des größeren Siebes ist so eng, daß die Ameisenpuppen nicht hindurchfallen können, während das kleinere mit einem Drahtgeflecht bespannt ist, durch welches die Puppen hindurchfallen können. Für die ersten großen Ameisenpupen mußte ein drittes Sieb vorhanden sein, das auch diese durchläßt. Nötig ist dann noch eine handliche Gabel,

ähnlich einer Dunggabel, und ein Paar Gummihandschuhe, welche die Hände vor den Bissen der Ameisen schützen, eine Handtasche zum Transport der Puppen und ein größeres möglichst weißes Tuch. Am Ameisenhaufen angelangt, macht man mit der Gabel den Haufen behutsam auseinander, bis man an die „Nester", die Lagerplätze der Ameisenpuppen, gelangt. Man nimmt nun vermittels der Gabel die Puppen mit möglichst wenig Streu heraus, schüttet sie in das kleine Sieb, welches über dem großen steht, und siebt sie aus. Die grobere Streu bleibt in dem Sieb, die Puppen mit der feinen Streu, die man wiederum durch Schütteln des Siebes entfernt, befinden sich im zweiten Sieb schon ziemlich rein. Um die Puppen ganz sauber zu bekommen, breitet man am Waldrand das Tuch aus und läßt die Puppen nun aus dem hochgehaltenen Siebe allmählich in das Tuch herabfallen. Was jetzt noch an Spreu und dgl. zwischen den Puppen ist, wird vom Wind fortgenommen. Auf diese Weise ist die Ameisenpuppenernte ergiebig und geht schnell vonstatten. Ich sammele auf diese Weise an jedem Sonntag genügend Puppen, um 22 Weichfresser damit eine Woche hindurch zu erhalten. Es ist selbstverständlich, daß man die geöffneten Ameisenhaufen wieder sorgfältig in Ordnung bringt.

Robert Thiele, Altona.

Papageienraub im Zoo. Der Berliner Zoologische Garten wird seit einiger Zeit von Dieben heimgesucht, die es besonders auf das Vogelhaus abgesehen haben. Bereits vor einiger Zeit wurden aus einem Käfig zwei Papageien, sogenannte Blaustirnamazonen, gestohlen. Die Diebe hatten die Gitter des Käfigs durchschnitten und auf diese Weise die wertvollen Tiere herausgeholt. Am 7. April, abends zwischen 7 und 8 Uhr, kurz vor Schluß des Betriebes, wurde wiederum ein Einbruch in das Vogelhaus verübt. Die Verbrecher knipsten, anscheinend mit einer scharfen Drahtzange, die Vergitterung durch und stahlen vier Papageien, und zwar eine Mülleramazone und zwei Farinosa-Blaubartamazonen und eine Fastivaamazone, die einen gelben Nacken hat. Die geraubten Papageien gehören mit zu den schönsten Tieren ihrer Art, die der Berliner Zoo aufzuweisen hatte, und haben außerordentlich großen Seltenheitswert. Alle sind gute Sprecher. Die Polizei hat die Ermittlung nach den Tätern aufgenommen, ohne jedoch von ihnen bisher eine Spur zu entdecken. Es ist nicht ausgeschlossen, daß es sich um Spezialisten handelt, die die Papageien nach dem Ausland verkaufen wollen. Vor dem Ankauf der Tiere wird gewarnt.

Sprechsaal.

(Steht den Abonnenten kostenlos zur Verfügung.)

Wenn bei meinen Vögeln **Legenot** eintritt, stecke ich das Tier in eine alte gut erwärmte Kaffeemütze und bringe dieselbe in den Bratherd, welcher etwa 30 Grad Wärme enthalten muß. Dort lasse ich den Vogel 1—2 Stunden ruhig liegen. In dieser Zeit ist das Ei sicher zutage gekommen, und der Vogel befindet sich wohl und munter. Die Prozedur mit dem kalten Wasser will mir nicht recht gefallen, sie verursacht nach meiner Ansicht nur große Qual. Früher hielt ich den Vogel so über Dampf, daß die Wärme direkt den Unterleib traf, aber eine ganze Stunde und mehr das Tier in solcher Lage zu halten, ermüdet sehr. Die alte Kaffeemütze besorgt das Geschäft viel bequemer und sicherer, da der Vogel dabei nicht unnötig geängstigt wird. Es kann ja auch leicht ein Körbchen mit Watte und einer Wattedecke darüber benutzt werden.

Eduard Spille, Mitgl. 83 der A. Z., Oldenburg i. Gr.



Bücher- und Schriftenschau.

Vogelleben und Vogelschutz (Schilderungen aus der Sing- und sonstigen Kleinvogelwelt). Allen, besonders der Jugend und ihren Erziehern zugeeignet von (O. v. Riesenthal). Dritte gänzlich umgearbeitete, vermehrte, mit 73 Abbildungen versehene Auflage von Eberhard von Riesenthal (Verlag von J. Neumann, Neudamm). 8/141 S.

Seit Jahren war die kleine Schrift Otto v. Riesenthals vom Büchermarkt verschwunden. Der Sohn des Verfassers hielt es für geboten, angesichts der üblen Folgen des Krieges und der Nachkriegszeit, die sich leider auch bei unserer Jugend nur allzusehr bemerkbar machen, die von Herzen kommenden und zu Herzen gehenden Worte des Vaters der Jugend und den Lehrern der Jugend wieder zugänglich zu machen. Veraltetes und durch neuere Beobachtungen Überholtes wurde ausgemerzt. Zusätze waren notwendig, um den heutigen Anforderungen, welche an eine solche Schrift zu stellen sind, zu genügen. Der Kern und der Geist der Schrift sind geblieben. Neu hinzugekommen sind die Abschnitte über den Vogelzug und den praktischen Vogelschutz sowie die Abbildungen.

Vom Vogelmarkt.

Von seltener auf den Vogelmarkt kommenden Vögeln werden angeboten:

C. B. G., Geschäftsstelle der „Ges. Welt": Kubafinken, grünb. Sperlingspapageien, Edelsänger, Mossambikzeisige.

K. Durau, Duisburg, Musfeldstr. 6a: 1,0 Gelbsteißbülbül, 1,0 kl. Beo.

A. Krabbe, Anklam, Demminer Str. 10 (A. Z.-Mitgl. 14): 1,0 Rosenpapagei, 2,1 Braunrückengoldsperling (e. Z.), 0,1 blausedr. Wellensittich.

S. Lichtenstaedt, Berlin-Johannisthal, Nieberstraße 10: Tarant. Inseparables, 2 Zuchtpaare.

Marschallek, Lübeck, Lützowstraße 21, tauscht 1,0 Isabell (rein) 23. gegen rein gelben Zuchthahn, 1,0 Münchner Holländer gegen dito Weibchen.

Willi Reichel, Dresden-Briesnitz, Gottfried-Keller-Str. 7: Stieglitzbastard, Zucht 1923.



Herrn F. W., Hamburg 33. Nach der gar zu allgemein gehaltenen Beschreibung ist es mir unmöglich, die Vögel zu bestimmen. Ich bin gern bereit, Ihren Wunsch zu erfüllen, wenn Sie einen der Vögel an mich senden.

Herrn Dr. F., München: Beiträge dankend erhalten.

Herrn A. S., Liegnitz. Im Kropf des jungen Mövchens befand sich ein Gemenge von Eigelb und trockenen Ameisenpuppen. Letztere lagen besonders dicht vor dem Kropfausgang, so daß dieser verstopft war und keine Nahrung in den Magen gelangen konnte. Infolgedessen mußten die jungen Vögel eingehen.

Herrn M. L., Bingen. Ihr Wunsch wird erfüllt werden.

Herrn G. B., Nassau. Die meisten Sittiche sind zur Brutzeit bösartig, wenn sie paarweise gehalten werden. Wellen-, Nymphensittiche können mit den wenig gewandten Plattschweifsittichen zusammen gehalten werden. Singsittiche vertragen sich nicht mit Wellensittichen. Edelsittiche (Alexander usw.) sind zur Brutzeit meist sehr bösartig. Die kleineren Arten könnten wohl mit andern gehalten werden. Die Keilschwanzsittiche sind für die Zwecke geeigneter. Die großen sind nicht sehr gewandt, daher kleineren Vögeln ungefährlich. Die kleineren Arten sind recht beweglich und es kann wohl vorkommen, daß sie einmal einem andern Vogel die Beine zerbeißen. Gut ist es, bei diesen möglichst gleichgroße Arten zusammenzuhalten.

Herrn Fr. H., Berlin. Der Stieglitz ist infolge von Abzehrung eingegangen.

Herrn H. W., St. Wendel. „Sukakadu" in dem Inserat war ein Druckfehler. Es muß heißen „Inkakadu". — „Schizochroismus" heißt Farbenspaltung, Farbentrennung. Bei einem grünen Vogel befindet sich in der obersten Rindenschicht der Federstrahlen und -strählchen ein gelber Farbstoff. Durch das Zusammenwirken dieses Farbstoffs mit einem darunter liegenden schwärzlichen und der Struktur der Feder entsteht die grüne Gefiederfärbung. Fehlt der gelbe Farbstoff, so erscheint der Vogel blau.

(Fortsetzung auf der 3. Umschlagseite.)

Aus den Vereinen.

Angemeldet sind die Herren: Karl Beyer, Rechnungsrat, Eisenach, Emilienstr. 12; Martin Bock, Berlin-Halensee, Katharinenstr. 9; Hermann Reisener, Mühlenrahmede i. Westfalen. — Da der Dampfer „Urundi" mit 80 Kisten Vögeln voraussichtlich am 15. Mai in Hamburg einlaufen wird, so hat Herr Fockelmann die Mitglieder zum Sonntag, den 18. Mai, für eine Besichtigung eingeladen. Ich bitte die angemeldeten Mitglieder davon Kenntnis zu nehmen. Programm folgt rechtzeitig. A. Krabbe.

Verein der Vogelliebhaber zu Lübeck. Generalversammlung vom 7. April 1924. Um 8½ Uhr eröffnete der Kassenführer, Herr M. Wischendorf, an Stelle der beiden leider verstorbenen Vorsitzenden die Versammlung. Er gedachte in kurzen Worten des 2. Vorsitzenden Herrn Robert Steinhagen, der nun auch dem erst kürzlich verstorbenen 1. Vorsitzenden Herrn Rud. Strehle in den Tod gefolgt sei. An Stelle des dieses Mal ausscheidenden ganzen Vorstandes wurden gewählt: Max Wischendorf, 1. Vorsitzender; Adolf Steinhagen, 2. Vorsitzender; Hermann Bösel, Schriftführer; Fritz Marschallek, Kassenführer; Johs. Erbe, Inventarverwalter; Platthoff und Frank, Beisitzende. Der Schriftführer erstattete dann einen kurzen Jahresbericht. Es wurde hierauf einstimmig beschlossen, in diesem Jahre wieder eine Ausstellung abzuhalten. Der Beitrag für das Jahr wurde auf 8 M. festgesetzt. In der Sammelbüchse befanden sich 2,77 M. Hierauf wurde die von 17 Mitgliedern besuchte Versammlung um 10½ Uhr geschlossen.
Hermann Bösel, Schriftführer, Lübeck, Adolfstraße 13.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig. Vereinssitzungen jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat im Vereinslokal, „Bauers Brauereirestaurant", Täubchenweg. Nächste Sitzung Donnerstag, den 1. Mai 1924. Gäste stets willkommen.
J. A.: Johann Birk, 1. Vorsitzender.

Anzeigenteil

Die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 20 G.-Pf. berechnet. Aufnahme erfolgt gegen Voreinsendung des Betrages in Reichsgeld per Brief od. auf unseren Zahlstellen: Postscheckkonto: Magdeburg 3148, Wien 156 687, Bern III 4326, Prag: Creditanstalt d. Deutschen unter Angabe des Zweckes.

Futtermittel

Vogelfutter [323
für Kanarien, Waldvögel, Exoten, Papageien, Weichfresser. Anfragen nur gegen Rückporto. Liste 13 über Vogelfutter, Liste 5 über Vogelkäfige, Zuchtgeräte usw. mit etwa 400 Abbild.
W. Göpel, Leipzig,
Tröndlinring 1. Telephon 14 958.

Mehlwürmer
prg. Einsend. v. 2.— Rentenmark ¼ Pfd. franko versend. **D. Waschinski & Co.,** Biesenthal I (Mark). [324

Vögel

Suche [325
0,1 Schama.
U. J. Beumée,
Groningen (Holland).

Gebe ab od. vertausche
je 1,0 Bandfink, Amarant, Schmetterlingsfink und 0,1 Atlasfink. [326
Paul Beling, Rudolstadt i. Thür., Roonstraße 9 I.

Tausche
1 Möwchen, braunbunt, geg. 2 Kanarien, gelb, postfrei gegen postfrei. [327
K. Demmel, Dietfurt / A. (Bayern).

0 tarant. Unzertrennliche
abzugeben. Suche zuchtfähiges [328
Möwchen (Weibchen).
Eduard Schütze, Eystrup (Weser).

Habe 0,4 gelbe und 0,2 Isabell-Kanarien
in, geschlossener Fußring 23, zu verlaufen oder zu verkaufen. [329
L. Knapp, Lübeck, Eschenburgstr. 16 II.

Schamawbch., zuchtf., k. Jgt. v. 1923, zu k. Direkt. Wucherpfennig, Artern. [330

P. Burghard, Dresden 29
Pennricher Straße 40.



Fabrikation **praktischer Vogelkäfige.** Speziell
Weichfresserkäfige.
Anfertigung von **Käfigen, Volieren usw.** nach allen Angaben in nur saubersten, solider und fachmännischer Ausführung bei billigster Berechnung. [331
Ia Referenzen. Goldene Medaille.

H. Fockelmann,
Hamburg 6
Catharinenstraße 25.
Postscheckkonto: **Hamburg 9632.** [332

Sämtliche Sämereien sind in eigener Anlage maschinell gereinigt und nicht mit üblicher Handelsware zu vergleichen.

	1 Postpaket franko inkl.
Scharpie, weiß	13.50 M
Erdnüsse	5.40 M
Hanfsamen	4.20 M
Hafer, geschält	3.30 M
Hirse, gelbe Ia	3.— M
Hirse, gelbe (Rückenfutter)	2.60 M
Hirse, geschält	3.— M
Hirse, Senegal	4.20 M
Hirse, weiße	9.40 M
Kanariensamen (Glanz) großkörnig, Marokko	4.40 M
Kanariensamen, holländischer	3.90 M
Karottengrieß	11.40 M
Leinsamen	4.20 M
Mohn, blau, prima	6.20 M
Negersamen	4.40 M
Rübsamen, prima	4.40 M

	1 Postpaket franko inkl.
Rübsamen, II	4.20 M
Sonnenblumenkerne	4.— M
Zirbelnüsse	6.40 M
Elbsand, gesiebt	2.50 M
Ossa-Sepia, bis 10 cm 10 Stück	0.40 M
Ossa-Sepia, 10—12 cm 10 Stück	0.65 M
Singfutter	4.40 M
Papageienfutter	4.40 M
Waldvogelfutter	4.40 M
Stiegl.- u. Zeisigfutter	5.40 M
Prachtfinkenfutter	4.40 M
Sittichfutter	4.40 M
Weichfutter für Insektenfresser mit Ameiseneiern	9.40 M
Weichfutter für Insektenfresser	6.80 M

Angebot freibleibend. Versand gegen Vorauszahlung, auf Wunsch per Nachnahme. Bestellungen unter 2½ kg von einer Sorte werden nicht ausgeführt (Sepia und Ameiseneier ausgenommen). Ausführliche Preislisten kostenlos.

Schamadrosseln, prima Sänger 60—70 M, **Purpurrote Kardinäle** 45 M, **Rotgehäubte Kardinäle** 15 M, **Dajaldrosseln** 45 M, **Purpurtangaren** Paar 45 M, **Abessin. Glanzstare** 20 M, **Goldaugentimalien** 35 M, **Rotohrbülbüls** 30 M, **Indische Wanderelster** 35 M, **Weißscheitelpfäffchen** Paar 15 M, **Weißkehlpfäffchen** Paar 15 M, **Safranfinken** Paar 10 M, **Graupapageien** 125—150 M, **Blaustirn-Amazonen** 60 M, **Zwergara,** Marak. 40 M, **Sperlingspapageien** Paar 16 M empfiehlt [333
Kleinerts Tierhandlg.,
Berlin NO 18,
Strausberger Straße 13.
Fernruf Alexander 3313.

Aus Platzmangel
habe abzugeben:
1,0 Wellensittich, 1½ jährig, 7 M,
1,1 Wellensittiche, garantiert gutes Zuchtpaar, zusammen 20 M,
2 Paar blaubürzlige Sperlingspapageien, à Paar 17 M,
1,1 Dompfaffen, erprobtes Zuchtpaar, zusammen 9 M,
mehrere japanische Möwchen und Zebrafinken eigener Zucht, sehr kräftige Vögel, Stück 8 M. [334
Bernd Regge, stud. iur.,
Lötzen in Ostpreußen. A. Z.-Mtgl. 264.

Suche zu kaufen:
8,8—10,10 grüne Wellensittiche, große, kräftige, gesunde Tiere, blutsfremd. Angebote an [335
Friedr. Lange, Wiesau, Kr. Glogau.

Gould-Amandinen
(oder sonstige Amandinen),
1 Pärchen, möglichst zutraulich, zu kaufen gesucht. Porto und Spesen für gefl. Zuschriften werden postwend. vergütet.
Otto Böneker,
Hannover, [336
Rambergstraße 36 A II.

Gebe ab:
1,0 Blauwangen-Blattvogel 60 M.
Suche:
2 Schamakäfige,
gut erhalten. [337
S. Lichtenstaedt, Berlin-Johannisthal, Nieberstraße 10.

Preislisten,

auch über Kücken, Legehühner, Zwerghühner, nur gegen Rückporto. [338
Emmy Vost, Köln, Merlostraße 23.

Wer verhilft [339

jungem Lehrer mit bestem Zeugnisse — Vogelliebhaber — zu einer Stellung als Hauslehrer, Privatsekretär oder zu einer and. passend. Beschäftigung? Gefl. Angeb. unt. L. W. a. d. Geschäftsst. d. „Gef. Welt."

28 jähriger märk. Vogelliebhaber
ersehnt

Idealehe

mit gemütv., naturliebend. in- od. ausld. Dame. Zuschriften mögl. m. Bild an **Fritz Domke,** Fürstenberg a. Oder, Kohlenwerke, erbeten. [340
(Diskr. u. Bildrückfdg. ehrenwörtl. zugesichert!)

Naumann XII 20 *M.* **Neumeister,** Taubenzucht 10 *M.* **Wurm,** Auerwild 6 *M.* **Brehm,** Die Vögel, 3 Bde, 36 *M.* **Finsch und Hartlaub,** Ornithologie der Viti-, Samoa- u. Tonga-Inseln. 14 kol. T. 12 *M.* **Haacke-Kuhnert,** Tierleben der Erde. Viele farb. T. u. Abb. 3 Bde. 75 *M.* **Hartlaub,** Vögel Madagascars 11 *M.* **Meyer u. Wolf,** Taschenb. d. deutschen Vogelkunde, 3 Bde, 45 *M* (Seltenheit). **Michelet,** Die Welt der Vögel. III. 8 *M.* **Riesenthal,** Raubvögel Deutschlands, 60 farb. T. 45 *M.* **Marshall,** Tiere der Erde. 3 Bde. Zahlr. farb. T. 45 *M.* Prismenglas sechsfach 60 *M.* [341

E. Albrecht,
Bischofswerda (Sachsen).

Austausch-Zentrale! [342]

Welch gleichgesinnter Vogelliebhaber beabsichtigt mit mir in **Austauschverkehr einheimischer und ausländischer Vögel und Zeitschriften** zu treten?
Syré, Lehrer, **Biernau i. Thür.**

Für Kanarienzüchter!

Der Kanarienvogel,

seine Naturgeschichte, Pflege u. Zucht von Dr. Karl Ruß. 14. Auflage. Mit 2 Farbentafeln und zahlreichen Textabbildungen. Bearbeitet von Karl Neunzig.
Kart. 2.50 M.

Die Bastardkanarienvogelzucht,

Von Walter Barth. Mit 20 Abbildungen und 1 Tondrucktafel. 1.50 M.

Der Kanariengesang.

Allgemeinverständliche sowie musikalische und phonetische Darstellung von W. Kluhs
1.00 M.

Zu beziehen durch:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg.
Postschließfach 148.

Zur gefälligen Beachtung!

§ 3 des am 1. September 1908 in Kraft getretenen „Vogelschutzgesetzes" lautet:

> In **der Zeit vom ersten März bis zum ersten Oktober** ist das Fangen und die Erlegung von Vögeln sowie der Ankauf, der Verkauf und das **Feilbieten,** die **Vermittlung** eines hiernach verbotenen An- und Verkaufs, die Ein-, Aus- und Durchfuhr von lebenden sowie toten Vögeln der **in Europa einheimischen** Arten überhaupt, ebenso der Transport solcher Vögel zu Handelszwecken untersagt.
>
> Dieses Verbot erstreckt sich für **Meisen, Kleiber, Baumläufer, Spechte, Eulen** und **verschied. Falken** für das **ganze Jahr.**

Auf Grund dieses können wir vom **1. März an** Inserate betreffend **Kauf** und **Verkauf einheimischer** Vögel nicht mehr zum Abdruck bringen und bitten, dies bei Aufgabe von Inseraten berücksichtigen zu wollen.

> Unter Feilbieten ist das Anbieten zum Kaufe oder zu **sonstigem Erwerbe** zu verstehen. Somit ist ein strafbares Feilbieten auch dann anzunehmen, wenn in einer Anzeige zwar dem Wortlaut nach ein **Tausch** angeboten wird, der Anbietende aber tatsächlich zu kaufen bzw. zu tauschen beabsichtigt und die Form des Tauschangebots nur wählt, um sich gegen strafrechtliche Verfolgung zu sichern. In solchen Fällen machen sich sowohl die anzeigenden Personen wegen verbotenen Feilbietens als auch die die Anzeigen veröffentlichenden Zeitungsunternehmer der verbotenen Vermittlung eines An- und Verkaufs strafbar.

Bei Tauschanzeigen ist ausdrücklich anzugeben, was als Gegenleistung geboten oder gesucht wird. Eine Angabe des Wertes der zum Tausch angebotenen Vögel darf nicht erfolgen! Unter Chiffre können derartige Anzeigen nicht aufgenommen werden!

Die Geschäftsstelle der „Gefiederten Welt"
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Soeben erschien:

Titel und Inhaltsverzeichnis
zur
„Gefiederten Welt" 1923

Die alten Abonnenten des Jahres 1923 erhalten **auf Wunsch** ein Stück postfrei zugestellt. **Einbanddecken für 1923** stehen ebenfalls (1.50 *M* und Porto) zu Diensten.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg
(Postscheckkonto: Magdeburg 3148)

Bitte!

In eigenem Interesse wollen die pp. Einsender beachten, daß

a) **alle für die Redaktion** der „Gefiederten Welt" bestimmten **Zuschriften** (Sprechsaal-Anfragen und -Antworten, Vereinsnachrichten usw.) und **Sendungen** (tote Vögel, Manuskripte) nur an **Herrn Karl Neunzig, Hermsdorf bei Berlin,** Neue Bismarckstr.,

b) **alle Bestellungen** auf **Abonnements, auch vom Ausland, nur durch die Post,**

c) **Inserate** und dergl. Geschäftliches nur an die **Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg,** Postschließfach 148,

zu richten sind.

Für die Abonnenten der „Gefiederten Welt" ist der heutigen Nummer die Kunstbeilage **„Deutsche Meisen"** beigefügt.

Der billige „Brehm".

Demnächst erscheint **Brehm's Tierleben in Auswahl** herausgegeben und bearbeitet von C. W. Neumann in 6 Leinen-Bänden zu je *M* 5.— oder in 6 Halbleder-Bänden zu je *M* 7.50. Jeder Band mit 150 Bildtafeln und über 600 Seiten Text. Die ersten drei Bände sind bis Ende Mai, Band 4—6 im Herbst dieses Jahres lieferbar. Band 1—3 enthalten die Säugetiere, Band 4 und 5 die Vögel und Band 6 Kriechtiere, Lurche und Fische. (Einzelne Bände können nicht abgegeben werden.) Bestellungen schon jetzt erbeten.

Die allzu gründliche Umarbeitung des großen „Brehm" hat von der ursprünglichen Form mit seinen klassischen Schilderungen und dem starken Persönlichkeitszauber Brehms wenig übergelassen. Die neue Ausgabe stellt den Urtext wieder her. Alles wissenschaftlich Einwandfreie ist aufgenommen und so ein Volksbuch im Sinne Brehms, mit seiner herrlichen Sprache und seiner ungemein fesselnden, dramatisch bewegten Schilderung, geschaffen. Prächtige Naturaufnahmen unterstützen wirksam den Text. Brehms unsterbliches Lebenswerk ist eine unversiegliche Quelle des Genusses und der Belehrung. **Ich verschicke auf Wunsch umsonst und postfrei eine reich mit Bildern geschmückte Inhaltsangabe.**

Alfred Troschütz,
Buchhändler und Antiquar, [343
Hannover, Große Aegidienstraße 4.

Wir sind beauftragt worden, folgende

Seltenheiten

anzubieten:

Gefiederte Welt. I. Jahrgang 1872—1923 außer 1904, 1910, 1911. Fast alles gebunden (11 Jahrgänge in Heften).
Journal f. Ornithologie. II. Jahrgang. 1854—1904 außer 1870 bis 1872. Es fehlen in älteren Jahrgängen einige Tafeln sowie in 1869 ein Bogen. Dazu gehörig: Ornithologisches Zentralblatt. I. Jahrgang 1876—1882. Komplett. Zum großen Teil gebunden.
Ornithologische Monatsschrift. I. Jahrgang. 1876—1879, 1883 1899, 1901—1922. Zum großen Teil gebunden.
Zeitschrift für Oologie. I. Jahrgang. 1911. Komplett.
Ornitholog. Rundschau. I. Jahrgang 1905. Komplett.
Zeitschrift für Oologie und Ornithologie. XV. Jahrgang. 1905—1910, 1912, 1920, 1921. Komplett. Von Jahrgang 1911, 1912, 1913, 1914, 1923 fehlen diverse Hefte.

Lieferbarkeit freibleibend — Irrtum vorbehalten. Liebhaber, die sich bewußt sind, daß derartige Seltenheiten I. Ranges einen angemessenen Preis erfordern, wollen sich mit uns in Verbindung setzen. Die einzelnen Reihen können nur in sich geschlossen abgegeben werden.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung
Magdeburg Postschließfach 148.

Inserate

für das am 8. Mai 1924 zur Ausgabe gelangende Heft 12 der Gef. Welt erbitten bis 3. Mai 1924 früh

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Hermsdorf bei Berlin; für den Anzeigenteil: Rolf Kretschmann, Magdeburg, Postschließfach 148.
Verlag der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck: August Hopfer, Burg Bz. Mgdbg.

Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Jahrg. 53 | Den 8. Mai 1924 | Heft 12

(Druckort: Burg, Bezirk Magdeburg.)

Von meinen Rosenpapageien!

Von Dr. Bilfinger, Schwenningen a. N.

(Nachdruck verboten.)

Nach den interessanten Ausführungen des Herrn Schütze über seine Rosenpapageien möchte ich auch einiges über mein Pärchen berichten. Zunächst sei mir gestattet, dem, was in der Literatur (Handbuch Karl Ruß, Dr. K. Ruß' Vogelzuchtbuch, Neunzig, Die fremdländischen Stubenvögel, Brehms Tierleben) zu finden ist, einiges beizufügen, was ich von anderen Züchtern erfahren habe:

Er kommt in großen Massen, zu Tausenden, im Innern unserer früheren deutschsüdwestafrikanischen Kolonie vor und treibt sich dort in großer Zahl auch in unmittelbarer Nähe der Farmen herum; um sich seiner zu erwehren, wird er von den Farmern durch Auslegen von Strychninwasser bekämpft. Seine Nistzeit soll hauptsächlich in die Regenzeit fallen; diese Tatsache sowie die ebenfalls feststehende Tatsache, daß er gemeinsam mit Webern (Mahaliweber) und Siedelsperlingen nistet und deren Nester benutzt — er treibt sie wohl hinaus wie bei uns die Turmschwalbe den Star —, sind wahrscheinlich, wie wir später sehen werden, für die Praxis bei seiner Züchtung von Belang. Wir müssen es jedenfalls mit größtem Bedauern empfinden, daß der Bestand dieses reizenden kleinen Papageis durch Vergiften, wenn vielleicht auch notgedrungen, über kurz oder lang erheblich vermindert werden wird, um so mehr, als anstatt dessen es vielmehr am Platze wäre, größere Mengen der Tierchen mit Schlagnetzen zu fangen und dem europäischen Markte zuzuführen. In Anbetracht der dortigen klimatischen Verhältnisse, des Steppencharakters dieser Gebiete mit verhältnismäßig wenig Wasserstellen dürfte das ähnlich wie in Australien nicht zu schwierig sein. Außerdem dürfte auch der Abtransport, da es sich doch vielfach um von Europäern besiedelte Gebiete handelt, nach der Küste mit gut überwindlichen Schwierigkeiten verknüpft sein, im Gegensatz zu den nördlicher gelegenen im Innern kaum kultivierten Gebieten Äquatorialafrikas. Betrübend wäre es auch, wenn es richtig wäre, daß die südafrikanische Regierung eine Bill in Vorbereitung hat, nach der Vögel zu Handelszwecken nicht mehr exportiert werden sollen; zum mindesten hätte eine solche Maßnahme eine noch ganz erhebliche weitere Verteuerung zur Folge. Hier möchte ich auch aufmerksam machen auf einen kleinen reizenden Roman von Hans Antonk Aschenborn „Jean und Piet, die Rosenpapageien" in seinem „Onduno und andere afrikanische Tiergeschichten", Kosmosverlag, Stuttgart.

Was seine Züchtbarkeit anlangt, so sei gleich verraten, daß es mir ebenso ging wie Herrn Schütze; mein Pärchen hat mich mit vier Fehlbruten geärgert, und was sie für 1924 im Schilde führen, weiß ich heute noch nicht. Im übrigen habe ich erfahren, daß er sowohl in England als auch in Frankreich von verschiedenen Liebhabern sehr ergiebig gezüchtet wird, und ein kürzlich verstorbener Zahnarzt in Paris soll ihn in Mengen gezogen haben. Aus Südafrika selbst sollen außerdem dort gezüchtete ebenfalls ausgeführt werden. Meine Erfahrungen, die ich mit dem einen Paar gemacht habe, lehren mich, daß seine Vermehrungskraft eine außerordentlich große und nur mit der des Wellensittichs zu vergleichen ist, und daß seine erfolgreiche Zucht nicht allzu schwierig zu erreichen sein sollte. Geduld, sackweise, ist auch hier die Hauptsache und schärfste Beobachtung, Feststellung aller Möglichkeiten, die den Erfolg vereitelten.

Die Unterscheidung der Geschlechter ist bei meinem Paar, welches ebenfalls aus dem Fockelmannschen Transport Februar 1923 stammt, sehr gut möglich: das Rosa des Weibchens ist, namentlich bei der Betrachtung aus einiger Entfernung, deutlich blasser als das des Männchens. Auch jeder fremde Besucher erkennt dies sofort. Beide Tiere sind gleich groß. Trotzdem gebe ich zu, daß dies durchaus nicht immer so sein muß; wahrscheinlich verhalten sich importierte und gezüchtete und auch Tiere aus verschiedenen Nestern bezüglich der Färbung verschieden. Ausschlaggebend dürfte in der Mehrzahl der Fälle das Verhalten der Tiere gegeneinander sein, jedenfalls ist dieser Prüfstein sicherer. Sollte ich das Glück haben, junge Rosenpapageien zu bekommen, so würde ich ihnen nach einigen Monaten vorübergehende Nistgelegenheit und Niststoffe reichen: diejenigen Exemplare, welche Holz zerschleißen, in den Bürzel stecken und eintragen, sind ohne jeden Zweifel die Weibchen, die Männchen machen solches nie. Diese dürften auch leicht an ihrem eigenartigen Balzspiel zu erkennen sein. Von zahm oder zutraulich ist bei meinem Paar keine Rede, ebensowenig sind sie scheu. Der Grundzug ihres Wesens ist dauernder Argwohn, ihre Sicherheit lassen sie auch keine Sekunde außer acht. Ein hoher

Grad von Intelligenz ist ihnen nicht abzusprechen. Hören sie auch nur die Tritte einer fremden Person, so werden die Hälse gestreckt, und schattengleich huschen sie in den Kasten, um darin so lange zu verweilen, bis sich der Eindringling entfernt hat, höchstens daß sie einmal vorsichtig aus dem Schlupfloch nach ihm hervorlugen. Meine Person halten sie aus und begnügen sich damit, bei meiner Annäherung gehörig zu zetern. Ihre Beweglichkeit und Munterkeit kennt keine Grenzen; die größte Freude mache ich ihnen mit Zweigen, die ich zwischen die Gitter stecke. In allen denkbaren Stellungen klettern sie sofort darin herum, und in kürzester Zeit sind die Ästchen vollkommen zerbissen und zerschlissen. Gibt man im Sommer belaubte Zweige, so ist der Anblick der in dem Grün umherkletternden Tierchen ein geradezu fesselnder. Ihr Geschrei, meist schrille, kurze Laute, dazwischen ein eigentümliches Krächzen und Gurren, finde ich durchaus erträglich und hat mich noch keinen Augenblick gestört. Als Niststoffe haben sie bei mir stets Holz bevorzugt, und zwar Spachtelholz, wie es zum Anfeuern benutzt wird, sowie Holunderzweige, auch weiche Sitzstangen wurden in kürzester Zeit zerbissen und restlos eingetragen, ebenso die am Sockel befindlichen Käfigleisten. Es ist fabelhaft, was sie in dieser Beziehung und welcher Zeitkürze fertigbringen. Das Nest selbst wurde auf einer etwa 6 cm hohen und mäßig festgedrückten Schicht Sägemehls erbaut und war vom Schlupfloch her halb überwölbt, so daß man nur mit Mühe die Gelege erblicken konnte. Ich halte das für Absicht der Tiere. Bei der Kastenkontrolle, die ich möglichst wenig vornahm, und nie, wenn das Weibchen drinnen saß, waren beide jedesmal sehr erregt. Gebrütet wurde bei Tag nur vom Weibchen, bei Nacht saßen meist beide drinnen, doch wurde unter heftigem Geschrei das Männchen mitten in der Nacht urplötzlich wiederholt von seiner Xanthippe hinausgebissen. Gefüttert wurde das Weibchen vom Männchen während der Brut sehr selten, meist nahm es selbst seine Nahrung auf. Im allgemeinen wurde gut gebrütet, immerhin habe ich den Eindruck gewonnen, daß das Weibchen sich, wenn auch nicht gerade stören, doch leicht zu Allotria verleiten läßt, z. B. beim Herausfangen von Wellensittichen aus einem Nebenkäfig und ähnlichen Arbeiten. Aus Neugier und Argwohn will es über alles orientiert sein und huscht bei solchen Störungen leicht aus dem Kasten und treibt sich eine ganze Weile außerhalb herum, fängt an Splisse abzuschälen und will das Brüten vergessen. Aus diesem Grunde ist es auch jedenfalls im Käfig gut, wenn man sofort mit dem ersten Ei die Niststoffe alle entfernt, außerdem Hartholzsitzstangen anbringt und, wenn möglich, einen Metallkäfig verwendet, damit diesem Triebe die Tore möglich verschlossen sind. Das, was im Handbuch Ruß in dieser Hinsicht steht, kann ich nur unterstreichen. Der Nestbau selbst ist ungemein spaßig anzusehen und gewährt für Stunden Unterhaltung. Mit unglaublichem Eifer werden die Splisse losgeschält, 6, 8 in den Bürzel genestelt, so daß der Vogel einem kleinen Stachelschweine gleichend seinem Neste zufliegt. Hin und wieder gelingt es dem Männchen, unbemerkt von hinten sich anzuschleichen und einen Span herauszureißen; das aber kostet übel Keile, und unter Jammergeschrei sucht er das Weite; manchmal zerren auch beide gleich jungen Hündchen an einem Span und suchen ihn sich gegenseitig zu entreißen.

Ernährung: Die meinen fressen vor allem Glanz, etwas weiße Hirse und Hanf sowie reichlicher Sonnenblumenkerne. Grünzeug, Miere zerbeißen sie nur, fressen davon fast nichts; möglich, daß sie den Saft in sich aufnehmen. Alles andere Beifutter, wie Mischfutter, Ameisenpuppen usw. rühren sie nicht an, halten sich lediglich an Trockenfutter. Es sind arge Verschwender, leeren regelmäßig den halben Napf voll auf den Bodensand. Rosenpapageien haben im gesunden Zustande immer etwas weiche Entleerungen, daher ist meines Erachtens, besonders beim Legen mit Grünzeug, sehr vorsichtig zu verfahren. Nach meiner Erfahrung neigen viele Sittichweibchen beim Legen zu dünnen Entleerungen, die dann durch Grünzeugfütterung zum Darmkatarrh ausarten können; Folge: Legeschwierigkeit, Fehlbrut. Bei der zweiten Brut hatte ich reichlich Miere gegeben, und richtig stellten sich dann beim Weibchen ganz wässerige Entleerungen ein und erhebliche Legeunpäßlichkeit beim dritten Ei. Nach Abstellen der Miere hörte das sofort auf, und das letzte Ei wurde glatt gelegt. Allem nach, was ich von anderen Züchtern gehört, und auch aus dem Handbuch Ruß zu entnehmen ist, neigt dieser Papagei sehr leicht zu Legenot; ich führe es vor allem auf das unverhältnismäßig große Ei zurück. Künftig werde ich über die Legezeit jede Grünzeugfütterung unterlassen, höchstens anstatt dessen ganz spärlich zerschnittene Scheiben guter Feigen (möglichst Tafelfeigen) geben, was erheblich ungefährlicher sein soll als Grünzeug, und anstatt Kreide und zerstoßener Eischalen zerkleinerte Calcantabletten, wie man sie in jeder Apotheke erhält, außerdem natürlich reichlich frischen Flußsand. Am gefährlichsten während des Legens, wohl bei allen Sittichen, sind Temperatursprünge, wie sie im zeitigen Frühjahr aufzutreten pflegen, besonders von Warm in Kalt.

Nun zur Brut selbst: bisher habe ich schon eine Reihe diesbezüglicher Punkte erledigt, und um nicht zu ausführlich zu werden, will ich meine Beobachtung bei den leider erfolglosen Bruten allgemein zusammenfassen; etwa 14 Tage nach Beginn des Eintragens der Niststoffe war allemal das erste Ei da, 10 Tage zuvor beobachtete ich die erste Begattung. Die Begattung selbst dauert merkwürdig lange, bis zu sechs Minuten; dabei werden die Akte oftmals in rascher Folge wiederholt. Nach Vollendung der Paarung setzt es regelmäßig seitens des Weibchens eine Tracht Prügel. Fest gebrütet wurde bei mir vom zweiten Ei an. Über die Dauer der Brutzeit kann ich nichts sagen, da die Eier nicht schlüpften. Die Eier selbst sind nicht rundlich, sondern länglich, gestreckt, glänzend weiß und für die Größe des Vogels auffallend groß. Die Tiere machten im Sommer und Herbst 1923 3 Fehlbruten, Winter 1924 1 Fehlbrut: 1. Brut 3 Eier, 2. Brut 4 Eier (durch Legeunpäßlichkeit ganz verunglückt), 3. Brut 5 Eier, 4. Brut 3 Eier (Winterbrut). Die Eier wurden, abgesehen von Brut 2, allemal gegen 35 Tage fest bebrütet, also etwa 15 Tage überbrütet. Ich entferne mit voller Absicht das Gelege vorher nicht; erfahrungsgemäß

kommt es immer wieder vor, daß man Eier, die einige, ja eine ganze Anzahl Tage überbrütet sind, öffnet und zu seinem Schreck lebende Junge vorfindet. Vor Öffnung des Eies mache ich daher eine kleine Probe, deren Kenntnis ich Herrn Mässelhäuser (Koburg) verdanke: lege das Ei in ein Schälchen mit lauwarmem Wasser, so daß dieses die Höhe des Eies nicht ganz erreicht. Lebt der Embryo, so flottiert das Ei deutlich. In Brut 1, 3 und 4 (Brut 2 schaltet aus) enthielten 7 Stück der 11 Eier vollkommen und tadellos entwickelte schlupfreife Junge, bei denen ein Dottersack nicht mehr zu erkennen war; im letzten Augenblick waren sie also, statt zu schlüpfen, eingegangen; von dem Reste (4 Stück) war eines lauter, die anderen enthielten in früheren Stadien abgestorbene Junge. Ursache?: Hier kann man wieder nur sagen: „Herr, dunkel ist der Rede Sinn". Blutsverwandtschaft ist ausgeschlossen, denn es handelt sich

Sibirischer Leinfink.

um ein importiertes Paar, dazu sehr kräftige Tiere. Zu hohes Alter erscheint ebenfalls ausgeschlossen, denn die Vögel haben ganz dunkle Krallen, und ferner dürften unter Importen kaum alte, zur Zucht nicht mehr taugliche Tiere sein. Möglich wäre, daß die Ursache in Jugendlichkeit des Paares liegt. Bei Wellensittichen habe ich das schon oft erlebt, z. B.: 6 Monate alt, 3 Fehlbruten mit durchweg abgestorbenen Jungen, in der 4. Brut kamen alle Jungen aus.

(Schluß folgt.)

Motive und Bedeutung der Vogelliebhaberei.

Von Karl Galle.

(Nachdruck verboten.)

Wiederholt ist in dieser Zeitschrift die Stubenvogelliebhaberei in mehr oder weniger ausführlicher Weise und nach jeder Richtung hin gewürdigt worden. Gleichwie fast alle berühmten Ornithologen und Vogelwirte die Berechtigung der Stubenvogelliebhaberei anerkannt und befürwortet haben, so widmen auch die Verfasser jener Aufsätze der Vogelliebhaberei liebevolle Worte, nennen sie eine edle Liebhaberei, deren Gemütswerte nicht zu unterschätzen seien und empfehlen ihre allseitigste Förderung und Verbreitung. In der Tat bietet die Stubenvogelliebhaberei dem Naturfreunde so viele reine Freuden, eine solche Fülle von Zerstreuung, Anregung und Belehrung, wie selten eine Liebhaberei. Sie zaubert ihm ein Stück lebende und belebende Natur in sein Heim und ersetzt ihm also ein wenig die mangelnden Naturgenüsse, welche er, insbesondere der erwerbstätige Stadtbewohner, einen großen Teil seines Lebens entbehren muß. Die Beobachtung des munteren Lebens und Treibens seiner gefiederten Stubengenossen, die Zutraulichkeit, welche sie ihm gegenüber an den Tag legen und nicht zum geringsten auch der mehr oder weniger angenehme Gesang, welchen sie vernehmen lassen, entschädigen ihn reichlich für die aufgewendete Mühe und die Kosten, welche sie ihm verursachen. Er pflegt sie nach bestem Wissen und Können, unterrichtet sich über ihre Bedürfnisse und Gewohnheiten, wo sich ihm immer Gelegenheit darbietet, kurz, er strebt danach, seinen kleinen Gefangenen das Los der Gefangenschaft zu erleichtern und so angenehm als möglich zu gestalten, denn er ist sich der ernsten sittlichen Pflichten wohl bewußt, welche er als Pfleger solcher zarter Naturgeschöpfe übernimmt. Die Liebe zur gefiederten Welt wurzelt tief im Herzen des Vogelliebhabers, und nichts ist imstande, sie ihm zu zerstören. Dem Wohlergehen seiner Pfleglinge gilt nächst dem seiner Familienangehörigen seine größte Sorge. Der echte Vogelliebhaber bewahrt seiner Passion trotz mancherlei Fehlschläge und Unannehmlichkeiten, welche die Ausübung derselben notwendigerweise zeitigt, in allen Wechselfällen des Lebens die Treue, mögen auch einmal die Verhältnisse ihn zwingen, der ihm liebgewordenen Passion zeitweise zu entsagen. Immer bleibt bei ihm das Interesse und die Liebe zu den liebreizenden, leichtbeschwingten Bewohnern der Luft bestehen. Schon in früher Jugend regt sich im zu-

künftigen, passionierten Vogelliebhaber das Interesse für die Vogelwelt. Sehr anregend und befruchtend wirkt auch hier das gute Beispiel. Der Knabe, dessen Vater Vögel käfigt, wird in der Regel ebenfalls einmal der Pflege von Stubenvögeln sich widmen und sich zum erfahrenen, praktischen Vogelliebhaber ausbilden. Damit soll nicht gesagt sein, daß auch in gereiften Jahren der Stubenvogelliebhaberei sich zuwendende Personen nicht tüchtige Vogelwirte werden können. Zweifellos ist aber der Liebhaber, welcher die Stubenvogelpflege von Jugend auf betreibt, sie gewissermaßen ererbt hat, viel inniger mit derselben verwachsen, reicher an Erfahrungen, als derjenige, welcher sich erst in vorgerücktem Lebensalter in plötzlich erwachendem Interesse ihr zuwendet. Nur wenige unter den letzteren sind jener Begeisterung und Aufopferung für die ideale Sache fähig, welche den echten, langjährigen Liebhaber auszeichnen, und nur in seltenen Fällen bewahren sie der Liebhaberei die Treue fürs Leben, sind vielmehr leicht geneigt, bei eintretenden Mißerfolgen und Verlusten die anfänglich mit großer Begeisterung ergriffene Liebhaberei wieder aufzugeben. Der wahre Vogelliebhaber hingegen, besonders der Liebhaber einheimischer Vögel hält treu an seinen Idealen fest und läßt sich auch durch die abfällige Kritik und die Intoleranz übereifriger Vogelschützler, welche die Vogelhaltung gesetzlich verboten wissen wollen, seine schöne Liebhaberei nicht vergrämen, sondern tritt mutig in Wort und Schrift für die berechtigte Sache ein.

Die Behauptung jener Vogelschützler, daß die Vogelhaltung im allgemeinen und diejenige unserer Waldvögel im besonderen eine Tierquälerei darstelle, daß sie egoistischen Motiven entspringe und auf den Vogelbestand der freien Natur schädigend einwirke, weiß er in überzeugender Weise zu entkräften. Gewiß gibt es auch unter den Vogelliebhabern, wie unter allen Tierpflegern, einzelne, welche ihre Pflegebefohlenen in dieser oder jener Beziehung vernachlässigen und sich grober Verfehlungen gegen die Gebote der Stubenvogelpflege schuldig machen, aber es wäre ungerecht, derartige Fälle zu verallgemeinern und deshalb die ganze Stubenvogelliebhaberei in Acht und Bann zu erklären. Der gewissenhafte Vogelliebhaber weist jene ungerechtfertigten Vorwürfe unverständiger, intoleranter Gegner der Vogelhaltung mit Entschiedenheit zurück, denn er läßt seinen Pfleglingen eine liebevolle, verständige Pflege zuteil werden. Er betrachtet es als seine erste Aufgabe, den kleinen Sängern den Aufenthalt in der Gefangenschaft möglichst angenehm zu gestalten und findet seine höchste Befriedigung darin, zu sehen, daß dieselben den Verlust der Freiheit bald nicht mehr betrauern, sondern auch im Käfig ihr munteres Wesen zur Schau tragen und keine Sehnsucht mehr nach der Freiheit bekunden. Die Tatsache, daß Käfigvögel bei guter Pflege gewöhnlich ein viel höheres Alter erreichen als im Freileben, widerlegt am besten die Behauptung der Gegner der Vogelhaltung, daß letztere das Leben der Vögel verkürze, daß der gefangene Vogel sich zu Tode grämе. Fast alle Wildvögel passen sich im Gegenteil schnell den neuen Verhältnissen an, werden allmählich mit dem Pfleger vertraut und zeigen dann keinerlei Verlangen mehr nach der verlorenen Freiheit. Der Vogel lernt das sorgenfreie Leben in der Gefangenschaft bald schätzen und tritt zu seinem Pfleger oft in ein überaus inniges, freundschaftliches Verhältnis. Man kennt genug Beispiele, daß entwichene Stubenvögel nach längerer Gefangenschaft freiwillig ihren Käfig wieder aufsuchten und darin verblieben, also das Gefangenleben der Freiheit vorzogen. Ersteres war ihnen so zur Gewohnheit geworden, daß es sie der Freiheit völlig entfremdet hatte und sie den Kampf ums Dasein draußen nicht mehr aufzunehmen wagten.

Der leidenschaftliche Liebhaber pflegt sich nicht leicht von seinen ihm liebgewordenen Vögeln zu trennen, sondern ihnen lange Zeit, oft für die Dauer ihres Lebens Herberge in seinem Heim zu gewähren. Seine höchste Befriedigung erblickt er darin, zutrauliche, anhängliche Stubenvögel zu besitzen, welche ihre natürliche Scheu vor dem Menschen ablegen und keinerlei Freiheitsdrang mehr offenbaren. Aus diesem Grunde verpflegt er mit Vorliebe solche Vögel, welche ihrer Art und ihrem Wesen nach veranlagt sind, sich zu angenehmen, zutraulichen Stubengenossen zu entwickeln, während er sich solcher Vögel, die ihre angeborene Wildheit dauernd behalten und schlechterdings unzähmbar sich erweisen, schnell wieder entäußert, da sie ihm statt Freude nur Ärger und seelisches Unbehagen verursachen. Zudem ist der Anblick derartig wild und ungebärdig sich benehmender, stürmischen Freiheitsdrang äußernder Käfigvögel nicht gerade dazu angetan, der Vogelliebhaberei Freunde zu gewinnen, gibt vielmehr nur zartfühlenden Tierschützlern willkommenen Anlaß, gegen die Waldvogelhaltung zu protestieren und dieselbe als Tierquälerei zu kennzeichnen. Um diese Vorwürfe zu entkräften, läßt es sich der gewissenhafte Liebhaber angelegen sein, durch liebevolle Wartung seiner Pfleglinge etwa gegensätzliche Anschauungen vertretende Beschauer durch den Augenschein davon zu überzeugen, daß die Stubenvogelliebhaberei keine Tierquälerei ist, sondern daß die meisten gefangenen Vögel bei verständiger pfleglicher Behandlung seitens des Pflegers sich bald mit dem Verlust der Freiheit abfinden und sich alsdann in der Gefangenschaft offensichtlich außerordentlich wohlfühlen. Darum wird der pflichtbewußte Liebhaber nur Vögel solcher Art und Zahl pflegen, als ihm möglich ist, deren notwendige Bedürfnisse in jeder Beziehung hinreichend zu befriedigen.

Der Einwand, daß die Vögel für die Freiheit geschaffen seien, hat keine Berechtigung, denn kein Tier hat sich einst freiwillig dem Menschen zugesellt. Ebenso müßte man dann auch für unsere Haustiere die ungebundene Freiheit fordern, denn diese waren ebenfalls ursprünglich wild und sind erst vom Menschen im Laufe der Zeiten gezähmt worden. Dann müßte man auch logischerweise die Zoologischen Gärten, Menagerien usw. als tierschutzfeindliche Einrichtungen bekämpfen, da sie gleichfalls für die Freiheit geschaffene Tiere gefangen halten und in ihrer Freiheit mehr oder weniger beschränken. Der Mensch ist nun einmal nach den Worten der Bibel dazu erwählt, über die Tiere der Erde zu herrschen und sich dieselben untertan zu machen, sei es nun zu seinem Nutzen oder zu seinem Vergnügen, zur Be-

friedigung seines idealen Bedürfnisses. Da nun die Vogelliebhaberei fast immer den letzteren edlen Motiven entspringt, so stellt dieselbe keineswegs eine Tierquälerei dar, verdient vielmehr als ein erfreuliches Zeichen des Volksgemüts eine durchaus wohlwollende, gerechte Beurteilung, mögen auch urteilslose Nichtkenner und Tierschutzfanatiker die Stubenvogelhaltung mißbilligen und sich offen als Gegner derselben bekennen. Viel ersprießlicher und für die Zwecke des praktischen Vogelschutzes förderlicher wäre es, wollten jene eifrigen, unentwegten Tierschützler, welche dem Vogelliebhaber seine harmlose, bescheidene Liebhaberei, seine lieben Waldvögel nicht gönnen, die immer noch nicht ausgerottete, verwerfliche Modeunsitte bekämpfen, die Hüte mit den Federn und Kadavern von kleinen Vögeln zu schmücken und dahin zu wirken, daß dem Vogelmord zu kulinarischen Zwecken ein Ende bereitet werde, dem so unendlich viele anmutige Singvögel zum Opfer fallen. Die Vogelliebhaberei bildet oft die einzige Freude und Zerstreuung im freudlosen Dasein der Armen und Unglücklichen, und es wäre hartherzig gehandelt, diesen ihre Lieblinge nehmen zu wollen oder die Freude daran zu verleiden. Darum gönne man jedem, der das Bedürfnis empfindet, sich Stubenvögel zu halten, das harmlose Vergnügen, vorausgesetzt, daß er den Tieren eine gewissenhafte, sachkundige Pflege zuteil werden läßt. Jeder Tierfreund hat nun einmal eine besondere Vorliebe für diese oder jene Tierart; der eine interessiert sich nur für Pferde und Pferdesport, der andere für Hunde oder Geflügel; der Vogelliebhaber hingegen hat die liebreizenden gefiederten Bewohner des Waldes und Feldes in sein Herz geschlossen und so liebgewonnen, daß er sie an sein Heim fesselt, um sich jederzeit an ihrem anmutigen, interessanten Wesen und Gebaren, ihrem herzerquickenden Gesange erfreuen zu können. Daß er zu diesem Zwecke die Vögel ihrer natürlichen Bestimmung entziehen und sie der Freiheit berauben muß, ist leider nicht zu umgehen. Der pflichtbewußte Vogelliebhaber ist jedoch, wie gesagt, bestrebt, durch sachkundige Pflege, Haltung seiner Pfleglinge in geeigneten Käfigen, wohl gar in Vogelstuben, sowie gelegentlichen Freiflug im Zimmer, seine kleinen gefangenen Hausgenossen den Verlust der Freiheit so wenig als möglich fühlbar werden zu lassen. In dieser Weise verpflegt, verschmerzt der gefangene Vogel in der Regel bald die verlorene Freiheit, bekundet keinerlei Sehnsucht mehr nach ihr und zeigt durch sein ganzes Benehmen, daß er mit seinem Schicksal völlig zufrieden ist. (Schluß folgt.)

Zwitter eines Gimpels (s. S. 94).

Ein neuer Fall von bilateralem Hermaphroditismus beim Gimpel.

Von Rudolf Neunzig.

(Nachdruck verboten.)

Hermaphroditen oder Zwitter sind aus dem Reiche der Vögel wenig bekannt und kaum beschrieben worden. Die Ursachen hierfür sind sowohl im seltenen Auftreten derartiger Gesetzwidrigkeiten als auch darin zu suchen, daß sie selten gefangen und erkannt werden.

Die Vogelzwitter aus der Familie der Finkenvögel, welche bisher anatomisch untersucht worden sind, es handelt sich um einen Buchfinken und zwei Gimpel, hatten stets links einen wohlentwickelten Eierstock und rechts einen richtig aufgebauten Hoden vorzuweisen.

Den ersten Fall von Hermaphroditismus beim Gimpel, und wahrscheinlich bei den Finkenvögeln überhaupt, erwähnt Cabanis im Journal für Ornithologie 1874 S. 344. Es handelt sich hier um einen Vogel aus der Sammlung des Oberamtmanns Heine. Der Vogel war rechts männlich und links weiblich gefärbt. In dem Bericht erwähnt Cabanis noch einen Zwitter von einem amerikanischen Specht, Colaptes mexicanus, aus Kalifornien, der im Gegensatz zum Gimpel ebenso wie ein Zwitter von Dacnis spiza rechts weiblich und links männlich gefärbt war. Anatomische Befunde über die Fälle liegen nicht vor.

Im Jahre 1890 beschreibt Weber im „Zoologischen Anzeiger" einen hermaphroditischen Buchfink, der rechts das Männchen- und links das Weibchenkleid trug, die sich in der Medianlinie sehr scharf voneinander abhoben. Der Vogel wurde anatomisch untersucht und es waren wohlausgebildete Geschlechtsorgane vorhanden; die Ausführungsgänge der Geschlechtsprodukte waren bei der Enthäutung des Vogels herausgerissen worden.

Einen weiteren Fall von Zwitterhaftigkeit beim Gimpel erwähnt Lorenz im Bulletin de la société des naturalistes de Moscou 1894. Der Vogel war ähnlich dem oben erwähnten gefärbt. Die Kopf- und Brustfedern der linken Hälfte waren jedoch mit roten Federn untermischt, auch an den Seitenfedern schimmerte etwas Rot durch. Hier ergab die anatomische Untersuchung: links ein äußerlich gut entwickeltes Ovar und rechts einen gut entwickelten Hoden. Der Legeschlauch enthielt ein Ei von halber normaler Größe, aber er war nicht voll entwickelt.

Der letzte bisher bekannte Zwitter vom Gimpel war lebend im Besitz von Dr. Heinroth. Er war wie alle bisher bekannten Gimpelzwitter links weiblich und rechts männlich gefärbt. Der Vogel, der in schlechtem Körperzustande war, wurde vor dem natür-

lichen Tode getötet. Über die Gefiederfärbung berichtet Dr. Heinroth in den Sitzungsberichten der Gesellschaft der naturforschenden Freunde 1909 S. 329: „Bei näherer Betrachtung zeigt es sich, daß das Rot der Unterseite genau auf die rechte Körperseite beschränkt ist, während das für das Weibchen charakteristische Graubraun die betreffenden Stellen der linken Körperseite einnimmt. Daß sich auf der Brust- und Kehlmitte die Grenze zwischen beiden Farben etwas verwischt, rührt daher, daß die Spitzen der Federn von links nach rechts her etwas durcheinanderrutschen: die in Betracht kommenden Federfluren tragen rechts nur rote, links nur graubraune Federn. Oberseits ist das Gefieder sehr schlecht und lückenhaft und ein Färbungsunterschied auf der rechten und linken Körperseite nicht erkennbar. Die äußersten Armschwingen sind beiderseits mit einem roten Fleck versehen." Über den anatomischen Befund berichtet Prof. Dr. Poll in demselben Hefte der Sitzungsberichte: „Bei der Sektion ergab sich, daß am oberen Nierenpol rechts färbt, nur oberhalb des Kropfes geht die graue Färbung etwas verwaschen in die rötliche über. Selbst die Rückenfärbung ist auf beiden Seiten verschieden; die weibliche ist grauer und die äußerste Armschwinge weist einen weniger rötlich gefärbten Fleck auf als die der männlichen Seite.

Der sehr zahme Vogel ist im vorigen Jahre zusammen mit einem Bruder und einer Schwester aus dem Nest genommen und aufgezogen worden. Die beiden Geschwister sollen normal gefärbt gewesen sein. Er bewohnt mit einem Weibchen einen großen Käfig, der zum Nisten eingerichtet ist. Er ist brütlustig und trägt häufig Niststoffe umher. Dem Weibchen gegenüber ist er sehr zänkisch; er sucht es zu befliegen, doch letzteres verhält sich sehr ablehnend. Da die Brutzeit ja noch bevorsteht, so wäre ein Erfolg nicht unmöglich, da er ja anscheinend sich als Männchen fühlt und vielleicht auch die Funktionen desselben ausführen kann.

Weißstirnpfäffchen.

ein lichtgelbes, glattes, glänzendes Körperchen von der Größe etwa eines Sagokorns lag, das bei der mikroskopischen Untersuchung sich als ein regelrecht aufgebauter Hoden erwies. Unmittelbar neben ihm, durch lockeres Stützgewebe angeheftet, liegt ein hellbraunrötliches, leicht höckriges, dreieckiges Gebilde, das mikroskopisch den Bau eines normalen Eierstockes zeigt. Von den Ausführungswegen waren der linksseitige, der Eileiter oder Legeschlauch, nur im oberen Drittel ausgebildet, während der rechtsseitige, der Samenleiter, völlig normal gestaltet war." Soweit der Bericht über den zuletzt beschriebenen Gimpel-Zwitter.

Anfang April gelangte ich mit Unterstützung der Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft in den Besitz eines neuen lebenden Zwitters vom Gimpel, der umgekehrt hermaphroditisch gefärbt ist wie die bisher bekannten Zwitter der Art. Abgesehen davon stimmt er am besten mit dem von Lorenz beschriebenen überein. Auch er weist in dem blaugrauen weiblichen Gefieder der Wangen, Brust und Seitenfedern rötliche, männliche Farbtöne auf. Eine derartig gefärbte Feder ist nur in der Mitte rötlich, die Federspitzen sind farblos. Im allgemeinen ist er bilateral hermaphroditisch ge-

Bastardzucht um 1555 und anderes.

Von Walter Barth, Göttingen.

(Nachdruck verboten.)

Für den Vogelzüchter irgendeiner Richtung hat es immer ein besonderes Interesse, zu erfahren, was bereits in früheren Zeiten auf diesem Gebiet erreicht wurde. Haben wir bei der Kanarienzucht über die ersten Zeiten, da dieser Vogel in der Gefangenschaft gezüchtet wurde, ziemlich sichere Mitteilungen, so sind auf dem Gebiet der Bastardzucht noch wenig Mitteilungen gemacht worden.

Diese Tatsache hat zwei Gründe gehabt. Einmal hatten die Besitzer von älteren Werken über Vögel und Vogelzucht kein Interesse an den Bastardzüchtungen, und die Ausgrabungen aus der alten Literatur unterblieben. Züchter, die sich dieser Zuchtrichtung widmeten, besaßen solche Werke nicht, und so mußten die Notizen in den vergilbten Blättern stumm und der Mitwelt verborgen bleiben. Und doch hat es einen besonderen Reiz, solche literarischen Ausgrabungen zu machen, in fast allen Fällen ist das Auffinden nicht sehr leicht, da die Bezeichnungen für die Vögel oft mit den heutigen nicht zu identifizieren sind.

In der ersten deutsch erschienenen Auflage von Gesner, „Vogelbuch", ist auf Seite 68 zu lesen, die in Klammer stehenden Worte sind hinzugefügt, „... es hat ein Vogeler bey vns ein paar (Girlitze) ein zeytlang bey einanderen erhalten / also / daß sy etwas weyte zu fliegen gehebt / vnd jungen daruon gezogen. Aber nahin als er für das Fädemle (Girlitz) männlin ein Zinßlin männlin zum weyblin gethon / habend sy wol eyer gelegt vnd gebrütet / es ist aber nichts daraus geworden ..."

Hier erfahren wir, daß ein Vogelfänger einen Mischlingszuchtversuch mit zwei Waldvögeln versuchte. Daß hier der Kanarienvogel noch nicht in Betracht kam, liegt wohl daran, daß zu jener Zeit der Kanarienvogel noch zu wenig bekannt oder daß der Preis für den größten Teil der Liebhaber zu hoch war. Für die Wahrscheinlichkeit der ersten Annahme spricht die Mitteilung, die Gesner beim Zitronenzeisig über den Kanarienvogel macht.

Nachdem hier der Zitronenzeisig beschrieben ist, fährt Gesner fort: „... disem ist gleych / als ich verston / das vögelin Canaria genennt / welches dann auß den Inßlen Canarijs / so von Zucker gantz fruchtbar sind / gebracht wird eines sehr lieblichen Gesanges (wegen) ..."

Hier ist wohl anzunehmen, daß Gesner den Kanarienvogel selbst noch nicht gesehen hat, doch in den damaligen Zeiten nahm man es nicht so genau mit den Angaben.

In der im Jahre 1669 erschienenen neuen Auflage des gleichen Werkes findet sich auf Seite 62 die Mitteilung: „... es werden auch offt Distelfincken ihnen (den Kanarien) beygeworffen welches dann eine seltzame Arth Vögel von mancherley Farben giebet."

Leider sind in dem Werk keine näheren Angaben zu finden, doch darf wohl angenommen werden, daß der Herausgeber bereits Stieglitzbastarde gesehen, vielleicht auch selbst gezogen hat.

Nur wenige Jahrzehnte später ist bereits ein Buch erschienen, das sich wohl im allgemeinen der Kanarienzucht zuwendet, doch ein volles Kapitel der Bastardzucht widmet, Hervieux: Trait curieux des serins de canarie, 1712. Der Verfasser empfiehlt, nur Wildlingsmännchen zu nehmen, die nicht älter als zwei Jahre sind, die Kanarienweibchen sollen noch nicht mit ihresgleichen gebrütet haben. Beide Angaben sind nach dem heutigen Stande der Bastardzucht nicht mehr zutreffend, lange jedoch, bis etwa in die 80er Jahre des vorigen Jahrhunderts, galten diese beiden Angaben als unerläßliche Vorbedingung der Bastardzucht. Hervieux schreibt dann weiter: In der Regel werden Finkenmännchen genommen, doch bin ich dafür, das Gegenteil zu tun, da sich die Eigenschaften der Männchen mehr auf die Nachkommen vererben, als wenn man das Gegenteil

Weißkehlpfäffchen.

tut. Mit der Vererbung ist hier wohl die Färbung der Bastarde gemeint. Die Erfahrung der letzten Jahrzehnte kann hier dem Verfasser nicht ohne weiteres beistimmen. Wenn ein gelber Kanarienhahn genommen wird, der von grünen Elterntieren abstammt, so wird wohl das eine oder das andere Junge hell fallen, doch die größere Anzahl unterscheidet sich nicht viel von den Mischlingen, die einen Stieglitz zum Vater haben.

Die Lehre von Mendel, die ein ganz bestimmtes Schema festgestellt hat, nach der sich die Eigenschaften der Elterntiere vererben, bestätigt dieses.

Auch über den Gesang der Bastarde schreibt der Franzose nicht falsch: Die Zeisigbastarde sind die schlechtesten, die Hänflingsbastarde die besten Sänger. Daß sich vieles auch in den Jahrhunderten gleich bleibt, sehen wir aus seiner Mitteilung, daß die meisten Bastarde vom Stieglitz gezogen werden, hier wiederholt er sich allerdings, nochmals rät er, einen Kanarienhahn und ein Stieglitzweibchen zu nehmen.

Die heutzutage noch immer strittige Frage über die Fortpflanzungsfähigkeit der Bastarde wird auch von ihm beantwortet. Die schönsten Bastarde, die er gesehen hat, waren die von weitergezüchteten Stieg-

litzbastarden. Diese sind damals (1708) für 500 Lires verkauft worden, eine sehr annehme Summe, wenn man dafür 400 Gmk. umrechnet.

Vielleicht bringt der eine oder andere Züchter etwas mehr aus alten Werken, ein einzelner Artikel kann diese Frage nur subjektiv, viele Arbeiten jedoch objektiv lösen.

Kleine Mitteilungen.

Eingewöhnung von Erlenzeisigen. Bei Spaziergängen habe ich öfters Gelegenheit, mit Erlenzeisigen zusammenzutreffen und komme ich ab und zu in den Besitz solcher lieben Tierchen. Als Vögel mit großem Appetit sind die Zeisige immer mit Futtersuchen beschäftigt, abends noch so hungrig wie morgens, was auch mit der Grund ist ihrer großen Zutraulichkeit im Freien. Kommt nun so ein Bürschchen in Gefangenschaft und geht nicht bald ans Futter, dann ist es gleich aus mit ihm. Ich gewöhne nun schon seit 20 Jahren Zeisige ein mit nur sehr gutem Erfolg. Ich setze den Vogel allein oder zu mehreren zu einem schon zahmen oder auch in einen nicht allzu großen Käfig. Als Eingewöhnungsfutter reiche ich in erster Linie gequetschten Hanf, feingeschnittene Nußkerne, Salatsamen usw., besonders Negersamen ist auch gut, solchen nehmen Frischfänge auch gerne an. Der Käfigboden wird mit reinem Flußsand bestreut und das Futter ja in kein Gefäß, sondern direkt auf den Boden, damit die Vögel solches sofort entdecken. Die Trinkgelegenheit muß auch gut sichtlich vorhanden sein. Der Stand des Käfigs möglichst hell, jedoch nur Vorderlicht. Auf diese Art lassen sich sämtliche Finkenvögel mit sicherem Erfolg eingewöhnen. F. Glaubrecht.

Vom Januar d. Js. bis jetzt habe ich in der Umgebung Altonas an den Bahrenfelder Kiesgruben den **Girlitz** bei strenger Kälte beobachtet. Am 10. März ist ein schönes gelbes Männchen gefangen worden. Mir scheint es, daß unser kleiner Girlitz ein sehr wetterfester Vogel ist. Im Sommer habe ich den Girlitz hier, in der Gegend von Blankeneese, häufiger beobachtet, nie aber im Winter. Ist an anderen Orten der Girlitz überwinternd angetroffen?

R. Thiele, Altona.

Frühjahrsbeobachtung. Am 25. April, abends 7 Uhr, überflogen die ersten Mauersegler Berlin in nordöstlicher Richtung. Frz. J. Kirstein.

Vom Vogelmarkt.

Von seltener auf den Vogelmarkt kommenden Vögeln werden angeboten:

Kleinerts Tierhandlung, Berlin NO 18, Strausberger Str. 13 (Fernruf Alexander 3313): Schamadrosseln, purpurrote Kardinäle, rotgehäubte Kardmäle, Dajaldrosseln, Purpurtangaren, abessin. Glanzstare, Goldaugentimalien, Rotohrbülbüls, indische Wandererlster, Weißscheitelpfäffchen, Weißkehlpfäffchen, Graupapageien, Blaustirnamazonen, Marak. Zwergara.

W. Knapp, Lübeck, Eschenburgstr. 16 II: 0,2 Isabellkanarien.

S. Lichtenstaedt, Berlin-Johannisthal, Nieberstraße 10: 1,0 Blauwangenblattvogel.

Eduard Schütze, Eystrup (Weser): 2,0 tarant. Unzertrennliche.



Herrn G. L., Brünn. Es geht wohl schon aus dem Namen hervor, daß Weißstirn- oder Weißscheitelpfäffchen und Weißkehlpfäffchen zwei verschiedene Vögel sind. Das eine hat weiße Stirn und weißen Scheitel (s. Abb S. 94, 95), das andere eine weiße Kehle. Das erstere lebt in Ostbrasilien, Guiana und Venezuela und wird recht selten eingeführt, das Weißkehlpfäffchen in Ostbrasilien. Es ist in neuerer Zeit häufiger eingeführt und auch schon gezüchtet. Es baut in der Gefangenschaft ein freistehendes Nest in Astgabeln, hat aber auch in einem Fall ein verlassenes Webervogelnest angenommen und ausgebaut. Es ist durchaus kein weichlicher Vogel. Ein Fall ist bekannt, in welchem es 11 Jahre in der Gefangenschaft lebte.

Herrn Dr. G. Schwenninger; Herrn Fr. J. K., Berlin; Herrn P. B., Berlin: Beiträge dankend erhalten.

Herrn H. G., Mannheim. Der nur in einem Briefumschlag verpackte Kadaver kam breitgequetscht als widerliche Masse hier an. Zur Untersuchung einzusendende Kadaver müssen in festen Papp- oder leichten Holzschachteln verpackt gesandt werden.

Herrn H., Leipzig. Der Zeisig ist infolge von Abzehrung eingegangen.

Herrn J. G. Der Vogel ist der weißköpfige Vieh- oder Starweber — Dinemellia dinemelli — aus Ostafrika.

Herrn H. B., Duisburg-Meiderich, ist brieflich Auskunft erteilt.

Herrn F. R., Sulingen. Beantwortung der Anfrage finden Sie im Heft 11 unter „Kleine Mitteilungen".

Herrn A. B., Jena. Der Vogel ist einem Herzschlag erlegen. Er war nicht zu fett. Krankheitskennzeichen waren nicht festzustellen.

Herrn H. R., Berlin N. Bei dem Kanarienvogel, der reichlich fett war, konnten besondere Krankheitskennzeichen nicht festgestellt werden. Er ist einem Herzschlag erlegen.

Herrn A. E., Berlin-Friedenau. Der Gimpel ist infolge von Abzehrung eingegangen. Er wog 15 g, das Normalgewicht eines Gimpels mittlerer Größe ist etwa 29 g.

Herrn E. R., Bernstadt i. Sa. ♀ Wellensittich ist einer Darmentzündung erlegen. Die Ursache der Erkrankung konnte nicht ermittelt werden.

Herrn B. Der Vogel ist dem seuchenartig auftretenden Typhoid erlegen. Die Ursache kann eine sehr verschiedene sein, wie verdorbenes Futter, zu kaltes Trinkwasser, Unreinlichkeit der Beherbergungsräume, Einschleppung von außen und Übertragung. Die Ansteckungsgefahr ist sehr groß. Um ihr vorzubeugen, ist es nötig, daß alle anscheinend noch gesunden Vögel in einem besonderen Raum untergebracht und nicht von derselben Person verpflegt werden, welche die kranken und verdächtigen behandelt. Sämtliche Käfige sind gründlich zu reinigen und zu desinfizieren, auch alle Zubehörteile. Die Vögel sind in hoher Wärme zu halten, 20—25 ° C. Als Futter wird nur Mohnsamen, amerik. Hafergrütze, Spitzsamen gereicht, kein Weichfutter, Biskuit, Obst und dergleichen mehr. Als Getränk wird täglich 3—5mal dünner erwärmter Haferschleim mit Zusatz von einfacher Opiumtinktur, auf ein gewöhnliches Trinkgefäß 1—2 Tropfen gegeben. Größte Reinlichkeit ist geboten. Erkrankte sind kaum am Leben zu erhalten.

Herrn E. T., Chemnitz. Falls bei dem Unterschnabel der Schama nur die Hornbedeckung abgebrochen ist, würde eine Ergänzung allmählich eintreten, aber wahrscheinlich nicht in normaler Form. Es ist möglich, daß das Schnabelhorn zu kurz bleibt, möglich ist auch, daß ein übermäßiges Wachstum eintritt und ein Zurückschneiden des Schnabels notwendig wird. Das wäre der günstigste Fall. Wenn aber auch der Knochen durchbrochen ist, scheint nur wenig Hoffnung zu sein, daß der Schnabel wieder eine Form bekommt, die dem Vogel ermöglicht, Nahrung aufzunehmen. Der Knochen ergänzt sich nicht wieder.

Herrn Dr. A. K., Frankfurt. Der Birkenzeisig ist infolge von Fettsucht eingegangen. Das dem Vogel gereichte Futter enthielt: Hanf, Hirse, Mohn, Hafer, Spitz-, Lein-, Neger-, Salat-, Distel-, Spitzwegerich- und sehr wenig Rübsamen. Letzterer sollte das Hauptfutter sein. Der Vogel sucht sich naturgemäß aus dem Gemisch nur das heraus, was ihm besonders mundet und ihn recht fett werden läßt. Rübsamen sollte sein Hauptfutter, alles andere soll abwechselnd als Beigabe gereicht werden. — Der Gimpel ist einer mit Abzehrung verbundenen Ernährungsstörung erlegen.

Herrn P. Sch., Neustadt i. Sa. Gegen die geschilderte unangenehme Erscheinung bei der Haltung mancher Schwarzplättchen gibt es nur ein Mittel, das ist die Haltung in sehr großen Käfigen. In den Sängerkäfigen ist der geschilderte Übelstand eine häufig vorkommende Erscheinung gerade bei dieser Art.

(Fortsetzung auf der 3. Umschlagseite.)

Aus den Vereinen.

Angemeldet sind die Herren: Albert Müller, Köln-Kalk, Usingerstr. 99; Georg Merkel, Druckereibesitzer, Mainz, Boppstr. 34; Friedrich Wolff, Hamburg 33, Heinrich-Helbing-Str. 33; Karl Lanz, Molkerei Zell, Krs. Alsfeld in Oberhessen. — Aufgenommen sind die Herren: Mtgl. Nr. 389 Karl Beyer, Rechnungsrat, Eisenach, Emilienstr. 12; Mtgl. 390 Martin Bock, Berlin-Halensee, Katharinenstr. 9; Mitgl. 391 Hermann Reisener, Mühlenrahmede i. Westfalen. — Am 28. April verstarb im Alter von 24 Jahren unser Mitglied 350, Herr Walter Raimann in Freiwaldau. Wir bedauern in dem Verstorbenen einen Naturliebhaber von seltener Gemütstiefe und mit den besten Anlagen ausgestattet. Mit seinem Tode erlischt ein reger Briefwechsel mit dem Unterzeichneten. A. Krabbe.

Vereinigung der Vogelliebhaber Landesverband Sachsen und Großthüringen. Unsere sehr verehrten Mitglieder machen wir wiederholt darauf aufmerksam, daß am 17. und 18. Mai 1924 die Jahresversammlung des Landesverbandes stattfindet. Im Verein mit der Ortsgruppe Leipzig ist der 17. Mai 1924 für einen Begrüßungsabend bestimmt worden. Wir erwarten bereits an diesem Tage die Vertreter der angeschlossenen Vereine wie auch unsere Einzelmitglieder. Für Unterkunft ist Sorge getragen, jedoch müssen wir um vorherige Anmeldung der Teilnehmer bitten. Der 18. Mai 1924 soll ernster Arbeit gewidmet sein. Die Sitzung beginnt vormittags um 10 Uhr. Versammlungslokal ist: Bauers Brauerei-Restaurant, Leipzig, Täubchenweg. Den Abschluß der Versammlung bildet die Besichtigung der Vogelschau, die nur für unsere Mitglieder zugängig ist. Wir möchten nicht unterlassen darauf hinzuweisen, daß die Versammlung so wichtig ist wie die Gründungsversammlung des Landesverbandes. Wir müssen darum bitten, daß unbedingt alle Vereine vertreten sein möchten, wie auch eine sehr rege Teilnahme unserer Einzelmitglieder erwartet wird. Unsere Tagesordnung lautet: 1. Verlesen der Niederschrift über die Jahresversammlung, 2. Feststellung der anwesenden Vertreter und Prüfung ihrer Vollmachten, 3. Jahresbericht, Bericht über die Gründungsversammlung des Reichsverbandes, 4. Kassenbericht, 5. Neuwahlen, 6. Anträge, 7. Verschiedenes. Die von den Vereinen abzuordnenden Vertreter wollen mit folgender Vollmacht versehen sein.

Vollmacht.

Der unterzeichnete Verein erteilt hierdurch .....

.....

Vollmacht zur Teilnahme an der am 18. Mai 1924 stattfindenden Jahresversammlung der Vereinigung der Vogelliebhaber Landesverband Sachsen und Großthüringen und zur Wahrnehmung und Vertretung aller Interessen des Vereins wie des Landesverbandes.

....., am ..... Mai 1924.

Einzelmitglieder weisen sich durch die Mitgliedskarte aus. Etwa zu stellende Anträge können bis 8 Tage vor der Jahresversammlung an den Unterzeichneten eingereicht werden. Unsere Mitglieder haben wahrscheinlich übersehen, daß der Verband um Entrichtung eines einmaligen Beitrags von 30 Pf. pro Kopf gebeten hat. Leider ist dieses kleine Opfer noch nicht allenthalben gebracht worden. Wir nehmen an, daß es nur noch dieses Hinweises bedarf, um in den Besitz einiger Geldmittel zu gelangen, deren wir bis Mai unbedingt noch bedürfen. Der Kassenbestand ist zurzeit so, daß die nach Berlin abgeordneten Vertreter die Aufwendungen aus ihren Mitteln aufbringen müssen, wozu sie kaum in der Lage sind. Der Vorstand.
J. A.: Joh. Birk, 1. Vors. Leipzig-Mo., Beuthstr. 29.

Vereinigung der Vogelliebhaber Landesverband Preußen. Generalversammlung. Am Sonnabend, dem 26. April, abends 8 Uhr, fand die erste Generalversammlung des Preußischen Landesverbandes der Vogelliebhaber in Berlin in den Posthörsälen, Artilleriestraße, statt. Vertreten waren die Vereine: „Aegintha", Verein der Vogelfreunde in Berlin, Vereinigung der Liebhaber einheimischer Vögel, Berlin, Verband der Vogelhändler und verwandter Berufsgenossenschaften E. V. Berlin und der Verein für Vogelschutz und -Liebhaberei zu Hamburg, vertreten durch den Vorsitzenden Herrn A. Weber. Der 1. Vorsitzende, Herr Nyncke, eröffnet die Versammlung mit der Begrüßung der Anwesenden und spricht sein Bedauern aus, daß nicht mehr Herren von den angeschlossenen Vereinen erschienen sind. Hierauf erhält der 1. Schriftführer, Herr Rückert, das Wort zur Erstattung des Jahresberichts. Derselbe enthält Angaben über die stattgefundenen Sitzungen und Vorstandssitzungen sowie folgende Angabe: Die Vereinigung der Vogelliebhaber Landesverband Preußen besteht aus 14 Vereinen mit 430 Mitgliedern. Herr Gumbrich vom Verein „Aegintha" hätte noch gern gesehen, wenn Angaben gemacht wären, welche Themen im Laufe der zwei Jahre bearbeitet worden sind. Das Protokoll wird angenommen. Herr Bankdirektor Merz, als Kassierer des Landesverbandes, erstattet Bericht über die Kassenverhältnisse. Der Verband hatte ein Vermögen von über 40000 M., welche sich aus Beiträgen und freiwilligen Stiftungen gelegentlich der Ausstellung usw ergaben. Da kam die unglückliche Inflation, und unser Vermögen zerrann in nichts. Um zu retten, was zu retten war, legte Herr Merz das Geld in Dollaranweisungen an und rundete den Betrag aus eigener Tasche auf 1 Dollar (4,20 M.) nach oben ab, so daß das Vermögen des Landesverbandes augenblicklich aus diesem Betrag besteht. Herrn Merz wird der Dank für die Kassenführung dargebracht und Entlastung erteilt. Hierauf wird dem Gesamtvorstand Entlastung erteilt und der Dank von seiten der Mitglieder für opferfreudige Arbeit ausgesprochen. Die Versammlung wählt nun einen Alterspräsidenten, welcher die folgende Neuwahl des Vorstandes zu leiten hat. Die Wahl fällt auf Herrn Gumbrich vom Verein „Aegintha". Die Wahl des 1. Vorsitzenden erfolgt mit Stimmzettel. Aus derselben geht Herr Nyncke als wiedergewählt hervor. Die übrigen Herren des Vorstandes wurden durch Zuruf gewählt. Zum 2. Vorsitzenden wird Herr Böhme (Vereinigung) gewählt. Der 1. Schriftführer, Herr Rückert, erklärt, kein Amt mehr anzunehmen. Nach längerer Aussprache übernimmt Herr Böhme dieses undankbare Amt, wozu er einstimmig gewählt wird. Zum 2. Schriftführer wird Herr Rückert (Vereinigung) gewählt. Zum 2. Vorsitzenden wird Herr Gottschlag vom Verein „Aegintha" einstimmig gewählt. Herr Merz (Vereinigung) wird einstimmig zum Kassenführer wiedergewählt; zu Kassenprüfern die Herren Gumbrich und Ploetz vom Verein „Aegintha". Außerdem gehören zum erweiterten Vorstand die jeweiligen 1. Vorsitzenden der angeschlossenen Vereine. Es folgt der Punkt Anträge. Hierzu liegt ein Antrag vor, den Jahresbeitrag pro Mitglied festzusetzen. Es werden Vorschläge gemacht: 3.—, 2.—, 1.— M. Nach längerer Aussprache wird beschlossen, den Beitrag für jedes Mitglied der angeschlossenen Vereine nach dem Bestand vom 1. April auf 1 M. festzusetzen. Der Verband der Vogelhändler und verwandter Berufsgenossenschaften E. V. findet diesen Betrag in Anbetracht seiner hohen Mitgliederzahl noch für zu hoch. Der Vorsitzende dieses Verbandes, Herr Lenger, befürchtet, daß seine Mitglieder den Austritt aus dem Landesverband erklären werden. Er kann noch keine bestimmte Zusage machen. Es geht dazu ein Antrag ein; falls der Verband der Vogelhändler seinen Austritt erklärt, können Vogelhändler als Einzelmitglieder aufgenommen werden. Dieser Antrag wird angenommen. Ferner wird beschlossen: die Beiträge können in vierteljährlichen Raten bezahlt werden. Einzelmitglieder, welche dem Verbande beitreten, zahlen 3 M. für das Jahr. Zum Punkt Verschiedenes werden noch viele Sachen behandelt wie Futterbeschaffung, Zeitungsangelegenheit, Interessenlosigkeit der angeschlossenen Vereine zum Landesverband, Reichsverband usw. Herr Böhme macht bekannt, daß zur Gründung des Reichsverbandes am morgigen Sonntag 10 Delegierte aus Leipzig eintreffen. Er bittet um zahlreichen Besuch. Eine große Bewegung geht durch alle Vogelliebhaber. Ein großes Werk soll geschaffen werden; der Zusammenschluß aller Vogelliebhaber Deutschlands. Seiner harren große Aufgaben. Unsere Brüder in Süddeutschland, Bayern und Sachsen leiden unter der Ungleichheit in der Auslegung des Reichsvogelschutzgesetzes. Was dem preußischen Vogelliebhaber gestattet ist, Ankauf von Vögeln, ist genannten Liebhabern verboten. „Freiheit und Gleichheit hört man schallen." Leider ist es anders. Erste Aufgabe wird es sein, den verpönten Paragraphen mit der Endfassung: „Etwa weitergehende Bestim-

mungen der Landesbehörden sind hiervon nicht berührt" aufzuheben. Der Bericht über die stattgefundene Reichsverbandsgründung wird von berufener Seite veröffentlicht werden. Zum Schluß rufen wir den noch nicht an den Landesverband angeschlossenen Vereinen zu: „Vogelliebhaber Deutschlands, vereinigt Euch!" Anschriften an die Vereinigung der Vogelliebhaber Landesverband Preußen sind zu richten an den 1. Vorsitzenden, Herrn F. Nyncke, Berlin O, Königsberger Straße 17. Die Herren Vereinskassierer werden gebeten, die Verbandsbeiträge an den Kassierer des Landesverbandes, Herrn Baukdirektor Erich Merz, Berlin-Friedenau, Wilhelm-Hauff-Str. 14, 2 Tr., einzusenden. Das eingegangene Postscheckkonto wird demnächst wieder eingerichtet werden.

P. Böhme, 1. Schriftführer.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig. Vereinssitzungen jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat im Vereinslokal, „Bauers Brauereirestaurant", Täubchenweg. Nächste Sitzung Donnerstag, den 15. Mai 1924. Gäste stets willkommen.

J. A.: Johann Birk, 1. Vorsitzender.

Anzeigenteil

Die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 20 G.-Pf. berechnet. Aufnahme erfolgt gegen Voreinsendung des Betrages in Reichsgeld v Brief od. auf unseren Zahlstellen: Postscheckkonto: Magdeburg 3148, Wien 156 687, Bern III 4326, Prag: Creditanstalt d. Deutschen unter Angabe des Zwecke

Futtermittel

Vogelfutter [344
für Kanarien, Waldvögel, Exoten, Papageien, Weichfresser. Anfragen nur gegen Rückporto. Liste 13 über Vogelfutter, Liste 5 über Vogelkäfige, Zuchtgeräte usw. mit etwa 400 Abbild.

W. Göpel, Leipzig,
Tröndlinring 1. Telephon 14 958.

Mehlwürmer
geg. Einsend. v. 2.— Reutenmark 1/4 Pfd. franko versend. **D. Waschinski & Co.,** Biesenthal I (Mark). [345

Vögel

Suche [346
0,1 Schama.

U. J. Beumée,
Groningen (Holland).

Junge
Blaustirn-Amazonen
sprechend und sehr gelehrige Vögel à Stück 50.— ℳ

Graupapageien
junge sehr gelehrige Vögel à Stck. 120.— ℳ
Sperlingspapageien Paar 18.— ℳ
Rote Kardinäle (Männch.) à 40.— ℳ
Rote Kardinäle (Weibch.) à 50.— ℳ
Papstfinken, ausgefärbte Paar 40.— ℳ
Papstfinken, nichtausgefärbt (Männch.) Stück 10.— ℳ
Indigofinken Paar 40.— ℳ
Halsbandpfäffchen Paar 30.— ℳ
Weißkehlpfäffchen Paar 15.— ℳ
Schwarzkappenpfäffchen (Männch.) Stück 6.— ℳ
Kubafinken (große) Paar 30.— ℳ
Bergmeisen (indische) Stück 25.— ℳ
Goldaugentimalien Stück 40.— ℳ
Damadrosseln Stück 45.— ℳ
Katzendrosseln Stück 20.— ℳ

Versand per Nachnahme oder Voreinsendung. Porto und Verpackung 3.50 ℳ.

E. W. Lenger, Berlin N 58,
Schönhauser Allee 70 a. [347

Singsittiche,
Nymphensittiche sowie Zuchtweibchen Zebrafink u. Wellensittich
zu kaufen gesucht. [348
Erlemann, Wiesbaden.

Sittiche, Araras, Kakadus, Amazonen, Edelpapageien, Zwergpapageien, Kragenpapageien, Loris, kleine Affen für eigene Sammlung zu kaufen gesucht. Angebote mit genauer Beschreibung und Preis an **Fliegner,** Lehrte-Hannover. [349

Preislisten,
auch über Küken, Legehühner, Zwerghühner, nur gegen Rückporto. [350
Emmy Voß, Köln, Merlostraße 23.

Zur gefälligen Beachtung!

§ 3 des am 1. September 1908 in Kraft getretenen „Vogelschutzgesetzes" lautet:

In **der Zeit vom ersten März bis zum ersten Oktober** ist das Fangen und die Erlegung von Vögeln sowie der Ankauf, der Verkauf und das **Feilbieten,** die **Vermittlung** eines hiernach verbotenen An- und Verkaufs, die Ein-, Aus- und Durchfuhr von lebenden sowie toten Vögeln der **in Europa einheimischen** Arten überhaupt, ebenso der Transport solcher Vögel zu Handelszwecken untersagt.

Dieses Verbot erstreckt sich für **Meisen, Kleiber, Baumläufer, Spechte, Eulen** und **verschied. Falken** für das **ganze Jahr.**

Auf Grund dieses können wir vom **1. März an** Inserate betreffend **Kauf** und **Verkauf einheimischer** Vögel nicht mehr zum Abdruck bringen und bitten, dies bei Aufgabe von Inseraten berücksichtigen zu wollen.

Unter Feilbieten ist das Anbieten zum Kaufe oder zu **sonstigem Erwerbe** zu verstehen. Somit ist ein strafbares Feilbieten auch dann anzunehmen, wenn in einer Anzeige zwar dem Wortlaut nach ein **Tausch** angeboten wird, der Anbietende aber tatsächlich zu kaufen bzw. zu tauschen beabsichtigt und die Form des Tauschangebots nur wählt, um sich gegen strafrechtliche Verfolgung zu sichern. In solchen Fällen machen sich sowohl die anzeigenden Personen wegen verbotenen Feilbietens als auch die die Anzeigen veröffentlichenden Zeitungsunternehmer der verbotenen Vermittlung eines An- und Verkaufs strafbar.

Bei Tauschanzeigen ist ausdrücklich anzugeben, was als Gegenleistung geboten oder gesucht wird. Eine Angabe des Wertes der zum Tausch angebotenen Vögel darf nicht erfolgen! Unter Chiffre können derartige Anzeigen nicht aufgenommen werden!

Die Geschäftsstelle der „Gefiederten Welt"
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Bitte!

In eigenem Interesse wollen die pp. Einsender beachten, daß

a) **alle für die Redaktion** der „Gefiederten Welt" bestimmten **Zuschriften** (Sprechsaal-Anfragen und -Antworten, Vereinsnachrichten usw.) und **Sendungen** (tote Vögel, Manuskripte) nur an **Herrn Karl Neunzig, Hermsdorf bei Berlin,** Neue Bismarckstr.,

b) **alle Bestellungen** auf **Abonnements,** auch vom **Ausland, nur durch die Post,**

c) **Inserate** und dergl. Geschäftliches nur an die **Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg,** Postschließfach 148,

zu richten sind.

Suche auf dem Wege de
Tausches
1 Birkenzeisig-Männche
Als Tauschobjekt zur Wahl ca. 60 Vög
Anfragen an **Dr. A. Kühner,** Fra furt a. M., Platz der Republik 12. [3

Suche zu kaufen
1a roten Kardinal, Magellanzeisig, Kanarienbastarde.
Stephan Welter, Merz
(Saargebiet). [

Vertausche:
rhein. Nachtigall, fingerzah halblaut im Schlag, geg **Schwarzköpfchen, chinesis Nachtigall od. Kanarienha ev. auch andere Sänger.**
N. Diwersy, Merzig (Saa
A. Z.-Mtgl. 183. [

Ia Karmingimpel
schön befiedertes Männch gibt ab oder vertauscht ge **andere Sänger**
N. Diwersy, Merzig (Saa
A. Z.-Mtgl. 183. [

Wegen Fortzuge
muß ich leider meine bereits zur Zuch sammengestellten hervorragenden Ex zuchtpaare sofort abgeben, 1—2 J alt, blutsfremd:
1,1 Zebrafinken 25 ℳ, **3 Zu paare japanische Möwc** (Männchen immer gelb — W chen braunbunt) à Paar 25 **Mehrere schöne Zuchtkäf**
Major Rempe, Bonn, Rittersh straße 21.

Austausch Zentrale!
Welch gleichgesinnter Vo liebhaber beabsichtigt mit in **Austauschverkehr einhei scher und ausländischer Vö und Zeitschriften** zu tret
Syré, Lehrer, **Viernau i. Th**

Der Wellens. v. K. Ruß, neu, f. 2 ℳ z. A.-G. v. Zitzewitz, Berlin W 50, fürstendamm 243. A. Z.-Mtgl. 308.

Inserate
für das am **15. Mai 1924** zur gabe gelangende Heft 13 der **Welt erbitten bis 10. Mai 1924**

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Hermsdorf bei Berlin; für den Anzeigenteil: Rolf Kretschmann, Magdeburg, Postschließfach 1
Verlag der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck: August Hopfer, Burg Bz. Mgdbg.

Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Jahrg. 53 | Den 15. Mai 1924 | Heft 13

(Druckort: Burg, Bezirk Magdeburg.)

Von meinen Rosenpapageien!

Von Dr. Bilfinger, Schwenningen a. N.

(Schluß.) (Nachdruck verboten.)

Luftverhältnisse: Bei Brut 1 und 3 waren dauernd die Fenster offen; Singsittiche, Wellensittiche in den Nebenkäfigen schlüpften fast alle aus. Der Boden wurde mehrmals täglich mit Wasser besprengt. Bei Brut 4 (Winterbrut), die 3 tadellos vollentwickelte Junge enthielt, wie mir Herr Neunzig mitteilte, mag die niedere Temperatur (durchschnittlich + 8° R) des Raumes und Mangel an frischer Luft Schuld tragen. Ungenügende Vitaminzufuhr während des Legens? Diese Frage bleibt offen, glaube aber hier nicht daran. Mangel an feuchter Luft: kann sehr wohl eine Rolle spielen; gerade bei Rosenpapageien und Rußköpfchen sollen Jungen noch viel leichter im Ei absterben als bei den Wellensittichen, wenn es an feuchter Luft mangelt. Beim Rosenpapagei scheint dies auf den ersten Blick paradox, da er aus einem Steppenklima in großer Trockenheit, spärlich Wasser, großer Hitze bei Tag und erheblicher Kühle bei Nacht stammt. Wenn er jedoch in der Regenzeit nistet, so liegt die Sache anders, dann dürfte auch in den dortigen Gegenden die Luft feuchtwarm sein und leicht in das Innere der bezogenen Nester gelangen. Vielleicht hat es die Natur so eingerichtet, damit er deshalb in der Regenzeit brütet. Demnach wäre also ein Erfolg am sichersten in einem Treibhaus zu erzielen. Solches steht aber nicht jedem Sterblichen zur Verfügung, daher habe ich mir jetzt einige Kasten bauen lassen, die dem möglichst nahekommen sollen: Statt des Kastenbodens habe ich ein gut schließendes Zinkblechschublädchen anbringen lassen; darin kommt Wasser und Schwammteile zur Erzeugung einer möglichst großen Verdunstungsfläche; im Kasten selbst befinden sich etwa 6 cm über dem Wasserspiegel 2 Holzleisten, auf welche ein Rähmchen mit Draht (Mücken-)Gaze zu liegen kommt. Darauf eine etwa 2—3 cm hohe Schicht grober Sägespäne oder feiner Hobelspänchen, und darauf baut der Vogel das Nest. Ich glaube, daß auf diese einfache Art in absolut unschädlicher Weise feuchtwarme Kastenluft zu erzielen ist. Ergeben sich Mißstände, was aber kaum anzunehmen ist, oder zeigt die Erfahrung, daß die Vorrichtung zwecklos ist, dann kann man ja das Wasser entfernen und den Kasten genau so wie den gewöhnlichen weiterbenutzen. Dr. K. Ruß selbst schreibt in seinem Handbuch, daß er jahrelang Mißerfolge mit Rosenpapageien hatte, obwohl sich dieselben in bester Verfassung befanden, und erst, als er durch direkte Befeuchtung des Sägemehls von unten her bis zur halben Höhe der Schicht für feuchte Kastenluft mittels eines Glastrichters mit langem Ansatzrohre sorgte, schlüpften alle Eier seiner Rosenpapageien. Das Verfahren scheint mir aber aus verschiedenen Gründen nicht ungefährlich zu sein. Daß feuchte und frische Luft für das Schlüpfen der Eier bei Sittichen eine große Rolle spielt, ist längst erkannt, und meiner Auffassung nach das Fehlen solcher eine der Hauptursache des Liegenbleibens der Eier. Ich halte es daher auch für sehr vorteilhaft, wenn brütende Weibchen fleißig baden, wie dies bei den Singsittichen der Fall ist. Wahrscheinlich wird die Schale bei trockener Luft hart und spröde und die hinter der Schale liegende Eihaut zäh, so daß das Junge nicht imstande ist, sie zu sprengen; es können aber auch andere Dinge noch dabei mitwirken. Dies ist wohl auch eine der Hauptursachen, daß Sommerzucht in Freivolieren immer bessere Resultate ergibt als im Zimmer, auch wenn die Fenster dauernd offengehalten werden, und Winterzuchten schlechte Resultate; neben den langen Nächten kommt da die niedere Temperatur oder die Austrocknung der Luft durch den Ofen oder die Zentralheizung, gegen welche auch alles Wassersprengen nichts nützt, der Mangel an Tageslicht und Sonne als schädliche Faktoren in Betracht. Bei der Wellensittichzucht im Winter im Zimmer bleiben meist ungemein viele Eier liegen, in der Freivoliere schlüpfen fast alle (Sommerzucht); in dem geöffneten Zimmer ist das Resultat schon etwas schlechter. Es ist wohl auch keine Frage, daß verschiedene Arten sich auch in diesem Punkte verschieden verhalten, d. h. mehr oder weniger empfindlich sind.

Schlägt alles fehl, dann bleibt als letzter Versuch das Umpaaren, wenn noch weitere Exemplare zur Verfügung stehen. Es sind dies die Fälle, bei denen die Ursache des Absterbens der Jungen im Paare selbst zu suchen ist. Es soll dieses Verfahren meist überraschende Erfolge haben.

Die geschilderten Zuchtversuche gingen in einem Flemmingkäfig von 85 cm Länge hoch oben am Fenster und an der Wand an einer möglichst ungestörten Stelle mit reichlich Sonnenlicht vor sich. Empfehle aber Drahtkäfig, und in solchem werde ich

mit einem weiteren Paare ebenfalls Zuchtversuche anstellen, wenn ich ein solches erhalten kann. Den Nistkasten bringt man am besten oben an einer Schmalseite von außen an, um den Raum nicht zu beengen; Kastengröße soll die Mitte zwischen dem für Wellensittich und Singsittich halten; ein viereckiger Kasten soll einschl. Holz 17 cm im Quadrat haben. Flugloch bzw. Flugstange sei nicht zu hoch vom Kastenboden entfernt, damit der Vogel beim Einschlüpfen, was oft sehr rasch und hastig geschieht, die Eier nicht beschädigt. Schlupfloch sei etwas größer als für Wellensittiche.

Im Käfig müssen Zuchtversuche bei der notorischen Bösartigkeit der Rosenpapageien in Einzelpaaren angestellt werden. In der geräumigen Freivoliere würde ich jedoch, da er in der Freiheit auch gesellig nistet, ruhig 3—4 Paare versuchsweise einsetzen, doch keine andere Art dazu. Hoffentlich bringt der zu erwartende südafrikanische Transport der Firma Fockelmann recht viele Paare mit, so daß zahlreiche Liebhaber Gelegenheit haben, diesen farbenschönsten, beweglichsten und drolligsten aller uns zugänglichen Zwergpapageien kennenzulernen, und hoffentlich tragen meine Zeilen dazu bei, die zu erwartenden Zuchtversuche erfolgreich zu unterstützen, so daß wir sagen können, daß nicht nur in Frankreich und England, sondern auch bei uns der Rosenpapagei zu den häufiger gezüchteten Papageien gehört. Endlich noch eine Warnung: Vorsicht beim Anfassen dieses kleinen Papageis. Ich wurde, als ich den ersten in der Hand hatte, derart schmerzhaft gebissen, daß es meiner ganzen Energie nur unter dem Eindruck der Gefahr des bevorstehenden Verlusts durch Anfliegen an Fenster oder Wand bedurfte, um das Tier nicht loszulassen. Am besten läßt man die Tiere unmittelbar aus dem Versandkasten in den für sie bestimmten Käfig fliegen, oder schützt sich mit Handschuhen. Es scheint dies vielleicht manchem Leser eine Kleinigkeit und nicht nötig darüber zu reden, doch kann die Sache sehr schwerwiegend werden.

Es wäre sehr dankenswert, wenn noch andere Züchter über ihre Erfahrungen mit der Zucht des Rosenpapageien berichten würden; etwaiger Berichtigung meiner Schilderung in dem oder jenem Punkte sehe ich mit Dank entgegen. Endlich möchte ich nicht verfehlen, den Herren K. Neunzig, Adlersparre (Stockholm), Ludwig (Halle), Mässelhäuser (Koburg), Krabbe (Anklam) für ihre Mitteilungen, wodurch dieser Bericht wesentlich unterstützt wurde, und welche sicher auch andern Liebhabern von großem Werte sind, an dieser Stelle zu danken.

Anhang: Sehr interessant war mir die Ausführung des Herrn Dr. Krös über Legenotbehandlung. Ich habe glücklicherweise ernstlich hiermit schon lange nichts mehr zu tun gehabt, bei Wellensittichen überhaupt nicht, jedoch früher schwer legekranke Wellensittichweibchen wiederholt in der geschilderten Weise erfolgreich behandelt bis auf einen Fall, der, weil nicht rechtzeitig bemerkt, schon zu weit vorgeschritten war. Ich habe das Verfahren auch in der „Gef. Welt", Heft 17/1921, beschrieben.

Da wir nun doch wieder in die Wellensittiche hineingeraten sind, so möchte ich noch berichten, daß ein junger Wellensittich, den ich vor zirka $^5/_4$ Jahren Frau Dr. C. Flöricke in Stuttgart überließ, nach vor kurzem erfolgter Mitteilung der Dame, nunmehr deutlich 20 Worte spricht, außerdem vollkommen handzahm geworden ist; Schnipp hat sich zum Liebling der Familie aufgeschwungen. Ich habe mich inzwischen selbst von der Richtigkeit der Angaben überzeugt und außerdem festgestellt, daß das seinerzeit geradezu krüppelig erscheinende Junge (4. Brut, schlecht gefüttert) sich zu einem selten schönen Vogel entwickelt hat mit tiefblauen Beinen. Er hat auch eine ganze Anzahl Anregungen von einem Rosakakadu, neben dem er untergebracht ist, angenommen, so z. B. das Nicken und Komplimentieren.

Motive und Bedeutung der Vogelliebhaberei.

Von Karl Galle.

(Schluß.) (Nachdruck verboten.)

Die Annahme, daß der Vogel von Natur aus für sein Wohlbefinden einen großen Bewegungsraum verlange, daß deshalb auch der Stubenvogel in der Gefangenschaft sich nicht wohlfühlen und nicht gedeihen könne, beruht auf falschen Voraussetzungen. Der Vogel besitzt wohl ein großes Bewegungsvermögen, aber kein großes Bewegungsbedürfnis. Der freilebende Wildvogel bedarf für seine Existenz, für den Kampf ums Dasein allerdings einer ständigen, anstrengenden Bewegung und volle Flugtüchtigkeit; für das Wohlbefinden des Vogels aber ist der große Bewegungsraum nicht unbedingt notwendig. Da der gefangene Vogel der Nahrungssorgen enthoben ist, so sind auch anstrengende Leibesbewegungen desselben nicht mehr erforderlich. Deshalb ist es falsch, die Stubenvogelhaltung deshalb als eine Grausamkeit zu bezeichnen, weil man die Vögel durch die Gefangenschaft in ihrer ungebundenen Bewegungsfreiheit beschränkt. Der Vorwurf, daß die Vogelhaltung eine Tierquälerei sei, weil durch sie anmutige für die Freiheit geborene Geschöpfe zu dauernder Gefangenschaft verurteilt werden, ist demnach unberechtigt. Wohl äußert erklärlicherweise der eingefangene Wildvogel im Anfang seines Gefangenlebens mehr oder minder lebhaftes Freiheitsverlangen, jedoch weicht, verständige Behandlung seitens des Pflegers vorausgesetzt, seine anfängliche Wildheit und natürliche Scheu vor dem Menschen gewöhnlich bald einem ruhigeren Benehmen, wandelt sich oft sogar in völlige Zahmheit und das ganze Betragen des Vogels verrät in offenkundiger Weise, daß er den Verlust der Freiheit verschmerzt hat und mit seinem Schicksal ganz und gar zufrieden ist.

Die Behauptung, daß die Vogelhaltung den Vogelbestand der freien Natur schädige, entbehrt jeder Begründung, wenn man die Tatsache berücksichtigt, daß für die Stubenvogelliebhaberei fast nur Männchen in Betracht kommen und diese bei den meisten Vögeln in der Überzahl sind, der Vogelbestand durch die Vogelliebhaberei mithin keinen nennenswerten Ausfall erleidet. Deshalb ist es verfehlt, den Vogelfang für den hier und da beobachteten Rückgang unseres Vogelbestandes verantwortlich zu machen. Viel größere Schuld an der Abnahme mancher Vogelarten als der Fang für Stubenvogelzwecke haben

kulturelle Veränderungen, ungünstige Witterungseinflüsse, tierische Feinde usw. Daß der Vogelfang für die Vogelliebhaberei nicht für den Rückgang der Zahl unserer Singvögel verantwortlich gemacht werden darf, beweist die Tatsache, daß diejenigen Vögel, welche sich den veränderten Verhältnissen angepaßt haben, trotzdem nicht in der Abnahme sind, obwohl sie nach wie vor für die Vogelliebhaberei gefangen werden. Die Vögel, welche für die Zwecke der Vogelliebhaberei gefangen werden, sind im Vergleich zu der jenen ungünstigen Einflüssen alljährlich zum Opfer fallenden Zahl gering und kommen für den Haushalt der Natur nicht in Betracht.

Übertriebene Vorstellungen herrschen auch hinsichtlich des wirtschaftlichen Nutzens, welchen die

Geperlter Schmuckbartvogel.

heimischen Vögel, besonders die insektenfressenden, angeblich durch Verzehren von den Menschen schädigenden Insekten gewähren. Es ist nicht zu leugnen, daß die Vögel dem Menschen im Kampfe gegen tierische Schädlinge richtige Dienste leisten, genaue Beobachtungen und Untersuchungen haben jedoch ergeben, daß sie auch ebenso viele dem Menschen nützende Insekten verzehren, daß also der Nutzen, welchen sie uns bringen, durch den Schaden wieder aufgehoben wird. Nicht unbeträchtlich ist der Schaden, welchen manche Vögel auch bei zahlreichem Auftreten an Obst-, Beeren- und sonstigen Nutzpflanzungen sowie durch das Abbeißen von Baumknospen usw. dem Menschen zufügen. Jeder Landwirt und Gartenbesitzer weiß ein Lied davon zu singen. Zudem sind bei verheerendem Auftreten schädlicher Insekten auch die wenigen Vögel nicht imstande, der Plage Einhalt zu gebieten. Es ist demnach falsch, immer nur vom Nutzen der Vögel zu reden und des oft beträchtlichen Schadens nicht zu gedenken, welchen uns dieselben bisweilen zufügen. Es gibt eben keinen absolut nützlichen und keinen absolut schädlichen Vogel; allen ist eine bestimmte Aufgabe im großen Haushalt der Natur zugeteilt, und sie tragen erfolgreich dazu bei, das Gleichgewicht in der Tierwelt aufrecht zu erhalten. In Anbetracht dieser Sachlage tut man gut daran, die Vögel nicht so sehr vom nationalökonomischen als vielmehr vom ethischen Gesichtspunkt aus zu hegen und zu pflegen. Die vorstehenden Ausführungen werden genügen, um darzutun, daß bei gewissenhafter, verständiger Ausübung die Vogelliebhaberei volle Berechtigung hat, und daß die Gegner der Waldvogelliebhaberei nicht berechtigt sind, dem Vogelfreund, der sich einen oder einige gefiederte Sänger der Heimat zu Stubengenossen erwählt, um sich an ihrem munteren Gebaren, ihrem herrlichen Gesange zu erfreuen, die Freude zu verkümmern und sein altes Recht, Vögel zu käfigen, streitig zu machen. Die Waldvogelliebhaberei ist viel älteren Datums als die Kanarien- und Exotenliebhaberei; sie hat alte, historische Berechtigung und läßt sich nicht mehr unterdrücken. Nur wer selbst leidenschaftlicher Vogelliebhaber, namentlich Waldvogelwirt ist, der weiß, mit welcher zärtlicher Liebe der wahre Vogelliebhaber seine Lieblinge pflegt, was ihm seine Liebhaberei bedeutet. Sie erhält ihm die Fühlung mit der Natur, der er sich sonst entfremden würde, gewährt ihm während der Arbeit und in der Mußezeit Zerstreuung und Erholung von den Sorgen des Alltags und

verleiht ihm neue Schaffensfreudigkeit im Kampfe ums Dasein. Dem echten Vogelliebhaber ist kein Opfer und keine Mühe zu groß, wenn es das Wohl seiner Pfleglinge erfordert. Er scheut nicht die Kosten, wenn es sich um den Erwerb eines heißbegehrten Sängers, eines zweckmäßigen, schönen Käfigs oder teurer Futtermittel handelt, nicht die Mühe, welche ihm die sachgemäße Pflege seiner Vögel verursacht; er erfreut seine gefiederten Lieblinge durch mancherlei Leckerbissen, die er oft mühevoll in Wald und Feld sammelt, legt sich ihretwegen oft Beschränkungen und fühlbare Entbehrungen auf, kurz er sucht und findet in der Vogelliebhaberei die Befriedigung seines idealen Bedürfnisses. Glücklich der Liebhaber, dessen spontane Liebe für die Vögel im Familienkreise wohlwollendes Verständnis findet, dem etwa eine liebe, gleichgesinnte Gattin zur Seite steht, die Freud' und Leid seiner Liebhaberei mit ihm teilt.

Übrigens dient auch die Vogelliebhaberei, so sonderbar es scheinen mag, dem Vogelschutz, insofern nämlich, als der praktische Vogelfreund bei dem steten Interesse für alles, was da fliegt, auch erfahrungsgemäß die Vögel im Freien nicht vergißt, indem er ihnen, wenn er es irgendwie vermag, durch Aufhängen von Brutkasten, Anpflanzungen von Hecken, Vernichtung ihrer Feinde, Winterfütterung usw. seinen Schutz zuteil werden läßt, ihnen eine sichere Heimstätte zu schaffen sucht und so die Schuld, der Natur ein paar reizende Geschöpfe für sein Heim geraubt zu haben, reichlich wiedergutmacht. Der Waldvogelliebhaber ist infolge seiner Kenntnis des Lebens und Wesens, der Bedürfnisse und Gewohnheiten vieler Vögel der Heimat in erster Linie berufen, praktischen Vogelschutz zu üben. Vogelschutz, Vogelkunde und Vogelliebhaberei stehen eben in engem Zusammenhang zueinander.

Neben der ethischen und volkswirtschaftlichen sowie derjenigen für den praktischen Vogelschutz kommt der Stubenvogelliebhaberei auch eine große wissenschaftliche Bedeutung zu, und sie hat der wissenschaftlichen Forschung schon wertvolle Dienste geleistet. So manches wissenschaftliche Resultat ist den aufmerksamen Beobachtungen und unermüdlichen Versuchen in Vogelliebhaberkreisen zu verdanken, so manche noch unaufgeklärte Frage auf dem Gebiete der Vogelkunde der Lösung näher gebracht worden. Die Wissenschaft baut sich ja aus zahllosen Einzelversuchen und Beobachtungen auf, und jeder Vogelliebhaber kann darum zu seinem Teil dazu beitragen, die wissenschaftliche Forschung durch einwandfreie Beobachtungen und Experimente zu unterstützen und fördern zu helfen. Hierzu ist es natürlich erforderlich und wünschenswert, daß jene Vogelfreunde, die zuverlässige, neue, interessante Beobachtungen gemacht haben, mögen sie auch scheinbar noch so unwichtig sein, damit nicht zurückhalten, sondern im Interesse der wissenschaftlichen Forschung und zu Nutz und Frommen anderer Vogelfreunde darüber in ihrer Fachzeitung sachlich und klar berichten.

Daß die Stubenvogelliebhaberei zur Bereicherung der Kenntnis unserer Vögel beiträgt, ist eigentlich selbstverständlich. Jeder Waldvogelwirt weiß von der krassen Unkenntnis, die im Volke noch immer auf diesem Gebiete herrscht, zu erzählen. Besonders die Kenntnisse des Großstadtbewohners lassen in dieser Hinsicht viel zu wünschen übrig, was nicht zu verwundern und entschuldbar ist, wenn man berücksichtigt, daß der Stadtbewohner wegen seiner mangelnden Berührung mit der Natur und im hastenden Erwerbsleben eben nur selten Gelegenheit hat, sich Kenntnisse auf diesem Gebiete anzueignen. Hier ist die Stubenvogelliebhaberei berufen, aufklärend und belehrend zu wirken und dem Volke die Kenntnis der heimischen Vogelwelt in ausgezeichneter Weise zu vermitteln.

Der Vogelliebhaberei wohnt aber auch eine gewisse soziale Bedeutung inne. Sie ist demokratischer Natur, bringt die Angehörigen aller Gesellschaftsklassen einander menschlich näher und trägt somit zur Milderung und zum Ausgleich sozialer Gegensätze bei, die in der gegenwärtigen Zeit so scharf hervortreten.

Aus den vorstehenden Ausführungen geht hervor, daß die Vogelliebhaberei keine müßige Spielerei ist, sondern daß ihr im Gegenteil Bedeutung in mehrfacher Hinsicht innewohnt und daß wichtige Faktoren für ihre Berechtigung sprechen, welche ihre Förderung und Verbreitung durchaus wünschenswert erscheinen lassen. Jeder einzelne Vogelliebhaber kann für sein Teil an der Hebung der Vogelliebhaberei mitarbeiten, indem er seine Vögel nach bestem Wissen und Gewissen pflegt, andern Liebhabern mit Rat und Tat helfend zur Seite steht und allezeit für die Wahrung der berechtigten Interessen der Vogelliebhaber eintritt. Zweck der vorstehenden Ausführungen ist es, den Vogelfreund in der Abwehr ungerechtfertigter Angriffe seitens unverständiger, sentimentaler Tierschützler zu bestärken und zu unterstützen, letztere von ihren gegensätzlichen Anschauungen zu bekehren und so der Vogelliebhaberei neue Freunde zuzuführen. Leider sind auch für die Vogelliebhaberei die Wirkungen des Weltkrieges nicht ausgeblieben. Das gänzliche Aufhören der Einfuhr fremdländischer Vögel, die hohen Preise für Vögel im Verein mit den mangelnden, minderwertigen Futtermitteln sowie auch die schweren wirtschaftlichen Nöte und Sorgen der Zeit haben bewirkt, daß die Stubenvogelliebhaberei starke Einbuße erlitten hat und naturgemäß in den Hintergrund treten mußte. Wahrhaft bedauerlich wäre es, wenn diese Erscheinung zur bleibenden werden und das liebevolle Empfinden für die Vogelwelt im Volke erkalten würde. Mit dem Verschwinden der Vogelliebhaberei ginge ein Stück Volkstum, ein schöner Zug des deutschen Nationalcharakters verloren. Schon aus diesem Grunde sollte man die Vogelliebhaberei nicht unterdrücken, sondern eher zu fördern suchen. Es ist zu erwarten, daß mit der Wiederkehr geordneter Verhältnisse im Reiche auch das Interesse für die gefiederte Welt im deutschen Volke neu erwachen und die Vogelliebhaberei wieder ihre alte, ausgedehnte Verbreitung finden wird.

Neueinführungen und Seltenheiten.

Von Karl Neunzig.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Die Zahl der bisher eingeführten Formen von Bartvögeln ist eine ziemlich geringe im Vergleich zu dem Artenreichtum der Familie. Man

kennt ungefähr 150 Arten, welche die Tropen Afrikas, Asiens und Amerikas bewohnen. Die Familie zeichnet sich durch einen großen Formen- und Farbenreichtum aus und umfaßt Vögel von der Größe eines Zaunkönigs bis zur Größe eines Grünspechtes. Die Abbildungen dieses Heftes zeigen einige Typen der Gattung. Der gerade oder wenig gebogene Schnabel ist kurz und kräftig, zeigt bei einigen eine oder mehrere Zahnauskerbungen vor der Spitze, und die ziemlich hoch, nahe der Firste am Schnabelgrunde liegenden Nasenlöcher sind bei manchen von Borsten bedeckt. Die stets vorhandenen Schnabelborsten sind bei manchen so stark entwickelt, daß sie die Schnabelspitze erreichen oder überragen. Die Zunge ist breit, lanzettförmig, ihr Rand ist zerfasert, die Läufe sind

Geperlte Schmuckbartvogel — Trachyphonus margaritatus (*Cretzschm.*)

gehört, gräbt in dem harten Erdreich flache, ziemlich enge Bruthöhlen. Die Eier sind weiß.

Das Kennzeichen der Gattung Schmuckbartvögel ist die Haubenbildung der Oberkopffedern, das Fehlen eines Zahnes an den Schneidenrändern des Oberschnabels, Fleckung oder Bänderung des Rückens und der Flügel sowie der Schwanzfedern, die etwa gleich lang sind. Die „Handlist“ nennt 10 über Ost- und Südafrika verbreitete Arten. Der geperlte Schmuckbartvogel ist über Nordostafrika verbreitet. Heuglin berichtet, daß er sich paar- oder familienweise in der Waldregion aufhalte, er habe ihn aber auch in der Steppe gefunden, wenn Büsche oder niedere

Halsbandbartvogel.

kurz, zwei Zehen sind nach vorn, zwei nach hinten gerichtet. Sie gehören zu den Klettervögeln, und besonders die kleineren klettern gewandt in den Zweigen der Bäume umher, während die größeren meist, besonders wenn sie gesättigt sind, träge und lange Zeit auf demselben Aste hocken und nur ihre kurzen, schrillen Rufe andauernd hören lassen. Von ihren kurzen Flügeln, welche sie als schlechte Flieger kennzeichnen, machen sie ungern Gebrauch, und selten beobachtet man sie bei ihrem kurzen schwirrenden Flug. Der Schwanz ist zehnfederig. Sie nähren sich von Beeren, Früchten, Blattknospen und Insekten, besonders Kerfen und deren Larven, welche im Holze leben. Bartvögel sind Höhlenbrüter. Sie nisten in vorhandenen Baumhöhlen, einige Arten meißeln sich ähnlich wie der Specht Bruthöhlen in Baumstämme. Zuweilen werden Brutstätten auch in Termitenbauten gewählt. Die Gattung Schmuckbartvögel — Trachyphonus, zu welchen der von Fockelmann neueingeführte

Baumgruppen in der Nähe waren. Meist lebt er in dichtem, mit Schlingpflanzen verwobenem Gebüsch, der Flug sei geräuschvoll, kurz und spechtartig. Besondere Aufmerksamkeit erregt die Stimme dieses Bartvogels bei den Reisenden. Heuglin sagt: „Oft und vorzüglich zur Paarungszeit hört man die laute, pfeifende Stimme, die ungefähr wie „du—du—dui — dui“ klingt, die zweite Silbe der mittleren Laute immer um eine Oktave höher als die erste. Mehrere Männchen wetteifern so aus vollem Halse schreiend.“ Hartmann, der den Gesang des Bartvogels einen der sonderbarsten und charakteristischsten Naturlaute nennt, welche man in jenen Gegenden vernimmt, beschreibt nun, um die Wirkung der Stimme des Bartvogels zu veranschaulichen, einen Flußwald in der Nähe eines Dorfes, in welchem er den Vogel hörte: „In der Nähe des Dorfes hat der Flußwald schon die großartigsten Dimensionen und zeigt eine Fülle tropischer Formen. Hochstämmige Akazienbäume, astreiche Ficus populifolia mit lang herabhängenden

Luftwurzeln, Tamarisken (hier werden die wissenschaftlichen Namen noch anderer Tropenbäume aufgezählt) und andere Arten bilden ein undurchdringliches Walddickicht, welches von zahlreichen Schlinggewächsen (die Arten werden aufgezählt) durchflochten ist. In diesem Pflanzenchaos vernimmt man das sonderbare Schnurren des Vogels, Töne, welche Hartmann durch die Silben: „tiurr—tiurr" umschreiben möchte, obgleich auch diese das halb Singen, halb Schnurren, oftmals hintereinander wiederholt und eine gewisse Modulation gewährend, nur wenig genügend ausdrücken. Meist sei der Vogel im dichten Gebüsch versteckt und sein Schnurren höre plötzlich auf, sobald man sich seinem Standort nähere. Nach Elliot nimmt der Vogel beim Ausstoßen der lauten schrillen Töne durch Verdrehen von Hals, Flügeln und Schwanz merkwürdige Stellungen ein. Eifrig scheint der Perlbartvogel nur im Singen und im Fressen zu sein, sonst ist er träge wie andere Gattungsgenossen. Wie oben erwähnt, nisten die Schmuckbartvögel in Erdlöchern, die sie selbst graben. Der Lied unserer Nachtigall mag ja gefühlvoller klingen, aber in Afrika, wo an kleinen Sängern kein Überfluß ist, habe ich den braven gelben Vogel stets mit Vergnügen gehört, besonders wenn sich nicht mehrere zu überschreien versuchten."

Gefiederbeschreibung: ♂ Oberkopf glänzend schwarz, Nacken hellgelb mit kleinen schwarzen Flecken; Rücken fahlbraun mit weißen Tropfenflecken; Bürzel blaßgelb; Oberschwanzdecken rot; Kopfseiten hellgelb mit kleinem hellem, weißem Ohrfleck; Vorderhals hellgelb, auf der Mitte ein schwarzer Fleck; schmales Brustband, außen an den Seiten braune Flecken mit weißem Tropfenfleck, in der Mitte gelblichweiß mit bräunlichen und roten Flecken; übriger Unterkörper gelblichweiß; Unterschwanzdecken rot; Flügeldecken wie Rücken; Schwingen, Schwanzfedern braun, auf beiden Fahnen mit weißlichen bis gelblichweißen Randflecken, welche auf den äußeren Schwanzfedern sich zu Querbändern erweitern; Unterflügeldecken weiß; Auge rotbräunlich; Schnabel gelbrot mit dunkelhornfarbiger Spitze; Füße bräunlich grau; Lg. 190—210, Fl. 85–95, Schw. 80—90, Schn. 22—27, Lf. 22—27 mm. ♀ wie ♂ ohne schwarzen Fleck auf dem Vorderhals.

Gefangene Bartvögel sind recht interessante Stubenvögel und in ihren schönen Farben eine Zierde jeder

Rotstirnbartvogel.

herausgeholte Sand wird mit den Füßen weit fortgeschleudert. Die fast wagerechten Nistlöcher graben sie 25—65 cm tief in die Steilabhänge der Regenstrombetten oder in Uferwände von Waldbächen. Die reinweißen Eier (25—27×18—19 mm), 4—6 an der Zahl, scheinen ohne Unterlage auf der bloßen Erde zu liegen. Die Brutzeit ist die Regenzeit. Nach den Berichten neuerer Forscher ist unser Bartvogel doch nicht so an Walddickichte gebunden, wie es nach den Schilderungen Hartmanns und zum Teil auch Heuglins den Anschein hat. Graf Zedlitz teilt über ihn mit, daß er nach seinen Beobachtungen keineswegs ein reiner Waldbewohner sei. „Er scheint wenig wählerisch zu sein und wird auf dem Hochplateau in den einzelnen Dornbüschen ebensogut angetroffen wie in den Steppen des Barkagebietes und den Obstgärten in Cheren. In letzterem Ort ist er gemein und wählt mit Vorliebe die Kaktushecken als Sitzgelegenheit." Gar nicht selten sah Graf Zedlitz den Vogel auf dem Boden umherhüpfen. Über seinen „Gesang" äußerte sich Graf Zedlitz wie folgt: „Keinen anderen Bartvogel hörten wir annähernd so fleißig singen wie diesen, wobei er meist auf der Spitze eines Feigenkaktusses oder Dornstrauches saß. Das Vogelstube. Die laute Stimme lassen sie bei weitem nicht so häufig und anhaltend hören, wie der Liebhaber aus den Schilderungen des Freilebens entnehmen oder gar fürchten könnte. Besonders die kleineren Arten werden schnell zahm und zutraulich. Zu ihrer Beherbergung dient der Drosselkäfig, der für die größere Art mindestens eine Länge von 1 m und entsprechende Höhe und Tiefe haben müßte. Die Sitzstangen müssen verschieden dick sein. Bartvögel werden mit Drosselfutter ernährt und Zusätzen von gekochtem Reis, zerschnittenen gekochten Möhren und vor allem viel Obst, besonders Bananen, Weinbeeren, Birnen, gequollene Südfrüchte und besonders schwarze Holunderbeeren, die sehr gern gefressen werden. Gelegentliche Beigaben von allerlei Kerfen, frischen Ameisenpuppen, Mehlwürmern und rohem Fleisch sind zu empfehlen. Bartvögel baden sehr gründlich, wenn auch nicht gerade häufig. Mit anderen Vögeln können sie nicht zusammen gehalten werden, da sie kleinere Vögel töten und auch größere beständig verfolgen.

(Fortsetzung folgt.)

Nur ein Star.

Von Dr. H. W. Frickhinger, München.

(Nachdruck verboten.)

Der lesenswerte Aufsatz, den A. Krüger unter diesem Titel in Nr. 7 (S. 53/56) der „Ges. Welt" veröffentlichte, veranlaßt mich, auch meine Erfahrungen über den Star als Stubenvogel an dieser Stelle bekanntzugeben.

Im Herbst 1922 erhielt ich von einem württembergischen Vogelfreund, mit dem ich in ornithologischen Austauschbeziehungen stehe, einen männlichen Star, der wohl aus einer Frühjahrsbrut dieses Jahres stammte.

Anfänglich war unser „Hans" etwas scheu, er gewöhnte sich aber bald an meine Frau und mich, und besonders erstere hatte er nach kurzer Zeit sehr in sein Herz geschlossen.

Es gibt nicht leicht einen klügeren Vogel wie den Star. Er lernte nach wenigen Wochen meine Frau und mich genau kennen, und wenn eines von uns beiden an den Käfig herantrat, wurden wir sofort von Hans mit einem breiten „Kwah" begrüßt. Dieselben Töne, aber dann in energischem, befehlsmäßigem Tone vorgebracht, äußerte Hans, wenn wir mittags beim Essen saßen. Immer dringlicher wurde sein Ruf, von stetigem, aufgeregtem Hin- und Hergehupfe begleitet, wenn wir seine Wünsche einmal nicht sofort erfüllten.

Als echter Star war Hans nämlich auch recht gefräßig: er fraß alles, was bei uns auf den Tisch kam. Und zog er auch ein Stückchen Fleisch oder ein Stückchen Pfannkuchen vor, so lehnte er doch selbst Fisch nicht ab. Und im Notfalle begnügte er sich auch mit einem Stückchen schwarzen Brotes. Die Hauptsache war immer, daß wir seiner nicht vergaßen. Hatte er dann etwas erhalten, widmete er sich eifrig dem Schmausen und hämmerte mit seinem Schnabel auf dem Käfigboden umher, daß es nur so klang. Hatte Hans seinen Brocken vertilgt und Geschmack an dem Gereichten empfunden, so bettelte er sofort wieder. Hatte es ihm nicht geschmeckt, schwieg er still.

Eigenartig an dieser Gewohnheit unseres Stars war die Tatsache, daß er nicht nur des Mittags oder beim Frühstück (in Kaffee getauchtes, mit Butter bestrichenes Weißbrot liebte er heiß) seine Anwesenheit in empfehlende Erinnerung brachte, auch beim Abendessen, selbst wenn er vorher in die oberen Regionen seines Hauses sich verzogen hatte, um der Nachtruhe zu pflegen, bettelte er sofort, zuerst leise und verschlafen, aber bald im gewohnten deutlichen Tone.

Levaillants Bartvogel.

Allein wollte Hans nicht sein. Wenn wir länger fort waren und ich schloß die Wohnungstür auf, dann vernahm ich — Hundert gegen Eins zu wetten — sofort sein Begrüßungs-„Kwah". Im tiefsten Winter badete Hans zwei-, dreimal am Tage. Und wie! Manchmal triefte sein ganzes Haus, so gespritzt hatte der muntere Bursche. Und wie er dabei krähte und krächzte, vor lauter Vergnügen! Auch in seinem Singsang war Hans tüchtig, die Schlußtöne jubelte er oft so schmetternd hinaus, daß uns Hören und Sehen verging.

Leidig an Hans war sein ewiges Herumspielen am Käfig, seine häufig wiederholten Versuche, die Türchen zu öffnen, was — endlich — gelang. Und eines Morgens saß Hans das erstemal oben auf der Vorhangstange und begrüßte uns mit einem freudigen „Kwah". Seine Spuren sind heute noch auf unserem Lampenschirm und andernorts zu finden! Und diese Ausbruchsversuche Hans' wiederholten sich immer öfter. Anfänglich hatten wir ihm den Flug im Zimmer gegönnt. Aber meine Frau hatte

alle Mühe, ihn immer wieder in den Käfig zurückzubefördern. Bis ich ein einfaches Mittel fand, ihn zur Vernunft zu bringen. Ich — kam mit einem großen Haarbesen! Davor hatte Hans eine Heidenangst, und mit einem ängstlichen „Kwah" flüchtete er sich zurück in sein Haus. Offenbar täuschte ihm der Besen ein Raubzeug vor.

Oktober 1923 stellten wir seinen Käfig an einem milden Abend ans offene Fenster und — vergaßen die Türen zu sichern. Hans stieg heraus, die Sonne lockte zur Freiheit, Hans entflog. Unser Schmerz war groß, besonders groß, weil wir uns sagen mußten, daß der arme Teufel wohl bald einer wildernden Katze oder der kurz darauf einsetzenden Kälte zum Opfer gefallen sein wird. Den Anstrengungen des Zuges war der Vogel sicherlich nicht gewachsen.

Kleine Mitteilungen.

Ich beobachte schon seit vergangenem Herbst 1923 hier auf der Vulkanwerft, oben auf den etwa 70 m hohen Schiffshelgen, wo einst vor dem Krieg Deutschlands größter Dampfer, der Imperator, vom Stapel lief, ein Paar **Wanderfalken**. Die Neuhofer und Tollerwarter Taubenzüchter sind davon nicht sehr erbaut und haben dem Wanderfalkenpaar, das unter dem Taubenbestand arg aufräumt, Rache für die verübten Räubereien geschworen. Im November vorigen Jahres fiel plötzlich einer der Vögel vom Helgen. Er war tot. Wahrscheinlich war er mit der für die Kräne bestimmten elektrischen Leitung hoch oben unter den Helgen in Berührung gekommen. Ich habe oft dies Falkenpaar beobachtet, wie es sein Opfer kröpft. Die Federn der Tauben fallen dann im Sonnenschein wie Schneeflocken zur Erde. Er schlägt auch Möwen. Aber während er eine Taube vollständig verzehrt, verzehrt er die Möwen nicht immer völlig. Was mag der Grund hierfür sein? R. Thiele, Altona.

Die Abbildungen auf S. 101—103 stellen **afrikanische Bartvögel** dar, welche einige Jahre vor Ausbruch des Krieges in den Berliner zoologischen Garten gelangten. Die drei Arten sind recht farbenprächtige Vögel. Der Halsbandbartvogel — Lybius torquatus (*Dum.*) fällt auf durch das rote Gefieder des Kopfes, welches nach hinten breit schwarz begrenzt ist. Die Unterseite ist blaßgelb, der Rücken braun mit sehr feinschwarzen Wellenlinien. Er ist wie Levaillants Bartvogel (S. 103) von mittlerer Größe, während der Rotstirnbartvogel — Tricholaema leucomelan *(Bodd.)* zu den kleineren, etwa finkengroßen Arten gehört. Sein Gefieder ist hauptsächlich schwarz und weiß gefärbt, ein breites Stirnband ist rot, der vordere Augenbrauenstreif, die Endhälfte der Oberschwanzdecken und die Fleckung der Oberseite sind gelb. Bei Levaillants Bartvogel ist das Gefieder an Kopf und Kehle gelb mit roten Spitzen, gelb ist auch der Bürzel und die Unterseite; rot ist die Strichelung der Brust und die Farbe der Oberschwanzdecken. Das übrige Gefieder ist schwarz mit weißen Zeichnungen.

Sprechsaal.

(Steht den Abonnenten kostenlos zur Verfügung.)

Frage 5: Nach meinen Beobachtungen singen im Käfig gehaltene Amseln fast ausschließlich auf dem Käfigboden. Soweit ich mich erinnere, sah ich sie nie von einer Sitzstange aus ihren Gesang vortragen, während sie im Freileben doch wohl in der Regel von einem höheren Stand aus ihr Lied hören lassen und nur selten auf dem Erdboden sitzend, was ich allerdings auch schon wiederholt beobachtet habe. Wie ist dies Verhalten zu erklären?

F. M., Potsdam.

Vom Vogelmarkt.

Von seltener auf den Vogelmarkt kommenden Vögeln werden angeboten:

E. W. Lenger, Berlin N 58, Schönhauser Allee 70a: Blaustirnamazonen, Graupapageien, Sperlingspapageien, rote Kardinäle (Mchn. u. Wbch.), Papstfinken (ausgefärbt u. nichtausgefärbt), Indigofinken, Halsbandpfäffchen, Weißkehlpfäffchen, Schwarzkappenpfäffchen, Kubafinken (große), Bergmeisen (indische), Goldaugentimalien, Damadrosseln, Katzendrosseln.

N. Diwersy, Merzig (Saar) (A. Z.-Mtgl. 183); Karmingimpel.



Herrn A. C., Berlin. Die jungen Vögel litten an Darmentzündung, die bei der Kanarienvogelzüchtung nicht selten einen epidemischen Charakter annimmt und Alte und Junge dahinrafft. Die Ursache der Erkrankung festzustellen, ist bei so jungen Vögeln sehr schwierig, und wenn die Fäulnis schon so weit fortgeschritten ist wie bei den gesandten, kaum möglich. Die beabsichtigte Maßnahme, die Züchtung vorläufig aufzugeben usw., ist richtig.

Herrn K. T., Braunschweig. Das Weibchen des Sonnenvogels ist häufig schwer vom Männchen zu unterscheiden, besonders wenn es sich um ältere Weibchen handelt. Im allgemeinen ist es matter gefärbt, besonders das Olivgrün am Oberkopf hat nicht den warmen, goldigen Ton wie beim Männchen. Ferner sind die Außensäume der inneren Handschwingen nicht karminrot wie beim Männchen, sondern orangerot. Der wissenschaftliche Name des Sonnenvogels — chinesische Nachtigall ist eine schlechte Bezeichnung für den Vogel, der mit der Nachtigall gar nichts zu tun hat — ist Liothrix luteus *Scop.*

Frau M. S., Stettin. 1. Wellensittiche sind im allgemeinen unempfindlich gegen Störungen während der Brut; es ist natürlich besser Störungen zu vermeiden, und besonders junge Weibchen oder solche, welche das erstemal in Gefangenschaft brüten, sollte man möglichst in Ruhe lassen. Wenn die Weibchen sonst munter sind und guten Appetit haben, so hat das Federsträuben vermutlich nichts auf sich. Weiße Hirse, Spitzsamen, Hafer genügen als Futter. 2. Wenn die Hähne auch nistlustig sind, so war es ganz richtig, die Weibchen in die Hecke zu geben. 3. Ein Kanarienweibchen, welches im vorigen Jahre an Legenot litt, kann in diesem Jahre wieder zur Zucht verwendet werden. Sollte sich aber wiederum Legenot einstellen, so wird es aus der Hecke entfernt. Es ist dann zur Zucht nicht zu verwenden.

Herrn R., Wien. Die Behauptung, daß junge Stare dem Geschlecht nach schwer zu unterscheiden sind, war oft aufgestellt. Ein eifriger Starenfreund schreibt uns: ..."Dem ist jedoch nicht so. Bekanntlich haben die jungen Starmännchen auf der Zunge einen länglichen, mohngrauen Fleck, während dieser Fleck bei den jungen Starweibchen niemals vorhanden ist. Dies ist ein sicheres Geschlechtsunterscheidungszeichen bei jungen Staren, und wer daran festhält, wird niemals bei Auswahl eines Vogels dieser Art fehlgreifen."

Herrn O. F., Halle. Wenn das gehäubte Kanarienweibchen die kahle Stelle stets gehabt hat, d. h. diese Stelle niemals befiedert war, so muß darauf verzichtet werden, dort Federn hervorsprießen zu sehen. Sind die Federn aber erst jetzt ausgefallen, so wird die Kahlheit bald wieder schwinden. Der Federwuchs wird zuweilen angeregt durch mehrmaliges dünnes Bestreichen mit Karbolsäureöl (1%). In ersterem Fall ist der Vogel nicht zu Zuchtzwecken zu verwenden.

Herrn M. P., Dresden-A. Der allzu fette Zeisig ist einem Herzschlag erlegen. Krankheitskennzeichen konnten nicht festgestellt werden.

Herrn A. C., Berlin. Der junge Kanarienvogel ist von den Alten nicht mehr gefüttert worden. Er ist verhungert.

Herr O. D., Zwickau. Das Männchen der Mönchgrasmücke hat eine schwarze, das Weibchen eine braune Kopfplatte. Es kommen auch Männchen mit brauner Kopfplatte vor. Früher wurden sie für eine besondere Art gehalten. Im Süden des Verbreitungsgebietes der Mönchgrasmücke sind sie häufiger als im Norden.

(Fortsetzung auf der 3. Umschlagseite.)

Aus den Vereinen.

Angemeldet ist Herr Walter Schenck, Oberleutenant a. D., Lebus bei Frankfurt a. O. — Aufgenommen sind die Herren: Mtgl. 392 Albert Müller, Köln-Kalk, Usingerstr. 99; Mtgl. 393 Georg Merkel, Druckereibesitzer, Mainz, Boppstr. 34; Mtgl. 394 Friedrich Wolff, Hamburg 33, Heinrich-Helbing-Str. 33; Mtgl. 395 Karl Lanz, Molkerei Zell, Krs. Alsfeld in Oberhessen. — Für weitere Mitteilungen verweise ich auf das voraussichtlich am 15. ds. Mts. zur Ausgabe gelangende Rundschreiben.

A. Krabbe.

Bayerischer Vogelliebhaber-Verein (e. V.) (Sitz München). Die Märzversammlung stand im Zeichen eines Wiener Besuches, des Offizials der Österr. Bundesbahn, Herrn Hans Janauschek, der als Delegierter des 1. Floridsdorfer Waldvogelvereins „Die Edelfinken" gekommen war. Dem Besuch ging eine längere Korrespondenz voraus, die durch die „Gef. Welt" eingeleitet wurde und zu einer korporativen Verbindung der beiden Vereine auf Gegenseitigkeit führte. Dieser Punkt allein genügte schon, ein volles Haus verzeichnen zu können, und es herrschte auch in der Tat eine drangvolle Enge. Der 1. Vorsitzende Herr Ing. Flierl eröffnete mit einer offiziellen Begrüßung der Erschienenen und mit Dankesworten für den guten Besuch die Versammlung und ging sofort zur Tagesordnung über. Zu Punkt 1 erledigte er neben einigen Neuaufnahmen den korporativen Anschluß des 1. Floridsdorfer Waldvogelvereins „Die Edelfinken" und gab seiner Freude darüber Ausdruck, daß nun auch mit Wien, das ja die Hochburg der deutschen Vogelliebhaberei darstellt, die engere, sportliche Verbindung hergestellt wurde. Das Wort beanspruchte hierauf Herr Janauschek, der des Lobes voll war über unsere Vereinstätigkeit, unseren nie erlahmenden Offensivgeist in Fragen der Vogelschutzbewegung (Petitionen, Druckschriften, Flugblätter usw.), die stattliche Vereinsbibliothek, die Balgsammlung usw. Weiterhin streifte er seine Eindrücke, die er gewonnen hatte, über den hohen Stand der Vogelliebhaberei in München, das auserlesene Käfigmaterial, die Reichhaltigkeit der gekäfigten Vogelarten usw. Seine Verwunderung gipfelte immer wieder in dem Ausruf: „Ja, so was gibt's nur in Deutschland". Der weitere Verlauf der Ausführungen galt nun seiner Heimat Österreich und der engeren Heimat Wien. Er entrollte uns ein Bild von den Wiener „Vogelzuckern", das mit viel Humor vorgetragen wurde, und scheint überhaupt der Verein „Die Edelfinken" den besten seiner Besten als Delegation entsandt zu haben. Weiter interessant waren die Ausführungen über die Spezialitäten-Einstellung der Wiener, die hauptsächlich nur Sprosser, Schwarzplättchen und Finken käfigen, während die anderen Sänger, wie Nachtigallen, Grasmücken usw., nur eine untergeordnete Rolle spielen. Für uns bemerkenswert sind auch die Gesangsausstellungen, zu der die Tiere regelrecht dressiert werden. Etwas vom Vogelfang in den Donaustaaten zu hören, galt uns ebenfalls sehr interessant, und ich erinnere da nur an seine Ausführungen über den Fang mit dem Wichtel, den Finken- und Plattlstricht mit Leim usw. Auch auf die Käfigfrage, die Sprunghölzer, die Fütterungsweise kam der Vortragende zu sprechen und streifte dabei auch seine persönliche Freundschaft mit dem Altmeister der deutschen Vogelliebhaberei Matthias Rausch, zu dessen Andenken er die Versammlung bat, sich von den Sitzen zu erheben, dem auch stattgegeben wurde. Als besonders zu nennen wäre auch die Überreichung des Wiener Vereinszeichens an unseren Vorsitzenden durch Herrn Janauschek, der dabei zu Tränen gerührt war und seinen Herzenserguß mit seinem „wachen Herz" entschuldigte. Alles in allem genommen, konnte man aus den Ausführungen ersehen, daß die Vogelliebhaberei in Wien trotz aller Kriegs- und Nachkriegswirren noch in hoher Blüte steht, und möchte dabei erwähnen, daß dort, ohne die Tischgesellschaften und Klubs gerechnet, an die 30 Vogelvereine bestehen. Mit Dankesworten für den herzlichen Empfang und freundliche Aufnahme in München und mit besonderem Dank für die überaus gute Bewirtung durch die Herren Rosenberger und Keidel schloß Herr Janauschek seine fast zweistündigen, mit viel urwüchsigem Wiener Humor gewürzten Ausführungen. Nicht leicht wurde den Münchner Vogelliebhabern ein gleich interessanter und humorvoller Abend geboten, und der Besuch des Herrn Janauschek wird allen Beteiligten eine stete Erinnerung bleiben.

J. A.: L. Keidel, 2. Vorsitzender.

Verein der Vogelfreunde Leipzig-Plagwitz. Vereinslokal „Gosenschlößchen", Leipzig-Plagwitz. Sitzungen finden jeden 1. und 3. Montag des Monats, abends 8 Uhr, daselbst statt. Vogelfreunde sind jederzeit willkommen.

J. A.: Karl Scholtissek, 1. Vorsitzender,
Leipzig-Plagwitz, Lauchstädter Str. 30.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig. Vereinssitzungen jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat im Vereinslokal, „Bauers Brauereirestaurant", Täubchenweg. Nächste Sitzung Donnerstag, den 15. Mai 1924. Gäste stets willkommen.

J. A.: Johann Birk, 1. Vorsitzender.

Anzeigenteil

Viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 20 G.-Pf. berechnet. Aufnahme erfolgt gegen Voreinsendung des Betrages in Reichsgeld per Nachn. od. auf unseren Zahlstellen: Postscheckkonto: Magdeburg 3148, Wien 156 687, Bern III 4326, Prag: Creditanstalt d. Deutschen unter Angabe des Zweckes.

Futtermittel

Vogelfutter [358
Kanarien, Waldvögel, Exoten, Papageien, Weichfresser. Anfragen gegen Rückporto. Liste 13 über Vogelfutter, Liste 5 über Vogelkäfige, Nistgeräte usw. mit etwa 400 Abbild.
H. Göpel, Leipzig,
Poststraßenring 1. Telephon 14958.

Mehlwürmer
täglich frisch. v. 2.— Rentenmark ¼ Pfd. franko versend. **D. Waschinski & Co.,** Biesenthal I (Mark). [359

Vögel
1 Paar Sing-Paare jap. Mövchen
à 20.— ℳ verkauft
Hugo Trommer, Hannover, Hildesheimer Straße 40 I. [360

Bitte!

In eigenem Interesse wollen die pp. Einsender beachten, daß

a) **alle für die Redaktion** der „Gefiederten Welt" bestimmten **Zuschriften** (Sprechsaal-Anfragen und -Antworten, Vereinsnachrichten usw.) und **Sendungen** (tote Vögel, Manuskripte) nur an **Herrn Karl Neunzig, Hermsdorf bei Berlin,** Neue Bismarckstr.,

b) **alle Bestellungen** auf **Abonnements,** auch vom Ausland, **nur durch die Post,**

c) **Inserate** und dergl. Geschäftliches nur an die **Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg,** Postschließfach 148,

zu richten sind.

Suche [361
0,1 Schama.
U. J. Beumée,
Groningen (Holland).

Biete an:
Prima Mohrenkopfpapageien, Pflaumkopfsittiche (nur Männchen), **Tuiparasittiche, Tarantin. Unzertrennliche, junge fingerzahme Graupapageien,** einiges sprechend; **zahmen Inkakakadu, Prachtglanzstare, abess. Glanzstare, Spiegeltrupiale, Weißkopfviehweber u. andere Arten.** [362
Preisliste kostenlos.
Vogelexport Joh. Götz,
Neu-Ulm (Bayern).

Verk.: 5,0 japan. Mövchen und 1,1 Silberschnäbelchen.
A.-G. v. Zitzewitz, Berlin W 50, Kurfürstendamm 243. A. Z.-Mtgl. 308. [363

Gesucht:

1,2 zuchtf. grüne Wellensittiche, Zuchtpaare japanische Mövchen, Zebrafinken u. and. Körnerfresser.
Johs. Hollander, Emden (Ostfriesl.), Pelzerstraße 9. [364

Bandfinken,

Paradieswitwen, Astrilde, Silberschnäbel, Atlasfinken, Orangeweber Paar 3,60 ℳ; **Amaranten rot, Schmetterlingsfinken, Elsterchen, Grisblen** Paar 3.80 ℳ; **Edelsänger, Mozambikzeisige, blaue Reisfinken** Paar 10 ℳ; gemischt nach meiner Wahl 25 Paar 80 ℳ, 50 Paar 140 ℳ, 100 Paar 250 ℳ; **Häher** Stück 5 ℳ, **Wellensittiche, gr. Papageien, Kanarienhähne, Kanarienzuchtweibchen, Alpensteinhühner, Landschildkröten** 8-14 cm Stck. 1,50 ℳ, 15—20 cm Stück 2 ℳ, bei 50 Stück 1,40 ℳ, bei 100 Stück 1,35 ℳ; **Weiße Mäuse** Paar 1,50 ℳ; **Weiße Ratten** Paar 2 ℳ; **Laubfrösche** Stück 0,50 ℳ **usw. usw.** [365

Garantiere stets für lebende und gute Ankunft.

Josef Beck,
Zoologische Handlung,
Stuttgart.

Jendaja-Sittiche à 12 ℳ, **Grassittiche** à 10 ℳ, **Goldstirnsittiche** à 12 ℳ, **Safranfinken** à Paar 9 ℳ, **rote Kardinäle** à 40 ℳ, **Purpurtangaren** à Paar 30 ℳ, **junge** à Paar 20 ℳ, **Amerik. Wanderdrosseln** à 15 ℳ, **Tyrannen** à 20 ℳ, **Meerblaue und Trauertangaren, junge** à 10 ℳ, **Zwergaras** à 25 ℳ und 30 ℳ.
Verpackung und Porto 3.50 ℳ.

Täglich
frische Ameiseneier.
Paul Tzornack, Berlin N 55,
Prenzlauer Allee 189. [366

Wegen Fortzuges

muß ich leider meine bereits zur Zucht zusammengestellten hervorragenden Exotenzuchtpaare sofort abgeben, 1—2 Jahre alt, blutsfremd:
1,1 Zebrafinken 25 ℳ, **3 Zuchtpaare japanische Mövchen** (Männchen immer gelb — Weibchen braunbunt) à Paar 25 ℳ.
Mehrere schöne Zuchtkäfige.
Major Rempe, Bonn, Rittershausstraße 21. [367

Austausch-Zentrale! [368]

Welch gleichgesinnter Vogelliebhaber beabsichtigt mit mir in **Austauschverkehr einheimischer und ausländischer Vögel und Zeitschriften** zu treten?
Syré, Lehrer, **Viernau i. Thür.**

Preislisten,

auch über Rücken, Legehühner, Zwerghühner, nur gegen Rückporto. [369
Emmy Voß, Köln, Merlostraße 23.

Beschwerden wegen Nichtzustellung der „Gefiederten Welt" sind beim zuständigen Postamt anzubringen.

E. W. Lenger, Tierhandlung

Berlin N 58, Schönhauser Allee 70a.

Postscheckkonto: Berlin NW 7, Nr. 83386 / Fernruf: Humboldt 5730.

Von meinen neuen Eingängen kann ich Ihnen heute offerieren:

		Goldmark
Molukken-Kakadus	à Stck.	300,00
Weißhauben-Kakadus	"	290,00
Gelbhauben-Kakadus, kleine	"	150,00
Schwarzkappenlori	à Paar	400,00
Gelbmantellori	"	400,00
Junge Blaustirn-Amazonen, sprechende, gesunde und fingerzahme Exemplare	à Stck.	50,00
Junge Graupapageien, sehr gelehrige, gesunde Vögel	"	120,00
Sperlingspapageien	à Paar	18,00
Rote Kardinäle (Männchen)	à Stck.	40,00
do. do. (Weibchen)	"	50,00
Papstfinken, ausgefärbte	à Paar	40,00
do. (nicht ausgefärbte, Männchen)	à Stck.	10,00
Indigofinken	à Paar	40,00
Weißkehlpfäffchen	"	15,00
Schwarzkappenpfäffchen (Männchen)	à Stck.	6,00
Goldaugentimalien	"	40,00
Damadrosseln	"	45,00
Katzendrosseln	"	20,00
Blaue Reisfinken (ganz erstklassig)	à Paar	10,00

Senegalfinken

in prima lebensfähigen Exemplaren

Astrilden	à Paar	4,00
Amaranten	"	4,00
Schmetterlingsfinken	"	4,00
Atlasfinken	"	3,80
Weber	"	3,80
Bandfinken	"	4,00
Paradieswitwen	"	4,00
Edelsänger	"	5,00
Schönbürzelchen	"	5,00
Silberschnäbelchen	"	4,20
Klein-Elsterchen	"	5,00
Mozambikzeisige	"	10,00

Ganz zahme **Affen,** wie: [370

Mangaven	à Stck.	80,00
Meerkatzen	"	70,00
Java-Affen	"	80,00
1 Langarm-Pavian	"	220,00
1 Mandrill, im Sitzen 33 cm	"	220,00
1 Mandrill, " " 39 "	"	280,00

Versand per Nachnahme oder Voreinsendung.
Porto und Verpackung 3,50 Goldmark.

Zur gefälligen Beachtung!

§ 3 des am 1. September 1908 in Kraft getretenen „Vogelschutzgesetzes" lautet:

In **der Zeit vom ersten März bis zum ersten Oktober** ist das Fangen und die Erlegung von Vögeln sowie der Ankauf, der Verkauf und das **Feilbieten,** die **Vermittlung** eines hiernach verbotenen An- und Verkaufs, die Ein-, Aus- und Durchfuhr von lebenden sowie toten Vögeln der **in Europa einheimischen** Arten überhaupt, ebenso der Transport solcher Vögel zu Handelszwecken untersagt.

Dieses Verbot erstreckt sich für **Meisen, Kleiber, Baumläufer, Spechte, Eulen** und **verschied. Falken** für das **ganze Jahr.**

Auf Grund dieses können wir vom **1. März an** Inserate betreffend **Kauf** und **Verkauf einheimischer** Vögel nicht mehr zum Abdruck bringen und bitten, dies bei Aufgabe von Inseraten berücksichtigen zu wollen.

Die Geschäftsstelle der „Gefiederten Welt"
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Für Kanarienzüchter!

Der Kanarienvogel,
seine Naturgeschichte, Pflege u. Zucht von Dr. Karl Ruß. 14. Auflage. Mit 2 Farbentafeln und zahlreichen Textabbildungen. Bearbeitet von Karl Neunzig.
Kart. 2.50 M.

Die Bastardkanarienvogelzucht,
Von Walter Barth. Mit 20 Abbildungen und 1 Tondrucktafel. 1.50 M.

Der Kanariengesang.
Allgemeinverständliche sowie musikalische und phonetische Darstellung von W. Kluh.
1.00 M.

Zu beziehen durch:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg.
Postschließfach 148.

Wir sind beauftragt worden, folgende

Seltenheiten

anzubieten:

Gefiederte Welt. I. Jahrgang 1872—1923 außer 1904, 1910, 1911. Fast alles gebunden (11 Jahrgänge in Heften).
Journal f. Ornithologie. II. Jahrgang. 1854—1904 außer 1870 bis 1872. Es fehlen in älteren Jahrgängen einige Tafeln sowie in 1869 ein Bogen. Dazu gehörig: **Ornithologisches Zentralblatt.** I. Jahrgang 1876—1882. Komplett. Zum großen Teil gebunden.
Ornithologische Monatsschrift. I. Jahrgang. 1876—1879, 1883—1899, 1901—1922. Zum großen Teil gebunden.
Zeitschrift für Oologie. I. Jahrgang. 1911. Komplett.
Ornitholog. Rundschau. I. Jahrgang 1905. Komplett.
Zeitschrift für Oologie und Ornithologie. XV. Jahrgang. 1905—1910, 1912, 1920, 1921. Komplett. Von Jahrgang 1911, 1912, 1913, 1914, 1923 fehlen diverse Hefte.

Lieferbarkeit freibleibend — Irrtum vorbehalten. Liebhaber, die sich bewußt sind, daß derartige Seltenheiten I. Ranges einen angemessenen Preis erfordern, wollen sich mit uns in Verbindung setzen. Die einzelnen Reihen können nur in sich geschlossen abgegeben werden.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung
Magdeburg Postschließfach 148

Inserate

für das am **22. Mai 1924** zur Ausgabe gelangende Heft 14 der Gefiederten Welt erbitten bis **17. Mai 1924** fr

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Hermsdorf bei Berlin; für den Anzeigenteil: Rolf Kretschmann, Magdeburg, Postschließfach 148.
Verlag der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck: August Hopfer, Burg Bz. Mgdbg.

Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Jahrg. 53 | Den 22. Mai 1924 | Heft 14

(Druckort: Burg, Bezirk Magdeburg.)

Etwas über den Graupapagei.

Von Emil Kaforke, Berlin.

(Nachdruck verboten.)

Im östlichen Kongobecken sind ausgedehnte Gebiete mit Urwäldern bedeckt. Schwarzgrün erscheint der dichte Wald, in dessen feuchtwarmem Schatten die Triebkraft der Natur in höchstem Maße zur Geltung gelangt. Das mannigfaltigste Leben gedeiht in üppigster Form. Während am Boden Tausendfüße von glänzend brauner oder schwarzer Farbe ihr Wesen treiben, Ameisen herdenweise marschieren, während Grillen zirpen und Ochsenfrösche brüllen, der Elefant mit seinem schweren Tritt die einzig gangbaren Pfade durch das dichte Unterholz bahnt, tummelt sich hoch oben unter dem gegen die aufdringliche Tropensonne schützenden Blätterdach mächtiger Tek- und Gummibäume der Vogel, welcher menschliche Laute täuschend wiederzugeben vermag, der Graupapagei.

Seine hervorragend geistigen Fähigkeiten stellen ihn nicht nur an die Spitze der gesamten gefiederten Welt, sondern auch in die Reihe der Tiere, die durch ihre eminente Intelligenz, im Gegensatz zu Carl Ludwig Schleich, recht gut den Beweis liefern, daß bei den höher organisierten Tieren alle Funktionen „menschlicher Nervensubstanz" bereits gradatim vorhanden sind. Die bei diesen Tieren beobachtete psychische Tätigkeit ist ausreichend, um die Seele des Menschen als eine Steigerung jener Ausübung ansprechen zu können. Abgesehen davon, daß alle Sinnesorgane, Stoffwechsel und Fortpflanzung Mensch und Tier gleich besitzen, müssen wir die unleugbare Vertiefung des Verstandes zahmer Tiere in menschlichem Umgange und menschlicher Erziehung anerkennen und den Menschen als höchst entwickeltes Wesen auf Erden betrachten, welches durch keinen unüberbrückbaren Spalt von den höher organisierten Tieren getrennt wird.

Anders der Philosoph Schleich. Ihm gilt als untrüglichstes Scheidungsmittel zwischen Mensch und Tier die Phantasie, die er nur als eine „besondere Funktion der menschlichen, aber nicht tierischen Nervensubstanz" auffaßt. Nun, wer Graupapagei, Schäferhund, Elefant und Schimpanse vorurteilslos längere Zeit wirklich beobachtet hat, weiß, daß diese Tiere träumen und simulieren; Traum, Simulation und Phantasie sind aber blutsverwandt und dementsprechend auch im Tierleben von Bedeutung —

Trotz der eben gepriesenen Geistesgaben unseres grauen Krummschnabels soll jetzt eine Unmöglichkeit auf dem Gebiete der Simulation Erwähnung finden. Irgendwo und irgendwann las ich einmal, daß einzeln gehaltene Graupapageien es fertig bekämen, Krämpfe zu simulieren. Zweifellos vermögen sich die schlauen Vögel krankzustellen, aber niemals Krampfzustände nachzuahmen. Krämpfe kann nur der imitieren, der sie wiederholt gesehen hat, und diese Gelegenheit dürfte wohl sehr schwer einem Papagei geboten werden. Fällt ein Geschöpf in Krämpfe, dann ist es bewußtlos und nie in der Lage, sich über die Situation Rechenschaft zu geben; eine Wiederholung aus eigenem Antriebe erscheint demnach absolut unmöglich. Vergegenwärtigen wir uns einmal das Krankheitsbild, wie ich es wiederholt gesehen: ein auf dem Rücken liegender, mit den Flügeln um sich schlagender, zuckender Vogel mit stierem Blick, der sich nicht selten die Zunge blutig beißt. Und dies traurig-elende Befinden soll von einem gesunden Vogel bewußt wiedergegeben werden, um für sich gewisse Liebkosungen oder Leckerbissen zu erlangen, nimmermehr! Krämpfe sind — das bitte ich zu beachten — niemals Simulation, sondern eine Erkrankung des Gehirns, die stets ernst genommen und behandelt werden muß. Als Naturheilmittel empfehle ich: frische Luft zu jeder Jahreszeit, geräumigen Käfig, viel Freiflug und täglich Badewasser; als Nahrung sind zu reichen Hirse, Reis, Spitzsamen, Hafer, Ebereschenfrüchte zu gleichen Teilen, Obst, Spinat, Salat oder Vogelmiere; zur Unterhaltung und Befriedigung des Nagebedürfnisses erhalten meine sämtlichen Papageien frische Zweige von Linden, Pappeln und Birken Nun auch eine Arznei, die gute Erfolge gezeitigt, mag hier Platz finden. 200 Gramm eines kalt bereiteten Baldrianaufgusses, in dem 2 Gramm kristallisiertes Karlsbader Salz aufgelöst sind, bilden das Getränk, bis die Anfälle ausbleiben. Verschweigen möchte ich nicht, daß mir trotz aller Heilmittel die kostbarsten Graupapageien eingegangen sind.

Ein Problem in der Papageienpflege, mit dem ich mich schon seit vielen Jahren beschäftige, ist das Selbstrupfen. Dieser pathologische Zustand verdankt sein Entstehen sehr oft unbefriedigtem Geschlechtstrieb. Wie die normale Sexualität fortdauernd das ganze geistige und körperliche Sein äußerst günstig beeinflußt,

so zeigen sich bei gewaltsam unterdrückten Gefühlsäußerungen tief eingreifende, krankhafte Erscheinungen in seelischer und körperlicher Beziehung.

Gesunde, muntere, vollbefiederte, zahme Jakos erscheinen launisch, bissig und in wenigen Tagen bratfertig gerupft bis auf den Kopf, den sie eben nicht bearbeiten können. Doch halt, ein dunkelroter Arara wußte sich zu helfen, indem er den Kopf durch Reiben am Käfiggitter von den Federn befreite. Diese Operation habe ich bei keinem zweiten Papagei beobachtet. Blaue, gelbbrüstige Araras, Pennantsittiche, rosenbrüstige Alexandersittiche usw. ließen wie die Graupapageien ihr schönes Haupt unberührt. Ein prachtvoller Bartsittich rupfte sich vor meinen Augen in wenigen Minuten die Brust kahl. Die hier erwähnten Fälle können sicher auf unbefriedigten Geschlechtstrieb zurückgeführt werden, da die Entstellung des Körpers und die veränderte Gemütsstimmung mit dem Eintritt und der Dauer der heimatlichen Brutperiode im Einklang standen. War letztere vorüber, dann besaß ich wieder verhältnismäßig schnell gut befiederte, überaus zutrauliche Tiere. Zurzeit pflege ich zwei männliche Graupapageien, von denen der eine sich topfreis macht, während der andere, mit tadellosen Federn geschmückt, einen geistig minderwertigen Eindruck erweckt; Flöten und Sprechen werden einfach so lange suspendiert, bis die blindmachende Liebe der rauhen Wirklichkeit gewichen ist. Vielleicht gelingt es mir, meine beiden grauen Afrikaner mit einem Mittel aus der Organotherapie in den wünschenswerten Zustand zu versetzen.

In der Tierpflege ist mein leitender Gedanke, allen Individuen die größtmöglichste Freiheit zu gewähren, damit jedes Organ sich betätigen kann. Nur so glaube ich der Lebensunfähigkeit meiner Lieblinge entgegenzuarbeiten. Reiche Erfolge, namentlich bei Einführung und Eingewöhnung junger Graupapageien, haben meine Maßnahmen bestätigt. Frisch importierte exotische sowie frisch gefangene einheimische Vögel stecke ich in geräumige Käfige und lasse sie, wenn angängig, tagsüber — natürlich in der wärmeren Jahreszeit — im Freien. Allerdings muß die Behausung teilweise bedeckt sein, damit die Bewohner sich nach Belieben vor den Einflüssen der Witterung schützen können. Reine, sauerstoffreiche Luft, jedoch keine Zugluft, bewahrt vor Lungenentzündung und belebt den Verdauungsprozeß derart, daß die Futterstoffe nicht nur aufgenommen, sondern auch ausgenutzt werden. Die Vögel bleiben widerstandsfähig und für schädliche Keime schwer zugänglich. Müssen aus irgendeinem Grunde die jungen Jakos dennoch im Zimmer untergebracht werden, dann lasse ich die Käfigtüren geöffnet. Es ist ein wirklicher Genuß, zu sehen, wie die drolligen, harmlosen Buben herumklettern, die Flügel lüften, flöten und sich des Lebens freuen. Ein seltener Anblick wurde mir einmal geboten bei einem Importeur, der frei in ziemlich großer Stube etwa 30 Graupapageien hielt. Die Zeit war damals noch golden, ein Exemplar zum Aussuchen kostete 15 Mark. Selbstverständlich spielt die Nahrung auch eine gewisse Rolle. In meiner Pflege besteht das Eingewöhnungsfutter aus geschälten Bananen, die mit Spitzsamen mäßig bestreut sind, aus zerstampften Haselnußkernen und teils gekochtem, teils während 24 Stunden mit 0,2% Salzsäurewasser erweichtem Mais. Als Getränk reiche ich verdünnten schwarzen Tee, der allmählich durch Wasser ersetzt wird. Sind die Tiere futterfest, beginnt ihre Erziehung, die schönste Aufgabe für einen Papageienfreund.

Allerlei Biologisches.

Von Fritz Braun.

(Nachdruck verboten.)

Kaum je in meinem Leben habe ich eine solche Pracht des Winters geschaut wie in diesem Jahr. Immer wieder funkelten auf dem beschneiten Gesericht see Millionen von Schneekristallen im Sonnenlicht, und Woche aus und Woche ein läuten die Schlittenglocken auf den stillen Waldwegen, zu denen der kalte Nordost nicht zu gelangen vermag. Aber der abenteuerliche Schmuck der Waldbäume, die neulich unter der Last der Schneemassen beinahe zusammenbrachen, und heute wieder vom Raufrost in ein schimmerndes Festgewand gekleidet wurden, bereitet den Waldvögeln weit weniger Freude als dem schönheitsdurstigen Auge des Menschen. In dieser sonnigen Welt, mit deren Lichtfülle der grüne Sommertag nicht zu wetteifern vermag, herrscht bittere Not. Neulich fand ich, als der Wintertag gleißend heraufkam, in meinem Garten ein totes Buchfinkenmännchen. Da der stattliche Vogel gut bei Leibe war, hatte ihn wohl die grimmige Kälte getötet, obgleich der Wärmemesser an jenem Morgen nur 16° unter Null zeigte. Die Buchfinken sind eben auf unseren nordostdeutschen Winter noch nicht recht eingestellt, mag auch alljährlich eine ganze Menge von ihnen, namentlich ältere Männchen, den Kampf mit seinen Unbilden aufnehmen. Bei ähnlichen Kältegraden schonten auch die Goldammern ihre Füße bereits so auffällig, daß sie vermutlich durch den Frost mehr oder weniger geschädigt worden sind. Manche von ihnen fielen ganz ähnlich auf dem Erdboden ein, wie dereinst einer meiner Stieglitze, den ein leidiger Papageienschnabel des linken Beines beraubt hatte.

Und noch andere Arten seufzten unter dem harten Frost, dessen Schrecken Rauhfrost und eine stellenweise schier unergründliche Schneedecke vervielfältigten. Immer neugieriger lugen in diesen Tagen die Eichelhäher in Hof und Garten hinein, und verschmähen es nicht, auf belebter Heerstraße im Pferdemist nach einem Haferkorn zu suchen. Bei starkem Rauhreif leistet bei diesem Geschäft selbst das sonst so unverzagte Volk der Waldmeisen den Goldammern und Spatzen treulich Gesellschaft, mögen auch die Bewegungen der am Erdboden so ungeschickten Kohl-, Blau- und Tannenmeisen deutlich genug zeigen, wie wenig diese Tätigkeit ihren Neigungen entspricht. In den letzten Tagen zeigte sich in meinem Garten sogar eine scheue Waldamsel. Anfangs flog sie nur rastlos, und offenbar noch unschlüssig, wie sie es treiben sollte, über den Gärten und Höfen hin und her. Dann ließ sie sich schon hier und da auf den Boden nieder, eifrig nach einem kargen Bissen lugend, und gestern saß sie vor meinem Fenster schon stundenlang auf einem niedrigen Obstbäumchen.

Auch hier machte ich wieder die Erfahrung, daß der Futterplatz, den ich mit den Abfällen meiner

Vogelstube unterhalte, von den Grünfinken erst recht spät im Winter besucht wurde, zeigten sie sich doch neben den Meisen, Feldsperlingen, Buchfinken und Goldammern doch erst in den letzten Januartagen. In Graudenz pflegten sie noch später zu kommen, um dann den Futterstellen bis tief in den März hinein treu zu bleiben.

Unser Altmeister Naumann gab ehedem seinem Befremden darüber Ausdruck, daß manche Kohlmeisen sich trefflich in die Gefangenschaft hineinfinden, andere dagegen es rein darauf abgesehen zu haben scheinen, ihrem Leben rasch ein Ziel zu setzen. Die Erklärung dieses befremdlichen Zwiespaltes ist vielleicht darin zu suchen, daß jene Vögel durch enge Nachbarschaft mit dem Menschen und seinem Werk vertraut wurden, während diese in der Regel solche Tiere sein mögen, welche fern von menschlichen Ansiedlungen am Ufer des Waldsees oder Heideflüßchens groß geworden sind. In diesem Jahre erhielten die Kostgänger meines Futterplatzes, als der starke Frost viele Wochen hindurch anhielt, noch gegen Ende Januar Zuzug von Kohlmeisen, die in ihrem ganzen Gehabe, beim Ein- und Ausschlüpfen in offenen Käfigen, bei rascher Flucht vor unerwünschten Besuchern der Futterstelle, und bei ähnlichen Gelegenheiten sich ganz anders benehmen als die alten Stammgäste in unseren Hausgärten.

Rotschwingenglanzstaar. (Text s. S. 84.)

Auffällig war es mir, daß die Meisen trotz der bitteren Kälte ihr Tagewerk sehr früh begannen und erst recht spät zur Ruhe gingen. Namentlich wenn bei Neuschnee wolkenloser Himmel herrschte, stellten sie sich schon beinahe eine Stunde vor Sonnenaufgang auf dem Futterplatze ein, und trödelten auch abends noch so lange im Garten umher als das Licht noch halbwegs reichen wollte. Eine Kohlmeise, die ich zufällig erbeutete, und 48 Stunden bei mir beherbergte, gehörte augenscheinlich zu den Unbänden, auf die Naumann anspielen will. Sie saß entweder bildsäulenartig da oder zwängte sich durch die Käfigwände, um gegen die Scheiben zu toben, eine Unsitte, auf die ich bei Ammern und Webern viel mehr gefaßt bin als gerade bei Meisen, die sich von vornherein in dieser Hinsicht viel vernünftiger benehmen oder wenigstens in kurzer Zeit, durch wiederholten Anprall gewitzigt, die durchsichtigen Flächen meiden lernen. Noch befremdender war es mir, daß dieser Vogel — Meisen schlafen sonst so fest wie Murmeltiere — in den beiden Nächten, die er in meiner Wohnung zubrachte, meines Wissens kein Auge zugetan hat. Mochte ich mich seinem Behälter in dem dunklen Zimmer auch noch so vorsichtig nähern, immer blickte ich sofort in die dunklen Meisenaugen, die mir ängstlich und wachsam entgegenschauten. So gleichmäßig sich eingewöhnte Kohlmeisen zu geberden pflegen, eine so unendliche Fülle von Individualität offenbaren sie gerade in den ersten Wochen ihrer Gefangenschaft, welcher den Übergang von dem Leben in die Freiheit an das in menschlicher Obhut vermitteln. Allerdings möchte ich auch das erste Urteil, kaum daß ich's niederschrieb, schon wieder beschränken und beinahe ins Gegenteil verkehren, doch möchte ich's dabei bewenden lassen, darauf hinzuweisen, daß die augenfällige Eigenart mancher schon Jahr und Tag im Zimmer verpflegter Kohlmeisen auf gesundheitliche Schädigungen und seelische Entartung zurückgeführt werden muß.

Durch die arge Kälte dieses Winters erklärt es sich wohl auch, daß meine Vögel noch recht schweigsam sind. In früheren Jahren pflegten die Stieglitze, Hänflinge, Grünfinken, und alle Kanarienbastarde schon an Kaisers Geburtstag aus Leibeskräften zu schmettern. In diesem Jahre schwiegen die Grünlinge noch ganz, und die anderen singen so temperamentlos und friedvoll wie sonst etwa im November. Könnte ich das Zimmer von 7—8°, die es für gewöhnlich aufweist, auf 15—17° bringen, so würde ihr Konzert an Feuer und Kraft wohl schon nach zwei, drei Tagen wenig zu wünschen übrig lassen. Um so mehr überraschte es mich, daß ein vorjähriger Zeisigbastard schon am 20. Januar mit seinem brünstigen Raufereien anfing. Ein Zeisigpärchen, das mit dem Raufbold in demselben Flugkäfig wohnte, hatte darunter am meisten zu leiden. Anfangs suchte ich den Übeltäter in einem Berghänflingsbastard, aber erst dann, als auch der Zeisigblendling aus dem Flugbauer entfernt worden war, fehlten die wehenden Federn, deren Ursprung die gerupften Rücken der gemißhandelten Zeisige aufs deutlichste ankündigten. Merkwürdigerweise hatte der Kampfhahn vorher sogar einen Girlitz unterbekommen, und zwar mit solchem Erfolge, daß ich den Besiegten mit einem völlig verschwollenen und verklebten Auge aus dem Flugkäfig entfernen mußte. Auch als die Heilung bereits erfolgt war, blieb das Auge des Girlitz noch geraume Zeit durch einen Hautfetzen zu drei Vierteln verschlossen. Weil ich

schon öfters die Erfahrung gemacht habe, daß solche Mißstände ganz von selbst, vielleicht durch unwillkürliche und doch zweckmäßige Nachhilfe der betreffenden Tiere, zu schwinden pflegen, ließ ich auch in diesem Falle Messer und Schere in Ruhe, und heute sieht der Girlitz schon längst wieder aus zwei großen, kreisrunden Augen in die Welt. Dem Zeisigbastard kam es zustatten, daß dieser Girlitz noch nicht in Brunst war und sich damit in einem Zustand befand, wo die Tiermännchen mehr Ambos als Hammer sind; sonst wäre der Bastard vermutlich als zweiter Sieger aus dem Kampfe hervorgegangen, denn mit brünstigen Girlitzen ist nun einmal nicht zu spaßen.

Gelegenheit zu einem absonderlichen Versuch gab mir in letzter Zeit mein Andamanenstar. Obgleich der Vogel in letzter Zeit ganz schweigsam war, wirkte bei ihm plötzlich aufflammendes Licht als ein Reiz, der mit tödlicher Sicherheit eine Gesangsstrophe auslöste. Mit tödlicher Sicherheit darf ich getrost sagen, denn da meine Frau an der Zuverlässigkeit der Beobachtung Zweifel äußerte, habe ich sie ihr wohl ein dutzendmal vorgemacht, ohne daß der Vogel ein einziges Mal versagte. Sowie ich die Glühbirne in dem dunkeln Zimmer aufflammen ließ, fuhr auch schon der spitzige Starenschnabel aus dem Nackengefieder, und schlaftrunken und augenzwinkernd sang das Stärlein mit fast komischer Leidensmiene sein quiekendes, quirlendes Lied. Als ich dann aber später an einem freien Nachmittage und Abend die Versuche häufte, stellte sich heraus, daß der Reiz nur dann seine zwingende Kraft behielt, wenn ich ihn nicht allzuoft wirken ließ. Nur dann konnte ich mich bedingungslos auf den Erfolg verlassen, wenn etwa eine Stunde seit dem letzten Versuch verstrichen war. Wiederholte ich ihn dagegen alle zehn Minuten oder noch öfter, so sang zwar der Vogel, in anderen Fällen versagte er aber auch, und je mehr ich die Sache übertrieb, desto unsicherer wurde das Ergebnis.

Eine ärgerliche Enttäuschung bereitete mir in diesen Wochen ein neu erworbener Stieglitz, ein schöner Vogel, der aber vermutlich Jahr und Tag im Einzelkäfig gesessen hatte. Er vermochte sich daher in das Leben im Flugkäfig gar nicht hineinzufinden und gebärdete sich, als wenn er zu Raubtieren gebracht würde, so daß ich ihn wieder in seinen früheren Behälter setzen mußte. So sehr es sich auch empfiehlt, selbst die dauerhaftesten Körnerfresser ein paar Monate lang im Einzelkäfig einzugewöhnen, ehe man sie in das Flugbauer setzt, so wenig ist doch in der Regel im Gesellschaftskäfig mit solchen Geschöpfen anzufangen, die jahraus jahrein in Einzelhaft lebten. Selbstverständlich gibt es auch hier Ausnahmen, aber in der Regel kostet die Wohnungsänderung solchen Einsiedler mindestens ihr sauberes und vollständiges Federkleid.

(Fortsetzung folgt.)

Der Gelbspötter, sein Fang, Eingewöhnung und Überwinterung.

Von Ernst Nieselt-Lausa, Dresden.

(Nachdruck verboten.)

Wenn der Lenz erwacht und der Kuckuck ruft und ein Blütenmeer sich übers Tal ergießt, da erscheint in unseren Gärten ein König der Sänger mit einer Zungenfertigkeit, wie es seinesgleichen hier keinen zweiten gibt. Kaum ist der Tag erwacht, so jagt er mich mit seinem einzig herrlichen Jubeln und Jauchzen, Johlen und Flöten, Pfeifen und Zwitschern, Krähen und Meckern aus dem Bett, um meine höchste Bewunderung zu entlocken. Großartig ist er in seiner Imitation, unübertrefflich in seiner starken Tonfülle. Seit Jahren kommt er pünktlich in der Nacht vom 6. zum 7. Mai in unser Dorf und zeigt sich sofort von der ersten Stunde an gesanglich über alle Vögel erhaben. Im Großen Garten zu Dresden hörte ich einst Nachtigallen schlagen, Gott, was für „Sperlinge" waren sie im Vergleich zum Gelbspötter. Wer Leben in die Bude wünscht, wer könnte es unter den Gefiederten besser als der Gelbspötter? Innerhalb 10 Minuten sitzt er gefangen, wenn man einen Locker hat, es genügt hierzu irgendein Körnerfresser, wenn er nur recht Lärm macht, denn der Gelbspötter duldet in seinem einmal ausgewählten Aufenthaltsgebiet keinen anderen Vogel, sobald er nur muckst. Wie ein wütender Irrenhäusler überfällt er jeden Vogel, der auch nur den Versuch macht zu piepsen, wie es ihm nicht gefällt; sich ruhig verhaltenden Vögeln tut er nichts. Selbst das Klappern der Zaungrasmücke reizt ihn derart, daß er sie augenblicklich wütend überfällt und weit verfolgt. Will man ihn fangen, so steckt man irgendeinen Lärmmacher in ein kleines Bauer, dessen Vorderseite etwa 30 cm hoch ist, die Hinterwand dagegen nur 15—20 cm. Auf diesem schräg nach hinten abfallenden Dach, das, wie die Vorderwand, aus Drahtgitter sein muß, bringt man ein Schlagnetzchen an, dessen Abzugstrittholz 1 cm über dem Vordergittergesims entlang steht, denn jeder Vogel setzt sich stets auf die höchste Stelle eines Bauers. Mehlwürmer sind gar nicht nötig. Dieses Fangbauer hängt man hoch in den Baum, auf dem der Gelbspötter ständig oder häufig singt. Sowie der Insasse des Käfigs zu mucksen anfängt, hüpft der Gelbspötter wütend, hochbeinig, aalglatt, mit langem Hals und offenen Schnabel, die Augen verdrehend, auf das Trittholz über dem Vordergitter, dieses hebt aus, das Netz überschlägt sich, und Spötterchen sitzt gefangen. Ich habe hierzu ein besonderes Netz erfunden, auch das Netzwerk selbst stricke bzw. klöppele ich mir selbst aus Strohhutzwirn, der noch feiner als Seide ist. Die Eingewöhnung geschieht separat in einem Kistenkäfig nur mit Vordergitter, welches mit lichtgrünem oder weißem Pauspapier überzogen wird. Mein Eingewöhnungsfutter besteht aus frischgesammelten Ameiseneiern, die ich aber erst in abgekochter Milch, der ich etwas reinen, frisch ausgepreßten Saft einer gekochten Feige oder gekochter Kirschen beifüge, nebst Mehlwürmern (geköpfte), die ich nur mit Kraut-, Bohnen- und Salatblättern und Eierbrot füttere. Dies Futter gebe ich 14 Tage lang nebst einem Stück süßen Apfels zwischen das Gitter gesteckt. Fliegen, die er leidenschaftlich frißt, sind ebenfalls täglich einige Dutzend in seinem Futternapf. Die Schublade wird mit frischem Waldmoos (Steinmoos) belegt, auf das ich gleich am ersten Tage 15 Mehlwürmer sichtbar ausbreite, vom 2. Tage an ist das nicht mehr nötig. Der Futternapf muß flach und breit sein und wird in der Mitte der Schublade zwischen

das Moos gebettet. Der Käfig bleibt Tag und Nacht draußen vor dem Fenster hängen oder auf dem Blumenbrett stehen; seine äußere Umgebung darf der Vogel keinesfalls sehen, wie er auch vor jeder Beunruhigung bewahrt werden muß. Vom 10. oder 14. Tage an erhält er täglich von meinem Spezial-Weichfutter eigener Zusammensetzung etwas unter die Ameiseneier und die Mehlwürmer fallen ganz aus. Vor dieser Zeit darf der Spötter nicht mehr als 15 Mehlwürmer täglich bekommen. Zuträglicher sind die weißen, frischgehäuteten Würmer sowie weiße Puppen als gelbe Würmer. Ich suche stets solche aus. Vom 14. Tage seiner Gefangenschaft an wird das Papier vor dem Gitter entfernt, und das Bauer kommt in die Stube in mindestens $2^1/_2$ m Höhe (vom Fußboden ab) an eine sonnige, nicht modrige Wand. Rauchen ist in diesem Zimmer dringend zu unterlassen, wie überhaupt jede Störung. Alle Bewegungen unsererseits müssen mit Ruhe ausgeführt werden. Aus angemessener Entfernung spreche man täglich ganz

Bergmeise.

ruhig und sanft mit ihm, zeige ihm dabei einige Minuten lang einen Mehlwurm, worauf er denselben erhält. In der 3. Woche wird täglich Badehaus mit überschlagenem Wasser gegeben. Von der 5. Woche an hängt man ihn tiefer und steckt ihm Eierbrot zwischen das Gitter, daneben Apfel. Beeren frißt er nicht. Grüne, jedoch nur nackte (unbehaarte) Raupen sind ihm Delikatesse vom 1. Tage an. Zur Zugzeit kommt er allnächtlich in ein kleines (nicht riechendes) Säckchen (Frühstückssäckchen), welches man zubindet und frei schwebend an einen Nagel an der Zimmerdecke aufhängt. Darin kann er sich weder verletzen, noch hört man nachts sein Geflattere. Weder der Mond noch sonst ein Licht darf das Säckchen bescheinen. Zum Morgen kommt er wieder in seinen Käfig. Zugluft ist dringend zu unterlassen. Im Winter muß er in ständig geheiztem, feuchtwarmem Zimmer hängen. (Dampfröhrenheizung ist schädlich, Petroleumofenheizung ebenfalls verwerflich.) Futterfliegen dürfen nur mit der Hand oder Fliegenklatsche gefangen sein, keinesfalls mit Leim oder giftigem Fliegenpapier, künstlich gefärbten oder verwesenden, stinkigen Lockmitteln. Die in Milch gewaschenen Ameiseneier müssen erst wieder lufttrocken gemacht werden. Trockene Ameiseneier müssen in Milch, der man eine Handvoll Kirschen oder den Saft einer gekochten Feige beifügt, tüchtig gekocht und darauf wieder getrocknet werden; nur so sind sie allen Weichfressern erträglich und delikat. Vor dem Kochen müssen die Puppen „gründlich" handverlesen und mindestens 5 mal in jedesmal gewechseltem, reinem, warmem Wasser hintereinander gewaschen werden. Bei jedesmaligem Waschen entsteht eine dicke, undurchsichtige, lehmgelbe Brühe mit Schwefelgehalt, die uns in Erstaunen versetzt; wir waschen daher so oft, bis das Wasser klar bleibt und keine Ausscheidungen aus den Puppen mehr vorkommen. Man scheue diese Mühe nicht, denn es geschieht im ureigensten Interesse, und alle Weichfresser bleiben bei so zubereiteten Puppen gesund und sangesfreudig. Ich spreche hier als Fachmann, als Weichfresser-Spezialist, der mit gewissenhafter Gründlichkeit und unbegrenzter Liebe Vögel käfigt. Spinnen füttere man nicht, denn bei den unendlich vielen Arten von Spinnen wissen wir nicht, was für welche der Vogel in der Freiheit frißt. Vorsicht sei in allen Sachen die Mutter der Weisheit. Besonders dringend empfehle ich als Futterbeigabe alle Arten Nachtfalter (nachts in Anlagen, alten Kirchhöfen, Ruinen usw. mit Blendlaternen leicht zu fangen). Große müssen zerschnitten werden. Vegetabilien sorgen für geregelte Verdauung und lange Lebensdauer. Dringend warne ich vor Mohrrüben, Karotten, Quarkkäse und Sepia, alle diese Sachen sind für den Vogelmagen gesundheitsschädlich (langjährige, eigene, gründliche Erfahrungen); zudem enthält jeder Quark eine ganz schädliche Säure, denn jeder Quark entsteht ja erst durch saure Milch. — — — Als Vegetabilien kommen nur in Frage: Vogelmierenköpfe mit Samenkapseln in halbreifem Zustande, Blattsalat, Bohnenlaub, alles waschen, in Milch mit oben geschildertem Fruchtsaftzusatz kochen, abtrocknen und zu Pulver mahlen. Milch macht alles geschmeidig, und Fruchtsaft gibt Aroma. Möge sich jeder, der nicht von Starrsinn befallen ist, meine gutgemeinten Erfahrungen, die ich heute wegen Zeitmangels kurz fassen mußte, baldmöglichst zu Herzen nehmen.

Ornithologische Beobachtungen in Bad Salzungen (Meiningen).

Von Joh. Aug. Schmeißer, Nürnberg.

(Nachdruck verboten.)

Vorbemerkung. Am 9. Oktober 1914 fiel bei Arras mein lieber Freund, Herr Lehrer und Offiziersstellvertreter J. A. Schmeißer aus Nürnberg, ein ebenso eifriger wie gewissenhafter junger Ornithologe (Nachruf in Band XII, Heft 2 der Verhandl. der Ornithol. Gesellsch. in Bayern). Nachdem Schmeißer erst kurz vor Kriegsbeginn, um Mitte Juli 1914, geheiratet hatte, fuhr er mit seiner Gattin nach Bad Salzungen a. Werra, um dort die Flitterwochen zu verbringen, die dann aber durch die Mobilmachung einen jähen Abbruch erlitten.

Damadrossel.

Auch in Salzungen hat Schmeißer es nicht versäumt, auf Spaziergängen der Vogelwelt seine Aufmerksamkeit zu widmen und hat auch diese Beobachtungen zu Papier gebracht. Seine Aufschreibungen wurden mir von seiner Witwe, Frau Frieda Schmeißer, in freundlicher Weise zur Verfügung gestellt und noch durch mündliche Mitteilungen ergänzt und erläutert. Ich betrachte es als eine Ehrenpflicht, diese Beobachtungen — wie es nachstehend geschieht — zu veröffentlichen. Handelt es sich auch nur um eine bloße Aufzählung nicht sehr vieler Arten, so werden darin doch eine Reihe seltener Vögel genannt, deren Feststellung für diesen Teil Thüringens wertvoll sein dürfte; dabei darf man an der Sicherheit der Beobachtung bei der Gewissenhaftigkeit Schmeißers nicht zweifeln. Natürlich darf man aber auch nicht umgekehrt aus dem Nichterwähnen einer Vogelart auf deren Fehlen bei Salzungen schließen. Schmeißer wollte ja nicht nur 1914 länger in S. bleiben, sondern auch 1915 bestimmt dorthin wiederkehren und hat deshalb auf das Notieren jedes Vogels in den ersten 14 Tagen nicht so viel Wert gelegt. Sämtliche Beobachtungen sind in der Zeit vom 16. bis 27. Juli gemacht. Die Ortschaften Ettenhausen, Langenfeld, Leimbach, Mangersberg, Möhra und Wenzelsberg liegen alle in einer Entfernung von 2—7 km um Salzungen, die Roßdorfer Kutte (ein kleiner See) befindet sich beim Dorfe gleichen Namens 11 km südlich von Salzungen. Bei Beobachtungen, die auf dem Wege zwischen zwei Ortschaften gemacht wurden, läßt sich jetzt nicht mehr gut feststellen, ob der betreffende Vogel am Ausgangs- oder Endpunkt beobachtet wurde, und ich schreibe deshalb in solchem Falle einfach: am Wege ... oder auf der Strecke ... Bei den wissenschaftlichen Namen habe ich mich nach dem neuen Nomenklator der Vögel Bayerns von Hellmayr und Laubmann (München 1916) gerichtet. E. Gebhardt, Nürnberg.

1. Corvus corax corax corax *L.* — Kolkrabe (?). 2 St. auf einem Kleebock am Wege Salzungen–Möhra. Flachköpfig und mächtiger keilförmiger Schnabel. (Von Schmeißer selbst mit Fragezeichen versehen.)

2. Corvus corone corone *L.* — Rabenkrähe. Bei Langenfeld beobachtet, bei Leimbach 1 St. unter Staren.

3. Corvus frugilegus frugilegus *L.* — Saatkrähe. Bei Langenfeld 1 St., bei Leimbach 2 St. gesehen.

4. Garrulus glandarius glandarius (*L.*) — Eichelhäher. Bei Langenfeld und auf der Strecke Wenzelsberg–Mangersberg–Leimbach festgestellt.

5. Sturnus vulgaris vulgaris *L.* — Star. Auf der Strecke S.–Möhra beobachtet, bei Leimbach ein großer Schwarm.

6. Coccothraustes coccothraustes coccothraustes (*L.*) — Kirschkernbeißer. In Salzungen gesehen.

7. Chloris chloris chloris (*L.*) — Grünling. In Salzungen festgestellt.

8. Carduelis carduelis carduelis (*L.*) — Stieglitz. Stieglitze wurden häufig am Wege S.–Möhra und auf den Höhen nördlich der Werra bemerkt.

9. Acanthis cannabina cannabina (*L.*) — Bluthänfling. Der Hänfling war ein häufiger Vogel auf den Höhen nördlich der Werra (Fichten- und Föhrenjungwald), sowie am Wege S.–Möhra.

10. Spinus spinus (*L.*) — Erlzeisig. — 1 St. bei der Roßdorfer Kutte gesehen.

11. Serinus canarius germanicus *Laubm.* — Girlitz. In Salzungen gehört.

12. Pyrrhula pyrrhula europaea *Vieill.* — Gimpel. Am Wege S.–Möhra begegnet.

13. Fringilla coelebs coelebs *L.* — Buchfink. Am Wege Wenzelsberg–Mangersberg–Leimbach gesehen.

14. Passer domesticus domesticus (*L.*) — Haussperling. Am Wege Salzungen–Möhra festgestellt.

15. Passer montanus montanus (*L.*) — Feldsperling. Ebenfalls am Wege S.–Möhra beobachtet.

16 Emberiza calandra calandra *L.* — Grauammer. Gehört am Wege S.–Möhra.

17. Emberiza citrinella sylvestris *Brehm* — Goldammer. Auf den Höhen nördlich der Werra und am Wege S.–Möhra vorkommend.

18. Alauda arvensis arvensis *L.* — Feldlerche. Singende Lerchen ließen sich auf den Höhen nördlich der Werra und am Wege S.–Möhra hören.

19. Anthus trivialis trivialis (L.) — Baumpieper. Baumpieper sangen auf den Höhen nördlich der Werra und am Wege S.–Möhra.

20. Motacilla alba alba *L.* — Bachstelze. Am Wege S.–Möhra gesehen.

21. Parus major major *L.* — Kohlmeise. Am Wege S.–Möhra und auf der Strecke M.–W.–Leimbach beobachtet.

22. Parus ater ater *L.* — Tannenmeise. Mehrmals begegnet, so auf den Höhen nördlich der Werra, am Wege S.–Möhra und auf der Strecke W.–M.–Leimbach.

23. Parus cristatus mitratus *Brehm* — Haubenmeise. Zeigte sich bei Langenfeld und auf der Strecke W.–M.–Leimbach.

24. Parus palustris communis *Bald.* — Sumpfmeise. Bei Langenfeld und auf der Strecke W.–M.–Leimbach festgestellt.

25. Regulus regulus (*L.*) — Wintergoldhähnchen. Am Wege S.–Möhra und auf der Strecke W.–M.–Leimbach gehört.

26. Regulus ignicapillus ignicapillus (*Temm.*) — Sommergoldhähnchen. Nur am Wege S.–Möhra gehört.

27. Lanius collurio collurio *L.* — Neuntöter. Verhältnismäßig zahlreicher Vogel; in Salzungen, am Wege S.–Möhra, auf der Strecke W.–M.–Leimbach und bei Langenfeld (zahlreich) begegnet.

28. Phylloscopus collybita collybita (*Vieill.*) — Weidenlaubsänger. Der Zilpzalp ließ sein Lied auf den Höhen nördlich der Werra, am Wege S.–Möhra, bei Langenfeld und auf der Strecke W.–M.–Leimbach vernehmen.

29. Phylloscopus trochilus trochilus (*L.*) — Fitislaubsänger. Der Fitis zeigte sich auf dem Wege S.–Möhra.

30. Acrocephalus palustris (*Bechst.*) — Sumpfrohrsänger. — Bei Langenfeld im Getreide singen gehört.

31. Hypolais icterina *(Vieill.)* — Gartenspötter. Gartenspötter sangen in Langenfeld.

32. Sylvia hippolais hippolais — Gartengrasmücke. Auf den Höhen nördlich der Werra, am Wege S.–Möhra und in Langenfeld festgestellt.



Transportschachtel (s. S. 112, Redaktionsbriefkasten unter B. G., Bernau).

33. Sylvia curruca curruca (*L.*) — Zaungrasmücke. Nur in Langenfeld beobachtet.

34. Turdus philomelos philomelos *Brehm* — Singdrossel. Bei Langenfeld gehört.

35. Planesticus merula merula *(L.)* — Amsel. Als Waldvogel auf den Höhen nördlich der Werra und auf der Strecke W.–M.–Leimbach beobachtet, wo sie vor einem Eichhörnchen warnte.

36. Phoenicurus phoenicurus phoenicurus (*L.*) — Gartenrotschwanz. Kam in Salzungen und in Langenfeld zu Gesicht.

37. Phoenicurus ochruros gibraltariensis *(Gm.)*. — Hausrotschwanz. Auf der Strecke S.–Möhra und auf den Höhen nördlich der Werra zu Gesicht bekommen.

38. Erithacus rubecula rubecula *(L.)* — Rotkehlchen. Bei Langenfeld und auf der Strecke W.–M.–Leimbach gesehen.

39. Troglodytes troglodytes troglodytes — Zaunkönig. Zaunkönige zeigten sich auf den Höhen nördlich der Werra und am Weg W.–M.–Leimbach.

40. Hirundo rustica rustica *L.* — Rauchschwalbe. Brutvogel in Salzungen, Langenfeld und Möhra.

(Schluß folgt.)

Kleine Mitteilungen.

Unter den zahlreichen Importen ausländischer Vögel sind viele Arten, welche vor dem Krieg zu den Seltenheiten des Vogelmarktes gehörten und über deren Lebensweise in der Gefangenschaft bisher nur wenig Mitteilungen aus dem Leserkreis eingegangen sind. Einer dieser Vögel ist die schöne indische Damadrossel (Abb. S. 110) — Geocichla citrina *Lath.* Ihre Gefiederfärbung ist ungemein ansprechend. Das zarte Bräunlichorange des Kopfes und der Unterseite geht allmählich in das Blaugrau des Oberkörpers, der Flügel und des Schwanzes über. Das Weiß der mittleren Flügeldecken gereicht dem Gefieder zur besonderen Zierde. Im Käfig hüpft sie munter von Stange zu Stange, aber ab und zu wird dieses Umherhüpfen durch zierliches kurzes Laufen auf dem Käfigboden unterbrochen. Zu ihrer Beherbergung ist ein großer Drosselkäfig geeignet, ihr Futter ist Drosselfutter, in welchem animalische Kost überwiegt. Ihr Gesang gehört zu den besseren Vogelgesängen. „Der leise Gesang wird genügend stark vorgetragen, um in allen seinen Einzelheiten vernommen zu werden. Er ist außerordentlich vielseitig und wohllautend; leider ist er etwas zerhackt, sanfte Übergänge zwischen den Strophen fehlen. Der laute Gesang besteht aus einer Reihe von langen wohllautenden Strophen, deren Klangfarbe außerordentlich an die Flöten des Pirolrufs erinnert." Nach dieser Schilderung des Gesanges der Damadrossel, welche Herr Ingenieur Kracht gibt, dürften auch anspruchsvolle Gesangsliebhaber dem Vogel großes Interesse entgegenbringen. Die indische Bergmeise (s. Abb. S. 109) ist der Kohlmeise ähnlich. Die stärker ausgesprochenen hellen Säume und Spitzen der Federn lassen sie lebhafter gefärbt erscheinen. Sie lebt in den Bergwäldern des Himalajagebiets bis ins südwestliche China. Die erste Einführung geschah 1912. In der Vogelstube des Herrn A. Troschütz lebte eine Bergmeise vier Jahre.

Sprechsaal.

(Steht den Abonnenten kostenlos zur Verfügung.)

Brütet der Star zweimal im Jahre? Um diese Frage abschließend zu klären, will ich der Sprechsaalnotiz des Herrn Ad. Selka, Kottbus, in Nr. 9 noch einige Worte hinzufügen. Meine Beobachtungen sind so eingehend, daß ich getrost mit der Behauptung in die Öffentlichkeit treten kann: In Ostpreußen brütet der Star nur einmal. Meine Beobachtung wurde auch in persönlicher Unterredung durch Professor Thienemann, den langjährigen Leiter der Vogelwarte Rossitten bestätigt, während, wie Herr Prof. Thienemann ausführte, in Thüringen, seiner Heimat, zwei Starbruten vorkämen. Das Manuskript „Nur ein Star" lag zur Zeit dieser Unterredung schon bei der Schriftleitung.

Graskau, Kreis Allenstein, den 22. April 1924.

A. Krüger.

Brütet der Star zweimal im Jahre? Was Herr Adolf Selka auf S. 72 über die Starbruten sagt, trifft zweifellos für das Gebiet, in welchem die Beobachtung über zwei Bruten der Stare gemacht ist, zu. Wenn aber gesagt wird, daß in „Einheimische Stubenvögel von Dr. K. Ruß" stehe, daß der Star regelmäßig zwei Bruten mache, so stimmt das wohl für ältere Auflagen des Buches. In der von mir im Jahre 1922 verfaßten Ausgabe des Buches heißt es: „Brutzeit: zweite Hälfte April. Bei günstiger Witterung und reichlicher Nahrung machen wahrscheinlich nur ältere Paare zuweilen zwei Bruten. Ältere haben schon im Mai Junge, jüngere im Juni." Wenn von zwei Bruten der Stare gesprochen wird, wird es sich in manchen Fällen um zwei verschiedene Paare handeln, um ein älteres Paar, das im Mai Junge hat, und um ein jüngeres, das im Juni brütet. K. Neunzig.

Bücher- und Schriftenschau.

Tarzan bei den Affen. Erlebnisse eines von Menschenaffen Geraubten. Von Edgar Rice Burroughs. 17 Bog. Schöner Halbleinenband mit mehrfarbigem Künstlereinband. (Verlag Dieck u. Co., Stuttgart.) Preis M. 4.80, für die Schweiz Fr. 6.—.

Tarzans Rückkehr in den Urwald. Von Edgar Rice Burroughs. 17 Bog. Schöner Halbleinenband mit mehrfarbigem Künstlereinband. (Verlag von Dieck u. Co., Stuttgart.) Preis M. 4.80.

Die englische Tarzan-Ausgabe erlebt Riesenauflagen. Der bekannte Verlag Dieck u. Co. in Stuttgart hat das alleinige Ausgaberecht für die deutsche Sprache erworben und gibt den ersten, vollständig in sich abgeschlossenen und einzeln käuflichen Band an die Öffentlichkeit, dem jetzt der zweite Band gefolgt ist. In vielen Ländern sah man diese Tarzan-Geschichten mit großem Erfolg über die Filmbühnen gehen und wartete mit Ungeduld auf diese Buchausgabe. Wie häufig Abenteuer-Geschichten, wird dieser Tarzan manchen in seinen Bann nehmen.

Vom Vogelmarkt.

Josef Beck, Zoologische Handlung, Stuttgart: Edelsänger, Mozambikzeisige, blaue Reisfinken, Häher, gr. Papageien, Alpensteinhühner.

Joh. Götz, Vogelexport, Neu-Ulm (Bayern); Pflaumkopfsittiche (nur Männchen), Tuiparasittiche, Tarantin. Unzertrennliche, junge fingerzahme Graupapageien, zahmen Inkakakadu, Prachtglanzstare, abess. Glanzstare, Spiegeltrupiale, Weißkopfviehweber.

E. W. Lenger, Berlin N 58, Schönhauser Allee 70a: Molukken-Kakadus, Weißhauben-Kakadus, kleine Gelbhauben-Kakadus, Schwarzkappenlori, Gelbmantellori, junge Blaustirn-Amazonen, junge Graupapageien, Sperrlingspapageien, rote Kardinäle (Männchen und Weibchen), Papstfinken (ausgefärbte) und nicht ausgefärbte Männchen, Indigofinken, Weißkehlpfäffchen, Schwarzkappenpfäffchen (Männchen), Goldaugentimalien, Damadrosseln, Katzendrosseln, blaue Reisfinken, Edelsänger, Mozambikzeisige.

Paul Tzornack, Berlin N 55, Prenzlauer Allee 189: Jendaja-Sittiche, Grassittiche, Goldstirnsittiche, Safranfinken, rote Kardinäle, Purpurtangaren, amerik. Wanderdrosseln, Tyrannen, meerblaue und Trauertangaren, Zwergaras.



Herrn X. Der Vogel ging am 3. d. M. ein. Der Kadaver traf hier am 9. d. M. ein. Die Fäulnis der Eingeweide war in diesen sechs Tagen soweit fortgeschritten, daß Feststellungen nicht mehr möglich waren. Der Flügelbruch ist frisch und unverheilt. Es handelt sich um einen einfachen Bruch, bei welchem eine Durchbrechung der Haut nicht stattgefunden hat. Eine Wunde ist daher äußerlich nicht wahrnehmbar. Unter den oben gekennzeichneten Umständen ist es natürlich nicht möglich, festzustellen, wann sich der Vogel den Flügelbruch zugezogen hat. Zur Untersuchung bestimmte Kadaver müssen sobald wie möglich gesandt werden. Andernfalls ist die Sendung zwecklos.

Herrn H., Leipzig. Der Wellensittich ist infolge falscher Verwertung der Nahrung durch den Organismus eingegangen. Er ist stark abgemagert. Zuweilen gelingt es durch Veränderung der Fütterung, derartig erkrankte Vögel zu erhalten. Die Krankheit kann nur durch fortgesetzte Feststellung des Ernährungszustandes (Gewichtes) erkannt werden. Wenn durch Wiegen des Vogels festgestellt wird, daß er fortgesetzt magerer wird, ist er in den meisten Fällen an dem oben genannten Leiden erkrankt.

Herrn A. St., Weißstein. Der Kanarienvogel ist einer Darmentzündung erlegen. Durch Warmhalten des Vogels und Verabreichen erwärmten dünnen Haferschleims als Getränk wäre vielleicht eine Heilung möglich gewesen. Der Vogel hätte nur Körnerfutter erhalten dürfen, wie amerikanische Hafergrütze und Mohn.

Herrn B. G., Bernau. Die Berliner Vogelhändler und wahrscheinlich auch Vogelhändler in anderen Städten haben eine für den kurzen Transport gekaufter Vögel bestimmte Pappschachtel eingeführt, welche auf S. 111 abgebildet ist. Die Schachtel ist zusammenlegbar und ihre Einrichtung verhindert eine Beschädigung des Vogels während des Transportes. Zum Versandt von Vögeln durch die Post ist sie ungeeignet. (Fortsetzung auf der 3. Umschlagseite.)

Aus den Vereinen.

Aufgenommen ist Mitgl. 396 Herr Walter Schenck, Oberleutnant a. D., Lebus b. Frankfurt a. O. — Am 18. und 19. d. M. ist ein Rundschreiben ausgegeben, dem die Liste einer Berliner Vogelhandlung und ein Prospekt beigelegt ist. A. Krabbe.

„Aegintha", Verein der Vogelfreunde zu Berlin. In der Sitzung am Donnerstag, den 15. Mai, im Aquarium hielten Herr Hammer und Herr Vorbrodt einen Vortrag über Käfigbau und praktische Käfigung. Herr Hammer hatte die Zeichnung eines von ihm neukonstruierten Weichfresserkäfigs mitgebracht und Herr Vorbrodt hatte einen sehr sauberen und praktischen, selbstgebauten Weichfresserkäfig mitgebracht. Auch einige ganz einfache Werkzeuge, von dem Vortragenden selbst konstruiert, zeigte er herum, welche auch dem Laien den Käfigbau wundervoll erleichtern. Zum Schluß wurde noch eine Nachtpartie nach Fürstenberg-Neustrelitz für die Nacht vom 31. Mai zum 1. Juni beschlossen. Abfahrt am 31. Mai abends 8 Uhr vom Stettiner Fernbahnhof. Es werden Sonntagsrückfahrkarten 4. Klasse nach Fürstenberg, Preis 2,60 M., gelöst. Diese Partie ist hochinteressant und wird von Herrn Noack geführt. Die Vereinssitzungen finden nach wie vor an jedem 1. und 3. Donnerstag im Monat, abends 8 Uhr, im Aquarium statt. Gäste sind gern willkommen.

J. A.: Otto Vorbrodt, 1. Schriftführer, Berlin O 112, Scharnweberstraße 18.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei zu Hamburg. Sitzungen finden statt jeden 1. und 3. Dienstag im Monat in Guttmanns Hotel, Poolstr. 22, abends 8¼ Uhr. Nächste Sitzung Dienstag, den 6. Juni 1924.

J. A.: Arnold Weber, 1. Vorsitzender.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig. Vereinssitzungen jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat im Vereinslokal, „Bauers Brauereirestaurant", Täubchenweg. Nächste Sitzung am 5. und 19. Juni 1924. Gäste stets willkommen.

J. A.: Johann Birk, 1. Vorsitzender.

Zool. Verein Zwickau i. S. In der letzten Mitgliederversammlung erstattete der als Delegierter nach Berlin gesandte 1. Vorsitzende Bericht über die dortselbst am 27. v. Mts. erfolgte Gründung des „Reichsverbandes deutscher Vogelliebhaber", dessen Sitz nach Leipzig gelegt ist. In kurzen, sachlichen Worten erläuterte der Genannte, Herr Paul Schmidt, alles Wissenswerte. Insbesondere wurde der mannigfachen Vorteile gedacht, die uns allen durch diesen Zusammenschluß zugute kommen. Der jahrelange Wunsch vieler Sportkollegen ist nunmehr in Erfüllung gegangen. Helfe ein jeder ohne Ausnahme, unsern neu ins Leben gerufenen Reichsverband zu festigen und zu erhalten. Dies soll stets unsere Parole sein! Ferner waren von den Brudervereinen in Eibenstock und Schönheide zu ihren diesjährigen Ausstellungen (am 11. Mai) an uns Einladungen ergangen. Es wurde beschlossen, denselben möglichst zahlreich Folge zu leisten. W. Fritzsche, Schriftführer.

Anzeigenteil

Die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 20 G.-Pf. berechnet. Aufnahme erfolgt gegen Voreinsendung des Betrages in Reichsgeld per Brief od. auf unseren Zahlstellen: Postscheckkonto: Magdeburg 3148, Wien 156 687, Bern III 4326, Prag: Creditanstalt d. Deutschen unter Angabe des Zweckes.

Futtermittel

Vogelfutter [371
für Kanarien, Waldvögel, Exoten, Papageien, Weichfresser. Anfragen nur gegen Rückporto. Liste 13 über Vogelfutter, Liste 5 über Vogelkäfige, Zuchtgeräte usw. mit etwa 400 Abbild.

W. Göpel, Leipzig,
Tröndlinring 1. Telephon 14958.

Mehlwürmer
geg. Einsend. v. 2.—Reutenmark ¼ Pfd. franko versend. **D. Waschinski & Co.,** Biesenthal I (Mark). [372

Vögel

Ia Grassittiche à Stück 10 ℳ, **Graue Reisfinken** à Paar 10 ℳ, **Zwergara** 30 ℳ, **Purpurtangaren** à Paar 25 ℳ, **Amerik. Wanderdrosseln** à 15 ℳ, **Trauertangaren** à Paar 20 ℳ, **Tyrannen** à 20 ℳ, **Safranfinken** à Paar 9 ℳ, **Papstfinken** à Paar 40 ℳ, **Indigofinken** à Paar 40 ℳ, **Mozambikzeisige** à Paar 15 ℳ, **Nesusaffen** à 65 ℳ, **Kanarienhähne,** flotte Roller, à 20 ℳ, **Astrilden, Amaranten, Atlasfinken, Weber** à Paar 3,50 ℳ, **Bandfinken, Schmetterlingsfinken, Silberschnäbel** à Paar 4 ℳ, **Edelsänger** à Paar 5 ℳ, **Junge Safranfinken** à Paar 4 ℳ. [373

Nur gesunde, gut befiederte Tiere kommen zum Versand.

Verpackung und Porto als dringend 3,50 ℳ.

P. Tzornack, Berlin NO 55,
Prenzlauer Allee 189.

Sittiche, Araras, Kakadus, Amazonen, Edelpapageien, Zwergpapageien, Kragenpapageien, Loris, kleine Affen für eigene Sammlung zu kaufen gesucht. Angebote mit genauer Beschreibung und **Preis** an **Fliegner,** Lehrte-Hannover. [374

Für Freunde der heimischen Vogelwelt.

Die deutsche Vogelwelt nach ihrem Standort. Ein Beitrag zur Zoogeographie Deutschlands und zugleich ein Exkursionsbuch zum Kennenlernen der Vögel. Von Werner Hagen. Mit 74 Abbildungen und 4 Schwarzdrucktafeln. Kart. 3.— M.

Die einheimischen Stubenvögel, ihre Naturgeschichte und Zucht. Von Karl Neunzig (zugleich 6. Auflage des Dr. Karl Rußschen Handbuchs für Vogelliebhaber Band II). Mit 22 Farbentafeln und 188 Textabbildungen. Geh. 14.—, geb. 17.— M.

Die gefiederten Sängerfürsten des europäischen Festlandes, ihre Naturgeschichte, sachgemäße Käfigung, Behandlung und Pflege als Stubenvögel. Von Mathias Rausch. 2. Auflage. Mit 3 Farbendrucktafeln und 16 Textabbildungen. Kart. 3.— M.

Die Hauptregeln der Sprosserpflege. Scherzreime von Oskar M. Kisch. Mit 2 Abbildungen. 1.— M.

Der Dompfaff, seine Naturgeschichte, Pflege, Abrichtung und Zucht. Auf Grund 54jähriger Erfahrung von F. Schlag. 8.—10. Auflage. Mit 2 Schwarzdrucktafeln. Kart. 1.— M.

Die deutschen Sumpf- und Strandvögel. Von Dr. Curt Floericke. Mit 44 Abb. auf 15 Tafeln in Schwarzdruck. Kart. 4.50 M.

Die deutschen Schwimm- und Wasservögel. Von Dr. Curt Floericke. Mit ca. 45 Abb. auf 15 Tafeln in Schwarzdruck. Kart. 4.50 M.

Die mitteleuropäischen Vögel. Von Dr. E. Bade. Band I. Singvögel. Mit 1 Farbentafel, 4 Schwarzdrucktafeln, 31 Tafeln in Photographiedruck u. 144 Textabbild. von Nestern, Eiern u. Vogelteilen. Geb. in Ganzleinen 5.— M.

Allerlei sprechendes gefiedertes Volk. (Raben- und Krähenvögel, Starvögel usw.) Ein Hand- und Lehrbuch von Dr. Karl Ruß. Mit 5 Vollbildern in Schwarzdruck. Kart. 3.— M.

Gefiederte Hausfreunde I. Von Karl Neunzig. Kurze Unterweisung üb. d. Pflege heimischer Stubenvögel. Kart. 1.— M.

Die Fänge der Raubvögel Mitteleuropas. Von Prof. Dr. Carl R. Hennicke. Mit 33 lithogr. Tafeln. Kart. 5.— M.

Für Liebhaber fremdländischer Vögel.

Die fremdländischen Stubenvögel, ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht. Von Karl Neunzig. (Zugleich 5. Auflage des Dr. Karl Rußschen Handbuchs für Vogelliebhaber Band I.) Mit 42 Farbentafeln und 400 Textabb. Geh. 30.—, geb. 35.— M.

Die fremdländischen Weichfutterfresser (Insekten- od. Kerbtierfresser, auch Wurmvögel genannt, Frucht- od. Beerenfresser u. Fleischfresser). Mit Anhang: Tauben- und Hühnervögel. Von Dr. Karl Ruß. (Die fremdländischen Stubenvögel Bd. II.) Mit 10 Farbentafeln. Geh. 30.— M.

Neunzigs fremdländische Vogeltypen. Eine Farbentafel in Größe 38×27 cm mit Erläuterungen. Vergriffen!

Gefiederte Hausfreunde II. Von Karl Neunzig. Kurze Unterweisung über die Pflege fremdländischer Stubenvögel. Mit 51 Abbildungen. Kart. 1.— M.

Zu beziehen durch:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlg., Magdeburg
Postschließfach 148.

Prima Kanarienhähne
(prima Sänger) sowie
gesunde Zuchtweibchen, grüne Wellensittiche, Astrilden, Amaranten, Bandfinken, Atlasfinken, Feuerweber, Paradieswitwen, Edelsänger, Mozambikzeisige, Dotterweber, Textorweber, Schwarzkopf-Nonnen
sowie
1 Paar jung. zahm. Rehe
verkaufe preiswert. Ebenso kaufe
Kanarien-Junghähne, Meerschweinchen, weiße Mäuse, alle anderen Arten Exoten, Ziervögel und Tiere. [375

J. Schneider, Breslau,
Klosterstraße 87.

4 Ia Wellensittichmännch.
vorjähriger Brut aus Freivoliere, da überzählig, zu verkaufen oder gegen andere Exoten zu vertauschen.
Suche außerdem
1,1 Reisfinken u. 0,1 Zebrafinken.
Wilhelm Berkenhoff.
Bad Münster a. Stein (Rheinl.).
Mitglied der A. Z. [376

Schamadrosseln	Stück	75.— ℳ
Rote Kardinäle	„	50.— ℳ
Purpurtangaren	„	50.— ℳ
Dominikanerkardinäle	„	15.— ℳ
Goldstirnblattvögel	„	60.— ℳ
Mexikan. Karmingimpel	„	15.— ℳ
Alexandersittiche	„	12.50 ℳ
Brannwangensittiche	„	25.— ℳ
Gelbe Wellensittiche	Paar	30.— ℳ
Grüne Wellensittiche	„	30.— ℳ
Kaptäubchen	„	25.— ℳ
Pikuitäubchen	„	20.— ℳ
Safranfinken	„	12.— ℳ
Senegalfinken	„	4—6 ℳ

Große Auswahl **hübscher Kapuzineräffchen** Stück 120—150 ℳ, **Kleine Javaaffen** Stück 75.— ℳ.

Porto dringend und Verpackung bis 5 kg zuf. 5 ℳ.

Fachmännisch zusammengestelltes Vogelfutter für alle Arten.

Bei Anfragen Rückporto.

Friedrich Frank, München,
Gabelsbergerstraße 9. [377

---

2 Schamadrosseln prima 60 u. 80 ℳ.

Ferner **tausche auf nützliches:**

1 Pirol, goldgelb, fleißig rufend,

1 Sumpfrohrsänger,

sehr guter Spötter.

O. Reupert, Breslau X,
Kospothstraße 21. [378

Verkaufe:

2 Zuchtpaare japan. Mövchen je 22.— ℳ,
3 einzelne kräftige Männchen je 10.— ℳ.

Dr. A. Schröter, Leipzig-Connewitz,
Auerbachstraße 7 II. [379

Zuchtpaar

Wellensittiche

grün, 1 Jahr alt, 22 ℳ. [380

Mertes, Mainz, Wallaustr. 62.

Vertausche

1 Ia Zuchtpaar Bandfinken,
1 Ia Zuchtpaar Malabarfasänchen,
2 Männchen Tigerfinken gegen **Stieglitze oder Zuchtpaar gelbe oder grüne Wellensittiche.**

N. Diwersy, Merzig (Saar).
A. Z.-Mtgl. 183. [381

Blauer Arara, Prachttier 250 ℳ, **Roter Arara,** Grünflügel 220 ℳ, **Blaustirn-Amazonen,** junge sprech. sehr gelehrige Vögel 50 ℳ, **Sperlingspapageien** Paar 16 ℳ, **Marokkaner Zwergara** 35 ℳ, **Schamadrosseln,** prima Sänger 70 ℳ, **Dayaldrosseln** 40 ℳ, **Purpurtangaren** Paar 40 ℳ, **Rote Kardinäle** 40 ℳ, **Safranfinken** Paar 9 ℳ, **Weißstirnpfäffchen** Paar 16 ℳ, **Weißkehlpfäffchen** Paar 16 ℳ, **Textorweber** Paar 10 ℳ.

Versand per Nachnahme oder Voreinsendung. — Porto u. Verpackung 3,50 ℳ. [382

Tierhandl. M. Kleinert,
Berlin NO 18, Strausberger Str. 13,
Tel.: Alexander 3313.

Ia Amerik. Spottdrossel zu verkaufen, Preis 45 ℳ; **Ia Schamadrossel** zu kaufen gesucht. [383

Wilh. Pfilterer, Ludwigsburg, Karlstraße 40 (Württemberg).

Tausche

dreijähr. Stieglitzmännch.

gegen [384

2 zuchtfäh. Kanarienweibch.

Georg Raht, Neunburg v. W., Obpf.

Für Kaninchenzüchter.

Wirtschaftskaninchen, ihre Pflege und Züchtung. Von Karl Neunzig. Mit 26 Abbildungen im Text. 1.— M.

Expori- und Schlacht-Kaninchenzucht. Ein Handbuch zur Beurteilung, Pflege und Zucht aller Rassen von P. Wafer. 2. Auflage. Mit 40 Abbildungen im Text. Geh. 2.—, geb. 3.— M.

Kaninchen-Rassen. Illustriertes Handbuch zur Beurteilung der Kaninchenrassen, deren Behandlung, Zucht, Verwertung und Krankheiten. Von Tiermaler J. Bungartz. 2. Aufl. mit 1 Farbentafel u. 22 Textabbildungen. Geh. 2.—, geb. 3.— M.

Farbige Kaninchenbilder. Naturwahre Aquarelldrucke von 18 verschiedenen Kaninchenrassen von J. Bungartz. 2.— M.

Für Bienenzüchter.

Dzierzon's rationelle Bienenzucht. Von Pfarrer Dr. Dzierzon. 2. Auflage. Mit vielen Textabbildungen. Kart. 3.— M.

Bienenzucht im Zargenbreitwabenstock. Von Jak. Luers. Mit 25 Abbildungen im Text. Kart. 2.— M.

Leben und Zucht der Honigbiene. Ein gemeinverständliches Lehrbuch über Behandlung der Bienen und über Tätigkeit, Nutzen und Anatomie der Biene von Prof. Dr. O. Krancher. 2. verbesserte Aufl. Mit 1 Tafel, 82 Abbild. u. 7 Kopfleisten. Kart. 3.— M.

Zu beziehen durch:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlg., Magdeburg
Postschließfach 148.

Bitte!

In eigenem Interesse wollen die pp. Einsender beachten, daß

a) **alle für die Redaktion** der „Gefiederten Welt" bestimmten **Zuschriften** (Sprechsaal-Anfragen und -Antworten, Vereinsnachrichten usw.) und **Sendungen** (tote Vögel, Manuskripte) nur an **Herrn Karl Neunzig, Hermsdorf bei Berlin,** Neue Bismarckstr.,

b) **alle Bestellungen** auf **Abonnements, auch vom Ausland, nur durch die Post,**

c) **Inserate** und dergl. Geschäftliches nur an die **Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg,** Postschließfach 148,

zu richten sind.

Zur gefälligen Beachtung!

§ 3 des am 1. September 1908 in Kraft getretenen „Vogelschutzgesetzes" lautet:

In **der Zeit vom ersten März bis zum ersten Oktober** ist das Fangen und die Erlegung von Vögeln sowie der Ankauf, der Verkauf und das **Feilbieten, die Vermittlung** eines hiernach verbotenen An- und Verkaufs, die Ein-, Aus- und Durchfuhr von lebenden sowie toten Vögeln der **in Europa einheimischen** Arten überhaupt, ebenso der Transport solcher Vögel zu Handelszwecken untersagt.

Dieses Verbot erstreckt sich für **Meisen, Kleiber, Baumläufer, Spechte, Eulen** und **verschied. Falken** für das **ganze Jahr.**

Auf Grund dieses können wir vom **1. März an** Inserate betreffend **Kauf** und **Verkauf einheimischer** Vögel nicht mehr zum Abdruck bringen und bitten, dies bei Aufgabe von Inseraten berücksichtigen zu wollen.

Unter Feilbieten ist das Anbieten zum Kaufe oder zu **sonstigem Erwerbe** zu verstehen. Somit ist ein strafbares Feilbieten auch dann anzunehmen, wenn in einer Anzeige zwar dem Wortlaut nach ein **Tausch** angeboten wird, der Anbietende aber tatsächlich zu kaufen bzw. zu tauschen beabsichtigt und die Form des Tauschangebots nur wählt, um sich gegen strafrechtliche Verfolgung zu sichern. In solchen Fällen machen sich sowohl die anzeigenden Personen wegen verbotenen Feilbietens als auch die die Anzeigen veröffentlichenden Zeitungsunternehmer der verbotenen Vermittlung eines An- und Verkaufs strafbar.

Bei Tauschanzeigen ist ausdrücklich anzugeben, was als Gegenleistung geboten oder gesucht wird. Eine Angabe des Wertes der zum Tausch angebotenen Vögel darf nicht erfolgen! Unter Chiffre können derartige Anzeigen nicht aufgenommen werden!

Die Geschäftsstelle der „Gefiederten Welt"
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Bandfinken,

Paradieswitwen, Astrilde, Silberschnäbel, Atlasfinken, Orangeweber Paar 3,60 ℳ; **Amarantenrot, Schmetterlingsfinken, Elsterchen, Grisblen** Paar 3.80 ℳ; **Edelsänger, Mozambikzeisige, blaue Reisfinken** Paar 10 ℳ; gemischt nach meiner Wahl 25 Paar 80 ℳ, 50 Paar 140 ℳ, 100 Paar 250 ℳ; **Häher** Stück 5 ℳ, **Wellensittiche, gr. Papageien, Kanarienhähne, Kanarienzuchtweibchen, Alpensteinhühner, Landschildkröten** 8-14 cm Stck. 1,50 ℳ, 15—20 cm Stück 2 ℳ, bei 50 Stück 1,40 ℳ, bei 100 Stück 1,35 ℳ; **Weiße Mäuse** Paar 1,50 ℳ; **Weiße Ratten** Paar 2 ℳ; **Laubfrösche** Stück 0,50 ℳ **usw. usw.** [385

Garantiere stets für lebende und gute Ankunft.

Josef Beck,
Zoologische Handlung,
Stuttgart.

Papageien,

Mönch- und Wellensittiche, Edelsänger und Prachtfinken, **keine** frisch importierten Tiere, **weiße Mäuse,** Meerschweinchen, Frettchen usw. verkaufe. Suche **Angorakatzen.** Anfr. Rückporto.

A. Schwarz, Weißenfels a. S.,
Klingenplatz 8. [386

Reichenow, **Die Vögel der zoologischen Gärten.**
2 Bände. 30 ℳ franko. [387
E. Albrecht, Bischofswerda (Sachs.).

Verkaufe

15 Jahrgänge **Cabanis-Journal,** ungebunden, 35 Jahrgänge **Zoologischer Garten** à Jahrgang für 2 ℳ, teils gebunden, teils ungebunden. [388

Spitz, Elzach (Baden).

Für Kanarienzüchter!

Der Kanarienvogel,

seine Naturgeschichte, Pflege u. Zucht von Dr. Karl Ruß. 14. Auflage. Mit 2 Farbentafeln und zahlreichen Textabbildungen. Bearbeitet von Karl Neunzig.
Kart. 2.50 M.

Der Kanariengesang.

Allgemeinverständliche sowie musikalische und phonetische Darstellung von W. Kluß.
1.00 M.

Zu beziehen durch:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg.
Postschließfach 148.

Beschwerden wegen Nichtzustellung der „Gefiederten Welt" sind beim zuständigen Postamt anzubringen.

Inserate

für das am 29. Mai 1924 zur Ausgabe gelangende Heft 15 der Gefiederten Welt erbitten bis 24. Mai 1924 früh

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Hermsdorf bei Berlin; für den Anzeigenteil: Rolf Kretschmann, Magdeburg, Postschließfach 148.
Verlag der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck: August Hopfer, Burg Bz. Mgdbg.

Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Jahrg. 53 | Den 29. Mai 1924 | Heft 15

(Druckort: Burg, Bezirk Magdeburg.)

Mein Blaubartblattvogel.

Von S. Lichtenstaedt, Berlin-Johannisthal.

(Nachdruck verboten.)

Als ich eines schönen Tages bei meinem „Hoflieferanten", Herrn Kleinert, weilte und die soeben eingetroffene, wohl mehr als zwanzigköpfige Schamaschar bewunderte, ertönte mir aus einer dunklen Ecke ein eigenartiges, noch nie gehörtes Pfeifen und Flöten entgegen, so daß ich neugierig den betreffenden Käfig musterte.

Ein selten prachtvolles Geschöpf saß da, mit herrlich leuchtend blauen Wangen, leuchtend blauen Flügeldecken und sonst in herrliches Gelb und Grün getaucht.

Ich konnte mich an dieser, besonders in der Sonne herrlich leuchtenden Farbenpracht kaum satt sehen, und wurde selbstverständlich der Wunsch in mir rege, diesen lebenden Tuschkasten zu erwerben.

Zu Hause wurde der „Neunzig" studiert, und da nichts besonders Nachteiliges von den Blattvögeln, denn ein solcher war es, zu finden war, so hielt das Tierchen am nächsten Tage seinen Einzug in meine Vogelstube.

Mein neuer Bewohner war der seltene blaubärtige Blattvogel, an Gestalt seinem bekannteren Vetter, dem Goldstirnblattvogel ähnelnd, in seiner aparten prachtvollen Färbung diesen aber bei weitem übertreffend.

Vor ein paar Monaten hatte ich bei meinem Freund Tzornack ein paar Dutzend Goldstirnblattvögel singen gehört, wobei mir die Lust zur Anschaffung gründlich verging. „Ein Blattvogel", sagte mir einst ein Liebhaber, „singt am schönsten, wenn man ihn nicht hört".

Leider sind die unangenehmen Eigenschaften vieler Stubenvögel in den meisten Lehrbüchern zu wenig hervorgehoben, alles ist fast immer eitel Licht und Sonne.

Wohl bietet selbst ein langweiliger Stubenvogel dem Liebhaber Interessantes, aber sehr viele langweilige Gesellen findet man häufig als geradezu hervorragende Zimmergenossen beschrieben.

So kommen nach meiner Erfahrung die Blattvögel im „Neunzig" viel zu gut fort, ihre unangenehmen Eigenschaften überwiegen ihre angenehmen bei weitem; daß ab und zu Ausnahmen vorkommen, ist nur eine Bestätigung der Regel.

„Schön, dumm, faul und gefräßig" nennt ein Liebhaber den Blattvogel („Gef. Welt" 1923/12), was nach meiner Ansicht wieder etwas zu stark übertrieben sein dürfte.

Der Blaubartblattvogel soll als Stubenvogel empfehlenswerter sein als sein goldstirniger Vetter, ich begann also mit einiger Neugierde an meinem neuen Genossen mit meinen Beobachtungen.

Im Sommer sollte der kleine Kerl dann in meine große Gartenvoliere, zwischen Farne und Palmen, da alle Blattvögel friedliche Geschöpfe sind und selbst dem kleinsten Prachtfinken nichts zuleide tun.

Mein „Billig" — warum er diesen Namen erhielt, bitte weiter unten nachzulesen — erhielt einen zirka 140 cm langen Käfig als beschlagnahmefreie Wohnung, mit allerlei Gezweig recht romantisch ausgestattet, und schien sich hier anscheinend recht wohlzufühlen.

Schon eine Stunde nach seiner Ankunft nahm er ein Bad, d. h. er benetzte im Trinkwasser die Brust oberflächlich, und begann nun die paar feuchten Federn aus Leibeskräften zu putzen und zu ordnen.

Er war nicht zahm, nicht scheu, fraß mit gutem Appetit sein Weichfutter, war genau so wild nach Mehlwürmern wie meine Schamas und begrüßte mich morgens beim Eintreten ins Vogelzimmer mit einem sanften pia-pia.

Über alles liebte er Obst, und besonders Apfelsine. Die kleingeschnittenen Scheiben nahm er in den Schnabel, hielt den Kopf gen Himmel und drückte und quetschte aus Leibeskräften den Saft aus der Frucht. Die ausgepreßten Scheiben ließ er liegen.

Apfel versuchte er in der ersten Zeit ebenso zu behandeln, als er aber merkte, daß die Mühe so ziemlich vergeblich war, zerkleinerte er diesen mit heftigen Schnabelhieben und fraß die kleinen Teile.

Aus Bananen und anderem Obst machte er sich nichts, hatte er Apfelsinenscheiben, so ließ er alles andere liegen, ein Beweis, daß ihm mehr an dem Saft des Obstes als an der Frucht zu liegen schien.

Als ein Zeichen von Intelligenz muß ich folgenden Vorfall buchen: Eines Tages sah ich den Vogel mit einer ausgepreßten Apfelsinenscheibe am Trinknapf sitzen und die Schale mehrmals ins Wasser tauchen. Als die Scheibe tüchtig durchnäßt war, flog er nach oben und begann sie neu zu bearbeiten. Instinkt oder Verstand?

Das ganze Benehmen meines Vogels war auch sonst ungemein interessant. „Dumm, faul und gefräßig" war mein Vogel nicht. Nicht eine Minute saß er ohne Beschäftigung im Käfig, immer huschte er geschäftig durch die Zweige. Mich kannte er schon

nach wenigen Tagen als „futterspendenden Geist". Unsinniges Umherflattern im Käfig beim Hantieren in demselben kannte er nicht, und gefräßiger ist er kaum mehr als eine Schama.

Daß ein Blattvogel durch das Fruchtfutter mehr schmutzt, ist richtig, doch ist dieses nicht gar so arg.

Leider, leider sollten seine unangenehmen Eigenschaften schneller, als mir lieb war, zum Durchbruch kommen.

Seine stimmliche Begabung war in der ersten Zeit erträglich. Er hatte zwar einige sehr unangenehm laute Töne, doch brachte er diese verhältnismäßig selten zu Gehör.

Je wohler sich der Vogel jedoch bei mir fühlte, um so weniger wohl fühlte ich mich. Angeregt wohl durch zu reichliche Mehlwurmfütterung oder durch die ersten frischen Ameisenpuppen, ließ er eine Anzahl Töne hören, die wie „billig-billig-billig" klangen. Dieses wäre noch zu ertragen gewesen, aber sein „billig" wurde immer lauter und aufdringlicher.

Schließlich ertönte es fünfzig- bis sechzigmal laut und gellend, zur Abwechslung erklang dann bei besonders starkem Wohlbefinden ein paar dutzendmal piiiaa-piiia-piiiaa, so laut und gellend, daß man in dem Urheber ein Tier in der Mindestgröße eines ausgewachsenen Kalbes vermutete.

Dazu kamen noch mindestens ein Dutzend durch Laute nicht wiederzugebende Töne, Kreischen, Wiehern, Blöken, Meckern, kurz ein ganzer zoologischer Garten schien sich in der Kehle meines Blattvogels etabliert zu haben.

Dabei konnte er auch anders. Saß er nach beendeter Mahlzeit, speziell wenn er den Saft einer halben Blutorange verputzt hatte, still auf der Stange, so entquollen seiner Kehle entzückende, leise, flötende und pfeifende Laute, an den Gesang unserer Grasmücken erinnernd.

Als vor seinem offenen Fenster die Buchfinken schlugen, hatte er schon nach wenigen Tagen diese Schläge imitiert in geradezu hervorragender Vollendung. Täglich brachte er uns nun Neues, leider nichts Gutes.

Eines Tages empfing mich meine liebe Frau mit der Nachricht, daß oben in der Vogelstube ein Tierchen unter entsetzlichen Schmerzen verendet sein muß. Erschreckt stürze ich zu meinen Lieblingen, aber alles ist wohl und munter. Am Nachmittage holte mich meine Frau aus dem Garten. „Hörst du es, schon wieder."

Aus dem Zimmer drangen laute gellende Töne, ähnlich wie sie ein Huhn von sich gibt, wenn es von Menschenhand gepackt wird, um in den Kochtopf zu wandern. Es war „Billig", der Urheber dieser lieblichen Laute.

Morgens halb fünf, wenn der Tag graute, begann es auch uns zu grauen. Dann begann der Blattvogel mit seinem Gesang. Ein paar Tage half Zudecken. Dann versagte auch dieses Mittel. „Entsetzliches Vieh" ertönte es aus dem molligen Lager neben mir, „Billig, Billig, Billig, piiaa-piiaa", antwortete aus dem Vogelzimmer mein „Liebling".

Ein neues Verhängnis. Mein altes Schamamännchen schien den Gesang entschieden nachahmenswert zu finden, und bald ertönte er nicht mehr im Solo, sondern im Duett. An diesem Duett fand nun wieder mein Jaco (einer der hervorragendsten Graupapageien, den ich je besessen) Gefallen, und er brachte das entzückende „Billig" schon nach wenigen Tagen.

Zum Glück brachten Schama und Jaco die Töne im piano und nicht im forte.

Noch eine Zeitlang hörte ich mir die Geschichte mit an, dann stand mein Entschluß fest. „Billig" mußte fort. Der Arzt erklärte mir, daß ich sonst in ein Sanatorium müßte, meine Stütze drohte mit Kündigung, meine Frau mit Scheidung, meine Nachbarn fragten mich, ob ich in der Wohnung Hühner oder Schweine züchte, kurz und gut, „Billig" mußte fort.

Ich inserierte in der „Gef. Welt", aber ich bin ein anständiger Mensch. Ich traute mich nicht, den Vogel einem Liebhaber, trotz dreier Bestellungen, zu senden.

Ich fürchtete Prozesse, den Staatsanwalt usw., und so wanderte der Vogel dahin, woher er gekommen ist.

Noch vorher sollte ich etwas Originelles erleben. Als ich den Vogel verpacken wollte und in der Hand hielt, öffnete er weit den Schnabel, nicht aber um zu beißen, sondern laut und gellend begann er in meiner Hand sein gesamtes Repertoire herunterzusingen. Erstaunt hielt ich ihn wohl zwei Minuten fest, und ununterbrochen sang er, noch schallender als sonst, wohl als Ausdruck der Angst.

Seit dieser Zeit besuchte ich Herrn Kleinert seltener. Ich hatte Furcht. Doch eines Tages war „Billig" verkauft. Ein Liebhaber war entzückt von ihm und nahm ihn gleich mit. Sollte der betreffende Käufer diese Zeilen zu Gesicht bekommen, so kann ich ihm bestätigen, daß dieser Blattvogel am schönsten singt, wenn man ihn nicht hört.

„Die weiße Amsel".

Von Vincenz Sommer, Münster i. W.

(Nachdruck verboten.)

Im Frühjahr, als alle die vielen Amselweibchen und die halbwüchsigen Amseljünglinge aus dem Süden wiederkamen, war auch ein alter Amselhahn mitgekommen. Aus welcher Gegend er stammte, warum er als Mann die Sommerfrische aufgesucht hatte, keiner wußte es. Eines Tages, lau wehte der Märzwind und der Nebel fiel in feinen Tröpfchen und Wasserstäubchen, war er da. Anstatt wie all die anderen Männchen ein kohlschwarzes Gefieder zu haben, war er fast ganz weiß. Nur die Stirn, ein paar Flügel- und Schwanzfedern waren schwarz. Der Schnabel war ebenso wie bei den andern Sterblichen gelb. So etwas war noch nie dagewesen in der Amselsippe. Eine weiße Schwarzdrossel. Die Männchen nannten es einen Skandal, die jüngeren Weibchen fanden es interessant. Ganz selbstverständlich hatte der fremde Vogel die Weibchen auf der Reise geführt, und nun blieb er auch ganz selbstverständlich hier. Im Männerverein auf dem alten Giebeldach wurden lebhafte Versammlungen abgehalten, um über den Übelstand zu beraten. Aber da war nichts zu machen. Ein vorlauter Amseljüngling war gestern noch von der weißen Drossel so zurechtgesetzt worden, daß den alten Männchen die Lust an allen Raufereien verging.

Man wäre ja auch nur in die Gefahr gekommen, ein paar von seinen schönen schwarzen Federn aus dem Hochzeitsfrack zu verlieren, und das mußte man doch jetzt in dieser wichtigen hochbedeutsamen Zeit vermeiden. Keiner wollte sich dieses weißen zugelaufenen Lümmels wegen der Gefahr unterziehen, nachher ohne Schwanz oder mit ausgerauften Flügelfedern den hübschen Amselfräuleins sich zu nähern. Das war denn doch zu gefährlich. Und so unterblieb denn jetzt noch Zank und Streit. Aber später, wenn man seiner Pflicht als zukünftiger Gatte und Vater zahlreicher Nachkommen Genüge getan hatte, dann sollte sich schon die Gelegenheit finden. Jetzt war man noch zu stolz auf den neuen Anzug. Außerdem hatte man ja auch schließlich etwas anderes im Kopf, wichtigere Ereignisse standen auf der Tagesordnung. Und so flog denn der ganze Drosselmännerverein wieder auseinander, die einen zur Brautschau, die anderen, um nach dieser Anstrengung an einem fetten Bissen sich zu laben. Jeder hatte jetzt genug mit sich selbst zu tun.

Tage, Wochen vergingen. Alles blühte und grünte und trieb Knospen. In den Gärten herrschte regste Tätigkeit. Jeder Vogel hatte sein ihm zusagendes Liebchen gefunden. All die vielen Drosselfrauen und Drosselfräuleins waren an den Mann gekommen. War das ein Leben und Treiben, ein Kosen und Zwitschern. Die Männchen saßen in den höchsten Spitzen der Birnbäume und oben auf dem Dachfirst und ließen von da ihre sehnsüchtigen liebestollen Lieder steigen. Und unten in der Hecke saßen die Damen, frisch und wohlgenährt von der langen Sommerfrische im Süden, und hörten die Minnesänge. Oder aber sie saßen zwischen den frischen Erdbeersprößlingen und ließen ab und zu ein sanftes Piepen für ihr Männchen hören. Die ganze Vogelwelt war verliebt. Dort, im Efeu, das den alten Apfelbaum fast ganz umsponnen hatte, nistete schon ein ganz eifriger Amseljüngling mit seiner hübschen braunen Ehehälfte, neben brütenden Meisenpärchen und Kleibern. Und da in den Nußsträuchern saß schon auf zwei grünen Eierchen, die so schön schwarz und braun gesprenkelt waren, eine andere Jungfrau der Drosselfamilie. In den folgenden drei Tagen, an jedem Morgen, konnte sie ihrem Männchen, das sich vor lauter Freude und Übermut nicht zu lassen wußte, ein neues frischgelegtes Ei zeigen, so daß die beiden die besten Hoffnungen für die Zukunft hegen durften. Und so waren in ähnlicher Weise alle Vögel beschäftigt. Hier fütterten einige, welche die Zeit gar nicht abwarten konnten, schon ihre Jungen, hier saß eine bedächtige Amselfrau noch auf den fünf oder sechs Eiern und brütete mit Geduld und Liebe, und das Männchen saß daneben und wartete der Dinge, die da kommen sollten. Und da waren ein paar ganz Vorsichtige, die an die langen und kalten Nachtfröste gedacht hatten, noch am Nestbauen. Alles war beschäftigt. Nur der fremde weiße Amselhahn nicht. Der hatte sich kein Liebchen ausgesucht und erkämpft, der wartete nicht auf den lebenden Inhalt der Eier seiner Gattin oder fütterte eine zahlreiche Jungenschar. Er kannte keine Liebe. Nie hatte er die Sehnsucht im Frühjahr gespürt, nie hatte aus dem höchsten Gipfel sein Liebeslied geklungen. So fremd wie ihm die anderen Vögel, selbst seine Artgenossen, waren, so fremd war ihm die Liebe. Nur Gleichgültigkeit oder Zorn konnte er spüren. In seiner frühesten Jugend war er gebissen, gejagt und vertrieben worden und jetzt, jetzt ging man ihm aus dem Wege, betrachtete ihn wütend oder eifersüchtig. Eine große Erbitterung gegen die ganze Vogelwelt hatte ihn ergriffen. Was konnte er denn dafür, daß er nicht wie all die anderen schwarz, sondern gescheckt war. Einsam lebte er, einsam flog er in den Gärten und pickte am Schönsten und Besten. Auch von anderen Lebewesen hatte er viel zu leiden. Katzen und Marder beschlichen ihn, Sperber und Falk stießen nach ihm. Nur durch Zufall hatte er sich eines Nachts, als er sich wohlgeborgen im dunklen Gebüsch meinte, aus den Klauen der Schleiereule retten können. Menschen hatten nach ihm mit Schroten geschossen, seine gelähmte Hinterzehe zeugte davon. Und das alles wegen seiner außergewöhnlichen weißen Färbung. So war der Vogel mit der Zeit dann einsam, überaus vorsichtig und schlau geworden. Auch unter den männlichen Drosseln besaß er nie einen Freund. Während oft im Winter zwei, drei Männchen bis zur Rückkehr der Weibchen gemeinsam lebten, oder sich gar mit einem Meisen- oder Goldhähnchentrupp unter Führung eines Spechtes zusammentaten, er, der weiße Vogel lebte immer einsam. Er kannte nicht den Geselligkeitstrieb und so spürte er ja auch schließlich die Einsamkeit nicht. Nur eine große öde Leere spürte er in seinem Herzchen. Und so verstand er auch nicht das schüchterne und stürmische Liebeswerben der Amselfrauen. Kalt ließ ihn ihr sehnsüchtiges Piepsen. Ruhig pickte und scharrte er dann weiter. Das Fressen schien bei ihm Hauptlebenszweck zu sein. Besonders

Blattvogelköpfe. a) Goldstirnblattvogel, b) Blaubärtiger Blattvogel, c) Malabarblattvogel, d) Grüner Blattvogel.

wenn es sich um Fleisch handelte, dann war der weiße Amselhahn immer einer der ersten und frechsten. Mochten drei oder vier Drosseln mit ein paar Buchfinken und Kohlmeisen im Garten mit dem Absuchen der Raupen beschäftigt sein, wenn die weiße Drossel kam, hielt sich alles in angemessener Entfernung. Zwar fielen in der ersten Zeit von ein paar alten, griesgrämigen und neidischen Männern grobe Schimpfwörter, wie „Hergelaufenes, gelbschnäbliges Pack usw.", aber das verging den Krakehlern bald. In ihrer Wut fiel es ihnen nie ein, daß sie ja auch schließlich den Vorrang hatten, Gelbschnäbel zu sein, sie suchten eben an allem etwas auszusetzen. Und da nun so der Fremdling überall Zutritt hatte, gedieh er ganz vortrefflich. Auch vor alten windschiefen Strohpuppen, aufgehängten Glas- und Porzellanscherben, oder vor hin- und herwehenden Leinenläppchen hatte er keine Angst. Ja, er trieb es sogar soweit in seiner Frechheit mit der Zeit, daß er sich jeden Morgen bei Sonnenaufgang und ebenfalls des Abends auf einer Vogelscheuche, und wohlberechnet auf dem alten verregneten Zylinder des Strohpuppenmanns, löste. Die anderen schwarzen und braunen Drosseln waren sprachlos. Die Männchen sprachen von maßloser Überhabenheit und Schädigung des guten Ansehens der Amselsippe, die Weibchen, und besonders die jüngeren, fanden es heldenhaft und sehr interessant. An all diesem Gerede störte sich der Amselhahn nicht. Leidenschaftslos lebte er in den Tag hinein. Da er sich nie mit den anderen Vögeln einließ, war er auch nicht auf ihren Klatsch und Tratsch begierig. Was ging es ihn auch an, daß bei Markwarts, den Eichelhähern, zwei faule Eier im Nest lagen, oder daß das Sumpfmeisenweibchen, das da drüben in den Weiden brütete, in diesem Frühjahr schon das dritte Männchen hatte, da das erste erschossen und das andere die Katze holte? So wichtige Angelegenheiten, die doch eigentlich jedes Vogelgemüt erregen mußten, ließen ihn völlig kalt. Wenn er nur wußte, wo es die fettesten Raupen, die dicksten Schmetterlingspuppen oder die zartesten Salatblättchen gab, das genügte ihm. Da flog er dann hin und zerwühlte mit seinem Kratzen und Scharren die schönsten Beete und Anlagen. Mitleidslos wühlte er mit seinem scharfen spitzen Schnabel die eben eingesetzten Pflänzchen aus dem Erdboden.

So pickte er auch heute wieder mal in der neu angelegten Erdbeerpflanzung herum. Die zarten hellgrünen Sprossen schienen ihm ganz vortrefflich zu munden. Wählerisch zupfte er mal hier und pickte mal da. Der Magen war ja auch schon so voll. Früh am Morgen hatte er die Salatbeete geplündert, war zum nahen Tümpel geflogen und hatte ein Spritzbad genommen, von da zum Gartenhaus gehüpft, hatte ein paar Fliegen und einen überwinterten Zitronenfalter, von dem er, leckerhaft wie er war, nur den Hinterleib verspeiste, und saß jetzt nach mannigfachen Irrfahrten in den Erdbeerbeeten. Da fällt ihm ein, man könnte erst mal seine Federn ordnen. Flugs geht's zum Strohmann oben auf die rechte Schulter. Weltvergessen sitzt er da und zupft an seinem weißen Frack. Plötzlich fährt er auf. Schallt da nicht Drosselwut- und angstschreie? Ein, zwei Drosseln fliegen an ihm vorüber zu der Stelle, woher der Tumult kommt. Da fliegt auch er mit. Im Geäst der alten Kastanie, dort, wo vor fast drei Wochen ein Amselpärchen seinen Wigwam aufschlug, sitzt ein weißbunter Kater. Ganz platt hat sich der Räuber an den Stamm gedrückt, nur durch einen Spalt blinzeln seine Augen nach den schreienden Drosseln. Furchtbar unangenehm waren ihm die lärmenden Vögel. Schnurrend und mit Liebesgedanken im Kopf war der Kater durch die Gärten geschlichen, da sah er blitzschnell einen dunklen Schatten in die Kastanie huschen. Und oben in der Gabelung, im molligen Nest rissen vier putzige Federbällchen ihren ungeheuren Schnabel auf. Piepsend, flügelschlagend. Das war für das Raubtier das Richtige. Langsam, ganz langsam schlich der Räuber zum Baum und dann — ein Sprung, und er lag auf dem untersten Aste. Platt drückt er sich eine Zeitlang an den Stamm. Der Atem geht langsam, mühsam unterdrückt. Nur in der äußersten Schwanzspitze ist ein ganz klein wenig Leben. Nahrung, Fleisch in Hülle und Fülle gab es da vor ihm. Von diesen Vögeln mußte er unbedingt welche haben; alle die Schliche, welche ihn die Mutter gelehrt, mußte man versuchen, und wenn es Stunden, wenn es den ganzen Tag dauern sollte. Man mußte sich sicher anschleichen, ehe der alte Vogel unruhig wurde und davonflog. Von Ast zu Ast schlich der Kater, hinter jedem Blatt Deckung nehmend. Der Geruch von Leben, Fleisch und Blut stieg ihm mächtig in die Nase; seine Glieder bebten und die Seher glühten. Langsam spannte sich der Rücken zum Sprung — ein weißbuntes Etwas schnellte sich vor und dann —, dann hielt das Raubtier die Drosselmutter, welche soeben wieder mit einem Räupchen im Schnabel heranflog, in den scharfen blutigen Tatzen. Wohllüstig vergräbt er die Zähne in das warme zuckende Fleisch. Und soeben wollte er sich auch über die vier Jungen hermachen, da erblickte ihn das Männchen. Wild stieß der Arme nach dem Katzentier, das mit den Pfoten nach ihm schlug. Mit seinem lauten Wut- und Angstgeschrei rief das Männchen die ganze Nachbarschaft zur Hilfe. Und alle, alle kamen sie! „Egitt, egitt, egitt", ruft eine alte behäbige Drosseldame, der schon etwas Ähnliches vor zwei Jahren geschehen war. Die ganzen Vögel flattern aufgeregt, heftig mit den Fittichen schlagend, um den Baum. Mit weit aufgerissenem Schnabel und vor Wut gesträubten Schopffedern hackten sie nach dem Kater. Und der sitzt lauernd, tückisch, nur auf den Augenblick wartend, in dem er aus den zu unvorsichtigen Vögeln einen haschen kann. Rotkehlchen und Grünfinken, Ammern und Drosseln, alles schwirrt durcheinander. Auch der weiße Amselhahn stößt in blinder Wut auf den Feind, auf den, der seit ewiger Zeit Erbfeind aller gefiederten Sänger ist. Der Haß hebt alle Größen- und Rangunterschiede auf. Da zetert der Zaunkönig ebenso erregt wie der Buchfink. Ist es doch gemeinsame Angelegenheit. Heute reißt die Katze die Drosseln und morgen wird sie vielleicht schon das Glück anderer vernichten. Ärgerlich wegen des Lärmes, der doch nur alle Vögel auf sie lockt, will der Räuber für sich noch retten was zu retten ist und packt mit beiden Pfoten in das volle Nest. Nur noch wütender werden die Tiere.

(Schluß folgt.)

Neueinführungen und Seltenheiten.

Von Karl Neunzig.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Unter den Neueinführungen Fockelmanns finden wir eine sehr hübsche kleine Ralle, die

Kajenneralle — Rufirallus cajennensis *(Gm.)*,

welche unsern kleinen Sumpfhühnchen, der Gattung Ortygometra, nahesteht. Ihre Heimat ist Kolumbien, Guiana, Brasilien. In der Literatur wird außerordentlich wenig darüber berichtet. Nach Pelzeln, „Ornithologie Brasiliens", wurde sie einmal auf einer dicken Staude gesehen. Burmeister berichtet, daß sie im Walde an Bächen, im Schilf lebe und sich schon wegen ihrer Kleinheit leicht den Nachstellungen entziehe und, wir dürfen wohl hinzufügen, auch der Beobachtung. Vermutlich spielt sich das Leben der Kajenneralle nicht anders ab als das unserer kleinen

Kajenneralle.

Sumpfhühner. Noch immer sind es recht wenig Liebhaber, welche der Gattung der kleinen Sumpf- und Stelzvögel Interesse entgegenbringen. Und doch sind es so anziehende Geschöpfe, daß jeder Tierliebhaber, dem es möglich ist einen großen Käfig aufzustellen, der über eine Vogelstube oder einen Außenflugraum verfügt, einige dieser reizenden Geschöpfe halten sollte. Eingewöhnung und Erhaltung macht keinerlei Schwierigkeiten. Schnell gewöhnen sie sich an den Pfleger und zeigen eine gewisse Anhänglichkeit. Auf die peinlichste Reinhaltung der Käfige, in welchen Sumpfvögel gehalten werden, ist das Hauptgewicht zu legen und auf die Beschaffenheit des Bodenbelages, der am besten aus angefeuchtetem groben Torfmull, feinem und gröberem Kies, Rasenstücken u. dgl. bestehen muß, um die weichhäutigen Füße gesund zu erhalten. Beim Erwerb dieser Vögel ist besonders darauf zu achten, daß die Füße keinerlei Schäden oder Verletzungen zeigen. Empfindlich ist auch bei ihnen die Schnabelwurzel. Für ihre Beherbergung ist darauf Rücksicht zu nehmen. Die Sumpf- und Stelzvögel haben die Gewohnheit am Käfiggitter entlangzulaufen und mit dem Schnabel durch das Käfiggitter zu stoßen, wobei häufig Verletzungen der reichhäutigen Schnabelwurzel herbeigeführt werden. Um das zu verhindern, benutzt man Käfige, deren Gitterwerk aus nicht zu dünnen, weichen Holzstäben besteht, oder man bringt vor dem Käfiggitter Glasscheiben an, die so hoch sind, wie der Vogel reichen kann. Geeignet zu ihrer Unterbringung sind auch nach Art von Terrarien gebaute und eingerichtete Käfige, die man völlig naturgemäß mit Wasserbecken, Schilf usw. ausstatten kann. Gut ist es, wenn den im Käfig gehaltenen täglich ein Ausflug gewährt werden kann, wobei man aber bei den Rallen große Vorsicht walten lassen muß, da sie die Neigung haben, sich zu verbergen. Ist ihnen das gelungen, so hält es schwer, sie wieder aufzufinden. Ihre Ernährung erfolgt mit Drossel-, für die kleineren Arten, also auch im vorliegenden Fall mit Nachtigallenfutter mit allerlei Beigaben.

Gefiederbeschreibung: Oberkopf, Kinn, Kehle, ganze Unterseite rostrot; Hinterkopf, Oberhals, Rücken olivenbraun, mehr oder weniger grünlich überflogen; Flügel, Schwanz reiner braun, außen rostfarben überlaufen; Augengegend, Zügel rötlichgrau; Schnabel horngrau; Grund des Unterschnabels blaugrau; Augen rot; Füße hell fleischfarben; Lg. 157, Fl. 86, Schw. 27, Lf. 38 mm.

In den Besitz des Herrn Pracht gelangte der sehr seltene

Lasurblaue Bischof — Cyanocompsa parellina *(Bp.)*

aus dem östlichen Mexiko, der erst einmal nach Europa gebracht ist, und zwar im Jahre 1895. Er ist der kleinste aus der Familie Blaugimpelfink — Cyanocompsa und wohl auch der zierlichste. Er hat ungefähr die Größe eines Zeisigs, macht aber doch infolge seines kräftigen Körpers einen größeren Eindruck. Über sein Freileben finde ich keine Angaben. Es ist aber anzunehmen, daß es sich wenig von dem der verwandten Arten unterscheidet. Er ist wie der dunkelblaue Bischof ein gewandter, beweglicher und anmutiger Vogel, der im Käfig im allgemeinen harmlos und verträglich ist, wenn er sich auch zuweilen gegen die Mitbewohner des Käfigs mutwillig zeigt.

Gefiederbeschreibung: ♂ dunkelindigoblau, an Bürzel, Oberschwanzdecken, Stirn, Wangen und kleinen Flügeldecken glänzend kobaltblau; Zügel schwarz; übrige Flügel- und Schwanzfedern schwarz mit bläulichen Säumen; Schnabel schwärzlich hornbraun, ebenso die Füße; Auge braun; Lg. 118—132 mm.

Als Seltenheit auf dem Vogelmarkt sind auch die zurzeit von der Firma Schöndube-Berlin in den Handel gebrachten

afrikanischen Halsbandsittiche — Palaeornis cubicularis *(Hasselqu.)*

zu erwähnen. Sie sind dem indischen Halsbandsittich oder kleinen Alexandersittich ähnlich, unterscheiden sich aber durch das mehr gelblichgrüne Gefieder und die Größe und Farbe des Schnabels, der nicht ganz rot ist wie bei der indischen Form. Der Unterschnabel und häufig auch die Spitze des Oberschnabels sind schwarz. Er ist der einzige langschwänzige Papagei des afrikanischen Kontinents. Er lebt in Oberguinea ostwärts bis zum weißen Nil, kommt aber auch um Kapstadt vor, wo er verwildert ist. Zu seinem Aufenthalt wählt er die bewaldete Steppe und hohe Bäume an Flußufern, wo er lärmend in kleinen Flügen, zuweilen aber auch in großen Scharen von Hunderten umherfliegt. Die Männchen lassen hohe Pfeiftöne hören. Großen Schaden richten sie in den Maisfeldern der Eingeborenen an. Mais sowie Baumfrüchte, wie Feigen, Tamarisken, Datteln, bilden ihre Nahrung. Im allgemeinen stehen Halsbandsittiche bei den Liebhabern in dem Ruf, nicht gerade angenehme Hausgenossen zu sein. Ihr unleidliches Geschrei, ihre Kunstfertigkeit und ihr Eifer im Zerstören von Holz und ihre Bösartigkeit gegen sämtliche Genossen, besonders aber gegen kleine Vögel, macht sie dem Liebhaber unleidlich. Dieses Urteil über Halsbandsittiche, das man oft hört, ist aber doch nicht gerecht. Es kann nur auf altgefangene Vögel angewendet werden und könnte mit derselben Berechtigung von vielen anderen Papageien gelten, wenn sie als alte Wildfänge in unsere Hand kommen, während sie als junge Vögel nach Europa gebracht, durchaus angenehme Zimmergenossen sind. Ich erinnere mich, daß auf den früheren Berliner Vogelausstellungen Christiane Hagenbeck mehrfach junge Halsbandsittiche ausstellte von einer Zahmheit, die höchstens noch durch die anscheinend angeborene Zahmheit der kleinen Schmalschnabelsittiche übertroffen werden konnte, und mein verstorbener Freund Karl Kullmann, der in der Zeit eines längeren Aufenthalts in Südfrankreich, wenn ich nicht irre in Marseille, die afrikanischen, vom Senegal eingeführten Halsbandsittiche als sehr angenehme Stubengenossen kannte, war auch noch in seinen letzten Lebensjahren im Besitz eines außerordentlich zahmen afrikanischen Halsbandsittichs, der einige Worte sprach und frei auf einem aus Holz gefertigten Papageienständer saß, wie es für diese Vögel in Frankreich üblich ist.

Goldaugentimalie.

Ich möchte es nicht unterlassen, auf die neuerdings mehrfach angebotene

Goldaugentimalie — Pyctorhis sinensis *(Gm.)*

hinzuweisen. Es handelt sich nicht um eine Neueinführung, wohl aber um Vögel, die selten auf den Vogelmarkt gelangen und des Interesses der Vogelfreunde wert sind. In seinem oberseits rotbraunen, unterseits rahmweißen Kleid erinnert der langschwänzige Vogel auf den ersten Blick an unsere Bartmeisen. Seinen Namen trägt er nach der Färbung der Augen, deren Iris braun, nach außen gelb ist; der Augenring ist leuchtend orangerot. Die

Pfleger dieses Vogels bezeichnen ihn als einen für größere Käfige und Flugräume ausgezeichneten Vogel, der stets in Bewegung, meisenartig in den Zweigen umherklettere und dabei seinen leisen, melodisch zwitschernden Gesang hören lasse, untermischt mit schönen klaren Rufen. Alle Bewegungen seien zierlich und anmutig. Er sei durchaus friedlich. Eigenartig ist die Aufnahme der Nahrung. Der ergriffene Bissen wird mit den Zehen des einen vorgestreckten Fußes festgehalten, dessen oberer Teil auf der Sitzstange ruht, mit dem anderen Fuß hält sich der Vogel auf der Stange fest. Die Nahrung besteht aus einem guten Insektenfresserfutter und süßem Obst. (Fortsetzung folgt.)

Purpurtangare (nat. Gr.).

Bekämpfung des Ungeziefers.

Von Apotheker Stöcker, Hamburg.

(Nachdruck verboten.)

Meinem Artikel über Insektenpulver (Jahrg. 1916 d. Ges. W. S. 149) möchte ich einige Ergänzungen zufügen. Beim Durchblättern der einschlägigen Literatur sind mir einige für uns Liebhaber interessante Studien speziell über die wirksamen Bestandteile, dann aber auch über die Anwendung des Insektenpulvers in die Hände gefallen, die ich den Liebhabern kurz mitteilen möchte.

Bekanntlich ist Insektenpulver das souveräne Mittel, welches wir den tierischen Parasiten unserer Pfleglinge gegenüber besitzen. Seine Anwendung beruht darauf, daß dem Pulver eine ausgesprochene insektentötende Wirkung zukommt, während höhere Tiere, d. h. Warmblüter, kaum davon beeinflußt werden. Auf alle Kaltblüter scheint das Pulver mehr oder weniger heftig zu wirken. Alle anderen Mittel, so vor allem die starkriechenden, wie Karbol, Petroleum usw., können nur in beschränktem Maße angewendet werden, von direkten Giften, wie Sublimat, Arsen usw., ganz zu schweigen.

Schwefelkohlenstoff, den Herr Kracht ausprobieren möchte, ist wohl an und für sich ein Radikalmittel gegen Ungeziefer. Die Insektensammler und Botaniker machen häufiger Gebrauch davon, um in ihre Sammlungen eingedrungene tierische Schädlinge zu vernichten. Leider verbietet die enorme Giftigkeit und der penetrante Geruch der Schwefelkohlenstoffdämpfe die ausgiebige Verwendung, auch würde die Anwendung einer dichtschließenden Giftkiste, in die man die Bauer einstellt, nicht zu umgehen sein. Für größere Bauer und Volieren käme der Schwefelkohlenstoff schon gar nicht in Frage. In einem der früheren Jahrgänge der Ges. W. fand ich einmal gepulvertes Wermutkraut (Artemisia absynthium) als Einstäubungsmittel für die Nester gegen Milbeneinfall angegeben. Ich selbst habe dieses Mittel nicht versucht und bezweifele, daß die Wirkung der des Insektenpulvers gleichkommt. Der wirksame Bestandteil im Wermut könnte nur der darin enthaltene Bitterstoff (Absynthiin) sein, der für Insekten vielleicht giftige Eigenschaften besitzt. In der Literatur habe ich nichts darüber finden können. Der Bitterstoff einer anderen Droge wird indessen viel als Fliegenmittel angewandt, und zwar ist es das Quassiin des Quassia- oder Fliegenholzes. Eine Abkochung dieses Holzes übt eine tödliche Wirkung auf Fliegen aus. Auf Milben usw. wird die Wirkung eine gleiche sein, und es wäre wünschenswert, wenn der eine oder andere Liebhaber mal hierüber Versuche anstellen würde. Vielleicht würden beide erwähnten Drogen in Form einer weingeistigen Tinktur (1 Teil Substanz, 5 Teile verdünnten Spiritus) dazu dienen können, durch Ausstreichen der Käfigritzen usw. die Milben fernzuhalten. Ich fürchte nur, daß der intensiv bittere Geschmack beider Drogen deren Anwendung beschränken wird. Zum Imprägnieren des Nistmateriales dürften sie wohl nicht in Frage kommen, obwohl eine giftige Wirkung auf den Vogel kaum zu befürchten wäre.

So sicher und angenehm die Verwendung des Insektenpulvers ist, hat sie den Nachteil, daß selbst das beste Pulver nach dem Herausnehmen aus dem gut verschlossenen Aufbewahrungsgefäß (Glasstöpselflasche!) nach kurzer Zeit an Wirksamkeit verliert. Die Prozedur des Einstäubens muß daher häufiger stattfinden. Hierzu folgende Notiz: In Portugal und Südamerika wird das Insektenpulver vorzugsweise zum Schutze der Nahrungsmittel gegen Ameisen verwendet, indem man die zu schützenden Gegenstände mit einem kleinen Wall von Insektenpulver umgibt. Dieser Schutz hält 3 Tage vor, am 4. Tage ist die Wirksamkeit auch des besten Pulvers gewöhnlich nicht mehr stark genug, um die Ameisen an der Übersteigung des Walles zu hindern (Pharm. Centralhalle 1912). (Schluß folgt.)

Aufruf!

An alle Liebhaber unserer heimischen Vogelwelt, an alle Freunde unserer Liebhaberei, des Vogel- und Naturschutzes, die im deutschen Sprachgebiete wohnen, ergeht die Mitteilung, daß am 27. April 1924 in Berlin die Gründung des

Reichsverbandes der deutschen Vogelliebhaber

stattgefunden hat.

Was der Reichsverband bezweckt, sagen die in vorliegender Nummer zum Abdruck gebrachten Satzungen. Er will, kurz erklärt, den Schutz unserer heimischen Vogelwelt, den Schutz der Liebhaberei gegen ungerechte Anfeindungen und den Schutz der Natur überhaupt, von sich aus oder in Verbindung mit anderen bestehenden Organisationen.

Um diesen Zweck und ein Ziel zu erreichen, bedarf es der Unterstützung aller der vielen tausenden und abertausenden Menschen, denen die Natur einen größeren Teil ihres Lebensinhalts bietet und dafür Schutz fordert. Ein zunächst kleines Häuflein idealer Menschen hat sich zu einem Reichsverband zusammengeschlossen und wirbt um die Unterstützung der noch außerhalb stehenden gleichen Gedankens wie die Gründer, denn der Reichsverband soll sich zu einer Macht entwickeln, die stark genug ist, die Anfeindungen ohne Ende abzuwehren und weiter darüber hinaus der Liebhaberei das wieder zu erkämpfen, was ihr mancherorts unter ganz unbegründeten Voraussetzungen genommen worden ist. Aber nicht allein dazu soll die Macht benutzt werden. Denke ein jeder daran, was heute noch nicht ist, kann morgen Tatsache geworden sein! Und was dann? Dann ist es zu spät! Ein jeder suche also zu erhalten und zu erwerben, was ihm nicht ohne Schaden genommen werden kann, denn jeder Liebhaber hängt, wie es nicht anders ist, an seinem Stück Natur, sei es in seinem Heim, sei es außerhalb dessen. Der Liebhaber kann das nur erreichen durch seinen An- und Zusammenschluß im

Reichsverband der deutschen Vogelliebhaber Sitz Leipzig.

Der Gesamtvorstand.

J. A.: Joh. Birk, Leipzig-Mockau, Beuthstr. 29.

Kleine Mitteilungen.

Die Vogelfreistätte Mellum in der Nordsee, eine kleine im Watt zwischen Jadebusen und Wesermündung liegende Insel, ist seit Jahren der Hauptbrutplatz von Fluß- und Brandseeschwalben (Tausende!); auch Silbermöven, Rotschenkel, Austernfischer, Regenpfeifer und die niedlichen Zwergseeschwalben sind hier heimisch, ja sogar die Brandente hat schon hier gebrütet. Viele Vögel berühren das Eiland auch auf dem Zuge, z. B. Raubvögel, Eulen, Taucher, Strandläufer. Der „Heimat-, Natur- und Vogelschutzverein der Jadestädte", der Mellum verwaltet, ist es heuer gelungen, für dieses Naturschutzgebiet in dem hessischen Ornithologen W. Sunkel einen Vogelschützer zu gewinnen, der zugleich Vogelwart ist. Ornithologen und Naturfreunde, die das Leben der Meeresvögel kennen lernen wollen, können nach Vereinbarung mit Herrn W. Sunkel (Adresse Wilhelmshaven, Schleusenerstr. 4) einige Zeit auf Mellum als Gäste weilen; auch ist von der „Deutschen Ornithologischen Gesellschaft" gelegentlich ihrer Hauptversammlung in Bremen für den 15. Juni ein Ausflug nach Mellum vorgesehen.

Vom Vogelmarkt.

Josef Beck, Zoologische Handlung, Stuttgart: Orangeweber, Edelsänger, Mozambikzeisige, blaue Reisfinken, Häher, Alpensteinhühner.

Friedrich Frank, München, Gabelsbergerstraße 9: Schamadrosseln, Rote Kardinäle, Purpurtangaren, Dominikanerkardinäle, Goldstirnblattvögel, Mexikan. Karmingimpel, Alexandersittiche, Braunwangensittiche, gelbe Wellensittiche, Kaptäubchen, Pikuitäubchen, Safranfinken.

M. Kleinert, Tierhandlung, Berlin NO 18, Strausberger Str. 13: Blauer Arara, roter Arara, Sperlingspapageien, Zwergara, Schamadrosseln, Dajaldrosseln, Purpurtangaren, rote Kardinäle, Safranfinken, Weißstirnpfäffchen, Weißkehlpfäffchen, Textorweber.

Wilh. Pfilterer, Ludwigsburg, Karlstraße 40 (Württemberg): Amerik. Spottdrossel.

O. Reupert, Breslau X, Kospothstraße 21: Schamadrosseln.

J. Schneider, Breslau, Klosterstr. 87: Weibchen grüne Wellensittiche, Feuerweber, Mossambikzeisige, Edelsänger, dottergelbe Weber, Textorweber, Schwarzkopfnonne.

A. Schwarz, Weißenfels a. S., Klingenplatz 8: Mönchsittiche, Edelsänger.

P. Tzornack, Berlin NO 55, Prenzlauer Allee 189: Grassittiche, graue Reisfinken, Zwergara, Purpurtangaren, Amerikan. Wanderdrosseln, Trauertangaren, Tyrannen, Safranfinken, Papstfinken, Indigofinken, Mozambikzeisige, Edelsänger, junge Safranfinken.



Herrn G. M., Mainz. Es gibt keine weiteren Mittel, um die Befiederung der kahlen Stellen herbeizuführen. Bei der Mauser wird sich die normale Befiederung einstellen. Es handelt sich nicht um irgendeine Krankheit. Milben können nur durch Vögel in die Vogelstube gebracht werden. Die Bekämpfung der Milben auf dem Vogelkörper geschieht durch das Seifenwasserbad; in der Vogelstube selbst durch Desinfizierung, neuen Anstrich der Wände, Erneuerung der Zubehörteile, evtl. gründliche Reinigung derselben und Übergießen derselben mit kochendem Wasser.

Herrn R. H., Neugersdorf. Der Gefiederbeschreibung nach könnte der Vogel ein ♀ Schamadrossel sein. Es ist aber nicht ausgeschlossen, daß es sich um ein junges ♂ handelt, zumal der Vogel vom ersten Tage an sang, wenn auch nicht so anhaltend und so gut wie das ♂. Aus der Tatsache, daß der Vogel kleiner ist als das ♂, kann nichts geschlossen werden, denn die Größe der Schamas schwankt (230—265 mm), wobei es vorkommen kann, daß kleinere Vögel langschwänziger sind als große, also eine recht geringe Körpergröße haben im Verhältnis zur Gesamtlänge. Die Länge des Schwanzes schwankt zwischen 120—165 mm. Es kommen aber auch Schamadrosseln vor, deren Schwanz 223 mm lang ist. Das heftige anhaltende Verfolgen des ♀ durch das ♂ vor der Paarung ist die Art der Schamadrosseln. Um dem ♀ Schutz vor den Verfolgungen zu bieten, bringt man in dem Züchtungsraum einen kleinen Nadelholzbaum, Ginstergebüsch, Zweigdickicht unter, dahinter wird auch Futter und Wasser gestellt. Bei gar zu heftiger Verfolgung wird das ♂ aus dem Zuchtraum entfernt und daneben in kleinerem Käfig untergebracht. Nur zeitweise wird es in den Zuchtraum zum ♀ gesetzt.

(Fortsetzung auf der 3. Umschlagseite.)

Aus den Vereinen.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei zu Hamburg. Sitzungen finden statt jeden 1. und 3. Dienstag im Monat in Hüttmanns Hotel, Poolstr. 22, abends 8¼ Uhr. Nächste Sitzung Dienstag, den 6. Juni 1924.

J. A.: Arnold Weber, 1. Vorsitzender.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig. Vereinssitzungen jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat im Vereinslokal, „Bauers Brauereirestaurant", Täubchenweg. Nächste Sitzung am 5. und 19. Juni 1924. Gäste stets willkommen.

J. A.: Johann Birk, 1. Vorsitzender.

Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber.

Bericht über die Reichsverbandsgründung.

Wie aus den erschienenen Fachzeitschriften, die „Gefiederte Welt" und „Vogelwelt", ersichtlich war, trugen sich seit zwei Jahren der Preußische und Sächsische Landesverband der Vogelliebhaber mit dem Gedanken der Gründung eines Reichsverbandes. Die Ungunst der Zeitverhältnisse ließ die Verwirklichung dieses Gedankens nicht eher zu, als bis sich unsere allgemeinen wirtschaftlichen Verhältnisse etwas gebessert hatten. Unermüdlich an dem Ziele festhaltend, ist in aller Stille gearbeitet und geschaffen worden, was zu schaffen und zu arbeiten möglich war, bis es uns nunmehr gelungen ist, den Reichsverband ins Leben zu rufen.

Am Sonntag, den 27. April dieses Jahres, fand in Berlin die Gründungsversammlung statt. Vertreten waren:

a) der Landesverband Preußen mit den folgenden, ihm angeschlossenen Verbänden, Vereinen und Einzelpersonen: 1. Vereinigung der Liebhaber einheimischer Vögel zu Berlin, 2. „Aegintha", Verein der Vogelfreunde, Berlin, 3. Verband der Vogelhändler und verwandte Berufsgenossen Deutschlands, Berlin, 4. Vereinigung der Vogelliebhaber von Dortmund und Umgebung, 5. Vereinigung der Waldvogelliebhaber von Görlitz und Umgebung, 6. Vereinigung Hannoverscher Vogelliebhaber in Hannover, 7. Verein der Liebhaber von Zier- und Singvögeln nebst Zweigverein für Aquarien- und Terrarienkunde in Herne i. W., 8. Verein der Liebhaber für Zier- und Singvögel in Hörde i. W., 9. Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei in Hörde i. W., 10. Verein der Waldvogelliebhaber Kiels in Kiel, 11. Vereinigung der Vogelliebhaber, Sitz Liegnitz in Liegnitz, 12. Verein der Vogelliebhaber in Lübeck, 13. „Ornis", Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei in Magdeburg, 14. Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Weißwasser und Umgegend, 15. Herr Adolf Albrecht in Stendal, 16. Herr Herm. Bösel in Lübeck, 17. Herr C. Balser in Kreutzwertheim, 18. Herr J. Heino z. Z. in Holland, 19. Herr Albert Müller in Köln-Kalk, 20. Herr Heinrich Menge in Charlottenburg, 21. Herr Heinrich Filor in Wilmersdorf, 22. Herr Paul Kunzke in Döbern N.L., 23. Herr Ewald Lorenz in Stahnsdorf bei Berlin, 24. Herr Fritz Pölz in Hamburg, 25. Herr Wilhelm Peter in Berlin, 26. Herr Zawodzinski in Danzig, 27. Herr Franz Weise in Meppen, 28. Herr Fritz Willigkeit in Berlin, 29. Herr A. Augustinat in Viersen, 30. Herr Karl Reich in Bremen — durch den 1. Vorsitzenden des Landesverbandes Herrn Franz Nyncke, Berlin,

b) der Landesverband Sachsen mit den folgenden ihm angeschlossenen Verbänden, Vereinen und Einzelpersonen: 1. Verband Mitteldeutscher Vogelhändler, Ortsgruppe Leipzig, 2. Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig, 3. Verein für Vogelschutz und -pflege zu Dresden, 4. Verein für Vogelkunde zu Chemnitz i. Sa., 5. Zoologischer Verein zu Zwickau i. Sa., 6. Verein für Vogelkunde, -schutz und -pflege zu Oschatz, 7. Alte Vereinigung der Vogelliebhaber zu Dresden, 8. Verein für Vogelschutz und -pflege Seifhennersdorf, 9. Verein für Vogelschutz und -pflege zu Jena i. Th., 10. Kanarien-, Zier- und Singvögelzüchterverein Wilkau i. Sa., 11. Sing- und Ziervögelzüchter-Verein Kanaria Aue i. E., 12. Vereinigung der einheimischen Stubenvögel in Zschorlau, 13. Vereinigung der Singvögel- und Aquarienfreunde Eibenstock, 14. Herr Hans Hager in Plauen i. V., 15. Herr Forstmeister Hildebrand in Hartmannsdorf bei Zwickau, 16. Herr Erich Richter in Bernstadt i. Sa., 17. Herr Emil Engert in Annaberg i. E., 18. Herr Ewalds Schuster in Reichenbach bei Königsbrück, 19. Herr Paul Buhrig in Reichenbach bei Königsbrück, 20. Herr Alwin Lau in Reichenbach bei Königsbrück, 21. Herr Willi Schöne in Reichenbach bei Königsbrück, 22. Herr Dr. Herwarth Lohse, Studienrat in Wurzen i. Sa., 23. Herr Bruno Zacher, Stuhlmeister in Kamenz i. Sa., 24. Herr W. Ludewig, Dentist in Elsterberg i. Sa., 25. Herr Kurt Geilert in Elsterberg i. Sa., 26. Herr Paul Oehme in Freiberg i. Sa., 27. Herr Alban Härtel, Lehrer in Aue i. E., 28. Herr Paul Schröter in Arnsdorf-Penig i. Sa., 29. Herr Dr. Fischer in Kamenz i. Sa., Frauenklinik — durch den 1. Vorsitzenden des Landesverbandes, Herrn Joh. Birk, Leipzig,

c) der Bayerische Vogelliebhaber-Verein, Sitz München, e. V., durch Herrn Joh. Birk, Leipzig, als Bevollmächtigter und

d) der Verein für Vogelschutz und -liebhaberei in Hamburg durch dessen 1. Vorsitzenden Herrn A. Weber aus Hamburg.

Die Versammlung, die mit einer Begrüßung der Erschienenen durch den 1. Vorsitzenden des Preußischen Landesverbandes, Herrn Nyncke, Berlin, um 11 Uhr vormittags ihren Anfang nahm, zeigte ein äußerst reges Interesse an dem Vorhaben. Eine zwei Stunden währende Aussprache über das Für und Wider, Wo und Warum, zeitigte zwar zunächst kein positives Ergebnis, aber genügend Gelegenheit, die gegenseitigen Ansichten anzuhören und auszutauschen und zu der Überzeugung zu kommen, daß die Liebhaber unbedingt und ohne zu zögern zu einem Reichsverband kommen mußten.

Die Wahl des Versammlungsleiters entfiel einstimmig auf Herrn Birk, Leipzig, der nach einer Begrüßung der Anwesenden und Grußübermittlung der von ihm vertretenen Liebhaber an die Versammlung auf Grund der in der Aussprache festgestellten Einigkeit, daß der Reichsverband unbedingte Notwendigkeit ist, das vom Landesverband schriftlich ausgearbeitete Programm zur Beratung empfahl. Unter Berücksichtigung der eingegangenen Anträge, nach Aussprache über jeden Punkt wurde folgender Satzung einstimmig Geltung verschafft.

I. Namen und Zweck des Reichsverbandes.

Der Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber sucht von sich aus oder in Verbindung mit bereits bestehenden Organisationen seinen Zweck zu erreichen durch:

1. Vertretung der Interessen der Vogelliebhaber bei den gesetzgebenden Körperschaften und Behörden,
2. Stellungnahme zu jeglichen Angriffen von Seiten der Gegner der Vogelliebhaber,
3. Eintreten für den Natur- und Vogelschutzgedanken durch Ausübung eines praktischen Natur- und Vogelschutzes,
4. Förderung der Vogelkunde und der Liebhaberei,
5. Bekämpfung unlauterer Machenschaften im Vogelhandel im Verein mit dem Verbande der Vogelhändler Deutschlands.

II. Organisation.

Der Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber ist die Organisation, in der sich

a) die Liebhaber durch ihre Mitgliedschaft zu einem bestehenden Landesverbande als Vereinsangehörige oder Einzelpersonen und

b) Vereine und Einzelpersonen in Ländern ohne Landesverband zur Erreichung des Zweckes unter I

zusammengeschlossen haben.

Der Reichsverband soll ins Vereinsregister eingetragen werden.

Das Geschäftsjahr läuft vom 1. April des jeweiligen bis zum 31. März des nächsten Jahres.

Die an den Reichsverband abzuführenden Beiträge werden von der Generalversammlung festgesetzt.

Die Beiträge sind von den Vereinen nach dem Mitgliederbestande des 1. April j. J. und Einzelmitgliedern für das Geschäftsjahr zu entrichten. Die Entrichtung erfolgt durch die Landesverbände. In Ermangelung der letzteren durch die Vereine und Einzelmitglieder selbst.

III.

Mitglieder können werden:

a) Landesverbände,
b) Vereine, deren Zugehörigkeit zu einem Landesverbande mangels eines solchen unmöglich ist,
c) Vereine und Einzelpersonen, die den gleichen Zweck unter I zu erreichen suchen und keinem Landesverband angeschlossen sind oder angeschlossen zu sein wünschen,
d) Personen, die mangels eines Landesverbandes nicht angeschlossen sein können.

Die Mitgliedschaft können Personen des gesamten deutschen Sprachgebietes beiderlei Geschlechts erwerben. Sie müssen ihren Beitritt und ihre Zugehörigkeit durch schriftliche Willensäußerung erklären. (Schluß folgt.)

Anzeigenteil

Die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 20 G.-Pf. berechnet. Aufnahme erfolgt gegen Voreinsendung des Betrages in Reichsgeld p
Brief od. auf unseren Zahlstellen: Postscheckkonto: Magdeburg 3148, Wien 156 687, Bern III 4326, Prag: Creditanstalt d. Deutschen unter Angabe des Zwecke

Futtermittel

Ornis-Haus
Halle-Saale
Gegründet 1912
Spezialität:
Individuelle Weichfresserpflege nach Angaben des Herrn Apotheker Adalbert Jena-Biberach-Riß. (Alleiniges Herstellungsrecht.)
Reform-Normal I, Volierenm.,
Reform-Normal II, f. Rotkehlchen, Schwarzplatten usw.,
Reform-Normal III, f. Nachtigall., Sprosser usw.,
Reform-Normal IV, f. Gelbspött., Goldhähnchen usw.,
Reform-Normal V, f. Schama usw.,
Körnerfutter Ia für jede Vogelart. [389
Inhaber langjähriger Fachmann, siehe „Ornis-Buch" (90 S.) Mk. 1
Preisliste auf Wunsch!

Vogelfutter [390
für Kanarien, Waldvögel, Exoten, Papageien, Weichfresser. Anfragen nur gegen Rückporto. Liste 13 über Vogelfutter, Liste 5 über Vogelkäfige, Zuchtgeräte usw. mit etwa 400 Abbild.
W. Göpel, Leipzig,
Tröndlinring 1. Telephon 14 958.

Holunderbeeren,
rote, luftgetrocknet, Naturfutter für Schwarzplättchen, kleinen Vorrat gibt ab 1,20 ℳ das Pfund [391
Johann Fischer
in Waldsassen,
Mitterteicher Straße 54.

Vögel

Sittiche, Araras, Kakadus, Amazonen, Edelpapageien, Zwergpapageien, Kragenpapageien, Loris, kleine Affen für eigene Sammlung zu kaufen gesucht. Angebote mit genauer Beschreibung und Preis an
Fliegner, Lehrte-Hannover. [392

4,4 Wellensittiche
bewährte Zuchtpaare, abzugeben.
Paar 16,— Mark.
Heinrich Hahn jun., Neuß,
393] Krefelder Str. 60.

Verkaufe:
1,0 Kubafink . . . . . 30 ℳ
1,0 Stieglitz-Kanarien-Bastard 15 ℳ
Nehme evtl. jap. Möwchen oder ähnl. in Tausch. [394
Horst Diesterweg, Magdeburg,
Kaiser-Otto-Ring 3.

Verkaufe: 1,1 Zebrafinken, 1,1 Möwchen,
gute Zuchtvögel, gegen Gebot. [395
A. Steinhagen, Lübeck,
Langer Lohberg 37.

Gebe ab:
1 Paar ausgefärbte Papstfinken 40.— Goldmark, **1 Paar blauflüglige Sperlingspapageien** 22.— Goldmark. Die Tiere sind Ia im Gefieder und eingewöhnt. [396
Verpackung und Porto 3.50 ℳ.
R. Huth, Perleberg.

Habe noch immer Bedarf an Insektenfressern, alten und jungen, laut meinem Inserat in „Gefiederte Welt" Nr. 4 vom 21. Februar 1924; wie **Schamadrossel,** Sprosser, Alpenbraunelle, Grasmücken und Lerchen usw. Kann tauschen: Schwarzkopf, Feldlerche und eine junge Singdrossel 23 er, alle seit Dezember gut im Gesang. Suche ferner zu kaufen alle Futterartikel sowie frische Ameiseneier und etwa 30 Pfund Mehlwürmer. [397
Peter Matzen, Göttingen.

Senegalsittiche, Rote Kardinäle, Katzendrosseln, Weißwangenlerchen, Weißstirnpfäffchen, Weißkehlpfäffchen, Orangepfäffchen, Jakarinifinken, Rotrückige Würger und andere Vögel.
Preisliste kostenlos. [398
E. Schöndube, Berlin,
Elisabethkirchstraße 1.

Verkaufe:
1 Dufresne's-Amazone,
junge, noch nicht ausgefärbte, 60.— Goldmark.
1 Gelbwang.-Amazone,
ganz zahm, 65.— Goldmark.
Beide Vögel sind prima befiedert. Geg. Nachnahme od. Voreinsendung des Geldes. Garant. leb. Ankunft.
Liefere **Papageien** jeder Art.
Ed. Bircher, Papageihandlg.,
Aarau (Schweiz). [399

Für Freunde der heimischen Vogelwelt.

Die deutsche Vogelwelt nach ihrem Standort. Ein Beitrag zur Zoogeographie Deutschlands und zugleich ein Exkursionsbuch zum Kennenlernen der Vögel. Von Werner Hagen. Mit 74 Abbildungen und 4 Schwarzdrucktafeln. Kart. 3.— M.
Die einheimischen Stubenvögel, ihre Naturgeschichte und Zucht. Von Karl Neunzig (zugleich 6. Auflage des Dr. Karl Rußschen Handbuchs für Vogelliebhaber Band II). Mit 22 Farbentafeln und 188 Textabbildungen. Geh. 14.—, geb. 17.— M.
Die gefiederten Sängerfürsten des europäischen Festlandes, ihre Naturgeschichte, sachgemäße Käfigung, Behandlung und Pflege als Stubenvögel. Von Mathias Rausch. 2. Auflage. Mit 3 Farbendrucktafeln und 16 Textabbildungen. Kart. 3.— M.
Die Hauptregeln der Sprosserpflege. Scherzreime von Oskar M. Kisch. Mit 2 Abbildungen. 1.— M.
Der Dompfaff, seine Naturgeschichte, Pflege, Abrichtung und Zucht. Auf Grund 54jähriger Erfahrung von F. Schlag. 8.—10. Auflage. Mit 2 Schwarzdrucktafeln. Kart. 1.— M.
Die deutschen Sumpf- und Strandvögel. Von Dr. Curt Floericke. Mit 44 Abb. auf 15 Tafeln in Schwarzdruck. Kart. 4.50 M.
Die deutschen Schwimm- und Wasservögel. Von Dr. Curt Floericke. Mit ca. 45 Abb. auf 15 Tafeln in Schwarzdruck. Kart. 4.50 M.

Für Liebhaber fremdländischer Vögel.

Die fremdländischen Stubenvögel, ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht. Von Karl Neunzig. (Zugleich 5. Auflage des Dr. Karl Rußschen Handbuchs für Vogelliebhaber Band I.) Mit 42 Farbentafeln und 400 Textabb. Geh. 30.—, geb. 35.— M.
Die fremdländischen Weichfutterfresser (Insekten- od. Kerbtierfresser, auch Wurmvögel genannt, Frucht- od. Beerenfresser u. Fleischfresser). Mit Anhang: Tauben- und Hühnervögel. Von Dr. Karl Ruß. (Die fremdländischen Stubenvögel Bd. II.) Mit 10 Farbentafeln. Geh. 30.— M.
Neunzigs fremdländische Vogeltypen. Eine Farbentafel in Größe 38×27 cm mit Erläuterungen. Vergriffen!
Gefiederte Hausfreunde II. Von Karl Neunzig. Kurze Unterweisung über die Pflege fremdländischer Stubenvögel. Mit 51 Abbildungen. Kart. 1.— M.

Zu beziehen durch:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlg., Magdeburg
Postschließfach 148.

Bestellungen für Juni sofort der Post übergeben!
Bestellzettel für Deutschland.

Postbestellzettel.
Hiermit bestelle ich für den Monat Juni 1924
1 „Die Gefiederte Welt"
(ebentuell mit Nachlieferung). — Erscheinungsort Burg Bz. Mgdb.

Name: .....

Wohnung: .....

Postquittung: .....Mk. .....Pf. sind heute bezahlt worden.

Ort: ..... den .....
Postannahme

.....

Alfred Troschütz,
Buchhändler und Antiquar
Hannover,
Große Aegidienstr. 4.
Postscheck-Konto: Hannover 200,
Cruse's Buchhandlung.
Von dem letzten Angebot billiger Büch
sind nur noch einige „Otto, die Scham
drossel" für 75 Pfg. zu haben. Hei
biete ich Kunstblätter an, die jeden Vog
freund erfreuen. Die Preise sind se
billig. Dir. Dr. Hugo Weigold: St
vögel. 20 Naturaufnahmen in Kupf
tiefdruck in Postkartenformat. Die Reih
20 Blatt, statt 2.— nur 1,50; 10 Reih
13,50; 20 Reihen 24,— ℳ. Postf
(Nachnahme-Kosten besonders). Nat
urkunden in entzückend schönen A
nahmen. Jeder Vogelfreund helfe
feinen Blätter verbreiten, um so z
Naturschutz beizutragen. 50 einheimis
Vögel in natürlicher Größe. Eine farb
Tafel im Format von 65×95 cm. P
frei 1,80 ℳ (Nachn. bef.). Das Be
was z. B. zu haben ist. Zeichnung
Naturtreue sind vorzüglich. Für Lehr
Schüler, Vogelhandlgn., für Anfän
u. Kenner gleich gut geeignet. [

Zu kaufen gesucht:
Sprechender Graupapag
ev. auch Amazone.
Offerten mit Sprachverzeichnis erbet
M. Diwersy, Merzig (Saa
A. Z.-Mtgl. 183.

Tausche Ia Edelfin
gegen gut erhaltene **Concertina**
Damenrad usw. [
Offerten unter Edelfink an die Gef. V

Tausche
auf 1 prima Zuchtpaar gri
Wellensittiche [
eine gute deutsche Nachtiga
Syré, Lehrer, **Biernau** i. T

Bandfinke
**Paradieswitwen, Astrilde, Sil
schnäbel, Atlasfinken, Ora
weber** Paar 3,60 ℳ; **Amaran
rot, Schmetterlingsfinken, El
chen, Grisbleu** Paar 3,80 ℳ; **G
sänger, Mozambikzeisige, bl
Reisfinken** Paar 10 ℳ; gemischt
meiner Wahl 25 Paar 80 ℳ, 50
140 ℳ, 100 Paar 250 ℳ; **Hä**
Stück 5 ℳ, **Wellensittiche, gr. P
geien, Kanarienhähne, Kanar
zuchtweibchen, Alpensteinhüh
Landschildkröten** 8-14 cm Stck. 1,
15—20 cm Stück 2 ℳ, bei 50
1,40 ℳ, bei 100 Stück 1,35 ℳ; **W
Mäuse** Paar 1,50 ℳ; **Weiße Ra
Paar 2 ℳ; Laubfrösche** Stück 0,
usw. usw.
Garantiere stets für lebende und
Ankunft.
Josef Beck,
Zoologische Handlu
Stuttgart.

Inserate
für das am 5. Juni 1924 zur
gabe gelangende Heft 16 der
Welt erbitten bis 31. Mai 1924

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Hermsdorf bei Berlin; für den Anzeigenteil: Rolf Kretschmann, Magdeburg, Postschließfach 1
Verlag der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck: August Hopfer, Burg Bz. Mgdbg.

Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Jahrg. 53 | Den 5. Juni 1924 | Heft 16

(Druckort: Burg, Bezirk Magdeburg.)

Neuseeländische Papageien.

Von Andreas Reischek*).

(Nachdruck verboten.)

Endlich kam ich in offenes, mit Tussokgras bewachsenes Hügelland. Ich fand einige Alpenpflanzen, Liliazeen, Wollkräuter und Flachs.

Unter Steinen und Gras hüpften Keas (s. Abb. S. 123) (Raubpapageien, Nestor notabilis) herum. Es sind schöne kühne Vögel, olivgrün mit dunkler Bänderung. Auf dem Boden ist der Kea unbehilflich. Sein Gang ist hüpfend, ..., aber wenn er sich in die Luft erhebt, schwebt er in Kreisen wie ein Falke, immer höher, bis man ihn nur noch als einen einzigen Punkt sieht. Sein Ruf klingt: „Kia, kiaaaa!" wie der des Steinadlers. Ich fand diese Vögel hier sehr zutraulich und erlegte einen davon.

Dieser Papagei gehört zu den seltsamen Tieren der neuseeländischen Inselwelt. Es gibt drei Arten Nestoren auf Neuseeland . . .: den Nestor montanus, meridionalis und notabilis. Während die beiden ersteren ihrer Papageienart treublieben und sich bescheiden und harmlos von Sämereien, Beeren und Honig nähren, hat sich der dritte, Nestor notabilis, zu einem gefährlichen, fleischfressenden Räuber entwickelt.

Auch er war ursprünglich Pflanzenfresser; er hauste im Hochgebirge, auf hohen Felswänden und war bis in die Gletscherregion hinauf zu finden. Sein Geschmack wandelte sich erst, als die europäischen Ansiedler mit der Schafzucht begannen. Anfangs werden die Papageien die auf den Schafkadavern zahlreich lebenden Schmeißfliegenmaden weggepickt haben; dabei rissen sie ab und zu Fleischstücke mit und kamen so schließlich dazu, die Fleischnahrung ihrer früheren vegetarischen vorzuziehen. Sie wurden zu ausgesprochenen Raubvögeln, die in Mengen Schafe anfielen, ihnen Fleischstücke aus dem Rücken rissen (meist in der Nierengegend) und sie sotöteten. Ihr adlerartig scharf gebogener Schnabel, die spitzen, eleganten Flügel und ihr langgedehnter Schrei lassen sie auch äußerlich als Raubvögel erkennen. Dem Menschen gegenüber sind sie harmlos und zutraulich; lästig wurden sie mir nur durch ihre Neugierde, die sie oft — während meiner Abwesenheit — in mein Zelt führte. Ich fand dann zu meinem Ärger Schuhe und Kleider zerrissen . . . . .

*) Aus: Andreas Reischek, „Sterbende Welt. Zwölf Jahre Forscherleben auf Neuseeland." Reich illustriert. Gebunden 15 Goldmark. (Brockhaus, Leipzig.)

Am 16. ging ich mit Maori nach dem Nyakakau, einem Gebirgskamm, auf dem die Maori im Herbst viele Nestoren fangen. Zum Locken benutzen sie zahme Nestoren, die mit einer Leine und einem Ring an einem schräg gewachsenen Baum oder auf einer Stange befestigt und mit Blättern und Ästen so verdeckt werden, daß die wilden Nestoren sie nicht sehen können. Sobald ein Flug Nestoren einfällt, fangen die zahmen zu locken an; in ihrer Nähe wurden an den Ästen vorher Beeren befestigt. Die zwischen Ästen und Blättern gedeckten Maori verhalten sich ganz ruhig, bis die wilden Nestoren sicher sind, daß ihnen keine Gefahr droht, und zu den Beeren herunterklettern. In diesem Moment fast ein Maori einen Papagei beim Kopf . . .

Ein in seinen Lebensgewohnheiten dem Kiwi ähnlicher, ebenso absonderlicher echter Neuseeländer ist der große grüne Erd- oder Eulenpapagei (Stringops habroptilus), der Kakapo der Maori. Die Vögel haben ein mehr eulen- als papageiähnliches Aussehen, sie sind etwas größer als der Kiwi und auch sie können nicht fliegen; ihr Brustkorb ist flach und die Flügel sind verkümmert. Sie leben noch einsamer als die Schnepfenstrauße, sie sind unter allen Vögeln die ungeselligsten.

Begegnen sich zwei Kakapo auf ihren Pfaden, so gibt's einen Kampf auf Leben und Tod, der ebenfalls mit Schnäbeln und Füßen ausgefochten wird. Selbst zur Paarungszeit beschränkt sich die Zärtlichkeit bloß darauf, daß das Männchen das Weibchen nicht totbeißt. Ein Liebeswerben und Zusammenleben kennt er auch da nicht.

Die Maori behaupten, der Kakapo brüte nur alle fünf Jahre einmal, wenn die Früchte der Tafra (Freycinetta) reifen. Ich selbst hielt diese Anschauung für nicht unbegründet, da ich z. B. im Jahre 1884 Eier und Junge in verschiedenen Entwicklungsstadien, in den folgenden drei Jahren aber in derselben Gegend keine Zeichen der Fortpflanzung fand.

Auch der Kakapo legt Pfade durch die Wälder an. Ich verbarg mich etlichemal in der Nähe eines solchen Pfades so, daß ich jeden des Weges kommenden Vogel sehen konnte. Es war ein belustigender Anblick, den Wanderer zu beobachten, wie er, bedächtig schreitend, jede Wurzel abzwickte, die den Pfad querte und jeden Ast oder Stein mit dem Schnabel zur Seite warf. Im Winter sah ich sie ihre durch die Schnee-

decke unkenntlich gewordenen Straßen systematisch austreten. Die Pfade glichen in ihrer Anlage denen der Eingeborenen.

Die Kakapo sind sehr gefräßig. Oft plünderten sie meine Gemüsegärten, die ich neben meinen einsamen Lagerplätzen angelegt hatte. Einmal fand ich am Morgen einen Kakapo unter einem Krautkopf schlafend. Er hatte sich nachts so vollgefressen, daß er nicht mehr weiterkonnte und an Ort und Stelle einschlief.

Wie der Kiwi sind auch die Kakapo Nachtwandler. Tagsüber schlafen sie in Höhlen, und „der Mond ist ihre Sonne".

Rotbart-Maxe.

Von Dr. Gg. Victor Mendel, Berlin.

(Nachdruck verboten.)

Ein milder Frühlingsabend. — In das fast leere Abteil des Vorortzuges hastet im letzten Moment ein verhutzeltes altes Männchen, wirft schnell noch über den Bahnsteig einen forschenden Blick, aus dem deutlich das schlechte Gewissen spricht, und läßt sich dann mit unendlicher Vorsicht auf die Sitzbank nieder. Im gleichen Moment fährt der Zug an, und ein lustiges, fast höhnisches Meckern kommt über die welken Lippen. Ich habe den Alten sofort erkannt, suche aber mein Inkognito vorläufig noch hinter der vorgehaltenen Zeitung möglichst lange zu bewahren, weiß ich doch, daß „Rotbart-Maxe" wieder mal auf verbotenen Wegen gewesen sein muß. Und richtig —, nachdem ein scheuer Blick in die Runde ihn davon überzeugt hat, daß außer dem harmlosen, eifrigen Leser niemand die Einsamkeit des Abteils weiter stört, und nach einem herzhaften Schluck aus der treuen Begleiterin in der Rocktasche lüftet er vorsichtig die zerfransten Rockschöße und ordnet die am Hosengürtel verteilten Leinwandbeutel, in denen es ängstlich zuckt und zappelt. Bis plötzlich ein durchdringender Schrei ihn auffahren, die Hand um den einen Beutel hastig schließen und die Rockschöße darüber fallen läßt. Ebenso plötzlich saust aber dann auch aus der dunklen Tiefe seine Hand hervor, von der ein feiner Blutstreifen herabsickert. „Verdammtes Biest", zischt er leise vor sich hin, mich dabei gespannt beobachtend, ob ich wohl etwas gemerkt habe.

Jetzt aber kann ich nicht länger an mich halten und platze ihm, laut lachend, in das erschreckte Gesicht: „Na, Maxe, seit wann schleppst Du denn auch Buntspechte mit nach Hause; Du weißt doch, daß die Dinger den Schnabel nicht halten wollen!" Sein plötzlicher Schreck verwandelt sich aber bald in herzliche Freude: „Herr Jott, der Doktor! Det se mir aber noch wiederkennen nach so lange Jahre! Aber schön wars doch, wie Sie bei mir noch die Stipperei gelernt haben, was?" Und nun kramt er alte Erinnerungen aus, der Rotbart-Maxe, der seinen Namen übrigens keineswegs eigenem Bartwuchse, der bei ihm äußerst spärlich vorhanden ist, zu verdanken hat, sondern vielmehr den gefangenen Rotkehlchen, die der Berliner Volksmund als „Rotbart" bezeichnet. Er war eine Koryphäe in der Zunft der berufsmäßigen Vogelfänger und war mein Lehrmeister, ehe ich zu zoologischen Zwecken in die Tropen ging, wo ich lebendes Material von Tieren aller Art berufsmäßig zu sammeln hatte. Kein Wunder, daß er diese, meine Lehrzeit, mag sie auch heute schon über 20 Jahre zurückliegen, keineswegs vergessen hat, war sie doch wohl die einzige Frist, in der er seiner alten Leidenschaft ungestört und ohne die Angst vor dem ständig drohenden Förster nachgehen konnte, da ich von einem hohen Ministerium die offizielle Erlaubnis zum Vogelfang für wissenschaftliche Zwecke besaß. Da stets ein wohlgefüllter Rucksack mit köstlichen Fressalien uns begleitete und eine nicht allzukleine Flasche voll 60 %igen Kirschwassers die Ausrüstung vervollständigte. Nie werde ich sein triumphierendes Gesicht vergessen, wenn sein Erbfeind, der Mann im grünen Rock, ihn dann einmal allein erwischte, während ich in einem Busch Siesta hielt, und er dann triefend vor Höflichkeit die ministerielle Erlaubnis vorwies.

So manchen Monat Gefängnis hat er absitzen müssen für seine alte Passion, die ihm doch nur das Allernotwendigste zum Leben einbringt und die der alte Waldgänger doch nicht lassen kann. Gewiß, sein Beruf ist verboten und zeitigt Auswüchse genug. Trotzdem möchten Tausende von armen Großstädtern ihn nicht missen, den Mann, der ihnen ein Stückchen lebendige Natur in die öden Mietskasernen, in die dumpfe Werkstatt oder das einsame Krankenzimmer trägt. Es ist so vieles für und gegen das Halten von Singvögeln in der Gefangenschaft geschrieben worden, und wenn man solche Aufsätze liest, möchte man sagen: sie haben beide recht. Ich bin vielleicht nicht objektiv genug, um den Standpunkt der Gegner völlig gerecht würdigen zu können. Ihr Einwand aber, daß der gefangene Singvogel schnell im Käfig dahinwelkt, kann von jedem Vogelfreunde widerlegt werden, der selber das Glück hatte, sie alle bei sich zu pflegen und zu zähmen.

Noch immer begehen wir den Fehler, dem Tier menschliches Empfinden unterzulegen. Gar schnell ist die freie Natur vergessen, sobald nur wirklich sachgemäße Unterbringung, natürliche Fütterung und sorgfältige Pflege Platz greift. Daß in dieser Beziehung unter hundert Fällen in neunundneunzig gesündigt wird, steht allerdings auf einem anderen Blatt, kann aber echten Naturfreunden nicht zur Last gelegt werden, die Beruf, Armut oder Krankheit oft das ganze Jahr lang nicht mit der freien Gotteswelt in Berührung kommen läßt. Wenn solche armen oder einsamen Menschen in ihrem Heim sich die stillen Freuden der Vogelhalterei schaffen, so möge man ihnen daraus keinen Vorwurf machen. Ihre kleinen gefiederten Freunde haben es dort weit besser als in der bösen rauhen Welt dort draußen, die wir Ausflügler immer nur an sonnigen schönen Tagen zu sehen gewohnt sind, die aber auch Sturm, Regen, Schnee, Kälte und bitteren Hunger ebenso oft schickt wie grimmige Feinde, die fast immer vorschnell den Leben des kleinen Sängers ein Ende machen; weit schneller meist, als der Käfig, der sachgemäß eingerichtet, von den Tierchen später gar nicht mehr verlassen werden will. Dies letztere ist eine Tatsache, die jeder Vogelhalter kennt und die niemand abzustreiten wagen darf. Wenn überhaupt eine Tierquälerei darin zu sehen ist, so liegt sie in den wenigen ersten Tagen der Gefangenschaft, die der Vogel je doch zumeist nicht bei dem Liebhaber, sondern bei

Fänger selbst oder beim Vogelhändler durchzumachen hat, deren genaue Kenntnis von deren Psyche und Lebensgewohnheiten es bestens versteht, diese Zeit nach Möglichkeit abzukürzen. Die meisten Vogelfänger sind nämlich ausgesprochene Naturfreunde und bringen es kaum fertig, bewußt ein Tier zu quälen.

Ihr Handwerk verabscheut deshalb auch die Anwendung aller solcher Methoden, die zur Verletzung oder auch nur zu leichter Beschädigung der Vögel führen könnte (schon aus geschäftlichen Gründen, da ihnen der Händler beschädigte Tiere kaum abnehmen würde). Verpönt sind deshalb vor allen Dingen die Sprenkel, in einem federnden Zweiglein angebrachte Roßhaarschlingen, die, mit Mehlwürmern oder Vogelbeeren beködert, um die Beinchen der Beute schnellen und leicht dabei zu Brüchen führen. Ebenso verpönt sind bei uns in Deutschland auch alle Massenfanggeräte, wie auf dem Vogelherd senkrecht aufgebaute Stellnetze, die von fern her durch eine dünne Schnur umgerissen werden, sobald sich auf dem Herd, einem frisch umgegrabenen Beet, das mit Futter und meist auch einigen Lockvögeln versehen, sich eine größere Schar von Finken oder Ammern niedergelassen hat. Hierbei werden allzu wahllos Weibchen und Jungtiere mitgefangen, die unverkäuflich sind, und oft genug erschlagen die Stäbe des aufgespannten Netzes auch noch einige Tiere, die am Rande des Beetes saßen. Der passionierte Vogelfänger sucht seine Beute unter erstklassigen Sängern, die er oft stundenlang vorher „abhört" und denen er mit unendlicher Geduld nachstellt, bis sie seiner raffinierten Kunst doch endlich ins Garn gehen. Ins Garn gehen hier im wahren Sinne des Wortes, da die meisten Sänger fast alle im „Schlagnetz" gefangen werden. Dies ist eine aus zwei Drahtbügeln, verbunden durch einen spiralig umwundenen Stab, bestehende Vorrichtung, die auf dem Erdboden fänglich aufgestellt wird, indem man die Bügel übereinander legt und durch einen Draht festhält, der lose in ein kleines Holzklötzchen eingelegt wird, auf dem ein Mehlwurm oder ähnliches als Lockspeise winkt. Besonders Nachtigallen, Sprosser, Grasmücken und Rotkehlchen gehen leicht auf diesen Köder. Sie kommen in ihrer Neugierde gewöhnlich schon hinzu, wenn das Netz aufgestellt wird und tapsen hinein, kaum nachdem man den Rücken gewandt hat.

Finken und andere Körnerfresser, aber auch Meisen werden meist mit Leimruten gefangen. Dies sind ganz dünne Zweiglein, welche man vorher mit Vogelleim bestreicht, aus altem Leinöl, Misteln oder auch Tischlerleim gekocht, wobei man letzterem ein wenig Chlorzink hinzufügte, um ihn nicht trocknen zu lassen und um andererseits später die damit beschmutzten Federchen mit wenig Wasser leicht wieder reinigen zu können. Solche Leimruten werden meist an einer „Tränke" aufgestellt, das sind kleine Pfützen und Tümpel auf einer Waldlichtung, zu der die Vögel zum Saufen oder Baden eilen. Sobald sie hier zwischen den zaunförmig ringsum lose in den Sand gesteckten Leimruten hindurch zu kriechen versuchen, heftet sich eine solche lose an das Gefieder, der Vogel versucht sie abzuschütteln, wobei sie sich unter oder über die Flügel legt und ihn so am Fortfliegen hindert. Rasch wird dann von dem in der Nähe sitzenden Fänger das Tier aufgegriffen, vorher noch einmal sorgfältig getränkt, um dann in den Transportbeutel aus Leinen zu wandern, wo es sich nicht beschädigen kann und doch genügend Luft und Licht behält.

Eine ganze Reihe anderer Fangmethoden, wie der Meisenkasten, das Finkenstechen, der Fang mit dem Kauz und das „Stippen" mit der Leimrute bei

Kea.

Goldhähnchen ist außerdem noch im Schwange. Ich möchte aber nicht in den Verdacht geraten, hier Anweisungen zum Vogelfang zu geben, der nun einmal verboten ist und der bei allgemeiner Freigabe auch recht bald zur völligen Verwüstung im Bestande unserer gefiederten Sänger führen würde. Es wird wohl auch kaum einer meiner Leser riskieren, für einen gefangenen Buchfinken auf Monate hinter schwedische Gardinen zu geraten, wenn er dasselbe Tier für wenige Groschen mühelos und eingewöhnt beim Vogelhändler kaufen kann. Aber versagen wollte ich es mir doch nicht, einmal eine Lanze zu brechen für den mißachteten Stand der Vogelfänger, die selten aus Gewinnsucht, oft aber aus reiner Liebe zur Natur und „Jagd" handeln.

„Die weiße Amsel".

Von Vincenz Sommer, Münster i. W.

(Schluß.) (Nachdruck verboten.)

Besonders das weiße Amselmännchen ist einer der schlimmsten. Nicht viel hätte gefehlt und der plötzliche Prankenhieb wäre nicht daneben gegangen, aber so stieben nur ein paar weiße Federchen zu Boden. Und noch einen jungen Vogel zerreißt die Katze und will sich eben den letzten holen — da fällt aus nächster Nähe ein Schuß. Erst jetzt bemerken die Vögel den Schützen und stieben davon. Nur einer nicht. In Todeszuckungen will es sich noch anklammern an den Zweigen, aber nur ein Flattern mit den Flügeln, ein paar Mal ein Schließen und Öffnen des Schnabels, aus dem ein kleiner purpurroter Blutstropfen sickert, und dann — dann fällt das schwarze Drosselmännchen, das vor einigen Augenblicken Weib und drei Kinder verloren, mit dumpfem Aufschlag zu Boden. Eins von den Schroten, welche die Katze auslöschten, traf das Tierchen. Unten im Grünen, zwischen den Bohnenbüschen liegt der kohlschwarze Vogel neben seinem weißbunten Feinde, der ihm sein Lebensglück vernichtete.

Auch die weiße Amsel war bei dem lauten Knall des Schusses geflohen. Die vielen Vögel waren in alle Winde zerstoben. Noch jetzt ist das Männchen ganz erregt. Entrüstet schallt sein aufgeregtes „Egitt, egitt" durch die Gärten. Nicht das Unglück des Genossen oder der jungen Vögel, nur der Anblick des verhaßten Todfeindes hatte sein Blut so in Wallung gebracht. Er hatte ja für so etwas kein Gefühl in der Brust, kannte kein Mitleid. Und jetzt, wo er den Feind nicht mehr vor Augen sieht, legt sich auch allmählich die Erregung. Der Vorfall hatte ihm seine so plötzlich unterbrochene Beschäftigung des Federordnens verleidet. Nach der körperlichen Anstrengung von vorhin spürt die weiße Drossel argen Hunger. Zuerst will sie jetzt mal bei den Bäumen anfangen und die Raupenbestände revidieren. So untersucht sie mit der Zeit eine ganze Baumreihe. Hier pickt sie und dann zupft sie dort und darauf scharrt sie in einem Astloch usw. Langsam gelangt sie auch wieder zur Kastanie. „Prr, prr" geht es mit den Flügeln und schon sitzt sie im Baum. Eifrig untersucht sie ein zusammengerolltes Kastanienblatt und erwartet die größten Überraschungen. Aber die Überraschung erwartete sie nicht. Denn plötzlich schießt ganz in der Nähe aus einer Astgabel ein schreiendes, piepsendes und flügelzitterndes Federbällchen mit weit aufgerissenem Schnabel in die Höhe. Erschreckt flattert das weiße Männchen zur Seite. Langsam erst beruhigt es sich. Ob das Tier nun Bedauern zu dem verlassenen Jungen oder nur die Neugierde führte, jedenfalls flog es zum leeren Nest, um sich den girrenden Federball näher anzusehen. Und so, wie die Drossel sich nähert, fährt der Schreihals wieder in die Höhe. Da hält es das Männchen nicht mehr aus, und nur um den kleinen Kerl zum Schweigen zu bringen, fliegt es fort, holt eine saftige Fliege und stopft sie tief in den klaffenden Schlund. Aber, welch ein Schreck. Ein hastiges Zuklappen und schon ist die schreiende Öffnung wieder da. Rein aus Verzweiflung fliegt das weiße Amselmännchen, das nie ähnliche Gefühle gehabt hatte, hin und her und holt Futter. Wahllos stopft sie alles, was ihr vor den Schnabel kommt, in den Federball. Endlich ist der Kleine still und das Männchen, das doch gar nichts mit der vernichteten Familie zu tun hatte, fliegt erleichtert ab. Weit, weit weg. Aber schon nach kaum einer Viertelstunde hört die Drossel in der entferntesten Ecke des Gartens sitzend, den Schreihals rufen. Und unwillkürlich muß sie hin und mit allerlei Mitteln die Stimme zum Schweigen bringen. Mehr tat sie aber auch nicht und was sie tat, war scheinbar ganz mechanisch. So vergingen ein paar Tage, eine Woche. Aus dem piepsenden, federumwachsenen Schlund war ein hübscher, netter Drosseljüngling geworden. Zwar war er nicht kohlschwarz wie sein gestorbener Vater, oder so schön weiß wie sein Pflegevater, aber trotzdem stand ihm sein braunes Jugendkleid herrlich. Er war schon ziemlich selbständig, trieb sich im Garten herum und machte allerlei Allotria. Die Beine waren ja wohl noch ein wenig schwach, so daß er bei jedem festen Picken vornüberkippte und dann am ganzen Schnabel schmutzig war, aber das würde sich mit der Zeit schon geben. Nur einen Kummer hatte er. Vor ein paar Tagen hatte er seinen weißen Pflegevater mitten im Salat gesehen. Mit lauten Freudentönen wollte er da auf denselben zugehen. Aber unglücklicherweise stolperte er gerade jetzt in den Radieschen, verwickelte sich in der Petersilie und stand dann genau wie früher vor seinem Pflegevater. Nur daß er den Schnabel nicht aus Hunger, sondern aus Freude losgerissen hatte. Aber nur ein paar zornige Töne über den unhöflichen Störer drangen dem weißen Amselhahn aus der Kehle. Bissig pickte und hackte er nach dem Kleinen, der sich nur durch einen Purzelbaum nach hintenüber retten konnte. Er hatte seinen Pflegesohn nicht wiedererkannt. Und ähnlich sollte es der jungen Drossel noch öfters gehen. Immer wieder vergaß sie die schmähliche Abweisung, und wo sie auch das Drosselmännchen sah, flog sie hin. Dem wurde es mit der Zeit, da er ja nicht die Gefühle des Jungen kannte, doch zu dumm. Immer rüpelhafter wurde der Pflegesohn behandelt, so daß der sich schließlich zu den anderen Artgenossen wandte und das Amselmännchen verließ. So lebte der Alte weiter einsam und verlassen, gehaßt, gefürchtet und ohne Liebe.

— — — — — — — — — — — — — —

Ein strenger Winter herrschte. Eine dicke Schneedecke hatte alles begraben. Überall in der Tierwelt, vielleicht mit Ausnahme der Raubtiere und Raubvögel, herrschte Hunger und Elend. Besonders die Vögel, welche im Vertrauen auf einen milden Winter, oder aus Liebe und Anhänglichkeit zur Scholle nicht zum sonnigen Süden gereist waren, litten Not. Auch die weiße Drossel hatte in diesem Jahr nicht die gefahrvolle Reise angetreten. Wie so viele ihrer Artgenossen war sie in den Gärten geblieben. Einsam und vor Kälte schauernd saß sie des Nachts unter irgendeinem Giebel. Mühsam, mit kalten Füßchen, scharrte sie in der Schneedecke. Nichts fand sich. Die Bäume waren mit einer dicken harten Eiskruste überzogen. Keine Käferlarve oder Schmetterlingspuppe war zu sehen. Halb erfroren, fast verhungert, kam sie eines Tages wieder in die Gärten. Alles stöbert

die Amsel durch. Da sieht sie mitten auf der Schneedecke einen guten Bissen. Langsam, zögernd, nähert sich das halbverhungerte Tier. Auch hier wittert es Gefahr, fürchtet die Schliche der Menschen, traut sich nicht heran. Da sieht der Vogel von links eine Meise heranschwirren. „Prr, prr" geht es, und schon sitzt die Blaumeise der Drossel gegenüber. Die bekommt es mit der Angst, daß der andere den Bissen hascht und stürzt sich auf den Brocken. Aber kaum hat sie ihn im Schnabel — da — ein Klappen, ein Emporschnellen zweier Eisenbügel, die mit Netzen bespannt sind. Entsetzt fliegt die Meise ab und im Klappnetz flattert der weiße Vogel, gefangen. Wild tobt der Überlistete im Netz, steckt das Köpfchen durch die Maschen, zerrt hin und her. Ganz zerknickt werden die schönen weißen Schwungfedern mit den schwarzen Punkten. Erschöpft hält der Gefangene still. Lange, lange Zeit. Und dann kam eine schwielige, schmutzige Menschenhand und griff nach dem reinen weißen Vogel, besudelte das Gefieder. — In einem Käfig fand die Drossel sich wieder. In einem kleinen Holzkäfig, der an der Vorderseite mit Draht bespannt war. In zwei schönen Näpfchen war klares ungefrorenes Wasser und gutes leckeres Futter. Keines von beiden rührte der Gefangene an. Scheu saß er des Nachts in einer Ecke, ganz zusammengekauert; aber bei Tag, wenn die bleiche Wintersonne schien, dann flatterte der arme Vogel gegen den kalten herzlosen Draht. —

— — — — — — — — — — — — — —

In einem Museum einer norddeutschen Stadt steht hinter Glas und Rahmen, ganz verstaubt und von Motten zerfressen, ein Vogelbalg. Das Gefieder war vielleicht ehedem weiß, weiß mit ein paar schwarzen Flecken. Jetzt ist die Farbe schmutziggelb mit einigen grauen Punkten. Matt und verstaubt sind die Glasaugen. Und unten, ganz unten steht ein kleines Schildchen, auch verstaubt und vergilbt mit folgendem: Weißes Amselmännchen, wahrscheinlich Zwitter, selten schönes Exemplar, gefangen in den städtischen Gärten.

Neueinführungen und Seltenheiten.

Von Karl Neunzig.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Nach langer Zeit gelangten auch wieder fremdländische Täubchen auf den Vogelmarkt und, soweit ich feststellen konnte, in drei Arten, sämtlich der Gattung Sperlingstäubchen — Chamaepelia angehörig, und zwar das gemeine Sperlingstäubchen — Ch. passerina (*L.*), das Rosttäubchen — Ch. talpacoti (*Tem. Knip.*) und als Neueinführung das

Sperlingstäubchen von Ekuador — Ch. cruziana *(d'Orb.)*.

Im allgemeinen erfreuen sich die Täubchen bei den Vogelliebhabern keiner allzu großen Beliebtheit. Neben der Hinfälligkeit mancher Arten unmittelbar nach der Ankunft scheinen sie bei oberflächlicher Betrachtung ihrer übergroßen Ängstlichkeit und Scheuheit wegen nicht gerade erstrebenswerte Vögel für Vogelstuben oder Vogelhaus zu sein. Aber liegt denn nicht gerade darin ein besonderer Reiz der Vogelhaltung, daß man derartige, anscheinend störende Eigenschaften überwindet, daß sich der Vogelwirt bemüht, gerade solche Vögel durch richtige Behandlung und Pflege dahin zu bringen, daß sie wirklich angenehme Bewohner der Vogelstube werden und den ganzen Reiz ihres Wesens ihm offenbaren. Steter Umgang des Pflegers mit den Täubchen, Versorgung nur durch ihn selbst und größte Ruhe und Geduld führen auch hier zum Ziel. Ein erfahrener Züchter und Vogelwirt sieht gerade in den Täubchen Vögel, welche wesentlich zur Bevölkerung und Belebung des unteren Raumes, namentlich des Fußbodens, der Vogelstube beitragen, der von den kleinen in den Zweigen lebenden Vögeln nur wenig besucht wird. Und die Erfahrung hat gezeigt, daß wir in vielen Arten der kleinen Täubchen sehr schöne und liebenswürdige Vögel besitzen, die unser ganzes Interesse in Anspruch nehmen, zumal wenn die Mühe, welche der Vogelpfleger anfangs auf sie verwandte, meist dadurch belohnt wird, daß sie zur Brut schreiten, was ja eine Reihe von Arten nicht allzuselten getan hat.



Sperlingstäubchen.

Die Hauptgesichtspunkte bei ihrer Haltung sind die Zähmung, die Möglichkeit, ihnen einen großen

Raum zur Verfügung stellen zu können, der natürlich auch von anderen Vögeln bewohnt sein kann, und die Haltung nur eines Paares. Wenn auch das friedliche Zusammenleben eines Paares gewöhnlich als Sinnbild einer glücklichen Ehe hingestellt wird, „sie leben wie die Täubchen", sagt man, so ist es mit der bekannten „Taubensanftmut" nicht weit her. Sie sind häufig miteinander und besonders mit anderen Arten ihrer Gattung meist recht unverträglich und futterneidisch. Da ihre Wehrhaftigkeit nicht sehr groß, sie sind auf Schnabelhiebe mit dem schwachen Schnabel und Flügelschläge angewiesen, so hat das im ganzen wenig zu bedeuten, wenn der Raum, der ihnen zur Verfügung steht, recht groß. Schaden kann es nur stiften, wenn ein Pärchen zur Brut schreitet und die Erregung in dieser Zeit ernsteren Charakter annimmt. Es ist deshalb ratsam, nur ein Pärchen in einem Raum zu halten.

Rosttäubchen.

Das Hauptgewicht ist auf die Zähmung zu legen. Sie müssen völlig zahm sein, bevor sie mit anderen Vögeln zusammengehalten werden können. Man hält das Pärchen anfangs in einem kleinen Käfig. Meist bleiben sie ruhig auf der Stange sitzen, so daß man annehmen könnte, sie seien gar nicht ängstlich und benehmen sich ganz verständig. Diese Annahme ist aber falsch. Die anscheinend ruhigen Täubchen stürmen plötzlich ohne ersichtlichen Grund wild umher, scheinen völlig außer Fassung geraten zu sein, und es besteht die Gefahr, daß sie sich schwer beschädigen, wenn sie nicht in einem Käfig mit weicher Decke gehalten werden. Trotzdem gelingt ihre Zähmung in nicht zu langer Zeit, und manche werden im kleinen Käfig gar zu ruhig. Sie verhalten sich still und sind wenig beweglich. In einen größeren Käfig gebracht, zeigen sie dann schon mehr von ihren angenehmen Eigenschaften, ihrer Zierlichkeit und Anmut. Aber noch immer sind sie nicht so weit, daß man ihnen freien Flug in der Vogelstube gewähren könnte. Diese und ihre Insassen müssen sie erst kennenlernen. Diese Vorsicht ist entschieden geboten. Sie werden einige Zeit innerhalb der Vogelstube in einem Käfig gehalten. Meist geht die Gewöhnung an die neuen Verhältnisse überraschend schnell.

Die Bewegungen der kleinen Täubchen sind alle von wunderbarer Anmut und Zierlichkeit; ihr geschäftiges, flinkes Umhertrippeln auf dem Boden unter nickenden Bewegungen des kleinen Köpfchens, das emsige Auflesen von Samenkörnchen bietet soviel Anziehendes und den Vogelfreund Fesselndes, daß er schon dadurch für die Mühe der Zähmung reichlich entschädigt wird. Und dann die Liebesspiele des girrenden Täubers, der das Weibchen unter Verbeugungen und mancherlei Wendungen mit gefächertem Schwanz und gelüfteten Flügeln eifrig umtänzelt, unter häufigen Rufen und Gurren und Ruckfen.

Das dargebotene Futter, allerlei kleine Sämereien, fein zerschnittenes Grünkraut, Nachtigallfutter, frische Ameisenpuppen, weichhäutige Kerfe, wird sofort angenommen.

In der Vogelstube des Dr. Ruß wurden Sperlingstäubchen ziemlich dreist und keck, kamen des Morgens, wenn die Futtergefäße gefüllt wurden, auf den Boden herab und trippelten ihm dicht vor den Füßen. Sie hielten sich viel in dem Fenstervorbau auf, selbst bei naßkaltem Wetter. Sie schritten dort auch zur Brut und machten drei Bruten hintereinander.

(Fortsetzung folgt.)

Ornithologische Beobachtungen in Bad Salzungen (Meiningen).

Von Joh. Aug. Schmeißer, Nürnberg.

(Schluß.) (Nachdruck verboten.)

41. Delichon urbica urbica — Mehlschwalbe. Die Mehlschwalbe nistet in Langenfeld; auch am Wege S.–Möhra beobachtet.

42. Micropus apus apus — Mauersegler. In Langenfeld gesehen.

43. Picus viridis pinetorum *(Brehm)* — Grünspecht. Der Grünspecht ließ seinen Ruf am Wege S.–Möhra erschallen.

44. Picus canus canus *Gm.* — Grauspecht. Der seltene Grauspecht zeigte sich am Wege S.–Möhra.

45. Falco tinnunculus tinnunculus — Turmfalk. Turmfalken rütteln auf der Strecke W.–M.–Leimbach (mehrere), zahlreich war der Vogel auch auf dem Wege S.–Ettenhausen sowie bei Roßdorf, wo allein 6 St. zu Gesicht kamen.

46. Buteo buteo buteo *(L.)* — Mäusebussard. Bussarde kreisten bei Roßdorf, am Wege S.–Möhra (ein Junges schreit kläglich „Kliäh") und auf der Strecke W.–M.–Leimbach.

47. Accipiter gentilis gentilis (L.) — Hühnerhabicht. Nur einmal, am Wege S.–Möhra, ließ sich der Habicht blicken.

48. Gallinula chloropus chloropus *(L.)* — Grünf. Teichhuhn. Ein grünfüßiges Teichhuhn schwamm in der Roßdorfer Kutte umher.

49. Columba palumbus palumbus — Ringeltaube. Ringeltauben sah man am Wege S.–Möhra und auf der Strecke W.–M.–Leimbach abfliegen.

50. Tetrao urogallus urogallus *L.* — Auerhuhn. Am Wege W.–M.–Leimbach wurden 4 Auerhühner, davon 1 ♂ und 3 ♀, aufgescheucht; 2 bäumten sofort auf, 2 andere liefen am Boden fort und flogen dann erst auf; letztere waren wahrscheinlich Junge.

Zum Schlusse mögen hier die Ausführungen Platz finden, die unter „Naturwissenschaftliches" in dem Führer „Solbad Salzungen und Umgebung" (L. Scheermessers Hofbuchhandlung, 8. Aufl. 1913) stehen und die von einem ziemlich guten Vogelkenner verfaßt zu sein scheinen.

S. 83. Tiere des Waldgebietes: Baumfalke (am Forstberg), Turmfalke, Gem. Gabelweihe, Habicht, Sperber, Mäusebussard, mittlere Ohreule, Waldkauz, Steinkauz, Schleiereule, Kuckuck, Schwarzspecht (selten), mittlerer und kleiner Buntspecht, Grauspecht, Star (in Astlöchern der Tiefenorter Waldung), vier Drosselarten, Wasserstar (im Grundhof-Tal), Hauben-, Schwanz-, Kohl- und Blaumeise, Goldhähnchen, Baumrutscher, Spechtmeise, Kreuzschnabel, Wiedehopf (im Oberrohner Gebiet), Nachtschwalbe (im Frohn- und Mangersberg häufig), Rabenkrähe, Saatkrähe, Dohle, Elster (wird immer seltener), Nußhäher, Ringel- und Hohltaube (letztere in den Wäldern zu beiden Seiten des Unterrohn-Oberrohner Tales), Auerhahn, Fasan (am Altenstein, einige Paare auch am Frankenstein und an der Spießleite-Schonung!) und Waldschnepfe.

S. 84. Tiere in Feld und Wiese, Garten und Haus: Wendehals, Rotrückiger Würger, Schafstelze, Bachstelze, Nachtigall (selten), Haus- und Rauchschwalbe, Uferschwalbe (im Zellroder Steinbruch), Turmschwalbe (baut in die Salinentürme), Rebhuhn nnd Wachtel.

Tiere im See, in der Werra und in Sümpfen: Eisvogel, Blaukehlchen (am Werraufer), Rot- und Weißbleßhuhn, Wasserralle, punktiertes Sumpfhuhn, Wachtelkönig, Kiebitz, Bekassine oder Himmelsziege, Storch (Nest steht auf einem Bohrturm der Saline), Fischreiher (brütet jedoch nicht in nächster Nähe), Stock-, Krick- und Knäckente und kleiner Steißfußtaucher („Lüffchen"). Während der Frühjahrs- und Herbstzugzeit halten im Werratale teils längere, teils kürzere Rast: Der blaufüßige Fischadler, die Nebelkrähe, die Rohrweihe, der Tannenhäher, der Bergfink, der Kranich, die Rohrdommel, die Graugans, die Schell-, Tafel-, Spieß- und Pfeifente, die Sägetaucherarten, der große Haubentaucher und der rothalsige Taucher, die Lachmöwe und die Seeschwalben.

Vorstehende, offenbar von einem Weidmann stammende Aufzählung nennt eine überraschende Zahl von seltenen Arten als Brut- und Durchzugsvögel. Sie ist natürlich mit Vorsicht zu gebrauchen, bietet aber — zusammen mit den Schmeißerschen Beobachtungen — für den Vogelkundigen manch wertvollen Hinweis auf etwa vorkommende Seltenheiten. Vielleicht veranlassen diese Ausführungen jemand, die Vogelwelt Salzungens und seiner schönen Umgebung näher zu durchforschen, worin ich den schönsten Erfolg dieser Zeilen sehen würde.

Kleine Mitteilungen.

Tarantinische Zwergpapageien. (Mit einer photographischen Originalaufnahme.) Zu den beiden interessanten Artikeln in den letzten Nummern der „Gefiederten Welt" über diesen reizenden Papagei möchte ich nach meinen letzten Erfahrungen folgendes bemerken: Im März d. Js. gelangte ein Transport von 7 Tarantinern (4,3) in meinen Besitz. Die Vögel waren alle anscheinend kerngesund, in den ersten Tagen munter und vergnügt, wenn auch nicht so lebhaft wie Wellensittiche und andere kleinere Sittiche. Immerhin waren sie munterer wie die gleichzeitig erhaltenen Sperlingspapageien. Nach einer Woche wurden drei der Vögel merkwürdig apathisch; eine

Tarantinische Zwergpapageien.

Untersuchung zeigte bei allen drei Vögeln spitzes Brustbein, sonst keinerlei Krankheitszeichen. Alle drei Vögel gingen in kurzer Zeit ein; ein Pärchen gab ich fort, und es ging trotz bester Pflege ebenfalls in zwei Wochen ein. Der Rest meines Transportes starb ebenfalls in kurzer Zeit unter gleichen Krankheitszeichen, spitzes Brustbein, immer mehr zunehmende Schwäche und Tod unter krampfartigen Erscheinungen. Die Vögel fraßen bei mir in der ersten Zeit fast nur Sonnenblumenkerne, dann Hafer, Spitz und etwas weiße Hirse. Ich kann auf Grund meiner und anderer Liebhaber Erfahrungen berichten, daß die Tarantiner in der ersten Zeit äußerst hinfällig sind. Erst ca. 3 Monate nach ihrem Hiersein kann man sie als einigermaßen eingewöhnt betrachten; bei hoher gleichmäßiger Wärme sollen sie mit geringeren Verlusten einzugewöhnen sein. Auch die Importeure klagen über die Hinfälligkeit der Vögel, so daß die Anschaffung bei den immerhin hohen Preisen für diese Papageien ein gewisses Risiko bedeutet. Wie mir berichtet wird, soll von dem letzten Transport dieser Sittiche so gut wie gar nichts am Leben geblieben sein.

S. Lichtenstädt.

Beobachtungen. Am Ostermontag, 21. April 1924, unternahm ich mit einem Freund einen ornithologischen Ausflug nach der Wulfsmühle bei Hasloh. Wir erreichten Hasloh mit der Kaltenkirchner Kleinbahn von Altona aus. An den Feldrainen hinter dem Dorf begegnen wir Hauben- und Feldlerchen, Heckenbraunellen, Rotkehlchen, Graudrossel und Amsel, Zaunkönig, Fitis- und Weidenlaubvogel. Nach einem Weg von einer und einer halben Stunde durch einen mit alten Buchen untermischten prächtigen Eichenwald, eine Seltenheit für Schleswig-Holstein, erreichen wir die wunderbar gelegene Wulfsmühle, ein prachtvoll gelegenes Fleckchen Erde, ein rechtes Vogelparadies. Vor der Mühle liegt ein sehr großer Teich mit üppigem Schilfwuchs, durchflossen von einem kleinen Flüßchen, der Pinnau. Um den Teich stehen uralte Eichen und Buchen und ein reicher Bestand von Erlen, im Norden befindet sich ein alter ausgedehnter Nadelholzwald. Die Wirtsleute in der Gastwirtschaft, welche mit der Mühle verbunden ist, sind eifrige Vogelliebhaber und gute Beobachter. Als wir die Mühle erreichten, sahen wir den Wirt mit schußbereitem Gewehr am Teich stehen, um ein Paar prächtige Rohrweihe, welche über dem Teich schwebten, abzuschießen, weil sie gar zu arg unter dem Wassergeflügel, welches zahlreich den Teich bewohnt, hausen. Schon einmal mußte er einen Rohrweih abschießen, obgleich es auch für ihn ein Genuß ist, die Flugspiele dieser Räuber zu beobachten. Auch Seeadler gibt's noch im benachbarten Forst. Leider sind so schöne und von Vögeln so reich bevölkerte Örtlichkeiten in unserem Vaterland schon recht selten. Aber auch in dem Mühlgarten, welcher von der Pinnau durchflossen wird, herrscht reiches Vogelleben. Selbst den Eisvogel sieht man hier auf dem Pfeiler eines über dem Flüßchen erbauten Pavillons sitzen, wie er nach vorüberziehenden Fischen Umschau hält. Hier treffen wir auch Herrn Hannemann, den früheren Vorsitzenden des Vereins Waldidyll-Hamburg, der vielen Lesern von der Vogelausstellung im Jahre 1910 bekannt sein dürfte. Am See beobachten wir noch Höckerschwäne, Waldenten, ein Paar Turmfalken bei der Begattung auf dem Pfahl einer Viehkoppel, Rotkehlchen und Rohrammer, Fitis und Weidenlaubvögel, Singdrossel und einen Flug von etwa 20 Rauchschwalben, die dicht über dem Wasserspiegel dahinfliegen. Es ist heute empfindlich kalt und es weht ein kräftiger Wind. Gesang ist infolgedessen nicht zu hören; im Mai klingt es hier überall von Vogelstimmen und besonders sind es die Rohrsänger, die in mehreren Arten den Teich bewohnen, die sich später sehr bemerkbar machen. Am 3. Mai, als ich wiederum dieses mir so ans Herz gewachsene Stückchen Erde besuchte, war das Vogelleben schon ein viel reicheres. Wir beobachteten Baum- und Turmfalk, wieder den Rohrweih, Mäuse- und Wespenbussard, Saat-, Raben- und Nebelkrähe, Dohlen, Eichelhäher und Elster, Wildenten, grünfüßiges Teichhuhn, Dorn-, Zaun- und Mönchgrasmücke, Rohr- und Goldammer, Buch- und Grünfink, Girlitz, Stieglitz, Gimpel und Kernbeißer, Trauerfliegenschnäpper, Fitis und Zilpzalp, Rotkehlchen, Heckenbraunelle, Zaunkönig, Feldlerche, Haubenlerche, Heidelerche, Steinschmätzer, braunkehligen Wiesenschmätzer, Wiesenpieper, Baumpieper, Gartenrotschwanz, Hausrotschwanz, Rauchschwalbe, Mehlschwalbe, Wendehals, Haussperling, Feldsperling, weißen Storch, Sumpfmeise, Kohlmeise, Tannenmeise, Haubenmeise, Schwarzspecht, Grünspecht, gr. Buntspecht, weiße Bachstelze. Rob. Thiele-Altona.

Vogel-Ausstellung im Erzgebirge 1924. Am 20. und 21. April ds. Js. fand in Aue die Ausstellung des dortigen „Vereins für Kanarien- und Ziervögel" statt. Trotz des regnerischen Wetters war ein guter Besuch derselben zu verzeichnen. Unter anderen war auch der „Zool. Verein zu Zwickau" erschienen. Im nachstehenden sei ein ungefähres Bild von der Veranstaltung gegeben. Allerdings darf man bei der Beurteilung derselben nicht den Maßstab des niedersächsischen Gebietes zugrunde legen, sondern muß die Entwicklungsstufe des Erzgebirges in Betracht ziehen. Seltenheiten waren nicht vorhanden, nur die bekannten Vertreter unserer Hart- und Weichfresser konnte man beobachten, und zwar in einer Stärke von 183 Köpfen. Im allgemeinen ließ das Aussehen und der Gesang der Pfleglinge nichts zu wünschen übrig. Was die Käfige, die Behausungen unserer Lieblinge betrifft, so sieht es da oben im Gebirge zwar noch traurig aus. Das dort beliebte Haubenbauer hat seinen Platz seit Generationen inne und scheint nur nach schwerem Kampfe weichen zu wollen. Doch muß man mit Freude feststellen, daß, speziell in Aue, eine Besserung zu verzeichnen ist. Wie schön und anmutend nehmen sich die Bauer modernen Stils neben den unpraktischen Haubenbauern aus. Es liegt halt nicht im Machtbereich des Menschen, eine so große Aufgabe mit einem Schlage zu lösen. Zur vollendeten Vogelpflege gehört nicht allein sachgemäße Fütterung und Beobachtung, sondern auch ein Käfig, dessen Größe dem Insassen ausreichende und bequeme Bewegung gestattet. Eine Auer Firma hatte einige Reklamebauer ausgestellt, welche aber in bezug auf saubere Ausführung sehr zu wünschen übrig ließen. Jedoch dies nur nebenbei. Immerhin zeigte die Ausstellung, daß der Wille zu fruchtbringender Arbeit vorhanden ist und befolgt wird. Wünschen wir, daß auch das übrige Erzgebirge wenigstens auf diese Höhe noch kommt zum Heile unserer Lieblinge, zum Nutzen für uns selbst.

Zool. Verein Zwickau i. S., Fritzsche, Schriftführer.

Vom Vogelmarkt.

Von seltener auf den Vogelmarkt kommenden Vögeln werden angeboten:

Josef Beck, Stuttgart: Elsterchen, Grisbleu, blaue Reisfinken.

Ed. Bircher, Aarau (Schweiz): 1 Dufresnes-Amazone, junge, noch nicht ausgefärbte, 1 Gelbwang.-Amazone.

Horst Diesterweg, Magdeburg, Kaiser-Otto-Ring 3: 1,0 Kubafink, 1,0 Stieglitz-Kanarie.

R. Huth, Perleberg: 1 Paar ausgefärbte Papstfinken, 1 Paar blauflüglige Sperlingspapageien.

E. Schöndube, Berlin, Elisabethkirchstraße: Senegalsittiche, rote Kardinäle, Katzendrosseln, Weißwangenlerchen, Weißstirnpfäffchen, Weißkehlpfäffchen, Orangepfäffchen, Jakarinifinken, rotrückige Würger.

A. Steinhagen, Lübeck, Langer Lohberg 37: 1,1 Zebrafinken, 1,1 Möwchen.



Herrn Z., München. Witwen und Weber kommen, sobald sie geschlechtsreif sind, das ist im ersten Lebensjahr der Fall, ins Prachtgefieder.

Herrn S. L., Berlin. Ich sehe mit großem Interesse den in Aussicht gestellten Arbeiten entgegen.

Herrn E. P., Gumbinnen. Der Zeisig ist infolge eines Magendarmkatarrhs eingegangen.

Herrn H. G., Essen; Herrn K., Berlin SW: Beiträge dankend erhalten.

Herrn H. G., Forst/L. Das Verlangen, genaue Angaben über den Gesang und die Ernährung von 21 verschiedenen Arten an dieser Stelle zu machen, überschreitet doch wohl das Maß der berechtigten Wünsche eines Lesers der Zeitschrift. Der Mossambikzeisig singt ähnlich wie der Kanarienvogel mit lauten, flötenden Rufen; Graugirlitz erinnert an den des Kanarienvogels und der Heidelerche, kräftig, abwechslungsreich; Gelbbürzelgirlitz ähnlich dem des vorigen mit lauten, schmetternden Tönen; Schwarzbrustzeisig ähnlich wie unser Stieglitz; an Stieglitz- und Lerchengesang erinnert das Lied des Weißkehlpfäffchens, des Weißstirnpfäffchens und des Schwarzkappenpfäffchens; der Gesang des Kanariengimpels ist ein langgezogenes gluckendes Flöten, etwas unrein und schlürfend; roter Kardinal sehr laut, wechselvoll, melodisch, allmählich fallend, sanft und weich, dann wieder laut und kräftig. Die Girlitze erhalten Hirse, Senegalhirse, Spitzsamen, wenig Rübsen und Mohn, einige Hanfkörner, Grünkraut, die Zeisige Hirse, Spitzsamen, Mohn, Rübsen, Birken, Erlen, Nadelholzsamen, wenig Hanf, Mohn, Lein-, Distelsamen, Grünkraut, Pfäffchen Hirse, Spitzsamen, Grünkraut. (Fortsetzung folgt.)

(Fortsetzung auf der 2. Umschlagseite.)

Jahrgang 53 5. Juni 1924 Heft 16

DIE GEFIEDERTE WELT.

ZEITSCHRIFT FÜR VOGELLIEBHABER

Begründet von Dr. Karl Ruß

Herausgegeben von Karl Neunzig in Berlin-Hermsdorf

Inhalt:

Neuseeländische Papageien. Von Andreas Reischek.
Rotbart-Mare. Von Dr. Gg. Victor Mendel, Berlin.
„Die weiße Amsel". Von Vincenz Sommer, Münster i. W. (Schluß.)
Neueinführungen und Seltenheiten. Von Karl Neunzig. (Forts.)
Ornithologische Beobachtungen in Bad Salzungen (Meiningen). Von Joh. Aug. Schmeißer, Nürnberg. (Schluß.)
Kleine Mitteilungen - Vom Vogelmarkt - Redaktionsbriefkasten - Aus den Vereinen.

Abonnement monatlich (4 Nummern) 1.50 Gm. — Einzelpreis des Heftes 50 Gpf.
vermittelt das nächste Postamt bzw. der zuständige Briefbote. / Postversand ab Burg Bez. Magdeburg.

reutz'sche Verlagsbuchhandlung / Magdeburg / Postschließfach 148

Aus den Vereinen.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei zu Hamburg. Sitzungen finden statt jeden 1. und 3. Dienstag im Monat in Hüttmanns Hotel, Poolstr. 22, abends 8¼ Uhr. Nächste Sitzung Dienstag, den 17. Juni 1924.

J. A.: Arnold Weber, 1. Vorsitzender.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig. Vereinssitzungen jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat im Vereinslokal, „Bauers Brauereirestaurant", Täubchenweg. Nächste Sitzung am 5. und 19. Juni 1924. Gäste stets willkommen.

J. A.: Johann Birk, 1. Vorsitzender.

Verein der Vogelfreunde Leipzig-Plagwitz. Vereinslokal „Gosenschlößchen", Leipzig-Plagwitz. Sitzungen an jedem 1. und 3. Montag des Monats, abends 8 Uhr. Vogelfreunde sind stets willkommen.

J. A.: Karl Scholtissek, 1. Vorsitzender, Leipzig-Plagwitz, Lauchstädter Straße 30.

Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber. (Schluß.)

Vogelhändler können die Mitgliedschaft durch Anschluß ihrer Organisation an den Reichsverband erwerben. Als Einzelmitglieder kann keine Aufnahme erfolgen.

Ausgeschlossen sind Kanarienzüchtervereine.

Über die Aufnahme entscheidet der geschäftsführende Vorstand. Die Ablehnung des Aufnahmeantrages wird in der Regel unter Grundangabe erfolgen.

Die Mitgliedschaft erlischt:

a) durch Willenserklärung,
b) durch Nichtzahlung der Beiträge,
c) durch Auflösung eines Landesverbandes, wenn die dadurch erlöschende Mitgliedschaft durch Einzelmitgliedschaft nicht erneuert bzw. fortgesetzt wird, und
d) durch Begünstigung von Bestrebungen gegen den in I erwähnten Zweck

am Ende des Geschäftsjahres.

Die Beitragszahlung hat am Anfang für das ganze Geschäftsjahr zu erfolgen.

Die Mitgliedschaft berechtigt:

a) zur Teilnahme an den Versammlungen des Reichsverbandes, an den Abstimmungen, zur Stellung von Anträgen,
b) zur Benutzung aller von dem Reichsverband getroffenen Einrichtungen,
c) zur Inanspruchnahme des Reichsverbandes in allen zum Zwecke des Reichsverbandes gehörenden Angelegenheiten.

IV. Vorstand.

Der Vorstand besteht aus dem Gesamt- und dem geschäftsführenden Vorstand.

Der geschäftsführende Vorstand gemäß § 26 BGB. besteht aus dem 1. und 2. Vorsitzenden, 1. und 2. Schriftführer und einem Kassierer.

Die Vertretung des Reichsverbandes geschieht nach innen und außen durch den 1. Vorsitzenden, im Behinderungsfalle durch den 1. Schriftführer. Sie sind an die Beschlüsse des Gesamtvorstandes gebunden.

Der Sitz des geschäftsführenden Vorstandes muß ein Ort sein.

Der Gesamtvorstand besteht aus dem geschäftsführenden Vorstand und aus 8 von der Generalversammlung zu wählenden Personen.

Der Gesamtvorstand und 2 Kassenprüfer werden von der Generalversammlung auf zwei Jahre gewählt.

V. Generalversammlung.

Die Generalversammlung wird durch den geschäftsführenden Vorstand einberufen. Der Aufruf erfolgt in dem Verbandsorgan spätestens 8 Wochen vor der Versammlung. Sie findet an einem von der Generalversammlung zu bestimmenden Orte statt.

Zur Generalversammlung haben die Landesverbände und die Vereine, soweit sie keinem Landesverbande angehören können, das Recht Delegierte abzuordnen. Das Stimmenverhältnis regelt sich wie 1 : 5. Einzelmitglieder haben 1 Stimme.

Anträge sind spätestens vier Wochen vor der Generalversammlung an den geschäftsführenden Vorstand einzureichen.

Auf der Generalversammlung werden die geschäftlichen Angelegenheiten (Geschäftsbericht, Kassenbericht, Besprechung der gestellten Anträge, Beschlußfassung usw.) erledigt.

Die Generalversammlung hat den Gesamtvorstand zu wählen, sie findet alle zwei Jahre statt.

VI. Sitz des Reichsverbandes.

Sitz des Reichsverbandes ist der Wohnort des für das laufende Geschäftsjahr gewählten geschäftsführenden Vorstandes.

VII. Auflösung des Reichsverbandes.

1. Die Auflösung des Reichsverbandes kann nur auf einer Generalversammlung erfolgen.
2. Zur Auflösung sind mindestens die Stimmen von ¾ der dem Reichsverband angeschlossenen Mitglieder erforderlich.
3. Etwa vorhandenes Vermögen ist Vogelschutzzwecken zuzuführen.

Mit der Annahme dieser Bestimmungen wurde der Reichsverband auf eigene Füße gestellt, dem aber wohl noch weitere Stütze geboten werden muß und kann, durch eifrige Werbung unter den Tausenden und Abertausenden außerhalb der Bewegung stehenden Liebhabern, für die der Reichsverband ebensogut tätig ist wie für die angeschlossenen Mitglieder. Diese Werbung muß die vornehmste Aufgabe der Landesverbände und der Liebhaber sein.

Zu II der Satzungen ist der Beschluß gefaßt worden, daß der Beitrag für Vereinsmitglieder 30 Pf. fürs Jahr und für Einzelpersonen gegen zwei Stimmen auf 2 M. jährlich festgesetzt worden ist. Ferner hat die Generalversammlung zu V bestimmt, daß als Verbandsorgan die „Gefiederte Welt" in Frage kommt.

Der Gesamtvorstand nach dem gleichen Punkte besteht aus den Herren Birk (Leipzig) als 1., Chlodek (Leipzig) als 2. Vorsitzenden, Petters (Leipzig) als 1., Vorwerk (Leipzig) als 2. Schriftführer und Geßler (Leipzig) als Kassierer. Die Herren Nyncke, Gottschlag, Lenger (Berlin), Schmidt (Zwickau i. Sa.), Fischer und Schwarz (Leipzig), Flierl (München), Weber (Hamburg) als Beisitzer.

Als Kassenprüfer sind einstimmig bestellt die Herren Gnmbrich und Beutel (Berlin).

Der geschäftsführende Vorstand besteht aus den Herren Birk, Chlodek, Petters, Vorwerk und Geßler (Leipzig).

Der Sitz des Reichsverbandes ist zurzeit Leipzig.

Die Verbandsbeiträge von 30 Pf. für Vereinsmitglied und 2 M. fürs Einzelmitglied sind, wie jedem unserer Liebhaber erkenntlich sein muß, in äußerst mäßiger Grenze gehalten. 2 M. für Einzelmitglieder sind deswegen festgesetzt worden, weil sie in dem Verhältnis zu den Vereinsmitgliedern, die mit Vereins-, Landesverbands- und sonstigen Beiträgen belastet sind, günstiger dastehen und daher das geringe Opfer wohl zu bringen in der Lage sein werden. Mit diesen Beiträgen kann jeder Liebhaber, auch der ärmste unter uns, durch seinen Beitritt in den Reichsverband für sein Ideal sehr, sehr viel tun, denn nur in der Stärke liegt die Macht.

In Anerkennung der Geringfügigkeit der Beiträge und Erkenntnis, daß der neugeschaffene Verband zu seiner Einrichtung gerade im ersten Lebensjahre Mittel braucht, ist es wohl nicht unhöflich und übel zu deuten, wenn der Verband darum bittet, ihn zu unterstützen, ein jeder nach seinem Vermögen.

In liebenswürdiger Weise machte der 1. Vorsitzende des Hamburger Vereins, Herr A. Weber, ein Angebot auf kostenlose Überlassung einer Schreibmaschine, selbstverständlich unter Eigentumsvorbehalt, das der Versammlung außerordentlich überraschend kam. Selbstverständlich wurde das freundliche Anerbieten angenommen. Herrn Weber sei auch an dieser Stelle noch einmal allerbestens gedankt. Werden sich auch die anderen Mitglieder zu einer außerordentlichen Unterstützung bereitfinden lassen nach ihrem Können?

Der Ort der in zwei Jahren stattfindenden Generalversammlung wird bestimmungsgemäß später festgesetzt.

An alle Landesverbände und deren angeschlossene Vereine sowie die dem Reichsverband unmittelbar angeschlossenen Vereine ist noch die Bitte zu richten, dem Reichsverband ein Vereinsstatut und eine Mitgliederliste einzusenden. Weiter aber wollen uns die Landesverbände bzw. Vereine, in deren Lande kein Landesverband besteht, ein Landesvogelschutzgesetz zur Verfügung stellen.

Mit all diesem war der Zweck der Versammlung erreicht.

(Fortsetzung auf der 8. Umschlagseite.)

Herr Gumbrich (Berlin) erstattete mit den besten Wünschen für den Reichsverband den aus Sachsen erschienenen Vertretern den besten Dank für die Arbeit im Interesse des Reichsverbandes, während daran anschließend Herr Birk (Leipzig) allen Anwesenden seinen Dank im Namen des Reichsverbandes sagte und mit der Bitte um rege Mitarbeit für die Sache um 3 Uhr 10 Min. die Versammlung schloß.

Im Rahmen dieses Berichtes soll weiter auch nicht vergessen werden, den Berliner Herren, die sich den Leipzigern sowohl in der Führung durch die Stadt und zurück zum Bahnhofe zur Verfügung stellten, als auch sie in ihrem Heime aufnahmen, den allerbesten Dank zu sagen in der Hoffnung, diese Liebenswürdigkeit recht bald einmal entgelten zu können. Petters, 1. Schriftführer.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei zu Hamburg. Jahresbericht 1923. Im verflossenen Vereinsjahre vom 20. März 1923 bis 19. März 1924 wurden insgesamt 21 Versammlungen abgehalten, an denen im allgemeinen ein zufriedenstellender Besuch verzeichnet werden konnte. Leider hat die überstürzende Geldentwertung mit ihren schweren Folgen auch unseren Verein in arge Mitleidenschaft gezogen und uns daran gehindert, das für das Vorjahr aufgestellte Programm völlig zur Durchführung zu bringen. Unter den Mitgliedern hatte während dieser Zeit eine sichtliche Bedrückung Platz gegriffen, die auf geschäftliche und andere wirtschaftlichen Sorgen zurückzuführen war und bei den Mitgliedern das richtige Interesse für die idealen Ziele und Bestrebungen des Vereins nicht aufkommen ließ. Unter anderem ist auch das Scheitern der für den 26. bis 28. Mai festgesetzten Vogelausstellung auf diesen Umstand zurückzuführen. Auch die in der Generalversammlung am 7. Februar festgelegten ornithologischen Frühjahrswanderungen fanden nicht den erwarteten Zuspruch, so daß man auch hiervon Abstand nahm und auch diese Veranstaltungen als völlig gescheitert ansehen mußte. Mit der Einführung einer festen Währung und der Rückkehr einigermaßen geordneter Verhältnisse kehrte auch die durch die Verhältnisse der Zeit gewaltsam unterdrückte Liebe zur Vogelwelt wieder, so daß ein merkliches Aufleben der Vereinstätigkeit zu beobachten war. An Stelle der inzwischen eingeführten Umlagen konnte wieder ein fester Monatsbeitrag in Höhe von 50 Pf. festgesetzt werden, welcher nunmehr wieder einen Überblick über die finanziellen Verhältnisse des Vereins gestattete. Die Bücherei erhielt durch Spenden einen weiteren Zuwachs. Neu eingereicht sind „Flör. Vogelbuch" von Herrn Weber und Heinikes „Der ges. Vogelschutz" von Herrn Ewald, so daß als Eigentum des Vereins 11 Bücher aus der Ornithologie vorhanden sind. Die Leihfrist der Bücher wurde auf vier Wochen festgesetzt.

Auf dem Gebiete des Vogelschutzes hatte der Verein infolge des abnorm strengen und langen Winters überaus reichlich Gelegenheit, sich zu betätigen und zu zeigen, daß er gewillt ist, die Bezeichnung „Vogelschutz" nicht als Deckmantel zu tragen, sondern bereit ist, den gefiederten Freunden — gleich welcher Art — beizustehen, sobald die Not an sie herantritt. Zunächst erstreckte der Verein seine Tätigkeit auf dem Gebiete des Hamburger Botanischen Gartens und versorgte die dort befindlichen Futterstellen regelmäßig mit Hanf und Sonnenblumenkernen. Es wurden während des Winters dem Botanischen Garten ½ Zentner Hanf und ½ Zentner Sonnenblumenkerne zur Verfügung gestellt. Die Ausführung der Fütterung hat die Verwaltung des Botanischen Gartens in anerkennenswerter Weise übernommen und möchte ich auch an dieser Stelle den Herren der Verwaltung im Namen unseres Vereins für ihre rege Tätigkeit unseren Dank aussprechen. Ganz besonders war es zu begrüßen, daß die Fütterungen gerade während der Zeit der außerordentlich hohen Schneefälle regelmäßig mit vollwertigem Futter versehen waren und es herrschte dann an den Fütterungen ein das Herz eines jeden Vogelliebhabers erfreuendes, reges Leben und Treiben unserer gefiederten Lieblinge. Auf dem Gebiete der Vogelkunde hielt Herr Weber belehrende Vorträge über das Gefangenleben unserer Stubenvögel, insbesondere unserer Grasmücken und des Gelbspötters, sowie ihrer Hege und Pflege nach eigenen Erfahrungen. Ferner hielt Herr Menrath fesselnde Vorlesungen aus Naumanns Werken, die auch im kommenden Vereinsjahre fortgesetzt werden. Im Verlauf des Vorjahres ist aus dem Verein Herr Bockelmann ausgetreten. Neu aufgenommen wurden die Herren Nölting und Pölz, so daß der Verein bei Abschluß des 2. Vereinsjahres 21 Mitglieder zählt. Im großen und ganzen haben wir allen Grund, mit der vorjährigen Tätigkeit des Vereins zufrieden zu sein und der Hoffnung Ausdruck zu geben, daß er sich auch fernerhin weiter entwickeln möchte zum Nutzen der Liebhaberei und zum Wohle der gesamten Vogelwelt.

J. A.: R. Evers, 1. Schriftführer.

Verein Vogelschutz und -pflege zu Dresden. Versammlung jeden Donnerstag, abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Schillers Restaurant", Ecke Stifts- und Ehrlichstraße. Nächste Monatssitzung am 5. Juni. Tagesordnung wird daselbst bekanntgegeben. Am Sonnabend, dem 14. Juni, findet die zweite Nachtpartie in das beliebte wie vogelreiche Seidewitztal statt. Donnerstag, den 19. Juni, Wanderabend nach Goppeln. Zahlreiche Beteiligung erwünscht. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen.

Bernhard Kühn, Vorsitzender.

Für Aquarienfreunde.

Praxis der Aquarienkunde. Aus der Praxis für die Praxis. Von Dr. E. Bade. 4. und 5. Auflage. Mit 1 Farbentafel, 12 Schwarzdrucktafeln und 203 Textabbildungen. Kart. 5.— M.

Die ausländischen Aquarienfische, ihre Naturgeschichte, Pflege und Züchtung. Von Dr. E. Bade. Mit einer Farbentafel und vielen Abbildungen im Text. (Erscheint demnächst! Preis ca. 5.— M.)

Katechismus für Aquarienliebhaber. Fragen und Antworten über die Einrichtung, Besetzung und Pflege des Süßwasser-Aquariums sowie über Krankheiten und Züchtung der Fische. Von Wilh. Geyer. 8. u. 9. von Hans Geyer besorgte Aufl. Kart. 3.— M.

Zimmer- und Freiland-Aquarienpflanzen. Von Mönkemeyer. Mit 26 Abbildungen. Kart. 1.20 M.

Der Schleierschwanz und der Teleskopschleierschwanz, ihre Zucht, Pflege und die Beurteilung ihres Wertes. Von Dr. E. Bade. Mit 5 Schwarzdrucktafeln u. 19 Textabbildungen. Geh. 2.— M.

Die künstliche Fischzucht. Von Dr. E. Bade. Mit 2 Schwarzdrucktafeln und 16 Textabbildungen. Geh. 1.— M.

Das Seewasser-Aquarium, seine Einrichtung, seine Bewohner und seine Pflege. Mit einem Anhange: Das Brackwasser-Aquarium. Von Dr. E. Bade. Mit 1 Farbentafel, 14 Schwarzdrucktafeln u. 104 Textabb. Kart. 5.—, geb. 6.— M.

Für Terrarienfreunde.

Deutschlands Amphibien and Reptilien. Eine Beschreibung und Schilderung sämtlicher in Deutschland und den angrenzenden Gebieten vorkommenden Lurche und Kriechtiere. Von Bruno Dürigen. Mit 12 Farbentafeln u. 47 Textabb. Geb. 20 M.—.

Praxis der Terrarienkunde. Terrarium und Terra-Aquarium. Von Dr. E. Bade. Vergriffen! Neue Auflage Ende des Jahres!

Katechismus für Terrarienliebhaber. Fragen und Antworten über Einrichtung, Besetzung und Pflege des Terrariums. Von Hans Geyer. Kart. 2.— M.

Das Terrarium, seine Einrichtung, Bepflanzung und Bevölkerung. Von Hermann Lachmann. Mit 5 Vollbildern und 87 Textabbildungen. Geh. 2.— M.

Die Giftschlangen Europas, beschrieben und in ihrer Lebensweise geschildert von H. Lachmann. Mit 9 Textabb. Geh. 1.— M.

Für Geflügelzüchter.

Der Brutapparat in der Geflügelzucht. Darstellung der Herkunft, Bauart, Nutzanwendung und Herstellung des Brutapparates. Von Max Schwarzlose. Mit 10 Abb. im Text. 1.— M.

Zu beziehen durch:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg / Postschließfach 148

Anzeigenteil

Die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 20 G.-Pf. berechnet. Aufnahme erfolgt gegen Voreinsendung des Betrages in Reichsgeld pe Brief od. auf unseren Zahlstellen: Postscheckkonto: Magdeburg 3148, Wien 156 687, Bern III 4326, Prag: Creditanstalt d. Deutschen unter Angabe des Zweckes

Futtermittel

Mehlwürmer
geg. Einsend. v. 2.— Rentenmark 1/4 Pfd. franko versend. **D. Waschinski & Co.,** Biesenthal 1 (Mark). [405

Vogelfutter [406
für Kanarien, Waldvögel, Exoten, Papageien, Weichfresser. Anfragen nur gegen Rückporto. Liste 13 über Vogelfutter, Liste 5 über Vogelkäfige, Zuchtgeräte usw. mit etwa 400 Abbild.
W. Göpel, Leipzig,
Tröndlinring 1. Telephon 14968.

Ornis-Haus
Halle-Saale
Gegründet 1912
Spezialität:
Individuelle Weichfresserpflege nach Angaben des Herrn Apotheker Adalbert Jena-Biberach-Riß. (Alleiniges Herstellungsrecht.)
Reform-Normal I, Volierenm.,
Reform-Normal II, f. Rotkehlchen, Schwarzplatten usw.,
Reform-Normal III, f. Nachtigall., Sprosser usw.,
Reform-Normal IV, f. Gelbspött., Goldhähnchen usw.,
Reform-Normal V, f. Schama usw.,
Körnerfutter Ia für jede Vogelart. [407
Inhaber langjähriger Fachmann, siehe „Ornis-Buch" (90 S.) Mk. 1
Preisliste auf Wunsch!

Vögel

Zu kaufen gesucht:
Sprechender Graupapagei, ev. auch Amazone. [408
Offerten mit Sprachverzeichnis erbeten.
N. Diwersy, Merzig (Saar).
A. Z.-Mtgl. 183.

Sittiche, Araras, Kakadus, Amazonen, Edelpapageien, Zwergpapageien, Kragenpapageien, Loris, kleine Affen für eigene Sammlung zu kaufen gesucht. Angebote mit genauer Beschreibung und Preis an
Fliegner, Lehrte-Hannover. [409

Nur Reell.
Suche prima Schwarzplatte
nur garantiert Doppelüberschläger
tausche dagegen prima Zeiß-Feldstecher.
410] **Franz Kempf,**
Offenburg (Baden), Hauptstraße 11.

1,0 Schnurrbärtchen
411] zu kaufen gesucht.
Sab. Engel, München, Baaderstr. 3 III.
A. Z.-Mtgl. 375.

1 fingerz. vorjähr. Star
spricht einige Worte, pfeift 2 Lieder, auch Vogelgesänge wie Sprosser, Hänfling usw., für 30 Mk. abzugeben. [412
F. Ehlers, Hannover,
Müllerstraße 5 a.

Gegen Exoten
zu tauschen: 0,1 rotr. Würger, 1,1 Birkenzeistge, 2,0 Buchfinken, 1,0 Grünhäufling, 1 gelben Kreuzschnabel, alles im Gesange. [413
Baumeister Gehricke, Landeck (Schlesien).

Schopfwachteln
schwarzkäpp. Blauhäher
langschwänz. Glanzstare
empfiehlt
Joh. Götz, Vogelexport
414] **Neu-Ulm** (Bayern).

Tausche
Nachtigall, Gelbspötter, Heidelerche, Schwarzplatte gegen **Weißwurm u. Mehlwürmer** (Retourmarke)
Paul Rückert, Berlin O 112,
415] Simon-Dach-Str. 7.

Abgebe: 2,0 Mövchen, 0,1 Oryxweber,
1,1 Gelbscheitelweber gegen Gebot oder im Tausch auf: **0,2 Mövchen, 1,0 Oryx und andere Exoten.**
416] **Eugen Müller,**
Küstedt (Eichsfeld). A.Z.-Mtgl. 66.

Abzugeben
1,0 Amarant, 2,0 Schmetterlings- und 1 Atlasfink, 1,1 Silberfasänchen. [417
Prof. Hoepfel, Salzwedel.

Tausche 2,2 Gilbweber gegen reingelbes od. grünes Kanarienweibchen, das noch nicht gebrütet hat. Sende nicht zuerst. [418
Zahnarzt Weinheimer, Plauen im Vogtland, Klösterlein 2.
A. Z.-Mtgl. 71.

Gebe ab
1,1 blaub. Sperlingspapageien,
über 1 Jahr in Vogelstube, durchaus verträglich, im Tausch gegen andere Exoten (Tigerfink, Grisbleu, Weber) 419] oder Mark 18.—.
W. Voigt, Jena, Feodorastraße 13.

Schamadrossel,
ausgesucht. Ia Sänger ℳ 60.—.
Zuchtpaar
Silberohrsonnenvögel
ℳ 70.—.
Pichler, Wien III,
420] Klimschgasse 18.

Sofort lieferbar!
Fleißig schlagende prima
Wachtelhähne
Stück 7,50 Mk.
u. and. Vögel u. Tiere empfiehlt
A. Schwarz, Weißenfels a. S.
421] Klingenplatz 8.

Alfred Troschütz,
Buchhändler und Antiquar
Hannover,
Große Aegidienstr. 4.
Postscheck-Konto: Hannover 200, Cruse's Buchhandlung.
Seltene ornithologische Werke in englischer Sprache.
Lieferungszeit: 14 Tage.
Gould, a century of Birds fro the Himalaya Mountains 80 fall-pa engravings drawn on stone a coloured after nature Folio-For Half morocco-Bd. 1832. 260 G.-M
Horsbrugh, The Game-Bir and Water-Fowl of South-Afric 4 Bde. 65 color. plates. 1912. 180 G.-M
Stark & Sclater, The birds South Africa. Bd. 2—4. 1901—0 422] 90 G.-M

Verkaufe:
2 Zuchtp. jap. Mövchen je 20
2 einzelne kräft. Männchen je 5
Dr. A. Schröter, Leipzig-Connew
423] Auerbachstraße 7, II.

Vertausche: Ia Rotkehlch Wipfelsänger, oder Schwarzplattel gegen Ia Re zugfink oder Sprosser. [
Riedel, Gittersee, Dresdner Str.

Vertausche:
Rheinische Nachtigal
23 er Wildfang, in vollem Schlag, ge
Schwarzplättchen, Kanarienha Bastard oder **Wellensittiche.** [
N. Diwersy, Merzig (Sa
A. Z.-Mtgl. 183.

Für Kanarienzüchte
Soeben erschienen:
Die Farben- und Gestal kanarien
nebst Beschreibung aller schied. Kanarienrassen, de Entstehung, Form- u. Far veränderung, Bastardzuc Farbenfütterung v. A. Asch brenner. Mit vielen haltigen Abb. Kart. 1.75
Wichtig zur Zucht:
Der Kanarienvogel,
seine Naturgeschichte, P u. Zucht von Dr. Karl R 14. Auflage. Mit 2 Far tafeln und zahlreichen abbildungen. Bearbeitet Karl Neunzig.
Kart. 2.5
Zu beziehen durch:
Creutz'sche Verlagsb handlung, Magdebu
Postschließfach 148.

Für Freunde der heimischen Vogelwelt.

Die deutsche Vogelwelt nach ihrem Standort. Ein Beitrag zur Zoogeographie Deutschlands und zugleich ein Exkursionsbuch zum Kennenlernen der Vögel. Von Werner Hagen. Mit 74 Abbildungen und 4 Schwarzdrucktafeln. Kart. 3.— M.

Die einheimischen Stubenvögel, ihre Naturgeschichte und Zucht. Von Karl Neunzig (zugleich 6. Auflage des Dr. Karl Rußschen Handbuchs für Vogelliebhaber Band II). Mit 22 Farbentafeln und 188 Textabbildungen. Geh. 14.—, geb. 17.— M.

Die gefiederten Sängerfürsten des europäischen Festlandes, ihre Naturgeschichte, sachgemäße Käfigung, Behandlung und Pflege als Stubenvögel. Von Mathias Rausch. 2. Auflage. Mit 3 Farbendrucktafeln und 16 Textabbildungen. Kart. 3.— M.

Die Hauptregeln der Sprosserpflege. Scherzreime von Oskar M. Kisch. Mit 2 Abbildungen. 1.— M.

Der Dompfaff, seine Naturgeschichte, Pflege, Abrichtung und Zucht. Auf Grund 54jähriger Erfahrung von F. Schlag. 8.—10. Auflage. Mit 2 Schwarzdrucktafeln. Kart. 1.— M.

Die deutschen Sumpf- und Strandvögel. Von Dr. Curt Floericke. Mit 44 Abb. auf 15 Tafeln in Schwarzdruck. Kart. 4.50 M.

Die deutschen Schwimm- und Wasservögel. Von Dr. Curt Floericke. Mit ca. 45 Abb. auf 15 Tafeln in Schwarzdruck. Kart. 4.50 M.

Die mitteleuropäischen Vögel. Von Dr. E. Bade. Band I. Singvögel. Mit 1 Farbentafel, 4 Schwarzdrucktafeln, 31 Tafeln in Photographiedruck u. 144 Textabbild. von Nestern, Eiern u. Vogelteilen. Geb. in Ganzleinen 5.— M.

Allerlei sprechendes gefiedertes Volk. (Raben- und Krähenvögel, Starvögel usw.) Ein Hand- und Lehrbuch von Dr. Karl Ruß. Mit 5 Vollbildern in Schwarzdruck. Kart. 3.— M.

Gefiederte Hausfreunde I. Von Karl Neunzig. Kurze Unterweisung üb. d. Pflege heimischer Stubenvögel. Kart. 1.— M.

Die Fänge der Raubvögel Mitteleuropas. Von Prof. Dr. Carl R. Hennicke. Mit 33 lithogr. Tafeln. Kart. 5.— M.

Für Liebhaber fremdländischer Vögel.

Die fremdländischen Stubenvögel, ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht. Von Karl Neunzig. (Zugleich 5. Auflage des Dr. Karl Nußschen Handbuchs für Vogelliebhaber Band I.) Mit 42 Farbentafeln und 400 Textabb. Geh. 30.—, geb. 35.— M.

Die fremdländischen Weichfutterfresser (Insekten- od. Kerbtierfresser, auch Wurmvögel genannt, Frucht- od. Beerenfresser u. Fleischfresser). Mit Anhang: Tauben- und Hühnervögel. Von Dr. Karl Ruß. (Die fremdländischen Stubenvögel Bd. II.) Mit 10 Farbentafeln. Geh. 30.— M.

Gefiederte Hausfreunde II. Von Karl Neunzig. Kurze Unterweisung über die Pflege fremdländischer Stubenvögel. Mit 51 Abbildungen. Kart. 1.— M.

Zu beziehen durch:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlg., Magdeburg
Postschließfach 148.

Inserate
für das am 12. Juni 1924 zur gabe gelangende Heft 17 der Welt erbitten bis 7. Juni 1924

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Hermsdorf bei Berlin; für den Anzeigenteil: Rolf Kretschmann, Magdeburg, Postschließfach
Verlag der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck: August Hopfer, Burg Bz. Mgdbg.

Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Jahrg. 53 | Den 12. Juni 1924 | Heft 17

(Druckort: Burg, Bezirk Magdeburg.)

Früchte.

Von Emil Kaforke Berlin.

(Nachdruck verboten.)

Jede vollreife Frucht, die uns selbst mundet, können wir ohne Bedenken, in gemessener Menge, auch unseren gefiederten Zimmergenossen darbieten.

Zu den ersten im Jahr hierzulande reifenden Früchten, nach denen jung und alt ein lebhaftes Verlangen äußern, gehört die schön geformte und prachtvoll gefärbte, blinkende Kirsche. Ihr hoher Wert liegt in der vorzüglichen Bekömmlichkeit, die bedingt wird durch den Gehalt an dem wasserlöslichen Ergänzungsnährstoff C, der, wie alle Ergänzungsnährstoffe, fördernd auf die Verdauungsorgane einwirkt und eine größere Ausnutzung der Nahrung herbeiführt. Besonders geschätzt ist die sogenannte Herz- oder Weichkirsche, welche einen geradezu köstlichen Geschmack besitzt. Niemand, außer dem Menschen, weiß das besser zu würdigen, als die Papageien, die schnell eine Vorliebe für das liebliche Genußmittel bekunden. Diese physiologische Eigentümlichkeit findet ihren Ausdruck in dem anatomischen Bau der Zunge, die wie bei den Enten, im Gegensatz zu dem Organ anderer Vögel, ein entschiedener und wohlentwickelter Träger des Geschmackssinns ist.

Vom Blaukrönchen bis zum Kobaltarara erhielten und erhalten alle meine Papageien besonders die große, süße, saftreiche Weichkirsche, die sie mit sichtlichem Behagen verzehren. Unvergeßlich bleiben mir zwei Rußköpfchen, die immer zugleich ihre Schnäbel in eine Kirsche oder Weinbeere steckten. Ein großer Weißhaubenkakadu, der jegliches Futter verschmähte, wurde durch eine Kirschenkur wieder geheilt. Ganz gierig nach Kirschen zeigte sich ein hübscher Neuguinea-Edelpapagei; doch das größte mir bekannte Leckermaul war ein roter Gelbflügelarara, indem er Kirschen, Weintrauben und Apfelsinen förmlich aussog, ein Schlecker allerersten Ranges mit riesigem Appetit.

Nach Brehm sollen nun einige Papageien nach dem Genuß von Kirschen gestorben sein. An diese Tatsache möchte ich einige Bemerkungen knüpfen, die sich auf meine vierzigjährige Papageienpflege stützen. Waren die gereichten Früchte wirklich reif, so hat entweder eine bereits begonnene Fäulnis, welche bei dunkelroten und schwarzen Exemplaren leicht übersehen werden kann, den Tod herbeigeführt, oder die Vögel litten schon an einer unheilbaren Krankheit. Waren die Kirschen halbreif, dann hatte man nicht in Betracht gezogen, daß viele Pflanzen zu ihrem eigenen Schutze vor Beendigung der Vegetationsperiode giftige oder giftähnliche, schädliche Körper bilden, die später von den Pflanzen wieder zerstört werden und demgemäß in reifen Früchten nicht mehr vorhanden sind. Vollreife, einwandfreie Kirschen, in gemessener Menge genossen, bringen das Leben gesunder Papageien niemals in Gefahr. Wohl gibt es Individuen, die Kirschen überhaupt nicht anrühren.

Als Beispiel für das Auftreten und Verschwinden eines Giftes bei einer Pflanze mag der Hanf dienen. Unreife Hanffrüchte enthalten das äußerst giftige, strychninähnlich wirkende Tetano-Cannabin, während die reifen Früchte völlig giftfrei sind und einen süßöligen Geschmack besitzen.

Im halbreifen und reifen Zustande zuträglich sind die Früchte von Weizen, Hafer und Mais, die dem Gramineen angehören, einer Pflanzenfamilie, welche von gesundheitschädlichen Stoffen ganz frei zu sein scheint.

Mit den Kirschen auf gleicher Wertstufe stehen Stachelbeeren, Himbeeren, Wein- und Brombeeren, Apfelsinen und Bananen. Eine große, vollsaftige, aromareiche, süße Banane bildet das erste Frühstück für zwei Graupapageien, einen Inka- und einen Molukkenkakadu. Während und unmittelbar nach einer Lungenentzündung meines ältesten Jakos bestand dessen Nahrung täglich aus einer ganzen Banane und einem halben erweichten Milchbrötchen. Diese Fütterung hat den sehr ermatteten Vogel wieder auf die Beine gebracht. Nebenher sei erwähnt, daß Bananen als eine fast unersetzbare Beigabe zur Nahrung der Marmosett-, Löwen- und Negerseidenäffchen zu beachten sind. Aber stets wähle man einwandfreie, reife, aber nicht schmierige Früchte. Unreife Bananen enthalten 80 % Stärke und nur 3—4 % Zucker, sind dementsprechend schwerer verdaulich als reife, die 70 % Zucker (40 % Saccharose und 30 % Invertzucker) und etwa 2 % Stärke liefern. Trotzdem bekommen unreife, jedoch geröstete Bananen mit Rührei von Haushühnereiern Menschen und Affen vortrefflich. Für die Vogelwelt wenig zweckmäßig gelten gekochte oder geröstete Früchte, da durch die erforderlichen Hitzegrade die lebenswichtigen

Ergänzungsnährstoffe entweder völlig zerstört oder in ihrer Wirksamkeit stark abgeschwächt werden.

Recht beliebt bei den Papageien sind auch Birnen und Äpfel. Letztere fehlen, besonders im Winter, bei keinem Menu meiner gefiederten Freunde. Süße, saftige Birnen haben namentlich meine Blaukrönchen gern und reichlich verspeist. Diese reizenden Vögel, gewandte Kletterer und fleißige Sänger, übertreffen an Zutraulichkeit und Anhänglichkeit an ihren Pfleger die meisten anderen kleinen Papageien. Einen drolligen Anblick gewährt es, wenn die niedlichen Papageichen — Fledermauspapageien — ein Stückchen Birne von Haselnußgröße gleich den größeren Artgenossen mit dem Fuße zum Schnabel führen. Um das kostbare Leben der anmutigen Gesellen, die beim Händler an Hanf gewöhnt waren, nicht zu gefährden, habe ich stets besonders reife, nicht ranzige Hanffrüchte in meinem Heim unter meiner Aufsicht aussuchen lassen. Ach, der leidige Krieg mit seinen Folgen hat mich um mein Glück gebracht, vielleicht, man darf und soll nicht verzagen, sehe ich meine Lieblinge noch einmal wieder.

Früchte, die ich hochschätze und in geeigneter Form, am besten frisch allen meinen Stubenvögeln reiche, sind die herb und bitter schmeckenden, für den Menschen roh kaum genießbaren, kugeligen, scharlachroten Beeren der Eberesche. Sie haben mir wesentliche Dienste geleistet bei der Eingewöhnung von Plattschweifsittichen, die frisch importiert oft sehr hinfällig sind, wie zum Beispiel junge Pennanten und Scharlachflügel. Der Wert der Eberesche würde sich eminent steigern, wenn ihre Abart mit süßen Früchten allgemein zum Anbau gelangte.

Nun noch ein Wort über die Kirsche. Außer der Herz- oder Weichkirsche gibt es die Knorpelkirsche und saure Kirsche. Beide habe ich meinen Krummschnäbeln serviert und gefunden, daß diese Abarten Verdauungsstörungen hervorrufen.

Meine Ausführungen bitte ich nachzuprüfen, denn „experience is the mistress of fools", eigene Erfahrung ist der rechte Meister.

Über den Gesang einiger nordamerikanischer Drosseln.

Von G. P.

(Nachdruck verboten.)

Wie bei uns sind Drosseln bei den Vogelfreunden in den Vereinigten Staaten von Nordamerika sehr geschätzt. Auch bei den Drosseln Amerikas ist der Gesang jeder Art so charakteristisch, daß jemand, der nur einigermaßen ein Ohr für Vogelgesang hat, ihn niemals vergessen oder mit dem Gesang einer anderen Art verwechseln wird.

Eine der auch in breiten Volksschichten bekanntesten Drosseln ist neben der Walddrossel — Turdus mustelinus *Gm.* die im Volksmund „Veery" genannte Wilsons Drossel — Turdus fuscescens *Steph.* Der Name „Veery" ist eine Wiedergabe ihres Rufes.

Der Gesang dieser Drossel ist gar nicht zu verkennen. Er hat die wohlklingendsten Töne von allen Drosseln im nördlichen Waldgebiet der Union. Man hört sie von der Ankunft im Brutgebiet, welche im Mai erfolgt, bis in den Juli, häufig aber schon früher in den südlichen Staaten, die sie auf dem Frühjahrszuge durchwandert.

Die häufig unternommenen Versuche, den Gesang zu beschreiben oder ihn in Silben wiederzugeben, sind unzulänglich. Es ist ja bekannt, daß es sehr schwierig ist, einen Vogelsang mit seinen Untertönen wiederzugeben. Die beste Beschreibung gibt Ridgway, der von einem kaum ausdrückbar zarten metallisch klingenden Vortrag der Silben „ta—weel—ah, twil—ah, twil—ah" spricht, die von einem zart trillernden Unterton begleitet werden. Der erste Teil der Strophe wird lauter gebracht als die Endsilben. Es hat den Anschein, als wird das Lied mit einem außerordentlichen Kraftaufwand begonnen, der sich nach dem Ende zu allmählich verringert. Aber der Gesang hat doch noch eine besondere Eigentümlichkeit. Er klingt fast wie eine Art Sphärenmusik, als ob die Töne auf einer feinen silbernen Flöte hervorgebracht würden und aus weiter Ferne zu uns herübertönen. Das ist seine besondere Eigenart. So kommt es denn, daß man glaubt, wenn man den singenden Vogel nicht sieht, er wäre weit entfernt von uns, obgleich er sich in unserer unmittelbaren Nähe befindet.

Der Gesang der Swainsons Drossel (Abb. S. 133) klingt ähnlich, aber doch nur wie eine schwache Nachahmung des Gesanges des „Veery".

Die braune Spottdrossel, der „Brown Trasher" der Amerikaner, wird bei uns gewöhnlich als ein ganz hervorragender Sänger bewundert, obgleich, wie ich glaube, noch kein Pfleger dieses Vogels in ihm einen hervorragenden Sänger besessen hat. Die älteren Beobachter Amerikas haben den Gesang gerade dieses Vogels ganz besonders gefeiert und ihn als „unbeschreiblich schön" in den überschwenglichsten Ausdrücken gepriesen. Von den älteren Ornithologen Amerikas, und zwar ausnahmslos, wird neben dem Sangesfleiß die große Schönheit, der Reichtum an Abwechslung, der Ausdruck im Vortrag gerühmt. Im vollen Feuer vorgetragen sei das Braunspötterlied „unbeschreiblich, herrlich". Es ist auch nicht anzunehmen, daß der Vogel vor vielen Jahren einmal so wunderbar sang und durch Fortfangen der besten Sänger allmählich der Gesang zurückgegangen ist, ähnlich wie es in Deutschland, wenigstens in manchen Gegenden, mit dem Schlag der Buchfinken, dem der Mönchgrasmücken und anderer Arten wohl der Fall ist.

Seine Ankunft im Brutgebiet aus seinem Winteraufenthalt im Süden kündet der Braunspötter durch seinen weithin schallenden abwechslungsreichen Gesang an. Besonders fleißig singt er des Morgens, aber auch zuweilen am Tage. Der Ruf des Vogels als guter Sänger beruht wohl weniger auf der großen Verschiedenheit und Klarheit der Töne seines Liedes, sondern darauf, daß er in unmittelbarer Nachbarschaft der Häuser sein Lied fleißig hören läßt.

Es ist auch in Amerika viel über den Gesang dieses Spötters gesprochen und geschrieben worden. Aus dem Laube der Bäume und Sträucher, sowohl von niedrigen als hohen Zweigen, aber meist durch das Laub gedeckt, hört man sein schmetterndes Lied, das in Amerika nicht mehr sehr geschätzt wird. „Für mein Ohr ist es eine verworrene, wunderliche Mischung

schnell wiederholter Töne, hohen und tiefen, angenehmen und rauhen", wie ein bekannter Vogelkenner sagt, „und alle diese Töne in der blödsinnigsten Weise durcheinandergewürfelt." Sein Lied klingt aber ehrlich und man hört ihn in der Überzeugung, daß er ernstlich bemüht war, sein Bestes zu geben.

(Schluß folgt.)

Neueinführungen und Seltenheiten.

Von Karl Neunzig.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Über das Freileben des Sperlingstäubchens berichtet sehr eingehend Dr. W. L. Ralph (Life histories of North American Birds), den das Täubchen wegen seiner Zahmheit interessierte. Er ist der Ansicht, daß es diesem Täubchen geradezu ein Vergnügen zu machen scheine, sich in der Nachbarschaft

Sperlingstäubchen von Ekuador (s. S. 132).

von Häusern aufzuhalten. Das Nest werde oft wenige Fuß über dem Boden an Stellen gebaut, wo dauernd Menschen verkehrten. In Florida nisten sie häufig in Orangehainen und suchen auch in diesen ihre Nahrung. In anderen Gegenden bevorzuge es Felder, welche an Wälder mit niedrigem Unterholz grenzen. Auf Jamaika sah Gosse („Birds of Jamaika") sie paarweise oder in kleinen Flügen von vier bis sechs Vögeln auf Wiesen mit kurzem Graswuchs geschäftig umherlaufen, den Schwanz etwas nach oben gerichtet getragen, so daß sie von weitem kleinen Hühnern glichen. Anscheinend ungern breiteten sie die Flügel, sobald sich jemand ihnen nahte. Aber dem Beispiel einer folgten dann alle, um sich nach kurzem Flug wieder auf den Erdboden fallen zu lassen oder im Gebüsch aufzubäumen. Ihr Ruf beginnt dreisilbig, wie „kŏŏ-kŏŏ-rŏŏ" und endet mit vier oder fünf Lauten, welche leicht variieren, wie „Mŏŏ-ŏă-ŏŏŏ-ŏŏŏ-ŏŏŏ", Kehllaute, die schwer genau wiederzugeben sind. Es sind tiefe, schwermütige, aber dessenungeachtet weithin durchdringende Töne, und während des Balzens und der Brutzeit sitzt der Täuber häufig eine Stunde und noch längere Zeit auf dem Dach eines Gebäudes oder in einem Baum und läßt seine schwermütigen Rufe hören. Ihr Flug ist für einen so kleinen Vogel recht geräuschvoll.

Gosse sah sie auf Jamaika Grassamen verzehren, welche wohl die Hauptnahrung bilden, aber auch Samen der Brechnuß, des Rizinus und des auf den Weideplätzen häufig wachsenden Stachelmohns. Ralph sagt, daß sie grüne Erbsen verzehre, wo sie diese erlangen könne. Der erstere berichtet auch, daß sie auf den Beeten von Kulturen der Schalotte herumpicke, um die durch die Erdbearbeitung zutage geförderten kleinen Samen zu fressen.

Das Nest wird verhältnismäßig größer und fester gebaut, als es sonst bei Tauben üblich ist. Als Nistmaterial werden Zweige, Kräuter, trockene Blätter, Fichtennadeln, Moos und ähnliche Stoffe verwendet, im Innern ist es mit zartem Gras und andern weichen Fasern ausgelegt. Gewöhnlich war es auf einem wagerechten Ast, besonders von Orangen, in einer Höhe von 5—25 Fuß, meist unter 10 Fuß gebaut. Nicht selten stand es auch im Gebüsch oder in Weinranken, gelegentlich auch auf dem Erdboden. In anderen Gegenden wird das Nest sehr leicht gebaut aus einigen Zweigen und Kiefernnadeln oder Grashalmen und Kiefernnadeln in Weinranken, auf einem Tannenbäumchen, im Myrtenbusch, auch auf einem Baumstumpf.

Die Brutdauer währt zwei Wochen. Gewöhnlich werden zwei Bruten, gelegentlich auch drei hintereinander gemacht und ausnahmsweise vier Bruten.

Die Nistzeit währt von Anfang April bis in den Juni, in manchen Gegenden trifft man sie auch noch im Juli brütend. Beide Gatten eines Paares brüten und sind sehr um ihr Nest besorgt. Wenn einer vom Nest, welches Eier enthält, gejagt wird, läßt er sich zu Boden fallen und flattert umher, als ob er verwundet wäre, und versucht auf diese Art, die uns besonders bei Grasmücken bekannt ist, den Störenfried vom Nest zurückzutreiben. Aber auch wenn das nicht

gelingt, sucht das Täubchen das Nest wieder auf. Noch aufgeregter benimmt es sich aber bei Störungen, wenn schon Junge im Nest sind. Es tobt dann wie wahnsinnig umher, fast bis zur völligen Erschöpfung. Diesen Täubchen wird durch Federjäger und jagende Touristen arg nachgestellt, aber man fängt es auch häufig in Roßhaarschlingen beim Futtersuchen.

Ähnlich wie dem Sperlingstäubchen geht es dem Rosttäubchen, das, wie A. Forbes im Ibis 1881 berichtet, von den Brasilianern besonders als Inhalt des Kochtopfes geschätzt wird und deswegen beständigen Nachstellungen ausgesetzt ist.

Das Verbreitungsgebiet des Rosttäubchens erstreckt sich über Peru, Bolivien, Paraguay, Guiana, Venezuela und Brasilien. In Brasilien ist sie überall gemein und ihre Zutraulichkeit, die ihr zum Verderben wird, führt sie in Dörfer und Städte, und selbst in den Straßen der Vorstädte Rio de Janeiros sieht man sie auf den Fahrwegen und in den Gärten umherlaufen. Es nistet auf niedrigen Bäumen und anscheinend wie das vorige gern auf den Zweigen der Orangenbäume. Das Nest wird aus gröberem Material gebaut und auch fester, als es sonst bei den Tauben üblich ist. Diesem Umstand, und wohl auch weil es weniger ängstlich und scheu ist als das Sperlingstäubchen und andere Gattungsangehörige, ist es wohl auch zu verdanken, daß es häufiger mit Erfolg gezüchtet wurde als andere kleine Täubchen, deren Bruten in der Gefangenschaft gar zu leicht zugrunde gehen, weil sie, wie das für die meisten Tauben typisch ist, außerordentlich leichte Nester bauen, die in bevölkerten Flugräumen stets gefährdet sind. Es sind recht stille, friedliche Vögel, die jedem Streit mit anderen, selbst mit anderen Tauben, aus dem Wege gehen. Anscheinend ziemlich wärmebedürftig, aber durchaus nicht weichlich, sucht es da, wo es nach Belieben in geschlossenen Räumen oder in den Volieren im Freien sich aufhalten kann, letztere nur bei Sonnenschein auf. Bei den erfolgreichen Züchtungsversuchen baute es selten ein freistehendes Nest, sondern bevorzugte Harzerbauerchen, an welchen einige seitliche Gitterstäbe herausgenommen waren.

Ähnlich wie die vorhergehenden wird sich vermutlich das neu eingeführte Sperlingstäubchen von Ekuador verhalten. Dieses niedliche kaum lerchengroße Täubchen lebt in Ekuador, Bolivien, Pern und im nördlichen Chile.

Die Gefiederfärbung ist folgende:

♂ oberseits fahl graubraun; Oberkopf und Wangen grau, nach unten hin weinrot, leuchtender und mehr ins Rosafarbene gehend an Bauch und Unterschwanzdecken; Kehle weißlich; Flügeldecken fahl weinrot, an den Schultern ein purpurbraunes Band; vordere große Flügeldecke mit stahlblauem Spitzenfleck, ebensolcher Fleck auf beiden Fahnen der inneren Schwingen; Handdecken und übrige Schwingen schwärzlichgrau; Achselfedern, innere Unterflügeldecken schwarz, außen grau; mittlere Schwanzfedern bräunlichgrau; seitliche grau, nach der Spitze zu schwarz; äußerste meist ganz schwarz, äußerer Spitzenrand weißlich; Schnabel hornschwarz, am Grunde gelb; Auge rot; Füße rot; Länge 185 mm. ♀ fahl graubraun, unterseits heller; Kehle, Bauch, Unterschwanzdecken weißlich; Stirn grau; kleiner als ♂.

Unter den in neuester Zeit eingeführten Vögeln waren auch wieder einige Arten aus der Sippe der Tangaren, die man jetzt wohl als Seltenheiten bezeichnen muß. Das Urteil der Liebhaber über diese farbenschönen Vögel ist im allgemeinen kein günstiges. Sie hätten keinen Gesang, säßen den ganzen Tag ruhig auf der Stange, bewegen sich nicht und böten bei ihrer immerhin nicht ganz leichten Verpflegung wenig, was den Vogelpfleger interessieren könnte. Dieses Urteil ist falsch, wenigstens in dieser Verallgemeinerung. Mir liegt es völlig fern, bei unseren Pfleglingen alles nur immer als „eitel Licht und Sonne" hinzustellen, die unangenehmen Eigenschaften vieler Stubenvögel aber nicht genügend hervorzuheben. Unser geschätzter Mitarbeiter, Herr S. Lichtenstädt, macht in seiner interessanten Arbeit über den Blaubartblattvogel in Heft 15 d. J. den Lehrbüchern einen in diesem Sinne gehaltenen Vorwurf. Ich glaube aber auch, das ist nicht ganz zutreffend. Der Verfasser eines Lehrbuches kann doch für die Schilderungen eines Vogels nur das wiedergeben, was über ihn bisher bekannt geworden und was er selbst an ihm beobachtet hat. So war es mir wohlbekannt, daß der Blaubartblattvogel neben vielen angenehmen Tönen auch weniger schöne Gesangsstrophen bringt, und das ist auch ganz klar zum Ausdruck gebracht mit den Worten „aber auch rauhere, weniger angenehme Töne". Daß nun einmal ein einzelner Blattvogel einen Ruf bringt, der dem Pfleger auf die Nerven fällt, ist natürlich unbestritten; aber ich glaube, daß der seltene Vogel einem anderen Pfleger außerordentlich gefällt, und ferner, daß die Arbeit des Herrn Lichtenstädt dem Blaubartblattvogel eher neue Freunde geworben hat, als daß sie wie eine Warnung vor dem Erwerbe dieser Art wirkt, denn nicht jeder Blaubartblattvogel ruft „billig, billig". Das ist eben eine Eigentümlichkeit dieses einen Vogels. Das Urteil eines Liebhabers, der sagt: „Ein Blattvogel singt am schönsten, wenn man ihn nicht hört", ist entschieden als jeder Grundlage entbehrend zurückzuweisen. Im einzelnen Fall könnte es einmal zutreffend sein, wie bei jeder Vogelart.

Doch zurück zu den Tangaren. Auch hier treffen zweifellos in einzelnen Fällen ungünstige Urteile über den Gesang, die Verträglichkeit, Lebhaftigkeit usw. zu, aber hören wir das Urteil eines erfahrenen Vogelpflegers, des Herrn Kuntzendorff, der in seinen geräumigen Flugräumen eine große Zahl von fremdländischen Weichfutterfressern lange Jahre hindurch hielt, unter anderem auch etwa ein Dutzend Tangaren verschiedener Arten. „Ich kann mir wohl kein schöneres Bild vorstellen, als diese farbenschönen Vögel im grünen Laub von der Sonne beschienen; das feurige Rot, das satte Gelb, das schillernde Blaugrün, das tiefe Violettschwarz neben dem anspruchslosen Blaugrau und Olivgrün inmitten des schönen leuchtenden Grün des Laubes. — Da sollten so ungünstig über die Tangaren Urteilende meine Tangaren beobachten, wie sie munter und gewandt im Flugraum ihre Flüge unternehmen, im Geäst umherklettern und unter ständigem Zwitschern scheinbar einander haschen, wie es ausgelassene Kinder gern tun, und noch sagen, sie wären uninteressante Vögel. Im Käfig kommt selbstverständlich ihr Wesen in derartiger Weise nicht zum Ausdruck ..." Wiederholt konnte ich mich bei Besuchen des in unmittelbarer Nachbarschaft meiner Wohnung gelegenen Heims des Herrn Kuntzendorff davon überzeugen, daß Herr K. das Benehmen der Tangaren in seinen Flugräumen völlig zutreffend schildert.

Und nun das Gegenstück. Herr Eichlam, der in seinem Wohnort Guatemala viele Arten von Tangaren nicht nur aus den Beobachtungen in Käfigen kennt, schildert sie als im Freileben durchaus ruhige und friedliche Vögel, die nur zur Brutzeit, wie die meisten Vögel, um ihre Brutplätze kämpfen. „In der Vogelstube sind die Tangaren gerade das Gegenteil. Nur zu leicht werfen sie sich dort zum Tyrannen auf und stiften nach allen Richtungen hin Unheil, zerstören die Nester anderer Insassen, töten jung und alt und vertreiben selbst viel stärkere Vögel mit Konsequenz vom Futterplatz. Tangaren in die Vogelstube einzusetzen bleibt immer ein Wagnis.“ Es stehen sich hier also die Erfahrungen zweier bewährter Vogelwirte schroff gegenüber. „Freilich“, so sagt Herr Eichlam am Schlusse seiner Betrachtungen, „gibt es auch hier — bei den Tangaren — verschiedene Temperamente!“ Es ist kaum anzunehmen, daß nur in diesem Umstand die Quelle der völlig entgegengesetzten Erfahrungen zweier erprobter Vogelwirte über eine große Gruppe von Vögeln zu suchen ist.

Nach Eichlam fehlt den Tangaren die herrliche Gabe des Gesanges. Von der wohl am häufigsten und auch jetzt wieder eingeführten Art der schönen blutroten, schwarzgeflügelten Purpurtangare (s. Abb. S. 119) sagt eine Pflegerin, sie lasse außer rauhen Touren auch „laute drosselähnliche Töne und schönen, etwas sanfteren, abwechslungsreicheren, dem des Rotkehlchens ähnlichen Gesang“ hören. Der Gesang der Kubatangare wird als „leises, angenehmes, melodisches Zwitschern“ geschildert, der der Feuertangare soll drosselartige „laute, flötende Töne schnell hintereinander“ bringen usw.

Es scheint demnach noch vieles über das Benehmen, Verträglichkeit, Gesang der Tangare der Klärung zu bedürfen. Mögen die Wiedereinführungen von Tangaren, welche in neuerer Zeit erfolgt sind, die Liebhaber zu ihrer Haltung anregen und damit zur Klärung aller dieser Fragen beitragen.

Es wurde die schon oben erwähnte Purpurtangare, die sehr schöne schwarzblaue Tangare — Tanagrella cyanomelaena (*Wied*), die Schwarzlappen-—Calliste brasiliensis (*L.*) und die Trauertangare — Tachyphonus rufus (*Bodd.*) wieder eingeführt. Letztere ist allgemein als sehr unverträglich bekannt, hat sich aber ebenso wie die Purpurtangare dazu bequemt, in der Gefangenschaft zur Fortpflanzung zu schreiten. (Fortsetzung folgt.)

Bekämpfung des Ungeziefers.

Von Apotheker Stöcker, Hamburg.

(Schluß.) (Nachdruck verboten.)

Über das wirksame Prinzip im Insektenpulver gebe ich folgende Auszüge aus den Arbeiten der einzelnen Forscher wieder. Ihre Ansichten sind zum Teil recht verschieden. Soviel ist indessen zweifelsfrei festgestellt, daß der wirksame Stoff in dem durch Ausziehen des Pulvers mit Petroläther (Benzin) erhaltenen Harze enthalten ist.

Husemann erhielt aus persischer Ware ein flüchtiges Öl und einen alkaloidischen Körper.

Hager: Trimethylaminähnlicher Stoff und ein momentan wirkender Bestandteil der Harzdrüsen und Pollenkörner.

Textor ermittelte als wirksamen Stoff ein durch Benzol extrahierbares Weichharz.

Hirschsohn kommt auf Grund seiner Tierversuche zu dem Resultat, daß ein flüchtiger Stoff, etwa ein ätherisches Öl, nicht die Wirksamkeit des Pulvers bedingen könne, ebensowenig wie eine Säure, sondern ein durch Alkohol, Äther, Chloroform oder Benzin extrahierbarer Stoff.

Swainsons Zwergdrossel.

Schlagdenhauffen und Reeb extrahierten durch Chloroform eine von ihnen mit Pyrethrotoxinsäure bezeichnete giftige Säure, welche sie später durch Extraktion mit Petroläther darstellten und als eine butterähnliche, nicht kristallinische gelbe Masse beschreiben, die sehr leicht in Alkohol, Benzol, Essigäther, Azeton und Benzin löslich sei.

Thoms wies 1890 nach, daß das giftige Prinzip sicher durch Petroläther extrahiert werden könne.

Caesar und Loretz schrieben 1897, daß die insektentötende Wirkung in der Hauptsache nur auf dem Harzgehalt der Blüten beruhe.

Gerard gibt 1898 als aktive Prinzipien ein Ölharz und ein ätherisches Öl an.

Fujitani (1909) nennt das Harz ein Nervenmuskelgift, welches bei Fröschen die motorischen Gebiete des Zentralnervensystems und der Atmung erregt. Die Erregung geht nach großen Gaben schließlich in Lähmung über. Das Gift wirkt in mancher Hinsicht wie Veratrin. Insekten sind dagegen sehr empfindlich.

E. Schmidt: Die insektentötende Wirkung scheint dem ätherischen Öl desselben zuzukommen. Über die flüchtige kristallisierbare Chrysanthemumsäure und die nicht flüchtige giftige Pyrethroxinsäure ist nichts Näheres bekannt. Chrysanthemin kann durch heißes Wasser ausgezogen werden, dasselbe ist nicht giftig.

Sato: Gegen Kaltblüter wirkt das Harz sehr heftig. Schon 0,0001 g genügt, um einen 100,0 schweren Frosch zu lähmen, während es auf Warmblüter fast unwirksam ist, selbst wenn die Gabe auf 1—2 g gesteigert wurde.

Wie aus vorstehendem ersichtlich, ist der wirksame Stoff bis jetzt noch nicht isoliert uns bekannt. Die Tatsache aber, daß er in Petroläther löslich ist, gibt uns ein Mittel in die Hand, den Milben durch eine Flüssigkeit intensiver auf den Leib rücken zu können. Durch eine Flüssigkeit können wir einen vermilbten

Braune Spottdrossel (s. S. 130).

Käfig usw. entschieden gründlicher behandeln als mit Pulver, da letzteres nicht haften würde, während durch die in dem Auszuge mitgelösten harzigen Bestandteile ein gutes Haften des wirksamen Stoffes gewährleistet wird. Zur Herstellung dieser Flüssigkeit würde man zirka 40,0 g bestes Insektenpulver mit ungefähr 100 ccm guten Benzins (Leichtbenzin) in einer gut verschlossenen Flasche einige Tage unter häufigem Durchschütteln ausziehen und den Auszug von den festen Bestandteilen abfiltrieren. Am besten wäre wohl die Anwendung mittels Zerstäubers. Beim Gebrauch wird das Benzin sehr rasch verdunsten und jeder mit der Flüssigkeit in Berührung gekommene Gegenstand erhält einen hauchdünnen Harzüberzug. Selbst die feinsten Ritzen können auf diese Weise von Ungeziefer gesäubert werden. Das Benzin als solches würde auch schon seinen Teil dazu beitragen. Nur müßte man diese Arbeit im Freien vornehmen und auf die Feuergefährlichkeit der Benzindämpfe Rücksicht nehmen. Wie sich der Käfiganstrich dieser Methode gegenüber verhält, müßte ausprobiert werden. Ideal wäre es ja, wenn wir durch einen wässerigen Auszug das erwähnte Harz in Lösung bringen könnten. Das ist leider nicht der Fall. Man könnte vielleicht versuchen, das Harz mit Wasser zu emulgieren, d. h. dasselbe mittels geeigneter Mittel, etwa Gummi arabikum, mit Wasser in eine milchige Flüssigkeit verwandeln, die das Harz in feinster Verteilung enthält. Es wäre dann aber auch noch festzustellen, ob die Wirksamkeit nicht darunter leidet. Alle Lösungsmittel werden wohl den Käfiganstrich mehr oder weniger angreifen, um auch gleich die Kehrseite der Medaille zu zeigen. Einige andere Vorschriften zu einer Insektenpulvertinktur lauten:

I. Insektenpulver 100,0, Wasser 500,0, Spiritus 100,0, Pottasche 10,0, 8 Tage digerieren, filtrieren und beim Gebrauch zu zerstäuben.

II. Insektenpulver 1 Teil, Wasser und Spiritus je 2 Teile, sonst wie I.

III. Eine Vorschrift, die das erwähnte Harz verwenden läßt, lautet: Ein Insektenvertilgungsmittel von sehr starker Wirksamkeit wird erhalten, wenn man sich aus Insektenpulver einen petrolätherischen Extrakt herstellt, denselben zur Honigkonsistenz eindampft (im heißen Wasser (Wasserbad), nachdem die Flamme entfernt ist!) und mit Hilfe von etwas Salmiakgeist in der zehnfachen Menge 50 % Alkohol löst. Zum Gebrauch mit dem Zerstäuber evtl. unter Verdünnung mit der gleichen Menge Wasser zu vertreiben (Hell, Pharm. techn. Manuale).

Wir haben oben gesehen, daß Petroläther und nicht Alkohol das beste Extraktionsmittel für den wirksamen Stoff ist. I und II müssen demnach hinter einem Petrolätherauszug an Wirksamkeit zurückstehen. III wäre auszuprobieren. 1916 empfahl ich einen Auszug mit Ätherweingeist. (1 Teil Pulver, 1 Teil Äther, 2 Teile Spiritus.) Leider versäumte ich damals, Versuche an Fliegen damit anzustellen, die vielleicht in der Weise anzustellen wären, daß man einige Tropfen des Auszuges auf Fließpapier verdunsten ließe, dieses dann mit einem kleinen Spitz-

glase überdeckt und die Wirkung auf eine hineingebrachte Fliege beobachtete. Auf diese Weise könnten dann auch vergleichende Untersuchungen über die Wirksamkeit verschieden erhaltener Auszüge angestellt werden, vorausgesetzt, daß auch dieselbe Pulversorte dazu verwendet wäre. Ob der ätherweingeistige oder der petrolätherische Auszug den Vorzug verdient, müßte die Praxis lehren.

Die Aktiengesellschaft Riedel, Berlin, brachte vor einigen Jahren ein Insektenpulver heraus, das in der Weise erhalten wird, daß man Insektenpulver mit Petroläther u. dgl. auszieht und den hergestellten Extrakt auf leicht zerstäubbare Körper, z. B. Magnesiumkarbonat, überträgt und durch Abdunstenlassen das Extraktionsmittel entfernt. Auf diese Weise soll es gelingen, die Wirkung des gewöhnlichen Insektenpulvers in hohem Grade zu steigern (Pharm. Zeitg. 1917). Für unsere Zwecke kommt dieses Pulver nicht in Betracht wegen zu starken Stäubens des weißen Magnesiumkarbonates.

Über Prüfung eines Insektenpulvers gibt Siedler u. a. noch folgende einfache Methode an: Man schüttelt 1,0 Insektenpulver während 1 Minute kräftig in einem Reagensglase (oder einem Tablettenzylinder), entfernt das Pulver wieder aus demselben, gibt eine Fliege hinein, verschließt und beobachtet die Zeit, nach welcher diese mit eingezogenen Beinen am Boden liegt. Auf diese Weise kann sich der Liebhaber von der Güte eines gekauften Pulvers leicht überzeugen und auch zwei verschiedene Pulver miteinander vergleichen.

Zum Schluß möchte ich noch auf einige Pflanzenwollen aufmerksam machen, die speziell für den Prachtfinkenzüchter von Interesse sind. Es sind Kapok und die Wolle unseres auf feuchten Wiesen vorkommenden Wollgrases (Eryophorum). Beide gelten infolge ihres Gehaltes an einem Bitterstoff für milbensicher. Es wäre interessant, Versuche damit anzustellen. Kapok ist die neuerdings für Polsterzwecke (Kissen usw.) viel verwendete Pflanzenwolle von gelblicher bis dunkelbrauner Farbe, seidenähnlichem Glanz und hervorragender Weichheit, die aus den Samenkapseln tropischer Bombazeen gewonnen wird und sich sicher gut zum Auspolstern der Prachtfinkennester eignen würde. Nach Reichenow liegen die Eier der Muskatfinken in mit Bombaxwolle (Kapok) ausgepolsterten, sonst aus einem dem gewöhnlichen Hirsegrase ähnlichen Grase hergestellten Nest. Auch die Nonnen bevorzugen im Freileben Pflanzenwolle zum Auspolstern ihrer Nester. Sollte in diesen Berichten vielleicht ein Fingerzeig liegen, um die schwere Züchtbarkeit dieser Arten in unseren Vogelstuben und Käfigen wenigstens in etwas zu erklären? Über Kapok finde ich noch angegeben, daß Matthes und Streicher der Nachweis eines Bitterstoffes im Kapok gelang, der als gelblicher, zähflüssiger, wasserlöslicher Körper erhalten wurde und starke Giftwirkung zeigte. Ein Frosch von 50,0 g Gewicht wurde durch etwa 0,05 g innerhalb 20 Minuten getötet. Vielleicht kommen wir auch durch diese beiden Wollen dem Wunsche, die Milben aus den Nestern fernzuhalten, näher. Sollten hiermit und auch mit den Insektenpulverauszügen gute (die Nachteile bitte nicht vergessen anzuführen) Erfolge erzielt werden, so bitte ich die Erfahrungen an dieser Stelle bekanntzugeben. Da ich augenblicklich keine Vögel halten kann, kommen praktische Versuche für mich nicht in Frage. Sollte ich indessen den Liebhabern etwas Anregung durch obige Ausführungen gegeben haben, so wäre der Zweck dieser Zeilen erfüllt. Evtl. werde ich später, nachdem ich eigene Versuche habe machen können, darauf zurückkommen.

Ein Frühlingsmorgen im Emslande.

Von Hans Gravel, Essen.

(Nachdruck verboten.)

Frühling war es endlich geworden, und endlich war ich einmal wieder in der lieben Heimat, im Emslande. Der erste Tag nach meiner Ankunft war ein strahlender Sonnentag. Wie schnell hatte die

Mohrenkopf. Aufnahme von S. Lichtenstädt.

siegende Kraft des prunkenden Tagesgestirns die jungen Knospen geweckt! Die jungen Birken am Wege haben zaghaft ihr erstes, zartes Grün aufgesteckt, und schon steigt ihr süßherber Duft in die Lüfte. Die zutrauliche Goldammer schrillert so fröhlich in die Landschaft hinein, daß es eine Lust ist, dem schlichten Sange zu lauschen. Dazwischen tönt der scharfe Vagantenschlag des Edelfinken. Nun schreite ich auf weichem Sandwege durch dichten Fichtenwald. Zahlreiche Rotkehlchen lassen von den Wipfeln der Tannen ihre Silberglöckchenweise hören. Im Dickicht lacht der Schwarzspecht. Eine Heidefläche unterbricht den Tannenbestand. Hier steht auf heidebewachsenem Hügel, unter Birken und Wacholderbüschen, eine von mir errichtete Bank. Sie ist noch da. Leise winken die junggrünen Birkenzweige, die grünen Knospen der Lindenbäumchen und die schon kräftig entfalteten Blätter der Ebereschen, die ich selbst hier angepflanzt, mir einen Willkommensgruß zu, und glücklich aufseufzend lasse ich mich zu kurzer Rast nieder. Da — es ist, als wolle mir heute die Heimat einen besonderen Genuß verschaffen — höre ich neben mir auf dem Heidehügel einen leisen Lockruf: dirlit, dirlit. Ich horche auf. Gleich darauf ertönt es wieder und dann: didl, didl, didl,

didl, lu, lu, lu, lu, sanft lullend wie aus weiter Ferne, und doch so nahe. Es ist kein Zweifel, es ist die Heidelerche, die ich seit langen Jahren heuer zum ersten Male wieder in der Heimat höre. Und nun sehe ich es auch, durch die Zweige lugend, das anspruchslose Heidekind, das doch durch sein wohllautendes, einschmeichelndes, traumhaft schönes Lied das Herz höher schlagen läßt. Und — er ist nicht allein. Verbeugungen machend, mit hochgesträubter Haube und gespreiztem Schwanze entfaltet er vor seiner Liebsten ein liebliches Liebesspiel. Und nun zu zweit in die sonnigen Lüfte . . . didl, didl, didl . . . ihr glücklichen Kinder der Heide! Heute abend noch kehre ich zurück, um vielleicht das seltene Glück zu genießen, auf mondbeglänzter Heide ihr dann doppelt süßes Lied noch einmal zu hören. — Doch meine Morgenwanderung ist noch nicht beendet. Den Auwiesen wende ich mich zu, wo die Erlen nicken, wo Wassertümpel geheimnisvoll blinkern, wo der Elstervogel zackigen Fluges über die Fläche streicht, um jenseits bei den Erlen aufzubäumen. Hier nistet noch der Kiebitz; hier in diesen entlegenen Wiesen ist er ziemlich sicher vor den Kiebitzeiersuchern, die in schnöder Gewinnsucht diese Eier suchen, mit denen verwöhnte Feinschmecker ihren Gaumen kitzeln. Mit klagenden Rufen kommt ein Paar in weiter Entfernung von mir hoch, entfaltet die prächtigen Schwingen und kehrt nach kurzer Zeit zurück. „Kiwitt — woar bliwick?" Hier, in der Nähe des Flusses, ist ziemlich ausgedehnter Mischwald mit Buchen, Eichen, Eschen, Edeltannen und dichtem Unterholz. Durch ihn nehme ich meinen Rückweg zum Dorfe. Philomele hoffte ich hier zu hören, sie, die Königin der gefiederten Sänger, die deutsche Nachtigall. Doch vergebens — es ist wohl noch ein paar Tage zu früh. Als Ersatz unterhält mich eine Amsel noch ein Viertelstündchen mit ihren feierlich schönen Klängen. In sie tönt das Läuten der Mittagsglocke von der Dorfkirche herüber. Schnell eile ich heim — ein gutes emsländisches Mittagessen wartet auf mich.

Kleine Mitteilungen.

Über eine Kleinigkeit, die nach meiner Ansicht für das Wohlbefinden der Prachtfinken, Weber und Täubchen nur von Vorteil ist, habe ich noch nichts gelesen. Das ist mir auch leicht erklärlich, denn in jeder Voliere, ob groß oder klein, auch in jedem Käfig findet man stets als Einstreu nur den gelben Sand, in dem die Vögel so gern herumsuchen. Nun habe ich meine Gartenvoliere von 20 Quadratmeter Fläche mit gelbem Sand in der Mitte und an den Seiten mit Erde, in welcher Hülsen (Ilex), Tannen, Lebensbäume, Stachelbeer- und Johannisbeersträucher wachsen, belegt. Dieser Sand und die Erde werden jedes Jahr erneuert. Dazu hole ich die Erde aus einem Buchenwald. Man sollte kaum glauben, wie die Vögel sich darüber herstürzen, um die Erdhäufchen zu untersuchen. Sie picken unaufhörlich und finden sicher viele Würmer und Kerbtiere, die man für gewöhnlich gar nicht beobachtet. Um nun festzustellen, was in dieser Walderde alles darin verborgen ist, habe ich auf einem weißen Bogen Papier eine Handvoll Erde mit der Lupe untersucht und gefunden, daß darin an Kleintieren sich eine Unzahl aufhält. Von den Vögeln abgesuchte Erde enthält dagegen nichts als etwa dickere Regenwürmer, welche für die Vögel keine geeignete Nahrung sind. Nun ist es ja leicht möglich für jeden Liebhaber, in seine Käfige vielleicht zur Hälfte die Walderde einzustreuen, die glücklichen Besitzer von größeren Vogelstuben oder Gartenvolieren können es jedenfalls einmal versuchen. Ich weiß bestimmt, daß sie ihren Lieblingen eine große Freude damit machen. Dabei möchte ich noch bemerken, daß die Erde, welche unter Buchen und Eichen mit dem gefallenen Laub gesucht wird, dem Anschein nach besser geeignet ist als solche von Tannenwäldern, in denen die Ameisen wohl schon aufräumen, denn bei Tannenerde stellen die Vögel die Durchsuchung bald ein. Vielleicht macht der eine oder der andere Sportsfreund einmal einen Versuch und teilt seine Ansicht darüber mit.

E. S., Mitglied 83 der A. Z., Oldenburg i. Gr.

Vom Vogelmarkt.

Von seltener auf den Vogelmarkt kommenden Vögeln werden angeboten:

Joh. Götz, Neu-Ulm (Bayern): Schopfwachteln, schwarzkäppige Blauhäher, langschwänzige Glanzstare.

Eugen Müller, Küllstedt (Eichsfeld): 2,0 Mövchen, 0,1 Oryxweber, 1,1 Gelbscheitelweber.

Pichler, Wien III, Klimschgasse 18: Schamadrossel, Zuchtpaar Silberohrsonnenvögel.

W. Voigt, Jena, Feodorastraße 13: 1,1 blaub. Sperlingspapageien.

Zahnarzt Weinheimer, Plauen i. Vogtland, Klösterlein 2 (A. Z.-Mtgl. 71): 2,2 Gilbweber.



Herrn K., München. Das erste Futter für junge Fasanen ist ein Gemisch von gleichen Teilen feingeriebener altbackener und auf dem Herd getrockneter Semmel oder Zwieback und feingehacktem Eigelee. Daneben werden reichlich frische Ameisenpuppen und vom dritten Tage an auch feingehackter Salat oder Gartenkresse sowie zerschnittene Mehlwürmer gereicht. Eigelee wird in folgender Weise hergestellt: Eiweiß und Dotter frischer Hühnereier wird vermittels eines Quirls gut durcheinandergemischt, dazu wird vorsichtig bis zum Sieden erhitzte gute Kuhmilch gegossen, wobei das Eigemisch nicht gerinnen darf, und zwar auf jedes Ei etwa 1—1½ Eßlöffel Milch. Milch und Ei werden gleichfalls gut verquirlt und nachdem das geschehen, mit Wasserbad bis zum Festwerden gekocht.

Herrn B. Sch., Berlin-Lichterfelde. Es ist wohl zweifellos, daß die hochgradige Giftigkeit des Goldregens, den die Vögel benagten, die Ursache des Eingehens ist. Die Verwendung von Dachpappe als Käfigeinlage, unter der Sandschicht, ist den Vögeln ohne weiteres nicht schädlich. Wenn aber Papageien die Dachpappen benagen und Teile davon verzehren, so kann ihnen das natürlich schädlich werden. Das Einstreuen einer dicken Sandschicht würde verhindern, daß die Papageien an die Dachpappe gelangen können.

Herrn R. H., Kehlheim. Bei dem Kadaver des jungen Stars war die Fäulnis schon soweit fortgeschritten, daß eine Untersuchung nicht mehr vorgenommen werden konnte. Bei der Auffütterung junger Stare ist zu beachten, daß ihnen in den ersten Tagen nach Entnahme aus dem Nest Futter gereicht werden muß, das ungefähr dem natürlichen Futter entspricht, das die alten ihnen reichen, also kleine, glatte Raupen, weichhäutige Kerfe, frische Ameisenpuppen, allmählich können dann andere Futterbestandteile, wie Semmel, am besten Milchsemmel, gekochtes Ei, am besten in Form von Eigelee, rohes Fleisch in nicht zu großer Menge, sehr reichlich gegeben erzeugt es Durchfall, und allmählich auch die anderen Bestandteile der Futtergemische gereicht werden. Wenn die Entleerungen nicht die Form der von einer Haut umhüllten Kotballen haben, so ist das ein Zeichen dafür, daß die Verdauungstätigkeit nicht in Ordnung ist. — Bei dem Kanarienweibchen liegt eine individuelle Veranlagung vor, es ist zur Zucht nicht verwendbar. Es ist besser, wenn der Hahn mit dem Weibchen zusammenbleibt.

(Fortsetzung auf der 2. Umschlagseite.)

Jahrgang 53 — 12. Juni 1924 — Heft 17

DIE GEFIEDERTE WELT.

ZEITSCHRIFT FÜR VOGELLIEBHABER

Begründet von Dr. Karl Ruß

Herausgegeben von Karl Neunzig in Berlin-Hermsdorf

Inhalt:

Früchte. Von Emil Kaforke, Berlin.
Über den Gesang einiger nordamerikanischer Drosseln. Von G. P.
Neueinführungen und Seltenheiten. Von Karl Neunzig. (Forts.)
Bekämpfung des Ungeziefers. Von Apotheker Stöcker, Hamburg. (Schluß.)
Ein Frühlingsmorgen im Emslande. Von Hans Gravel, Essen.
Kleine Mitteilungen - Vom Vogelmarkt - Redaktionsbriefkasten - Aus den Verbänden - Aus den Vereinen.

Abonnement monatlich (4 Nummern) 1.50 Gm. — Einzelpreis des Heftes 50 Gpf.
vermittelt das nächste Postamt bzw. der zuständige Briefbote. / Postversand ab Burg Bez. Magdeburg.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung / Magdeburg / Postschließfach 148

Aus den Verbänden.

Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber. Bericht. Am 7. Mai 1924 fand die erste Sitzung des geschäftsführenden Vorstandes statt. Eingegangen war ein Schreiben von Herrn Weber (Hamburg) mit den Bedingungen, unter denen er uns die Schreibmaschine zur Verfügung stellt. Der Vorbehalt des Eigentumsrechtes wurde anerkannt und die Verpflichtung zur Versicherung gegen Diebstahl usw. übernommen, ebenso die Verpflichtung zur Übersendung nach Jahresfrist zwecks Durchsicht. In einer Karte erklärt Herr Neunzig die Behauptung bei der Gründungsversammlung, er habe den Aufruf zur Gründungsversammlung wie auch Verbands- und Vereinsberichte in der Gef. Welt nicht aufgenommen, für unwahr. Davon wird Kenntnis genommen. Die Satzungen des Reichsverbandes werden auf Empfehlung von Gerichtsseite zur Vorprüfung eingereicht, etwaige Änderungen, die nur technischer bzw. redaktioneller Natur sein können, werden zur Kenntnis und Genehmigung gebracht werden. Die Geschäftsstelle befindet sich bei dem ersten Schriftführer Rud. Petters (Leipzig-Probsth.), Preußenstr. 31. Alle Zuschriften werden dorthin erbeten. Die Einrichtung von Kauf- und Tauschgelegenheit wird Herrn Vorwerk übertragen, der nach eingehendem Studium berichten und die Einrichtung organisieren wird. Zum Studium der bestehenden Landesvogelschutzgesetze und örtlichen Bestimmungen bitten wir um Überlassung je eines Stückes, um die Bekämpfung von Härten und Mängeln einleiten zu können. Der Reichsverband wird Postscheckkonto erhalten. Einzahlungen bitten wir an den Kassierer, Herrn Werner Geßler (Leipzig), Dresdener Str. 2, vorzunehmen. Petters, 1. Schriftführer.

Vereinigung der Vogelliebhaber Landesverband Sachsen und Großthüringen. Bericht. Unter zahlreicher Beteiligung der dem Landesverband angeschlossenen Vereine und Mitglieder fand am 18. Mai 1924 die Jahresversammlung des Verbandes statt. Über das Wesentliche der Geschäftsvorgänge ist kurz folgendes zu berichten: Aus dem Jahresbericht: Der Verband zählt 13 Vereine mit 519 Mitgliedern und 18 Einzelmitglieder. Aufgenommen wurden im Laufe des Geschäftsjahres 240 Vereins- und 4 Einzelmitglieder, ausgetreten ist infolge Zersplitterung ein Verein mit 39 Mitgliedern, so daß zurzeit ein Bestand von 537 Mitgliedern vorhanden ist. Die Einnahmen betrugen unter Außerachtlassung des entwerteten Geldes 64,70 G.-M. und die Ausgaben 45,90 G.-M., so daß ein Kassenbestand von 18,80 G.-M. vorhanden ist. Im Rückstande mit der Umlage von 30 Pf pro Vereins- und Einzelmitglied fürs Jahr 1923 sind 9 Vereine. Aus den Versammlungsbeschlüssen: Die Wahl des Vorstandes ergab folgende Zusammensetzung: die Herren Höhne (Leipzig) 1., Waak (Leipzig) 2. Vorsitzender; Hunger (Leipzig) 1., Roth (Leipzig) 2. Schriftführer; Böttcher (Leipzig) Kassierer, Herr Paul Schwarz für den Leipziger Verein; die jeweiligen ersten Vorsitzenden der angeschlossenen Vereine und die Herren Birk und Petters vom geschäftsführenden Vorstande des Reichsverbandes als Beisitzer; Kassenprüfer sind die Herren Höll (Chemnitz) und Rausch (Zwickau). An Beiträgen werden erhoben jährlich von jedem Vereinsmitgliede 1 M., von jedem Einzelmitgliede 3 M. Davon führt der Landesverband für jedes angeschlossene Vereinsmitglied jährlich 30 Pf. und jedes Einzelmitglied 2 M. an den Reichsverband ab. Das erste Viertel der Beiträge muß spätestens am 1. Juni 1924 im Besitze des Landesverbandes sein. Die Vereine, die mit den 30 Pf. Umlage im Rückstande sind, haben sie noch nachzuzahlen. Verbandsorgan ist die „Gef. Welt". Der Jahresversammlung ging ein recht wohl verlaufener Begrüßungsabend voraus und schloß sich eine Vogelschau an. Über beides zu richten ist anderer Stelle vorbehalten. — Wir ersuchen unsere angeschlossenen Vereine um recht baldige Angabe der Mitgliederzahl zur Vervollständigung unserer Statistik. Wegen Verzögerung der Bekanntmachung des vorstehenden Berichtes kann der auf den 1. Juni 1924 festgesetzte Einzahlungstermin nicht eingehalten werden. Wir sind damit einverstanden, wenn das erste Viertel der Beiträge bis zum 15. Juni 1924 gezahlt wird. Petters.

Vereinigung der Vogelliebhaber Landesverband Sachsen. Am 17. und 18. Mai 1924 fand die zweite Jahresversammlung statt, zu welcher mehrere Vertreter auswärtiger Vereine sich bei der gastgebenden Ortsgruppe Leipzig eingefunden hatten. Den Auftakt gab ein Begrüßungsabend, welcher allen Teilnehmern, mit dem Bewußtsein ein paar frohe Stunden verlebt zu haben, lange in Erinnerung bleiben wird. Besonders erwähnt sei hier das Unikum Herr Winkler, dies war schon ein Programm für sich, und wer des Lachens müde, der erholte sich an den herrlich gesungenen und unserm edlen Sport angepaßten Liedern des Doppelquartetts Rüffer. Die Geschwister Schwarz und Frl. Böttcher mit ihren stimmungsvollen Liedern zur Laute trugen ebenfalls wesentlich zu dem Gelingen des Abends bei. Allzuschnell vergingen die Stunden, und die vorgerückte Zeit ermahnte zur Nachtruhe, erwartungsvoll für den kommenden Tag. Doch ehe ich weitergehe, allen den Genannten, den Schöpfern dieser fröhlichen Stunden, herzlichsten Dank. Sonntag, den 18. Mai, früh 1/2 11 Uhr, eröffnete der Vorsitzende, Herr Johann Birk, mit einem herzlichen Willkomm die Sitzung. Dieselbe nahm einen glatten Verlauf und brachte manch Interessantes für die auswärtigen Vertreter zutage. Doch soll Bericht über das Geschäftliche nicht meine Aufgabe sein. Vielmehr will ich versuchen die Eindrücke wiederzugeben, welche die an einer Seite des Lokals befindliche Vogelschau auf uns machte. Rund 60 Einzel- sowie ein Gesellschaftskäfig, welche vorwiegend Sängerfürsten beherbergten, zogen das Interesse aller auf sich, so daß unser Herr Vorsitzende oftmals die Anwesenden erinnern mußte, doch wenigstens ein Ohr der geschäftlichen Angelegenheit zu widmen. Und im Interesse der letzteren war es von Vorteil, daß nicht mehr mit ihrem Stimmaterial aufwarteten. Es war wohl das Beste, wie auch in Gefieder und Käfigen, was hier vorhanden war, um den Hochstand der Liebhaberei unseres Leipziger Brudervereins vor Augen zu führen. Und ich bedauere nur wie auch unser Vorsitzender, Herr J. Birk, daß nicht mehr Mitglieder von den auswärtigen Ortsgruppen sich diesen Genuß zu Gemüte führen konnten. Ich bitte deshalb die Herren Vertreter für den Besuch der Jahresversammlung des Landesverbandes im nächsten Jahre unter ihren Mitgliedern mehr zu agitieren. Denn es ist nichts geeigneter, die Begeisterung für unseren Sport zu fördern, als derartige Veranstaltungen. In Anbetracht des gemütvollen Eindrucks, den diese Vogelschau auf uns Vertreter machte, muß ich unseren Leipziger Sportskollegen für ihre große Bemühung sowie den Herren, welche in liebevoller Weise uns Quartier zur Verfügung gestellt haben, aufs herzlichste danken. Zum Schluß bitte ich den Gesamtvorstand der Vereinigung der Vogelliebhaber Landesverband Sachsen, insbesondere den 1. Vorsitzenden, Herrn J. Birk, für seine vielseitige, aufopfernde Tätigkeit im Interesse unseres edlen Sportes unseren innigsten Dank entgegennehmen zu wollen, mit dem Wunsch auf ein frohes Wiedersehen im nächsten Jahre!

Zugleich im Auftrag der anwesenden auswärtigen Vertreter
Bernhard Kühn,
vom Verein Vogelschutz und -pflege, Dresden.

Aus den Vereinen.

Angemeldet ist Herr Lokalkaplan S. Schwing, Osthausen b. Ochsenfurt i. Bayern. — Auf den Aufruf im Rundschreiben sind eingegangen und abgeliefert von Ludwig (Halle) 3 M., Krabbe (Anklam) 5 M., Frl. Biese (Helsingfors) 2 Dollar; insgesamt 16,40 M. Weitere Spenden werden gerne entgegengenommen. A. Krabbe.

Vereinigung hannoverscher Vogelliebhaber. 41. Mitglieder-Versammlung, 2. Mai 1924. Anwesend 32 Personen, unter den Gästen der bekannte hessische Vogelkundige Sunkel, der, ganz auf sich gestellt, mit fabelhaftem Fleiß und großer Sachkenntnis die heimische Vogelwelt erforscht und beschrieben hat, und der auf der Durchreise nach der Nordseeinsel Mellum war, wo er mehrere Monate Vogelwärter sein wird. Er brachte uns wertvolle Anregungen, die wir für unsere Vereinsarbeit benutzen wollen. Der Abend hat uns überhaupt eine ganze Reihe von Plänen gewiesen, vor allem durch unser neues Mitglied Dr. Weigold, und wir wollen nun in den nächsten Monaten eifrig arbeiten, um vieles davon zur Wirklichkeit werden zu lassen und auch, soweit das bei uns Laien möglich ist, wissenschaftliche Erfolge zu liefern. Wie üblich, gab es viele Eingänge zu besprechen, preiswertes Futter wurde verkauft, über den guten Erfolg unserer Wanderungen berichtet, an denen noch viel mehr Mitglieder teilnehmen müssen, als es schon geschieht. Der Vorsitzende wies darauf hin, daß wir nicht nur Vögel pflegen wollen, sondern uns auch draußen an ihnen freuen und sie schützen müssen. Wir wollen Naturfreude in größere Kreise bringen und

(Fortsetzung auf der 3. Umschlagseite.)

recht viele Mitglieder werben, die, ohne Vogelhalter zu sein, in dieser Richtung bei uns Vertiefung und Belehrung suchen. Freiherr von Berlepsch, der bekannte Vogelschützer, richtet in Hannover demnächst größere Vogelschutzanlagen ein, und wir hoffen, ihn auch einmal zu einem besonderen Lehrgange und zu einem Vortrage gewinnen zu können. Der in drei Vorstellungen vorgeführte Mellum-Film hat viel Freude und Begeisterung ausgelöst. Im Herbst sollen die Vorführungen in Verbindung mit anderen Vereinigungen auf gößerer Grundlage wiederholt werden. — Die Mitglieder werden darauf hingewiesen, daß sie schleunigst sich bei Capelle als Bezieher frischer Ameisenpuppen eintragen müssen, wenn sie solche gebrauchen. Der Hauptteil des Abends war durch einen gründlichen, fesselnden, sachkundigen Vortrag unseres auswärtigen Mitglieds, Lehrer Ottens, Eilvese, ausgefüllt. Er sprach über unsere zahlreichen und viel zu wenig bekannten Eulenarten und bedauerte, daß diese dem Landwirt so nützlichen Mäusevertilger nach wie vor sinnlos verfolgt und geschossen werden, nur weil sie Nachttiere sind, merkwürdige Laute ausstoßen und dadurch zu allerhand blödem Aberglauben Anlaß gegeben haben. Wir müssen diese kraftvollen, in ihrer Lebensweise so interessanten Tiere schützen, über ihre Bedeutung im Naturhaushalt aufklären und Vorurteile beseitigen helfen, sonst kommt es dahin, daß neben dem fast ausgestorbenen Uhu auch die anderen Arten allmählich aus unserer engeren Heimat verschwinden. Appel.

Verein der Vogelliebhaber Dortmund und Umgegend. Jahresbericht zum einjährigen Bestehen unseres Vereins. — Generalversammlung am 27. April 1924 im Lokal „Thüringer Hof". Von großer Liebe für unsere heimische Vogelwelt durchdrungen, faßte ich vor einem Jahre den Entschluß, uns Vogelliebhaber, alte Bekannte und noch fremde Kollegen wieder zu einem Verein zusammenzuschließen. Meiner Aufforderung zufolge waren denn auch am 17. Mai 1923 (am Gründungstag unseres Vereins) sieben Herren zusammengekommen, um als echte Vogelliebhaber den Grundstein für die Neugründung unseres Vereins zu legen. Wir haben im ersten Vereinsjahre schwere Sorgen überstanden, denn nachdem wir zirka ½ Jahr unsere Versammlungen im alten Lokal: „Zum Schieferhäuschen" an der Krukelke abgehalten hatten, setzten in Deutschland die Geldentwertung und Arbeitslosigkeit ein, so daß es uns nicht mehr möglich war, uns in der Wirtschaft bei den teuren Preisen zu versammeln. Um aber auf jeden Fall alle unsere Kollegen für unsere edle Liebhaberei musterhaft zusammenzuhalten, wurde beschlossen, abwechselnd die Mitgliederversammlungen bei den Kollegen in den Wohnungen abzuhalten. Trotz des furchtbaren Wirtschaftselendes und dank unserer Einigkeit für unsere edle Sache haben wir alle fest und treu zum Verein gehalten und sind so über den Berg hinweggekommen. Unser Kollege Pistor stiftete im Monat August 1923 in dankenswerter Weise dem Verein einen neuen Vereinsschrank. Vom 8. November 1923 bis zum 24. Februar 1924 haben wir die Versammlungen bei den Kollegen abgehalten. Seit dem 30. März 1924 haben wir nun wieder ein schönes Vereinslokal hier im „Thüringer Hof", Mallinkrodstr. 180, woselbst die Versammlungen alle vier Wochen, also jeden 4. Sonntag im Monat, abends 6 Uhr beginnend, bis auf weiteres stattfinden. Seit Bestehen unseres Vereins sind wir dem Landesverband Preußen in Berlin und seit dem 25. November 1923 der Süddeutschen Vogelwarte in Stuttgart als Mitglied angeschlossen. Im Verein werden die Zeitschriften: „Gef. Welt", „Die Vogelwelt" und die „Monatsberichte der Süddeutschen Vogelwarte" gehalten, welche allen Mitgliedern zur Verfügung stehen. Die Arbeiten im ersten Jahre des Bestehens des Vereins waren folgende: Es wurden 19 Vereins- und eine außerordentliche Versammlung abgehalten. Am 27. September 1923 wurde ein gemütlicher Familienabend im alten Lokal abgehalten. Am 21. Oktober 1923 haben wir dem Naturwissenschaftlichen Museum einen Besuch abgestattet. Unsere sehr gemütliche Weihnachtsfeier fand am 29. Dezember beim Kollegen Steenkamp statt. Zur Beobachtung der Vogelwelt im Winter wurde am 6. Januar 1924 ein Morgenspaziergang nach Huckorde unternommen. Besondere belehrende Vorlesungen wurden gehalten über: 1. Die Grundregeln der Stubenvogelliebhaberei von J. Birk; 2. Ein Wort zur Weichfresserfütterung von Dr. Boxberger; 3. Etwas über Sumpfrohrsänger, Brustbeinabmagerung und Weichfresserverpflegung von Koll. Thiehmann; 4. Die Vogelausstellung in Leipzig am 17. und 18. Dezember 1923; 5. Etwas über das Spotten der Singvögel (Liebhabererlebnisse); 6. Die Bekämpfung der Milbenfrage von F. Mielert; 7. Die Haltung des Rotkehlchens von Koll. Lappe; 8. Wie verpflege ich mein Rotkehlchen? („Ges. Welt"); 9. Vom Nesterbau der Vögel von F. Mielert. — Generalversammlung am 27. April 1924. 1. Neuwahl des Vorstandes. Wiedergewählt wurden die Herren: Vorsitzender Paul Steenkamp, Schriftführer Sondermann, Bücherwart Schulte, neugewählt als Kassierer Hornig; als Beisitzer in den Vorstand wurde Bohr gewählt. 2. Aufnahme neuer Mitglieder. Es meldete sich Herr Willy Duder, Steinstr. 58, selbiger wurde einstimmig als Mitglied aufgenommen. Unter Punkt 3 wurden die rückständigen Beiträge bezahlt. 4. Besprechung unseres Morgenausfluges. Vorschlag zum Gräfingholz und nach Mengede zum Vogelparadies. Der letzte Vorschlag vom Kollegen Lappe fand die Stimmenmehrheit, und fand der Ausflug am Sonntag, dem 11. Mai, statt. Nach Verlauf der Tagesordnung begann der gemütliche Teil zu unserem 1. Stiftungsfeste, wozu die anwesenden Damen und Herren ihr Bestes beitrugen. Ebenso hatten es sich die erschienenen Kollegen vom Hörder Verein nicht nehmen lassen, das Fest verschönern zu helfen. Bei gemeinschaftlichen Liedern und humoristischen Vorträgen blieben wir bis 12 Uhr nachts im frohen Kreise zusammen.

Paul Steenkamp, Vorsitzender.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei zu Hamburg. Sitzungen finden statt jeden 1. und 3. Dienstag im Monat in Hüttmanns Hotel, Poolstr. 22, abends 8¼ Uhr. Nächste Sitzung Dienstag, den 17. Juni 1924.

J. A.: Arnold Weber, 1. Vorsitzender.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig. Vereinssitzungen jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat im Vereinslokal, „Bauers Brauereirestaurant", Tänbchenweg. Nächste Sitzung am 19. Juni 1924. Gäste stets willkommen.

J. A.: Johann Birk, 1. Vorsitzender.

Verein der Vogelfreunde Leipzig-Plagwitz. Vereinslokal „Gosenschlößchen", Leipzig-Plagwitz. Sitzungen an jedem 1. und 3. Montag des Monats, abends 8 Uhr. Vogelfreunde sind stets willkommen.

J. A.: Karl Scholtissek, 1. Vorsitzender, Leipzig-Plagwitz, Lauchstädter Straße 30.

Für Aquarienfreunde.

Praxis der Aquarienkunde. Aus der Praxis für die Praxis. Von Dr. E. Bade. 4. und 5. Auflage. Mit 1 Farbentafel, 12 Schwarzdrucktafeln und 203 Textabbildungen. Kart. 5.— M.

Die ausländischen Aquarienfische, ihre Naturgeschichte, Pflege und Züchtung. Von Dr. E. Bade. Mit einer Farbentafel und vielen Abbildungen im Text. (Erscheint demnächst! Preis ca. 5.— M.)

Katechismus für Aquarienliebhaber. Fragen und Antworten über die Einrichtung, Besetzung und Pflege des Süßwasser-Aquariums sowie über Krankheiten und Züchtung der Fische. Von Wilh. Geyer. 8. u. 9. von Hans Geyer besorgte Aufl. Kart. 3.— M.

Zimmer- und Freiland-Aquarienpflanzen. Von Mönkemeyer. Mit 26 Abbildungen. Kart. 1.20 M.

Der Schleierschwanz und der Teleskopschleierschwanz, ihre Zucht, Pflege und die Beurteilung ihres Wertes. Von Dr. E. Bade. Mit 5 Schwarzdrucktafeln u. 19 Textabbildungen. Geh. 2.— M.

Die künstliche Fischzucht. Von Dr. E. Bade. Mit 2 Schwarzdrucktafeln und 16 Textabbildungen. Geh. 1.— M.

Das Seewasser-Aquarium, seine Einrichtung, seine Bewohner und seine Pflege. Mit einem Anhange: Das Brackwasser-Aquarium. Von Dr. E. Bade. Mit 1 Farbentafel, 14 Schwarzdrucktafeln u. 104 Textabb. Kart. 5.—, geb. 6.— M.

Für Terrarienfreunde.

Deutschlands Amphibien and Reptilien. Eine Beschreibung und Schilderung sämtlicher in Deutschland und den angrenzenden Gebieten vorkommenden Lurche und Kriechtiere. Von Bruno Dürigen. Mit 12 Farbentafeln u. 47 Textabb. Geb. 20 M.—.

Praxis der Terrarienkunde. Terrarium und Terra-Aquarium. Von Dr. E. Bade. Vergriffen! Neue Auflage Ende des Jahres!

Katechismus für Terrarienliebhaber. Fragen und Antworten über Einrichtung, Besetzung und Pflege des Terrariums. Von Hans Geyer. Kart. 2.— M.

Zu beziehen durch:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg / Postschließfach 148

Anzeigenteil

Die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 20 G.-Pf. berechnet. Aufnahme erfolgt gegen Voreinsendung des Betrages in Reichsgeld pe
Brief od. auf unseren Zahlstellen: Postscheckkonto: Magdeburg 3148, Wien 156 687, Bern III 4326, Prag: Creditanstalt d. Deutschen unter Angabe des Zweckes

Käfige u. Gerätschaften

Schindler-Käfige

2 Grasmückenkäfige, 1 Drosselkäfig, 1 Exotenkäfig,
1 Pfund selbstgetrocknete Ameiseneier
gegen Gebot. [426

Lehrer **Krebs, Wolfstein** (Rheinpfalz).

Futtermittel

Mehlwürmer

geg. Einsend. v. 2.— Rentenmark 1/4 Pfd. franko versend. **D. Waschinski & Co.,** Biesenthal I (Mark). [427

Vogelfutter [428

für Kanarien, Waldvögel, Exoten, Papageien, Weichfresser. Anfragen nur gegen Rückporto. Liste 13 über Vogelfutter, Liste 5 über Vogelkäfige, Zuchtgeräte usw. mit etwa 400 Abbild.

W. Göpel, Leipzig,
Tröndlinring 1. Telephon 14 958.

Mehlwürmer neue, feinste Qualität, Pfd. 8 ℳ
429] **Jeltner, Breslau,** Weinstr. 12.

Ornis-Haus Halle-Saale

Gegründet 1912

Spezialität:
Individuelle Weichfresserpflege nach Angaben des Herrn Apotheker Adalbert Jena-Biberach-Riß. (Alleiniges Herstellungsrecht.)

Reform-Normal I, Volierenm.,
Reform-Normal II, f. Rotkehlchen, Schwarzplatten usw.,
Reform-Normal III, f. Nachtigall., Sprosser usw.,
Reform-Normal IV, f. Gelbspöti., Goldhähnchen usw.,
Reform-Normal V, f. Schama usw.,
Körnerfutter Ia für jede Vogelart. [430

Inhaber langjähriger Fachmann, siehe „Ornis-Buch" (90 S.) Mk. 1
Preisliste auf Wunsch!

Vögel

Gelbe Wellensitt. Paar 30 ℳ
Grüne „ „ 25 ℳ
Alexandersittiche „ 25 ℳ
8,0 jap. Mövchen „ à 10 ℳ
431] und sonstige Vögel.
Anfragen Rückporto beifügen.

Friedrich Frank
München
Gabelsbergerstr. 9.

Gr. Wellensittiche

frisch importiert, blaufüßig, Paar 22 ℳ.
Ernst Schöndube, Berlin N.,
432] Elisabethkirchstraße 1.

Sittiche, Araras, Kakadus, Amazonen, Edelpapageien, Zwergpapageien, Kragenpapageien, Loris, kleine Affen für eigene Sammlung zu kaufen gesucht. Angebote mit genauer Beschreibung und Preis an
433] **Fliegner, Lehrte-Hannover.**

Gartenbau-Bücherei

Herausgegeben von
Prof. **Dr. Udo Dammer,** Kustos des Botanischen Gartens Berlin-Dahlem.

Jeder Band 1.20 M.

Bd. 1. **Monatskalender des Pflanzen- und Gartenfreundes.** Von Prof. Dr. Dammer. 2. Auflage.
Bd. 2. **Zimmerblattpflanzen.** Von Prof. Dr. Dammer. 2. Auflage. Mit 48 Abbildungen.
Bd. 3. **Gewürzkräuter.** Von Obergärtner Bode. Mit 6 Abb.
Bd. 4. **Balkonpflanzen.** Von Prof. Dr. Dammer. 2. Auflage. Mit 41 Abbildungen.
Bd. 5. **Zimmerblütenpflanzen.** Von Prof. Dr. Dammer. 2. Auflage. Mit 23 Abbildungen.
Bd. 6. **Die ein- und zweijährigen Gartenpflanzen.** Von Gartenbaudirektor Goeschke. Zurzeit nicht lieferbar!
Bd. 7. **Der Gartenrasen.** Von Obergärtner Bode. Mit 14 Abb.
Bd. 8. **Die Farnpflanzen unserer Gärten.** Von Inspektor Mönkemeyer. Mit 15 Abbildungen.
Bd. 9. **Der Zwergobstbau.** Von Gartenbaudirektor Koopmann. Mit 6 Abbildungen. Zurzeit nicht lieferbar!
Bd. 10. **Die Staudengewächse.** Von Gartenbaudirektor Goeschke. Mit 35 Abbildungen.
Bd. 11. **Gemüsebau auf Gartenbeeten.** III. Teil. Von Gartenbauinspektor Lindemuth. Mit 20 Abbildungen. Vergriffen.
Bd. 12. **Pfirsiche und Aprikosen.** Von Obergärtner Kotelmann. Mit 13 Abbildungen.
Bd. 13. **Schönblühende Zwiebelgewächse.** Von Gartenbauinspektor Lindemuth. Mit 30 Abbildungen.
Bd. 14. **Blütensträucher.** Von Gartenbaudirektor Goeschke. Mit 28 Abbildungen.
Bd. 15. **Gemüsebau auf Gartenbeeten.** I. Teil. Von Gartenbauinspektor Lindemuth. Mit 22 Abbildungen.
Bd. 16. **Die Beerensträucher.** Von Gartenbauinspektor Maurer. 2. Auflage. Mit 14 Abbildungen.
Bd. 17. **Bunte Gehölze.** Von Gartenbaudirektor Goeschke. Mit 1 Tafel.
Die Tabakpflanze. Ein Handbuch zu ihrer Anzucht und Verwertung für jedermann. Von A. Oertel. 2. Auflage. —.60 M.
Bd. 18. **Gemüsebau auf Gartenbeeten.** II. Teil. Von Gartenbauinspektor Lindemuth. Mit 22 Abbildungen.
Bd. 19. **Gurke, Melone, Kürbis.** Von Inspektor Lange. Mit 15 Abbildungen.
Bd. 20. **Der kleine Villengarten.** Von Gartenarchitekt Pfyffer v. Altishofen. Mit 20 Abbildungen und 3 Tafeln.
Bd. 21. **Das Mistbeet.** Von Obergärtner Bode. Mit 5 Abbildungen.
Bd. 22. **Die Gartenlaube.** Von Landschaftsgärtner Klamun. Mit 14 Abbildungen.
Bd. 23. **Das Weinspalier.** Von Gartenbaudirektor Koopmann. Mit 17 Abbildungen.
Bd. 24. **Die Kultur der schönblühenden Orchideen.** Von Inspektor Ledien. Mit 7 Abbildungen.
Bd. 25. **Zimmer- und Freiland-Aquarienpflanzen.** Von Inspektor Mönkemeyer. Mit 26 Abbildungen.
Bd. 26. **Rosen.** Von Gartenbaudirektor Koopmann. 2. durchgesehene und ergänzte Auflage. Mit 17 Abbildungen.
Bd. 27. **Einfassungspflanzen.** Von Gartenbaudirektor Goeschke. Mit 44 Abbildungen.
Bd. 28. **Nadelhölzer.** Von Prof. Dr. Dammer.
Bd. 29. **Schönblühende Knollengewächse.** Von Gartenbauinspektor Lindemuth. Mit 20 Abbildungen.
Bd. 30. **Der Spargel.** Von Inspektor Dreßler. Mit 10 Abb.
Bd. 31. **Die Erdbeere.** Von Dozent Dr. Fürn. Mit 13 Abb.
Bd. 32. **Palmen.** Von Prof. Dr. Dammer. Mit 29 Abbildungen.
Bd. 33. **Gewächshaus des Privatmannes.** Von Inspektor Ledien. Mit 8 Abbildungen. Zurzeit nicht lieferbar!
Bd. 34/36. **Gartenfeinde und Gartenfreunde.** Die dem Gartenbau schädlichen und nützlichen Lebewesen. Von Prof. H. Kolbe. Mit 75 Abbildungen. 3.60 M.
Bd. 37/39. **Theorie der Gartenarbeiten.** Ein Katechismus des Pflanzenbaues. Von Prof. Dr. Udo Dammer. Mit 23 Abbildungen. Preis 4.60 M.

In Vorbereitung: **Champignon-Zucht. — Kakteen.**
Die besten Speiseschwämme von Gotth. Hahn. Mit naturgetreuen kolorierten Abbildungen auf 12 Tafeln. 1.20 M.

Zu beziehen durch:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlg., Magdeburg
Postschließfach 148.

Verkaufe:

2 Zuchtp. jap. Mövchen je 20
2 einzelne kräft. Männchen je 5
Dr. A. Schröter, Leipzig-Connewit
434] Auerbachstraße 7, II.

Gebe ab: Prima Blaukehlche in Tausch geg. Vogelbüch
H. Eberhardt, Nordhausen,
435] Altendorf 36.

Sofort lieferbar
Fleißig schlagende prima
Wachtelhähn
Stück 7,50 Mk.
u. and. Vögel u. Tiere empfieh
A. Schwarz, Weißenfels
436] Klingenplatz 8.

Vertausche

3 Blaukehlchen (keine Wildfänge), zu Teil fingerzahm, 1 Schwarzkopf, 1 R kehlchen, alle im Gesang und lange e gewöhnt, tadellos im Gefieder, geg Exoten. Angebote erbeten an [
Emil Urban, Karlsruh
Hirschstraße 89.

2,0 jap. Mövchen

gegen 0,2 zwecks Blutauffrischung tauschen oder kaufen gesucht. Weiter suche 0,1 Zebrafink, 0,2 Wellens
438] **Erlemann, Wiesbad**

Verk.: 1,0 amerik. Spottdro aalglatt, Ia Gefieder, 45 1,1 Harzer Kanarien 18 ℳ, tausche gegen fremdländische Körnerfresser. [
Saller, Planegg bei Münch
Christinestraße 7.

Für Kanarienzüchte

Soeben erschienen:

Die Farben- und Gestal kanarien
nebst Beschreibung aller v schied. Kanarienrassen, be Entstehung, Form- u. Farb veränderung, Bastardzuch Farbenfütterung v. A. Asch brenner. Mit vielen f haltigen Abb. Kart. 1.75

Wichtig zur Zucht:

Der Kanarienvogel,
seine Naturgeschichte, P u. Zucht von Dr. Karl R 14. Auflage. Mit 2 Far tafeln und zahlreichen T abbildungen. Bearbeitet Karl Neunzig.
Kart. 2.50

Zu beziehen durch:
Creutz'sche Verlagsb handlung, Magdebur
Postschließfach 148.

Inserate

für das am 19. Juni 1924 zur gabe gelangende Heft 18 der Welt erbitten bis 14. Juni 1924

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Hermsdorf bei Berlin; für den Anzeigenteil: Rolf Kretschmann, Magdeburg, Postschließfach 1
Verlag der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck: August Hopfer, Burg Bz. Mgdbg.

Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Jahrg. 53 | Den 19. Juni 1924 | Heft 18

(Druckort: Burg, Bezirk Magdeburg.)

Vogelberge und Vogelfang auf den Färöer Inseln.

Von Dr. J. Wiese, Berlin-Friedenau.

(Nachdruck verboten.)

Zu den vielen Eigentümlichkeiten der Färöer gehören ganz besonders auch die Vogelberge und deren Bewohner, die „Bergvögel", wie sie dort genannt werden, obwohl See- oder Wasservögel das richtigere Wort wäre. Da die Bergvögel bei der folgenden Schilderung eine sehr wichtige Rolle spielen, so dürfte es angemessen sein, eine kurze Beschreibung von ihnen vorauszuschicken.

Ihre zahlreichsten Arten sind die Lunde oder Seepapageien, die Lommier (Lummen), Alken und Möwen. Sie zeichnen sich alle, wie die Seevögel im allgemeinen, durch große Dummheit und fabelhafte Sorglosigkeit aus, ihr Äußeres hingegen ist auffällig durch hübsches Gefieder, drollige Bewegungen und durch aufrechten Gang, der durch den Stand ihrer Beine dicht am Bürzel bewirkt wird. Der Seepapagei ist ein plumper, dicker Vogel, etwa so groß wie eine Taube, Oberkopf, hinterer Hals, Rücken und Schwanz sind schwarz, Bauch und Kehle weiß, der Schnabel, dem er seinen Namen Papagei verdankt, ist hoch und dick, seitwärts zusammengedrückt mit tiefen Querfurchen und roten und blauen Querstreifen, die Beine sind rot und mit scharfen Krallen versehen, die er, sowie den starken Schnabel, sehr unangenehm gegen einen Angreifer zu gebrauchen versteht; da der Vogel nur kurze stumpfe Schwingen hat, fliegt er sehr mühsam, sein Gang ist, wie auch bei Lummen und Alken, taumelnd wie der eines Betrunkenen. Der Alk ist dem Seepapagei sehr ähnlich, nur größer, auch ist sein Schnabel nicht so stark, hat auch schwarze und weiße Querstreifen, im Sommer bekommt dieser Vogel noch einen besonderen Schmuck in Gestalt eines Streifens brauner, sammetweicher Federn um den Hals. Die Lummen haben braune Beine, sonst aber ist Schwarz und Weiß auch ihre Hauptfarbe, doch ist der Schnabel länger und dünner, der Hals auch länger und beweglicher. Sie, sowie die vorgenannten, sind ebenfalls schlechte Flieger und Läufer, im Schwimmen und besonders im Tauchen aber unübertroffen. Man sagt, sie holen Fische aus einer Tiefe von 10 Faden blitzschnell herauf. Die Möwe, der vierte Hauptbewohner der Vogelberge, ist das gerade Widerspiel der anderen Bergvögel. Scheu und klug, im Flug graziös und gewandt wie die Schwalbe, dagegen unfähig zum Tauchen, gibt es ihrer von der Größe einer Taube bis zu vier Fuß Flügelbreite. Die Farbe dieser hübschen Tiere ist ein blendendes Weiß mit lichtblauen Flügeln, die Beine sind schwarz, der Schnabel dunkelgelb, gebogen und spitz, die Rachenränder rosa gefärbt, auch haben sie meistens einen rötlichen Ring um die Augen.

Nachdem wir so mit den Bergvögeln Bekanntschaft gemacht, wollen wir einen der 25 färöischen Vogelberge besuchen, und zwar den auf der Insel Streymoyj, zwischen den Weilern Westmannahavn und Saxin. Dicht an der nordwestlichen Einfahrt des Sundes, der Streymoyj on Vagoyj trennt, liegt unweit des Vorgebirges Mulin der Vogelberg. Vor diesem Berg erhebt sich schwarz und senkrecht gegen 700 Fuß hoch eine freistehende Felswald, in deren Fuße sich eine durchgehende Spalte, einem riesigen Tore vergleichbar, befindet, durch das man bei ruhiger See rudert und dann in ein schmales Bassin gelangt, in dem aber doch noch große Boote wenden und fahren können. Hier hat man eine echt färöische Situation vor Augen: unter uns das tiefe Meer mit seiner eigentümlichen dunkelgrünen Färbung im Schatten des Felsen, oben ein Stückchen klaren blauen Himmels gleich einem durchsichtigen Dache, rundherum die schräg oder jählings himmelhoch aufsteigenden düstern Felsen, zu deren Füßen riesige Steinblöcke in chaotischer Verwirrung liegen; dazwischen wieder tiefe, unerforschte Höhlen, aus denen dumpfes Brausen und Stöhnen der Wellen herausschallt, die sich schäumend und plätschernd an den Klippenwänden brechen. Wäre hier nicht so viel Tierleben, die großartige Szenerie müßte einen grauenhaften Eindruck machen, so aber lebt und wimmelt es von Bergvögelchen jeder Art, die auf den nackten oder durch Verwitterung dünn mit Erde bedeckten Steinen und Vorsprüngen reihenweise sitzen. Es ist ein buntes Leben, erschreckt man die Tierchen, so fahren sie in solcher Menge auf, daß man schlechterdings das Stückchen Himmel über sich nicht sehen kann, alles wimmelt und lebt, der Lärm der Stimmen und des Flügelschlages ist ohrenbetäubend; das zornige Orrr, orrr! der Lummen und Alke, das schläfrige Ohoh! der Lunde und der gellende Ruf der Möwen lassen einen das eigene Wort nicht ver-

stehen. In der Luft wimmelt es, wie gesagt, von Vögeln, im Wasser schwimmen Lunde und Alke so dicht um das Boot, daß man sie mit den Rudern erreichen kann, und blicken uns verwundert, aber dumm an, dann tauchen sie eilig unter, um eine Strecke weiter wieder hervorzukommen; die Röltmöwe schießt unaufhörlich nach jedem unglücklichen Hering oder anderen Fisch hernieder, der seinen fetten Rücken der Oberfläche des Wassers zu nahe bringt. Doch oft mühen sich diese fleißigen Tiere vergeblich ab und werden um den Lohn ihrer sauren Arbeit schmählich geprellt, denn die große Raub- oder Diebsmöwe schießt mit zusammengefalteten Schwingen pfeilschnell auf den ersten besten Proletarier herab, wenn er eben, reichlich beladen, an nichts Arges denkend, zu seiner Familie auffliegen will, und verfolgt ihn unter durchdringendem Geschrei so andauernd, daß dem unbescholtenen Manne nichts übrigbleibt, als seine Habe fahren zu lassen, die der elegante Räuber dann sehr geschickt noch in der Luft aufzufangen versteht und davonträgt, unbekümmert um die Trauer des Beraubten. So ist hier alles Leben und Bewegung, in der Luft, im Wasser und auf den Klippen. Auf letzteren, die eigentlich nur zur Kindererziehung da sind, finden oft komische Raufereien zwischen Verwandten statt, wozu der Wohnungsmangel (denn hier horsten Hunderttausende) die Veranlassung gibt, da trotz der scheinbar auf den Klippen herrschenden Unordnung und Verwirrung doch ein strenges Hausregiment geführt wird; denn jede Vogelart hat ihren besonderen Platz und jedes Pärchen wieder sein Stückchen Stein davon zum Brüten; tritt nun einmal ein Nachbar aus Versehen in eine fremde Wohnung, so läuft sofort der Hausherr in aufrechter Stellung gegen den Besucher, es entspinnt sich eine Schieberei, die durch das häufige Hintenüberfallen der Vögel sich recht komisch ausnimmt. Nester findet man übrigens auf diesen Brutplätzen nur wenig, da die meisten dieser Vögel, besonders Alke und Lummen, ihre hübsch gezeichneten meergrünen Eier auf den nackten Stein legen, nur die Möwen bauen sich aus Seegras und Tang ein dürftiges Nest, und die Lunde kratzen sich mit ihren scharfen Klauen eine Höhlung in die durch ihren Guano fruchtbare Erdschicht, die stellenweise den Fels bedeckt; die Lunde und eine Art Sturmvögel, hier Skrapur genannt, sind überhaupt sehr besorgt, kein Wasser in ihr Brutloch kommen zu lassen, deshalb stopfen die Vogeljäger auch das Loch sorgsam zu, das sie von oben her, um die Jungen erreichen zu können, hineingegraben haben, denn sonst kommt der Vogel im nächsten Jahre nicht wieder.

Außer den eigentlichen Bergvögeln, die sich mehr auf den Felsen und in Felswänden aufhalten, gibt es noch andere Arten, die besonders die losgerissenen Klippen und die großen Steine am Fuße der Hauptfelsen bevölkern, wie z. B. die Scharben, kleine schwarze, langhälsige Vögel mit gekrümmten Schnäbeln und sehr platten Füßen, die auch im färöischen Sagenkranze in Verbindung mit der Eidergans einen ehrenhaften Platz einnehmen.

So wie die Bergvögel und die Vogelberge zu den merkwürdigsten Eigentümlichkeiten der färöischen Natur gehören, ebenso ist das Vogelfangen eine der vorzüglichsten Geschicklichkeiten und ein Haupterwerbszweig der Färinger. Die Bergvögel sind eine der wichtigsten Lebensbedingungen für die Bewohner der Färöer, das Fleisch der Lunde, Alke und Lummen ist eine gesunde und für den färöischen Gaumen auch wohlschmeckende Nahrung, man genießt es frisch, gesalzen und gedörrt; die Eier werden zu tausenden gegessen, und mit den Federn füllt man Kissen und Bettsäcke, während ein sehr großer Teil nach Dänemark ausgeführt wird (wodurch die Regierung früher eine gute Monopol-Einnahme hatte). Der Vogelfang ist daher sehr wichtig, aber ebenso mühsam und lebensgefährlich. Man beobachtet verschiedene Verfahren, die Bergvögel zu fangen; meistens bedient man sich dazu eines Netzes, doch auch dieses wird, je nach der Eigentümlichkeit der Vögel und der Beschaffenheit des Fangplatzes, sehr verschieden angewendet. Das Netz ist von feinerem und gröberem Seilgarn, sackförmig, an zwei dünnen Bügeln befestigt, die an einer sechs Ellen langen Stange festgebunden sind, das Ganze stellt also einen sehr großen sogenannten Kesser vor. Mit diesem Gerät begibt sich der „Vogelmann" an den Ort, wo viele Vögel vorbeizufliegen pflegen, und er fängt dieselben dadurch, daß er das Netz über sie schlägt, wozu aber eine große Sicherheit der Hand und des Auges nötig ist. Auf färöisch nennt man diese Fangweise „fleyga" (fliegen) und den Ort, wo der Vogelmann sitzt, „fleyga-sessur" (Fliegesitz). Die Art des Flugfangens richtet sich danach, ob man Lunde, Lummen oder Alke fangen will. Die Lunde, die, wie schon erwähnt, auf den grasbewachsenen Abhängen (skor) der Berge nisten, werden folgendermaßen gefangen. Der Vogelmann geht nach dem passenden Flugsitz, wenn derselbe zugänglich ist, d. h. für einen Färinger zugänglich, der Schwindel nicht dem Namen nach kennt, und setzt sich da, wo die meisten Vögel vorbeifliegen, mit seiner Stange nieder; man muß sich aber kein bequemes Sitzen denken, es ist eigentlich ein Liegen an der abschüssigen Wand, wobei die Füße gegen einen Rasenhöcker gestemmt werden; oft ist dieser aber durch den Winterschnee und Regen vom Berge gelockert, gibt nach — und dann stürzt der Vogelfänger zerschmettert in die Tiefe. Felsenstücke lösen sich auch mitunter über ihm los und zerschmettern ihn im Fallen.

Falls das Lundeland, d. h. die Stelle, wo die Lunde zu nisten pflegen, sich zu tief unten an der steilen Bergwand befindet, wird der Vogelmann am Bergseil niedergelassen. Sechs Mann begeben sich nämlich auf den Gipfel des Berges und knüpfen dort mehrere Leinen bis zur Länge von mehreren hundert Faden zusammen; diese große Leine wird dann dem Vogelmann um den Leib gebunden, oder eigentlich um die Schenkel, die man vorher mit breiten wollenen Tragbändern umwickelt hat, so daß er wie in einer Art Sessel sitzt; damit das Tau beim Niedergleiten nicht an Steinen zerschnitten wird, schiebt man ein Stück über den Abhang hinaus, worin es dann wie in einem Kranbalken gleitet.

(Schluß folgt.)

Über den Gesang einiger nordamerikanischer Drosseln.

Von G. P.

(Schluß.) (Nachdruck verboten.)

Am meisten geschätzt von allen Drosselgesängen ist in der Union der Gesang der Walddrossel — Turdus mustelinus (*Gm.*) (Abb. S. 139), von dem Vogelfreunde und auch nüchterne Forscher geradezu begeistert sind. Einer der letzteren, Chapman, sagt von dem Walddrosselgesang, er klinge wie eine Verheißung für die Zukunft, am Morgen wie ein fröhliches Aufjauchzen, wie ein Segen am Schluß des Tages.

In einer Schrift „Nützliche Vögel und ihr Schutz" gibt der Verfasser E. H. Farbusch eine eingehende Schilderung des Gesanges. Er sei einer der schönsten Vogelgesänge, welche Amerika hervorgebracht hätte, und käme an Güte fast dem der Einsiedlerdrossel Singdrossel beobachten können, wenn sie hochaufgerichtet ihre prachtvollen Töne allmählich immer leiser werdend im prächtigen Abendrot sanft ersterben läßt. Die Walddrossel läßt noch einmal ihr liebliches „A-ollich" ertönen, und dann herrscht Ruhe; darauf erklingt weniger laut eine Reihe von ruhig vorgetragenen unterbrochenen Tönen, gleichsam der musikalische Ausdruck der Stimmung in der Natur. Mächtig, voll und metallisch, wie die zitternd klingenden Töne einer Glocke, scheint das Lied der stimmliche Ausdruck des Weltgeheimnisses, eine Melodie, so rein und erdentrückt und doch gebunden an das Erdendasein. Man kann sie weder nachahmen noch beschreiben. Das Lied steigt und fällt, schwillt an und wird schwächer, bis sich das Dunkel der Nacht über die Erde breitet. — Der Warnruf der Walddrossel ist ein scharfes, mehrfach wiederholtes „pit-

Walddrossel.

gleich. Er ist nicht da, um bei völliger Stille zu erklingen wie das laute und kraftvolle Lied der Wanderdrossel, für welches der darauf verwendete Aufwand an Kraft kennzeichnend ist, oder der laute und abgerissene Gesang des Braunspötters. Das Walddrossellied klingt feierlich und ernst. Es scheint zu harmonieren mit dem Rauschen des Waldes, dem Säuseln des Windes, dem Rieseln des Wassers und dem Fallen der Regentropfen im sommerlichen Wald. Aber wie bei allen Vögeln, gibt es auch bei ihr große Unterschiede in der Güte und individuellen Vollkommenheit des Gesanges, und wenn auch von einzelnen Männchen der Art gesagt werden kann, daß kein anderes Vogellied mit dem seinigen wetteifern kann, so kann das natürlich nicht von allen gesagt werden. Gegen Abend begibt sich die Drossel gewöhnlich in die oberen Zweige eines hohen Baumes, nicht selten eines solchen am Waldrand, um ohne Störung ihr feierliches Lied allmählich verklingen zu lassen, ein Vorgang, den wir ja auch bei unserer pit", häufig zu einer Rolle anwachsend; zuweilen wird ein sanftes mehrfach wiederholtes „kluck" gebracht und ein angenehm klingendes „sching".

Bei der Schilderung des Gesanges der Walddrossel handelt es sich nicht um eine Überschätzung des Gesanges oder um eine im Überschwang der Gefühle gegebene Schilderung. Wohl ist es die Stimmung der umgebenden Natur, die selbstverständlich nicht ohne Einfluß bleibt, wenn man einen hervorragenden Sänger draußen hört. Wem ginge es anders, wenn er an einem schönen Maiabend draußen in unserem Wald bei Sonnenuntergang das Singdrossellied hörte?

Wir Liebhaber, und besonders die „Gesangsliebhaber", stehen derartigen Schilderungen meist skeptisch gegenüber, weil wir häufig enttäuscht sind, wenn wir den Vogel im Käfig vor uns haben und das vorgetragene Lied den gehegten Erwartungen gar nicht entspricht. Ich möchte deshalb hier noch anführen, wie sich ein kritischer Beobachter einer ge-

fangenen Walddrossel, Herr von Lukanus, in einem früheren Jahrgang der Gef. Welt (1916) über den Gesang dieser Drossel äußert: „Die Drossel, welche ich besaß, ließ nur zwei aus wenigen Flötentönen zusammengesetzte Strophen vernehmen. Diese haben eine große Ähnlichkeit mit dem Pirolruf, da beim Vortrag die Töne ineinander verschlungen werden. Die Stimme ist laut und kräftig, dabei aber weich und ungemein melodisch; man gewinnt den Eindruck, als ob auf einem Saiteninstrument, ich möchte es am ehesten mit der Harfe vergleichen, zwei harmonisch abgestimmte Töne gleichzeitig angeschlagen werden. Die Vortragsweise ist ernst und feierlich. Der Gesang klingt sehr absonderlich, man glaubt zunächst gar nicht, daß er von einem Vogel herrührt ... Daß der Gesang einer großen Abwechslung fähig ist, glaube ich kaum, dazu besitzt das aus verschlungenen, harfenartigen Klängen zusammengesetzte Lied einen zu ausgeprägten, fest gefügten Charakter. Es mag sein, daß einzelne Sänger die Strophen ihres Liedes etwas variieren ... Mit Rücksicht auf die Verschiedenheit, die sich im Gesang mancher Vogelarten je nach der örtlichen Herkunft den einzelnen Individuen bemerkbar macht, läßt sich freilich ein endgültiges Urteil erst dann fällen, wenn man das Lied mehrerer Vögel gehört hat."

Ähnlich wie die deutsche Amsel ist die Wanderdrossel (Abb. S. 141), der „Robin" der Amerikaner, ursprünglich ein scheuer Waldvogel, in manchen Gegenden Amerikas zu einem Garten- und Stadtvogel geworden, der sich in unmittelbarer Nähe der menschlichen Wohnungen aufhält und seinen lauten mit großer Kraft vorgetragenen Gesang hören läßt. Ihr Gesang wird häufig mit dem der Amsel verglichen, und das trifft zu, wenn man nur die Stimme, den Ton an sich in Betracht zieht. Aber das Lied der Amsel ist anhaltender und abwechslungsreicher und steht weit über den kurzen, einförmigen Strophen der Wanderdrossel, deren lautes melodische Flöten in unmittelbarer Nähe der Menschen, während des Frühjahrs vorgetragen, ihm in der Heimat dieselbe Bedeutung verleihen, die man in Deutschland der Amsel als Botin des Frühlings beimißt. Sie ist die erste, welche vom Wipfel eines Baumes herab den kommenden Frühling kündet.

Die Katzendrossel (Abb. S. 142), der Cat-bird — Katzenvogel — der Amerikaner, wird weniger ihres Originalgesanges wegen geschätzt als der eigentümlichen Laute wegen, welche z. B. an das Miauen der Katze erinnern. Sie bringt in ihrem nicht sehr lauten Gesang ganz unvermittelt leichte Strophen aus den Liedern anderer Sänger, die sie meist unvollkommen wiedergibt. Solche Nachahmungen wechseln ab mit zuweilen harmonischen, wohltönenden eigenen Lauten. Man erfreut sich mehr an den komischen, seltsamen Tönen, welche diese Drossel hervorbringt, als an ihrem eigentlichen Gesang.

Meine Lieblinge und ich!

Von Max Meyer, Berlin.

(Nachdruck verboten.)

Der Zufall ließ mich vor nicht allzulanger Zeit an meinen Futterlieferanten die Frage stellen, ob es auch eine Zeitschrift für Vogelliebhaber gäbe, worauf mir dieser, Herr Herm. Arold, Franseckystr. 4, sogleich bereitwilligst einige der letzten Nummern der „Gef. Welt" leihweise zur Verfügung stellte. Ich studierte diese durch und war recht interessiert daran, weswegen ich mir dann auch einige ältere Jahrgänge der „Gef. Welt" lieh.

Ich bin im Besitze von jetzt 11 Waldvögeln, und ich glaube den Lesern der „Gef. Welt" durch diesen Aufsatz etwas recht Interessantes zu bieten. Der größte Teil meiner Vögel besitzt eine wohl seltene Zahmheit.

Ehe ich jedoch beginne, will ich den Lesern noch erzählen, wie ich so ein richtiger Vogelmeyer wurde.

Mein Vater war schon in meiner frühesten Jugend ein Tier- und Vogelliebhaber. Die verschiedensten Vögel, Fische, Salamander, Schlangen, Frösche, Schnecken, Mäuse wechselten bunt durcheinander. Jetzt hat er seit einer Reihe von Jahren wieder Vögel, und zwar nur hiesige, im ganzen 17 Stück. Es ist also auch kein Wunder, wenn der Junge auch auf diese Liebhaberei verfällt. Vor allem gefiel mir bei meinem Vater das muntere Rotkehlchen, weswegen mir meine Mutter als vorzeitiges Geburtstagsgeschenk, im Juli 1920, ein solches schenkte. Trotzdem mein Mäuschen, wie ich es getauft hatte — es war ein Wildfang und noch im Jugendkleid —, die ersten sechs Wochen recht arg tobte und scheute, so daß ich manchmal recht mutlos ob dieser Wildheit wurde, schlug es dann plötzlich um und wurde ebenso zahm und zutraulich, wie es anfangs wild war. Da ich alleinstehend bin, so wohne ich möbliert. Da wollte es der Zufall, daß ich eine leere Kochstube bekam. Ich griff natürlich hocherfreut zu, konnte ich mir doch dann Vögel in beliebiger Anzahl halten. Nun kaufte ich mir noch ein Rotkehlchen zu, welches ich Dickerchen nannte. Hier konnten sich nun beide, wenn ich nachmittags aus der Fabrik kam, nach Herzenslust ausfliegen. Sie erreichten auch nun einen hohen Grad von Zahmheit, vor allem das anfangs so überaus wilde Mäuschen. Es kümmerte ihm nicht im geringsten, welche Hantierungen man gerade vornahm. Stets war es dicht um mich herum, so daß ich sehr aufpassen mußte, es nicht zu treten, da es ruhig stehenblieb. Der Gesang war äußerst zart und leise. Dafür konnte Dickerchen mit seinem Gesang zum Steinerweichen um Mehlwürmer betteln, indem er sich stets direkt vor mich aufpflanzte, mich mit seinen lieben großen Äuglein bettelnd und fragend ansah und unermüdlich dabei sang.

Leider sollte ich es bald verlieren. Eines Sonntags abends hatte ich eine Kleinigkeit vergessen und ging zurück, das Versäumte zu holen. Da ich nur auf den Tisch greifen brauchte, machte ich nicht erst Licht, sondern ließ die Stubentür einen kleinen Spalt offen. Dies benutzte Dickerchen und flog unbemerkt auf den Gasarm im Treppenflur. Wie ich nachts zu Hause kam, vermißte ich ihn sofort. Durch Zufall erhielt ich ihn jedoch tags darauf wieder. Leute im Hause hatten ihn, nachdem sie ihn gründlich abgejagt hatten, eingefangen. Am folgenden Donnerstag fiel er abends 8 Uhr tot von der Stange. Mein Mäuschen schien darüber nicht gerade erfreut, denn es zeigte darnach, z. B. durch gänzliches Einstellen

des Gesanges, ein stark verändertes Wesen. Also mußte ich mir Ersatz verschaffen. Hier sprang nun mein Vater ein, indem ich dessen Kehlchen bekam, da es bei meinem Vater absolut nicht mehr ins Bauer zu bekommen war. Kaum bei mir angelangt, war der kleine Kerl auch schon zu Hause, und zum größten Erstaunen meiner Eltern ging es fast ausnahmslos abends gegen 10 Uhr allein ins Bauerchen. Leider verlor ich auch bald dieses und kurz darauf auch mein so überaus zahmes Mäuschen. Wenn es auch denen wehe getan, die es kannten, so kann ich jedenfalls mein erstes Mäuschen nie vergessen. Nun hatte ich gar kein Vögelchen mehr. Bald war es mir so ohne ein lebendes Wesen zu tot, und kurz entschlossen kaufte ich mir am 16. April 1921 ein Finkenhähnchen. Hier beginnt nun meine eigentliche Liebhaberei. Meine Mutter schenkte mir abermals als verfrühtes Geburtstagsgeschenk am 30. Juni einen jungen Kiefernkreuzschnabel, Mucki getauft. Leider hatte der schon recht drollige Geselle am 8. Oktober beim Kuchenbacken ein kleines, abgesprungenes Bittermandelstückchen verzehrt, woran er innerhalb zehn Minuten verstarb.

Mein Finkenhans, trotzdem er sehr schwer mauserte, sich aber sonst wohl und guter Dinge befand, hatte am 30. September 1921 Unglück, indem ihm ein Mehlwurm direkt vor dem Magen stehenblieb, woran er in der Nacht, trotz aller Abführversuche, einging. Ich stellte die Todesursache — wenn auch schweren Herzens, aber zum Wohle der anderen Vögel — durch Sezieren der kleinen Leiche fest.

Wie man sieht, war mein Anfang nicht gerade rosig, doch war dies noch nicht alles. Ich hatte vorher ein billiges Goldammernmännchen erworben, doch schon nach drei Tagen ging es mir ein. Ursache blieb mir unbekannt. Am 17. September 1921 erstand ich abermals ein solches, aber auch dieses verendete mir nach 8 Tagen. So gern ich mir ein Goldammerchen halten möchte, ich wagte mich durch die erlittenen Verluste vorläufig nicht wieder an solche heran. Dies sind meine herbsten Verluste, doch muß ich hierbei noch eines Buchfinken gedenken. Am 3. Pfingstfeiertage setzte ich mich in Gesellschaft meines Vaters auf die Bahn und fuhr nach Finkenkrug. Dort fing ich im Bauer einen kräftigen und prächtig gezeichneten Buchfinken. Zu Hause angekommen, verhielt er sich äußerst manierlich im Käfig; fraß und scheute nicht allzusehr, so daß ich die schönsten Hoffnungen hegen konnte. Eines Morgens, nach 14 Tagen, beim Füttern, die oberen Fenster waren geöffnet, entwischte mir dieser Prachtkerl auf Nimmerwiedersehen. Dies war mein Anfang, reich an Enttäuschungen; doch durch Schaden wird man klug. In der Folge kam ich auf verschiedene Art, durch Kauf und eignen Fang, nach und nach in den Besitz von 11 Vögeln. Ich lasse diese dem Datum nach folgen: 1. Am 15. August 1921 eine Kohlmeise, wegen ihres anfangs recht diabolischen Wesens Rebeckchen getauft; 2. am 18. August 1921 eine Sumpfmeise, Karchen genannt; 3. am 6. September 1921 ein Amselmännchen, sehr fragwürdig im Gefieder, zum Teil noch im Jugendkleid, seines Lockrufes Tack, Tack, Taxel genannt; 4. ein Finkenweibchen, gerufen Minchen, bekam ich von einem Fänger geschenkt; 5. und 6. am 21. September 1921 zwei sehr schöne Rotkehlchen, Knickerchen und Bückerchen getauft; 7. am 23. Sept. 1921 eine Schwanzmeise, Schwänzchen genannt; 8. am 14. Oktober 1921 eine Blaumeise, genannt Blauchen; 9. am 28. Dezember 1921 einen Buchfinken, allerdings flügellahm, wieder Hans gerufen; 10. am 3. Januar 1922 eine Heckenbraunelle, Nellchen getauft; 11. am 10. Januar 1922 einen Birkenzeisig, Schättchen getauft.

Dies wären der Reihe nach meine Vögelchen. Alle befinden sich in bester Verfassung und sind im wahrsten Sinne des Wortes quietschvergnügt.

(Schluß folgt.)

Wanderdrossel (s. S. 140).

Der Kühkopf.

Von Werner Sunkel, Marburg (Hessen).

(Nachdruck verboten.)

Gegenden, die noch mit dem alten Landschaftsbild ein mehr oder weniger ursprüngliches Tier- und Pflanzenleben bewahrt haben, erfreuen nicht nur den Wanderer und Heimatfreund, sondern bieten auch dem

Naturforscher Gelegenheit zu wertvollen Beobachtungen dadurch, daß er hier gewissermaßen Einblicke in die biologischen Verhältnisse vergangener Zeiten gewinnt. Für uns in Hessen ist einer der großartigsten Zeugen der Vergangenheit der Kühkopf, die größte, durch die Korrektion des Flusses entstandene Rheininsel. Die ursprünglich 354 km lange Rheinstrecke zwischen Basel und der badisch-hessischen Grenze wurde durch die Korrektion auf 273 km verringert, wobei viele ehemalige Flußkrümmungen zu Altwassern („Altrheine" genannt) wurden und zahlreiche Inseln entstanden, z. B. auch unser Kühkopf bei Stockstadt-Erfelden. Da der Kühkopf reiner als die Ufer des regulierten Stroms die besonders in der Pflanzenwelt ausgeprägte Natur des alten Rheins erhalten hat, stellt diese Insel mit ihrem 15 km langen Altrhein ein herrliches Beobachtungsgebiet dar, um dessen Erforschung sich in hohem Maße die „Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft" in Frankfurt a. M., besonders ihre Mitglieder Dr. Otto Schnurre und Dr. F. Haas bemühten (letzterer veröffentlichte im 52. Bericht dieses Vereins eine illustrierte Abhandlung „Der Kühkopf, ein Zeuge aus der Vergangenheit des Oberrheins").

Anfang August 1920 war ich zum erstenmal mit meinem Freund Otto Schnurre auf dem urwüchsigen Kühkopf, um vor allem seine artenreiche Vogelwelt zu beobachten. Bei Erfelden, das wir von Frankfurt aus mit der Bahn erreicht hatten, setzte uns ein Fährmann über den Altrhein. Beim Betreten des Kühkopfs fallen dem Laien bald die durch ihre sonderbaren Stelzwurzeln ausgezeichneten Weidenbäume auf; das von starken Hauptwurzeln sich abzweigende dichte Netz feiner Wurzelfäserchen, welches durch das Festhalten des Schlicks die Verlandung begünstigt, verleiht den alten knorrigen Bäumen einen gespenstigen Eindruck, besonders wenn nachts bleiches Mondlicht Schattenbilder, Gestalten aus Sage und Märchen, auf den morastigen Boden malt. In diesen verknorpelten Weiden, unter denen wir Ende Mai 1921 eine sonst nie geschaute Menge und Pracht blühender Vergißmeinnicht wirklich anstaunen konnten, lebt als ein Charaktervogel dieser Landschaft die durch ihre mattschwarze Kopfplatte und das locker getragene Gefieder sich von der ähnlichen Nonnenmeise (Parus palustris) unterscheidende Weidenmeise (Parus atricapillus rhenanus *Kl.*), die ich früher schon oft in Frankreich kennengelernt hatte und, wohl in einer anderen Form, bei Paderborn, in Bayern, Rhön und bei Gießen beobachtete. Den in manchen Gegenden auch Erlkönigsmeise genannten Vogel, den wir immer sofort an seinem heiseren „Däh-däh" erkannten, trafen wir auf dem Kühkopf neben Kohl-, Blau-, Sumpf- und Schwanzmeisen nicht selten. Es fehlten natürlich auch nicht Grasmücken, Amsel, Singdrossel, Mistler, Rotkehlchen, die drei Laubsänger, Zaunkönig, Buch- und Grünfink, Kleiber, Baum- und Wiesenpieper, Bach- und Schafstelze, beide Baumläufer, Grün-,

Katzendrossel (s. S. 140).

Schwarz-, Klein- und Rotspecht. Schnurre beobachtete, wie ein Schwarzspecht von einem im Wasser eines Kolkes liegenden Baumstamm aus trank. Im Gegensatz zum Sumpfrohrsänger hörte ich am 27. Mai 1921 viele Teichrohrsänger und auch einige Schilfrohrsänger, während die auch hier vorkommende Rohrdrossel an diesem Tage schwieg. In einem lichten Kopfweidenbestand, allerdings nicht weit von Wiesen und Obstbäumen, sang ein Girlitz, der doch sonst meist nur auf Siedlungsgelände vorkommt. Häufig sind Braunkehlchen, Nachtigall, Pirol, grauer und Trauerfliegenschnäpper. Die drei Taubenarten fehlen auch nicht. Mehrere am Maimorgen sich im Balzflug erhebende Blaukehlchen erinnerten uns an eine frühere gemeinsame Beobachtung dieses lieblichen Vogels bei Fritzlar an der Eder. Auffallend zahlreich nistet der Baumsperling in den Weidenköpfen. Neuntöter, Raubwürger, Kuckuck, Häher und Elstern, Rabenkrähe und Wendehals machen sich durch ihre Stimme bemerkbar, ebenso die Saatkrähen, deren Horstkolonie eine Pappelgruppe, nahe dem Westufer, trägt. Auch hier horstende Fischreiher

zeigten sich in Gruppen bis zu einem Dutzend, während der Purpurreiher seit 1860 vom Kühkopf verschwunden ist. Über der Insel kreisen Storch, Mäusebussard und als häufigster Raubvogel der schwarze Milan; Gabelweihe, Habicht, Sperber, Turm- und Baumfalk kommen auch vor. Wiesen und Ufer bewohnen Kiebitz, Brachvogel, Uferschnepfe, Flußuferläufer und gelegentlich Lachmöwen. Der Altrhein, den riesenhohe Schilfwälder säumen, wird belebt vom Eisvogel, Zwerg- und Haubentaucher, Krick-, Knäk-, Stock- und anderen Wildenten sowie Teich- und Wasserhühnern. Abends hören wir die Rufe der Wald- und Steinkäuze. Die hier früher eingebürgerten Fasanen, Zwerghühner und Truten scheinen in den letzten Jahren ausgerottet zu sein. Es steht zu erwarten, daß bei einer weiteren planmäßigen Durchforschung des Kühkopfs, wie sie von der „Biologischen Vereinigung für Hessen", besonders durch ihre Mitglieder Schnurre und Malchus, in Angriff genommen ist, sich die Zahl der nachgewiesenen Brutvögel wesentlich erhöhen wird; vor allem dürfte das Studium der Sumpf- und Wasservögel (z. B. Rohrdommel, Sumpfhühner), größeren Raubvögel und seltener Singvögel (manche Rohrsänger, Bartmeise, Zipp- und Zaunammer) vielleicht noch wertvolle Ergebnisse zeitigen.

Während Wildschweine, Edel- und Damhirsch schon länger vom Kühkopf verschwunden sind, waren bis vor wenigen Jahren Rehe noch in ziemlicher Anzahl vorhanden, werden aber wohl jetzt durch die weißen und schwarzen französischen Schießer bald ausgerottet sein; ähnlich mag es den Hasen ergehen. Von anderen Säugetieren kommen vor: Kaninchen, Dachse, Baummarder, Fischotter und von Kleinnagern z. B. die Zwergmaus, deren niedliches Nest wir am 25. September 1921 im Schilf dicht über der Erde entdeckten.

Gegenüber Hecht, Aal und Barsch, die gelegentlich vom offenen Rhein in die Altwasser mit ihren ruhigen Buchten vordringen, überwiegen im Erfeldener Altrhein doch Schleie und Karpfen, Karausche und Kaulbarsch. Der Bitterling legt hier seine Eier in die Kiemen der Flußmuscheln, während der Stichling in klaren Tümpeln und Gräben sein Reich hat. Gleichsam noch aus alter Erinnerung an den ehemaligen Stromcharakter des Erfeldener Altrheins steigt, wie Dr. Haas sich ausdrückte, der Lachs in ihm hinauf, obwohl er nur bei Hochwasser einen Ausgang aus der Sackgasse finden kann, in die er geraten ist. — Häufig sind auf dem Kühkopf Ringelnatter, Laub-, Wasser- und der tieflandbewohnende Moorfrosch (dagegen Grasfrosch seltener), grüne und Erdkröte, Teich- und Kammmolch. — Unter der artenreichen Insektenwelt machen sich die Schnaken am meisten bemerkbar und haben uns vor allem beim nächtlichen Beobachten am Altrhein ganz bös zugerichtet. Diese Tiere verscheuchen deshalb auch gründlich alle empfindlichen Leute, die

Lasurblauer Bischof (s. S. 117).

nicht entweder als abgehärtete Wandervögel oder eifrige Naturforscher die zahllosen Mückenstiche gering achten. Uns haben nicht diese kleinen Kerbtiere in letzter Zeit vom Besuch der Insel abgehalten, sondern die lästiger und gefährlicher gewordene französische Besetzung.

Zum letztenmal war ich am 29. September 1921 mit Geheimrat Dr. Möbius (Prof. der Botanik, Universität Frankfurt) und meinem Freund Schnurre dort. Die Milane waren schon fort, einzelne Erlenzeisige, Dohlen, 20 fischende Reiher, viele Enten, Taucherfamilien, etwa 30 Lachmöwen, 200—300 Kiebitze ließen sich sehen, also zum Teil schon auf dem Zug befindliche Tiere, die halt gut zum Abschiednehmen paßten.

Verfügen wir erst wieder voll und ganz über unseren deutschen Rhein und unseren hessischen Kühkopf, dann wollen wir — die reichhaltige Tier- und Pflanzenwelt dieser großen Insel rechtfertigt dies! — hier ein deutsches Banngebiet schaffen und eine hessische Naturwarte! — — — —

Kleine Mitteilungen.

Storch-Forschung. Der weiße Storch nimmt seit einigen Jahrzehnten so stark ab, daß es an der Zeit ist, nicht nur sein früheres und jetziges Vorkommen festzustellen, sondern auch die in seiner Lebensweise noch ungeklärten Punkte zu erforschen. Die sich der heimischen Flora und Fauna widmende Biologische Vereinigung für Hessen hat sich auch der Storch-Forschung angenommen und bittet alle deutschen Storchbeobachter um Beantwortung besonders folgender Fragen: Wo sind Storchhorste und wie viele? Wo horsteten früher welche, seit wann und weshalb nicht mehr? Wo finden zu Beginn des Wegzuges (August) Störche sich zusammen? Standort der Nester: Dach, Schornstein, Baum (Art des Baumes und Alter)? In manchen Gegenden soll dieser Vogel die Fähigkeit verloren haben, auf Bäumen ohne Mithilfe des Menschen

sein Nest zu bauen, so daß der Horst nur auf geköpften Bäumen errichtet werden könnte; wir erbitten diesbezügliche Beobachtungen sowie solche über Stimme, Nahrung, Beteiligung der Geschlechter am Brutgeschäft. Wo und unter welchen Umständen wurden Junge von den Alten aus dem Neste geworfen? Wurden sog. Kontrollversammlungen beobachtet, wobei zur Reise Untaugliche getötet werden sollen? Es sollte alles versucht werden, um ein Aussterben des Storches, der sich aus altgermanischer Zeit erhalten hat und eng mit dem deutschen Volksleben verknüpft ist, zu verhindern. Bei etwaigen Ansiedlungsversuchen wollen wir deshalb gern mit unserem Rat helfen.

Werner Sunkel, Marburg (Hessen), Fr. Str. 55.

Sprechsaal.

(Steht den Abonnenten kostenlos zur Verfügung.)

Frage 6: **Füttern die Vögel ihre Jungen getrennt?** Diese Frage stellte ich mir, nachdem ich folgendes beobachtete. Durch unser Dörfchen führt eine Kreischaussee, welche längs der beiden Seiten zum größten Teil mit Ahorn, Linden, Akazien, Kastanien und Birken bestanden ist. In diesen Bäumen haben Grasmücken, Girlitz, Buchfinken u. a. m. ihr Domizil aufgeschlagen. Und so kam es, daß ich eines Tages unten auf der Chaussee einen halbflüggen Buchfinken gewahrte. Um denselben nicht ein Opfer der hier sehr viel wildernden Katzen werden zu lassen, nahm ich ihn in meine Obhut und setzte ihn in einen Käfig. Letzteren stellte ich auf das Fensterbrett und wartete der Dinge, die da kommen sollten, nämlich, ob sich die alten Finken um den jungen kümmern würden.

In Anbetracht dessen, daß die Wiege des kleinen Buchfinken nach meinen Feststellungen unweit meiner Wohnung lag, hoffte ich bestimmt, daß die alten Finken weiter füttern würden, was mich ein früherer Vorfall gelehrt hatte. Der kleine Fink, welcher nach den Angaben des Herrn Mathias Rausch in „Die gefiederten Sängerfürsten" ein Männchen war (gelbe Augenwimpern, breitere Flügelbinden und rötlichere Brust), lockte sogleich, und es dauerte gar nicht lange, bis das alte Finkenmännchen mit einigen Räupchen im Schnabel erschien und ohne die geringste Scheu (evtl. dadurch bedingt, daß das betreffende Fenster mit Spalierkirschbäumen umgeben ist) durch das Gitter des Käfigs fütterte. Nach einiger Zeit kam auch das alte Finkenweibchen mit Futter gerade in dem Moment, als ich im Begriff war, den Standort des Käfigs etwas zu verändern (leider). Mit einem lauten pink-pink flog es auf und davon und hat sich nie wieder sehen lassen. Das Männchen füttert bereits jetzt den dritten Tag und so regelmäßig, daß ich annehmen muß, es ätzt nur das eine Junge. Ohne Zweifel werden doch der fraglichen Brut mehr als der eine Fink entsprossen sein, denn sonst würde doch wohl auch das Weibchen wiederkommen.

Kann mir vielleicht einer der Herren Liebhaber auf Grund ähnlicher Erfahrungen auf gleichem Wege mitteilen, ob das Weibchen die (eventuellen) übrigen Jungen und das Männchen ausschließlich den erwähnten kleinen Fink weiterfüttern mag??

Georg Herrmann, Hermsdorf bei Sagan i. Schles.

In Nr. 12 der „Ges. Welt" wird wegen **Überwinterung des Girlitzes** angefragt. Hierzu möchte Ihnen aus hiesiger Gegend mitteilen, daß dieses Jahr die Girlitze bei uns nicht überwintert haben; in allen Wintern nach dem Kriege konnte ich die kleinen Kerle beobachten, im verflossenen Winter ist weder mir noch mehreren anderen Vogelfreunden auch nur ein einziges Tier zu Gesicht gekommen. Jetzt ist er hier so zahlreich wie die Buchfinken. Kann es stimmen, daß vor 25 Jahren, als ich die ersten Vögel käfigte, dieser Vogel hier noch fehlte? Oder haben wir Jungen ihn nur deshalb übersehen, weil wir ihn nicht kannten. Walter Barth, Göttingen.

Vom Vogelmarkt.

Von seltener auf den Vogelmarkt kommenden Vögeln werden angeboten:

Friedrich Frank, München, Gabelsbergerstraße 9: Alexandersittiche

Herrn A. G., Opladen. Das Verfahren, frische Ameisenpuppen mit Blumentöpfen zu sammeln, ist wenig ergiebig. Es wird von Friedrich empfohlen, welcher sagt: „Besitzer von Hausgärten, Wiesen u. dgl. können sich von Mai an auf leichte Weise Ameiseneier verschaffen. Man sucht ihre Haufen auf und stülpt auf die entdeckten ganz einfach Blumentöpfe. Sehr gern benutzen die Ameisen diese, um ihre Brut darin unterzubringen, füllen sie deshalb mit lockerer Erde aus und tragen in die geschlossenen Zwischenräume ihre Larven und Puppen. Nach wenigen Tagen ist jeder Blumentopf gefüllt; man hebt ihn mit seinem Inhalte ab," siebt durch usw. — In Flaschen, welche man bis zur Öffnung in den Ameisenhaufen eingräbt, fängt man Ameisen, die, einmal in die Flasche hineingefallen, diese nicht mehr verlassen können. — In ungeheizten frostfreien Räumen können die genannten Vögel überwintert werden. Der Gesang beginnt infolge dieser Überwinterung später, ungefähr um dieselbe Zeit, zu welcher die Genannten im Freileben mit dem Vortrag ihres Liedes beginnen.

Herrn E. W. Der Vogel war ein roter Amarant, und zwar ein Männchen. Er ist infolge von Darmentzündung eingegangen.

Herrn E. W., Stralsund. Zur Feststellung der Todesursache eingesandte Vögel müssen in fester Papp- oder Holzschachtel verpackt sein. Der Hänflingskadaver kam zerquetscht hier an, so daß irgendwelche Feststellungen nicht gemacht werden konnten.

Herrn G. K., Frankfurt a. M., Herrn A. L., Brandenburg, Herrn A. W., Jena, ist brieflich Bescheid zugegangen.

Herrn Fr. B., Schwelm. „Gefiederte Hausfreunde" kommt nicht in Frage, sondern „Der Wellensittich" von Dr. K. Ruß, zu beziehen von der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung, Magdeburg.

Herrn J. F., Karlsruhe. In „Die Fremdländischen Stubenvögel" von Karl Neunzig ist die Katzendrossel wie folgt beschrieben: „Stirn mehr oder weniger schiefergrau, übriger Oberkopf bis Nacken schieferschwarz bis schwarz; Schwingen schwärzlich, breit schiefergrau gesäumt; Schwanzfedern schwarz, am Grunde schiefergrau gerandet; Unterschwanzdecken kastanienbraun, am Grunde schiefergrau; übriges Gefieder schiefergrau, oberseits dunkler; Auge braun bis gelb; Schnabel schwarz; Fuß grünlich- bis schwärzlichbraun." Von einem weißen Spiegelfleck ist auch beim Jugendkleid keine Rede (siehe auch Abb. S. 142).

Herrn E. St., Quelle. 1. Vor der ersten Käfigmauser füttert man Mönchgrasmücken zweckmäßig nur mit frischen Ameisenpuppen, daneben kann auch süßes Obst und Beerenfrucht gereicht werden. Nach Übergewöhnung an das Mischfutter im Spätsommer können gleichfalls Früchte und Beeren gereicht werden. Bei sehr saftreicher Nahrung (frische Ameisenpuppen, frische Früchte, Beeren) wird der Vogel vom Trinkwasser keinen Gebrauch machen. Es kann trotzdem gereicht werden. Bei sachgemäßer Pflege steigert sich der Gesangsfleiß. 2. Die Naturgeschichte der roten Waldameise finden Sie in jedem naturwissenschaftlichen Buch, welches sich auch mit der Naturgeschichte der Insekten befaßt. Die großen, aus allerlei Zweigstücken, Nadeln, Blättern usw. aufgeschichteten Bauten der roten Waldameise findet man in unseren Wäldern, besonders in Nadelholzwäldern. Sobald die wärmere Jahreszeit eingesetzt hat und warmes Wetter herrscht, beginnen die Weibchen mit dem Eierlegen, aus denen sich in kurzer Zeit die Larven entwickeln, welche sehr schnellwüchsig sind und sich bald verpuppen. Gegen Mitte bis Ende April findet man in den Haufen die großen Ameisenpuppen, aus denen männliche und weibliche Ameisen sich entwickeln, später findet man die kleinen Puppen, aus denen die kleinen geschlechtslosen Ameisen, die „Arbeiter", entstehen.

(Fortsetzung auf der 3. Umschlagseite.)

Aus den Vereinen.

Verein Vogelschutz und -pflege zu Dresden. Versammlung jeden Donnerstag, abends 8 Uhr, im Vereinslokal, „Schillers Restaurant", Ecke Stifts- und Ehrlichstraße. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen.

Bernhard Kühn, Vorsitzender.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei zu Hamburg. Sitzungen finden statt jeden 1. und 3. Dienstag im Monat in Hüttmanns Hotel, Poolstr. 22, abends 8¼ Uhr. Nächste Sitzung Dienstag, den 1. Juli 1924.

J. A.: Arnold Weber, 1. Vorsitzender.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig. Vereinssitzungen jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat im Vereinslokal, „Bauers Brauereirestaurant", Täubchenweg. Nächste Sitzungen am 19. Juni und 3. Juli 1924. Gäste stets willkommen.

J. A.: Johann Birk, 1. Vorsitzender.

Verein der Vogelfreunde Leipzig-Plagwitz. Vereinslokal: „Gosenschlößchen", Leipzig-Plagwitz. Sitzungen an jedem 1. und 3. Montag des Monats, abends 8 Uhr. Vogelfreunde sind stets willkommen.

J. A.: Karl Scholtissek, 1. Vorsitzender, Leipzig-Plagwitz, Lauchstädter Straße 30.

Für Entomologen.

Bau's Schmetterlingsbuch. Zum Selbstbestimmen aller in Deutschland, Österreich, Ungarn und der Schweiz vorkommenden Groß- sowie der vorzugsweise gesammelten Klein-Schmetterlinge. Mit 67 Textabbildungen. Kart. 4.— M.

Bau's Käferbuch. Zum Selbstbestimmen der in Deutschland, Österreich-Ungarn und der Schweiz vorkommenden Koleopteren. Mit 144 Textabbildungen. Kart. 4.— M.

Der Käfer- und Schmetterlingssammler. Anleitung zur Herstellung und Handhabung der beim Fange, der Zucht und dem Präparieren von Käfern, Schmetterlingen und Raupen als geeignet bewährten Geräte, sowie zur Anlage und Erhaltung von Insektensammlungen. Von Karl Wingelmüller. Mit 32 Abbildungen. Geh. 1.50, geb. 2.— M.

Schädlinge und Nützlinge der Kleintierwelt. Ein Lehrbuch für jedermann von Prof. Dr. L. Glaser. Mit 85 Textabbild. Kart. 3.— M.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg / Postschließfach 148

Von folgenden **Farbentafeln** der **„Gefiederten Welt"** sind noch einige Exemplare vorrätig, welche wir, solange der geringe Vorrat reicht, zum Preise von **1 G.-M. für die Tafel** zuzügl. **20 G.-Pf.** Porto u. Verpackung **für jede Sendung** bei vorheriger Einsendung des Betrages auf unser Postscheckkonto **Magdeburg 3148** abgeben.

1898 Tafel III: Schwarzspecht. (Schwarzdrucktafel.)
1899 Tafel IV: Nest des Gartenrotschwänzchens mit Weibchen, Jungem und Ei. (Schwarzdruck.)
1900 Tafel I: Madagaskar-, Napoleons-, dottergelber, Samt-, Blutschnabelweber.
1900 Tafel II: Kl. Alexander-, Bunt-, Wellensittich, Rosenpapagei, kl. Gelbhaubenkakadu.
1900 Tafel III: Sonnenvogel, blauer Hüttensänger, Rosenstar, Schamadrossel, weißohriger Bülbül.
1900 Tafel IV: Paradieswitwe, Mozambikzeisig, Grauer Kardinal, Safranfink, Papstfink.
1901 Tafel III: Kleinspecht, Kleiber, Wendehals.
1902 Tafel I Kohl-, Schwanz-, Hauben-, Tannenmeise.
1902 Tafel II: Goldammer, Baumpieper, Feldlerche.
1902 Tafel IV: Diamant-, weißbäckige Gürtel-, Masken-, Gürtelamandine.
1903 Tafel I: Hausrotschwanz, Sprosser, Nachtigall, Rotkehlchen.
1903 Tafel II: Bluthänfling, Grünling, Kernbeißer, Buchfink.
1903 Tafel III: Mistel-, Wacholder-, Wein-, Singdrossel.
1903 Tafel IV: Zwergstrandläufer, Wachtel, weißflüglige Seeschwalbe, Sandregenpfeifer.
1904 Tafel I: Zaun-, Garten-, Dorn-, Mönchgrasmücke.
1904 Tafel II: Schneefink, Steindrossel, Alpenbraunelle, Steinsperling.
1904 Tafel III: Binden-, Kiefern-, Fichtenkreuzschnabel.
1904 Tafel IV: Bartmeise, Rohrammer, weiße Bachstelze, Sumpfrohrfänger.
1905 Tafel I: Schwarzbürzel-, Spitzschwanzbronzemännchen, weißes, gelbbuntes, braunbuntes jap. Mövchen.
1905 Tafel II: Grau-, Orange-, Erz- und Schmuckpfäffchen.
1905 Tafel IV: Schwarzkehl-, Dreifarben-, Weißkopf- und Schwarzkopfnonne.
1906 Tafel II: Lein-, Erlenzeisig, Berghänfling, Stieglitz.
1906 Tafel III: Stein-, braunkehliger und schwarzkehliger Wiesenschmätzer.
1907 Tafel II: Weißsterniges, rotsterniges, Wolfsches Blaukehlchen, Blaukehlchen ♀.
1907 Tafel III: Kleines, Zwerg-, Glanz-, Riesen-, rotrückiges und Gitterflügel-Elsterchen.
1907 Tafel IV: Karmin- und Hakengimpel, Gimpel.
1908 Tafel II: Braunrückengold- ♂ ♀, Schwarzkopf- und Goldsperling ♂ ♀.
1908 Tafel IV: Pünktchenastrild, Amarant ♂ ♀, dunkelroter Astrild, Tigerfink ♂ ♀.
1909 Tafel I: Orangegesichtiger Unzertrennlicher, Rosenpapagei, Rußköpfchen, Tarantinischer Unzertrennlicher, Grauköpfchen.
1909 Tafel II: Klarinetten- und Mennigvogel, braunkehliger Blauschnäpper.
1909 Tafel III: Schwarzbäckchen-, Elfen-, Bunt- und Granatastrild, gemalter Astrild.
1909 Tafel IV: Orange-, Rotkopf-, Blutschnabel-, Napoleons- und Madagaskarweber.
1910 Tafel I: Grauer, Trauer-, Halsband-, Zwergfliegenschnäpper.
1910 Tafel IV: Zipp-, Garten-, Zaun-, Kappenammer.
1911 Tafel I: Rotrücken-, Raub-, Schwarzstirn-, Rotkopfwürger.
1911 Tafel II: Zeresastrild, Malabarfasänchen, Muskatfink, Silberschnäbelchen.
1911 Tafel III: Gartensänger, Fitislaub-, Weidenlaub- und Waldlaubvogel.
1911 Tafel IV: Goldköpfiges ♂ ♀, feuerköpfiges Goldhähnchen, Zaunkönig.
1912 Tafel II: Wieners, Aurora-, Tropfen-, Wachtel- und Rebhuhnastrild.
1912 Tafel III: Magellan-, Kapuzen-, mexikanischer, Yarells und Trauerzeisig.
1912 Tafel IV: Dorn-, Sonnen- Binsen- und Gitterflügelastrild, Zebrafink.
1913 Tafel II: Violettblauer u. Rotbauchorganist, Purpur-, Dreifarben- und schwarzblaue Tangare.
1913 Tafel III: Paradies-, Dominikaner-, Königs-, Fischers, Rotscheitel- und Gelbrückenwidafink.
1913 Tafel IV: Goldschulter-, Fein-, Sing-, Browns Singsittich.
1914 Tafel I: Schwarzkopf-, Rosenbrust- u. mexik. Gelbkernbeißer, dunkelblauer Bischof, roter Kardinal.
1914 Tafel III: Diuka-, Grau-, Kron- und Morgenammerfink, Graukardinal.
1914 Tafel IV: Pikui-, Kap-, Diamant-, Tamborin- u. Friedenstäubchen, chinesische Zwergwachtel.
1915 Tafel I: Sammetköpfchen, Sperber-, Orpheus- und Bartgrasmücke.
1915 Tafel III: Diamantfink-, Masken-, Weißwangen- und Spitzschwanzamandine, Gürtelgrasfink.
1915 Tafel IV: Star, Pirol, Rosenstar.
1920 Tafel I: Nandy-, Jendaja-, Guajakil- und Goldstirnsittich.
1920 Tafel II: Schuppenköpfchen, Schnurrbärtchen, dottergelber, Zwergmasken- und Textorweber.
1920 Tafel III: Tui-, Ziegen-, Mönch-, Tuipara- u. Katharinasittich.
1920 Tafel IV: Reisfink, weißer Reisfink.
1921 Tafel I: Gelber Wellensittich und Wellensittich.
1921 Tafel II: Kleiner Gelbhaubenkakadu.
1921 Tafel III: Kleiner Alexandersittich.
1921 Tafel IV: Domingo-, Cuba- und Rotbugamazone.

Da die Nachfrage nach Farbentafeln sehr groß ist, bitten wir sofort zu bestellen.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg / Postschließfach 148

Anzeigenteil

Die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 20 G.-Pf. berechnet. Aufnahme erfolgt gegen Voreinsendung des Betrages in Reichsgeld p
Brief od. auf unseren Zahlstellen: Postscheckkonto: Magdeburg 3148, Wien 156 687, Bern III 4326, Prag: Creditanstalt d. Deutschen unter Angabe des Zwecke

Käfige u. Gerätschaften

Papagei-Käfig

größerer, guterhaltener, zu kaufen gesucht. Off. mit Größenmaßangabe an
W. F. Maier, Benthen O.S.,
440] Freiheitstr. 7. A. Z. Mtgl. 153.

Futtermittel

Ia getrocknete
Ameiseneier,
sand- und holzfrei, Kilogramm 10 ℳ. Offerten an die „Gef. Welt" erbet. [441

Mehlwürmer
1/4 Liter gegen Einsendung
442] von 2 Rentenmark franko
Bonitas-Versand, Rostock i. M.

Ornis-Haus
Halle-Saale
Gegründet 1912
Spezialität:
Individuelle Weichfresserpflege nach Angaben des Herrn Apotheker Adalbert Jena-Biberach-Riß. (Alleiniges Herstellungsrecht.)
Reform-Normal I, Volierenm.,
Reform-Normal II, f. Rotkehlchen, Schwarzplatten usw.,
Reform-Normal III, f. Nachtigall., Sprosser usw.,
Reform-Normal IV, f. Gelbspött., Goldhähnchen usw.,
Reform-Normal V, f. Schama usw.,
Körnerfutter Ia für jede Vogelart. [443
Inhaber langjähriger Fachmann, siehe „Ornis-Buch" (90 S.) Mk. 1
Preisliste auf Wunsch!

Mehlwürmer
geg. Einsend. v. 2.— Rentenmark 1/4 Pfd. franko versend. **D. Waschinski & Co.,** Biesenthal I (Mark). [444

Vogelfutter [445
für Kanarien, Waldvögel, Exoten, Papageien, Weichfresser. Anfragen nur gegen Rückporto. Liste 13 über Vogelfutter, Liste 5 über Vogelkäfige, Zuchtgeräte usw. mit etwa 400 Abbild.
W. Göpel, Leipzig,
Tröndlinring 1. Telephon 14958.

Mehlwürmer neue, feinste Qualität, Pfd. 8 ℳ
446] **Jeltner, Breslau,** Weinstr. 12.

Kanarienfutter
beste Mischung, staubfrei, 50 kg 28 ℳ ohne Verp., Postbeutel 4 ℳ portofrei. Versand per Nachnahme. [447
Theodor Rath,
Samengroßhandlung,
Quedlinburg a. H.

Ameiseneier, stets frisch u. trock., Liter 1.50 ℳ liefert
K. Edel, Würzburg, Augustinerstr. 13. [448

Vögel

Sittiche, Araras, Kakadus, Amazonen, Edelpapageien, Zwergpapageien, Kragenpapageien, Loris, kleine Affen für eigene Sammlung zu kaufen gesucht. Angebote mit genauer Beschreibung und Preis an
449] **Fliegner, Lehrte-Hannover.**

Sofort lieferbar!
Fleißig schlagende prima
Wachtelhähne
Stück 7,50 Mk.
u. and. Vögel u. Tiere empfiehlt
A. Schwarz, Weißenfels a. S.
450] Klingenplatz 8.

Ich habe abzugeben:
Je ein Stück schöne glatte Tiere im Gesang
1 Schwarzplättchen,
1 Nachtigall, schön im Gefieder,
1 Gartengrasmücke.
Nehme in Tausch:
ganz rotes **Kardinal-Männch.,**
Spottdrossel oder Schamadrossel, zahle zu
E. Kebekus,
454] Photograph,
Schwerte-Ruhr, Markt 6.

Kanarien, Stamm Geiser
gute, tiefe Sänger zu 18—20 u. 25 ℳ
Beste heckreife Stammblutweibchen zu 5 und 6 ℳ abzugeben. [4
K. Elsässer, Versenbrück i. Hannove

Verk. je 1 Zuchtpaar zu 5,50 ℳ
Astrilden, Schmetterlingsfinken, Bandfinken, Klein-Elsterchen, Schönbürzelche
Mossambikzeisige 10 ℳ. Zusammen 36 ℳ
459] **Wucherpfennig, Artern.**

Zuchtpaar frisierte [4
Münchener Holländer
gegen Gebot zu verkaufen. Suche zuc
fähige Kanarienweibchen.
C. Balser, Fulda.

Blaustirnamazone, junge, sehr g
lehrige Vögel . . . Stck. 50
Schwarzschulter-Edelpap. 125
Rote Arara 225
Goldstirnsittiche . . . Paar 16
Grassittiche . . . . „ 15
Grüne u. gelbe Wellensittiche Paar 20
Glockenvogel . . . . Stck. 90
Rote Kardinäle . . . „ 35
Graue Kardinäle . . „ 15
Dominikaner-Kardinäle „ 8
Senegalfinken . . Paar 3,50—5
Reisfinken . . . . . Paar 7
Tigerfinken . . . . . „ 7
Schwarzkopfnonnen Paar 4,50
Weißköpfige . . . . Paar 10
Muskatfinken . . . Paar 6,50
Bronzemännchen . . . Paar 7
Sonnenvögel (Männchen) Stck. 11
461] empfiehlt
Max Kleiner
Tierhandlung
Berlin NO 18
Strausberger Straße 13.
Telephon: Alexander 3313.

Groß. Jaso-Papageien, Glockenvogel, Paar Tirika, Paar Braunohr-Sittiche gibt ab [4
Frohn, Horst-Emsche

Diesjähr. Kanarie
vertausche gegen 1 oder 2 Seidenschwän
463] **H. Wickel,** Zeitz, Posaerstr.

Allen Vogelfreunden
zur gefl. Kenntnis, daß ich
meine Abteilung (Muster Rausch)
bedeutend vergrößert habe. Bestellungen werden schon jetzt entgegengenommen. Anfragen nur gegen 50 Pfg. Rückporto Bedienung streng reell. [46
Josef Pichler,
Wien III, Klimschgasse 18

Zu verkaufen:
Naumann, Naturgeschichte d
Vögel Mitteleuropas, 12 Lederbd
gut erhaltenes, komplettes Exemplar. [
Fr. Philipps, Dietzenbach in Hess

Kaufe
„Gefiederte Welt" Jahrgang 1889, 1
à 12 ℳ, 1900, 1901 à 10 ℳ. Fer
typische gebrauchte Käfige vom Erz
birge, Thüringen, Bergisch. Land so
eigenartige alte Tierfallen. [
Kracht, Duisburg, Bechemstraße

Inserate
für das am 26. Juni 1924 zur A
gabe gelangende Heft 19 der G
Welt erbitten bis 21. Juni 1924 fr

Bitte!

In eigenem Interesse wollen die pp. Einsender beachten, daß

a) **alle für die Redaktion** der „Gefiederten Welt" bestimmten **Zuschriften** (Sprechsaal-Anfragen und -Antworten, Vereinsnachrichten usw.) und **Sendungen** (tote Vögel, Manuskripte) nur an **Herrn Karl Neunzig, Hermsdorf bei Berlin,** Neue Bismarckstr.,

b) **alle Bestellungen** auf **Abonnements, auch vom Ausland, nur durch die Post,**

c) **Inserate** und dergl. Geschäftliches nur an die **Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg,** Postschließfach 148,

zu richten sind.

Schamadrossel
(ff. Sänger) 56 ℳ.
Chin. Nachtigall
(ff. Schläger) 16 ℳ. [451
Dornbach, Köln-Sülz,
58 Aegidiusstr. 58.

2,1 Stieglitzkanarien zus. 30 Mk. Porto extra. Postfert. Versandk. einsenden.
A. Hirsch, Aubstadt (Unterfranken).
452] A. Z. Mtgl. 233.

1 Roter Kardinal, 1 amerikan. Spottdrossel, 1 Grauedelsänger ferner **1 Paar Jendaja-Sittiche** (rotbrüstig), **1 Paar gelbe Wellensittiche,** Ia erprobt, zu verkaufen. [453
Off. unt. W. H. an die „Gefied. Welt".

Tausche
1,0 kleinen Kubafinken gegen 0,1 oder suche letzteren zu kaufen.
Fr. See, Frankfurt a. M.,
455] **Bahnhofplatz 8.**

Für Schwarzplättchenliebhaber!
20 Pfund Holunderbeeren, rote, kann
456] noch abgeben
Joh. Fischer, Waldsassen (Bayern), Mitterteicher Str. 54.

Vertausche eine Singdrossel (Davidzippe), pr. Sänger, 22er Wildfang, gegen Ia Sprosser oder sonst nützliches, da im Zimmer zu laut. [457
Oswald Saurbier, Arnstadt, Holzmarkt 11.

Bestellungen für Juli sofort der Post übergeben!
Bestellzettel für Deutschland.

Postbestellzettel.
Hiermit bestelle ich für den Monat Juli 1924
1 „Die Gefiederte Welt"
(eventuell mit Nachlieferung). — Erscheinungsort Burg Bz. Mgdb.

Name: .....

Wohnung: .....

Postquittung: .....Mk. .....Pf. sind heute bezahlt worden.

Ort: ..... den .....

Postannahme

.....

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Hermsdorf bei Berlin; für den Anzeigenteil: Rolf Kretschmann, Magdeburg, Postschließfach 148
Verlag der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck: August Hopfer, Burg Bz. Mgdbg.

Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Jahrg. 53 | Den 26. Juni 1924 | Heft 19

(Druckort: Burg, Bezirk Magdeburg.)

Vogelberge und Vogelfang auf den Färöer Inseln.

Von Dr. J. Wiese, Berlin-Friedenau.

(Schluß.) (Nachdruck verboten.)

Beim Hinablassen gibt der Vogelmann mit der Hand Zeichen oder ruft, wenn er halten oder seine Richtung ändern will; denn man kann ihn oben sehen und auch hören. Hat er festen Fuß gefaßt, dann bindet er sich los, und seine Kameraden lassen sich einer nach dem andern nieder; auf diese Weise steigen vier bis acht Mann hinab, und wenn sie da angelangt sind, wo der Fang stattfinden soll, richten sie sich auf mehrere Tage oder auf eine ganze Woche häuslich daselbst ein, denn Mitte Mai, da die Lunde zum ersten Mal gelegt haben, rechnet man immer auf gutes Wetter. Die Vogelmänner haben in solchem Falle Zünder und Torf, Essen und Trinken mit hinuntergenommen, des Nachts kriechen sie in ein Loch oder in eine Bergspalte, oder legen sich hinter einen großen Stein, oft aber können sie das nicht einmal, wenn der Abhang nämlich zu steil ist, und sie müssen sich dann festbinden, damit sie nicht im Schlafe den steilen Felsen hinabstürzen.

Nun werden eine Menge Lunde gefangen, die entweder in ein unten harrendes Boot geworfen werden oder, falls die See zu hoch geht, um ein Boot heranzulassen, ballenweise in die Höhe gewunden werden müssen. Jeden Tag legt oder versucht ein Boot unten am Berge anzulegen, und die Angehörigen der Vogelfänger finden sich auf der Spitze des Berges ein, um nachzusehen, wie es ihren Leuten da unten geht. Bei stillem Wetter, d. h. wenn nur ein gelinder Wind weht, ist der Fang am besten, weil die schwerfälligen, kurz beschwingten Vögel mit Hilfe des Windes leichter fliegen und solche Tage fleißig benützen, sich Bewegung zu machen, freilich zu ihrem Verderben.

Ist der Flug beendet oder tritt schlechtes Wetter ein, dann zieht man die Vogelmänner in die Höhe, ist aber der „Fliegesitz" zu tief nach unten, dann läßt man ihnen noch eine Leine hinab, an der sie dann, einer nach dem andern, in das harrende Boot hinabgleiten; dieser Niedergang ist aber für den letzten sehr gefährlich, denn er muß die Leine so locker an einen Stein binden, daß sie eben nur hält und, nachdem er unten angekommen, durch Schütteln wieder losgemacht werden kann.

Abgesehen von dieser Fangweise fängt man Lunde auch dadurch, daß man sie einfach mit der Hand oder einem Hakenstock aus ihren Brutlöchern hervorholt.

Lummen und Alke, die ihre Eier auf den nackten Fels legen, fängt man meistens auch mit dem Netz, nur muß man sie auf anderen, aber viel gefährlicheren Stellen suchen. Die Seevögel werden gewöhnlich zwei bis drei Jahre alt, ehe sie an Gründung eines Hausstandes denken, doch trifft man die Junggesellen sehr zahlreich an den Brutplätzen, wo sie sich vielleicht aufhalten, um mit dem Familienleben mehr vertraut zu werden. Diese Jungvögel oder „Mellufuglar" (weil sie gern auf flachen Klippen sitzen), denen sehr nachgestellt wird, fängt man also: Ein Boot rudert nach der Klippe, auf der man viele der Tiere sitzen sieht, der Vogelmann vorn im Boote hält ihnen das vorher versteckte Stangennetz plötzlich vor, und sie springen regelmäßig beim Versuch, in das Wasser zu kommen, hinein. Sitzen die Vögel zu hoch, um sie auf diese Weise fangen zu können, dann erschreckt man sie durch lautes Schreien, worauf sie ins Wasser springen, aber wenn sie über das Boot wegfliegen oder dicht dabei untertauchen wollen, in das vorgehaltene Netz fallen. Diese Fangweise nennt man „oman-fleyg" (oman von unten).

Will der Vogelmann aber nicht bloß auf Jungvögel Jagd machen, sondern die Lummen und Alke in ihren Brutplätzen besuchen, was eben sehr gefährlich ist, dann läßt man ihn an einer Leine, die aber länger sein muß als die zum Lundefang ausreichende, weil obige Vögel tiefer dem Meere zu horsten pflegen, hinab; am entsprechenden Orte angelangt, bindet er sich los und macht die Leine an einem Steine fest, damit sie ihm nicht entschlüpft, und beginnt darauf, mit einer fabelhaften Kühnheit an der Felswand — wo der geringste Fehltritt das Leben kostet — umherzuklettern und zu hüpfen. Vögel findet er zu Tausenden, er greift sie mit den Händen oder fängt sie im Netz, dreht ihnen ohne Schonung den Hals um und wirft sie in das Boot hinab oder läßt sie bündelweise hinaufziehen.

Bei diesem Fang geschieht es oft, daß der Vogelfänger eine Höhle in senkrechter Felswand unter sich bemerkt, oft ist sie durch einen Felsvorsprung wie mit einem Vordach versehen; in ihr nisten Tausende

von Vögeln, deshalb muß er hinein; er läßt sich also bis über den Vorsprung nieder, und wenn er dann vollständig im Freien schwebt, schwingt er sich am Seile in die Höhle hinein; hier macht er sich los und bindet die letztere fest, wobei es einst einem Färinger geschah, daß sie ihm entschlüpfte und nun unerreichbar weit draußen vor ihm hing; um nicht Hungers zu sterben, sprang der Mann in seiner Verzweiflung hinaus, und es glückte ihm wirklich, die Leine im Fallen mit den Händen zu packen, worauf er sich niederließ, bis er festen Fuß faßte und sich so rettete. So gefährlich diese Art Fang auch ist, so lohnend ist sie aber auch, denn nach 3—4 Stunden kann ein einzelner Mann ein paar Bootsladungen von 3—4000 Vögeln gefangen haben, dann läßt er sich hinaufziehen und wird von seinen harrenden Freunden mit Jubel und Glückwünschen empfangen.

Außer auf den Vogelbergen und den „hellur" werden die Vögel auch noch auf den freistehenden steilen Seeklippen gefangen, wozu immer zwei und zwei Mann nötig sind, von denen jeder mit einer langen Stange mit Eisenspitze ausgerüstet ist, und die sich mit einem zehn Faden langen Tau aneinander binden. Sie klettern mit Hilfe ihrer Stangen den steilen Fels hinauf, wobei der untere dem obern durch Hineinschieben seiner Stange in den Hosengurt hinaufhilft, der obere zieht dann seinen Hintermann hinauf, und so helfen sie sich wechselweis, fällt einer, dann muß ihn der andere halten, oft aber stürzt jener so jählings, daß er diesen mit hinabreißt und beide zerschmettern. Einst kletterten zwei Färinger, von denen der eine schon ein Siebenziger, aber noch flink und rüstig war, einen sehr gefährlichen Felsen hinauf; sie brauchten jeder seine Stange selbst, ohne einander damit helfen zu können, da verliert der ältere beim Hinabklettern die seinige; der jüngere besinnt sich einen Augenblick, darauf reicht er seinem alten Gefährten seine eigene Stange mit den Worten: „Du hast Frau und Kind zu Hause, nach mir wird aber niemand weinen, darum nimm meine Stange, Gott hilft mir vielleicht auch ohne sie!" Und Gott half ihnen beiden.

So ist's mit dem färöischen Vogelfang, der vielleicht gefährlicher ist als Löwen- und Tigerjagden; manche Stunde schrecklicher Todesangst müssen die kühnen Kletterer aushalten, und mancher von ihnen bezahlt seinen Broterwerb mit dem Tode, woran aber selten der durch den Federhandel reich gewordene Kaufmann denkt. Der Vogelreichtum auf den Inseln nimmt aber trotz der Jagden nicht ab, denn die Berge sind mit Millionen dieser Tiere bevölkert.

Neueinführungen und Seltenheiten.

Von Karl Neunzig.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Sehr erfreulich ist die Einführung zahlreicher Arten von Pfäffchen, einer Gruppe kleiner Finkenvögel in fast durchgängig schlichtem, aber vielfach doch recht hübsch und ansprechend gezeichnetem Federkleid. Ihre auffälligste Eigentümlichkeit ist der kurze, hohe Schnabel, dessen Höhe etwa gleich der Länge des Schnabels ist. Die Firstlinie ist gebogen, die Schneidenränder sind nach hinten stumpfwinklig geknickt. Wenn auch die plastischen Merkmale bei den Arten bei oberflächlicher Betrachtung übereinzustimmen scheinen, so wird man doch bei den einzelnen Arten auch in diesen große Verschiedenheiten finden, als deren Extreme man das kleine feinschnäblige Zwergpfäffchen — Sp. minuta mit den verhältnismäßig langen und schlanken Zehen und Krallen und das hochschnäblige Graupfäffchen — Sp. hypoleuca ansehen kann. Ihre Verbreitung in etwa 60 Arten erstreckt sich über das tropische amerikanische Festland, vom südlichen Texas bis Paraguay und die Länder gleicher Höhe.

Es ist anzunehmen, daß sich die Pfäffchen mit langen dünnen Zehen und gestreckten Krallen viel auf dem Erdboden aufhalten. Frl. Dr. Snethlage sah sie in Brasilien auch vielfach auf Wiesen. „Alle Finken", so teilt die genannte Forscherin im Journal für Ornithologie mit, „sind eigentliche Wiesenvögel, welche neben einigen anderen durch ihr Auftreten in oft riesigen Schwärmen den Campos ganz besonders ihr Gepräge geben." Unter anderen befanden sich unter diesen die Grau-, Zwerg-, Streifen-, Weißstirnpfäffchen und andere. Sie bevölkerten aber auch das Unterholz und die Baumgewächse der Ufer- und Inselwälder am Amazonenstrom und die Gärten der Siedlungen. Das graurückige Zwergpfäffchen (Abb. S. 150) wurde auch auf einzelnstehenden Bäumen angetroffen, aus deren Kronen es seinen hellen kurzen Schlag hören ließ, ein einzelnes besuchte regelmäßig den Hof eines Hauses, um dort spatzenartig nach Futter zu suchen. In der Gefangenschaft sind alle Pfäffchen angenehme und verträgliche Vögel, dazu in jeder Beziehung anspruchslos und gut ausdauernd, und auch als Sänger sind sie, oder doch wenigstens einige Arten, durchaus nicht zu unterschätzen. Liebhaber, welche auf nicht zu lauten Vogelgesang Gewicht legen, können sich keine besseren Vögel wünschen als Pfäffchen.

Nach meiner Kenntnis sind durch die neueren Importe 10 Arten eingeführt, darunter ist eine Art **das Graukopfpfäffchen – Sporophila plumbeiceps** *(Salvad.)* als Neueinführung zu betrachten. Es scheint allerdings, daß dieser Vogel auch schon früher einmal zu uns gelangt ist, aber nicht als Art bestimmt bzw. erkannt wurde. Das Graukopfpfäffchen, s. Abb. S. 147, ist eine der am schönsten gezeichneten Arten.

Gefiederbeschreibung: ♂ Oberkopf, Zügel, Ohrgegend, Hinterhals bis auf den Rücken bleigrau; Oberrücken, Schulter bräunlichgrau mit dunkleren Federmitten, ebenso die Oberschwanzdecken; Unterrücken, Bürzel rostbraun, Wangen, Vorderhals, Halsseiten schwarz; ganze Unterseite rostbraun; Flügelfedern graubraun mit helleren grauen Säumen, welche an Deckfedern und innersten Schwingen ziemlich breit; innere Handschwingen an der Wurzel weiß, einen weißen Spiegelfleck bildend; Unterflügeldecke weißlich; Schwanzfedern wie Schwingen mit schmaleren Säumen; Auge braun; Schnabel schwarz; Füße schwärzlich hornbraun; Lg. 102, Fl. 53, Schw. 36 mm.

Die Verbreitung dieses schönen Pfäffchens erstreckt sich über Ost- und Südbrasilien, Nordargentinien und Bolivia.

Zu den besten Sängern unter den Pfäffchen gehört das Weißkehlpfäffchen (Abb. S. 95), das wie vor dem Kriege auch jetzt wieder mehrfach eingeführt wurde. Es ist immer in Bewegung, schwanzwippend

und flügelschlagend hüpfen sie umher und erinnern in ihrem rastlosen Treiben an das Wesen der kleinen Kubafinken. Gegen andere Vögel benehmen sie sich harmlos, necken sie aber zuweilen. Nur am Nest, sie sind mehrfach in der Gefangenschaft gezüchtet, greifen sie jeden Vogel an, der sich in die Nähe des Nestes begibt, sind sehr aufgeregt und gegen Pfäffchen der eigenen oder anderer Arten recht angriffslustig. Obgleich sie auch in gutbevölkerten Flugkäfigen mehrfach mit Erfolg gezüchtet worden sind, ist es doch besser, ihnen für Züchtungszwecke einen besonderen Käfig zu geben.

Das Weißstirnpfäffchen ist auf S. 94 abgebildet. Früher nur selten und in geringer Zahl eingeführt, scheint es jetzt häufiger auf den Vogelmarkt zu gelangen. Wie alle Pfäffchen sind sie angenehme ruhige Vögel. In der Gefiederfärbung gehört es zu den schönsten Vertretern der Familie, der Gesang dagegen ist minder gut und entbehrt der Abwechslung, da er nur aus einer Strophe, einem langgezogenen Triller, besteht, der laut und hart klingt.

Das Falzschnabelpfäffchen, das sich in einem Stück gleichfalls unter den eingeführten Pfäffchen befand, ist auf S. 61 abgebildet, und auf S. 70 ist das Nötige über diesen Vogel gesagt.

Graupfäffchen gehören zu den besten Sängern unter den Pfäffchen und werden in ihrer Heimat als solche hoch geschätzt. Im Benehmen weichen sie nicht von den Verwandten ab, mit denen sie sich in der Brutzeit meist sehr schlecht vertragen. Gleichfalls zu den besseren Sängern gehört das Schwarzkappenpfäffchen (Abb. S. 149). Ein Weibchen dieser Art nistete zusammen mit einem Männchen Weißkehlpfäffchenin der Voliere des Herrn Hofrat Dr. Pretzfelder (Würzburg).

Eine Seltenheit auf dem Vogelmarkt war stets das Brillenpfäffchen, das jetzt wieder in mehreren Stücken eingeführt ist. Der Gesang der Erzpfäffchen ist ein wunderliches, sanftes Gezwitscher, das ziemlich leise vorgetragen wird, aber doch angenehm klingt. Dieses Pfäffchen ist wie das Graupfäffchen in der Gefangenschaft gezüchtet worden.

Von den kleinsten Vertretern der Familie ist dann noch unter den Wiedereinführungen zu nennen das graurückige Zwergpfäffchen (Abb. S. 150) — Sp. castaneiventris (*Cab.*), das sehr selten eingeführt wurde, aber wegen seiner Kleinheit und hübschen Färbung eine Zierde jedes Flugkäfigs sein würde. Es ist oberseits und unterseits kastanienbraun, Flügel und Schwanz sind schwarz. Etwas größer, aber nicht minder schön befiedert ist das Orangepfäffchen — Sp. nigroaurantia (*Bodd.*) (Abb. S. 151). Das Männchen ist rötlich zimmetfarben mit schwarzer Kopfplatte, schwärzlichen Flügeln mit weißem Spiegelfleck und hellen ockergelblichen Säumen, der Schwanz ist dunkel; Schnabel schwarz. Das Weibchen ist fahler, ohne schwarze Kopfplatte. Sein Gesang ist leise, unbedeutend, mit wunderlich krähenden Tönen vermengt. Es hat sich Züchtungsversuchen zugänglich erwiesen.

Liebhabern, welche sich für diese kleinen Finkenvögel interessieren, ist mit der Einführung von 10 verschiedenen Arten Pfäffchen eine reiche Auswahl geboten, besonders denen, welche sich mit Züchtungsversuchen befassen. Die Züchtung mehrerer Arten ist z. T. mehrfach gelungen. Auch bei der Aufzucht der Jungen sind die Pfäffchen anspruchslos und füttern die Jungen nur mit Samen auf, wenn es auch besser ist, ihnen neben den Sämereien frische Ameisenpuppen, zerschnittene Mehlwürmer und Insektenfresserfutter, viel Grünkraut und Obst zu verabreichen. Hinderlich für die Züchtung ist die Schwierigkeit, die Weibchen der einzelnen Arten zu erkennen und häufig auch zu beschaffen. Die vermeintlichen Weibchen entpuppen sich nicht selten später als Männchen. Es waren im Jugendkleid, das meist dem des Weibchens ähnlich ist, befindliche Vögel. (Fortsetzung folgt.)

Graukopfpfäffchen (s. S. 146).

Meine Lieblinge und ich!

Von Max Meyer, Berlin.

(Schluß.) (Nachdruck verboten.)

Als mir der schöne Finkenkrugfink ausgerückt war, bespannte ich drei Fensterflügel mit ½-Zoll-Drahtgeflecht. Den vierten Flügel öffnete ich nicht, da

hierfür das Geflecht nicht reichte. Nun ließ ich alles was ich an Vögeln hatte und später noch hinzubekam, ohne weiteres fliegen. Es war eine rechte Lust, zu sehen, wie sich die Tierchen wohlfühlten; der Futter-, Trink- und Badegelegenheit ging jedes in seinem Bauer nach. Da ich infolge Nervenleidens seit Juli gänzlich zu Hause bin, so hatte ich die rechte Muße, meine Kerlchen zu studieren. Abends fing ich alle wieder ein und sie ließen sich auch alle willig in ihren Käfig tun; nur Rebeckchen Kohlmeise hatte jedesmal etwas zu schebbern. Kohl- und Sumpfmeise wurden erstaunlich schnell fingerzahm. Lag ich auf dem Sofa, kam Rebeckchen und zupfte mich in den Haaren oder hackte auch auf jene Stelle, wo einmal Haare gesessen hatten, was mitunter recht empfindlich war. Karchen, die Sumpfmeise, untersuchte derweilen höchst geschäftig meine Westenknöpfe und -taschen, bis ich munter wurde und jedes dann ein Würmchen bekam. Knrz, beide bewiesen eine geradezu treuherzige Zutraulichkeit. Taxel, die Schwarzdrossel, verhielt sich noch sehr reserviert. Er hielt sich nur im hinteren Teil der Stube oder in den höheren Regionen, in Deckennähe auf. Zeigte er doch auch mancherlei Scheu, so bewies er sein Dasein durch schöne fleißige Gesangsstudien. Von einem Sonntagsausfluge brachte ich mir einige lange Haselnußgerten mit. Von diesen machte ich mir in Stubenmitte, etwa 60 cm von der Stubendecke entfernt, ein Gehänge, in Form eines Kreuzes (+ liegend), welches ich an einer Drahtblumentopfampel befestigte. Hieran befestigte ich einige Fichten- und Wachholderbäumchen, die bis zur Decke reichten. Ferner stellte ich ebensolche in Blumentöpfen auf beide Schränke, nachdem ich alles mit starkem Papier abgedeckt hatte. Die drei Fenstergitter setzte ich bisher nur tagsüber ein. Jetzt habe ich die Gitter für beide unteren Flügel außen befestigt, so daß die Fensterflügel nach Belieben geöffnet werden können, ohne daß ein Vogel entweichen kann. Nun konnte meine Federgesellschaft überhaupt draußen bleiben. Ich räumte ihnen eine Tischecke ein, richtete ein zweitüriges kleines Bauerchen zur Fütterung ein und, nachdem sie daran gewöhnt, verschloß ich alle übrigen Käfige. Nun hatte ich meine kleinen Lieblinge, gegen alle Gepflogenheiten der Vogelliebhaberei, in voller Freiheit zu jeder Zeit um mich herum. Wie reizend sieht's sich doch dem immer friedfertigen, nicht Ruh und Rast habenden Sumpfmeischen zu. Emsig und frohlockend versteckt es einen Sonnenblumenkern nach dem anderen, und ebenso schnell und diabolisch holen Kohl- und Blaumeise die versteckten Körnchen hervor und schon ertönt aus irgendeinem Winkel das bekannte trommelartige Gehämmere der Kohlmeise. Trotzdem, Karchen bleibt immer gleich friedfertig und läßt sich in ihrer Spararbeit dadurch gar nicht abhalten. Zünde ich abends die Lampe an, sofort trippeln so sechs, sieben auf dem Tisch herum. Vor allem aber die Blaumeise. Ein richtiges kleines Katzengesicht. Gerade als ob alles nur für sie allein da wäre. Rufe ich, wenn sie an der Tapete knabbert, Blauchen, was machst du schon wieder, dann bleibt sie mit der unschuldigsten Miene ruhig sitzen, zieht das Köpfchen ein, dreht es hin und her, als wollte es sagen: ich, ich trübe kein Wässerchen. Meine zarteste, sozusagen das Nesthäkchen, ist die Schwanzmeise. Nehme ich nur das Mehlwurmglas zur Hand, sofort sitzt Schwänzchen auf meinem Finger. Gebe ich ihr nun einen großen Wurm, dann lieber Leser, glaube ja nicht etwa, daß sie diesen einfach konfisziert. Kein Gedanke! Mit hocherhobenem Schwanz schaut es mich mit seinen rotgeliderten Auglein an, als wollte es sagen: Na, vielleicht reißt du mir auch das Würmchen in Stücke. Ruhig bleibt es auf dem Finger sitzen und läßt sich das Würmchen buchstäblich stückweise füttern, denn Scheu kennt mein Schwänzchen überhaupt nicht. Selbstverständlich steht nun die ganze Gesellschaft mit den Rotbärten vor mir auf dem Tisch und wollen auch ihren Teil, während Taxel, der Gelbschnabel, sich jetzt schon dicht an meine Füße plaziert. Natürlich bekommt dann jedes sein Teil, jedoch halte ich den Meisen den Wurm fest, so daß sie ihn mir, auf der Hand sitzend, stückweise zwischen den Fingern herausholen. Diese Zutraulichkeit erweisen nun die Meisen nicht etwa mir allein, nein, jeder Fremde, und sei er auch das erste Mal da, kann diese Art des Würmerfütterns machen. Allerliebst ist auch das Gebettele des Schwänzchens, wenn es schlafen will. Dann zirbt und wirbt sie um die Blaue, daß diese sich danebensetzen soll, damit sich Schwänzchen so recht ankuscheln kann. Doch leider will Blauchen in den allermeisten Fällen nichts davon wissen und reißt immer wieder aus. Auch allerliebste Turnkunststückchen kann Blauchen vollführen. Mit Vorliebe ist sie abends in Gemeinschaft mit der Sumpf- und Schwanzmeise und Knickerchen, dem Rotbart, auf dem Tisch. Hier vollführt sie dann nichts wie dummes Zeug. Jedes Glas, jede Tasse muß sie untersuchen — oft verschwindet sie ganz darin —, ob sich nicht etwa ein Tröpfchen Kaffee darin befindet, für den sie eine ganz besondere Vorliebe an den Tag legt. Habe ich Butterbrote oder Schrippen auf dem Tisch, sofort ist die ganze Gesellschaft da und maust sich ganz ungeniert ihren Teil, aber ja nicht etwa vom Brot, nur die Butter picken sie ab, Herrchen kann ja ruhig trocken essen. Na, es bleibt schon allemal noch genug für mich. Eine Zeitlang hat es Blauchen sogar in der Weise gemacht, daß es sich auf die Schrippe setzte, welche ich gerade zum Munde führte. Dann pickte sie oben die Butter ab und ich mußte währenddem am anderen Ende beißen. Kurz, gerade Blauchen legt eine Unverfrorenheit an den Tag, die wirklich ihresgleichen sucht. Oft sitzen alle vier Meisen auf meinem Unterarm und betteln gemeinsam nach Würmer. Ja, Rebeckchen Kohlmeise ist sogar so schlau, geht zum Mehlwurmglas, hackt es ein paarmal recht vernehmlich an und kommt dann wieder angehopst, und hopp auf meine Hand. Wer kann da kein Würmchen geben?! Ich bringe es nicht fertig. Was nun die beiden Rotkehlchen anbelangt, so haben diese den Käfig nur zwei Tage und vier Nächte zum Einfüttern kennengelernt. Während das Knickerchen ein richtiger kleiner Frechdachs ist, hält sich Bückerchen immer sehr reserviert, aber nicht etwa minder zutraulich. Beide singen sehr schön vernehmlich, doch habe ich für Bückerchen begründete Hoffnung, in diesem einen Wipfelsänger zu haben. Die Schwarzdrossel hat einen fast gelben Schnabel und setzt auch schon des öfteren mit Touren ein. Sie legt oftmals rechten Übermut an den Tag, doch kann ich

sie im allgemeinen als durchaus friedfertig den Kleineren gegenüber bezeichnen. Nur auf ihr Futter, welches ihrer Größe wegen auf der Erde steht, hat sie ein wachsames Auge. Ihre Lieblingsbeschäftigung ist, mir den Kohlenkasten auszuräumen oder im Leitungsausguß nach irgend etwas zu stöbern. Hat sie einmal vom Kartoffelschälen so ein ausgestochenes Stück gefunden, dann spielt sie damit wie ein kleiner Hund. Es sieht sich recht spaßig zu, wenn sie das Gefundene, fortwährend dabei quatschend, in die Luft wirft und dann schnell einige Schritte zurücktrippelt, was sie mit großer Beharrlichkeit wiederholt. Gern jagt sie sich auch mal mit den Rotbärten, doch bei deren Fluggewandtheit zieht sie stets den kürzeren. Infolge der guten Pflege und Fütterung — sie bekommt dasselbe Weichfutter wie die anderen — befindet sie sich auch nicht zuletzt durch den Freiflug in allerbester Verfassung. Finkenhänschen, Braunellchen und Schättchen sind noch zu jung in meinem Besitz, um von ihnen irgendeine Originalität berichten zu können.

Nun noch einiges über das Zimmer selbst. Es ist etwa $4^1/_2$ m lang, 3 m breit und 3 m hoch, parterre gelegen und als solches sehr hell. Im Sommer, etwa $4^1/_2$ Monat, habe ich auch Sonne im Zimmer, allerdings nur in Fensternähe. Um ein Entweichen beim Öffnen der Tür zu verhindern, ist diese mit einer Portiere verkleidet. Meine Lieblinge leben nun so Tag und Nacht frei in der Stube. Am Abend hat jedes sein Plätzchen zum Schlafen, welches ganz besonders von den Meisen behauptet wird. —

Nun, lieber Leser, glaube ja nicht, daß nun dadurch bei mir alles vor Vogelschmutz starrt, etwa daß das Zimmer an eine Reiherkolonie erinnert. Mit Ausnahme einiger kleiner Flecke auf dem Fußboden — hierfür liegt stets ein feuchter Wischlappen bereit, um auch dieses von Zeit zu Zeit verschwinden zu lassen — ist, infolge der Anordnung des an der Decke befindlichen Gehänges, so gut wie gar nichts zu merken, daß außer mir noch 11 Vögel in der Stube ihr Wesen treiben. Darin aber liegt die Kuriosität gerade, daß die Vögel ihre Freiheit haben und ich doch stets eine reine Stube. Hierdurch habe ich allein die Zahmheit der Vögel zu verdanken, und ich möchte den sehen, der mir sagen wollte, das wäre Tierquälerei. Der käme jedenfalls bei mir und auch bei meinen Mätzchens schön an.

Hier will ich zum Schluß noch zwei, für mich recht ängstliche Episoden zum besten geben. Während des Sommers hatte ich zwei Blumenkästen mit hochgerankten, das ganze Fenster verdeckenden Bohnen auf dem Blumenbrett. Zur Zeit fing ich die Vögel abends noch ein. Ich hatte abends den einzigen oberen gitterfreien Flügel geöffnet, aber vergessen zur Nacht zu schließen. Am anderen Morgen, einem Sonntag, sitze ich am Fenster auf einem Fußbänkchen und mache mir mit meinen Stiefeln zu schaffen. Meine Kohl- und Sumpfmeise sowie Mucki, der Kreuzschnabel, tummeln sich seelenvergnügt im sonnigen Fenster herum. Plötzlich sehe ich hoch, und o Schreck, der Fensterflügel ist noch weit auf; jedoch nahm keiner der Vögel Notiz davon, trotzdem die Meisen direkt im Fensterrahmen saßen. Mit Hilfe einiger Würmchen ließen sie sich ganz ruhig fortlocken und konnte so ich dann den Fensterflügel schließen. Ein Beweis dafür, daß den Vögelchen der Begriff Freiheit gar nicht mehr anders bekannt war, da sie ja ihre Freiheit und einen stets gedeckten Tisch dazu hatten.

An einem anderen Sonntag lötete ich für meinen Vater an einer kleinen Käfigscheibe einen Haken an. Da mir der Salmiakdunst etwas zu arg wurde — die Fenster waren offen —, öffne ich des schnelleren Durchzugs halber die Stubentür. Ich war schon einige Zeit fertig, als eine Hausanwohnerin kommt und den Kindern meines Nachbarn zuruft: „Bei euch ist eben ein Rotkehlchen eingeflogen“. Ich wundere mich sehr darüber, da ja meine beiden vermeintlich da waren. Ich also hinüber zum Nachbar und den Eindringling gefangen. Wer beschreibt mein Erstaunen,

Schwarzkappenpfäffchen (f. S. 147).

als wir ihn haben und sich der Rotbart als mein Knickerchen entpuppt. Ich habe diesen, da beide im Anfang zum Verwechseln ähnlich waren, einen Aluminiumring ums Beinchen gelegt, woran ich ihn sofort wiedererkannte.

Er hatte sich durch die offene Tür verflogen und wollte dann vom Hof aus, nach Aussage der Hausanwohnerin, bei mir am Gitter herein, aber konnte natürlich nicht, und ist einfach ins Nebenfenster, welches eine zerbrochene Scheibe hatte, eingeflogen. Auch ein Beweis, daß das Tierchen gar keinen besonderen Freiheitsdrang hatte, denn sonst hätte es ja, da es schon auf dem Hofe war, einfach auf und davon fliegen können.

Ich glaube also wohl nicht zuviel zu sagen, wenn ich sage, meine Vögelchen empfinden absolut keine Freiheitsberaubung. Jedenfalls habe ich mich an diese herzigen, lieben Dingerchen dermaßen gewöhnt, daß sie mir für kein Geld preis wären und würde die Not noch so groß sein. Lieber verzichte ich auf eine Mahlzeit, aber nicht auf meine Mätzchen.

Mein Jamaika-Trupial.

Von Prof. K. A. Diener.

(Nachdruck verboten.)

Der herrliche Vogel ist in einem Käfig von 1,35 m Länge und entsprechender Höhe untergebracht. Sprunghölzer, zur Hälfte berindete Zweige verschiedener Dicke, sind vorhanden; diese benutzt er meistens zu seiner Fortbewegung, da er nur sehr ungern auf den Boden kommt. Mitten im Bauer befindet sich über dem Blechboden in der Tiefenrichtung ein 10 cm breiter, 2½ cm hoher Trog, der saubern Seesand enthält; auf diesem Trog bearbeitet er gewöhnlich die verschiedenen Bissen, die er ohne vorherige Zubereitung nicht verschlingen will oder kann. Regelmäßig zieht er sie erst durch den Sand, bevor er sie verspeist, so daß stets eine ganze Anzahl Körner mit in seinen Schlund hinabgelangen. An einer Schmalseite ist ein großes, für Papageien ausreichendes Badehaus angehängt, dessen Eingang jederzeit offensteht; davor liegt auf einem schmalen, dünnen Brettchen ein großer flacher Stein und auch der Trinknapf steht hier darauf. Der Bewohner ist nämlich ein eifriger Badegänger, der so ziemlich täglich sein Gefieder gehörig durchnäßt; nur hält er sich, im Gegensatz zu fast allen anderen meiner Pfleglinge, dabei nicht im geringsten an eine gewisse Tagesstunde, sondern er steigt ins Naß, sobald und so oft ihm der Gedanke daran kommt. Für den kühlen Stein hat er, wie der zum Unterschied von seinen Mitbewohnern, anscheinend kein besonderes Interesse; jedenfalls hält er sich sozusagen nie absichtlich darauf auf, woraus zu schließen ist, daß eine solch' kühlende Unterlage für die Gesundheit seiner Füßen nicht unbedingt erforderlich ist. Als Bodenbelag dient eine Schicht Zeitungspapier, die mindestens jeden Tag zu erneuern ist; die Entleerungen des Bewohners sind eben außerordentlich häufig und umfangreich, ganz wie es von einem Starvogel erwartet wird.

Graurückiges Zwergpfäffchen (s. S. 147).

Ebenso war vorauszusehen, daß er, als echter Vertreter von Icterus, sich nicht gerade durch Mäßigkeit im Fressen auszeichnen würde; das Quantum, welches er sich alltäglich einverleibt, ist denn auch wahrlich nicht gering. Da kommt keine meiner Drosseln, die am Futterplatz doch auch „ihren Mann stellen", im entferntesten mit. Glücklicherweise sind die Materialien, die er verarbeitet, weder schwer erhältlich noch besonders kostspielig; in der Hauptsache bestehen sie nämlich aus Früchten. Die ersten Wochen seines Hierseins bekam er nur geschnittene Birnen, da diese gerade reif waren; dann kamen Äpfel und noch etwas später Apfelsinen (Orangen) an die Reihe, welch letztere er mit besonderer Vorliebe entgegennimmt. Er bekommt gewöhnlich ¼ oder (von den kleinen Exemplaren) ½ vorgesetzt und diese höhlt er mit staunenswerter Geschicklichkeit bis aufs letzte Restchen tadellos sauber aus. Jeden Tag verzehrt er die Hälfte eines mittleren Apfels, ebensoviel einer gleich großen Birne und dazu eine halbe große oder eine ganze kleine Apfelsine. Das reicht aber noch lange nicht; er ist nämlich nicht nur Vegetarier, sondern ein ebenso überzeugter Fleischfresser. Sein Futtergemisch enthält jeden Tag einen recht hübschen Prozentsatz rohen, geschabten Rindfleisches; dieses holt er Stückchen um Stückchen aus dem Napf heraus, trägt sie zum Sandtrog und dort verspeist er sie gemächlich in allerkleinsten Portionen, die er mit seinem langen Schnabel vom Stück löst, das er währenddessen mit dem einen Fuß an die Wand des Troges gepreßt festhält. Auch damit hat der Hunger leider noch nicht genug; für allerlei lebendes Getier hat er ebenfalls vollstes Verständnis und so erhält er denn in zwei Tagesraten je 6 Mehlwürmer größten Kalibers und, ganz nach Verfügbarkeit, als willkommene Intermezzi Fliegen, Spinnen und anderes Geschmeiß. Interessant ist, wie er mit seinem gefährlich-spitzen Schnabel die Würmer entgegennimmt, sie erst in der vordersten Spitze ein paarmal hin und her schiebt und dann ohne irgendwelche Schwierigkeit glatt den Schlund hinabrutschen läßt. Im Laufe des Nachmittags sind all seine Tröge leer, der Appetit ist aber nach wie vor ungeschwächt und so sucht er nun im ganzen Käfig alle gelegentlich herausgeworfenen Bissen peinlich gewissenhaft zusammen und führt auch diese seinem außergewöhnlich leistungsfähigen Magen zu; natürlich muß nochmals wenigstens teilweise nachgefüllt werden und er bekommt also regelmäßig noch etwas Universalfutter und einen neuen Schnitz Apfelsine. Sein Trinkbedürfnis ist selbstredend recht gering; es wundert mich nur, daß er überhaupt noch Wasser schöpft, was er regelmäßig tut.

Im Benehmen und Wesen ist mein Orangetrupial sehr interessant; obwohl er nicht gerade sehr beweglich oder gar rastlos kann genannt werden, ist er doch sozusagen den größten Teil des Tages über „im Betrieb". Besonders elegant schauen seine Bewegungen nicht aus, wenigstens im Einzelkäfig nicht; sein ganzes Äußere ist allerdings so wie so wenig proportioniert. Besonders merkwürdig, um nicht zu sagen unschön, wirken sein verhältnismäßig langer Schnabel, sein fischähnliches, unsympathisches Auge und seine außergewöhnlich kräftigen Ständer; prachtvoll dagegen zeigt sich sein Frack, dessen zwei Hauptfarben schwarz und gelb ungemein effektvoll kontrastieren und zusammen mit dem Weiß der Flügelbänder ein ebenso auffallendes wie farbenprächtiges

Orangepfäffchen (s. S. 147).

Gesamtbild hervorrufen. Eine ziemliche Neugierde ist dem buntbefrackten Ausländer eigen; auf alles gibt er wohl acht und was überhaupt in Reichweite kommt, untersucht er gründlich mit dem Schnabel, dessen er sich in geradezu virtuoser Weise, ähnlich einer Pinzette, bedient. Auch plötzlichem Erschrecken ist er ausgesetzt; besonders gerät er in Aufregung, wenn sich ihm etwas Glänzendes, Blendendes nähert, sei es ein goldener Ring an irgendeinem Finger der Hand, die an oder in seinem Käfig zu tun hat, oder eine Brille oder ein Kneifer, wie ich einen trage. Doch verliert er nie völlig den Kopf und rast also nie wie toll in seinem Behälter herum; dagegen wahrt er einen angemessenen Abstand, drückt sich mit Vorliebe gegen die Käfigrückwand und mustert nun den Gegenstand, der ihn in Aufregung brachte, mit langem Hals und merkwürdig lugendem Blick. In dieser Stellung macht er einen ganz besonders eigentümlichen Eindruck, sieht alles eher als vertrauenerweckend, wohl aber höchst unsympatisch aus und ist dazu angetan, dem Beschauer eine leise Furcht vor seiner Berührung einzuflößen. Tatsächlich erfolgt auch, sobald sich die Hand ihm nähert, blitzschnell ein wohlgezielter, ziemlich schmerzender Schnabelhieb und es empfiehlt sich da von selber, rechtzeitig den Rückzug anzutreten, denn sonst steigert sich seine Abneigung zu richtigem Zorn und die Hiebe erfolgen nachdrücklicher und hageldicht. Dabei stößt der Vogel, dem sich die Kehlfedern sträuben, ein eigentümliches, unschönes, warnendes Gekrächz aus, ähnlich wie es z. B. die Raubvögel von sich geben, wenn sie gegriffen werden.

Im übrigen ist mein Trupial außerordentlich zahm; jeden vorgehaltenen Bissen nimmt er anstandslos entgegen, von mir manchmal freilich etwas „grob", da ihn meine Kneifergläser ab und zu irritieren. Alle Familienangehörige kennt er genau; auch meinen Boxer weiß er wohl zu erkennen und vor ihm hat er nicht die geringste Scheu, läßt sich durch ihn auch nicht im geringsten irgendwie stören, während ein fremder Vierbeiner durchaus nicht nach seinem Geschmack ist. Anderen gefiederten Wesen gegenüber ist er allerdings unverträglich; ich hatte ihn zunächst versuchsweise in eine Voliere zu einem Sonnenvogel hineingesetzt, den er aber vom ersten Augenblick an tyrannisierte. Zum Futterplatz ließ er den kleineren Genossen unter keinen Umständen, und ab und zu, ganz wie ihm die Laune ankam, verfolgte er ihn im ganzen Käfig. Glücklicherweise war dieser behender und beweglicher als sein Verfolger; trotzdem erwischte er ihn schon am ersten Tage, als er an ihm vorbeiwollte, mitten im Auge und beschädigte ihn am linken Flügel. Ich entfernte dann sofort den Sonnenvogel und brachte einige Tage später den Trupial im neuen, eigens für ihn hergestellten geräumigen Einzelkäfig unter. Kommt gelegentlich einer meiner gefiederten Zimmergenossen aus und hängt sich ans Gitter seines Bauers, so fährt er unverzüglich fauchend auf ihn los; wehe dem Unvorsichtigen, wenn er sich nicht rechtzeitig zurückzieht und so den scharfen Schnabel des Gelbvogels zu spüren bekommt!

Manierlicher zeigt er sich jedoch, wenn die Mehlwürmerkiste vom Gestell genommen wird, was für ihn immer bedeutet, daß nun die Verteilung der von ihm besonders geschätzten Leckerbissen vor sich gehen soll. Scharf äugt er in der Richtung, wo die Würmer zuerst zur Verabreichung gelangen und verfolgt voll Spannung all meine Bewegungen. Im Laufe der Zeit hat er sich eine ganz eigene Methode des Bettelns zurechtgelegt, mit der ich mich vollkommen einverstanden erkläre: er singt mir nämlich regelmäßig etwas vor. Sobald er sieht, daß die auf der gegenüberliegenden Seite hausenden Drosseln ihre Rationen verabreicht bekommen, läßt er eine bestimmte Strophe hören und wiederholt sie in kurzen Abständen solange, bis endlich die Reihe auch an ihn kommt. Stimmt er aber ausnahmsweise einmal diesen Sang nicht an, so brauche ich ihn dazu nur aufzufordern und ihm nötigenfalls die Strophe vorzusingen, und unverweilt kommt er der Einladung nach und verdient sich mit seinem Geflöte den Festbraten schon im voraus.

(Fortsetzung folgt.)

Kleine Mitteilungen.

Beobachtungen bei Escheburg-Börnsen am 25. 3. 24. Bachstelze, die ersten weißsternigen Blaukehlchen, Kiebitz, Brachvogel, Singdrossel im Gesang, ziehende Wiesenpieper; Lerchen, auch Heidelerchen singen; Haubenlerchen, Rohrammer, Kleiber, nestbauende Elstern, schlagende Buchfinken. 26. 3. 24, gleich hinter Bergedorf Starengesang; außer den oben Genannten Bluthänflinge paarweise, Gebirgsstelze, Fitislaubsänger, Storch; lautsingende Rotkehlchen; Blau- und Kohlmeise. Am 30. 3. 24 bei anfangs schönem, sonnigem Wetter, gegen 11 Uhr einsetzender Trübung mit kalten Winden sehe ich vier weißsternige Blaukehlchen in einem Wassergraben

unter Wurzeln von Weiden sich drückend. Außer den schon vorher Genannten Wacholderdrossel, Grünspecht, Heckenbraunelle, Zaunkönig, Sumpfmeise, Rebhühner. Am 5. 4. 24, nach einer Nacht mit starkem Frost bei schönem angenehm warmen Wetter mit Sonnenschein, 9½ Uhr vorm., überall balzende Blaukehlchen, den ersten Weidenlaubsänger, Gartenrotschwanz, Elster, Stockente, Teichhuhn, große Züge von Bluthänflingen und Buchfinken, darunter auch Bergfinken. 9. 4. 24 Hausrotschwanz, Scharen von Feldsperlingen, überall Lerchengesang; das erste Wolfsche Blaukehlchen, das zurzeit einen meiner Käfige bewohnt. 13. 4. 24: In der Nacht zum 10. d. M. starker Schneesturm bis zum 11. d. M., nachm. 5 Uhr; die Telegraphenmasten der Strecke Hamburg—Bergedorf sind umgebrochen. Das Blaukehlchenrevier ist überschwemmt. Mein Beobachtungsrevier ist in Schnee eingehüllt. Ich begegne Heckenbraunellen, Zaunkönig, Rotkehlchen, die erste Rauchschwalbe!; Blaukehlchen, Brachvogel, Bachstelze, Kleiber, Singdrossel, Rohr-, Goldammer; Fitis-, Weidenlaubsänger; unter den Blaukehlchen befand sich eins, das den Schwanz verloren hat. 17. 4. 24: außer den meisten der vorgenannten Arten sehe ich: Amsel, Fischreiher, Turmfalken, ein Paar Mäusebussarde über den Wiesen kreisend, Grünlinge, Rabenkrähe und Sperber. Am 30. 4. 24 höre ich bei Blankenees e die ersten Nachtigallen schlagen, sehe die ersten Trauerfliegenschnäpper, Mönch-, Dorn- und Zaungrasmücken, Wendehals, Stein- und braunkehligen Wiesenschmätzer. Am 1. 5. 24 sehe ich hier den ersten Mauersegler; es ist kalt, die Bäume zeigen noch sehr wenig Laub, Mönch- und Gartengrasmücke halten sich viel am Boden auf. Am 10. 5. 24 beobachte ich bei Winsen a. d. Luhe den ersten Baumpieper, ein mit dem Nestbau beschäftigtes Nachtigallenpärchen, Mönchgrasmücken paarweise, höre den ersten Kuckuck und den ersten Waldlaubsänger neben den meisten obengenannten Vögeln, die auch hier anzutreffen sind.

Rob. Thiele, Altona.

Sprechsaal.

Frage 7: 1. Was ist das Aufzuchtfutter für Zebrafinken und Mövchen; 2. Verfärbt sich bei dem Blutschnabelweber während der Brutzeit auch das Weibchen?

E. W., Oberlind.

Frage 8: Welche Arten der Prachtfinken sind bereits untereinander mit Erfolg gekreuzt worden? Wie sahen die Mischlinge aus? Und welche Arten der Prachtfinken sind mit Kanarien erfolgreich gezüchtet worden?

Frage 9: Welche Mischlinge sind bereits untereinander oder mit einer der Stammformen weitergezüchtet worden?

Vom Vogelmarkt.

Frohn, Horst-Emscher: Große Jasapapageien, Glockenvogel, Tirika, Braunohrsittiche.

A. Hirsch, Aubstadt, Unterfranken (A. Z.-Mtgl. 333): 2,1 Stieglitzkanarien.

Max Kleinert, Tierhandlung, Berlin NO 18, Strausberger Straße 13: Schwarzschulteredelpapagei, rote Arara, Glockenvogel, Schwarzkopfnonnen, Weißkopfnonnen, Muskatfinken, Bronzemännchen.



Herrn A. C., Berlin. Der rechte Unterarm des Erzpfäffchens war geschwollen. Die Todesursache war eine schwere Darmentzündung. Der Darm war stark gerötet und blutig unterlaufen. Eine Lungenentzündung war nicht festzustellen.

Herrn C. F., Höchst a. Main. Der Stieglitz ist infolge von Darmentzündung eingegangen. Wodurch die Krankheit verursacht wurde, konnte nicht festgestellt werden. Ganz sonnenlose Räume sind zur Vogelhaltung nicht besonders geeignet. — Wellensittiche brüten zu jeder Jahreszeit. Vielleicht hängt das fortgesetzte Mausern auch mit dem Aufenthaltsraum zusammen. Falls die Luft in dem Raum sehr trocken ist, was wahrscheinlich ist, müßte in bekannter Weise für Luftbefeuchtung gesorgt werden. Sonst läßt sich dazu nichts tun, als die Tiere sachgemäß zu halten. Dasselbe ist der Fall bezüglich des Nistens der Vögel.

Herrn H. v. H., Graz. Das beste Futter für Feerflügelsittiche ist: Hirse (Silber- und Senegalhirse), Spitzsaat, Hafer, wenig Hanf und Reis in Hülsen; Früchte (Bananen) und Beeren, wie sie die Jahreszeit bietet; außerdem Eierbrot, Grünkraut, frische Zweige zum Benagen, halbreifes Getreide und Gräser. Die Ernährung der Sperlingspapageien ist dieselbe. Näheres ist in „Fremdländische Stubenvögel" von Karl Neunzig, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, angegeben.

Herrn W. S., Dresden-Strehlen. 1. Als gute Sänger unter den häufigen auf den Vogelmarkt gelangenden ausländischen Finkenvögeln gelten Mossambikzeisig, Grauedelsänger, roter Kardinal, einzelne Pfäffchen. 2. Man kann diese Vögel bezüglich des Gesanges nicht mit einheimischen Vögeln gleichstellen. Der Gesang ist ein anderer. 3. Am ehesten kann man den Gesang des Sonnenvogels mit dem der Mönchgrasmücke vergleichen.

Herrn K. T., Braunschweig. Der Sonnenvogel kam hier in fauligem Zustande an. Die Untersuchung des Darmes, die zur Klärung der Todesursache nötig war, mußte unterbleiben. Anscheinend ist der Vogel einer Vergiftung erlegen. Dafür sprechen auch die auf der Karte angegebenen Erscheinungen. Das Füttern von Fliegen ist am besten zu unterlassen, da sie oft die Träger von fauligen, giftigen Stoffen sind.

Herrn H. D., Hamborn. Es kann auch bei Sonnenvögeln vorkommen, daß mal ein Vogel den lauten Schlag nicht bringt, wie das ja auch zuweilen z. B. bei der Mönchgrasmücke der Fall ist. Es kann aber auch sein, daß er ein junges Männchen ist, das später noch den lauten Ruf bringen wird, besonders dann, wenn er Gelegenheit hat, einen gut schlagenden Vogel zu hören. Vielleicht ist der Vogel ein Weibchen?

Herrn B. Z. in K. Der mexikanische Karmingimpel bewohnt den südöstlichen Teil der Hochebene von Mexiko. Er ist ein hübscher und harmloser Vogel, der sich für Volieren gut eignet. Seine Züchtung ist bereits gelungen. Auch wurden Mischlinge von einem Karmingimpelmännchen mit einem Kanarienweibchen gezogen. Näheres s. „Fremdländische Stubenvögel" von Karl Neunzig, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung.

Herrn A. St., Stettin. Der Kadaver kam hier mit Fliegenmaden behaftet an, so daß eine Untersuchung nicht möglich war. Die als Futter verwandte Hirse ist besser durch Silberhirse, die wohl kaum im Handel ist, oder durch Senegalhirse zu ersetzen. Die Proben der Mehlwürmer und Ameisenpuppen scheinen einwandfrei zu sein.

Herrn Fr. W., Hamburg. Die gewünschte Auskunft will ich gern geben. Ich weiß aber nicht, welcher Vogel mit Braunflügelstärling gemeint ist. Ich finde diese Bezeichnung nirgends. Nach Mitteilung des wissenschaftlichen Namens oder einer kurzen Beschreibung des Vogels kann die Beantwortung der Frage erfolgen.

Herrn E. W., Stralsund. Im Kropfe des Wellensittichs fanden sich keine Reste eines Eies vor. Der Vogel war nicht gut im Körperzustande. Es scheint eine Verdauungsstörung vorgelegen zu haben. Der Tod ist durch Herzschlag eingetreten.

Herrn G. K., Frankfurt a. M. Über Bastardzucht befinden sich eine Anzahl Abhandlungen in früheren Jahrgängen der „Ges. Welt", wie von Dr. Braune im Jahrg. 1910 u. a., ferner befinden sich Angaben über Bastardzucht in „Der Kanarienvogel" von Karl Neunzig, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung. Ältere Werke über Bastardzucht sind mir unbekannt, es mag sich wohl in einigen Werken über Vogelhaltung etwas finden. Verstreut sind einige kurze Abhandlungen in den Zeitschriften der Vogelkunde. Ein großes seltenes Werk ist das 1896 erschienene „Des Hybrides à l'Etat sauvage" von Suchetet. Es gibt aber nur Beschreibungen meist von wildgefangenen Mischlingen. Überhaupt sind besonders ältere Mitteilungen über Mischlinge vorsichtig zu behandeln.

Herrn A. F., Hamburg. Der Kadaver kam hier in verfaultem und mit Fliegenmaden besetztem Zustande an. Die Verpackung war sehr mangelhaft. Soweit es noch festzustellen war, handelt es sich um den großen Beo, Eulabes javanensis.

(Fortsetzung auf der 3. Umschlagseite.)

Aus den Verbänden.

Reichsverband der deutschen Vogelliebhaber, Sitz Leipzig. Um unsere Mitglieder vor Schaden zu bewahren, ist es dringend notwendig, sie darauf aufmerksam zu machen, daß sie, falls sie mit der Austauschzentrale des Herrn Lehrers Syré in Viernau i. Th. in Austauschverkehr treten wollen, niemals zuerst senden, da uns ein, gelinde ausgedrückt, krasser Fall von Übervorteilung des betr. Herrn gemeldet worden ist. Gleichzeitig ersuchen wir unsere Mitglieder, uns alle unreellen Machenschaften von Händlern und sogenannten „Auchliebhabern" unter Einsendung von beweiskräftigen und stichhaltigen Unterlagen bekannt zu geben, damit dementsprechende Schritte des Reichsverbandes unternommen werden können, denn der Schutz unserer Mitglieder vor dem unreellen Handel ist eine Hauptaufgabe unserer Organisation. Ferner ersuchen wir unsere Mitglieder, falls sich irgendwo Einschränkungen des gesetzlich verbrieften Rechtes der Stubenvogelliebhaberei durch Lokalbehörden bemerkbar machen, die ja leider gesetzlich zulässig sind, uns genaue Abschriften der diesbezüglichen Verfügungen zugehen zu lassen, damit wir für eine Milderung, eventuell für eine Beseitigung derartiger lokalen Verordnungen arbeiten können. Desgleichen ist es unbedingt nötig, wenn unser Reichsverband eine wirkliche Interessenvertretung und eine wirksame Kampforganisation sein soll, daß uns die Vogelliebhaber von allen von gegnerischer Seite geplanten oder bereits unternommenen Schritten zur Bekämpfung der Liebhaberei einheimischer Stubenvögel sofort eingehend unterrichten, damit wir geeignete Gegenmaßregeln ergreifen können. Darum, Vogelliebhaber des gesamten deutschen Sprachgebietes, kommt zur Interessenvertretung Eurer Sache, werbt und agitiert für den Reichsverband der deutschen Vogelliebhaber (Geschäftsstelle Rud. Petters, Leipzig-Propstheida, Preußenstraße 31), denn nur in der Einigkeit des Zusammenschlusses liegt unsere Stärke und in dieser unsere Macht.

Der Gesamtvorstand.
J. A.: Joh. Birk, 1. Vors., Leipzig-Mockau, Beuthstr. 29.

Aus den Vereinen.

Aufgenommen ist Mtgl. Nr. 397 Herr Lokalkaplan S. Schwing, Osthausen bei Ochsenfurt i. Bayern.

A. Krabbe.

Vereinigung hannoverscher Vogelliebhaber. 42. Mitgliederversammlung am 6. Juni 1924. Anwesend 6 Personen. Dr. Weigold, der Leiter der naturwissenschaftlichen Abteilung des Provinzialmuseums, wurde in den Vorstand gewählt. Der Vorsitzende bittet alle Mitglieder, darauf hinzuwirken, daß alle Leute, die in der Nähe der Stadt Hannover Vögel irgendwelcher Art fangen, unnachsichtlich verfolgt und zur Anzeige gebracht werden. Das sind wir dem Ansehen unserer Vereinigung und unseren Bestrebungen als Vogelschützer schuldig. Wir wollen uns auch in demselben Sinne unter Nennung unseres Vereins an die Presse wenden. — Es wird billiges Futter, vor allem Weißwurm, verkauft. — Herr Troschütz zeigte neue Bücher und Vogelkarten, die er zum Nutzen unserer Kasse zum ermäßigten Preise abgibt. Auch stiftete er, wie schon früher häufig, eine Anzahl wertvoller Vogelbücher. Besonders empfehlend wurde auf die neue Grasersche Karte „Einheimische Vögel" hingewiesen. — Eingehend wurde über die bisherigen Wanderungen und die Vogelbeobachtungen dabei (auf einer Wanderung 54 Arten!) gesprochen. Unser Mitglied Böttcher zeigte einen von ihm ganz vorzüglich sauber und zweckmäßig angefertigten Käfig. Die Selbstkosten sind weniger als 4 M. — Dr. Weigold sprach über die vorzügliche Ausstellung in dem Provinzialmuseum „Wie komme ich zur Natur?", die von ihm und unserem Mitgliede Troschütz mit viel Mühe und Sachkenntnis aufgebaut war und glücklicherweise guten Erfolg und regen Besuch gehabt hat. Der Hauptteil des Abends war ein sehr warmer, sachkundiger und längerer Vortrag unseres Mitgliedes F. Schnetter II über unsere Lerchenarten. Er nannte etwa 12 der bekannteren Lerchenarten, von denen bei uns nur die Feld-, Hauben- und Heidelerchen vorkommen. Eingehend sprach er über das ganze Leben dieser schönen Sänger, ihre Gesangswerte, vor allem auch über die Art der Haltung und die Freude, die Vogelfreunde an diesen Tieren haben können, wenn sie sie richtig behandeln. Eine Besonderheit bei den Lerchen ist die sehr schwierige Unterscheidung der Geschlechter. Der Vortrag wurde durch ausländische Erfahrungen von Dr. Weigold ergänzt.

Appel.

Verein Vogelschutz und -pflege zu Dresden. Versammlung jeden Donnerstag, abends 8 Uhr, im Vereinslokal, „Schillers Restaurant", Ecke Stifts- und Ehrlichstraße Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen.

Bernhard Kühn, Vorsitzender.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei zu Hamburg. Sitzungen finden statt jeden 1. und 3. Dienstag im Monat in Hüttmanns Hotel, Poolstr. 22, abends 8¼ Uhr. Nächste Sitzung Dienstag, den 1. Juli 1924.

J. A.: Arnold Weber, 1. Vorsitzender.

Verein von Vogelfreunden Karlsruhe in Baden, gegr. 1888. Vereinsversammlung jeden 1. Donnerstag im Monat. Vorstandssitzung 1. Donnerstag nach dem 15. eines jeden Monats.

Nächste Monatsversammlung Donnerstag, den 3. Juli 1924, abends 8 Uhr. — Vereinslokal „Goldener Adler". Gäste willkommen.

Bang, 1. Vors. Boppel, 1. Schriftführer.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig. Vereinssitzungen jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat im Vereinslokal, „Bauers Brauereirestaurant", Täubchenweg. Nächste Sitzungen am 19. Juni und 3. Juli 1924. Gäste stets willkommen.

J. A.: Johann Birk, 1. Vorsitzender.

Verein der Vogelfreunde Leipzig-Plagwitz. Vereinslokal: „Gosenschlößchen", Leipzig-Plagwitz. Sitzungen an jedem 1. und 3. Montag des Monats, abends 8 Uhr. Vogelfreunde sind stets willkommen.

J. A.: Karl Scholtissek, 1. Vorsitzender, Leipzig-Plagwitz, Lauchstädter Straße 30.

Für Entomologen.

...s Schmetterlingsbuch. Zum Selbstbestimmen aller in Deutschland, Österreich, Ungarn und der Schweiz vorkommenden Groß- sowie der vorzugsweise gesammelten Klein-Schmetterlinge. Mit 67 Textabbildungen. Kart. 4.— M.

...s Käferbuch. Zum Selbstbestimmen der in Deutschland, Österreich-Ungarn und der Schweiz vorkommenden Koleopteren. Mit 144 Textabbildungen. Kart. 4.— M.

...e Käfer- und Schmetterlingssammler. Anleitung zur Herstellung und Handhabung der beim Fange, der Zucht und dem Präparieren von Käfern, Schmetterlingen und Raupen als geeignet bewährten Geräte, sowie zur Anlage und Erhaltung von Insektensammlungen. Von Karl Wingelmüller. Mit 32 Abbildungen. Geh. 1.50, geb. 2.— M.

Schädlinge und Nützlinge der Kleintierwelt. Ein Lehrbuch für jedermann von Prof. Dr. L. Glaser. Mit 85 Textabbild. Kart. 3.— M.

Für Bienenzüchter.

Dzierzon's rationelle Bienenzucht. Von Pfarrer Dr. Dzierzon. 2. Auflage. Mit vielen Textabbildungen. Kart. 3.— M.

Bienenzucht im Zargenbreitwabenstock. Von Jak. Zuers. Mit 25 Abbildungen im Text. Kart. 2.— M.

Leben und Zucht der Honigbiene. Ein gemeinverständliches Lehrbuch über Behandlung der Bienen und über Tätigkeit, Nutzen und Anatomie der Biene von Prof. Dr. O. Krancher. 2. verbesserte Aufl. Mit 1 Tafel, 82 Abbild. u. 7 Kopfleisten. Kart. 3.— M.

...reutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg / Postschließfach 148

Anzeigenteil

Die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 20 G.-Pf. berechnet. Aufnahme erfolgt gegen Voreinsendung des Betrages in Reichsgeld per Brief od. auf unseren Zahlstellen: Postscheckkonto: Magdeburg 3148, Wien 156 687, Bern III 4326, Prag: Creditanstalt d. Deutschen unter Angabe des Zweckes.

Käfige u. Gerätschaften

Verk. Schindler-Voliere
mit Zubehör und Tisch (Metall), 1,85 m lang, 2,15 m hoch, 1 m tief. Außerdem 1 Kreuzschnabel, Dompfaff, Hänfling, Zeisig, Grünfink u. Buchfink.
Julius Hahne, Berlin NO,
467] Christburger Str. 16.

Futtermittel

Frische Ameisenpuppen
versende 1 Liter im Holzkistchen als Päckchen für 2.20 ℳ bei Voreinsendung des Betrages.
468]
E. W. Lenger, Berlin N 58,
Schönhauser Allee 70 a.

Feinste Ameiseneier
(Pfälzer) liefert bis auf weiteres per Liter ℳ 2.—, nur gegen Einsendung des Betrages.
469]
E. Urban, Vogelhandlung,
Karlsruhe i. B., Hirschstraße 89.

Vogelfutter [470
für Kanarien, Waldvögel, Exoten, Papageien, Weichfresser. Anfragen nur gegen Rückporto. Liste 13 über Vogelfutter, Liste 5 über Vogelkäfige, Zuchtgeräte usw. mit etwa 400 Abbild.
W. Göpel, Leipzig,
Tröndlinring 1. Telephon 14 958.

Mehlwürmer neue, feinste Qualität, Pfd. 8 ℳ
471] Jeltner, Breslau, Weinstr. 12.

Mehlwürmer
¼ Liter gegen Einsendung von 2 Rentenmark franko
472]
Bonitas-Versand, Rostock i. M.

Mehlwürmer
geg. Einsend. v. 2.—Rentenmark ¼ Pfd. franko versend. D. Waschinski & Co., Biesenthal I (Mark). [473

Vögel

Graupapageien
junge sehr gelehrige Tiere à 120,— ℳ
Weißhaubenkakadu à 200,— ℳ
Gelbhaubenkakadu à 90,— ℳ
Feuerflügelsittiche à Paar 40,— ℳ
Wellensittiche à Paar 20,— ℳ
Rote Kardinäle à Paar 80,— ℳ
Blaue Reisfinken à Paar 10,— ℳ

Chinesische Nachtigallen
feurige Schläger à Stück 11,— ℳ
Papstfinken à Paar 20,— ℳ
Amaranten à Paar 4,— ℳ
Atlasfinken à Paar 4,— ℳ
Grauastrilden à Paar 4,— ℳ
Schmetterlingsfink. à Paar 4,— ℳ
Orangebäckchen à Paar 4,— ℳ
Bandfinken à Paar 4,— ℳ
Paradieswitwen à Paar 4,— ℳ
Silberschnäbelchen à Paar 4,20 ℳ
Grauedelsänger à Paar 5,— ℳ
Schönbürzelchen à Paar 5,— ℳ
Goldbrüstchen à Paar 6,— ℳ
Webervögel à Paar 3,50 ℳ
Mossambikzeisige à Paar 10,— ℳ
Schwarzkopfnonnen à Paar 4,50 ℳ
Weißkopfnonnen à Paar 10,— —
Muskatfinken à Paar 4,50 ℳ
Bronzemännchen à Paar 7,— ℳ
E. W. Lenger, Berlin N 58,
474] Schönhauser Allee 70 a.

475] Je ein Weibchen
Nymphen- u. Singsittich
1923er Brut gesucht.
Jos. Porzelt, München, Klarastr. 3.

Vertausche

Ia Männchen
Kirschkernbeißer,
fingerzahm und singend, gegen anderen Sänger oder Zuchtpaar Dompfaffen, evtl. auch Exoten. [4—
N. Diwersy, Merzig (Saar).
476] A. Z.-Mtgl. 183.

Ia Singdrossel
jung aufgezogen, gegen anderes zu tauschen gesucht. [477
Ernst Petschel, Weisa 15 (Sachsen).

Nordischen Sprosser
gebe in Tausch gegen Nützliches.
478] Retourmarke.
L. Koß, Berlin, Dresdener Str. 76, IV.

Verkaufe

Zuchtpaare Safranfinken, Wellensittiche, japan. Mövchen.
Hugo Trommer, Hannover,
479] Hildesheimer Str. 40 I.

Suche Weibchen Jakarinifink od. Pärchen, auch Orangepfäffchen.
Brummund, Prenzlau,
480] Neustadt 692 a.

Gebe ab

an ges. eingewöhnt. Zuchtpaaren:

1,1	Angolablauastrild	15 ℳ
2,2	jap. Mövchen	je Paar 16 ℳ
1,0	jap. Mövchen	5 ℳ
1,0	Zebrafink	5 ℳ
1,1	gr. Kubafink	25 ℳ
1,1	klein. Kubafink	45 ℳ
1,1	indische Wachteln (Einführ. v. Fockelmann)	42 ℳ
1,1	Lachtauben	12 ℳ
	Alte u. junge Wellensittiche	je 7 ℳ

481] evtl. Angebote erbeten.
Haberlandt, Magdeburg-Wst.
A. Z.-Mtgl. 12. Hardenbergstr. 9.

Gartenbau-Bücherei

Herausgegeben von
Prof. **Dr. Udo Dammer,** Kustos des Botanischen Gartens Berlin-Dahlem.
Jeder Band 1.20 M.

Bd. 1. **Monatskalender des Pflanzen- und Gartenfreundes.** Von Prof. Dr. Dammer. 2. Auflage.
Bd. 2. **Zimmerblattpflanzen.** Von Prof. Dr. Dammer. 2. Auflage. Mit 48 Abbildungen.
Bd. 3. **Gewürzkräuter.** Von Obergärtner Bode. Mit 6 Abb.
Bd. 4. **Balkonpflanzen.** Von Prof. Dr. Dammer. 2. Auflage. Mit 41 Abbildungen.
Bd. 5. **Zimmerblütenpflanzen.** Von Prof. Dr. Dammer. 2. Auflage. Mit 23 Abbildungen.
Bd. 6. **Die ein- und zweijährigen Gartenpflanzen.** Von Gartenbaudirektor Goeschke. Zurzeit nicht lieferbar!
Bd. 7. **Der Gartenrasen.** Von Obergärtner Bode. Mit 14 Abb.
Bd. 8. **Die Farnpflanzen unserer Gärten.** Von Inspektor Mönkemeyer. Mit 15 Abbildungen.
Bd. 9. **Der Zwergobstbau.** Von Gartenbaudirektor Koopmann. Mit 6 Abbildungen. Zurzeit nicht lieferbar!
Bd. 10. **Die Staudengewächse.** Von Gartenbaudirektor Goeschke. Mit 35 Abbildungen.
Bd. 11. **Gemüsebau auf Gartenbeeten.** III. Teil. Von Gartenbauinspektor Lindemuth. Mit 20 Abbildungen. Vergriffen.
Bd. 12. **Pfirsiche und Aprikosen.** Von Obergärtner Kotelmann. Mit 13 Abbildungen.
Bd. 13. **Schönblühende Zwiebelgewächse.** Von Gartenbauinspektor Lindemuth. Mit 30 Abbildungen.
Bd. 14. **Blütensträucher.** Von Gartenbaudirektor Goeschke. Mit 28 Abbildungen.
Bd. 15. **Gemüsebau auf Gartenbeeten.** I. Teil. Von Gartenbauinspektor Lindemuth. Mit 22 Abbildungen.
Bd. 16. **Die Beerensträucher.** Von Gartenbauinspektor Maurer. 2. Auflage. Mit 14 Abbildungen.
Bd. 17. **Bunte Gehölze.** Von Gartenbaudirektor Goeschke. Mit 1 Tafel.
Die Tabakpflanze. Ein Handbuch zu ihrer Anzucht und Verwertung für jedermann. Von A. Oertel. 2. Auflage. —.60 M.
Bd. 18. **Gemüsebau auf Gartenbeeten.** II. Teil. Von Gartenbauinspektor Lindemuth. Mit 22 Abbildungen.
Bd. 19. **Gurke, Melone, Kürbis.** Von Inspektor Lange. Mit 15 Abbildungen.
Bd. 20. **Der kleine Villengarten.** Von Gartenarchitekt Pfyffer v. Altishofen. Mit 20 Abbildungen und 3 Tafeln.
Bd. 21. **Das Mistbeet.** Von Obergärtner Bode. Mit 5 Abbildungen.
Bd. 22. **Die Gartenlaube.** Von Landschaftsgärtner Klawun. Mit 14 Abbildungen.
Bd. 23. **Das Weinspalier.** Von Gartenbaudirektor Koopmann. Mit 17 Abbildungen.
Bd. 24. **Die Kultur der schönblühenden Orchideen.** Von Inspektor Lebien. Mit 7 Abbildungen.

Zu beziehen durch:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlg., Magdeburg
Postschließfach 148.

Lebende

Edelreiher
Löffelreiher
Purpurreiher
Fischreiher
Nachtreiher
Zwergreiher
Ibisse (Sichler)
weiße Störche
schwarze Störche
Trappen
Kraniche
Kolkraben
Siebenbürger Uhu
Stein- und Königsadler
Gänse- und Kuttengeier
Birk- und Auerwild
Wanderfalken u. Habichte
offeriert die altrenommierte Firma
E. Mayer, Wilderport,
Wiener Neustadt.
Rückporto muß beiliegen. [48

Abzugeben oder im Tausch gegen bessere Exoten
1,1 Silberschnäbelchen, garant. Zuchtp.
1,1 Amaranten
1,1 Schmetterlingsfinken
1,1 Grauastrilde
1,0 Grisbleu
1,0 Erlenzeisig [4
Fritz Gleißner, Cannstatt
Karlstr. 18. A. Z.-Mtgl. 31

Franks Zoolog. Vogel-Samen- und Käfig-Handlung, München
Gabelsbergerstraße 9, bietet an
Gut eingewöhnte Vögel, wie Schamadrosseln 90 ℳ, rote Kardinäle 60 ℳ, ausgefärbte Purpur-Tangaren 50 ℳ, meerblaue Tangaren 20 ℳ, Dominikaner-Kardinäle und amerik. Wanderdrosseln je 15 ℳ, kleine Alexandersittiche, mexik. Karmingimpel 12 ℳ das Stück, Jendajasittich 30 ℳ, gelbe Wellensittiche 25 ℳ, grüne Wellensittiche 20 ℳ, graue Reisfinken und Safranfinken je 10 ℳ, jap. Mövchen 18 ℳ, Weber, Bandfinken, Astrilden, rot, je 4 ℳ das Paar, Kanarienhähne 15, 18, 20 u. 25 ℳ d. S. Anfragen Rückporto beifügen. [

Vertausche
1 Schlagnetz, 3×4 m, gegen Singdrossel, Schamadrossel, Sprosser oder Buchfinken (Reitzsinger [3 oder Düsterwied), nur rein schlagend
Wilh. Althoff, Düsseldorf
485] Kaiser-Wilhelm-Straße 11.

Allen Vogelfreunden
zur gefl. Kenntnis, daß ich meine Abteilung (Muster Rausch) bedeutend vergrößert habe. Bestellungen werden schon jetzt entgegengenommen. Anfragen nur gegen 50 Pfg. Rückporto. Bedienung streng reell. [
Josef Pichler,
Wien III, Klimschgasse

Inserate
für das am 3. Juli 1924 zur Ausgabe gelangende Heft 20 der Welt erbitten bis 28. Juni 1924

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Berlin-Hermsdorf; für den Anzeigenteil: Rolf Kretschmann, Magdeburg, Postschließfach 14
Verlag der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck: August Hopfer, Burg Bz. Mgdbg.

Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Jahrg. 53 | Den 3. Juli 1924 | Heft 20

(Druckort: Burg, Bezirk Magdeburg.)

Vogelleben im Wiesengelände.

Von Fritz Braun.

(Nachdruck verboten.)

Meine hart an der Stadtgrenze von Graudenz gelegene, über weite Wiesen hinwegschauende Wohnung besitzt auch mancherlei Mängel. Gar ungestüm rüttelt im Winter der Nordost an Fenstern und Türen, und je tiefer die Quecksilbersäule des Thermometers sinkt, um so höher werden die Beträge der Kohlenrechnungen. Und doch möchte ich das Quartier um vieles nicht mit einer Herberge im Innern der Stadt vertauschen. Die Vorzüge, die das mit sich brächte, vermöchten mich nicht dafür zu entschädigen, daß man dort der Natur soviel ferner gerückt wäre. Anders als inmitten der engen Gassen läßt sich von meinen Fenstern aus das Spiel der Schneeflocken, das Wabern der Blitze beobachten, und wenn die Wiesen und Kornfelder dieser Gegend auch keine Sprosser beherbergen, so nehme ich in lauer Frühlingsnacht auch mit den Liebesliedern der zahllosen Frösche, welche die rohrumhegten Tümpel bewohnen, gerne vorlieb.

Mitunter mache ich mir wohl Gedanken darüber, ob es nicht gesundheitsschädlich sei, in einem so tief gelegenen Striche zu hausen. Ich sage mir dann aber, daß es damit nicht so schlimm sein kann, denn es handelt sich hier nicht um einen alten Landsee, dessen Becken allmählich von Torfmoosen und allerlei Sumpfgewächsen ausgefüllt worden ist, sondern vielmehr um ein früheres Strombett, in dem weiße Talsande, die mir auch den Bodenbelag für meine Vogelkäfige liefern, bis in große Tiefen reichen. Vermutlich zog hier dereinst die mächtige Weichsel ihre Bahn, ehe sie sich ihr jüngeres Bett westlich der Graudenzer Diluvialinsel geschaffen hatte.

Gerade im letzten Jahrzehnt hat der Mensch mit gutem Erfolge sein Möglichstes getan, den Grundwasserspiegel in diesem alten Flußtal durch die Anlage zahlreicher Gräben und durch ähnliche Maßnahmen mehr ein ganzes Stück tiefer zu legen. Nur die Gefiederten wollen sich mit dieser Tatsache noch nicht recht abfinden, denn immer wieder stelzt im Lenz Freund Adebar in der jungen Saat herum, ehe er einsieht, er tue besser, sich anderswo anzusiedeln. Immer wieder versuchen einzelne Kiebitzpärchen in dem vormals so wohnlichen Revier ihre Brut aufzuziehen, und auch die Flüge rastloser Wiesenpieper, die sich im Frühling einstellen, scheinen den zwei, drei Pärchen, die auf der Trift nisten, diesen Vorzug nicht recht zu gönnen, da sie sich stets noch lange auf den junggrünen Feldern herumtreiben.

Beinahe tagtäglich schlendre ich ein Stündchen auf dem ebenen, baumarmen Plan meiner Wege, und nur selten kehre ich von diesen Spaziergängen unbefriedigt heim.

Kaum hundert Schritt vom Straßenrande liegt inmitten von Wiesen ein mächtiger 2 Meter hoher Komposthaufen, an die 30 Schritte lang und ihrer 10 Meter in die Breite messend, hier und da begrünt von keimendem Roggen und Hafer. Gerade auf diesem Komposthaufen findet man fast immer ein reiches Vogelleben. Im Winter und Vorfrühling machen sich dort die Saatkrähen und Dohlen so breit, daß die Haubenlerchen, Gold- und Grauammern ihren Lieblingsplatz räumen müssen. Jetzt im Juni sind die Kuhstelzen dort Stammgäste. Ihrer zwei oder drei triffst du dort eigentlich zu jeder Tageszeit. Ich liebe diese Vögel nicht gerade sonderlich, da sie bei dem Vergleich mit der weißen Bachstelze und der Gebirgsstelze, der sich einem doch unwillkürlich aufdrängt, recht schlecht abschneiden. Es ist fast unglaublich, daß diese so viel plumperen Vögel, deren Bewegungen in Sitz und Flug uns mitunter geradezu an die Ammerarten erinnern, so oft mit der Gebirgsstelze verwechselt werden, bei der die Fee der Anmut selber Pate gestanden haben könnte.

Jedenfalls ist es ganz unterhaltend, das Tun und Treiben der Kuhstelzen eine Weile zu beobachten. Jetzt sitzen sie minutenlang auf einem Fleck, schier maschinenmäßig ihren scharfen Lockton ausstoßend. Dann beginnen ihrer zwei zu raufen und fliegen bald gegen den Gegner an, bald dicht über seinen Rücken hinweg. Dann rütteln sie wieder schier minutenlang mit weit ausgebreitetem Schwanz, so daß die weißen Binden seines Federfächers in der Sonne leuchten. Dabei handelt es sich aber nur um harmlose Scheingefechte; die Kuhstelzen kommen hier offenbar viel besser miteinander aus als im Drewenztal, wo ich oft genug beobachtete, daß bei ihren Kämpfen die Federn nur so stoben. Ihr leises, bescheidenes Liedchen lassen sie am meisten in den Abendstunden hören. Zu dieser Zeit sah ich auch einmal einen seltsamen Balzflug, bei dem das Stelzenmännchen, das vielleicht 15 Meter aufgestiegen

war, sich in zehn, zwölf ganz knappen, nach vorn offenen Flugbögen in der Weise herabließ, daß es unmittelbar unter dem Punkte am Erdboden ankam, wo es bei Beginn des Balzfluges gerüttelt hatte.

Auch den Haubenlerchen scheint es auf dem Komposthaufen ganz besonders zu behagen. Daß sie in dieser Gegend so zahlreich sind, liegt vielleicht daran, daß ihnen die flachen Holzzementdächer der städtischen Mietkasernen sichere Niststätten bieten. Dort auf den Dächern beginnen und beschließen sie das Tagewerk mit ihren klangvollen Strophen, die ich persönlich viel höher schätze als manches Vogellied, das sonst in weit größeren Ehren steht. Deshalb freute ich mich auch immer, daß Ruß in seiner Rangordnung der deutschen Sänger der Haubenlerche einen der ersten Plätze angewiesen hatte. Damit verträgt sich vielleicht auch die abweichende Ansicht mancher Ornithologen besser, als sie selbst meinen, denn gerade die Gesangesgabe der Haubenlerchen scheint ja nach ihrem Aufenthaltsorte recht verschieden zu sein.

Offenbar ist auf dem riesigen Komposthaufen jederzeit ein guter Bissen für den Schnabel zu finden, denn sonst würden die Buchfinken und Grünlinge, die Rothänflinge, Stieglitze und Girlitzchen nicht so weit in das offene Gelände hinausstreben und sich dort auf dem bloßen Erdboden herumtreiben.

Auch diese Gesellschaft sehe ich hier recht gern, weil sich die Bewegungen der Vögel auf den kahlen Stellen des Komposthaufens vorzüglich verfolgen lassen. (Schluß folgt.)

Über den Nestbau des Vogels.

Von Anton Usinger.

(Nachdruck verboten.)

Heute, wo die Forschung auf dem Gebiete der Vogelwelt so ausgedehnt und mannigfaltig ist und wir den Vogel nicht mehr einzig und allein seines Gesanges wegen lieben und schätzen, sondern auch tiefer eindringen in das Leben und Treiben unserer gefiederten Sänger, da sieht sich der Beobachter wunderbaren Einrichtungen, Eigenarten und Augenblicken in demselben gegenüber, die sein Interesse und seine Bewunderung im höchsten Grade erregen. Nicht allein der jedes Jahr wiederkehrende Vogelzug ist es, der ihn fesselt, sondern auch das immer wieder vor sich gehende Brutgeschäft und der mit demselben verbundene ebenso interessante Nestbau. So sehr wir den Vogel auch im Gesang bewundern, in eben demselben Maße staunt der Finder eines Vogelnestes über die Fertigkeit des kleinen Meisters.

Ich setze bei meinen Lesern die Arteinteilung in Höhlen- und Halbhöhlenbrüter, Frei- und Offenbrüter als bekannt voraus. Sie umfaßt das ganze Vogelgeschlecht und bildet mit wenigen, nie ausschlaggebenden Abweichungen einzelner Paare, hervorgerufen durch Wohnungsnot oder örtliche Verhältnisse, stets die Regel. Die Wahl der Brutstellen erfordert gewöhnlich eine längere Zeit, und dem nach einem Nistplatz suchenden Vogelpaar scheint die Entscheidung, wo es ihr Nest anlegen soll, nicht leicht zu werden. In der Regel sucht das Männchen die Niststelle, trägt das erste Material herbei und überläßt dem Weibchen den weiteren Ausbau des Nestes. Nur bei wenigen Arten, wie Rabenvögel, Schwalben u. a. beteiligen sich beide Geschlechter gemeinsam am Nestbau, wie ja auch wiederum bei verschiedenen anderen, den größeren Raubvögeln und den in Kolonien brütenden Jahr für Jahr derselbe Horst oder wenigstens dieselbe Niststätte benutzt wird. Ungeachtet der Verfolgung, selbst des regelmäßigen Abschusses eines der beiden Tiere, z. B. Steinadler, Uhu, Hühnerhabicht und Mäusebussard, halten diese Tiere an ihrem angestammten Horste fest, der mit der Zahl der Jahre, da er ja bei jeder Benutzung neu ausgebessert wird, weniger im Umfang als in der Höhe zunimmt.

Im allgemeinen hängt der Stand des Nestes ganz von den Bedürfnissen der Vogelart und von den örtlichen Verhältnissen ab, und sind es vor allen die Höhlenbrüter, die die Natur am engsten an ihre Gesetze fesselt und ihnen Abweichungen nur selten gestattet. Die Spechte, als die ausgesprochensten Höhlenbrüter, die sinnbildlichen Zimmerleute unter den Vögeln, sind stets auf alte Bäume angewiesen und wenn auch der mit starkem Schnabel ausgerüstete Specht ebensoleicht den gesunden Stamm anschlägt, so bevorzugt er doch vom größten bis zum kleinsten Vertreter stets morsche, kernfaule Bäume, vor allem Weichhölzer. Die Nisthöhle, beutelförmig nach unten vergrößert und am Ende oval zulaufend, ist nach Größe der Spechtart verschieden tief und weit. Das Prinzip der Bauart bleibt jedoch stets dasselbe. Den unteren Brutraum füllt meist nichts als der modernde Holzmulm aus, auf dem die Eier zu liegen kommen. Die Höhe der Nisthöhlen schwankt zwischen 3 und 9 m, doch sind tieferstehende Höhlen keine Seltenheiten. Oftmals befinden sich in ein und demselben Stamm mehrere Nisthöhlen etagenweise übereinander. Meist sind dies unfertige Höhlen, die als Schlafstellen benutzt werden, da unsere Höhlenbrüter selten im Freien übernachten, vielmehr alte Höhlen aufsuchen, in denen sie, aufrecht an der Wand hängend, die Nacht verbringen. Wir finden jedoch nicht allein bei den Spechten und ihren Verwandten solche eigens zu diesem Zwecke errichtete Schlafhöhlen, sondern stoßen auch bei dem Zaunkönig auf solche Spielnester, die nichts weiter als Nachtasyle des einzelnen Vogels sind.

Während die Spechte ihre Nisthöhlen selbst zimmern, ist die muntere Sippe der Meisen darauf angewiesen, die verlassenen Höhlen der Spechte als Nistplatz zu benutzen oder mit mehr oder weniger geeigneten Baumlöchern und Spalten vorliebzunehmen. Sie vor allem trifft das Ausrotten kranker und alter Bäume am empfindlichsten. Bei dieser Vogelart finden wir schon eine mit Haaren und Wolle ausgepolsterte Nestmulde, die den Verhältnissen entsprechend nahe oder entfernter des Schlupfloches liegt, so daß der zum Nest strebende Vogel oftmals eine lange Schlupfröhre durcheilen muß. Die halbwegs flüggen Jungen rücken alsdann später dem Lichte zu und kommen, wenn die Beschaffenheit der Höhle dies gestattet, oftmals bis zum Ausgang. Man beobachtet dies beim Segler und den Uferschwalben hauptsächlich. Wir können nicht leugnen, daß die Familie der Meisen beim Nestbau ein außerordentliches Anpassungsvermögen entwickelt und die verschiedenartigsten Nistgelegenheiten wahrnehmen, um ihre Bruten

hoch zu bringen. Sie sind es auch, die am leichtesten die künstlichen Nisthöhlen annehmen. Die weiteren zwei Verwandten, Spechtmeise und Baumläufer, sind insofern interessant, als der erstere das zu große Flugloch mit dem Schmutz der Waldwege bis auf eine kleine Öffnung zumauert und der letztere ein zu seiner Größe in keinem Verhältnis stehendes umfangreiches Nest in Baumlöcher errichtet.

Den Übergang vom Höhlenbrüter zum Frei- und Offenbrüter bilden die Halbhöhlenbrüter. Sie wählen Baumhöhlen, Erd- oder Mauerlöcher und sonstige stets nach oben geschützte Stellen zum Nistplatz. Das Nest selbst liegt, von vorne gesehen, meist frei infolge des sehr großen Einschlupfes. Auch hier ist die Nestmulde mit Haaren, Baumfasern und Federn ausgekleidet, jedoch bleibt dasselbe immer noch ein mehr oder weniger kunstlos zusammengetragenes und wirr geflochtenes Ganzes, bei dem sich eine innere und äußere Nestschicht nur schwer unterscheiden läßt.

Diese Unterschiede treten erst voll und ganz bei den weitaus am künstlerischsten angelegten Nestern der Freibrüter zutage. Hier besteht das Nest deutlich aus zwei Schichten, der äußeren und der inneren. Erstere gibt dem oft auf schwankender Baumspitze stehenden Nest den nötigen Halt und ist mit den Zweigen seiner Umgebung meist innig und fest verbaut. Während außen das Geflecht am stärksten, am Nestrand aber am dichtesten und sorgfältigsten verarbeitet ist, wird das Material nach der Mitte zu feiner, bis die aus den feinsten Hälmchen, Würzelchen bestehende zweite Schicht, in die erstere eingesetzt, nur noch aus Tier- und Pflanzenwolle, Haaren und Federn bestehend, den Eiern eine weiche Unterlage bietet. Das von den einzelnen Paaren verwandte Nistmaterial ist nach Ort und Lage des Nestes verschieden, während der Bau, die Form sowie die Anlage desselben stets gleich bleibt. Jede Art weist Eigentümlichkeiten der Bauweise auf, die ihr gemeinsam eigen sind wie die Horste der Raubvögel, die Raben- und Taubennester, auch die der Finken, oder aber einzelne Vertreter lassen sich sofort an den in die Augen fallenden Formen erkennen und stehen abseits, wie Zaunkönig, Goldhähnchen, Laubvogel und Schwanzmeise. (Schluß folgt.)

Nest der Gartengrasmücke.

Mein Jamaika-Trupial.

Von Prof. K. A. Diener.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Merkwürdig ist auch, daß er diese gleiche Strophe bringt, wenn er Anstalten zum Baden trifft; das ist nämlich stets eine ziemlich umständliche Sache und bis er endlich einmal ordentlich im Gehäuse drinhockt und das Geplantsch vollführt, läßt er regelmäßig erst eine gewisse Zeit verstreichen. Unter dem Eingang wartet er immer und vergewissert sich, daß er nicht etwa beobachtet wird; sieht er nun, daß ich seinem Tun zusehe, so fängt er zu flöten an die schon erwähnte stereotype Strophe, doch erheblich schüchterner und zaghafter, gleichsam fragend, ob er sich's wirklich auch leisten könne. Ich muß mich dann ganz regungslos verhalten, da er bei der geringsten Bewegung meinerseits den Rückzug antritt und einstweilen aufs Bad verzichtet. In gleicher Weise zaghaft beginnt er zu flöten, wenn er in irgendeiner Beschäftigung unvermutet gestört oder wenn er gar erschreckt wird; statt nämlich nach bekannten Mustern planlos hin- und herzurufen, duckt er sich ängstlich nieder und schaut fragend, was nun wohl geschehe. Bemerkt er dann, daß er beobachtet wird, namentlich aus der Nähe, so stimmt er das bekannte Flöten an, das ihm scheinbar am besten über alle kritischen Lagen hinweghilft. Überhaupt behagt ihm der prüfende menschliche Blick nicht; nie und auf keinem Fall hält er einem solchen stand und da er sich ihm gar oft nicht entziehen kann, nimmt er in seiner Herzensangst Zuflucht zur Stimme und klagt in Tönen sein Leid und Unbehagen. In dieser Hinsicht weicht er somit ganz wesentlich von allen meinen gefiederten Pfleglingen ab und bietet daher wiederum ganz besonderes Interesse.

Seine Gesangestätigkeit bietet ebenfalls außerordentlich viel Interessantes; immerhin kann er nicht etwa als Sangesgröße im Sinne von Schama u. a. gelten*). Sein Vortrag zeichnet sich nämlich nicht durch besonderen Melodienreichtum aus; auch in der Struktur bietet er keineswegs auffallend Kunstvolles und in harmonischer und rhythmischer Einsicht bringt er es im großen und ganzen ebenfalls nicht über Mittelmäßiges. Der Hauptvorzug und die größte

*) Für mich ist die Schama die „Sängerkönigin", der ebenbürtig die amerikanische Spottdrossel zur Seite steht, wenngleich sich beide in mancher Hinsicht nicht unwesentlich voneinander unterscheiden. Den „wahren"= „musikalischen" Wert ihres Gesanges erreicht kein anderes Vogellied, dies schon aus dem Grunde nicht, als keinem in ähnlichem Maße das wertvollste Moment (musikalisch-künstlerisch) eignet, die Erfindung; an technischem Können, ebenfalls einer wesentlichen Eigenschaft, die vornehmlich durch den jeden Einzelsänger eignenden Singapparat bedingt ist, kommt ihnen unser Singapparat beinah gleich, während Sprosser und Nachtigall unmittelbar nachher rangieren. Über den „musikalischen Wert" des Gesanges unserer Vögel liegt bislang nichts Stichhaltiges vor; was wir von der Güte des Vogelliedes wissen, stammt von Liebhabern — einzelne, ja die erfahrensten, waren außerdem Händler und schon aus diesem Grunde nicht vorurteilslos —, die die Beurteilung des Gesanges von grundsätzlich unrichtigen Gesichtspunkten aus vornahmen und für ihre Beobachtungsobjekte einen neuen, speziellen Liebhaberwert uns schufen, wobei sie ein wesentlicher Mangel, außerdem nur beschränktes Material berücksichtigen konnten. Man denke an die Wiener und ihre Sprosser-, Nachtigall-, Schwarzplatten- und Buchfink-Theorien, die für ein paar Kronländer, meinetwegen sogar für die K. K. Monarchie überhaupt zutreffen mögen, natürlich auch nur bedingt, für uns andere aber durchaus nicht das Evangelium bedeuten können. Von „Wissenschaftlichkeit" ist von vornherein keine Rede dabei!

Eigentümlichkeit seines Vortrages bestehen in einem unsagbaren Wohllaut, von dem sich keiner eine Vorstellung macht, der den Vogel nicht gehört hat; ähnlich mit Wohllaut geradezu durchtränkte Töne bringt keine zweite Vogelkehle hervor und selbst Bülbül und (von den einheimischen) Pirol, denen in gewissem Sinne ähnlich melodiöse Rufe eignen, reichen bei weitem nicht an ihn heran, ganz abgesehen davon, daß der Europäer auch recht unangenehme, krächzende Laute produziert, die keinen ungetrübten Genuß seines Gesanges zulassen. Im Klangcharakter können sie kaum genau wiedergegeben werden; am ehesten noch mag das möglich werden auf der Königin der Instrumente, der Orgel, bei entsprechender Registerbehandlung.

Eigentliche Rufe, die nur aus einem Ton oder höchstens 2 Tönen bestehen, läßt er nicht vernehmen; stets sind es mehr oder weniger lange Touren oder Strophen, die ab und zu nur zwei bestimmte Takteile enthalten, die aber hintereinander wiederholt werden. Charakterisch sind zunächst zwei eigentlich stereotype Strophen, von denen die eine, die Begrüßungs- oder Anbettelungs-Tour, bereits genannt wurde. Diese besteht aus zwei Takten, die ihrerseits wiederum aus je zwei Tönen bestehen; von den vier Tönen sind alle mit Ausnahme des ersten von einem ihnen vorangehenden, um $^1/_2$ Ton tiefern, kurzen Vorschlag begleitet. Das Ganze bewegt sich im $^3/_4$ Takt, doch nicht etwa walzermäßig lebhaft, sondern behaglich und gemächlich; die Tonart ist Ges-Dur. Wie folgt:



Die zweitaktige Tour wird mindestens zweimal hintereinander gebracht; im allgemeinen gelangen die einzelnen Takteile stets vollständig zum Vortrag, ab und zu aber auch verstümmelt. Letzteres ist besonders der Fall, wenn der Vogel irgendwie überrascht wurde und es macht dann sein Lied den Eindruck der Verlegenheit; man möchte sagen, der Künstler habe „den Faden verloren" und suche nach dem Zusammenhang. Bald klingt es



Oder der Künstler bricht ab:



Alles ist ungewöhnlich wohllautend, nicht gerade sehr kräftig, aber recht tragfähig; mit dem eigentlichen „Gesang" steht diese Strophe in keinem Zusammenhang.

Die zweite ist zwar nicht mehr so ausgesprochen stereotyp, aber doch auch wieder eine Klasse für sich und kommt nur unter bestimmten gleichen Verhältnissen zustande. In der Struktur ist sie etwas komplizierter, setzt sie sich doch aus drei Takten zusammen und enthält sie doch einen nicht wenig kühnen Sextenschritt. Zeitmaß und Tonart sind wiederum dieselben; dagegen bewegt sie sich im $^2/_4$ Takt. In der Hauptsache besteht sie wieder aus zwei Tönen, wenngleich im ganzen deren vier darin erscheinen. Im allgemeinen gelangen diese drei Takte nur einmal zum Vortrag; eine unmittelbare Wiederholung derselben kommt nie zustande. Wie nachstehend:



Ab und zu werden die zweite Hälfte des zweiten Taktes und die beiden Noten des dritten regetiert, so daß eine viertaktige Tour zustandekommt.



Länger als so kommt sie jedoch niemals zum Vortrag; dagegen erscheinen nicht allzuselten die zwei ersten Takte für sich allein und wiederholen sich gelegentlich bis zu vier. und fünf Mal, wobei dann von der dritten Reprise an ein bis zu erstaunlicher Kraft anschwellendes Crescendo einsetzt, das erst kurz vor dem Abschluß der Strophe ganz wenig decrescendo abnimmt. Etwa so:



Die Kraft und Fülle, die der Künstler in dieser Partie entwickelt, sind überraschend und wurden von ihm kaum erwartet; sein Sang dominiert dann mühelos über dem von meinen zahlreichen Drosseln veranstalteten Gesamtkonzert und hört sich recht eigenartig an. Besonders charakteristisch ist daran auch, daß das marschähnliche Motiv mit Bestimmtheit, d. h. besonders scharf rhythmisiert, vorgetragen wird; dieser „robuste" Rhythmus kontrastiert eigentlich nicht wenig zur „weichen" Tonart. Ebenso auffallend ist die Taktart, die von keinem meiner anderen Sänger irgendwo in seinem Liede eingehalten wird; es sticht denn auch des Trupials Marschweise sofort aus dem Chorus heraus nachdrücklich ab. Wie der ganze Vortrag von sturnus jamaicensis überhaupt, so wirkt namentlich diese Partie darin ganz besonders instrumentähnlich; kaum daß man sie vernimmt, erinnert sie einem auch schon, daß man analoge Klänge da und dann einmal gehört hat und unschwer kommt man zur Ansicht, daß dieselben von einem Holzblasinstrument ausgingen, so ausgeprägt und unverkennbar ist der spezifische Klangcharakter des Trupialsanges, der wie gesagt nur in gewissen Orgelpfeifen-Tönen sein ungefähres Gegenstück hat.

Der eigentliche „Gesang", den der Vogel nur vorträgt, wenn er vollständig ungestört ist und besonders, wenn er sich unbeobachtet weiß oder glaubt, wird mit charakteristischer Komik eingeleitet; den Auftakt zu dieser seiner etwas ausgedehnteren musikalischen Betätigung bildet nämlich eine gewissermaßen inwendige, bauchrednerische Leistung. Nachdem der Gelbrock eine Zeit lang behaglich auf einem der oberen Sitzstäbe dagesessen, duckt er sich unvermittelt nieder, streckt Schnabel und Hals beinahe senkrecht in die Höhe und mit gesträubtem Kehlge-

fieber und unter sichtlicher Anstrengung „pumpt" er irgend etwas aus dem Leibesinnern herauf, das zunächst trotz angespanntesten Hinhorchens nicht vernehmbar ist, schließlich aber sich in einen unsagbar wohllautenden, orgelpunktähnlichen (einzelnen) Ton auflöst. Dieser ist der tiefste, den er überhaupt zu produzieren vermag; daß einem das Lachen ankommt, wenn man Augenzeuge der Art und Weise ist, wie dieser hervorgebracht wird, all seinem Wohlklang zum Trotz, kann kaum verwundern. Unwillkürlich denkt man an die Nonnen, die ihren „Gesang" in ähnlicher Weise zustandebringen, mit dem einen großen Unterschied freilich, daß bei ihnen die aufgewendete Mühe in keinem richtigen Verhältnis zum erzielten Resultat steht. Das Auflachen nähme nun freilich der Künstler, der sich eben in „Stimmung" bringt, recht übel und auf die weiteren gesanglichen Genüsse müßte verzichtet werden; denn wie alle wahren Künstler ist auch er sehr empfindlich. Auf genannten Orgelpunkt folgt gewöhnlich ein Schnalzer oder Jauchzer in Gestalt eines Dezimenschrittes, dem ein um eine Oktave tieferer kurzer Vorschlag vorausgeht; diesem Schnalzer folgt erst eine Pause und darauf erscheint ein sonderbares Poch- oder Klopf-Motiv, das ab und zu auch gurgelnd zur Darstellung gelangt, d. h. in Begleitung von ganz kurzen Vorschlägen. Das Ganze ist nicht an eine bestimmte Taktart gebunden; dagegen ist namentlich das Pochmotiv scharf rhythmisiert und es wirkt denn dieses trotz seiner Primitivität recht charakteristisch. Das Tempo ist erheblich flotter und das rascheste, das der Künstler irgendwo anschlägt. Ungefähr wie folgt:



Die einzelnen Klopfnoten werden scharf staktiert und die ganze Reihe wird mit einem ausgesprochenen Crescendo zum Vortrag gebracht, das bis zum Ende anhält. Diese Tonkette zählt zwischen acht bis zwölf gehämmerte Achtel und reißt nicht selten unvermittelt ab, ohne daß also noch etwas darauf folgte. Häufig aber erfolgt in direktem Anschluß daran ein neues Motiv, das aus zwei Tönen, Grundton und Sext besteht und das ich als Glocken-Motiv bezeichnen möchte; das Tempo hat sich angemessen verlangsamt und die Wirkung ist, wenn dieses neue Motiv unmittelbar aufs vorangegangene folgt, ganz eigenartig, dies umsomehr, als nun wieder eine deutliche Taktart zum Vorschein kommt, $^2/_4$ nämlich. Wie folgt:



(Schluß folgt.)

Nest der Tafelente.

Die Frau als Vogelliebhaberin und Vogelpflegerin.

Von Karl Ruß, Königsberg Pr.

(Nachdruck verboten.)

Wenn der Dichter Georg Thies in einem wundervollen Gedicht schrieb: „Wem Gott ein liebend Herz geschenkt, der fand den Himmel auf Erden", so hat er in den herrlichen Versen voll und ganz recht, wenn aber der Komponist Leon Jessel noch solche wundervolle Klänge dazu findet, so muß es wahrhaft das höchste Glück auf Erden sein, ein liebend Herz sein Eigen zu nennen. Das Glück von uns Vogelfreunden kann aber sogar noch zu einem allerhöchsten Glück werden, wenn es unser liebes Frauchen auch wirklich versteht, in punkto Vogelangelegenheiten unsere Interessen voll und ganz zu den ihren zu machen. Gerade das letztere ist in der Ehe für uns Vogelliebhaber von ausschlaggebender Bedeutung, ja es ist sogar für die meisten Vogelliebhaber eine unerläßliche Voraussetzung für die Vogelpflege und Vogelhaltung, daß wir in dieser Beziehung von unseren Frauen unterstützt werden, und wo dies

nicht der Fall ist, dürfte es in diesem Punkte wenigstens doch gelegentlich einmal zur ehelichen Disharmonie kommen, was von den Frauen aber unbedingt vermieden werden könnte. Schon Schiller sagte: „Raum ist in der kleinsten Hütte für ein liebend glücklich Paar", und würde selbst diese kleine Hütte nicht zum Sonnenschein werden, wo beim kleinsten Sonnenstrahl oder Tageshelle die verschiedenen Vögel ihren ihnen von unserem höchsten Schöpfer verliehenen so wundervollen Gesang, der so unendlich viel Seele und Gemüt in sich birgt, hören lassen? Ich glaube ganz bestimmt, daß die kleinste Hütte zum Sonnenhäuschen wird, wenn beide Ehegatten ernstlich wollen und beider Interessen zu einem Verstehen und Sichselbstergänzen werden. Viele — leider gar zu viele — Vogelliebhaber finden in dieser Beziehung ungerechtfertigterweise bei ihren Frauen für ihre höchste Liebhaberei viel zu wenig Verständnis. Ist es von den Frauen richtig gehandelt, ein schiefes Gesicht zu zeigen, wenn einmal einige Körner oder Federn aus den Käfigen gefallen oder geflogen sind, oder wenn die Käfige gar schon wieder einmal schmutzig sind und deshalb gründlich gereinigt werden müssen? Ich will vorweg gerne zugeben, daß die Vogelpflege für die Frau etwas Mehrarbeit verursacht, aber ist es verwunderlich, wenn der Gatte darüber, daß er bei seiner Frau für seine höchsten Interessen der Vogelliebhaberei — selbstverständlich neben dem Wohlergehen der Familie, welches natürlich an allerhöchster Stelle stehen müßte — mißstimmt und oft sogar mit Berechtigung verletzt ist. Daß jeder Mann irgendeine Passion hat, ist ja eine bekannte Tatsache, und wenn dies wirklich die Vogelliebhaberei ist, so sollte auch selbst die auf peinlichste Reinlichkeit bedachte Gattin sich glücklich preisen, solch einen Mann zu besitzen. Es ist schon oft genug festgestellt, daß gerade die Vogel- und Tierfreunde, welche für gewöhnlich auch die größten Blumenfreunde sind, die besten Seelen — wenn vielleicht auch manchmal in einer rauhen Schale — besitzen. Da liegt es nun unbedingt an der Frau des Liebhabers, daß sie die kleine Mehrarbeit des Fütterns und des Reinemachens der Käfige und Zimmer gerne in Kauf nimmt und dadurch, wie man sagt, den Gatten ans Haus fesselt; ihn also auf seinem höchsten Nebengebiet der Vogelliebhaberei unterstützt und ihrem Ehegatten und Familienvater den in dieser traurigen Zeit geradezu mehr als sorgenvollen Tag der Arbeits- und Lebenssorge verschönert und sonnig gestaltet. Von dem erzieherischen Wert, den die Vogelhaltung in Familien mit Kindern auf diese ausübt, will ich erst gar nicht schreiben, denn stets haben diese Kinder nicht nur mehr Seele und Gemüt, sondern werden zu ausgesprochenen Tierfreunden erzogen und bekanntlich haben Tierfreunde auch ein gutes Herz ihren Mitmenschen gegenüber.

Gelege der Küstenseeschwalbe.

Ein jedes Blatt hat zwei Seiten und ich bin weit davon entfernt, nur der Frau gute Ratschläge zu geben, aber wenn ich mir erlaube, auch Euch, Ihr Herren Vogelliebhaber, einmal einige kleine Winke zu geben, so bin ich davon überzeugt, daß auch sie ihre Berechtigung haben. Ich will Euch, meine verehrten Vogelliebhaber, einmal auf einen Weg führen, den ich selbst gewandert bin, will dabei aber schon vorweg zugeben, daß meine Frau so klug und so vernünftig war, meine Interessen auch zu den ihren zu machen, ganz so, wie es sich in einer Ehe der Harmonie gehört. — Meine Frau hatte für die Natur und damit für Vögel schon immer viel übrig und wenn ich jetzt ein Stück ehelichen Glücks verraten sollte, so ist es das, daß stets mein Frauchen die Vögel, welche auch ihre Lieblinge sind, aufs beste verpflegt und sauber hält. Nie im Leben werde ich es vergessen, als wir — meine Frau und ich — uns vor vielen Jahren als Brautleute das erste Vöglein zusammen kauften und wie wohl hat es mir — der ich schon von Kind auf ein großer Vogelfreund war — getan, als sich damals meine Braut fast täglich nach dem Wohlergehen des kleinen Piepmatz erkundigte, wie viel Seele und Aufmerksamkeit verriet es mir. Meine Frau hat also voll und ganz meine Interessen — die früher noch nicht so ausgeprägt waren wie jetzt — zu den ihren gemacht und ich, der ich im geschäftlichen Leben stehe, muß die kostbare Zeit des Tages für weiteres Streben und Vorwärtskommen verwenden. So bleibt also gar nichts anderes übrig, als daß mein Frauchen meine Vögel füttert und pflegt und selbst die Weichfresser sind schlank und haben gesunde Füße, wie sie auch das Sandgeben und die Reinigung der Käfige besorgt, was eine Frau unbedingt besser versteht als der befähigste haushälterigste Mann. Ich habe natürlich nun endlich nur solche Käfige im Besitz, bei denen ein Verstreuen des Futters so gut wie ausgeschlossen ist, denn wir Vogelliebhaber müssen unsern Frauen in diesem Punkte entgegenkommen und es den Frauen natürlich so leicht wie irgend möglich machen, damit wir auch hierdurch bei den Frauen die Freude zur Liebhaberei wecken und fördern. Es ist auch empfehlenswert, der Frau für ihre Mühewaltung ab und zu ein Lob zu spenden und sie aus dem Erlös etwaiger Verkaufsvögel zu bedenken, oder ihr bei bessergestellten Vogelliebhabern den gesamten überschießenden Gewinn zukommen zu lassen, damit wir die Frauen, welche bei unserer Liebhaberei unersetzlich

sind, voll und ganz für unsere schöne ideale Liebhaberei gewinnen. Auf diese Weise können die Vogelliebhaber unbedingt ihre Frauen interessieren. Aber auch selbst da, wo es den Liebhabern nicht möglich ist, ihre Gattin zu bedenken, sollte die Frau schon aus taktischer Klugheit die Vogelpflege und Wartung übernehmen, zumindesten aber über die Vogelhaltung kein schiefes Gesicht zeigen, denn ich glaube, für die Frau, welche mit ihrem Gatten diese Vogelinteressen teilt, wird gelegentlich doch einmal etwas von dem Herrn der Schöpfung in klingender Münze oder sonstigem Naturell abfallen.

Ich gestatte mir also allen Frauen der Vogelliebhaber den ehrlichen und gutgemeinten Rat zu geben, nie eine taktische Unklugheit in punkto Vogelhaltung und Vogelpflege zu begehen, denn wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg, und das allerhöchste Glück, die eheliche Harmonie, wird wonnig gefördert zum Wohle unserer einzig schönen Liebhaberei. Vereinzelt gibt es natürlich auch Frauen, die ganz ausgesprochene Vogelliebhaberinnen sind, da sollte sich natürlich der Ehegatte freuen, solch eine Gattin sein Eigen zu nennen.

Wenn diese meine Zeilen, soweit es nicht bereits der Fall ist, auf fruchtbaren Boden fallen, bin ich fest davon überzeugt, daß unsere schöne Vogelliebhaberei noch mehr Freunde und Freundinnen finden wird zum Segen unserer Liebhaberei und zum Glück der Liebhaber, damit es voll und ganz zur Wahrheit werde.

Gelege des Halsbandregenpfeifers.

Kleine Mitteilungen.

Historisches zur Vogelstimmenkunde. Seit dem Erscheinen der meisterlich verfaßten Leitfaden zum Studium der Vogelstimmen aus der Feder Prof. A. Voigts, Bernh. Hoffmanns u. a. hat die Kenntnis der Vogelstimmen in den letzten Jahren ohne Zweifel bedeutend zugenommen; die Forschungen sind aber auch schon weitergegangen: Prof. B. Hoffmann legte die Beziehungen zwischen dem Kunst- und Vogelgesange in einem gleichnamigen Werke dar, und andere Ornithologen, wie Schmitt, Stadtler und Hesse, sind eifrig bestrebt, in Noten selbst die schwierigsten Vogelgesänge festzulegen. Im Zusammenhang mit dieser ausgesprochenen Zeitrichtung wird es interessieren, daß schon im 18. Jahrhundert der Vogelgesang vom musikalischen Standpunkt aus gewürdigt worden ist. Der Konrektor und Bibliothekar G. Venzky zu Halberstadt hielt in der dortigen Domschule im Jahre 1739 eine Rede darüber, „wie die gefiederten Musikanten oder Vögel GOTT verherrlichen". In der Einleitung wird u. a. darauf hingewiesen, daß der Mensch nach der Meinung einiger Forscher wahrscheinlich von den Vögeln überhaupt erst das Singen erlernt habe, denn sein Nachahmungstrieb habe ihn, als er noch mehr in Gärten und Lustwäldern denn in Häusern wohnete, veranlaßt, es ihnen gleichzutun und sie womöglich darin noch zu übertreffen. Sodann führt der Redner die vielen „herrlichen Proben der göttlichen Providenz und Versorgung" an, die der allweise Schöpfer und Erhalter der Welt augenscheinlich gerade in bezug auf den Vogel und sein Leben zutage treten lasse: seine Ernährung, Fortpflanzung, sein Flugvermögen, Fortzug usw. „Allein ich will anietzo nur vornehmlich auf ihre Stimmen sehen, wodurch sie GOTT verherrlichen", fährt Venzky fort ... „Man bewundert billig die große Mannigfaltigkeit der Stimmen und Abwechselung der Töne. Wenn dieses Chor Gottes seine Musik erhebt, so höret man alle vier Stimmen (z. E. den Baß bey der Rohrdommel, dem Raben; den Tenor bey der Elster, der Ente; den Alt bey dem Kukuck, dem Wiedehopf, der Schwalbe; den Diskant bey der Lerche und Nachtigall), und welches das bewundernswürdigste ist: obgleich jedes sein besonderes Lied aus seinem eigenen Tone erhebet, dennoch keinen widrigen und unangenehmen Übelklang, sondern die schönste Harmonie, welches bey uns Menschen, wenn wir dergleichen unternehmen wollen, ein seltsames Geheul zuwege bringt. Diese so wunderbare Übereinstimmung muß GOTT zum Urheber haben." „Man bewundert die unermüdete Emsigkeit im Singen. Sobald der frühe Morgen anbricht, gehet dieses Singen an, welches die Nacht über nicht ganz aufgehöret hatte, und währet den ganzen Tag. Berg, Wald, Thal, ja die ganze Luft schallet von diesem süssen Getöne wieder, und wenn schon ein Vögelein inne hält, so sind zwey andere da, welche den Gesang fortsetzen. Ich kann dieses nicht besser beschreiben, als wenn ich mich des grossen Brocks Worte bediene, die vielleicht Niemanden unangenehm zu hören seyn werden." Es folgt eine Schilderung des Nachtigallengesanges in Versen, die den Hamburger Naturdichter B. H. Brockes zum Verfasser hat (1680 bis 1747). „Doch von den beyden, der Lerche und Nachtigall, als den vortrefflichsten unter unsern Sängern, werden noch nach mir zwey andere etwas reden." „Allein zu was für einem Ende sind die Vögel so geschäftig? Die Lieblichkeit der Zeit und Erden reizet sie. Sie begehen alsdann gleichsam ihre Hochzeitstage ... Der Mensch aber, als der Herr der Erden, soll im Wachen und Schlafen erfreuet, vergnüget und zum Lobe seines Schöpfers erwecket werden. Und vor allen Dingen wird der Urheber und der Erhalter der Welt gepriesen, gelobet und verherrlichet. Das sind die Absichten, welche GOTT gehabt, als er den Vögeln die Gabe und den unermüdeten Trieb beylegte, also zu singen. O was ist das für eine Herrlichkeit des Höchsten, welche durch diese gefiederten Musikanten und Sänger so unvergleichlich hervorstrahlet!" Ob diese musikalische Abhandlung noch eine Fortsetzung hat, vermochte ich noch nicht festzustellen, da das Werk auf der Göttinger Universitätsbibliothek nicht weiter vorhanden ist. Übrigens hat bereits der Engländer D. Barrington 1773 „Versuche und Beobachtungen über den Gesang der Vögel" angestellt, die durch eine im Hannoverschen Magazin vom Jahre 1778, IV. Theil erschienene teilweise Übersetzung auch dem sprachunkundigen Leser zugänglich sind.

B. Quantz, Göttingen.

Die Zusendung lebender Vögel in das besetzte Gebiet ist zurzeit mit keinen besonderen Schwierigkeiten verknüpft. Die Zusendung vom unbesetzten in das besetzte deutsche Gebiet erfolgt unter den gleichen Bedingungen wie die Zusendung lebender Vögel innerhalb des unbesetzten Gebietes. Der von der Besatzung erhobene Eingangszoll wird vom Empfänger durch deutsche Postbeamte erhoben (bei der Paketauslieferung). — Eine Paketsendung lebender Vögel vom besetzten in das unbesetzte deutsche Gebiet erfolgt genau wie früher, nur hat hierbei der Absender den Zoll für die Besatzung bei der Portoberechnung gleich mitzuzahlen. — Ich teile dieses zur Veröffentlichung mit, weil

von der Zusendung lebender Vögel ins besetzte Gebiet mancher Käufer zurückschreckt. Ich hoffe, durch diese Aufklärung uns besetzten Liebhabern wieder Gleichstellung mit den unbesetzt wohnenden zu verschaffen.

Pracht, Stadtarchitekt, Düsseldorf.

Erlebnisse mit meinem Perlstar „Jakob". Erwarb denselben im November 1920 als zirka 1½jährig, er war sehr munter und gab schnarrende und schnetternde, natürliche Laute von sich, aber er sprach kein Wort oder Laut. Er kam auf die Hand, wenn es galt, einen Leckerbissen zu holen; eines Tages, als ich Besuch erhielt und derselbe an meine Tür klopfte und ich „herein" rief, da tönte ein klares und deutliches „herein" vom Jakob her, das war der Anfang vom Sprechen, es war dies im März 1921; von nun an gab ich mich mehr mit ihm ab, ich hing ihn in den Geschäftsladen meiner Schwiegereltern, und hier lernte er nach und nach viel sprechen und pfeifen. Er spricht z. B. „bin ich dein Jakob", „willst du singen", „bist du fertig", „na, dann los", „bringst du Frühstück", „Emma", „Musik", er ahmt den Ruf des Pirols nach, auch andere Pfeifsignale, sagt: „Mutter, Mutterken", ruft: „Frau Ziehme" (der Name meiner Schwiegermutter), er ist ein fideler, drolliger Kerl. Jetzt komme ich zu einer Sache, die ich nicht recht begreifen kann. Eines Tages, als meine Frau ihn füttern will, ist er infolge eines bisher nicht bemerkten Defekts am Käfig verschwunden, er saß auf einem Hause ungefähr 200 Meter entfernt und rief immerwährend: „bin ich dein Jakob", „na, komm", „willst du singen" usw. Aber wir bekamen ihn nicht wieder, dies war Ende August 1921; wir alle waren betrübt, ihn auf diese Weise verloren zu haben, und oft frugen wir uns, wo mag wohl unser Jakob sein und ob wir ihn wohl jemals wieder zu sehen bekommen. Jetzt, am Freitag, den 19. Mai 1922, kommt ein junger Mann zu mir und bittet mich, festzustellen, was er für einen Vogel gefangen hätte, und da entdeckte ich, daß es mein Jakob ist. Als wir ihn in einen Käfig setzten, war sein erstes Wort: „bin ich dein Jakob", „na, komm". Selbstverständlich erwarb ich ihn aufs neue und hat er sich jetzt noch einiges neue angeeignet, und zwar bellt er wie ein Hund und gackert wie ein Huhn, wenn es ein Ei gelegt hat. Wo war der Vogel in der ganzen Zeit vom August 1921 bis Mai 1922 über Winter bei der strengen Kälte? Jedenfalls ist dies ein untrügliches Zeichen, daß ein Vogel seinen früheren Pfleger nach längerer Abwesenheit doch gut wiedererkennt, wie aus dem ganzen Benehmen des Vogels hervorgeht, der sich jetzt wieder ganz wohlfühlt und mit jedem von uns ganz vertraulich tut.

W. Ganetzki, Eisleben.

Aus den Vereinen.

Verein Vogelschutz und -pflege zu Dresden. Versammlung jeden Donnerstag, abends 8 Uhr, im Vereinslokal, „Schillers Restaurant", Ecke Stifts- und Ehrlichstraße Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen.

Bernhard Kühn, Vorsitzender.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei zu Hamburg. Sitzungen finden statt jeden 1. und 3. Dienstag im Monat in Hüttmanns Hotel, Poolstr. 22, abends 8¼ Uhr. Nächste Sitzung Dienstag, den 15. Juli 1924.

J. A.: Arnold Weber, 1. Vorsitzender.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig. Vereinssitzungen jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat im Vereinslokal, „Bauers Brauereirestaurant", Täubchenweg. Nächste Sitzungen am 3. und 17. Juli 1924. Gäste stets willkommen.

J. A.: Johann Birk, 1. Vorsitzender.

Verein der Vogelfreunde Leipzig-Plagwitz. Vereinslokal: „Gosenschlößchen", Leipzig-Plagwitz. Sitzungen an jedem 1. und 3. Montag des Monats, abends 8 Uhr. Vogelfreunde sind stets willkommen.

J. A.: Karl Scholtissek, 1. Vorsitzender, Leipzig-Plagwitz, Lauchstädter Straße 30.

Vom Vogelmarkt.

Haberlandt, Magdeburg-Wst., A. Z.-Mitgl. 12, Hardenbergstraße 9: 1,1 Angolablauastrild, 1,1 gr. Kubafink, 1,1 klein. Kubafink, 1,1 indische Wachteln.

E. W. Lenger, Berlin N 58, Schönhauser Allee 70a: Weißhaubenkakadu, Gelbhaubenkakadu, Feuerflügelsittiche, Papstfinken, Schwarzkopfnonnen, Weißkopfnonnen, Muskatfinken, Bronzemännchen.

E. Mayer, Wildexport, Wiener Neustadt: Edelreiher, Löffelreiher, Purpurreiher, Fischreiher, Nachtreiher, Zwergreiher, Ibisse (Sichler), weiße Störche, schwarze Störche, Trappen, Kraniche, Kolkraben, Siebenbürger Uhu, Stein- und Königsadler, Gänse- und Kuttengeier, Birk- und Auerwild, Wanderfalken und Habichte.



Herrn K. B. Man verhütet das Aufkommen von Mehlmilben in den Mehlwurmzuchthecken dadurch, daß man die Weizenkleie, bevor man sie in den Kasten schüttet, hoher Wärme aussetzt. Die Milben werden auf diese Weise getötet. Wärme und Trockenheit vertragen sie nicht, Feuchtigkeit befördert ihre Vermehrung. Im Kleieansatz vorhandene Milben vertreibt man aus der Zuchtkiste durch Erwärmen der Kiste vom Boden aus. Man stellt zu diesem Zweck die geöffnete Kiste auf den erwärmten Ofen, legt darüber ein weißes Tuch, in welches sich die Milben, welche der Wärme entgehen wollen, flüchten. Am besten legt man, sobald ein Tuch von Milben besetzt ist, ein zweites darüber und so fort. Meist ist diese Prozedur mehrmals zu wiederholen.

Herr O. P. Der Zitronenzeisig ist ein angenehmer, verträglicher Vogel, der anfangs etwas scheu ist, aber doch bald ruhiger und zahmer wird. In seiner Gestalt erinnert er etwas an den Hänfling. Seine Färbung ist im allgemeinen grün; Wangen, Unterkopf, Halsseiten sind grau. Er ist weichlicher als der Erlenzeisig und auch nicht so zutraulich wie dieser. Die Ernährung ist dieselbe. Er kann im ungeheizten Zimmer überwintert werden. Er bewohnt Südeuropa, die Küstenländer des Mittelmeeres, die Alpen und das südwestliche Deutschland. Näheres siehe „Einheimische Stubenvögel" von Karl Neunzig.

Herrn Th. Gr., Badenweiler. In einem Käfig von den angegebenen Maßen lassen sich 5—6 Paar Exoten unterbringen. Von kleineren können schließlich noch einige Paare hinzugesetzt werden. Je weniger ein Käfig besetzt ist, desto besser ist es. Die Prachtfinken sind ja meist Gesellschaftsvögel. Reisfinken sind besser mit größeren Arten zusammenzuhalten. Zur Fütterung der Astrilden u. a. ist neben den verschiedenen Arten der Hirse (Senegal-, Silber-, Mohnhirse, Kolbenhirse) etwas Spitzsaat, Sämereien der Gräser, Vogelmiere, Ameisenpuppen u. a. zu reichen. Nähere Angaben sind in „Die Fremdländischen Stubenvögel" von Karl Neunzig angegeben. Die beste Beförderung der Vögel ist durch die Post als „dringend" bezeichnet. Die Art des Versandes kann den Firmen überlassen werden.

Herrn P. W., Ch. Ich sehe der Fortsetzung der Arbeit mit Interesse entgegen. Der Birkenzeisig verliert in der bevorstehenden Mauser die rote Kopfplatte, und zwar für immer. Bis jetzt ist es leider nur in ganz wenigen Fällen gelungen, das Rot zu erhalten.

Liebau. Unseres Wissens ist die gen. Firma, welche schon in den Jahren vor dem Kriege nur als Futtermittelhandlung bestand, aufgelöst.

Herrn Pr., Düsseldorf. Der Weber scheint Ploceus (Sitagra) capitalis *(Lath.)* zu sein. Die Weibchen und Männchen der nicht im Prachtkleid stehenden Weber, die zur Gruppe Sitagra gehören, sind teilweise sehr schwer zu unterscheiden. Der eingesandte Vogel ist den im Berliner Museum befindlichen capitalis-♀♀ oder unausgefärbten Männchen am ähnlichsten. Verbreitungsgebiet ist Westafrika, von Senegambien bis zum Niger. Bei der Sektion war das Geschlecht des Vogels nicht festzustellen, da die inneren Organe bereits in Verwesung übergegangen waren. Nach der Beschreibung ist die 2. Art nicht zu bestimmen. Wahrscheinlich handelt es sich hier um eine kleinere Art der Gruppe Sitagra, die im unausgefärbten und Weibchenkleid oft nur geringe Unterschiede aufweisen.

Christian Ludwig Brehm
Pfarrer in Renthendorf
bei Neustadt a. Orla
geb. 24. Januar 1787 — gest. 23. Juni 1864

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg

Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Jahrg. 53 | Den 10. Juli 1924 | Heft 21

(Druckort: Burg, Bezirk Magdeburg.)

Christian Ludwig Brehm*).

Geb. 24. Januar 1787 — gest. 23. Juni 1864.

Christian Ludwig Brehm, Pfarrer in Unterrenthendorf, einem idyllisch gelegenen Dorf bei Neustadt a. d. Orla in dem ehemaligen Herzogtum Sachsen-Altenburg, gehört zu den Begründern der deutschen wissenschaftlichen Vogelkunde. Er war am 24. Januar 1787 in dem Dorfe Schönau, damals gleichfalls zu Altenburg gehörig, geboren, studierte in Jena Theologie und wurde im Jahre 1813 Pfarrer in Renthendorf.

Schon von frühester Jugend an war er Sammler und Vogelliebhaber und fand in dieser Betätigung auch als Pfarrer keinen Nachteil für seine Lebensführung. Die Beschäftigung mit der Natur, das Eindringen in ihre Geheimnisse, das Erkennen der Wunder der Schöpfung bei seinen „Waldspaziergängen mit der Flinte" waren ihm Gottesdienst. Kennzeichnend für ihn ist es, wenn er in seinen „Beiträgen zur Vogelkunde" (Neustadt a. d. Orla, 1821—1822) schreibt: „Ich habe nur da auf den Schöpfer hingewiesen, wo ich dem Drange, dies zu tun, nicht wiederstehen konnte, doch bin ich mir bewußt, bei Abfassung des Ganzen Gott im Herzen gehabt zu haben ... und trüge dieses Werkchen etwas dazu bei, unsere Forschungen in der großen Natur die Richtung zu geben, daß man bei ihnen mehr als bisher den einzigen, der alle erfüllt und belebt, suchte und fände, dann wäre sein höchster Zweck auf das Vollkommenste erreicht".

Bei den Angehörigen seiner Gemeinde war der offenherzige Pfarrer gern gesehen, nicht so bei manchen seiner Amtsbrüder, welche kein Verständnis für die „Allotria" des alten Renthendorfer Pfarrherrn aufbringen konnten. Chr. L. Brehm brachte im Laufe der Jahre eine Sammlung von mehr als 9000 Bälgen europäischer Vögel in allen Altersstufen, Kleidern und örtlichen Abänderungen zusammen. Er suchte namentlich die zahlreichen Abweichungen der Normalform der einzelnen Arten festzustellen. Diese wertvolle Sammlung, dieser „Schatz von Vogelmumien, um die das Ausland uns beneidet", wie der Dichter Welcker im Journ. f. Ornithol. 1864 S. 290 von der Sammlung sagt, blieb leider nicht in Deutschland. Sie wurde 1897 von Rotschild-London erworben und in dessen Museum in Tring untergebracht. In Deutschland war leider kein Geld vorhanden, um die wertvolle Sammlung dem Vaterland zu erhalten.

Des alten Brehm hauptsächlichste Schriften sind: „Beiträge zur Vogelkunde" (Neustadt a. O. 1821—22, 3 Bde.); „Lehrbuch der Naturgeschichte aller deutschen Vögel" (Jena 1823—24, 2 Bde.); „Ornis" (Jena 1824—27, 3 Hefte); „Handbuch der Naturgeschichte aller Vögel Deutschlands (Ilmenau 1831); „Monographie der Papageien" (Jena 1824—55, 14 Hefte); „Der Vogelfang" (Leipzig 1836; neue Bearbeitung Weimar 1855); „Handbuch für Liebhaber der Stuben-, Haus- und anderen der Zähmung werten Vögel" (Ilmenau 1832); „Die Kunst, Vögel als Bälge zu bereiten, auszustopfen usw." (Weimar 1842, 2. Aufl. 1860); „Wartung, Pflege und Fortpflanzung der Kanarienvögel, Sprosser und Nachtigallen usw." (Weimar 1855, 3. Aufl. 1871).

Brehm starb am 23. Juni 1864 in Renthendorf. Über sein Ableben finden wir im Journ. f. Ornithol. 1864 folgende von einem Trauerrand umgebene Anzeige:

Christian Ludwig Brehm †.

Soeben wird mir von Dr. Reinhold Brehm die Trauerbotschaft vom Tode seines Vaters gemeldet. Der wunderbar tätige und noch vor zwei Jahren jugendlich frische Greis „ist am 23. Juni früh 4 Uhr nach mehrwöchentlichem Kränkeln und Krankseln an einer Herzbeutel-Wassersucht verschieden".

Diese vorläufige Nachricht auf den Wunsch der Seinigen. Den Nekrolog später und hoffentlich bald!

Osternienburg, 27. Juni 1864. Dr. E. Baldamus.

Der Nekrolog erschien erst ungefähr ein Jahr nach Brehms Tode im Journ. f. Ornithol. 1865 in Form einer längeren Dichtung Ph. H. Welckers. Es wird darin erwähnt, wie bei der Beerdigung des Alten während eines stillen Gebetes am offenen Grabe aus dem nahen Gebüsch eine Gartengrasmücke ihr Lied hören ließ. Welcker kleidet diesen Vorgang in folgende Worte:

„Doch wo bist Du, frommer Vogel, welcher im vergangenen Jahre / Nach Versenkung unf'res Freundes brachte Botschaft, wunderbare? / Brachst Du nicht mit Deinen Tönen plötzlich aus den nahen Zweigen, / Als ein stilles Vaterunser ward gebetet, — hier das Schweigen? / Ja, Du ließest Deinen Sang hier, Deinen lieblichen und vollen, / Zu dem Sarg des großen Kenners Deines Volks noch niederrollen. / Da, Du warst ein Abgesandter Deines buntbeschwingten Chores, / Ihn noch Ein Mal zu begrüßen an dem Rand des schwarzen Thores."

---

*) Wir beabsichtigen im Laufe der Zeit Bildnisse und kurzen Lebensabriß aller bedeutenderen Vogelkundigen zu veröffentlichen.

Die Schriftleitung.

Vogelleben im Wiesengelände.

Von Fritz Braun.

(Schluß.) (Nachdruck verboten.)

Über der Beschreibung der eigentlichen Balzflüge darf man nicht vergessen, hervorzuheben, daß alle Bewegungen mancher Finkenmännchen während der Brunstzeit ein ganz anderes Gepräge annehmen. Man betrachte einmal einen Buchfinken, der sich im Dezember in den Obstgärten der Mittelmeerländer herumtreibt, und vergleiche damit denselben Vogel, welcher sich im Mai in den blühenden Büschen eines deutschen Stadtparkes von Ast zu Ast wirft. Scheint es nicht, als ob sich durch den Körper des brünstigen Tieres ein Fluidum ergossen habe, dessen Einfluß bei jeder Bewegung zu spüren ist? Mitunter fühlte ich mich beinahe versucht, davon als von einer Brunstlähmung zu sprechen, denn fast in jedem Augenblick nehmen wir wahr, daß die Bewegungen des Tieres nicht darauf eingestellt sind, die mechanischen Aufgaben der Futtersuche und Sicherung auf die denkbar einfachste Weise zu erreichen, wie das etwa in der geschlechtlich neutralen Zeit geschieht, sondern daß noch etwas anderes, Neues hinzugekommen ist, dessen Ursachen und Zwecke im Geschlechtsleben gesucht werden müssen. Es verlohnt sich wohl, diese weniger auffälligen Erscheinungen des Geschlechtslebens bei unseren deutschen Finkenvögeln — auch Grünfinken und Girlitze sind in dieser Hinsicht dankbare Gegenstände der Beobachtung — genauer zu beobachten und auch ihre allmähliche Entwicklung im Frühjahr, ihr Verschwinden im Herbst aufmerksam zu verfolgen.

Allmählich wird der widerlich süße Verwesungshauch, den der Komposthaufen ausströmt, unserer Nase aber doch allzu lästig, und wir wandern darum weiter in die Wiesen hinaus. Da treffen wir einen rohrbewachsenen Weiher. An seinem Ufer rastet's sich gut, obgleich der anmutige Teich vor nicht allzulanger Zeit nur eine simple Lehmgrube gewesen ist. Auch die Vögel wissen das bescheidene Gewässer, das du mit etwa 200 Schritt bald umkreist, wohl zu schätzen. Im Röhricht brütet Jahr für Jahr ein Pärchen Stockenten, an den Rohrhalmen üben muntere Stieglitze, die dem Weiher ganz regelmäßig ihren Besuch abstatten, allerlei Kletterkünste, und wenn du die Kuhstelzen auf ihrem Komposthaufen umsonst gesucht hast, wirst du an diesem Teich nicht vergeblich nach ihnen Ausschau halten.

An einer Seite grenzt an den Weiher ein Stückchen Sumpfwiese, nur wenige Quadratmeter groß. Ueber dem jungen Rasen klappert hier und da ein dürrer Halm, der den Winterstürmen getrotzt hat. Auf diesen Halmen und Stauden sitzen drei, vier winzige Vögel, die bald ihr kurzes Lied hervorsprudeln, bald schwanzwiegend nach einem Kerbtier Ausschau halten. Es sind braunkehlige Wiesenschmätzer. Im letzten Jahr trieb sich dort weiter nach der Stadt zu ein Männchen herum, dessen Liedern ich so manches Mal lauschte, da es ein Spötter war trotz der besten Haubenlerche. Diese hier können offenbar nichts weiter als den kurzen Singsang, der so oft mit dem Liede der Dorngrasmücke verwechselt wird und mitunter auch wirklich sehr leicht damit verwechselt werden kann, denn daß die Dorngrasmücke flotter, rauschender singt, fällt einem erst dann recht auf, wenn man sie gleichzeitig mit diesen Stummelschwänzchen singen hört.

Lagern wollen wir uns hier aber nicht, denn ich möchte Dir noch an jener Eschenallee einen seltsamen Sänger zeigen. Vor einigen Tagen kam Freund S. zu mir und sagte, auf den obersten Zweigen der Alleebäume pflege dort ein dunkler Vogel zu sitzen, der beständig wie ein Weidenlaubvogel rufe, nur daß er nicht wie jener immer nach 2 Tönen eine Pause mache. Da hörst du schon selber den Beklagten, und dort sitzt der Sänger.

Da wir eine Weile warten, strebt der Vogel in die Wiese hinaus und fliegt wagerecht in etwa fünf Meter Höhe über dem Grase hin und her, her und hin, nach jedem Umbiegen fast genau in die letzte Flugbahn zurückkehrend. Immer wieder erwarten wir, er werde auf den Boden einfallen, aber immer wieder setzt der Vogel mit kurzer Wendung das alte Spiel fort, bis er mit einem Male in schräger Linie wohl 50 Meter aufsteigt und dann in kurzen Absätzen, oft innehaltend, schief zur Erde herabsinkt. Der Gesang, den er dabei hören läßt, klingt merkwürdig zerhackt, mitunter macht es beinahe den Eindruck, als ob innere Erregung die Kehle des Sängers lähme. Gegen Ende April sangen die Wiesenpieper — denn um einen solchen handelt es sich — ganz anders. Da rieselte ihr Lied in vollen, weichen Wellen wie Kanariengesang dahin; jetzt bekommen wir nur Bruchstücke davon zu hören, die mich entfernt an jene Weisen erinnern.

Heute hat es der Sänger — mitunter warten wir tagelang vergebens auf seinen Balzflug — besonders eifrig und erfreut uns bei jedem Abstieg durch andere Flugbögen, andere Tonreihen. Dabei nähert er sich immer mehr einem hohen, schmalen Gebäude, das der Gutsherr zu einem uns unbekannten Zwecke inmitten der Wiese errichtet hat. Nun fällt er beim Herabgleiten nach dem Balzflug nicht mehr auf die Eschen ein, sondern auf das Pappdach jenes Bauwerks, das ihm dazu offenbar sehr geeignet erscheint, da er immer wieder dahin zurückkehrt.

Lange, lange schauen wir dem Sänger zu, bis er schließlich seines Treibens müde wird und unter kurzen, fast girlitzartigen Trillern — Wiesenpieper verfügen mitunter über einen ganz auffälligen Reichtum der verschiedensten Töne — weit wegfliegt, bis hinaus über den nächsten Haferschlag, wo er unserem Blick entschwindet.

Gern möchten wir noch zwei einsamen Erlen am Wiesengraben einen Besuch abstatten, welche — in weitem Raum die einzigen ihrer Art — von den Vögeln auffällig bevorzugt werden. Neulich lockten oder sangen auf ihnen gleichzeitig Stieglitz, Rothänfling, Grünling, Gold- und Gartenammer, Dorngrasmücke, Kuhstelze und Wendehals. Doch von der nahen Kirche ertönen sieben langsam verklingende Glockenschläge und rufen uns zum Abendbrot. Ich glaube, man wird mir darin beipflichten, daß es auf der kurzen Wanderung mancherlei zu sehen gab, obgleich wir uns nur ein paar hundert Meter von der Haustür entfernt hatten. Vielleicht ist sich der Leser derweilen auch darüber klar geworden, weshalb ich zum Erstaunen meiner lieben Frau den hohen Kostenrechnungen gegenüber so unverwüstliche Langmut zeige.

Über den Nestbau des Vogels.

Von Anton Usinger.

(Schluß.) (Nachdruck verboten.)

Wenn wir hier von Offenbrüter reden, so geschieht dies nur zum Unterschied von dem Höhlenbrüter, denn auch die ersteren brüten versteckt und verstehen es meisterhaft, durch Anlage des Nestes den Stand desselben so zu verbergen, daß der Ungeübte es nur zufällig findet. Vor allem sind es die Finken und da an erster Stelle der Buchfink, die die Außenseite ihres Nestes mit den in ihrer Umgebung vorherrschenden Baumflechten ausschmücken, daß das Nest selbst fast gar nicht auffällt und mit

Trauertangare (s. S. 133).

derselben zu einem Ganzen verschmilzt. Es scheint so viel Sorgfalt und Kunst zu dem Bau erforderlich zu sein, daß man es kaum für möglich hält, wie in so kurzer Zeit der Vogel dieses aus Haaren, Wolle, Flechten und Rindenstückchen zu einem Gespinst verarbeitete Nest zuwege bringt.

Ebenso interessant ist das Nest der Singdrossel (s. S. 165), die den Nestnapf entgegen der Gewohnheit anderer Vögel nicht mit Federn und Wolle auskleidet, sondern die Mulde mit feinzerkautem und mit ihrem zähen Speichel vermischtem Holzmulm, ähnlich einer rohen Papiermasse, ausschmiert. Bei älteren Singdrosselnestern, dieselben überstehen fast stets den Winter, löst sich dieser Speichel in Gestalt kleiner Schüppchen wieder ab, auch phosphoresziert das Nestinnere sehr oft schwach infolge der beim Bau verwandten faulenden Holzteilchen. Wird das Nest, was nicht selten geschieht, zum zweitenmal benutzt, so erhält es außer den üblichen Ausbesserungen eine neue Schicht dieses hellfarbigen Kleisters. Dieses Drosselnest mit dem genau halbkugligen Napf und dem peinlichst ausgetünchten Innern rechnet zu den besten Kunstwerken des Nestbaues, und hierin leisten, wie bei allen Vogelarten, die älteren Tiere eine bessere und sorgfältigere Arbeit als solche, die zum erstenmal bauen. Eine gewisse Fähigkeit, sich gesammelte Erfahrungen zunutze zu machen, können wir dem Vogel nicht absprechen, soweit sie sich auf örtliche Veränderungen beschränken. Wesentliche Abweichungen von der seiner Artgenossen eigentümlichen Bauart gestattet ihm der angeborene Instinkt jedoch niemals.

Auffallend nachlässig im Gegensatz zu den vorgenannten sorgfältig gebauten Finkennestern sind die der Grasmücken. Findet man auch ab und zu ein bessergebautes Nest dieser Vogelart, so sind doch die meisten so schlecht und oberflächlich gebaut, daß die Eier durch den Boden des Nestes zu fallen drohen. Bild S. 155, ein auffallend gutgebautes Grasmückennest, scheint ein solches der ersten Brut zu sein, da die meisten Bauten der zweiten Brut denen der ersteren an Sorgfalt und Festigkeit nicht gleichkommen.

Zu den vollendetsten Erzeugnissen des Nestbaues zählen ohne Zweifel die Kugelnester des Zaunkönigs, der Schwanzmeise, des Goldhähnchens und des Laub-

vogels. Aus Moos, Halmen, Flechten und innen mit Federn ausgepolstert stehen diese kugelig gebauten Nester mit seitlichem Einschlupf teils auf der Erde, unter Grasbüscheln und Wurzelstöcken, teils aber hängen sie, wie die der Goldhähnchen, in den höchsten Spitzen unserer Nadelbäume. Hier sind sie mit Ästen und Laubwerk kunstreich verflochten und trotzen Sturm und Wind. Das an den Stamm angelehnte Schwanzmeisennest ist gleich dem Finkennest mit Flechten, Moosen, die noch untereinander und mit Spinnweben verfilzt sind, beklebt.

Während Goldammer und andere nur gelegentlich auf dem Boden brüten, ist ein großer Teil unserer Vögel, die Lerchen, Pieper, die Hühnerarten und die Sumpfvögel, darauf angewiesen, dem welligen Gelände und dem schützenden Schilf ihr Gelege anzuvertrauen. Mehr als 2300000 ha Ödfläche unseres Vaterlandes bieten den artenreichen Bodenbrütern Raum und Gelegenheit zum Nestbau. Die Mehrzahl dieser Nester, mit Ausnahme der der Lerchen nnd Pieper, sind kunstlose Mulden- und Bodeneindrücke, die mehr oder weniger durch üppige Vegetation dem Auge des Feindes verborgen bleiben. Hier tritt alsdann meistens eine Schutzfarbe der Eier an Stelle des schützenden Nestes. Wie die keiner Schutzfarbe benötigenden Eier der Höhlenbrüter weiß sind, haben die der Bodenbrüter eine zweckentsprechende Färbung aufzuweisen und heben sich nur wenig von ihrer Unterlage und ihrer Umgebung ab. Ausgesprochene Bodenbrüter sind die Strandvögel. Ihr Gelege liegt entweder in natürlichen oder selbstgescharrten Vertiefungen des Sandes, wie das der Küstenseeschwalbe (Bild S. 158), und im Steingeröll oder Kiesboden des Strandes, wie das des Halsbandregenpfeifers (Bild S. 159). Hier hat der Vogel durch kreisförmiges Anordnen kleiner Kiesel eine Unterlage für die Eier geschaffen.

Zum Überfluß decken einzelne Vögel das Gelege beim Verlassen des Nestes zu, wie z. B. die Tafelente, die ihre Eier (Bild S. 157) mit Schilf und Rohr bedeckt hat, ehe sie dasselbe verließ.

Die Mehrzahl unserer deutschen Vögel baut, wenn der Frühling in ihnen den Geschlechts- und Fortpflanzungstrieb weckt, ein Nest. Nur wenige verzichten auf eine eigenhändige Errichtung einer Niststätte und benutzen alte, verlassene Nester anderer Vögel, wie z. B. der Rotfußfalke das Elsternest, die Eulen alte Krähennester und der Waldwasserläufer das der Drossel. Peinliche Sauberkeit herrscht im allgemeinen während des Brutgeschäftes in der Kinderstnbe aller Vögel, und wenn die Jungen aus dem Ei geschlüpft, entfernt der alte Vogel stets die vorhandenen Entleerungen seiner Pfleglinge nach jeder Fütterung. Der mit einer gallertartigen Haut überzogene Unrat wird im Fluge aus dem Nest getragen und unterwegs fallen gelassen. Auch hier läßt die Natur Ausnahmen zu. Wiedehopf und Wendehals (? N.) entfernen keineswegs den Kot der Jungen, und schon von weitem strömt das Nest einen üblen Geruch aus. Derselbe rührt jedoch auch, wie beim Eisvogel und Kormoran, von faulenden Resten der Nahrung her, die in und in nächster Nähe des Nestes liegen bleibt und im höchsten Grade unästhetisch wirkt.

So erweckt der gesamte Nestbau unserer Vögel das gerechte Erstaunen des Forschers, und je mehr derselbe sich mit den Einzelarten beschäftigt, um so tiefer und weiter wird sein Blick in die Wunder der Natur eindringen. Wir dürfen jedoch nicht im einzelnen Individuum den Künstler und sein Werk bewundern. Das als Wiege errichtete Nest ist kein Kunstwerk des einzelnen Vogels, sondern das Erzeugnis des Fortpflanzungstriebes einer ganzen Spezies, der der Instinkt die Bauweisen und -regeln vorschreibt und sie so zum Meister werden läßt.

Wenn wir, wie vorher schon erwähnt, dem einzelnen Vogel gewisse Erfahrungen nicht absprechen können, vor allem was Standort anbelangt, so ist stets Vorsicht bei diesen Annahmen geboten, denn selbst im ersteren Falle sind es weit mehr aufgezwungene Änderungen in der Wahl der Niststätten als willkürliche Verbesserungen. Ich erinnere nur an die Wohnungsnot der Höhlenbrüter, die sie zur Annahme der künstlichen Nistkasten zwang und die bereits einzelne Vertreter, wie Turmfalke, Uhu und andere, vom Höhlenbrüter zum Freibrüter machte. Ein Akkommodationsvermögen muß in jedem Falle vorhanden sein, denn das Fehlen desselben hätte das Aussterben des Geschlechtes zur Folge.

Mein Jamaika-Trupial.

Von Prof. K. A. Diener.

(Schluß.) (Nachdruck verboten.)

Im allgemeinen erklingen die beiden Töne des und b mit gleichmäßiger mittlerer Stärke; die einzelnen Takte wiederholen sich drei bis sechsmal. Nicht selten erfolgt eine Anschwellung bis zum stärksten Fortissimo, wie wir es in Beispiel VI sehen und gleichzeitig erscheinen die einzelnen Glockentöne prägnant martellato, doch unter sich legato verbunden, nämlich so:



Diese Sexten gehören zu den wertvollsten Darbietungen, die mir von irgendeinem Sänger bekannt sind; sie sind absolut rein und erfahren nie die geringste Trübung, sind also auch frei von jeglichem portamento, das im Vortrage so mancher guten Sänger dessen (musikalische) Architektonik unliebsam beeinträchtigt und verunstaltet.

Nicht selten erscheint das Glockenmotiv in etwas veränderter Gestalt; auf den einmaligen gewöhnlichen Schritt des=C erfolgt nämlich ein ähnlicher, doch des—C—C, wobei die beiden letzten Töne noch von einem Vorschlag begleitet sind. Auch hier setzt häufig ein mächtiges Crescendo ein. Ungefähr so:



Gewöhnlich wiederholt sich das Vorschlag-C, nachdem das Motiv zweimal vollständig gebracht wurde,

als Coda sechs- und mehr Mal hintereinander; immer mit der bekannten Anschwellung. An eine bestimmte Taktart hält sich das Ganze nicht. Zufolge des bis zum Schlusse unvermindert anhaltenden crescendo molto erklingen, diese letzten Einzeltöne besonders scharf martellato.



Die vollständigste Form seines „Gesanges", zugleich die längste, die der Künster sehr oft, doch wie weiter oben erwähnt, immer nur produziert, wenn er ganz ungestört und in „Stimmung" ist, lautet ungefähr folgendermaßen:



Damit beschließe ich das Kapitel über die gesanglichen Leistungen meines Trupials; natürlich ist es ganz unvollständig, bringt der Vogel doch noch viel mehr. Aber einerseits bezwecke ich nicht, eine Monographie des Gesanges von jamaicensis zu geben, ein Unternehmen, das nicht nur sehr zeitraubend, sondern auch ungemein schwierig wäre, handelt es sich doch um einen „Sänger" und nicht nur um einen Stümper, dem höchstens einzelne Töne und möglicherweise noch kunstlose Tonreihen eignen, deren Wiedergabe somit die Möglichkeit einer relativen Vollständigkeit bietet, was ganz ausgeschlossen ist, wenn die Leistungen eines eigentlichen Sängers sollen festgehalten werden*); anderseits dürften meine Ausführungen trotz ihrer Knappheit genügen, um den Beweis zu erbringen, daß mein Jamaika-Trupial auch in gesanglicher Hinsicht Anspruch auf geziemende Beachtung erheben darf.

Das Gefieder des Trupials — jamaicensis — soll, wie von verschiedener Seite berichtet wird, ziemliche Farbenunterschiede aufweisen; besonders häufig soll Orange seine Hauptfarbe sein, weshalb ihn z. B. Ruß als Orange-Trupial bezeichnet. Diese Benennung würde nun freilich auf mein Exemplar nicht passen; es hatte, als es in meinen Besitz kam, kaum eine Spur dieser Färbung an sich und auch heute, d. h. nachdem es die letzte Totalmauser erledigt hat, erscheint nirgends eine solche Farbe. Der Vogel ist am ganzen Körper rein zitrongelb; gleichgefärbte waren allerdings früher auch schon im Besitze gewisser Liebhaber, sodaß mein Gelbvogel nur die Richtigkeit der oben angeführten Beobachtung bestätigt. Was

Nest der Singdrossel (s. S. 163).

den Verlauf der Totalmauser anbetrifft — sie trat verspätet ein und wäre unter normalen Bedingungen zweifellos ausgeblieben, voraussichtlich zum Schaden des wertvollen Tieres —, so ging sie glatt und ohne irgendwelche Komplikationen vor sich; sie dauerte 6 Wochen und bot nur insofern Auffälliges, als die Steuerfedern und Handschwingen ganz merkwürdig unregelmäßig und in großen Zwischenräumen ausfielen. Ich war sehr gespannt, ob das Resultat dieses Federwechsels etwa eine Abweichung von der ursprünglichen Färbung ergeben würde; diese trat, wie schon gesagt, nicht ein, wenn auch das Gesamtkleid in seiner neuen Form bedeutend frischer und leuchtender aussieht.

Der Trupial nimmt sich mit seiner aparten Gestalt und ebensolchen Färbung unter meinen ziemlich schlicht gezeichneten Sängern äußerst vorteilhaft aus; er hat sich meine Zuneigung in kurzer Zeit zu erringen verstanden und wenn er auch gesanglich keineswegs alle die strengen Forderungen erfüllt, die ich

*) Daß eine „richtige", ja auch nur „annähernd zutreffende" Wiedergabe auch nur einer einzelnen Tour, geschweige denn eines ganzen Liedes „lautlich" ganz unmöglich ist, sei neuerdings mit allem Nachdruck betont; einen interessanten Beitrag zu dieser von vereinzelter Seite immer noch bezweifelten Tatsache bietet u. a. D. H. Stadler, Lohr, in seiner Abhandlung „Die Rufe und Gesänge des Berglaubsängers" (erschienen in der Tierwelt, Aarau), worin der Verfasser an Hand konkreter Beispiele nachweist, daß nicht einmal ein einzelner primitiver Ruf von den verschiedenen Beobachtern gleich gehört, geschweige denn gleich (lautlich) wiedergegeben wird, ein Umstand, „der diese Methode wie kein zweiter ad absurdum zu führen geeignet sei". Aus genannter Arbeit resultiert aber auch die Richtigkeit einer Behauptung, daß der Gesang eines „Sängers" überhaupt nicht einwandfrei fixiert werden kann; die Lautmethode kommt überhaupt erst gar nicht in Frage. Was also von der „Wissenschaft" sog „anerkannter Autoritäten" zu halten ist, die z. B. den Gesang „von Sprosser und Nachtigall lautlich richtig" wiedergegeben zu haben behaupten, ergibt sich daraus von selber. Mit diesen Fragen befasse ich mich u. a. in „Sänger- und Sangeskunstbeurteilung", erschienen in der Tierwelt und auch in dem Aufsatz „Vom Toureureichtum unserer Sänger", ebenda.

an jeden „Sänger“ vom musikalischen Standpunkt aus zu stellen pflege*) — wobei ich vom Geschmacke möglichst unabhängige Richtlinien einzuhalten versuche —, so bildet doch sein charakteristischer Vortrag mit seinen unbeschreiblich wohllautenden Flötentönen eine Klasse für sich. Unzweifelhaft ist er ähnlichen einheimischen (wie z. B. dem Pirol) in jeder Hinsicht überlegen, und das, obwohl er „nur“ ein Ausländer ist; zumindest erhärtet er die (mir speziell) freilich schon seit langem nicht mehr fremde Tatsache, daß unter den Fremdländern mehr wertvolle Individuen sich befinden, als sich so manche „Autoritäten“ und „Theorie-Apostel“ in ihrer Voreingenommenheit gegen alles, was nicht heimischen Ursprungs ist, wohl träumen lassen.

Mein Werdegang als Kanarienzüchter. Kanarienvogel oder Grünfink? und der Kanarienvogel vor dreitausend Jahren.

Von W. Kluhs, Stettin.

(Nachdruck verboten.)

Den ältesten Lesern der „Gef. Welt“ dürfte mein Name noch erinnerlich sein. Von 1877 bis 1893 war ich ständiger Mitarbeiter über alle Fragen der Kanarienzucht und mit Dr. Karl Ruß befreundet bis zu seinem Tode. Auch später (1912) habe ich nochmals eine Artikelserie in der „Gef. Welt“ gebracht. — Im Jahre 1912 erschien im Verlage der Crentz'schen Buchhandlung auch mein Buch: „Der Kanariengesang“, musikalische und phonetische Darstellung.



Junge Sumpfmeise (s. S. 154).

Nach Mitteilung meines Vaters züchtete schon mein Großvater, weiland Lehrer in Hollendorf, Kreis Greifswald, seit dem Jahre 1822 ebenfalls Kanarienvögel, und von ihm war diese Liebhaberei auf meinen Vater übergegangen. Der Sinn für Kanarienzucht muß mir wirklich angeboren sein, denn nach Mitteilung meines Vaters konnte ich ihm schon in früher Jugend dabei helfen, und sehr bald sind mir die notwendigen Handgriffe bekannt gewesen.

Es war im Frühjahr 1865, als mir mein Vater gestattete, selber eine kleine Hecke anzulegen; drei Hähne und zwei Weibchen waren das Ergebnis, und es sind also jetzt 59 Jahre her, seit ich Kanarienzüchter wurde. Gute Kanariensänger sind meine Begleiter im Wandel der Zeiten immer gewesen. Auch in meiner langen Laufbahn als Soldat und Beamter (41 Jahre) habe ich immer Kanarien besessen. Neben meinem Vater war es namentlich meine Bekanntschaft mit dem alten Jürgens, die diese Liebhaberei bei mir förderte und stabil machte.

Der alte Jürgens war ein Vogelnarr; alle Nachbarn sagten das, und mein Vater erzählte oft und wunderliche Sachen von ihm. Der große Garten hinter meinem Elternhause grenzte an den des alten Jürgens, und wenn Sommer war und schönes Wetter, lugte ich oft stundenlang durch ein Loch im Grenzzaun. Es lohnte sich für einen phantasievollen Knaben. Ich konnte gerade in die große Laube hineinsehen, in der Jürgens saß. Seine ewig qualmende Kalkpfeife im Munde und eine bunte Zipfelmütze auf dem weißen Kraushopf, so saß er da und um ihn herum sowie an der Decke der Laube, auf Ständern und in Hängeringen saßen und schaukelten sich Papageien mit langen und kurzen Schwänzen in allen Farben und Kakadus, die er sich bei seinen vielen Seefahrten als Schiffskapitän mitgebracht und die nun schreiend und plappernd einen Höllenlärm verursachten; doch das ist schon lange her.

Durch einen Zufall wurde Jürgens auf mich aufmerksam, und mit der Zeit wurde er mein Freund. Ich durfte immer zu ihm kommen, wenn ich Lust hatte, und Lust hatte ich immer. Nun lernte ich seine Vogelstuben kennen. Als ich das erstemal zu ihm ging, geschah es immerhin mit einer gewissen Scheu; denn man erzählte sich über seine Narrheiten mancherlei. Jürgens lebte mit einer Schwester, ohne allen sonstigen Verkehr nur für seine Vögel und kümmerte sich wenig darum, was sonst in der Welt vorging. Er konnte es, da er sich bei seinen langjährigen Seefahrten ein Vermögen erworben hatte. Jürgens' Schwester empfing mich und wies mich an, eine Treppe hinaufzusteigen, da der Alte in der Vogelstube sei. Oben hüpfte mir eine Elster entgegen, die fortwährend „Max“, den Rufnamen des alten Kapitäns, rief. Auf mein Klopfen an eine Tür, hinter der ich Vogelstimmen hörte, öffnete mir Jürgens und ließ mich eintreten. Meine Mütze mußte ich draußen lassen, weil die

*) Den Wert des Liedes schätze ich nach „musikalischen“ Gesichtspunkten ein; ich suche darin in erster Linie Abwechslung = Toureureichtum = Erfindung. Unter Touren verstehe ich, „Motive“ und zwar ist für mich der Vogel noch nicht tourenreich, der nur ein Motiv, dieses aber in mannigfacher Variation bringt; so sind denn auch für mich die hochbewerteten (von den speziellen Liebhabern, die sich Kenner zu nennen pflegen) 8 Sprosserrufe: David, Judith, Hohlip, Kuhlik, Panwist, Klotild, Filip, Thibet genau gleichviel wert, sind sie doch (musikalisch) ein und dasselbe recht primitive Motiv = 2 Töne mit eventuellen Vorschlägen, und unterscheiden sich von einander nur zufolge veränderter Tonlage, Klangcharakter und (vereinzelt) Akzentverschiebung. Zählt man solch geringfügige Variationen jeweils als besondere Touren, kommt man freilich zu derlei phantastischen Zahlen, wie sie z. B. Rausch mit 80 und mehr vom Sprosser angibt; in Wirklichkeit reduzieren sie sich auf ein Viertel und so nennt in Tat und Wirklichkeit die Nachtigall, die angeblich tourenärmer ist, nicht nur mehr, sondern auch wertvollere Touren ihr eigen. Was die speziellen Liebhaber als besonders wertvoll empfinden und bezeichnen, ist ihre rein private und persönliche Angelegenheit und hat mit der Sache an und für sich herzlich wenig zu tun; auch durch eine eventuelle „Rarität“ wird eine bestimmte Tour (musikalisch) nicht wertvoller, auch dann nicht, wenn sie tatsächlich „schön“ wäre.

Vögel sich vor dieser in meiner Hand ängstigen würden.

Ein ungeheures, regelloses Durcheinander von allen möglichen einheimischen Vogelarten, die ich damals zum Teil noch nicht kannte, und sehr vielen Kanarienvögeln gewöhnlichster Sorte in größeren und kleineren Käfigen bedeckte die Wände des Zimmers.

Ich konnte anfangs kaum verstehen, was Jürgens sagte, das war ein Getöse, Schreien, Singen und Pfeifen in dem kleinen Raum, daß mir die Ohren gellten. Jürgens zeigte mir bereitwilligst alle Vögel, jedesmal den Namen derselben nennend. Die Papalungen bezeugten es; aber auch Jürgens verstand seine Vögel, wie ich aus den Tatsachen im Laufe der Zeit nach und nach zu meinem Staunen erkannte; er verstand die Vogelsprache.

Ich war damals noch zu jung und unerfahren, um alle näheren Umstände zu verstehen und zu merken; aber die blanken Tatsachen haben sich in meiner Erinnerung erhalten. Nur noch einen Winter und den folgenden Sommer dauerte unser Verkehr. Dann verließ ich die Schule und hatte selten Gelegenheit, Jürgens zu sehen und zu sprechen. Die Kindheit lag hinter mir, und der Ernst des Lebens nahm alle meine Kräfte in Anspruch. Mein Inter-

Nisthöhlen des mittleren Buntspechtes (s. S. 154).

geien waren nicht in diesem Zimmer, sondern in einem besonderen Raum unten, wo ich später auch deren Bekanntschaft machte.

Hin und wieder machte der alte Herr mich auf besondere Künstler aufmerksam, die Volkslieder pfeifen konnten. In der Wohnstube zeigte er mir später einen Kanarienvogel, der auf Jürgens' Anregung sogleich das Lied: „Steh' ich in finst'rer Mitternacht" usw. tadellos pfiff. Hier zeigte er mir ferner zwei Kanarienvögel, von welchen einer mittels besonderer Vorrichtung einen kleinen Wagen zog, auf welchem der andere stand. Da war außerdem ein Käfig, dessen Insasse (ein Kanarienvogel) an seinen Futternapf erst dann gelangen konnte, wenn er einen kleinen Riegel zur Seite schob, worauf der Futternapf an einem Kettchen herniederrasselte u. dergl. mehr.

Jürgens sprach unaufhörlich mit seinen Vögeln, und viele schienen ihn zu verstehen, denn ihre Handesse an Jürgens verblaßte; er ist gestorben, und seine Vögel sind in andere Hände gekommen.

Als ich später einen eigenen Hausstand gründete und selber Vögel hielt, kehrte die Erinnerung zurück, und je älter ich wurde, um so mehr lernte auch ich die Sprache der Vögel verstehen.

Als ich nach langer, 41jähriger Abwesenheit an die Stätte meiner Jugend zurückkehrte und mein Fuß zuerst heimatlichen Boden betrat, war es mir gleichsam, als flüsterte eine Stimme in mir: „Zieh' deine Schuhe aus, denn das Land, wo du stehst, ist heiliges Land."

Die tiefe Sehnsucht nach den Stätten, wo ich als Knabe gespielt und gestürmt, als Jüngling gefühlt, gelernt und gedacht, hatte mich nach Wolgast zurückgeführt, an dem noch heute mein Herz mit allen Fasern hängt. Mein liebes Elternhaus stand noch genau ebenso, wie ich es vor jetzt 53 Jahren

verlassen hatte; aber andere Menschen hatten es nach ihren Bedürfnissen eingerichtet, und nun sah es mich so fremd an, so neu, so nüchtern!

Die Liebe zur Tierwelt im allgemeinen und für unsere Kanarien im besonderen ist dort in mein Herz gepflanzt und mir anerzogen worden. Wir Vogelzüchter sind häusliche Menschen, und was die fortschreitende Kultur uns draußen genommen hat und nimmt, das zaubern wir uns durch unsere Lieblinge in unser Heim; sie sind der stete und rechte Sonnenschein unserer Häuslichkeit und unseres Lebens, stürmt es auch draußen noch so sehr. Tief im Auge unserer Lieblinge sehen wir die Vogelseele uns entgegenblicken. Wir sehen sie geboren werden aus dem Ei und wachsen unter dem Gefieder. Wir sehen unsere Lieblinge uns anblicken und halten ihnen gern die Treue. Kommt näher, ihr kleinen Vögel; ihr ersetzet uns die Chöre der Engel.

(Schluß folgt.)

Sprechsaal.

(Steht den Abonnenten kostenlos zur Verfügung.)

Frage 10: Wie kann ich mir praktisch eine Mehlwurmhecke anlegen?

Frage 11: Ich möchte gern einem Vogelliebhaberverein beitreten. Welcher Verein käme daher wohl für die Provinz Ostpreußen in Frage, evtl. für Gumbinnen?

Wilhelm B., Gumbinnen.

Vom Vogelmarkt.

Von seltener auf den Vogelmarkt kommenden Vögeln werden angeboten:

Offerten unter C. B.: Tarantin. Unzertrennliche, Elfenastrilde, Buntastrilde.

Horn, J., Bremen, Fedelhören 101: Rosakakadus.

Kleinert, Max, Tierhandlung, Berlin NO 18, Strausberger Str. 13: Schwarzschulter-Edelpapageien, Glockenvogel, Dreif. Prachtglanzstar, Dajaldrosseln, Goldaugentimalie, Rotohrbülbül, Schwarzkopfnonnen, Weißköpfige, Muskatfinken, Bronzemännchen.

Lenger, E. W., Berlin N 58, Schönhauser Allee 70a: Rebhuhnastrilde, Muskatfinken, Schwarzkopfnonnen, Weißkopfnonnen, Mönchsittiche, Feuerflügelsittiche, Weißhaubenkakadu, Gelbhaubenkakadu, Kaptäubchen.

Mayer, E., Wildexport, Wiener Neustadt: Edelreiher, Löffelreiher, Purpurreiher, Fischreiher, Nachtreiher, Zwergreiher, Ibisse (Sichler), Weiße Störche, Schwarze Störche, Trappen, Kraniche, Kolkraben, Siebenbürger Uhu, Stein- und Königsadler, Gänse- und Kuttengeier, Birk- und Auerwild, Wanderfalken und Habichte.

Herrn A. B., Rath. 1. Die Geschlechter des Raubwürgers sind schwer zu unterscheiden. Die dunklen Wellenlinien auf der Unterseite zeigen häufig auch noch Vögel im zweiten Jahr, besonders aber die Weibchen, welche meist kleiner sind und weniger Weiß im Flügel haben. 2. Als Futter kommt neben Fleisch, lebenden Insekten, gelegentlich einem getöteten Sperling oder einer Maus ein Gemisch von geriebener Möhre, altbackenem geriebenem Weißbrot, Weißwurm, geriebenem Weichkäse, geriebenem gekochtem magern Fleisch (Herz, Leber) und trockenen Ameisenpuppen in Betracht. 3. Sie nehmen in der Gefangenschaft auch Lieder anderer Vögel auf, die sie aber unvollkommen wiedergeben. Soeben dem Nest entflogene werden bessere Spötter als aufgepäppelte. 4. Raubwürger sind interessante Käfigvögel. — Heckenbraunellen singen das ganze Jahr hindurch.

Herrn K. Ein sicheres Kennzeichen für das Geschlecht der amerikanischen Spottdrossel ist das Vorhandensein des weißen Spiegelfleckes auf dem Flügel nicht. Dieser ist auch beim Weibchen vorhanden, nur ist er bei diesem ebenso wie das Weiß der Schwanzfedern in der Regel weniger ausgedehnt als beim Männchen. Der Gesang ist das einzig sichere Kennzeichen des Männchens. Aus der Tatsache, daß der Vogel noch scheu ist, darf nicht gefolgert werden, daß er noch nicht gesungen hat. Zweckmäßig ist es, den Käfig des noch scheuen Vogels hoch aufzuhängen, damit er sich sicher fühlt, und zwar so, daß er alles, was in dem Raum, in welchem der Käfig untergebracht ist, vor sich geht, sehen kann. Wenn er dann richtig ernährt wird (Zugabe von frischen Ameisenpuppen, Insekten, allerlei frisches Obst und Beeren usw., s. „Fremdländische Stubenvögel" von K. Neunzig S. 67), wird er auch singen. Ob das noch in diesem Jahre der Fall sein wird, ist fraglich. Der Gesang beginnt gewöhnlich im April und währt bis zur Mauser (August-September). Manche singen auch nach der Mauserzeit noch eine Zeitlang. Wirklich hervorragende Sänger kommen bei dieser Art, wie auch bei anderen Arten, in der Freiheit nicht allzuhäufig vor und finden, falls sie gefangen werden, auch schon in der Heimat ihren Liebhaber. Zu uns kommen solche Sänger selten, aber ihre Einführung ist natürlich nicht ausgeschlossen.

Herrn Dr. J. K., Dessau, Herrn H. G., Mannheim Anfragen sind brieflich beantwortet.

Herrn P. S., Arnsdorf-Penig. Ich hoffe Ihren Wunsch in nächster Zeit erfüllen zu können.

Herrn P. K., Hannover. Der richtige Weg, das Futtermittel den Vogelpflegern zu empfehlen, ist die Inanspruchnahme des Anzeigenteils der Zeitschrift.

Herrn R. F., Neugersdorf. Man kann nichts tun, um die Wellensittiche zur Paarung zu veranlassen. Das Männchen ist zurzeit zur Zucht untauglich. Anscheinend hat es sich eine Schädelverletzung zugezogen.

Herrn A. C., Berlin. Das Weißstirnpfäffchen ist einer schweren Darmentzündung erlegen.

Herrn St. W., Merzig. Der Kanarienvogel war infolge einer Darmentzündung eingegangen. Vermutlich hat er irgendwelche schädlichen oder verdorbenen Samen gefressen. Da unter den gehaltenen Körnerfressern mehrfach Todesfälle eingetreten sind, wäre es zweckmäßig, die Futtersämereien versuchsweise von anderer Stelle zu beziehen, um zu sehen, ob bei Verabreichung dieser Sämereien weiterhin Erkrankungen vorkommen.

Herrn K., Berlin W. Die Anwendung von Petroleum zur Beseitigung von Kalkringen ist bei kleinen Vögeln nicht zu empfehlen. Man bestreicht die erkrankten Füße mit milder Seife (Schmierseife) und badet sie nach etwa 24 Stunden in warmem Wasser. Falls die Krusten dann noch nicht abfallen, muß das Verfahren wiederholt werden. Nach Beseitigung der Krusten werden die Füße mit mildem Fett bestrichen, dem man einige Tropfen Perubalsam zusetzen kann. Desinfektion des Käfigs ist notwendig.

Herrn E. Sch., Eystrup. Der Vogel war ein Männchen Pünktchenastrild.

Herrn A. M., Finnland. Nach der Beschreibung scheint es der Halsbandsittich (kleiner Alexandersittich) zu sein. Die Heimat hat meines Wissens mit Zähmbarkeit und Begabung der Vögel nichts zu tun.

Frl. O. G., Berka a. Werra. Der Stieglitz, welcher 9 Jahre im Besitz der Pflegerin war, war völlig abgemagert. Er litt an einer Verdauungsstörung, welche bei dem hohen Alter des Vogels den Tod herbeigeführt hat. — Bei dem Grünling ist abzuwarten, ob er sich bei der bevorstehenden Mauser nicht wieder befiedert. — Der Hänfling, welcher munter ist und fleißig und schön singt, scheint völlig gesund zu sein.

Herrn Dr. S, Böblingen. Die Fäulnis des Wellensittichkadavers war soweit fortgeschritten, daß eine Untersuchung nicht vorgenommen werden konnte. Anscheinend lag auch eine Verletzung der Wirbelsäule vor.

(Fortsetzung auf der 3. Umschlagseite.)

Aus den Verbänden.

Vereinigung der Vogelliebhaber (Landesverband Preußen). Zum Ausbau unserer jungen Organisation benötigen wir dringend Geld. In dankenswerter Weise haben mehrere Vereine ihre Verpflichtungen prompt erfüllt. Wir nehmen an, daß dieser Hinweis genügt und die noch ausstehenden Beiträge, pro Mitglied 1 M., dieselben können auch in Vierteljahrsraten bezahlt werden, von den noch ausstehenden Vereinen an unsern Verbandskassierer, Herrn Bankdirektor Erich Mey, Berlin-Friedenau, Wilh.-Hauff-Str. 14 II, per Postanweisung eingesandt werden.

Der Vorstand. J. A.: P. Böhme, Schriftführer, Berlin O 17, Rüdersdorfer Str. 69.

Aus den Vereinen.

Angemeldet sind die Herren: Max Sachs, Plauen in Vogtl., Mozartstr. 27; Ernst Seyschab, Nürnberg, Tafelfeldstr. 18. — Für das laut Ausführung im Rundschreiben aufgelegte Liebeswerk sind ferner eingegangen: Mtgl. 23 Stefani, Neuß, 30 M.; Mtgl. 299 Hahn jr., Neuß, 30 M.; Mtgl. 394 Wolff, Hamburg, 5 M. Bereits ausgeliefert 16,40 M., zusammen 81,40 M. Weitere Spenden werden dankend entgegengenommen und weitergeleitet. A. Krabbe.

„Aegintha", Verein der Vogelfreunde zu Berlin. Im Juli und August sind Vereinsferien und werden keine Versammlungen abgehalten. Ab September finden wieder regelmäßig jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat Versammlungen im Aquarium, Kurfürstendamm, statt.
J. A.: O. Vorbrodt, 1. Schriftführer, Scharnweberstr. 18.

Vereinigung der Liebhaber einheimischer Vögel zu Berlin. Sitzungen finden regelmäßig jeden 2. Donnerstag nach dem 1. und 15. des Monats statt. — Nächste Sitzung Donnerstag, den 10. Juli. Vogelliebhaber als Gäste sind stets gern gesehen. J. A.: P. Böhme, Schriftführer, Berlin O 17, Rüdersdorfer Str. 69.

Verein der Vogelliebhaber Dortmund und Umgegend. Protokoll der Versammlung vom 25. Mai 1924. Die Versammlung wurde vom 1. Vorsitzenden Kollegen Steenkamp um 6 Uhr eröffnet. Als erstes hielt uns der Herr Rektor Weimann einen schönen Vortrag über unsere Vogelwelt. Nachdem gingen wir zur Tagesordnung über, welche folgende Punkte hatte: 1. Aufnahme neuer Mitglieder. Es meldete sich Herr Paul Kletezka, Münsterstr. 184, dessen Aufnahme einstimmig erfolgte. Der 2. Punkt betraf die Beitragszahlung an den Kassierer. 3. Punkt: „Was soll mit den Mitgliedern werden, welche die Versammlungen nicht besuchen?" Es wurde vorgeschlagen, diese Mitglieder vom Kassierer persönlich nochmal einzuladen und die rückständigen Beiträge einzukassieren. Zu Punkt 4 wurde erwähnt, die Zeitung „Die Vogelwelt" nicht mehr als Verbandsorgan zu halten, weil selbe für uns nur noch sehr wenig Interesse zeige. Zum 5. Punkt: Besprechung zum Sommerausflug wurde beschlossen, einen gemeinschaftlichen Ausflug zum Cuorler Wald zu machen. Treffpunkt am Sonntag, den 1. Juni um 7½ Uhr am Borsigplatz. Beim letzten Punkt „Verschiedenes" kam es wegen einer Vereinstafel, welche ohne Versammlungsbeschluß bestellt worden war, zu lebhaften Auseinandersetzungen. Um 11 Uhr wurde die Versammlung vom 1. Schriftführer geschlossen.
Sondermann, 1. Schriftf.

Verein Vogelschutz und -pflege zu Dresden. Versammlung jeden Donnerstag, abends 8 Uhr, im Vereinslokal, „Schillers Restaurant", Ecke Stifts- und Ehrlichstraße Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen.
Bernhard Kühn, Vorsitzender.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei zu Hamburg. Sitzungen finden statt jeden 1. und 3. Dienstag im Monat in Hüttmanns Hotel, Poolstr. 22, abends 8¼ Uhr. Nächste Sitzung Dienstag, den 15. Juli 1924.
J. A.: Arnold Weber, 1. Vorsitzender.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig. Vereinssitzungen jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat im Vereinslokal, „Bauers Brauereirestaurant", Täubchenweg. Nächste Sitzung am 17. Juli 1924. Gäste stets willkommen. J. A.: Johann Birk, 1. Vorsitzender.

Verein der Vogelfreunde Leipzig-Plagwitz. Vereinslokal: „Gosenschlößchen", Leipzig-Plagwitz. Sitzungen an jedem 1. und 3. Montag des Monats, abends 8 Uhr. Vogelfreunde sind stets willkommen.
J. A.: Karl Scholtissek, 1. Vorsitzender, Leipzig-Plagwitz, Lauchstädter Straße 30.

Von folgenden **Farbentafeln** der **„Gefiederten Welt"** sind noch einige Exemplare vorrätig, welche wir, solange der geringe Vorrat reicht, zum Preise von **1 G.-M. für die Tafel** zuzügl. **20 G.-Pf.** Porto u. Verpackung **für jede Sendung** bei vorheriger Einsendung des Betrages auf unser Postscheckkonto **Magdeburg 3148** abgeben.

1898 Tafel III: Schwarzspecht. (Schwarzdrucktafel.)
1899 Tafel IV: Nest des Gartenrotschwänzchens mit Weibchen, Jungem und Ei. (Schwarzdruck.)
1900 Tafel I: Madagaskar-, Napoleons-, dottergelber, Samt-, Blutschnabelweber.
1900 Tafel II: Kl. Alexander-, Bunt-, Wellensittich, Rosenpapagei, kl. Gelbhaubenkakadu.
1900 Tafel III: Sonnenvogel, blauer Hüttensänger, Rosenstar, Schamadrossel, weißohriger Bülbül.
1900 Tafel IV: Paradieswitwe, Mozambikzeisig, Grauer Kardinal, Safranfink, Papstfink.
1901 Tafel III: Kleinspecht, Kleiber, Wendehals.
1902 Tafel I Kohl-, Schwanz-, Hauben-, Tannenmeise.
1902 Tafel II: Goldammer, Baumpieper, Feldlerche.
1902 Tafel IV: Diamant-, weißbäckige Gürtel-, Masken-, Gürtelamandine.
1903 Tafel I: Hausrotschwanz, Sprosser, Nachtigall, Rotkehlchen.
1903 Tafel II: Bluthänfling, Grünling, Kernbeißer, Buchfink.
1903 Tafel III: Mistel-, Wacholder-, Wein-, Singdrossel.
1903 Tafel IV: Zwergstrandläufer, Wachtel, weißflüglige Seeschwalbe, Sandregenpfeifer.
1904 Tafel I: Zaun-, Garten-, Dorn-, Mönchgrasmücke.
1904 Tafel II: Schneefink, Steindrossel, Alpenbraunelle, Steinsperling.
1904 Tafel III: Binden-, Kiefern-, Fichtenkreuzschnabel.
1904 Tafel IV: Bartmeise, Rohrammer, weiße Bachstelze, Sumpfrohrsänger.
1905 Tafel I: Schwarzbürzel-, Spitzschwanzbronzemännchen, weißes, gelbbuntes, braunbuntes jap. Möwchen.
1905 Tafel II: Grau-, Orange-, Erz- und Schmuckpfäffchen.
1905 Tafel IV: Schwarzkehl-, Dreifarben-, Weißkopf- u. Schwarzkopfnonne.
1906 Tafel II: Lein-, Erlenzeisig, Berghänfling, Stieglitz.
1906 Tafel III: Stein-, braunkehliger und schwarzkehliger Wiesenschmätzer.
1907 Tafel II: Weißsterniges, rotsterniges, Wolfsches Blaukehlchen, Blaukehlchen ♀.
1907 Tafel III: Kleines, Zwerg-, Glanz-, Riesen-, rotrückiges und Gitterflügel-Elsterchen.
1907 Tafel IV: Karmin- und Hakengimpel, Gimpel.
1908 Tafel II: Braunrückengold- ♂ ♀, Schwarzkopf- und Goldsperling ♂ ♀.
1908 Tafel IV: Pünktchenastrild, Amarant ♂ ♀, dunkelroter Astrild, Tigerfink ♂ ♀.
1909 Tafel I: Orangegesichtiger Unzertrennlicher, Rosenpapagei, Rußköpfchen, Tarantinischer Unzertrennlicher, Grauköpfchen.
1909 Tafel II: Klarinetten- u. Mennigvogel, braunkehliger Blauschnäpper.
1909 Tafel III: Schwarzbäckchen-, Elfen-, Bunt- und Granatastrild, gemalter Astrild.
1909 Tafel IV: Orange-, Rotkopf-, Blutschnabel-, Napoleons- und Madagaskarweber.
1910 Tafel I: Grauer, Trauer-, Halsband-, Zwergfliegenschnäpper.
1910 Tafel IV: Zipp-, Garten-, Zaun-, Kappenammer.
1911 Tafel I: Rotrücken-, Raub-, Schwarzstirn-, Rotkopfwürger.
1911 Tafel II: Zeresastrild, Malabarsasänchen, Muskatfink, Silberschnäbelchen.
1911 Tafel III: Gartensänger, Fitislaub-, Weidenlaub- u. Waldlaubvogel.
1911 Tafel IV: Goldköpfiges ♂ ♀, feuerköpfiges Goldhähnchen, Zaunkönig.
1912 Tafel II: Wieners, Aurora-, Tropfen-, Wachtel- und Rebhuhnastrild.
1912 Tafel III: Magellan-, Kapuzen-, mexikanischer, Yarells und Trauerzeisig.
1912 Tafel IV: Dorn-, Sonnen- Binsen- und Gitterflügelastrild, Zebrafink.
1913 Tafel II: Violettblauer u. Rotbauchorganist, Purpur-, Dreifarben- und schwarzblaue Tangare.
1913 Tafel III: Paradies-, Dominikaner-, Königs-, Fischers, Rotscheitel- und Gelbrückenwidafink.
1913 Tafel IV: Goldschulter-, Fein-, Sing-, Browns Singsittich.
1914 Tafel I: Schwarzkopf-, Rosenbrust- u. mexik. Gelbkernbeißer, dunkelblauer Bischof, roter Kardinal.
1914 Tafel III: Diuka-, Grau-, Kron- u. Morgenammerfink, Graukardinal.
1914 Tafel IV: Pikui-, Kap-, Diamant-, Tamborin- u. Friedenstäubchen, chinesische Zwergwachtel.
1915 Tafel I: Sammetköpfchen, Sperber-, Orpheus- und Bartgrasmücke.
1915 Tafel III: Diamantfink-, Masken-, Weißwangen- und Spitzschwanzamandine, Gürtelgrasfink.
1915 Tafel IV: Star, Pirol, Rosenstar.
1920 Tafel I: Nandy-, Jendaja-, Guajakil- und Goldstirnsittich.
1920 Tafel II: Schuppenköpfchen, Schnurrbärtchen, dottergelber, Zwergmasken- und Textorweber.
1920 Tafel III: Tui-, Ziegen-, Mönch-, Tuipara- u. Katharinasittich.
1920 Tafel IV: Reisfink, weißer Reisfink.
1921 Tafel I: Gelber Wellensittich und Wellensittich.
1921 Tafel II: Kleiner Gelbhaubenkakadu.
1921 Tafel III: Kleiner Alexandersittich.
1921 Tafel IV: Domingo-, Cuba- und Rotbugamazone.

Da die Nachfrage nach Farbentafeln sehr groß ist, bitten wir sofort zu bestellen.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg / Postschließfach 148

Anzeigenteil

Die viergesp altene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 20 G.-Pf. berechnet. Aufnahme erfolgt gegen Voreinsendung des Betrages in Reichsgeld per Brief od. auf unseren Zahlstellen: Postscheckkonto: Magdeburg 3148, Wien 156 687, Bern III 4326, Prag: Creditanstalt d. Deutschen unter Angabe des Zweckes.

Käfige u. Gerätschaften

Flugkäfige

1,30—1,55 m breit, 60—75 cm tief, 80—90 cm hoch, für 70 M. **J. Steuger,** München, Türkenstraße 53. [511

Futtermittel

Vogelfutter [512

für Kanarien, Waldvögel, Exoten, Papageien, Weichfresser. Anfragen nur gegen Rückporto. Liste 13 über Vogelfutter, Liste 5 über Vogelkäfige, Zuchtgeräte usw. mit etwa 400 Abbild.

W. Göpel, Leipzig,
Tröndlinring 1. Telephon 14958.

Frische Ameiseneier

versendet 1/2 Liter 1,25 M franko gegen Voreinzahlung auf Postscheckkonto Berlin 149951. [513

Hermann Arold, Zoolog. Handlung, Berlin N 58, Fransecky straße 4.

Feinste Ameiseneier

(Pfälzer) liefert bis auf weiteres per Liter M 2.—, nur gegen Einsendung des Betrages. 514]

E. Urban, Vogelhandlung, **Karlsruhe i. B.,** Hirschstraße 89.

Ameiseneier, stets frische prima saubere Ware, à Liter 1.50 M. **Karl Edel,** Würzburg, Augustinerstraße 13. [517

Mehlwürmer neue, feinste Qualität, Pfd. 8 M 515] **Jeitner, Breslau,** Weinstr. 12.

Mehlwürmer

geg. Einsend. v. 2.— Rentenmark 1/4 Pfd. franko versend. **D. Waschinski & Co.,** Biesenthal I (Mark). [516

Vögel

Lebende

Edelreiher
Löffelreiher
Purpurreiher
Fischreiher
Nachtreiher
Zwergreiher
Ibisse (Sichler)
weiße Störche
schwarze Störche
Trappen
Kraniche
Kolkraben
Siebenbürger Uhu
Stein- und Königsadler
Gänse- und Kutteugeier
Birk- und Auerwild
Wanderfalken u. Habichte

offeriert die altrenommierte Firma

E. Mayer, Wilderport,
Wiener Neustadt.

Rückporto muß beiliegen. [518

Steinkauz, fingerzahm (frißt Mischfutter), gegen Dompfaff od. Wachtel zu tauschen. [519 Wuckel, Haun.-Linden, Fröbelstr. 9, II.

Veilchenpapageien, Blaubartamazonen, Blaustirnamazonen, tarant. Unzertrennliche, Sperlingspapageien, Toviisittiche, Elfenbeinsittiche, Mönchsittiche, Tuiparasittiche, Klarinos, Schamadrosseln, Männchen u. Weibchen, amerikan. Spottdrosseln, Kaprötel, peruan. Grünhäher, schwarzkäpp. Blauhäher, langschwänzige Glanzstare, abessin. Glanzstare, Prachtglanzstare, dreifarbig, Soldatenstare, Purpur-, blaue und Palmtangaren, Spiegel-, Garten-, Gelbschulter-, schwarzkehlige und braunköpfige Trupiale, Rotschopfbülbüls, Gangesbrillenvögel, Dominikaner und rote Kardinäle, blaue mexikan. Kernbeißer, südafrikan. Grüngimpel, südafrikan. Angolagirlitze, Karmingimpel, Orangeblaufinken, Papstfinken, mexikan. Zeisige, Lerchenammern, Hahnschweifwitwen, Schnurrbärtchen, Rotkopfamandinen, Safranfinken, Weißkopfviehweber, Oryx- und Flammenweber, Napoleons- und Feuerweber, Blutschnabel- und Gilbweber, hochrote Amaranten, Grauastrilden, Orangebäckchen, Elsterchen, Silberfasänchen, Atlasfinken, Paradieswitwen, Bandfinken, Muskatfinken usw. liefert zu reellen Preisen unter Gewähr zuverlässiger Bedienung (Liste umsonst) [520

Südd. Vogelexporthaus Joh. Götz,
Neu-Ulm (Bayern).

Ausländer-Vögel

und 50 Stück **Harzer Kanarien,** gute Sänger, abzugeben. Näheres **H. A.,** Paffau, Wittgasse 5 I. [521

Aus mein. Bastardzucht Kanarienweibch. u. Zeisigmännch. gebe 2 Pärchen (stng.) geg. exotische Vögel in Tausch. Angeb. an Arth. Israel, Seifhennersdorf b. Zittau i. Sachs., Neugersdorfer Str. 821 B. [522

Weltbekannt sind

meine **billigen Preise** und **reelle Bedienung.** [523

Ganz kleiner w. Gelbhaubenkakadu, taubenzahm, sitzt frei auf Hand u. Schulter, kein Schreier, 50 M. **Zahme Elster** 5 M. **Zwerghühner, Legehühner, Pöllen, Küken mit u. ohne Glucken, Kanarienvögel, Angorakaninchen, frische Ameisenpuppen** laufend billig abzugeben. Listen auch über andere Vögel gegen Rückporto.

Emmy Voß, Cöln, Merlostr. 23.

Schamadrosseln	Stück	80 M
Klarinos	„	80 M
Rote Kardinäle	„	50 M
Purpurtangar.	Stck. 35 M, Paar	45 M
Div. Trupiale	Stück	35 M
Orangeblaufinken	„	35 M
Papstfinken	„	25 M
Mexikan. Zeisige	„	35 M
Meerbl. Tangaren	„	25 M
Trauertangaren	„	30 M
Dominikanerkardinäle	„	15 M
Amerik. Wanderdrosseln	„	15 M
Weißstirnpfäffchen	„	12 M
Weißkehlpfäffchen	„	12 M
Mexik. Karmingimpel	„	10 M
Gelbe Wellensittiche	Paar	25 M
Grüne Wellensittiche	„	20 M
Jap. Möwchen	„	20 M
Safran- u. gr. Reisfink.	„	10 M
Elfenbeinsittiche	„	60 M
Senegalfinken	„	4—6 M
Kanarienhähne	von	8—30 M
Kanarienweibchen		2 M

bietet an **Friedrich Frank, München,** Gabelsbergerstraße 9. [524
Anfragen Rückporto beifügen.

Vertausche

1,1 japanisches Möwchen (braunweiß) gegen prima Zuchtpaar **Zebrafinken.** [525

Oscar Haas, Fabrikant, **Lauterbach** (Württ.), „Villa Bergfried". A. Z.-Mitgl. 11.

Roter Kardinal	Paar	40.— M
Chin. Nachtigall	„	12.— „
Wellensittiche	„	20.— „
Kl. Alexandersittiche	„	24.— „
Rotr. Goldsperling	„	6.— „
Elsterchen	„	5.— „
Weißscheitelpfäffchen	„	15.— „
Zwergkappenweber	„	8.— „
Weißwangenlerche	„	10.— „
Mossambikzeisig	„	10.— „
Astrilde	„	4.— „
Amaranten	„	4.— „
Silberschnabel	„	4.— „
Orangebäckchen	„	4.— „
Rotschwänzchen	„	5.— „
Schmetterlingsfinken	„	4.— „
Schwarzkopfnonnen	„	4.50 „
Blaue Reisfinken	„	10.— „
Muskatfinken	„	4.50 „

E. Schöndube, [526
Berlin O, Elisabethkirchstr. 1.

Offeriere in einwandfreien Exemplaren, gesund und prima im Gefieder: Blaustirnamazone Stück 45 M, tarantinische Unzertrennliche Paar 80 M, Toviisittiche P. 35 M, Goldstirnsittiche, ganz zahm, P. 25 M, Weißbauchpapageien St. 110 M, Gelbmantellori St. 170 M, großer Gelbhaubenkakadu St. 120 M, blaubürzl. Sperlingspapageien P. 20 M, Männchen St. 8 M, rotbürzl. oder rotrück. Amazone, ganz zahm, spricht, St. 75 M, Kapuziner Affen, zahm, St. 100 M, mex. Grünhäher St. 40 M, rote Kardinäle Männchen 34 M, Dominikaner Kardinäle St. 10 M, Papstfinken in vollständiger Pracht Männchen 25 M, Orange-Blaufinken P. 50 M, chin. Nachtigallen, Männchen gut schlagend, 11 M, Weibchen 2 M, Wellensittiche, grüne, P. 18 M, Soldatenstare St. 12 M, Reisfinken, grau, P. 7 M, Muskatfinken P. 4.50 M, Bronzemännchen P. 7 M, Mossambikzeisige P. 8 M, kleine Elsterchen P. 4 M, Silberschnabel P. 3.50 M, Amaranten, Astrilde, Orangebäckchen P. 3.50 M, Atlasfinken, Webervögel P. 2.80 M, Kanarienhähne, flotte Sänger, St. 12—15 M, junge Hähne 8 M, Schuppentäubchen P. 15 M. Verpackung und Porto 6.50 M. [527

Paul Tzornack, Berlin, Prenzlauer Allee 189. Tel. Humboldt 2063.

Verkaufe

9 junge Wellensittiche,

teilweise 4 Monate, verschiedener Abstammung, durch Fußringe gezeichnet, Stück 6 M, zus. 50 M. [528

Dentist **Jacobsen, Sonderburg** (Dänemark), Brandsgade 3.

4 ff. indische Gelbspötter vertausche gegen **Hohlroller.** [529
Schlößchen, Allersberg b. Nürnberg.

Aus Gartenvoliere gebe ab: 1,1 Glanzstare 15 M, 1,1 Zwergtäubchen (Stargröße) 13 M, 0,1 Safranfink 3 M, Lachtauben à 5 M. E. Stümcke, Vegesack (Bremen). A. Z.-Mtgl. 258. [530

Graupapagei, gut sprechend, Sprachenverzeichnis auf Wunsch, **Blaustirnamazonen,** junge, schon etwas sprechend, viel Talent, prachtvoll im Gefieder, **Sperlingspapageien, Wellensittiche,** gelbe und grüne, **Schamadrossel,** Ia, **Senegalvögel** 4—10 M pro Paar. [531
Täglich frische **Ameiseneier.**

Zoologische Handlung G. Behnke,
Berlin O 34, Petersburger Str. 29.

Gegen Exoten od. Kanarien vertausche 1,0 Blaukehlchen, 1,0 Rotkehlchen, 1,0 Buchfink.

Verkaufe 3,0 Wellensittich, einer gelb, stark, 1,1 japan. Möwchen, 0,1 Grauedelsänger u. a. Rückporto erbeten. [532
E. Urban, Karlsruhe, Hirschstr. 89.

Suche z. kaufen od. tauschen 0,1 Sperlingspapagei.

Verkaufe oder tausche ein Zuchtpaar Gimpel. [533
Erich Richter, Bernstadt (O.-L.).
A. Z.-Mtgl. 235.

1,1 Nymphen od. kleine Alexandersittiche
suche zu kaufen oder tauschen gegen
Wellensittich. [534
Erich Richter, Bernstadt (O.-L.).
A. Z.-Mtgl. 235.

Verkaufe erprobtes Zuchtpaar gr. Wellensittiche für 20 M. Frau **E. Birkner,** Crimmitschau (Sa.), Annenstr. 38. A. Z.-Mtgl. 60. [535

Aus meinen Freivolieren gebe ab:

2,1 Schamadrosseln

à 75 M. Nehme z. T. in Tausch **jap. Möwchen.** Ferner ein prima Zuchtweibchen **Schama** abzugeben gegen dito Männchen.

Ferner habe wegen Platzmangels! **große wertvolle Kakteensammlung** (nur am Platze) abzugeben, auch Tausch gegen Exoten. [536

S. Lichtenstaedt,
Berlin-Johannisthal, Nieberstr. 10.

Verk. Die **„Gef. Welt"** Jahrg. 1916—23 einschl. auch einzeln. A. G. v. Zitzewitz, Berlin W 50, Kurfürstendamm 243. A. Z.-Mtgl. 308. [537

[redacted]

Inserate

für das am 17. Juli 1924 zur Ausgabe gelangende Heft 22 der Ges. Welt erbitten bis 12. Juli 1924 früh

[redacted]

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Berlin-Hermsdorf; für den Anzeigenteil: Rolf Kretschmann, Magdeburg, Postschließfach 148.
Verlag der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck: August Hopfer, Burg Bz. Mgdbg.

Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Jahrg. 53 | Den 17. Juli 1924 | Heft 22

(Druckort: Burg, Bezirk Magdeburg.)

Zehn Tage Vogelschutzstudien.

Von A. J. Kögel, Berlin.

(Nachdruck verboten.)

Meine diesjährige Ferienzeit vom 6.—16. Juni benutzte ich, um der Tochterstation des Herrn v. Berlepsch, Haus Wendgräben bei Loburg, Bez. Magdeburg, die unter Leitung des Herrn Vogelwarts Büchner steht, einen Besuch abzustatten. — Als ich dort ankam, traf ich den Vogelwart gerade beim Füttern von zwei aus dem Horst genommenen Eulen, einer Waldohreule und einem Waldkauz, die zur Aufzucht und der Wissenschaft dienen sollen. Der Horst der Waldohreule befand sich in einem alten Krähenhorst in zirka 18 Meter Höhe; vier Meter weiter war ein Nebelkrähennest. Das Nest des Waldkauzes befand sich in einem Kaninchenbau, am Rande des Waldes an einer Kiefernschonung. Am andern Morgen um 3 Uhr konnte ich in Begleitung des Herrn B. einen Einblick in die Station nehmen, welche ein sehr reiches Vogelleben aufweist. Zuerst betraten wir den Schloßpark, welcher eine Größe von zirka 20 Morgen hat. In der Ferne hörten wir die Heidelerche, die doch immer wieder durch ihren Gesang entzückt. Die Nachtschwalbe konnten wir auch an ihren schnurrenden Tönen erkennen. Dann kamen rasch aufeinanderfolgend Haus- und Gartenrotschwanz, Gartengrasmücke, Pirol, Singdrossel, Amsel, der Kuckuck rief unermüdlich, Zaunkönig, das Müllerchen mit dem Klick, Klick, Klick, Zilp-Zalp, dessen eintöniger Gesang sich dem ganzen Konzert anpaßte. Der Fitis- und Waldlaubvogel ließ uns auch nicht im Stich. Da ertönte ein eigentümliches Gurren an unser Ohr, ich dachte an eine Taube, aber Herr B. belehrte mich eines Besseren, daß wir es hier mit dem Balzruf des Kuckucks zu tun hätten. Da schlug der Buchfink, der auch in einigen guten Exemplaren vorhanden ist. Der Trauerfliegenfänger war auch zu hören und zu sehen. Eines Rotkehlchens zaubervollem Flöten hörten wir lange zu. Nun verließen wir den Park und traten in den Wald, wo wir noch sehr viele Vogelarten sahen und hörten. Auf dem Felde hörten wir die Feldlerchen jubilieren, die Kiebitze rufen; Grau- und Goldammer begleiteten die Musik. Zum Schluß des Morgenganges betraten wir den Ochsenstall, der, 12 Meter lang und 6 Meter breit, 30 Paar Rauchschwalben Nistgelegenheit gewährte. Die Nester befanden sich auf vom Vogelwart angebrachten Brettchen. Um 6 Uhr hatten wir unsern Rundgang beendet. Meine späteren Studien machte ich teils allein oder in Begleitung des Vogelwartes. Dicht am Ochsenstall brütete auf einem kleinen Brett der graue Fliegenfänger. Ich konnte mir die eben geschlüpften Jungen ansehen. Aus diesem Nest entnahm Herr B. zu wissenschaftlichen Zwecken von sechs Eiern fünf Stück, der Vogel ersetzte diesen Verlust durch Nachlegen von vier Eiern, so daß das Gelege wieder fünf Eier aufwies, welche alle ausgebrütet wurden. Man braucht sich keine Mühe zu machen, ein Nest zu finden, das Vogelleben ist dort so reich, daß die junge Station bei erst dreijährigem Bestehen mit Stolz auf die gute Entwicklung sehen darf. Ein Buchfinkennest mit fast flüggen Jungen konnte ich einige Tage beobachten; merkte der Fink meine Anwesenheit, so blieb er mit dem Futter im Schnabel sitzen und schlug ganz leise, als ob er mich zu bitten schien, entferne dich. Junge Trauerfliegenschnäpper zeigte mir der Vogelwart in einer Berlepschschen Nisthöhle in zirka 4 Meter Höhe. Auf einer Eiche im Walde an einsamer Stelle in 15 Meter Höhe befand sich der Horst des jetzt so ziemlich seltenen Wespenbussard. Der große Buntspecht hatte in einer alten Akazie in 2 Meter Höhe seine Villa erbaut. Diese haben 14 Stück der Berlepschschen Nisthöhlen B zur Brut benutzt. An einem kleinen Teich in der Nähe des Schlosses konnte ich die Gebirgsbachstelze beobachten. Sie brütete an der Schloßmauer im Efeu in 8 Metern Höhe auf sechs Eiern. Einen jungen Kuckuck sah ich in einem Gartengrasmückennest. Er war allein. Er wurde durch den Vogelwart beringt. Die Stiefeltern fütterten den stets Hungrigen recht fleißig. In einer jungen Fichte in $1^1/_2$ Meter Höhe, einen Fuß breit vom Stamme entfernt, fand ich ein Buchfinkennest. Da mir der eigenartige Bau auffiel, untersuchte ich es näher und fand als Unterlage ein Nest des rotrückigen Würgers mit vier Eiern, zwei zerdrückt und zwei noch unversehrt. Herr B. war anwesend und belehrte mich näher darüber. In diesem Jahre hängen etwa 1200 Nisthöhlen im Gebiet, von denen etwa tausend besetzt sind. Der Vogelwart hat im Park einmal 60 Höhlen geprüft, von denen 57 besetzt waren; gewiß ein schöner Erfolg. Ein Paar Blauraken wurde im Mai einigemal gesehen. Der Haus-

sperling wird wegen seiner Schädlichkeit dort vernichtet, der Feldsperling bleibt wegen seiner Seltenheit in einigen Brutpaaren erhalten und ist nur noch in drei Paaren vertreten. Nebelkrähen, Elstern und Eichelhäher, Wiesel, Eichhörnchen, wildernde Katzen und Hunde werden bekämpft. Der Wiedehopf ist dort auch Brutvogel. Interessieren dürfte es auch, daß in einem Umkreis einer halben Stunde 85 Paar Stare gebrütet haben. Tatsächlich hat der Eichenspinner und Maikäfer dem Baumbestand nicht so großen Schaden zugefügt wie in der weiteren Umgebung, wo kein Vogelschutz getrieben wird, und wo ganze Teile kahl dastehen. Zwecks Studiums besitzt Herr B. eine reichhaltige Literatur, eine Eier-, Nester-, Flügel-, Feder-, Brustbein-, Schädel-, Ständer-, Fänge-, Gewölle-, Sämereien- und Insektensammlung. Im vorigen Jahre war ich dort zum ersten Male Gast der Vogelschutzstation; in diesem Jahre war ich erfreut über die großen Fortschritte, die der Vogelschutz dort gemacht hatte. Möge ihm weiter so gutes Gedeihen und so herrliche Erfolge wie bisher beschieden sein. Wünschenswert wäre es, wenn noch andere mit Lust und Liebe dem Beispiele der dortigen neuen Vogelschutzstation folgten, zum Nutzen unsrer ganzen Volkswirtschaft. Der Erfolg wird nicht ausbleiben!

Noch ein paar Worte über Rosenpapageien und über das Absterben der Jungen im Ei.

Von A. Adlersparre.

(Nachdruck verboten.)

Besonders nach den beiden letzten sehr interessanten und ausführlichen Arbeiten über die reizenden kleinen Rosenköpfchen (Über Unzertrennliche und Sperlingspapageien von Eduard Schütze in Heft 8 und „Von meinen Rosenpapageien" von Dr. Bilfinger in Heft 12 und 13) kann ich mich hier kurz fassen — habe übrigens schon vor ein paar Jahren Gelegenheit gehabt, den Vogel in diesen Spalten zu behandeln.

Diejenigen Rosenköpfchen, die — seitdem es mir durch eine Zufälligkeit gelang, ein richtiges Paar zu erwerben, von welchem das Weibchen jedoch bald verlorenging — s. Z. bei mir mit Erfolg nisteten, fraßen wenig Vogelmiere und gar kein Obst, auch nicht gewöhnliche gelbe und rote Hirse (die nebenbei minderwertig sind), ließen sich aber allmählich an hartgekochtes Eigelb und Eierbrot (mit wenig Ameisenpuppen, ab und zu durch Termiten ersetzt) gewöhnen. Außerdem fraßen sie hauptsächlich Silberhirse und Glanz, weniger Senegalhirse, ferner ein wenig Hafer und „Boermannaseed" (aus Südafrika, Senegalhirse ziemlich ähnelnd), anfänglich auch (später aber nicht) Hanf. Auf Sonnenblumenkerne waren sie ganz erpicht, bekamen aber nur geringere Gaben. Auch Samen von Tragopogon pratensis (Wiesenhaferwurz oder Wiesenbocksbart) in grünem, noch nicht vollreifem Zustande war sehr begehrt wie von allen meinen anderen exotischen Vögeln (s. „Ges. Welt" 1919 S. 123 und 124, vgl. auch „Ges. Welt" 1906 S. 15 und 1918 S. 14). Zu dem mit Möhre schwach erweichten Eierbrot setzte ich einige Tropfen von Möllers hydroxylfreiem Lebertran teils aus Gründen, die ich in meinem Aufsatz über Vitamine und Vogelhaltung (Heft 2 und 3 des laufenden Jahrgangs) näher ausgeführt, teils auch in der Annahme, daß diese Zubereitungsweise das Futter diesen ausgesprochenen Liebhabern ölhaltigen Samens (Sonnenblumen) vielleicht angenehmer machen könnte. — Als Aufzuchtfutter bekamen sie außer den nämlichen Futtersorten leicht angekeimte Körner (über 1—2 T., je nach der Härte der Körner und Durchlässigkeit der Schalen für Wasser), auch geringere Gaben von Grünfutter. Aus diesem allen konnten sich dann die Alten nach eigener Wahl heraussuchen, was sie für den Fütterungszweck dienlich fanden.

Die Angabe in der Arbeit von Schütze, daß Rosenköpfchen bei ihm Obst gefressen („Der Vogel wurde so zahm, daß er auf seinen Namen „Peterle" sofort ans Käfiggitter kam und ein Schnittchen Apfel aus der Hand nahm"), war besonders interessant. Es ist nämlich dies eine Bestätigung der Angaben des bekannten schwedischen Forschungsreisenden und Jägers um die Mitte des vorigen Jahrhunders Karl Johan Andersson, dem wir nebenbei, wie es scheint, die einzige Nachricht über die Lebensgewohnheiten dieses Papageis im Freien bis in die letzten Jahre verdanken — wenigstens schreiben in einem verhältnismäßig neuen Werk: The Birds of South Africa (4 Bde., London 1900—1906) Stark und Sclater: „The only notice of the habits of this little Parrot is that of Andersson"*). Nun gibt aber Andersson u. a. an, daß die Nahrung aus großen Beeren und beerenähnlichem Samen besteht. Die Richtigkeit hiervon wurde aber von den meisten Pflegern, mit Ruß an der Spitze, auf Grund langjähriger Erfahrungen ernstlich in Zweifel gezogen. — Daß die Rosafarbe in Verbreitung und Intensität je nach Alter, Körperzustand und entsprechend den Verhältnissen und Einflüssen in der Zeit der Entwicklung etwas schwankt, stimmt mit meinen Erfahrungen überein.

Auch die Arbeit von Bilfinger enthält — wie immer — viel Interessantes und Wissenswertes. In einigen Punkten hege ich jedoch geringe Zweifel. Der Verfasser nimmt u. a. an, daß die schwarze Krallenfarbe seiner Rosenköpfchen auf jugendliches Alter deutet. Ein jüngeres Individuum in meinem Besitz hat indessen grauliche Krallen, nur im Zentrum hornbraun. Wäre es nicht möglich, daß die schwarze Krallenfarbe darauf beruht, daß die Vögel wildgefangen oder aber in einer Freivoliere in Südafrika gezüchtet waren? Die Pigmentierung der Füße und nebenbei auch die der Regenbogenhaut mehrerer Vögel wird erfahrungsgemäß bedeutend schwächer, wenn diese Vögel hier in Europa im Zimmer gezüchtet werden.

Sehr hat mich die Angabe in der nämlichen Arbeit interessiert, daß die Rosenköpfchen in ihrer Heimat während der Regenzeit nisten sollen und daß deshalb der Grund des häufigen Absterbens von schlüpffertigen Jungen in einer zu geringen Luftfeuchtigkeit bei uns läge. Ich gebe gerne zu, daß diese Annahme auf den ersten Blick des Rätsels Lösung in sich zu schließen scheint. Indessen will es

*) Kurze Mitteilungen über den Rosenpapagei sind hier und da in der Literatur zerstreut zu finden.

erscheinen, als ob es im Hauptteil des Verbreitungsgebietes — sog. regenarme südafrikanische Zone: Damaraland, Groß-Namaland und Kalahari-steppe — keine regelrechte Regenzeit gäbe. In der Literatur heißt es: „Alle Monate niederschlagsarm". „Fällt einmal Regen, so ist dieser fast immer mit Gewitter von Osten her verbunden." Auf das Fehlen einer eigentlichen Regenzeit in diesen Gegenden scheint auch die überaus geringe jährliche Niederschlagsmenge zu deuten — angeblich geringer als 125 mm, welches Quantum uns hier in den Küstenländern der Ostsee schon einige regnerische Sommertage bringen können und in den Tropen ein paar Stunden. Nur in der nördlichen Randzone des Verbreitungsgebietes (Süden des portugiesischen Westafrika), in einem kleinen Damaragebiet und in der östlichen, inneren Randzone liegt die jährliche Regenmenge zwischen 125 und 250 mm. Ein Blick auf beigefügte Karte, die ich im Anschluß zu meinen im Jahrgang 1914 der „Gef. Welt" S. 395, Fußnote, ausgesprochenen Ansichten später für „Avikulturella Meddelanden" (Avikulturelle Mitteilungen) ausgearbeitet habe, wird meinen verehrten Lesern das Gesagte veranschaulichen. Für die Beurteilung der Luftfeuchtigkeit muß man übrigens auch in Betracht ziehen, daß die niedrigen nächtlichen Temperaturen in Südwestafrika, die bisweilen bis zum Gefrierpunkt und noch darunter herabsinken sollen, anscheinend schon in wenigen Tagen die Luft ihres etwa vorhandenen Feuchtigkeitsüberschusses berauben. Fragen wir uns schließlich nach der jährlichen Niederschlagsmenge bei uns in den baltischen Küstenländern (Baltikum, Deutschland, Dänemark, Südschweden), so liegt diese angeblich für Deutschland zwischen 500 und 1000 mm, in einigen wenigen hauptsächlich nördlichen und östlichen Gebieten ein wenig darunter, in einigen anderen hauptsächlich südwestlichen etwas darüber. Für Schweden liegt sie zwischen 450 und 700 mm (für das ganze Land durchschnittlich 515 mm, für Stockholm 485). Für die dänischen Inseln angeblich 500—600 mm, für den Hauptteil Jütlands zwischen 600 und 800 mm.

Anscheinend ist also die Luftfeuchtigkeit bei uns wenigstens während Sommer und Herbst vielmals größer als in Südwestafrika, und meines Erachtens kann das Absterben der jungen Rosenpapageien im Ei deshalb nicht auf ungenügende Luftfeuchtigkeit bei uns zurückgeführt werden. Der Grund muß ein anderer sein*).



Schematische Darstellung der Niederschlagsgebiete Afrikas, nach verschiedenen Quellen von A. Adlersparre ausgearbeitet.

(Aus „Avikulturella Meddelanden", 1915.)

Ganz verschieden verhält sich die Niederschlagsmenge an der Südostküste Afrikas. Ein Blick auf die Karte wird uns zeigen, daß mit Ausnahme eines kleinen Inhambanegebietes die Regenmenge meistens zwischen 500 und 1000 mm liegt, in Natal zwischen 1000 und 2000 mm und in einem kleinen Nyassagebiet sogar über 2000 mm. Den einen oder anderen Leser wird es vielleicht überraschen, daß der Unterschied zwischen Ost- und Westküste so bedeutend ist. Die Erklärung ist indessen recht einfach. An der Ostküste vorbei fließt der warme, von den Äquatorialgegenden kommende Mossambikstrom (wie der Golfstrom an den Küsten Norwegens), die Winde sind warm, meistens von Osten blasend, feuchtgesättigt. Wenn sie gegen die Bergformationen des inneren Hochlandes stoßen, fällt die meiste Feuchtigkeit aus. Nur verhältnismäßig wenig geht über die Berge hinweg und gibt dem inneren Hochlande (durchschnittlich 1200 Meter über dem Meer) einen relativ spärlichen Niederschlag, kann sogar in Ausnahmefällen die Westküste erreichen (vgl. oben). An der Westküste vorbei fließt dagegen der von den Südpolargegenden kommende kalte Benguelastrom. Die vorherrschenden, hier südwestlichen Winde werden über ihm stark abgekühlt, und die Feuchtigkeit derselben fällt schon, ehe sie die Küste erreichen, aus. Deshalb wird die Westküste beinahe regenlos, besonders zwischen 17° und 30° südlicher Breite.

Nun wäre man ja berechtigt, zu erwarten, daß diejenigen Vögel ganz besonders unter der Trockenheit unserer europäischen Luft leiden müßten, deren Verbreitungsgebiet mit der Ostküste zusammenfällt,

*) Rosenköpfchen sind s. Z. auch im dänischen Klima — soweit bekannt ohne besondere Anfeuchtungsmaßnahmen — erfolgreich gezüchtet, nämlich von Christensen, einem der bedeutendsten Liebhaber und Züchter, die dieses Land gehabt.

wo ein Klima anscheinend vielmals feuchter als das unsrige und mit doppelter Regenzeit vorherrscht. Jedoch habe ich hier in Stockholm im Januar (also bei geheizter, trockener Zimmerluft) ohne besondere Anfeuchtungsmaßnahmen Braunrückenelsterchen, die tadellos auskamen, gezüchtet (im Alters-, Jugendkleid und auf Originalphoto deutlichem, hinsichtlich Flankenmusterung sehr charakteristischem, für Reproduktion aber anscheinend nicht ganz geeignetem Übergangskleid in „Gef. Welt" 1922 S. 19 und 21 wiedergegeben). Das Verbreitungsgebiet dieser Art erstreckt sich vom Tanafluß (oder wenn man Spermestes nigriceps minor *Erlanger* mit zurechnen will, vom Djubagebiet) im Norden bis nach Natal im Süden und ins Innere wenigstens bis an den Nyassasee (Langenburg), also über Gegenden, die (s. Karte) einen Niederschlag von 200—2000 mm, möglicherweise sogar darüber, aufweisen können. Ebenso verhält es sich mit bspw. den Goulds. Das Hauptverbreitungsgebiet letzterer Art weist eine Regenmenge von 500 bis mehr als 2000 mm auf. Bei mir kamen die Goulds allerdings nicht immer tadellos aus, und ich habe deshalb vor mehreren Jahren mit künstlicher Anfeuchtung (Verdunstungsanordnungen gleich denen des Psychrometers = Feuchtigkeitsmesser) eine Zeitlang gearbeitet, ohne jedoch irgendeinen mehr auffallenden Parallelismus zwischen den Veränderungen der Luftfeuchtigkeit (allerdings innerhalb mäßiger Grenzen) und dem Absterben der Embryonen feststellen zu können. Nunmehr ist deshalb meine Ansicht die, daß die Luftfeuchtigkeit für das Ausschlüpfen normaler Jungen der meisten Arten durchaus nicht die große Rolle spielt, die man ihr bisher hat zuschreiben wollen. Der Grund des Absterbens im Ei muß ein ganz anderer sein.

Hiermit habe ich aber nicht verneinen wollen die von Ruß und anderen gemachte Erfahrung, daß übernormale Feuchtigkeit das Schlüpfen erleichtern kann, erkläre mir aber die Sache so: Sind die Jungen gesund und normal, sind die Schwankungen der Luftfeuchtigkeit (innerhalb mäßiger Grenzen) von geringer praktischer Bedeutung. Sind die Jungen aber aus irgendwelchem Grunde Schwächlinge, vermögen sie die Schlüpfungsarbeit nicht ohne Unterstützung auszuführen, so kann dabei übernormale Feuchtigkeit von erleichternder Bedeutung sein. Unsere tierzüchterische Arbeit muß indessen darauf zielen, dem Grund der Schwächlichkeit abzuhelfen, nicht aber Schwächlinge mit künstlichen Mitteln zu erziehen, und sicherlich wird uns sachliche Kooperation seitens hierfür ernstlich interessierter Vogelpfleger aller Länder schließlich zu dem Ziele führen, gleichzeitig wie auch ein auf diesem Gebiete nur nützlicher Internationalismus uns viel Doppelarbeit, viel sonst unnötigerweise aufgeopferte Zeit und Mühe ersparen will. Nur unter diesem Leitmotive sind vorausstehende Zeilen abgefaßt.

Stockholm, den 28. Mai 1924.

Neueinführungen und Seltenheiten.

Von Karl Neunzig.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Von Seltenheiten gelangte auf den Vogelmarkt, anscheinend aus Liebhaberhand, der Gelbsteißbülbül — Pycnonotus nigricans (*Vieill.*) (s. Abb. S. 173) aus Südafrika und mit einem der letzten nordostafrikanischen Importe der zum erstenmal eingeführte

Somalibülbül — Pycnonotus arsinoe somaliensis *Rchn.*,

der sich jetzt im Vogelhaus des Zoolog. Gartens in Berlin befindet. Seine Verbreitung erstreckt sich über das nördliche Somaliland.

Gefiederbeschreibung: Oberkopf, Kopfseiten, Kehle schwarz; das Schwarz der Kehle verläuft allmählich in das Erdbraun der Kropfgegend; hinter der Ohrgegend zuweilen ein kleiner weißer Fleck; übrige Oberseite fahl erdbraun, Schwingen dunkler, ebenso die Schwanzfedern; übriger Unterkörper bräunlichweiß, an den Seiten dunkler, Bauchmitte, Unterschwanzdecken weiß; Auge braun; Schnabel schwarz; Füße dunkelgrau.

Außer einer Beschreibung des Eies dieses Bülbüls in „Beiträge zur Vogelfauna Nordostafrikas" von v. Erlanger im J. f. O. 1905 finde ich in der Literatur keine biologischen Angaben über diesen Bülbül. Über das Leben und Treiben einer verwandten Form gibt Emin Pascha in seinem Tagebuch folgende hübsche Schilderung: „. . . er versteht es, sich bemerkbar zu machen; ist er doch ein ebenso fleißiger als tüchtiger Sänger, dessen laute und wohlklingende Sänge uns an die Drosseln erinnern. Stets in Bewegung, hüpft er im Gebüsch und niederen Bäumen, die er bevorzugt, gewandt umher, kommt auch wohl auf einen hervorragenden Ast, richtet die Kopffedern auf und schaut nach allen Seiten, dann kommt er zum Boden herab, läuft ganz geschickt umher und verschwindet bald wieder im Gebüsch. Dabei schweigt er nie, und man hört ihm die Sorglosigkeit am Sange an. Seine Nahrung besteht in allerlei Insekten, die auch im Fluge erhascht werden, Raupen und Ameisen. Auch ist er ein großer Freund von Früchten, besonders süßen, und besucht deshalb gern die süßen Limonen, Feigen, Ananasbüsche zur Zeit der Fruchtreife. Überhaupt bewohnt er gern die Gärten und bevorzugt hier wieder die dichtbelaubten Limonen- und Zitronenbäume. Er ist so wenig scheu, daß er bis dicht an die Hütten herankommt und sich ruhig beobachten läßt; trotzdem ist er vorsichtig und besonders zanksüchtig mit seinesgleichen, während der Nistzeit auch mit anderen Vögeln. Die Pärchen scheinen sich nie zu trennen und nisten zwischen Mai und Juli im Freien im dichsten Dorngebüsch von Akazien, besonders gern auf Zizyphus, in den Gärten, den Astgabeln der Limonenbäume, ziemlich niedrig über der Erde. Das Nest ist groß, halbkugelig, aus allerlei Wurzeln und Pflanzenstoffen dicht zusammengefügt, die Höhlung sehr nett und glatt mit Bastfasern ausgekleidet, . . . die Jungen werden noch, nachdem sie das Nest verlassen, für lange Zeit von den Eltern geführt, und man sieht dann häufig die kleinen Familien in den Gärten umherstreifen. Jung gefangen, lassen sie sich gut im Bauer halten und gefallen durch ihre Munterkeit und ihren Sang sowie durch das possierliche Aufrichten der Haube, wenn irgend etwas ihnen befremdlich erscheint. Schon ganz zeitig beim Morgengrauen beginnen sie zu singen. Bei dem geringen Interesse der Araber und Neger für die Vogelwelt denkt natürlich niemand daran, sie in Gefangenschaft zu halten." Was hier Emin von P. tricolor minor

Heugl. mitteilt, trifft im großen und ganzen auch auf die verwandten afrikanischen Formen zu.

Im Laufe des Juni traf ein größerer Import meist ostafrikanischer Vögel ein, die, soweit es Seltenheiten betrifft, jetzt Käfige des Vogelhauses des Berliner Zoologischen Gartens bewohnen. Unter diesen Ostafrikanern befinden sich auch zwei Raken, welche das erstemal nach Europa gelangten, die abessinische Gabelrake — Coracias caudata corti *Shell.* und die Strichelblaurake — Coracias naevius *Daud.* Raken sind unstete und unruhige Vögel, welche tagsüber von Baum zu Baum fliegend große Strecken durchstreifen. Mit Vorliebe sitzen sie in den Wipfeln der Bäume, besonders wenn diese ihnen dürre Äste bieten, die ihnen eine freie Umschau gestatten. Von hier aus jagen sie allerlei fliegende Kerfe, die ihre hauptsächlichste Nahrung bilden, aber nicht die alleinige. Wenn sie den Erdboden besuchen, nehmen sie alles, was da kreucht und fleucht, von Kerfen und deren Larven, bis zu jungen Vögeln und Eiern, manche verzehren auch kleine Schlangen und Eidechsen. Auch Früchte werden von vielen gefressen. So bevorzugt die abessinische Gabelrake besonders die von Feigenbäumen. Zum Aufenthalt wählen sie Waldlichtungen und freies Gelände. Böhm fand die Gabelrake auf Getreidefeldern, auf denen sie Jagd auf die zahlreichen Heuschrecken machte, welche die Felder verheeren. Raken sind unverträglich und zänkisch, stoßen auf kleine und große Vögel. Böhm sah die Gabelrake mit lautem Geschacker den Schmarotzermilan angreifen und besonders haßt sie die Kuckucke. Fleck teilt mit, daß sie sich mit Wut auf diese stürze. Selbst dann, wenn Fleck nur den Lockton eines Kuckucks nachahmte, kam sie taumelnden Fluges und kreischend herbei, um den vermeintlichen Kuckuck zu verjagen. Kleine Vögel, welche in ihren Bereich kommen, belästigen sie beständig. So sah Alexander, wie sie die geschlossenen Flüge von Webervögeln zerstreuten. Ihre Stimme ist rauh, krächzend und gellend. Zur Paarungszeit läßt das aufgeregte Männchen der Gabelrake laute, mißtönende Rufe hören, während es sich spielend in der Luft umhertummelt. Es erhebt sich schwankenden Fluges zu bedeutender Höhe, um dann plötzlich sich überstürzend niederzuschießen. Sie sind außerordentlich gewandte Flieger. „Ihr schöner Flug, der äußerst leicht und schnell die schönen Farben zur Geltung bringt" (Emin Pascha), entschädigt für ihr wenig liebenswürdiges Wesen.

Raken nisten in Baumhöhlen. Die Eier sind reinweiß und glänzend, ihre Form ist kurz eiförmig oder rundlich. Die Gattung der Raken — Coracias sind in etwa 15 Arten über das gemäßigte Europa un Asien, Indien, die Sundainseln und Afrika verbreitet.

Die abessinische Gabelrake — C. caudatus corti *Shell.*

ist in Größe und Färbung der typischen Form der Gabelrake (s. „Fremdl. Stubenvögel" S. 602 Abb. 289) sehr ähnlich, aber Kropf und Brustgegend zeigen die hellblaue Farbe des Unterkörpers, nur die Kehle ist veilchenrot. Ihre Verbreitung erstreckt sich von Somaliland und Schoa bis Witu.

Die Strichelblaurake C. naevius *Daud.*

gehört zu einer Gruppe von Blauraken, welche sich durch einen weißen Genickfleck auszeichnen. Ihr Verbreitungsgebiet erstreckt sich über Nordwest- und Nordostafrika. Nach Heuglin (Ornithologie Nordostafrikas) bewohnt sie meist waldige Gegenden. Sie führt ein einsameres, stilleres Leben als die Verwandten.

Gefiederbeschreibung: Kopf, Hals, Unterseite weinrötlich rostbraun, ins Veilchenfarbene ziehend, Wangen, Unterkörper weiß gestrichelt; breites Stirnband, Augenbrauenstreif, Fleck im Genick weiß, bläulich überhaucht; Kinn weiß, Federn des Oberkopfes im frischen Gefieder grünlich gespitzt; Rücken, Schultern bräunlich oliv; Bürzel veilchenrot; Oberschwanzdecken blau; Unterschwanzdecken veil-

Gelbsteißbülbül (s. S. 172).

chenfarben; Flügeldecke weinrötlich braun; Flügelrand und Hinterdeckfedern längs desselben blau, die vorderen veilchenfarben; Schwingen blau, Wurzel der Innenfahne heller, Spitzen der Handschwingen heller grünlichblau; Unterflügeldecken weiß; Schwanzfedern ultramarinblau, z. T. grünlich überflogen; Auge braun; Schnabel schwarz; Füße olivgrün; Lg. 310—340; Fl. 170—180; Schw. 135—150; Schn. 36—42; Lf. 25 mm.

(Fortsetzung folgt.)

Mein Werdegang als Kanarienzüchter. Kanarienvogel oder Grünfink? und der Kanarienvogel vor dreitausend Jahren.

Von W. Kluhs, Stettin.

(Schluß.) (Nachdruck verboten.)

Unsere Kanarienlieblinge stammen von den durch die Natur lieblich ausgestatteten Inseln des östlichen Afrika, einem jener Teile der Erdoberfläche, die sich unter den wärmenden Strahlen der südlichen Sonne mit ihrem vegetabilischen Leben zu einem Paradies gestaltet haben. Die bisherige älteste Nachricht

darüber gibt Dr. Conrad Geßners Vogelbuch, das 1557 bei Froschauer in Zürich erschien, und die ersten urkundlich nachgewiesenen Kanarienvögel in Deutschland waren diejenigen, die der Rat zu Bremen im Jahre 1609 der letzten Gräfin von Oldenburg verehrte. Alle Nachrichten, Urkunden und Überlieferungen weisen mit positiver, unzweifelhafter Bestimmtheit auf die Abstammung unseres deutschen Edelrollers von jenem Wildling von den Kanarischen Inseln hin.

Schon in den 70er und 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts hat man behaupten wollen, daß der bei uns eingebürgerte Kanarienvogel keineswegs wirklich von der auf jenen Inseln freilebenden Art herstamme, sondern daß er seinen Ursprung der fortgesetzten Vermischung einiger grüngelben, leicht zähmbaren, bei uns und in andern Weltteilen heimischen Finkenarten verdanke. Und nun ist plötzlich eine Broschüre erschienen unter dem Titel: „Kanarienvogel oder Grünfink?“, in welcher die Verfasserin, Fräulein W. Hartwig in Bremen, klipp und klar behauptet, alle Nachrichten über die Abstammung unseres Kanarienvogels von jenem Wildling der Kanarischen Inseln seien falsch, derselbe sei vielmehr ein Abstamm des deutschen Grünfinken.

Positive Beweise vermag Fräulein Hartwig nicht zu geben; ihre Beweisführung gleicht einem Kartenhaus, das beim Berühren zusammenstürzt. Unsere ganzen bisherigen geschichtlichen Unterlagen erklärt Fräulein Hartwig für Märchen. Insbesondere beruft Fräulein Hartwig sich auf jenen alten Bericht, nach welchem die Spanier den Handel mit Kanarienvögeln nahezu ein Jahrhundert hindurch dadurch ausschließlich für sich zu bewahren gewußt hätten, daß sie nur die Männchen ausgeführt, die Weibchen aber wohlweislich zurückgehalten hätten.

Warum glaubt Fräulein Hartwig nun diese Nachricht, da sie doch alle andern für Märchen ansieht? Gerade diese Nachricht ist am wenigsten glaubhaft bzw. bedarf der Einschränkung. Wir wissen genau, daß bei größeren Vogelmengen immer auch geschlechtlich zweifelhafte vorkommen, die uns längere Zeit in Ungewißheit darüber lassen, ob sie Männchen oder Weibchen seien. Auch in betrügerischer Absicht werden Weibchen für Männchen exportiert worden sein. Jedenfalls konnten die Spanier also die Ausfuhr von Weibchen schlechterdings nicht gänzlich verhindern, nur der Wunsch war der Vater des Gedankens.

Mit großem Interesse bin ich allen Ausführungen der Verfasserin gefolgt, und ich glaube ihr ohne weiteres, daß sie ihr Material mit Fleiß und großer Begeisterung zusammengetragen hat. Ich kann ihr auch versichern, daß ich der erste gewesen wäre, der ihr zur Seite gestanden, um die Sache zu verfechten, wenn sie mit beweiskräftigen Unterlagen hätte aufwarten können. Aber alles, was Fräulein Hartwig uns bietet, sind Redensarten, und zwar dieselben, die auch schon früher dieserhalb laut wurden.

Hätte Fräulein Hartwig ihre Ansichten in einer besonderen Abhandlung in einem Fachblatt kundgetan, so hätte sich dazu nichts sagen lassen, denn sie vertrat nur ihre Ansicht; aber ein Buch über diese Frage herauszugeben, bedeutet einen Aufwand und eine Ausgabeforderung für die Käufer und Leser, die durch den Erfolg des Buches in keiner Weise gerechtfertigt erscheinen.

Hätte Fräulein Hartwig recht, so hätten wir Kanarienzüchter es allerdings sehr leicht mit einer Blutauffrischung; wir könnten sie ja dann aus erster Hand haben. — Wie groß und kräftig müßten solche neu aufgekreuzten Kanarienvögel wohl ausfallen? — Aber hat Fräulein Hartwig auch daran gedacht, daß der Grünfink, dieser im Verhältnis zu Kanarien klotzige Vogel nur einen etwa halb so langen Schwanz hat? und an seine plumperen Bewegungen? — Auch die Beine des Grünfinken sind, im Hinblick auf seine kräftigere, gedrungenere Figur, kürzer als die des leichteren, schlankeren Kanarienvogels, und die Farbe des olivgrünen Grünfinken harmoniert mit der des grünen Kanarienvogels gar nicht. Es käme vor allen Dingen aber auch darauf an, ob Bastarde vom Grünfinken und Kanarienvogel unter sich fortpflanzungsfähig sein würden; soweit ich unterrichtet bin, ist das nicht der Fall. Ehe Fräulein Hartwig sich zur Herausgabe ihres Buches entschloß, hätte sie sich einen solchen wichtigen Beweis verschaffen bzw. sichern sollen. Wir besitzen bereits ein Buch: „Der wilde Kanarienvogel und seine Veredelung in der Gefangenschaft“ von Böcker. Der Verfasser war persönlich auf den Kanarischen Inseln und hat dort seine Beobachtungen und Studien gemacht; etwas glaubhafter lesen sich dessen Ausführungen allerdings doch als diejenigen von Fräulein Hartwig, die lediglich auf Kombination beruhen.

Braunrückenstrauchschmätzer (s. S. 176).

Der Reiz, der für uns in dem Entwicklungsgang unseres deutschen Kanariensängers liegt, ist so groß, daß seine Zucht, Pflege und Gesangsausbildung immer neue Freunde finden, die ihn wegen seiner phänomenalen Gesangserrungenschaften als ein kerndeutsches Produkt und Nationalgut betrachten. Was er uns Deutschen gilt, gilt er als Sänger. In diesem Sinne will es mir als fast belanglos erscheinen, ob dieses deutsche Gesangsprodukt aus dem Wildling oder aber aus einheimischen Finken schon vor Hunderten von Jahren herausgezüchtet und also geschaffen wurde.

Geschichtlich und wissenschaftlich ist der Kanarienvogel bisher seit 450—500 Jahren nachweisbar gewesen. Kürzlich aber fiel mir ein Buch in die Hände, nach welchem der wilde Kanarienvogel schon vor fast dreitausend Jahren entdeckt wurde, was bisher wohl gänzlich unbeachtet und unbekannt geblieben ist.

Es handelt sich um das Buch: „Abenteuer des Kapitäns Majo," eine phönikische Weltfahrt vor 2900 Jahren von Dr. Karl Oppel, Verlag und Druck von Otto Spamer in Leipzig. — Majo lebte zur Zeit des Königs Hiram I. von Tyrus (980 bis 947 vor Chr. Geb.) und war also ein Zeitgenosse der Könige David und Salomo und der Königin von Saba. Auf seiner großen Weltfahrt kam er auch nach der Heimat des Kanarienwildlings, die er „die glücklichen Inseln" nannte. In der 3. Aufl. dieses Buches Seite 247 heißt es wörtlich: „Vierzehn Tage lang lag ich an dieser Insel vor Anker, kaufte Gold ein und besserte meine Schiffe aus; aber wenn ich noch ein ganzes Vierteljahr hätte hier bleiben wollen, meine Gefährten wären es alle zufrieden gewesen; niemand verlangte hinweg. Dieses herrliche Land erzeugt auch die schönsten Früchte von der Welt. Die Täler sind mit hundertjährigen Apfelsinenbäumen bedeckt, auf welchen kleine Vögel mit gelblichem Gefieder herumflattern, deren Gesang uns entzückte. Bikri (der Name eines Schiffsgefährten des Kapitäns Majo), der ziemlich gleichgültig gegen das Gold wurde, nachdem er einmal genug hatte, seinen Köcher und sein Wehrgehänge damit zu schmücken, verbrachte seine Zeit mit Dionysos in den Wäldern, wo sie Tag für Tag umherstreiften. Er fing auch mehrere dieser Vögel und tat sie in einen Käfig, den er eigens für sie machte, aber sie sind während der Fahrt alle gestorben." —

Es unterliegt wohl keinem Zweifel, daß wir hierin nunmehr die älteste Nachricht über das Vorkommen der Ahnen unseres heutigen Kanarienvogels vor fast dreitausend Jahren vor uns haben.

Kleine Mitteilungen.

Nochmals die „Tarantinischen Zwergpapageien" Auf meine Notiz betreffs Hinfälligkeit der Tarantiner in Nr. 16 der „Gef. Welt" sind mir einige Zuschriften zugegangen, in welchen z. T. die Hinfälligkeit der Vögel bestritten wird. Auch ein mir befreundeter Berliner Händler, welcher augenblicklich im Besitz einer größeren Anzahl dieser Papageien ist, bestreitet entschieden die außergewöhnliche Hinfälligkeit der Vögel. Es liegt mir absolut fern, den Liebhabern ein für allemal abzuraten, diesen reizenden Sittich anzuschaffen, im Gegenteil. Nur ganz frisch eingeführte Vögel sind zu meiden. Sind sie erst 4—6 Wochen hier, so kann man den Kauf schon eher wagen, Bedingung ist jedoch, daß die Tiere volles und fleischiges Brustbein zeigen, normalen Kot haben und munter sind. Man gebe den Tieren in den ersten Wochen nur Hirse, Hafer und vor allen Dingen Glanz. Sonne und frische Luft sind Bedingung. Die Vögel nagen gerne frische Zweige, doch ist hierin vor einem Überfüttern zu warnen. In den ersten Wochen kein Eierbrot, keine frischen Puppen usw. reichen. Die Preise für diese reizenden Papageien sind stark gesunken, der März-Transport wurde noch mit 120 Mk. per Paar, der jetzige mit fast der Hälfte dieses Preises angeboten. Für uns Exotenliebhaber scheint überhaupt eine „goldene" Zeit anzubrechen. Von überallher treffen neue Transporte ein. Im März eine Invasion von Schamadrosseln und Graupapageien, Tausende und aber Tausende von Astrilden und Amandinen trafen in letzter Zeit ein. Alle Arten Nonnen, darunter auch die selteneren Weißkopfnonnen, Pfäffchen, Weber, seltene Finkenarten usw. Massenhafte Transporte von Sonnenvögeln trafen ein. Gestern besichtigte ich einen frisch angekommenen Transport (ca. 200—300 Paar) Goulds, rot- und schwarzköpfige, Spitzschwanzamandinen und Maskenastrilde. In den Berliner Handlungen sind noch rote Kardinäle, die seltenen Weißbauchsittiche, Tovisittiche, Tyrannen, Glanzstare, Molukkenkakadus, verschiedene Loris, Zwergaras, sogar die seltenen Glockenvögel, weißen Raben ähnelnd, kann man finden. Fast ganz verschwunden sind imp. Wellensittiche (warum?), alle Transporte waren junge Vögel, ferner Sing- und Nymphensittiche, Zebrafinken und jap. Mövchen. Wo bleiben die entzückenden Rußköpfchen? Wer in dieser Zeit das nötige „Gold" hat, kann seine Käfige schön wieder füllen.

S. Lichtenstaedt.

Blauwangenbartvogel (s. S. 176).

Sprechsaal.

(Steht den Abonnenten kostenlos zur Verfügung.)

Frage 12: Kann mir jemand aus dem Kreise der Leser der „Gef. Welt" eine Bezugsquelle für Kajennepfeffer zur Farbenfütterung der Kanarien nennen?

L. B., Crimmitschau.

Antwort.

Auf Frage 7: Neben den den Mövchen und Zebrafinken gereichten Sämereien und sonstigem Futter, also Hirse, am besten weiße und Senegalhirse, auch in Kolben, und Spitzsamen sowie Grünkraut, gibt man zur Aufzucht der Jungen, am besten schon einige Tage vor dem Schlüpfen, ein Eifuttergemisch, welches man zu gleichen Teilen aus gehacktem hartgekochten Ei und frischen bzw. gequollenen trockenen Ameisenpuppen herstellt. Vielfach wird auch ein Zusatz von geriebenem Eierbrot gereicht. Statt dessen kann man auch erweichtes, gut ausgedrücktes und zerkrümeltes Eierbrot darunter geben oder in besonderen Näpfchen reichen, ebenso können frische Ameisenpuppen besonders gereicht werden. Manche nehmen auch zerschnittene Mehlwürmer an. Halbreife Grasrispen werden gleichfalls gern angenommen. Bei der Darbietung des immerhin etwas feuchten Gemisches gebe man bei der leichten Verderblichkeit dieses in der wärmeren Jahreszeit immer nur in kleinen Mengen, die jedesmal frisch zurechtgemacht werden.

Fritz K., Karlsruhe.

Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber, Sitz Leipzig.

1. Die Prüfung unserer Satzungen ist durch das Amtsgericht erfolgt. Es machen sich einige Änderungen notwendig, die nicht unseren Zweck und unsere Ziele ändern, sondern nur Formsache sind, um dem Gesetze zu genügen. Zum Zwecke der Zustimmung wird die Urschrift der endgültigen Satzungen den Herren des Gesamtvorstandes übermittelt, unsere Mitglieder erhalten die Satzungen in Kürze zugestellt.

2. Die Angelegenheit mit unserer Austauschzentrale muß so lange vertagt werden, bis es uns gelungen ist, die geltenden Vogelschutzbestimmungen der einzelnen Länder, die im Buchhandel nicht mehr zu erhalten sind, zu verschaffen.

3. Wir müssen unbedingt Mitgliederlisten aller angeschlossenen Vereine haben. Unsere innere Organisation kann nicht eher beendet werden, bis diesem Ersuchen entsprochen worden ist. Die Herren Vorsitzenden der Landesverbände und Vereine werden dringend gebeten, um die Einsendung der Listen besorgt zu sein.

4. Der geschäftsführende Vorstand erachtet es für notwendig, zunächst jeden Monat eine Sitzung abzuhalten. Hierfür ist jeder zweite Mittwoch des Monats bestimmt. Der Ort der Zusammenkunft wechselt. Unsere Herren des Gesamtvorstandes, die auswärts wohnen und bei Gelegenheit ihrer Anwesenheit in Leipzig an den Sitzungen teilzunehmen wünschen, wollen sich der kleinen Mühe unterziehen und den jeweiligen Ort der Zusammenkunft beim 2. Schriftführer, Herrn Richard Vorwerk in Leipzig-Connewitz, Merveldstr. 39II (Telephon 12000) erfragen.

5. Die Anmeldungen von fünf Herren als Einzelmitglieder sind eingegangen. Die Aufnahme ist erfolgt.

6. Ein zur Anzeige gebrachter Fall von Übervorteilung beim Austausch wurde in der Weise geregelt, daß eine Warnung veröffentlicht worden ist.

7. Die Verbandsbeiträge sind fällig. Wir bitten um recht baldige Einsendung an unseren Kassierer Herrn W. Geßler, Leipzig, Dresdener Str. 2. Wir brauchen unbedingt und recht bald Mittel, um unsere Sache vorwärts zu bringen.

8. Ein weiterer Erfolg unserer Bitte um eine freiwillige Unterstützung ist die freundliche Zusage der Firma Gustav Wenzel & Sohn in Braunschweig, uns 1500 Stück unserer Satzungen unentgeltlich zu liefern. Wir danken recht vielmals für das freundliche Anerbieten, durch das uns erspart wird, ein Loch in unseren recht schwachen Verbandssäckel zu machen. Ein anderer Herr, Herr Max Chlodeck, Leipzig, hat uns Kassenbücher unentgeltlich überlassen. Auch ihm besten Dank.

Der Vorstand. J. A.: Petters, 1. Schriftführer.

Vom Vogelmarkt.

Von seltener auf den Vogelmarkt kommenden Vögeln werden angeboten:

G. Behnke, Zoologische Handlung, Berlin O 34, Petersburger Str. 29: Graupapagei, Blaustirnamazonen, Sperlingspapageien, Wellensittiche, gelbe Schamadrosseln.

Friedrich Frank, München, Gabelsbergerstraße 9 (Anfragen Rückporto beifügen): Schamadrosseln, Klarinos, Rote Kardinäle, Purpurtangare, div. Trupiale, Orangeblaufinken, Papstfinken, Mexikan. Zeisige, Meerbl. Tangaren, Trauertangaren, Dominikanerkardinäle, Amerik. Wanderdrosseln, Weißstirnpfäffchen, Weißkehlpfäffchen, Mexik. Karmingimpel, Gelbe Wellensittiche, Jap. Mövchen, Safran- u. gr. Reisfinken, Elfenbeinsittiche.

Joh. Götz, Südd. Vogelexporthaus, Neu-Ulm (Bayern): Veilchenpapageien, Blaubartamazonen, Blaustirnamazonen, tarant. Unzertrennliche, Sperlingspapageien, Tovisittiche, Elfenbeinsittiche, Mönchsittiche, Tuiparasittiche, Klarinos, Schamadrosseln (Männchen und Weibchen), amerikan. Spottdrosseln, Kaprötel, peruan. Grünhäher, schwarzkäpp. Blauhäher, langschwänzige Glanzstare, abessin. Glanzstare, Prachtglanzstare (dreifarbig), Soldatenstare, Purpur-, blaue und Palmtangaren, Spiegel-, Garten-, Gelbschulter-, schwarzkehlige und braunköpfige Trupiale, Rotschopfbülbüls, Gangesbrillenvögel, Dominikaner und rote Kardinäle, blaue mexikan. Kernbeißer, südafrikan. Grüngimpel, südafrikan. Angolagirlitze, Karmingimpel, Orangeblaufinken, Papstfinken, mexikan. Zeisige, Lerchenammern, Hahnschweifwitwen, Schnurrbärtchen, Rotkopfamandinen, Safranfinken, Weißkopfviehweber, Oryx- und Flammenweber, Napoleons- und Feuerweber, Blutschnabel- und Gilbweber, hochrote Amaranten.

Oscar Haas, Fabrikant, Lauterbach (Württ.), „Villa Bergfried" (A. Z.-Mitgl. 11): 1,1 japan. Mövchen (braunweiß).

S. Lichtenstaedt, Berlin-Johannisthal, Nieberstr. 10: 2,1 Schamadrosseln.

E. Schöndube, Berlin O, Elisabethkirchstr. 1: Roter Kardinal, Chin. Nachtigall, Kl. Alexandersittiche, Rotr. Goldsperling, Weißscheitelpfäffchen, Zwergkappenweber, Weißwangenlerche, Mossambikzeisig, Schwarzkopfnonnen, Blaue Reisfinken.

E. Stümcke, Vegesack (Bremen) (A. Z.-Mitgl. 258): 1,1 Glanzstare, 1,1 Zwergtäubchen (Stargröße), 0,1 Safranfink.

Paul Tzornack, Berlin, Prenzlauer Allee 189 (Tel. Humboldt 2063): Blaustirnamazone, tarantinische Unzertrennliche, Trovisittiche, Goldstirnsittiche, Weißbauchpapageien, Gelbmantellori, großer Gelbhaubenkakadu, blaubürzl. Sperlingspapageien, rotbürzl. oder rotrück. Amazone, mexik. Grünhäher, rote Kardinäle (Männchen), Dominikaner Kardinäle, Papstfinken, Orange-Blaufinken, chin. Nachtigallen, Soldatenstare, Reisfinken (grau), Bronzemännchen, Mossambikzeisige, kleine Elsterchen, Schuppentäubchen.

Emmy Voß, Cöln, Merlostr. 23: kleiner w. Gelbhaubenkakadu.



Herrn E. St., Flensburg. Die in einem der vorhergehenden Hefte aus Liebhaberhand angebotenen Vögel, den aus Indien zuweilen eingeführten Blauwangenbartvogel — Cyanops asiatica *(Lath.)* und den Braunrückenstrauchschmätzer — Thamnobia cambaiensis *(Lath.)* zeigen die Abb. S. 175 u. 174. Letzterer ist oberseits erdbraun, Oberschwanzdecken und Unterseiten sind glänzend schwarzblau, hintere Bauchgegend, Unterschwanzdecken leuchtend kastanienbraun. Er ist in Indien ein gemeiner Vogel. Der Bartvogel ist grün, Stirn, Scheitel und Flecken auf der Seite sind rot, über dem Scheitel eine schwarze Binde, welche sich über die Ohrdecke hinzieht.

Herrn R. E., München, Herrn W., Merzig, Herrn Sch., Berlin, Herrn S. L., Berlin-Johannisthal. Beiträge dankend erhalten.

(Fortsetzung auf der 3. Umschlagseite.)

Aus den Vereinen.

Verein Vogelschutz und -pflege zu Dresden. Versammlung jeden Donnerstag, abends 8 Uhr, im Vereinslokal, „Schillers Restaurant", Ecke Stifts- und Ehrlichstraße. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen.

Bernhard Kühn, Vorsitzender.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei zu Hamburg. Sitzungen finden statt jeden 1. und 3. Dienstag im Monat in Hüttmanns Hotel, Poolstr. 22, abends 8¼ Uhr. Nächste Sitzung Dienstag, den 5. August 1924.

J. A.: Arnold Weber, 1. Vorsitzender.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig. Vereinssitzungen jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat im Vereinslokal, „Bauers Brauereirestaurant", Täubchenweg. Nächste Sitzung am 17. Juli 1924. Gäste stets willkommen. J. A.: Johann Birk, 1. Vorsitzender.

Verein der Vogelfreunde Leipzig-Plagwitz. Vereinslokal: „Gosenschlößchen", Leipzig-Plagwitz. Sitzungen an jedem 1. und 3. Montag des Monats, abends 8 Uhr. Vogelfreunde sind stets willkommen.

J. A.: Karl Scholtissek, 1. Vorsitzender, Leipzig-Plagwitz, Lauchstädter Straße 30.

Gartenbau-Bücherei

Herausgegeben von

Prof. **Dr. Udo Dammer**, Kustos des Botanischen Gartens Berlin-Dahlem.

Jeder Band 1.20 M.

Bd. 1. **Monatskalender des Pflanzen- und Gartenfreundes.** Von Prof. Dr. Dammer. 2. Auflage.

Bd. 2. **Zimmerblattpflanzen.** Von Prof. Dr. Dammer. 2. Auflage. Mit 48 Abbildungen.

Bd. 3. **Gewürzkräuter.** Von Obergärtner Bode. Mit 6 Abb.

Bd. 4. **Balkonpflanzen.** Von Prof. Dr. Dammer. 2. Auflage. Mit 41 Abbildungen.

Bd. 5. **Zimmerblütenpflanzen.** Von Prof. Dr. Dammer. 2. Auflage. Mit 23 Abbildungen.

Bd. 6. **Die ein- und zweijährigen Gartenpflanzen.** Von Gartenbaudirektor Goeschke. Zurzeit nicht lieferbar!

Bd. 7. **Der Gartenrasen.** Von Obergärtner Bode. Mit 14 Abb.

Bd. 8. **Die Farnpflanzen unserer Gärten.** Von Inspektor Mönkemeyer. Mit 15 Abbildungen.

Bd. 9. **Der Zwergobstbau.** Von Gartenbaudirektor Koopmann. Mit 6 Abbildungen. Zurzeit nicht lieferbar!

Bd. 10. **Die Standengewächse.** Von Gartenbaudirektor Goeschke. Mit 35 Abbildungen.

Bd. 11. **Gemüsebau auf Gartenbeeten.** III. Teil. Von Gartenbauinspektor Lindemuth. Mit 20 Abbildungen. Vergriffen.

Bd. 12. **Pfirsiche und Aprikosen.** Von Obergärtner Kotelmann. Mit 13 Abbildungen.

Bd. 13. **Schönblühende Zwiebelgewächse.** Von Gartenbauinspektor Lindemuth. Mit 30 Abbildungen.

Bd. 14. **Blütensträucher.** Von Gartenbaudirektor Goeschke. Mit 28 Abbildungen.

Bd. 15. **Gemüsebau auf Gartenbeeten.** I. Teil. Von Gartenbauinspektor Lindemuth. Mit 22 Abbildungen.

Bd. 16. **Die Beerensträucher.** Von Gartenbauinspektor Maurer. 2. Auflage. Mit 14 Abbildungen.

Bd. 17. **Bunte Gehölze.** Von Gartenbaudirektor Goeschke. Mit 1 Tafel.

Bd. 18. **Gemüsebau auf Gartenbeeten.** II. Teil. Von Gartenbauinspektor Lindemuth. Mit 22 Abbildungen.

Bd. 19. **Gurke, Melone, Kürbis.** Von Inspektor Lange. Mit 15 Abbildungen.

Bd. 20. **Der kleine Villengarten.** Von Gartenarchitekt Pfyffer v. Altishofen. Mit 20 Abbildungen und 3 Tafeln.

Bd. 21. **Das Mistbeet.** Von Obergärtner Bode. Mit 5 Abbildungen.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg / Postschließfach 148

Von folgenden **Farbentafeln** der **„Gefiederten Welt"** sind noch einige Exemplare vorrätig, welche wir, solange der geringe Vorrat reicht, zum Preise von **1 G.-M. für die Tafel** zuzügl. **20 G.-Pf.** Porto u. Verpackung **für jede Sendung** bei vorheriger Einsendung des Betrages auf unser Postscheckkonto **Magdeburg 3148** abgeben.

1898 Tafel III: Schwarzspecht. (Schwarzdrucktafel.)
1899 Tafel IV: Nest des Gartenrotschwänzchens mit Weibchen, Jungem und Ei. (Schwarzdruck.)
1900 Tafel I: Madagaskar-, Napoleons-, dottergelber, Samt-, Blutschnabelweber.
1900 Tafel II: Kl. Alexander-, Bunt-, Wellensittich, Rosenpapagei, kl. Gelbhaubenkakadu.
1900 Tafel III: Sonnenvogel, blauer Hüttensänger, Rosenstar, Schamadrossel, weißohriger Bülbül.
1900 Tafel IV: Paradieswitwe, Mozambikzeisig, Grauer Kardinal, Safranfink, Papstfink.
1901 Tafel III: Kleinspecht, Kleiber, Wendehals.
1902 Tafel I Kohl-, Schwanz-, Hauben-, Tannenmeise.
1902 Tafel II: Goldammer, Baumpieper, Feldlerche.
1902 Tafel IV: Diamant-, weißbäckige Gürtel-, Masken-, Gürtelamandine.
1903 Tafel I: Hausrotschwanz, Sprosser, Nachtigall, Rotkehlchen.
1903 Tafel II: Bluthänfling, Grünling, Kernbeißer, Buchfink.
1903 Tafel III: Mistel-, Wacholder-, Wein-, Singdrossel.
1903 Tafel IV: Zwergstrandläufer, Wachtel, weißflüglige Seeschwalbe, Sandregenpfeifer.
1904 Tafel I: Zaun-, Garten-, Dorn-, Mönchgrasmücke.
1904 Tafel II: Schneefink, Steindrossel, Alpenbraunelle, Steinsperling.
1904 Tafel III: Binden-, Kiefern-, Fichtenkreuzschnabel.
1904 Tafel IV: Bartmeise, Rohrammer, weiße Bachstelze, Sumpfrohrsänger.
1905 Tafel I: Schwarzbürzel-, Spitzschwanzbronzemännchen, weißes, gelbbuntes, braunbuntes jap. Möwchen.
1905 Tafel II: Grau-, Orange-, Erz- und Schmuckpfäffchen.
1905 Tafel IV: Schwarzkehl-, Dreifarben-, Weißkopf- u. Schwarzkopfnonne.
1906 Tafel II: Lein-, Erlenzeisig, Berghänfling, Stieglitz.
1906 Tafel III: Stein-, braunkehliger und schwarzkehliger Wiesenschmätzer.
1907 Tafel II: Weißsterniges, rotsterniges, Wolfsches Blaukehlchen, Blaukehlchen ♀.
1907 Tafel III: Kleines, Zwerg-, Glanz-, Riesen-, rotrückiges und Gitterflügel-Elsterchen.
1907 Tafel IV: Karmin- und Hakengimpel, Gimpel.
1908 Tafel II: Braunrückengold- ♂ ♀, Schwarzkopf- und Goldsperling ♂ ♀.
1908 Tafel IV: Pünktchenastrild, Amarant ♂ ♀, dunkelroter Astrild, Tigerfink ♂ ♀.
1909 Tafel I: Orangegesichtiger Unzertrennlicher, Rosenpapagei, Rußköpfchen, Tarantinischer Unzertrennlicher, Grauköpfchen.
1909 Tafel II: Klarinetten- u. Mennigvogel, braunkehliger Blauschnäpper.
1909 Tafel III: Schwarzbäckchen-, Elsen-, Bunt- und Granatastrild, gemalter Astrild.
1909 Tafel IV: Orange-, Rotkopf-, Blutschnabel-, Napoleons- und Madagaskarweber.
1910 Tafel I: Grauer, Trauer-, Halsband-, Zwergfliegenschnäpper.
1910 Tafel IV: Zipp-, Garten-, Zaun-, Kappenammer.
1911 Tafel I: Rotrücken-, Raub-, Schwarzstirn-, Rotkopfwürger.
1911 Tafel II: Zeresastrild, Malabarfasänchen, Muskatfink, Silberschnäbelchen.
1911 Tafel III: Gartensänger, Fitislaub-, Weidenlaub- u. Waldlaubvogel.
1911 Tafel IV: Goldköpfiges ♂ ♀, feuerköpfiges Goldhähnchen, Zaunkönig.
1912 Tafel II: Wieners, Aurora-, Tropfen-, Wachtel- und Rebhuhnastrild.
1912 Tafel III: Magellan-, Kapuzen-, mexikanischer, Yarells und Trauerzeisig.
1912 Tafel IV: Dorn-, Sonnen- Binsen- und Gitterflügelastrild, Zebrafink.
1913 Tafel II: Violettblauer u. Rotbauchorganist, Purpur-, Dreifarben- und schwarzblaue Tangare.
1913 Tafel III: Paradies-, Dominikaner-, Königs-, Fischers, Rotscheitel- und Gelbrückenwidafink.
1913 Tafel IV: Goldschulter-, Fein-, Sing-, Browns Singsittich.
1914 Tafel I: Schwarzkopf-, Rosenbrust- u. mexik. Gelbkernbeißer, dunkelblauer Bischof, roter Kardinal.
1914 Tafel III: Diuka-, Grau-, Kron- u. Morgenammerfink, Graukardinal.
1914 Tafel IV: Pikui-, Kap-, Diamant-, Tamborin- u. Friedenstäubchen, chinesische Zwergwachtel.
1915 Tafel I: Sammetköpfchen, Sperber-, Orpheus- und Bartgrasmücke.
1915 Tafel III: Diamantfink-, Masken-, Weißwangen- und Spitzschwanzamandine, Gürtelgrasfink.
1915 Tafel IV: Star, Pirol, Rosenstar.
1920 Tafel I: Nandy-, Jendaja-, Guajakil- und Goldstirnsittich.
1920 Tafel II: Schuppenköpfchen, Schnurrbärtchen, dottergelber, Zwergmasken- und Textorweber.
1920 Tafel III: Tui-, Ziegen-, Mönch-, Tuipara- u. Katharinasittich.
1920 Tafel IV: Reisfink, weißer Reisfink.
1921 Tafel I: Gelber Wellensittich und Wellensittich.
1921 Tafel II: Kleiner Gelbhaubenkakadu.
1921 Tafel III: Kleiner Alexandersittich.
1921 Tafel IV: Domingo-, Cuba- und Rotbugamazone.

Da die Nachfrage nach Farbentafeln sehr groß ist, bitten wir sofort zu bestellen.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg / Postschließfach 148

Anzeigenteil

Die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 20 G.-Pf. berechnet. Aufnahme erfolgt gegen Voreinsendung des Betrages in Reichsgeld Brief od. auf unseren Zahlstellen: Postscheckkonto: Magdeburg 3148, Wien 156 687, Bern III 4326, Prag: Creditanstalt d. Deutschen unter Angabe des Zweck

Käfige u. Gerätschaften

Flugkäfige

1,30—1,55 m breit, 60—75 cm tief, 80—90 cm hoch, für 70 M. **J. Stenger,** München, Türkenstraße 53. [538

Weichfresser-Voliere,

3teilig, 1,80 m hoch, 70×45×57 cm jede Abteilung, prachtvoller Zimmerschmuck und praktische Inneneinrichtung, Kerbschnitzerei, preiswert zu verkaufen.

Georg Horn, Meiningen (Thür.), Anton-Ulrich-Straße 26, I. [539

Futtermittel

Vogelfutter [540

für Kanarien, Waldvögel, Exoten, Papageien, Weichfresser. Anfragen nur gegen Rückporto. Liste 18 über Vogelfutter, Liste 5 über Vogelkäfige, Zuchtgeräte usw. mit etwa 400 Abbild.

W. Göpel, Leipzig,
Tröndlinring 1. Telephon 14958.

Ornis-Haus
Halle-Saale

Gegründet 1912

Spezialität:
Individuelle Weichfresserpflege nach Angaben des Herrn Apotheker Adalbert Jena-Biberach-Riß. (Alleiniges Herstellungsrecht.)

Reform-Normal I, Volierenm.,
Reform-Normal II, f. Rotkehlchen, Schwarzplatten usw.,
Reform-Normal III, f. Nachtigall., Sprosser usw.,
Reform-Normal IV, f. Gelbspött., Goldhähnchen usw.,
Reform-Normal V, f. Schama usw.,
Körnerfutter Ia für jede Vogelart. [541

Inhaber langjähriger Fachmann, siehe „Ornis-Buch" (90 S.) Mk. 1
Preisliste auf Wunsch!

Mehlwürmer neue, feinste Qualität, Pfd. 8 M
542] **Jeltner, Breslau,** Weinstr. 12.

Mehlwürmer

geg. Einsend. v. 2.— Rentenmark 1/4 Pfd. franko versend. **D. Waschinski & Co.,** Biesenthal I (Mark). [543

Vögel

Gebe ab:

40 Stück **grüne Wellensittiche** (Jungtiere), darunter auch einige gelbe, in Freivoliere gezüchtet von importierten Eltern, daher bes. kräftig, pro Stück 8 M. Porto und Verpackung Selbstkostenpreis. [544

R. Huth, Perleberg.

Rotkehlchen Ia.

Gebe in Tausch garant. ganz laut. unermüdl. Wipfelsänger. **J. Decker, Bremen,** Finkenau 125. [545

Aus unsern Freiflugräumen geben wir teils jetzt, teils im Laufe des Sommers nach beendeter Ausfärbung ab: [546

Farben-Wellensittiche,

blau, blaublütig, maigrün (jadefarbig), orangegelb, hellgelb, olivenfarbig und satinglänzend. Ferner an Prachtfinken: **Masken- und Rotkopf-Amandinen, Spitzschwänze, Zebrafinken, Schnurrbärtchen.**

Stefani u. Sohn, Neuß a. Rhein.

Verkaufe

je 1 Paar Feuerweber, Blutschnabelweber, Silberschnäbel, Bandfinken, Grauastrilde, Paradieswitwen à Paar 3.20 M, Grauedelsänger, Ruß-, Gilb- u. Flammenweber à Paar 5 M, Tigerfinken, Dom. Witwen, Reisfinken à P. 6.50 M, Oryxweber, brasil. Kurzschnabelgirlitze à P. 10 M, Mossambikzeisige à P. 9 M, chin. Nachtigall, Grassittiche à P. 12 M, Sperlingspapageien à P. 15 M, kalif. Schopfwachteln à P. 45 M, 1,0 Zebrafink 5 M, 2,0 Mövchen à 5 M, alles gut eingew. richtige Paare, tadellos befiedert. Alle zusammen 175 M. Bei Voreinsendung des Betrages sende alle zusammen franko inkl. Verpackung. [547

Fritz Waentig, Meißen,
Hafenstr. 43. A. Z.-Mitgl. 105.

Aus Freivoliere gebe ich wegen Blutauffrischung ab: [548

0,1 und 4 junge gr. Wellensittiche à 10 M und 3 junge gelbe à 11 M.
Suche 0,1 Dompfaff.

Erich Wiechmann, Stralsund,
Frankendamm 38. A. Z.-Mtgl. 134.

Beschwerden wegen Nichtzustellung der „Gefiederten Welt" sind beim zuständigen Postamt anzubringen.

Bitte!

In eigenem Interesse wollen die pp. Einsender beachten, daß

a) **alle für die Redaktion** der „Gefiederten Welt" bestimmten **Zuschriften** (Sprechsaal-Anfragen und -Antworten, Vereinsnachrichten usw.) und **Sendungen** (tote Vögel, Manuskripte) nur an **Herrn Karl Neunzig, Hermsdorf bei Berlin,** Neue Btsmarckstr.,

b) **alle Bestellungen** auf **Abonnements,** auch vom Ausland, **nur durch die Post,**

c) **Inserate** und dergl. Geschäftliches nur an die **Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg,** Postschließfach 148,

zu richten sind.

Bestellungen für August sofort der Post übergeben!
Bestellzettel für Deutschland.

Postbestellzettel.

Hiermit bestelle ich für den Monat **August 1924**

1 „Die Gefiederte Welt"
(eventuell mit Nachlieferung). — Erscheinungsort Burg Bz. Mgdb.

Name: .....

Wohnung: .....

Postquittung: .....Mk. .....Pf. sind heute bezahlt worden.

Ort: ..... den .....

Postannahme

.....

Vertausche

rhein. Nachtigall, 23er Wildfa Ia Sänger, zahm und schön befied gegen Kanarienhahn oder Exoten.
M. Diwersy, Merzig (Saar). A. Z.-Mtgl. 183. [

Schamadrosseln,

ausgesuchte Ia Sänger, 55 M, Sil ohrsonnenvögel Zuchtpaar 60 M.
Pichler, Wien III,
Klimschgasse 18. [

Goldhase, zahm. g. Geb., zahm, G nack, vielsprech. 200 M, Blaust amazonen, zahm 35 M, dito sprechend u. 100 M, Weißhaubenkakadu, taub zahm, 80 M, 1,0 Safranfink 10 M, Mossambikzeisig, fl. Säng., 30 M. [
Fluck, Bremen, Knoopstr. 39.

Für Kanarienzüchte

Soeben erschienen:

Die Farben- und Gestal kanarien

nebst Beschreibung aller v schied. Kanarienrassen, de Entstehung, Form- u. Farb veränderung, Bastardzuch Farbenfütterung v. A. Asch brenner. Mit vielen sti haltigen Abb. Kart. 1.75

Wichtig zur Zucht:

Der Kanarienvogel,

seine Naturgeschichte, Pfl u. Zucht von Dr. Karl Ru 14. Auflage. Mit 2 Farb tafeln und zahlreichen Te abbildungen. Bearbeitet v Karl Neunzig.
Kart. 2.50

Die Bastardkanarienvog zucht,

Von Walter Barth. A 20 Abbildungen und 1 T drucktafel. 1.50

Der Kanariengesang.

Allgemeinverständliche so musikalische und phoneti Darstellung von W. Klu 1.00

Zu beziehen durch:

Creutz'sche Verlagsbu handlung, Magdebur
Postschließfach 148.

Inserate

für das am 24. Juli 1924 zur A gabe gelangende Heft 23 der Welt erbitten bis 19. Juli 1924

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Berlin-Hermsdorf; für den Anzeigenteil: Rolf Kretschmann, Magdeburg, Postschließfach 148.
Verlag der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck: August Hopfer, Burg Bz. Mgdbg.

Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Jahrg. 53 | Den 24. Juli 1924 | Heft 23

(Druckort: Burg, Bezirk Magdeburg.)

Unglaublich, aber wahr!

Von Rudolf Engel.

(Nachdruck verboten.)

Das größte Blatt Bayerns, die „Münchner Neueste Nachrichten", schreibt in einem Feuilletonartikel, betitelt „Abendgewitter im bayerischen Wald": „. . . Papstfinken, Weber und Schönbürzel treiben auf naher Lichtung ihr nachmittägiges Spiel . . . und dann sehe ich ein Mädchen am offenen Morgenfenster stehen und dem morgendlichen Schlag der Bandfinken, dem frühen Orchester in den Brombeergesträuchen und Krannewitbüschen lauschen . . .".

Also Papstfinken, Schönbürzel, Weber und Bandfinken im bayerischen Wald! Ausgerechnet in den durch sein rauhes Klima bekannten bayerischen Wald sind sie von ihrer tropischen Heimat geflogen und haben sich dort häuslich niedergelassen. Hoffentlich werden diesem Beispiel auch noch alle anderen ausländischen Vögel folgen und im bayerischen Wald singen, spielen und lustig sein. Wohl schöne Zeiten sind angebrochen für euch, all ihr Vogelliebhaber! Ihr müßt nun nicht mehr auf Schiffstransporte warten und von Einfuhrfirmen die von langer Seereise abgematteten und zum Teil kranken Vögel um teures Geld erstehen, ihr könnt sie vom bayerischen Wald, frisch vom Fang weg, beziehen und, was die Hauptsache ist, alle Akklimatisationsarbeiten und Einfütterungsversuche fallen weg, denn die Vögel haben sich ja schon an das deutsche Klima und an deutsches Futter gewöhnt. Werden da nicht goldene Zeiten für Vogelliebhaber kommen? Es wirkt wirklich erheiternd für uns Vogelliebhaber, hie und da eine solche Zeitungsweisheit zu lesen, wenn dabei nur nicht auch eine recht große, dunkle Schattenseite bestünde, eine betrübende Tatsache festgestellt werden müßte, die einem so recht zum Bewußtsein bringt, wie wenig bis heute die Kenntnis unserer deutschen Vogelwelt ins Volk gedrungen ist, wie wenig die Vogelkunde auch unter Gebildeten verbreitet ist, wenn sogar Schriftsteller in bedeutenden, führenden, die Volksaufklärung fördern wollenden Zeitungen solche Ungereimtheiten verzapfen zu dürfen glauben, müssen solche Ausführungen nicht geradezu verführend auf das ganze Publikum wirken, das natürlich noch weniger Kenntnis von der heimischen Vogelwelt hat als die gebildeten Herren Zeitungsschreiber und deswegen alles glaubt, was ihm von diesen allwissenden, d. h. alles wissen wollenden Journalisten vorgesetzt wird, was sie in irgendeiner Kaffeehausecke ausgebrütet haben, und das sie für frische, selbstgemachte Naturerlebnisse ausgeben.

Aber noch eine andere beklagenswerte Tatsache wird hier plötzlich wieder einmal in grelles Licht gerückt. Jeder Vogelschützler, der dies nicht nur mit dem guten Willen, sondern auch mit Sachkenntnis ist, hält an dem nun einmal unverrückbaren Standpunkt fest, daß nur der wirksamen Vogelschutz ausüben kann, der die Vogelwelt in ihrem Wesen und Treiben und all ihren Bedürfnissen kennt, und lehnt alle anderen Behelfe, mögen sie in Wort, Schrift oder anderen Maßnahmen bestehen, die diesen Standpunkt nicht teilen, als von geringer Bedeutung ab. Welch geradezu erschreckendes Bild tut sich durch einen solchen Zeitungsartikel vor unseren Augen auf, welcher Abgrund von Unkenntnis zeigt sich uns da. Nicht einmal dem Namen nach kennt man, wie solche Zeitungsergüsse zeigen, unsere heimische Vogelwelt. Wie mag es da mit dem Vogelschutz bestellt sein? Mit dem von gewissen Seiten so gerühmten und verhätschelten bayerischen Vogelschutz!

Weil für Bayern die im deutschen Reichsvogelschutzgesetz vorgesehenen Maßnahmen nicht genügten, hat es sich am 5. Mai 1913 eine eigene königliche Verordnung zum Schutze der Vögel geschaffen, die weit über das Reichsgesetz hinausgeht, und zwar so, daß das Halten einheimischer Vögel fast völlig unterbunden ist. Es ist aber eine allbekannte Tatsache, daß mit der Unterdrückung der Vogelliebhaberei auch das Interesse an der Vogelwelt und mit dieser die Kenntnis und dadurch auch der wirksame Vogelschutz erstickt wird. Braucht man sich da zu wundern, wenn solche sensationelle Zeitungsnachrichten unwidersprochen erscheinen können? Braucht man sich da zu wundern, daß Vogelschutzbücher, von staatlichen Organen verfaßt, mit dem berührten Zeitungsartikel auf gleicher Stufe stehen und deshalb gleiche Wertung erfahren müssen, weil sie in ihrer Befangenheit bei Aufzählung der zu schützenden und nicht zu schützenden einheimischen Vögel gar nicht alle nicht einmal dem Namen nach kennen, andererseits aber in ihrem blinden Eifer und Wüten gegen jede Vogelliebhaberei es fertig gebracht haben, daß durch oben erwähnte Verordnung Vögel unter gesetzlichen Schutz genommen werden, die in Bayern gar nicht vorkommen

und deren Fang unter Geldstrafe und bei Wiederholung unter schwere Freiheitsstrafen gestellt ist. Wer lacht da? So man das am grünen Holze tut, was soll aus dem dürren werden?

Wir Bayern hoffen, daß auch bei uns der Grundsatz zur Geltung kommt, „gleiches Recht für alle", und daß wir in bezug auf Vogelliebhaberei recht bald unsern übrigen deutschen Brüdern gleichgestellt werden.

Neueinführungen und Seltenheiten.

Von Karl Neunzig.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Ausländische Raken werden kaum in die Käfige der Liebhaber gelangen. Es wäre diesen unruhigen Vögeln ein möglichst großer Raum zu geben, damit sie das schöne Gefieder nicht beschädigen. In Käfigen gehaltenen müßte häufig freies Umherfliegen im Zimmer gewährt werden. Der Käfig müßte mindestens 1 m lang, entsprechend hoch und tief sein. Zwei dickere Sitzstangen würden genügen. Da Raken gern Sandbäder nehmen, wäre der Käfigboden dick mit Sand zu belegen. Die Ernährung müßte in Darbietung möglichst reichlicher Mengen lebender Insekten und eines hauptsächlich fleischliche Bestandteile enthaltenden Futtergemisches bestehen. Wenn möglich, wären ab und zu junge frisch getötete Mäuse, ein junger Sperling oder dergleichen zu reichen. Zu versuchen ist auch, ob Obst angenommen wird.

Graf Zedlitz (J. f. O. 1910) fand diese Rake auf einem eng begrenzten Raum seines Forschungsgebietes am Nordabhang eines Plateaus. Dort lebt sie keineswegs als Waldvogel, wie Heuglin berichtet, sondern hält sich „im kahlen, steinigen Gelände, wo hier und da ein riesiger Baobab zwischen Felspyramiden seine nackten Äste ausbreitet und an Gebirgsbächen ein wilder Feigenbaum als einzige Oase in der Steinwüste grünt", ein Gelände, das auch für verschiedene andere Gebirge bewohnende Vögel typisch ist. „Dort sitzt auch unsere violette Rake auf freier Warte, steif aufgerichtet und unbeweglich oft viertelstundenlang. Wiederholt sah ich mehrere beisammen, auch einzelne Paare sich spielend jagen, doch konnte ich von Brüten noch nichts feststellen. Bei der ausgesprochenen Vorliebe, welche der Vogel für den Baobab zeigt, glaube ich, daß er die in diesem sich zahlreich bietenden Höhlen zum Nisten benützen wird." Die Brutzeit in dieser Region dürfte in den Sommer fallen.

Unter der Bezeichnung „Rüppells Ammerfink" befindet sich im Vogelhaus ein zu der Gruppe Graugirlitz — Poliospiza gehöriger bescheiden gefärbter Vogel

Rüppells Graugirlitz — Poliospiza tristriata *(Rüpp.)*

aus Nordostafrika, gleichfalls eine neueingeführte Form. Die Verbreitung dieses Graugirlitzes erstreckt sich über Nordostafrika, von Bogos bis Schoa und zu den Gallaländern. Heuglin sagt von ihm (J. f. O. 1868), daß er ein ziemlich häufiger Gebirgsvogel sei und in Höhen von 400—11000 Fuß Meereshöhe auf Hecken, Juniperusbäumen und Felsen, gewöhnlich paarweise, vor der Regenzeit auch in größeren Trupps beobachtet sei. Die Stimme habe etwas Sperlingsartiges. Heuglin erhielt im Januar das sehr zierliche Nest des Vogels. Es stand über mannshoch auf einem Wacholderbaum, war sehr klein und aus Wurzeln, feinen Grashalmen, Flechten und Haaren zusammengesetzt und enthielt drei sehr feinschalige, noch nicht bebrütete Eier. Diese zeigten auf sehr blaßgrünlichem Grunde, namentlich nach dem stumpfen Ende zu, feine violette Tüpfelchen und Punkte (20×15,5 mm).

Baron v. Erlanger teilt im J. f. O. 1907 über Rüppels Graugirlitz folgendes mit. „Singt und lockt ähnlich wie unser Grünfink, die Lebensweise erinnert aber mehr an die des Girlitzes. Etwas Ammerartiges kann ihm aber auch nicht abgesprochen werden. Sie nisten bald höher, bald niederer, doch selten über Manneshöhe, in dichten Büschen und mit Vorliebe in Dornenzäunen, die mit Schlingeuphorbien und anderen Schlingpflanzen durchwachsen sind. Manche Nester sind ähnlich denen unserer Girlitze, hübsche tiefnapfige Bauten. In der Regel verwenden sie aber nicht viel Sorgfalt beim Nestbau, so daß diese oft nur aus wenig dürren Stengelchen und meistens aus Schaf- oder Baumwolle lose gebaut sind. Die besseren sind dickwandige, gut ineinander verfilzte Bauten aus Gras- und Blütenstengeln, Spinnengeweben, Watte und Bindfäden. Innen sind sie schön mit Haaren und oft mit vielen Federn ausgepolstert." Frische Gelege wurden von April bis in den Oktober gefunden; es werden demnach mehrere Bruten gezeitigt. Das Gelege besteht aus 3—4 Eiern (17—20×13—14 mm), ähnlich denen unseres Grünfinken. Auf sehr blassem grünlich-weißem Grunde sind spärliche violette und hell- bis dunkelrotbraune Pünktchen und Spritzer, selten auch Kritzel verteilt.

Gefiederbeschreibung: Oberseits braun, auf dem Kopf deutlicher, auf dem Rücken weniger deutlich dunkel gestrichelt; Augenbrauenstreif bis über die Schläfe weiß, ebenso Kinn; übrige Unterseite hell fahl graubraun, nach hinten heller werdend; Schwanz, Flügeldecken wie Rücken, Schwingen schwarzbraun; Auge dunkel; Schnabel hornbraun; Füße fleischbraun; Lg. 120, Fl. 65, Schw. 55 mm.

Rüppells Graugirlitz steht dem schon früher eingeführten etwas größeren Brauengirlitz — P. gularis *(A. Sm.)* aus Südafrika nahe, mit dem er auch den schlanken Schnabel und den sperlingsartigen Gesang gemein hat.

Unter den aus Abessinien importierten Vögeln des Berliner Zool. Gartens befand sich auch der

nordöstliche Bandfink — Amadina fasciata alexanderi *Neum.*,

der sich von der westlichen, meist eingeführten Form durch schärfere Bindenzeichnung der Oberseite und Armschwingen, blasseren Grundton der Unterseite und schwarze Federränder, welche das rote Halsband unten begrenzen, unterscheidet. Nach Graf Zedlitz (a. a. O.) ist er ausschließlich Bewohner des Tieflandes. In der trockenen Jahreszeit wurde er regelmäßig an den im Barkabett gegrabenen Brunnen in Schwärmen auf niederen Bäumchen oft zu Dutzenden beisammen sitzend angetroffen. Erlanger sah kleine Flüge von etwa 10 Vögeln, die sich viel an den Nestern des weißen Büffelwebers (Dinemellia) zuschaffen machten. Sie schlüpften ein und aus, und

es hatte den Anschein, daß sie diese Nester zum Brüten benutzen wollten. Die Verbreitung dieses Bandfinken erstreckt sich über Nordabessinien bis Schoa, Somaliland und Deutschostafrika.

(Fortsetzung folgt.)

Eisvögel.

Von E. Schöndube.

(Nachdruck verboten.)

In den Sommermonaten kommt es des öfteren vor, daß den Vogelhändlern allerlei seltene Dinge aus Wald und Feld, auch Vögel und dergleichen, von unkundigen Leuten zum Kauf angeboten werden. Gerade der Großstädter ist es, der auf diesem Gebiet häufig arg sündigt, besonders die großstädtische Jugend. Das ist nicht wunderbar. Die Jugend hat in der vergangenen Zeit sich kaum Kenntnisse auf dem naturwissenschaftlichen Gebiete aneignen können. Früher verfügten die Schulen über gutes Anschauungsmaterial, wie ausgestopfte Tiere, gute Anschauungstafeln und dergleichen. In den höheren Schulen mag das auch jetzt noch vorhanden sein, in der Volksschule ist es auf diesem Gebiet aber schlecht bestellt.

Es ist kein Wunder, daß, wenn alt und jung einen Ausflug macht und zufällig ein Vogelnest gefunden wird, man dies, trotz jeder Unkenntnis der Pflege der Vögel, mit dem lebenden Inhalt mit nach Hause nimmt.

Wir Händler erleben da die tollsten Dinge. Man hat gehört, daß Kanarienvögel mit Rüb- und Spitzsamen ernährt werden. Es wird ohne weiteres angenommen, daß alle Vögel mit diesen Samen ernährt werden können oder man holt sie vom Händler, um junge Meisen damit zu ernähren; da nützt alle Belehrung von seiten des Händlers nichts. „Der Händler will nur die Vögel billig haben", darum erfolgt die scheinbare Belehrung. So geht manche Brut Meisen, Rotschwänze, Rotkehlchen, Fitislaubvögel usw. elend zugrunde.

Zuweilen werden aber auch junge Vögel dem Händler zum Kauf angeboten, und dann zu welchem Preise! Und was da alles gebracht wird, Wiedehopfe, Ziegenmelker — von den Beerensuchern gefunden —, Wendehälse usw. Bin ich doch im vergangenen Jahre in den Besitz von Rohrdommeln gekommen, die man mit gequollenen Mais gestopft hatte. Es hat viel Mühe gekostet, diese Vögel wieder hochzubringen. Wenn der Händler nun solche Vögel annimmt, um sie großzuziehen, so gehört dazu eine große Portion Mitgefühl mit den Tieren, denn von einem Verdienst kann beim Verkauf derartiger Vögel nicht gesprochen werden. Und wenn der Händler dann so mühevoll aufgezogene Tiere verkauft, so begeht er eine strafbare Handlung. Das wäre nicht der Fall, wenn er sie verhungern läßt. Ich überlasse es dem Leser zu beurteilen, ob eine solche Handlungsweise eines Händlers, die zweifellos eine Gesetzesverletzung ist, bestraft werden muß.

Ich erhielt auf die oben geschilderte Weise in diesem Jahre eine Brut junger Eisvögel. An altgefangenen Eisvögeln hatte ich schon meine Erfahrungen gemacht. Aber wie sah es mit der Aufzucht

Strichelblaurake (s. S. 173 f.).

junger Eisvögel aus? Die erste Frage war, was füttern die Alten? Fische! Das hört sich einfach an. Aber wo in der warmen Jahreszeit immer frische Fische hernehmen, und obgleich die Vögel noch klein, können sie eine große Menge verzehren. Es ging besser als ich dachte. In der Markthalle kaufte ich „grüne" Heringe, die ich der Länge nach auftrennte, um das Rückgrat mit den anhaftenden Gräten zu entfernen. Ich schnitt nun die Hälfte in kleine, längliche Stücke, und nun ging das Stopfen los. Bald war das unnötig, da die jungen Vögel die Fischstücke, welche ich ihnen vorhielt, von der Pinzette abnahmen. Da junge Eisvögel nicht sperren, ist wohl anzunehmen, daß sie in der Freiheit die von den Alten gebrachte Nahrung vom Schnabel abnehmen. Es dauerte nicht lange, da wollten die Heringe den Vögeln nicht mehr recht munden, und ich ernährte sie mit Plötzen und anderen Süßwasserfischen, die sie gern annahmen und ihnen auch besser bekamen. An ihrem Benehmen bemerkte ich, daß sie Futter suchten. Lebende Fische zu geben, hielt ich für gewagt, da ich annahm, daß sie dann nur lebendes Futter annehmen würden.

Um ihnen Gelegenheit zu selbständiger Nahrungsaufnahme zu geben, brachte ich einen Blumentopfuntersatz in gleicher Höhe mit der unteren Sitzstange ihres Käfigs an. In den Napf wurden Fischstücke, vermischt mit frischen Ameisenpuppen, das scheint mir das Richtige, und Mehlwürmern gelegt. Drollig war es anzusehen, wenn die Vier um den Futternapf saßen und sich die Bissen heraussuchten. Kopfnickend saßen sie um den Napf, als ob sie sich überlegten, wer den Anfang machen sollte. Keiner griff zu. Mit einem langen Draht rührte ich nun in dem Futtergemisch umher, und nach einiger Zeit bequemte sich einer der Vögel, den ersten Happen zu nehmen. Er sollte ihn nicht behalten, die drei anderen machten ihm den Bissen streitig und zogen ihn hin und her. Der Erste bekam nichts. Der Vierte, der auch ein Stück ergriffen hatte, hüpfte mit dem Bissen sofort auf eine höhere Stange und verzehrte denselben, nachdem er ihn durch Hin- und Herschlagen auf der Stange nach Eisvogelart mundgerecht gemacht hatte. Jetzt sind die Vögel soweit entwickelt und erzogen, daß sie wie jeder andere Vogel Futter aus dem Napf nehmen, sobald sich Hungergefühl bei ihnen einstellt.

Was nun das Baden und Tauchen gefangener Eisvögel anbelangt, so ist es ja recht verlockend für sie, einen Käfig mit Aquarium einzurichten, wie es die Abb. 151 in „Einheimische Stubenvögel" zeigt. Man könnte dann wohl die Tauchkünste des Eisvogels bewundern. Das geht wohl einigemal, dann aber ist es leider mit dem Vogel vorbei. Das Gefieder wird naß und trocknet mit der Zeit nicht mehr. Der Vogel verliert die Eigenwärme und geht ein. Ich habe das auch bei den jungen Eisvögeln ausprobiert; aber schnell, nachdem sie sich gut durchnäßt hatten, den großen Wasserbehälter fortgenommen. Es genügt, ihnen einen kleineren Wasserbehälter zu geben, von dessen Rand aus sie trinken und sich auch mal baden können. Dabei bleiben sie gesund. Sonne lieben sie sehr. Untereinander sind sie verträglich.

Nachwort der Schriftleitung: Die Tatsache, daß es verschiedenen Vogelpflegern gelungen ist, Eisvögel, Bachamseln, die unter ähnlichen Bedingungen leben, mehrere Jahre bei ständiger Darbietung einer Tauchgelegenheit gesund zu erhalten und zu erreichen, daß das Gefieder wie bei dem freilebenden Vogel trocken bleibt, steht fest. Dies zu erreichen, gelingt nicht immer. Es scheint bei Eisvögeln und Bachamseln besonders schwierig zu sein. Bei Schwimmvögeln (Enten und dergleichen), welchen längere Zeit die Möglichkeit zu schwimmen bzw. zu tauchen entzogen war, z. B. bei langen Transporten, wird dasselbe beobachtet. Das Gefieder wird naß und erst nach allmählicher Gewöhnung wird erreicht, daß das Gefieder wieder die Fähigkeit erhält, beim Schwimmen trocken zu bleiben.

Erinnerungen an meine Gartenvoliere.

Von Adolf Voigt, Jena.

(Nachdruck verboten.)

Schon als Junge habe ich Vögel gekäfigt und ich habe diese Passion wohl geerbt, denn schon mein Vater sowie auch dessen Vater waren bereits eifrige Vogelliebhaber. Ich bevorzugte damals Stieglitz, Gimpel und Rotkehlchen. Ich sah in meiner Jugend bei einem Bruder meines Vaters dann eine Gartenvoliere mit Prachtfinken und bin oft als Junge von Berlin nach Spandau, dem Wohnort meines Onkels, gewandert, um dort stundenlang den frohen, farbenprächtigen, allzeit lebendigen, kleinen Gesellen zuzuschauen.

Auch als junger Forstmann hielt ich stets Vögel im Zimmer, vielfach im Dohnenstieg verunglückte Rotkehlchen und Gimpel, sonst aber auch allerlei Körnerfresser, Blaumeisen usw., auch einmal einen Steinkauz. Im Frühjahr wurde dann das Fenster geöffnet und die ganze Schar ins Freie entlassen. Blaumeisen speziell kehrten stets den ganzen Sommer über wieder ins Zimmer zurück, sobald das Fenster offen war, auch bei Rotkehlchen habe ich das einige Male erlebt.

Daß ich als Vogelliebhaber eifriger Vogelschützler wurde, versteht sich von selbst.

Nach mehrjähriger Pause bat mich mein damals 7jähriger Junge, ihm doch einen Vogel zu schenken, und da ich meinte, auf das Gemüt eines Kindes könnte nichts günstiger einwirken als das Leben und Treiben, das Nestbauen, Erbrüten und das Füttern der Jungen, so entschloß ich mich dazu, leicht züchtbare Vögel zu wählen. Ich kaufte zunächst zwei Käfige von größeren Ausmaßen und fertigte mehrere selbst an. Zunächst wurden 2,2 Wellensittiche gewählt und, da der Appetit beim Essen kommt, folgten ihnen bald 1,1 Möwchen und 1,1 Zebrafinken. So flink, als ich gedacht hatte, ging es allerdings nicht mit dem Züchten. Zunächst verhielten sich alle vier Paare passiv.

Inzwischen baute ich mir ein Haus, und da sich daran ein nur nach Süden offener Garten anschloß, beschloß ich eine Gartenvoliere zu errichten. Die Lage war die denkbar günstigste. Gegen Norden schützte ein Seitenflügel des Nachbarhauses, gegen Osten das

eigene Haus und der etwa $1^1/_2$ m höher gelegene Hof. Einen Teil — etwa den dritten — deckte ich mit Brettern und Dachpappe. Der 1 cm weite, sechseckige, am Stuck verzinnte Draht wurde doppelt gespannt, d. h. die 15—16 cm starken Rundholzsäulen wurden innen und außen mit Draht bezogen. Auch das Dach war doppelt gedeckt. Zum Schutze gegen Katzen ist das sehr zweckmäßig. Der äußere Draht kann etwas weitmaschiger genommen werden. Ich hatte in alten Jahrgängen der „Gef. Welt" verschiedene Artikel über Gartenvolieren gelesen, mir auch die Volieren des Herrn L. T. angesehen, und danach baute ich meine eigene Voliere, und zwar in der Größe von etwa $4 \times 2 \top 2^1/_2$. Das Innere stattete ich mit Buschwerk aller Art aus, pflanzte auch verschiedene Sträucher sowie Fichten und Wacholderbäumchen an. Da ich indes Körnerfresser hielt, hatten sie kein langes Leben, alle Triebe, auch die der Nadelhölzer, wurden sofort abgefressen. Auch den Erdboden konnte mir von ihnen gute Ratschläge holen. Auch hier kam der Appetit beim Essen, aus der einen Voliere wurden noch im Jahre 1910 deren zwei. Das war nötig, weil sich die Gimpel während der Brut gar zu üppig benahmen, auch die jungen Wellensittiche viel Unfug trieben.

Diese zweite, kleinere Voliere wurde an die erste angebaut, mit jungen Wellensittichen und dem Gimpelpärchen besetzt.

Beim Öffnen der Tür waren mir einige Male Vögel entflogen, bis auf eine Ausnahme jedoch freiwillig wieder in die Gefangenschaft zurückgekehrt. Das sollte den allzu wehleidigen Tierschützlern zu denken geben! Um vor Verlusten geschützt zu sein, baute ich einen Korridor aus Draht, in den beide Volierentüren mündeten und der noch einmal abgeschlossen war.

Meine Korrespondenz mit auswärtigen Vogelliebhabern nahm an Umfang zu, und auch die Zahl der Vögel wurde immer größer. Ich schaffte nach

Rüppells Graugirlitz (s. S. 178).

hatte ich mit Drahtgeflecht ausgelegt, zum Schutze gegen Mäuse. Aber Mäuse fanden sich doch immer wieder ein, und ich habe in einer Falle oft vier an einem Tage, im Jahre etwa 40—50 Stück gefangen. Sie haben indes die Vögel nie beunruhigt. Erwähnen will ich noch, daß die Voliere auch nach zwei Seiten durch Bretterwände geschützt war, wenigstens auf die Hälfte ihrer Ausdehnung. Im Mai 1910 war sie völlig fertiggestellt und mit Nistkasten aller Art, die ich aus Brettchen und Brettern selbst gezimmert hatte, sowie mit Drahtkörben, Harzerbauerchen u. dgl. ausgestattet. Die Wellensittiche, die Zebrafinken, ein Paar Gimpel, 1,1 Grünfink, 1,1 Zeisig, 1,0 Hänfling, 1,1 Silberschnäbel, 1,1 kleine Elsterchen bezogen sie alsbald. Das war ein lustiges Leben in der Frühlingssonne, im grünenden Garten! Welch farbenprächtiges Bild! Und bald kamen auch die Zuchterfolge. Die Wellensittiche eröffneten den Reigen, schon nach zwei Monaten waren Junge im Kasten. Ich bezog dann 1910 noch ein Paar gelbe Wellensittiche, die sich als ganz besonders fruchtbar erwiesen. Durch meine Zuchtberichte in der „Gef. Welt" wurde ich mit unsern jetzigen Vereinsmitgliedern bekannt und nach an: 1,1 Birkenzeisig, 1,0 Blaukehlchen, 1,0 Schwarzplättchen, 1,0 Nachtigall, 1,0 Amsel, 0,1 Girlitz flog mir zu und ging, wie auch ein Kanarienweibchen, freiwillig in die Gefangenschaft. 1,0 Goldammer fand ich flügellahm, 0,1 nordischen Gimpel fand meine Frau, sie erholten sich rasch in der Voliere; 1,0 Zippe wurde fingerzahm. Die Weichfresser hielt ich in großen Kistenkäfigen in der Voliere, ein Rotkehlchen frei bei den Wellensittichen. Wieder mußte ich anbauen, und diesmal wurden es gleich drei neue Volierenteile, die sich an den Korridor anschlossen, im ganzen also fünf Volieren. Auch Ausländer kamen nach und nach immer mehr dazu. So richtete ich eine gut mit Schlingpflanzen bepflanzte Voliere nur für 1,1 Blutschnabelweber und 1,1 Sonnenvögel ein. Eine zweite enthielt 1,1 Nymphenkakadu, 1,1 Gimpel, 1,1 Zebrafinken und junge Wellensittiche; die dritte 1,1 Mossambikzeisige, 1,1 Gimpel, 1,1 Stieglitz; die vierte nur zwei Wellensittichzuchtpaare, die stets Junge hatten, sowie das Rotkehlchen; die fünfte, größte, allerlei Prachtfinken, 1,1 Silberschnäbelchen, 1,1 Amarant, 1,1 Schmetterlingsfink, 1,1 kleine Elsterchen, 1,1 Zebrafinken sowie

einzelne Exemplare von Schwarzkopfnonne, Muskatfink, ferner 1,1 Reisvögel, 1,1 Weißkehlpfäffchen, 1,1 Zwergelsterchen, 1,1 Tigerfink, 1,1 Bandfink, 1,1 Möwchen; dazu 1,1 Birkenzeisig, 1,1 Erlenzeisig, 1,1 Grünfink, 1,1 Kanarie, 1,0 Stieglitz.

In einem Stallraum des Hauses wurde noch ein sehr großer Flugkäfig errichtet und mit einem Stieglitzmännchen sowie einem Kanarienweibchen besetzt.

Die Fütterung einer so großen Vogelschar erforderte viel Zeit und war ziemlich kostspielig. Durch Zuchterfolge wurde aber mancher Beitrag zur Futterkasse geliefert. Ich bin im Sommer stets um 4 Uhr aufgestanden und habe etwa drei Stunden lang meine Lieblinge beobachtet und verpflegt. Am Tage und abends blieb mir wenig Zeit dazu, zumal da ich auch noch einen größeren Garten zu bewirtschaften und zum Teil urbar zu machen hatte. Die Sonntage gehörten zum größten Teil meinen Lieblingen. Kam der Winter, so wurden etwa Ende November, wenn stärkere Fröste auftraten, die zarten Exoten herausgefangen und in der Stube oder im „Stall" im Flugkäfig einquartiert. Weber, Sonnenvögel, Sittiche, Muskat-, Reisfinken, Nonnen, sowie die einheimischen Körnerfresser, das Rotkehlchen und die Kanarien blieben im Freien. Sie haben hier 20° Kälte gut überstanden. Die Voliere wurde oben dicht mit Brettern und Mistbeetfenstern gedeckt, blieb nur nach Süden offen, die anderen Seitenwände erhielten Stroh- und Bastmattenschutz. Trinkwasser gab es mittags warm, auf heiße Mauersteine gestellt. Bei 5° badeten z. B. die Kanarien im Freien (bei Sonnenschein allerdings)! Auch die Südfront wurde nachts mit Strohdecken verhängt. (Schluß folgt.)

Wie ganz anders gestalten sich die Verhältnisse, wenn man ins Ausland geht. Fachzeitschriften fehlen meistens. Liebhaber, insbesondere für Insektenfresser, sind äußerst dünn gesät; die wenigen, die evtl. vorhanden sind, wollen ausfindig gemacht sein, was, solange man die Sprache nicht beherrscht, gar nicht so einfach ist, und auf die Angaben der Händler und Fänger kann man sich nicht zur Genüge verlassen. Man weiß also auch nicht genau, was man zur Fangzeit wohl erhalten wird und inwieweit es Zweck hat, sich mit Vorratskäfigen für die Frühjahrssaison auszurüsten. Die im Auslande im Handel befindlichen Käfige sind nach unseren Begriffen unzweckmäßig, solche aus Deutschland kommen zu lassen ist mit Rücksicht auf die durch das große Gewicht bedingten hohen Zoll- und Transportspesen ein kostspieliges Vergnügen. Würde es sich nur um einige Stück handeln, so hätte das nicht viel zu sagen, aber man bleibt gewöhnlich nicht allzuviele Jahre am selben Ort und will doch möglichst viel kennenlernen resp. abhören können! Im vergangenen Frühling interessierten mich in Odessa naturgemäß außerordentlich die Sprosser; ich käfigte also 10 Stück



vom Dnjester und 15 Stück vom Dnjeper, außerdem auch noch 1 Garten-, 1 Sperber- und 1 schwarzköpfige Grasmücke, 1 Sumpfrohrsänger, 1 Nachtigall, 1 Braunkehlchen sowie 6 Halsbandfliegenfänger, d. h. innerhalb 14 Tagen wuchs mein schon nicht geringer Vogelbestand um 37 Exemplare an. Natürlich war es nicht meine Absicht, diese große Anzahl längere Zeit hindurch zu halten, aber sie sollten doch abgehört werden, und für ein paar Wochen mußten demnach Einzelkäfige für dieselben da sein. Ich hatte mir drei einfache Käfige mit je acht Einzelabteilungen (35 × 20 ⊥ 18 cm) anfertigen lassen, der Rest der Vögel wurde in normalen Nachtigallbauern untergebracht. Es wurde mir aber in kürzester Zeit klar, daß meine drei zwar einfachen und billigen Käfige (zusammen 48 M.) absolut unzweckmäßig seien, insbesondere, da sie keine Separierung eines bestimmten Vogels zwecks genauerer Abhörung zulassen. Dieselben sind außerdem noch schwer und schlecht zerlegbar, so daß sie mir in diesem Jahre, wo ich an der Wolga, in der Nähe von Zarizyn, weile, nicht einmal Dienste leisten können.

Ich habe mir nun besondere Reisekäfige für Wildfänge konstruiert, die sich als äußerst praktisch erweisen und auf deren Konstruktion ich nachstehend näher eingehen will:

Leicht zerlegbare Käfige für Frischfänge.

Von Ingenieur Kracht.

(Nachdruck verboten.)

Gehört man zu den Wanderern, wie ich es tue, so ist eine überaus unbequeme Frage immer diejenige praktischer Käfige für die Frühjahrswildfänge. Bleibt man hübsch daheim im lieben Vaterland, so sind einem derartige Kopfzerbrechen erspart, die Sache wird einem dort gar so leicht und angenehm gemacht! Zunächst hat man Zeit; wurde in diesem Frühjahr schon ein Schwarzkopf und eine Gartengrasmücke erworben, und wird es einem zuviel noch eine Nachtigall hinzuzunehmen, so wartet man einfach bis zum nächsten Jahre und begnügt sich einstweilen damit, Nachtigallen bei befreundeten Liebhabern abzuhören. Sodann die „Käfige"; man läßt sich von einer der bewährten Firmen einen Katalog kommen, und bald ist auch für billiges Geld etwas Geeignetes gefunden. Glaubt einer besondere Ausführungen der Käfige haben zu müssen, so werden auch solche geliefert. Nicht unerwähnt lassen möchte ich die große Annehmlichkeit, daß im Laufe der Jahre in Deutschland fast alle europäischen Vögel auf den Markt kommen, und zwar zu verhältnismäßig bescheidenen Preisen.

a) Gesichtspunkte, die für den Entwurf maßgebend waren:

1. Möglichst geringe Abmessungen und möglichst geringes Gewicht.
2. Leichte Zerlegbarkeit.
3. Fortfall des schweren Zinkschiebers, da sowieso nur Papiereinlagen verwandt werden.
4. Möglichst geringer Preis.

b) Ausführung:

Zu 1. Um bei geringen Abmessungen dem Vogel doch genügende Bewegung zu ermöglichen, wurde der Zweisprung gewählt. Um ein geringes Gewicht zu erzielen, sind: Vorderseite und Seitenwände aus 5 mm starken Brettchen in Verbindung mit Holzstabgitter; Decke aus Wachsleinwand; obere Hälfte der Rückseite aus weißer Leinwand; Bodenbrett und breitere Latte der Rückwand (untere Hälfte) aus dünnen, dreifach geleimten Brettern. Das Gewicht des Käfigs ist gering. Zweckmäßig wäre es, das Bodenbrett mit ganz dünnem Zinkblech zu belegen.



Dayaldrossel.

Zu 2. In je einem Stück gearbeitet sind die Vorderseite und die beiden Seitenwände. An Einzelteilen verbleiben der Boden, die beiden Latten der Rückseite und die drei Zierleisten zur Befestigung der Wachsleinwand der Käfigdecke. Zusammengefügt wird das Ganze mittels kleiner Nägel (Zigarrenkistennägel); diese Befestigungsart genügt bei dem geringen Gewicht vollauf; das Zerlegen geht ohne Schwierigkeiten und Beschädigungen vor sich. Verschraubungen oder Scharniere sind vollkommen unnötig. Leinwand der Rückseite und Wachstuchstreifen zum Halten des Bodens werden mit Tischlerleim angeklebt.

Zu 3. Dieser Punkt ist der wesentlichste der Käfige. Es ist nur ein nach unten aufklappbares Bodenbrett vorhanden, auf welches ein Bogen Stroh- oder Zeitungspapier aufgelegt wird. Damit der Vogel nicht entkommen kann, wird beim Reinigen ein dünnes Bodenbrett eingeschoben (in der Skizze S. 182 angedeutet).

Zu 4. Bei gleichzeitiger Bestellung von 10 solcher Käfige (ausschl. Decke, Leinwand für die Rückseite und Zusammensetzen) stellt sich der Preis für das Stück auf etwa 3,20 M.

Verbessern ließe sich die Konstruktion dadurch, daß die Decke, wie bei den Schindlerschen Käfigen, aus einem mit der Wachsleinwand bespannten Drahtrahmen hergestellt würde.

Bemerken möchte ich, daß der einzige Nachteil dieser Käfige darin besteht, daß man sie nicht unmittelbar übereinander aufhängen kann, da dann das Aufklappen des Bodens nicht möglich ist. Will man Frischfänge abhören, so ist es ja sowieso erforderlich, die Käfige in gewisse Abstände zu bringen, wenigstens, wenn es sich um gleichartige Sänger handelt. Ich hänge die Käfige stets an einem Fenster auf, das nicht geöffnet wird, durch die man immer genau sehen kann, welcher Vogel jeweilig singt.

Es sollte mich freuen, wenn obige Ausführungen dem einen oder anderen Liebhaber von Nutzen sein könnten. Ausdrücklich bemerke ich, daß diese Käfige nur zur Beherbergung der Frischfänge für die Dauer der Gesangszeit, nicht aber zur dauernden Beherbergung der Vögel bestimmt sind, denn dazu sind sie viel zu klein.

Sprechsaal.

(Steht den Abonnenten kostenlos zur Verfügung.)

Frage 13. **Gartenrotschwanznest mit acht Jungen.** In einer Mauerlücke unter dem Dache meines Hauses, welches direkt an einem ziemlich großen, teilweise dichtbebuschten Park liegt, brütete dieses Frühjahr ein Gartenrotschwanzpärchen. Als die Alten auf Futtersuche waren, was oft einige Minuten dauerte, benutzte ich diese Gelegenheit, einmal in das Nest hineinzuschauen und stellte zu meiner Überraschung fest, daß sich in demselben acht Junge befanden. In allen ornithologischen Werken, welche ich bisher gelesen, wird die Höchstzahl der Eier des Gartenrotschwänzchens mit sieben angegeben. Ich bin nun im unklaren, ob obige Beobachtung eine Seltenheit ist oder nicht und möchte sehr bitten um diesbezügliche Auskunft.

H. H., Aachen.

Antworten.

Auf Frage 7. Das Weibchen des Blutschnabelwebers behält zur Brutzeit das alte Gefieder. Es legt kein Brutkleid an wie das Männchen. Nur der sonst rote Schnabel wird zur Brutzeit gelb. A. K., Bunzlau.

Betrifft Versendung von Vögeln. Ich bestellte bei K. Reich, Bremen, einen Nachtigallkanarien und sandte 54 Goldmark ein. Der Vogel wurde in Bremen gut verpackt und deklariert auf dem Postamt 5 aufgegeben. Infolge unrichtiger Behandlung oder Expedierung kam die Sendung verspätet in Mannheim, Zollpostamt, an,

der Vogel war bereits verendet. Das Amt ließ die Kiste an den Absender zurückgehen und teilte mir mit, daß der Vogel tot angekommen sei. Ich reklamierte nun beim Postamt Mannheim und ersuchte um Erstattung der 54 Mark. Nach öfterem Hin- und Herfragen erhielt ich vor einigen Tagen vom Postamt 5, Bremen, als Entschädigung 4,55 Mark. Darauf schrieb ich an das Amt, daß ich nicht damit zufrieden sei. Daraufhin erhielt ich den Bescheid, nach dem Postgesetz stünde mir eine höhere Entschädigung nicht zu. Die Postgesetze sind mir nun nicht bekannt, ich nehme aber an, daß die Entschädigung nach dem Gewicht bezahlt wird. Es wäre also den Versendern zu empfehlen, die Versandkisten so schwer zu machen, daß bei einem Verlorengehen oder dergleichen kein Verlust entstehen kann; oder noch besser, die Vögel als Wertsendung zu befördern.

St. Welter.



Bücher- und Schriftenschau.

Dr. Oskar u. Frau Magdalena Heinroth. Die Vögel Mitteleuropas. Herausgegeben von der Staatl. Stelle für Naturdenkmalpflege in Preußen. Hugo Bermühler Verlag, Berlin-Lichterfelde. 1. Lief. 16 S. 5 Tafeln in Schwarzdruck, 3 Tafeln in Farbendruck. 4°. Preis der Lief. 2,50 M.

Aus dem Wunsche, durch Halten und Aufzucht möglichst vieler Arten mitteleuropäischer Vögel das eigene Wissen zu bereichern, entstand bei Herrn und Frau Dr. Heinroth der Plan, möglichst alle heimischen Vogelformen von frühester Kindheit an kennenzulernen und ihre körperliche Entwicklung auch photographisch festzuhalten. Die der elterlichen Obhut entzogenen jungen Vögel, „diese geistig völlig unbeschriebenen Blätter", gaben Gelegenheit zu allerlei psychologischen Versuchen und Beobachtungen. Die Fülle des gesammelten wissenschaftlichen und bildlichen Materials, die Arbeit zweier Jahrzehnte auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht zu sehen, war ein oft ausgesprochener Wunsch. Dieser Wunsch ist nun erfüllt. Das erste Heft des umfangreichen Werkes, welches 37 Lieferungen mit 125 Farb- und 275 Schwarzdrucktafeln umfassen soll, liegt vor uns. Die Schwarzdrucktafeln des ersten Heftes zeigen in 12 Bildern die Entwicklung der Nachtigall, das Bild eines Sprossers, die Entwicklung des Rotkehlchens, des Uhus und des Kiebitz, sowie 6 Bilder der Nebelkrähe. Die farbigen Tafeln nach sorgfältig übermalten Photographien zeigen die Entwicklung des Kernbeißers, des Turmfalken, des Rotkehlchens, Nachtigall und Sprosser. Wie die Bilder, so bringt auch der Text des Werkes so viel vollständig Neues und so viele Anregungen, daß wir das Werk jedem Vogelfreund empfehlen.

Aus den Verbänden.

Der **Landesverband Preußen** veranstaltet in der Zeit von Mittwoch, den 19. November bis Sonntag, den 23. November 1924 in den Sophiensälen, Berlin C, Sophienstraße 17/18, eine große Vogelschau.

Vom Vogelmarkt.

Von seltener auf den Vogelmarkt kommenden Vögeln werden angeboten:

Fluck, Bremen, Knoopstr. 39: Weißhaubenkakadu, 1,0 Safranfink.

Pichler, Wien III, Klimschgasse 18: Schamadrosseln, Silberohrsonnenvögel, Zuchtpaar.

Stefani u. Sohn, Neuß a. Rh.: Farben-Wellensittiche, blau, blaublütig, maigrün (jadefarbig), orangegelb, hellgelb, olivenfarbig und satinglänzend. Masken- und Rotkopf-Amandinen, Spitzschwänze, Zebrafinken, Schnurrbärtchen.

Fritz Waentig, Meißen, Hafenstr. 43 (A. Z.-Mitgl. 105): Ruß-, Gilb- und Flammenweber, Reisfinken, Oryxweber, brasil. Kurzschnabelgirlitze, Grassittiche, kalif. Schopfwachteln, 2,0 Mövchen.

Erich Wiechmann, Stralsund, Frankendamm 38 (A. Z.-Mitgl. 134): 3 junge gelbe Wellensittiche.



Herrn B. M., Nidda. Völlig abgeschlossen sind die Frischhaltungsversuche mit „frischen Ameisenpuppen" noch nicht. Es eignen sich dazu nur ganz frisch dem Ameisenhaufen entnommene Puppen. Die Puppen wurden bei einem der zuletzt bekanntgewordenen Versuche in ¼ Liter-Weckgläsern versuchsweise 15 Minuten bei 75° und 10 Minuten bei 98° sterilisiert. Mitte Januar geöffnete Gläser zeigten, wie schon früher geöffnet, folgendes Bild: Der Inhalt hatte sich tadellos gehalten, die Puppen wie frische, jedoch feucht und zusammenballend, wie frische Puppen, die etwas Regen bekommen haben. Zum Trocknen wurden sie auf einem Kuchenblech flach ausgebreitet und ½ Minute lang im Kuchenbackofen guter Hitze ausgesetzt, daß sie mäßig dampften. Darauf wurden sie auf einen Papierbogen ausgebreitet an der Luft getrocknet. Sie hatten dann völlig das Aussehen der „geschwelgten Puppen" und waren wie diese, kühl aufbewahrt, mehrere Tage haltbar. Sie wurden mit gutem Erfolg den Wintermausern gereicht.

Herrn A. M., Suonenjoki. Der Züchtungsraum müßte etwa 2 cbm Inhalt haben und so gefertigt sein, daß er nicht von den Schnäbeln der Sittiche zernagt werden kann. Für das Nagebedürfnis müßten viel frische Zweige angebracht werden. Nistkasten, lichte Weite 25, lichte Höhe 35 cm, Schlupfloch 7 cm, Gelege 3—5 Eier, Brutdauer 22—25 Tage, nur Weibchen brütet, Junge verlassen sechs Wochen alt den Nistkasten. Zur Aufzucht die sonst gereichten Samen auch gequollen, gekeimter Hafer, frische Ameisenpuppen, oder wenn nicht erhältlich Gemisch aus gleichen Teilen trockener Ameisenpuppen, gequollenen Weißwurm, Eierbrot, geriebener Möhre.

Herrn P. W., Chemnitz; Herrn W. V., Jena; Herrn A. M., Suonenjoki (Finnland); Herrn J. B., Leipzig-Mockau: Beiträge dankend erhalten.

Herrn G. B., Nassau. 1. Im allgemeinen ist der Graukardinal ein harmloser, verträglicher Vogel, der sich mit Prachtfinken gut verträgt, besonders wenn, wie im vorliegenden Fall, der Aufenthaltsraum recht geräumig ist. Es besteht bei dem Zusammenhalten von kleinen Vögeln mit einem größeren starkschnäbeligen immer die Gefahr, daß der größere bei den unvermeidlichen Zusammenstößen am Futternapf einem kleinen Vogel gefährlich wird, auch wenn er sonst ganz verträglich ist. Der Gesang des Graukardinals leidet bei dem Zusammenhalten mit anderen nicht. 2. Fremdländische Stubenvögel von K. Neunzig.

Herrn K. Z., Nauen. Der Kuckuck bedarf zu seiner Beherbergung eines Käfigs von etwa 1 m Länge, entsprechender Höhe und Breite. Junge K. müssen lange Zeit gepäppelt werden, bevor sie selbständig Futter aufnehmen. Als Futter verwendet man große Insekten, Raupen, Fleisch, roh und gekocht, frische Ameisenpuppen und schließlich auch ein gutes Drosselfutter, dem auch gemahlener Hanf zur Gewöllbildung zuzusetzen ist.

Herrn v. G., Köln-Worringen. Den Zeisigen ist, wenn sie Junge aufziehen, auch animalische Kost, wie frische Ameisenpuppen, ein Insektenfresserfutter und gehacktes Ei, Zweige mit Blattläusen u. dgl., auch Grünkraut zu reichen. Vermutlich sind die jungen Zeisige infolge der ausschließlichen Ernährung mit Körnern nicht recht lebensfähig und gehen schon in jugendlichem Alter ein.

Herrn E. H., Braunschweig. Die Bekämpfung von Eingeweidewürmern bei kleineren Vögeln ist sehr schwierig und der Erfolg der Einwirkung von Heilmitteln ist sehr fraglich. Am wenigsten gefährlich ist das Eingeben von einigen Tropfen reinen Baumöls, das eine schnellere Entleerung der Därme bewirkt und dadurch in manchen Fällen auch eine Entfernung der in den Eingeweiden schmarotzenden Würmer herbeiführt.

Herrn A. K., Anklam. Der Vogel war eine Glanzwitwe. Die rostfarbenen Beine sind entweder eine Abnormität oder es handelt sich um eine noch unbekannte Form. Sie ist infolge von Damentzündung eingegangen.

(Fortsetzung auf der 3. Umschlagseite.)

Stützungsfonds.

Für den Stützungsfonds sind eingegangen durch Herrn Adlersparre-Stockholm 20 M. Besten Dank.

K. Neunzig.

Aus den Vereinen.

Aufgenommen ist Mitglied Nr. 398 Herr Max Sachs, Plauen i. Vogtl., Mozartstr. 27; Mtgl. Nr. 399 Ernst Seyschab, Nürnberg, Tafelfeldstr. 18.

A. Krabbe.

Verein Vogelschutz und -pflege zu Dresden. Versammlung jeden Donnerstag, abends 8 Uhr, im Vereinslokal, „Schillers Restaurant", Ecke Stifts- und Ehrlichstraße. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen.

Bernhard Kühn, Vorsitzender.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei zu Hamburg. Sitzungen finden statt jeden 1. und 3. Dienstag im Monat in Hüttmanns Hotel, Poolstr. 22, abends 8¼ Uhr. Nächste Sitzung Dienstag, den 5. August 1924.

J. A.: Arnold Weber, 1. Vorsitzender.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig. Vereinssitzungen jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat im Vereinslokal, „Bauers Brauereirestaurant", Täubchenweg. Nächste Sitzung am 7. August 1924. Gäste stets willkommen. J. A.: Johann Birk, 1. Vorsitzender.

Verein der Vogelfreunde Leipzig-Plagwitz. Vereinslokal: „Gosenschlößchen", Leipzig-Plagwitz. Sitzungen an jedem 1. und 3. Montag des Monats, abends 8 Uhr. Vogelfreunde sind stets willkommen.
J. A.: Karl Scholtissek, 1. Vorsitzender, Leipzig-Plagwitz, Lauchstädter Straße 30.

Für Entomologen.

Jax's Schmetterlingsbuch. Zum Selbstbestimmen aller in Deutschland, Österreich, Ungarn und der Schweiz vorkommenden Groß- sowie der vorzugsweise gesammelten Klein-Schmetterlinge. Mit 67 Textabbildungen. Kart. 4.— M.

Jax's Käferbuch. Zum Selbstbestimmen der in Deutschland, Österreich-Ungarn und der Schweiz vorkommenden Koleopteren. Mit 144 Textabbildungen. Kart. 4.— M.

Der Käfer- und Schmetterlingssammler. Anleitung zur Herstellung und Handhabung der beim Fange, der Zucht und dem Präparieren von Käfern, Schmetterlingen und Raupen als geeignet bewährten Geräte, sowie zur Anlage und Erhaltung von Insektensammlungen. Von Karl Wingelmüller. Mit 32 Abbildungen. Geh. 1.50, geb. 2.— M.

Schädlinge und Nützlinge der Kleintierwelt. Ein Lehrbuch für jedermann von Prof. Dr. L. Glaser. Mit 85 Textabbild. Kart. 3.— M.

Für Bienenzüchter.

Dzierzon's rationelle Bienenzucht. Von Pfarrer Dr. Dzierzon. 2. Auflage. Mit vielen Textabbildungen. Kart. 3.— M.

Bienenzucht im Zargenbreitwabenstock. Von Jak. Luers. Mit 25 Abbildungen im Text. Kart. 2.— M.

Leben und Zucht der Honigbiene. Ein gemeinverständliches Lehrbuch über Behandlung der Bienen und über Tätigkeit, Nutzen und Anatomie der Biene von Prof. Dr. O. Krancher. 2. verbesserte Aufl. Mit 1 Tafel, 82 Abbild. u. 7 Kopfleisten. Kart. 3.— M.

Für Hundefreunde.

Gebrauchs- und Luxushunde. Von Emil Ilgner. 2. Auflage mit 87 Abbildungen im Text. Kart. 3.— M.

Der kurzhaarige deutsche Vorstehhund. Von Camillo Morgan. Mit 13 Abb. berühmter kurzhaariger deutscher Vorstehhunde. 2.— M.

Der Foxterrier, seine Zucht, Pflege und Erziehung für Jagd und Stube, von Emil Ilgner. 2.50 M.

Kreutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg / Postschließfach 148

Von folgenden **Farbentafeln** der **„Gefiederten Welt"** sind noch einige Exemplare vorrätig, welche wir, solange der geringe Vorrat reicht, zum Preise von **1 G.-M. für die Tafel** zuzügl. **20 G.-Pf.** Porto u. Verpackung **für jede Sendung** bei vorheriger Einsendung des Betrages auf unser Postscheckkonto **Magdeburg 3148** abgeben.

1898 Tafel III: Schwarzspecht. (Schwarzdrucktafel.)
1899 Tafel IV: Nest des Gartenrotschwänzchens mit Weibchen, Jungem und Ei. (Schwarzdruck.)
1900 Tafel I: Madagaskar-, Napoleons-, dottergelber, Samt-, Blutschnabelweber.
1900 Tafel II: Kl. Alexander-, Bunt-, Wellensittich, Rosenpapagei, kl. Gelbhaubenkakadu.
1900 Tafel III: Sonnenvogel, blauer Hüttenfänger, Rosenstar, Schamadrossel, weißohriger Bülbül.
1900 Tafel IV: Paradieswitwe, Mozambikzeisig, Grauer Kardinal, Safranfink, Papstfink.
1901 Tafel III: Kleinspecht, Kleiber, Wendehals.
1902 Tafel I Kohl-, Schwanz-, Hauben-, Tannenmeise.
1902 Tafel II: Goldammer, Baumpieper, Feldlerche.
1902 Tafel IV: Diamant-, weißbäckige Gürtel-, Masken-, Gürtelamandine.
1903 Tafel I: Hausrotschwanz, Sprosser, Nachtigall, Rotkehlchen.
1903 Tafel II: Bluthänfling, Grünling, Kernbeißer, Buchfink.
1903 Tafel III: Mistel-, Wacholder-, Wein-, Singdrossel.
1903 Tafel IV: Zwergstrandläufer, Wachtel, weißflüglige Seeschwalbe, Sandregenpfeifer.
1904 Tafel I: Zaun-, Garten-, Dorn-, Mönchgrasmücke.
1904 Tafel II: Schneefink, Steindrossel, Alpenbraunelle, Steinsperling.
1904 Tafel III: Binden-, Kiefern-, Fichtenkreuzschnabel.
1904 Tafel IV: Bartmeise, Rohrammer, weiße Bachstelze, Sumpfrohrsänger.
1905 Tafel I: Schwarzbürzel-, Spitzschwanzbronzemännchen, weißes, gelbbuntes, braunbuntes jap. Mövchen.
1905 Tafel II: Grau-, Orange-, Erz- und Schmuckpfäffchen.
1905 Tafel IV: Schwarzkehl-, Dreifarben-, Weißkopf- u. Schwarzkopfnonne.
1906 Tafel II: Lein-, Erlenzeisig, Berghänfling, Stieglitz.
1906 Tafel III: Stein-, braunkehliger und schwarzkehliger Wiesenschmätzer.
1907 Tafel II: Weißsterniges, rotsterniges, Wolfsches Blaukehlchen, Blaukehlchen ♀.
1907 Tafel III: Kleines, Zwerg-, Glanz-, Riesen-, rotrückiges und Gitterflügel-Elsterchen.
1907 Tafel IV: Karmin- und Hakengimpel, Gimpel.
1908 Tafel II: Braunrückengold- ♂ ♀, Schwarzkopf- und Goldsperling ♂ ♀.
1908 Tafel IV: Pünktchenastrild, Amarant ♂ ♀, dunkelroter Astrild, Tigerfink ♂ ♀.
1909 Tafel I: Orangegesichtiger Unzertrennlicher, Rosenpapagei, Rußköpfchen, Tarantinischer Unzertrennlicher, Graupsittich.
1909 Tafel II: Klarinetten- u. Mennigvogel, braunkehliger Blauschnäpper.
1909 Tafel III: Schwarzbäckchen-, Elfen-, Bunt- und Granatastrild, gemalter Astrild.
1909 Tafel IV: Orange-, Rotkopf-, Blutschnabel-, Napoleons- und Madagaskarweber.
1910 Tafel I: Grauer, Trauer-, Halsband-, Zwergfliegenschnäpper.
1910 Tafel IV: Zipp-, Garten-, Zaun-, Kappenammer.
1911 Tafel I: Rotrücken-, Raub-, Schwarzstirn-, Rotkopfwürger.
1911 Tafel II: Zeresastrild, Malabarsasänchen, Muskatfink, Silberschnäbelchen.
1911 Tafel III: Gartensänger, Fitislaub-, Weidenlaub- u. Waldlaubvogel.
1911 Tafel IV: Goldköpfiges ♂ ♀, feuerköpfiges Goldhähnchen, Zaunkönig.
1912 Tafel II: Wieners, Aurora-, Tropfen-, Wachtel- und Rebhuhnastrild.
1912 Tafel III: Magellan-, Kapuzen-, mexikanischer, Yarells und Trauerzeisig.
1912 Tafel IV: Dorn-, Sonnen- Binsen- und Gitterflügelastrild, Zebrafink.
1913 Tafel II: Violettblauer u. Rotbauchorganist, Purpur-, Dreifarben- und schwarzblaue Tangare.
1913 Tafel III: Paradies-, Dominikaner-, Königs-, Fischers, Rotscheitel- und Gelbrückenwidafink.
1913 Tafel IV: Goldschulter-, Fein-, Sing-, Browns Singsittich.
1914 Tafel I: Schwarzkopf-, Rosenbrust- u. mexik. Gelbkernbeißer, dunkelblauer Bischof, roter Kardinal.
1914 Tafel III: Diuka-, Grau-, Kron- u. Morgenammerfink, Graukardinal.
1914 Tafel IV: Pikui-, Kap-, Diamant-, Tamborin- u. Friedenstäubchen, chinesische Zwergwachtel.
1915 Tafel I: Sammetköpfchen, Sperber-, Orpheus- und Bartgrasmücke.
1915 Tafel III: Diamantfink-, Masken-, Weißwangen- und Spitzschwanzamandine, Gürtelgrasfink.
1915 Tafel IV: Star, Pirol, Rosenstar.
1920 Tafel I: Nandy-, Jendaja-, Guajakil- und Goldstirnsittich.
1920 Tafel II: Schuppenköpfchen, Schnurrbärtchen, dottergelber, Zwergmasken- und Textorweber.
1920 Tafel III: Tui-, Ziegen-, Mönch-, Tuipara- u. Katharinasittich.
1920 Tafel IV: Reisfink, weißer Reisfink.
1921 Tafel I: Gelber Wellensittich und Wellensittich.
1921 Tafel II: Kleiner Gelbhaubenkakadu.
1921 Tafel III: Kleiner Alexandersittich.
1921 Tafel IV: Domingo-, Cuba- und Rotbugamazone.

Da die Nachfrage nach Farbentafeln sehr groß ist, bitten wir sofort zu bestellen.

Kreutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg / Postschließfach 148

Anzeigenteil

Die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 20 G.-Pf. berechnet. Aufnahme erfolgt gegen Voreinsendung des Betrages in Reichsge
Brief od. auf unseren Zahlstellen: Postscheckkonto: Magdeburg 3148, Wien 156 687, Bern III 4326, Prag: Creditanstalt d. Deutschen unter Angabe des Zu

Gimpelbauer

mit Drahtstäben 17½ cm lang, 17 cm hoch, 13 cm breit pro Dtzd. 14 ℳ; fertige alle Sorten Käfige und Utensilien für Kanarien an. [552

A. Janson, Barbis a. H.

Suche neuen oder sehr gut erhaltenen

Schamadrosselkäfig

mit weicher Decke, nicht unter 50 cm Höhe, am liebsten weiß lackiert. Genaue Angabe über Größe, Art und Preis an Frau Dr. **Rosell**, Ballenstedt a. Harz, A. Z.-Mtgl. 89. [553

Vogelfutter [554

für Kanarien, Waldvögel, Exoten, Papageien, Weichfresser. Anfragen nur gegen Rückporto. Liste 13 über Vogelfutter, Liste 5 über Vogelkäfige, Zuchtgeräte usw. mit etwa 400 Abbild.

W. Göpel, Leipzig,
Tröndlinring 1. Telephon 14958.

Mehlwürmer

geg. Einsend. v. 2.—Rentenmark ¼ Pfd. franko versend. **D. Waschinski & Co.**, Biesenthal I (Mark). [555

Mehlwürmer neue, feinste Qualität, Pfd. 8 ℳ
556] **Jeitner, Breslau**, Weinstr. 12.

Gebe ab:

Prima Blaukehlchen u. Grünfink mit Kanariengesang, gegen Exoten, Bücher und anderes. **H. Eberhardt,** [557
Nordhausen-Altendorf 36.

Gebe ab: 1,0 Zaunkönig, in Tausch gegen 0,1 desgl., beiderseits Garantie für Geschlecht. Suche 0,1 Wachtel. [558
F. Reck, Sulingen i. Hannover.

Gebe ab:

1,1 Blauastrilde 2 ℳ, 1,0 Bandfink 2 ℳ, 2,0 Mövchen 6 ℳ, 6 grüne u. gelbe junge Wellensittiche 6 ℳ, 1,0 Kanarie 1924 6 ℳ, 0,2 Oryxweber 1.50 ℳ, 1,0 Zeisig 4 ℳ, 1,0 Amsel 10 ℳ, 0,1 Wellensittich grün 1923 8 ℳ, 0,1 Blutschnabelweber 1.50 ℳ. Preise per Stück. Tausche auf amerik. Spottdrossel, Unzertrennliche u. andere. [559
Eugen Müller, Küllstedt (Eichsfeld).

0,2 jap. Mövchen,

zuchtfähig, abzugeben. Suche 1,0 do. zuchtf. u. 1 Paar Exoten in Tausch. [560
M. Wischendorff, Lübeck, Hüxstr. 89.

Wer tauscht eine prima [561

Schamadrossel

gegen schöne Ölgemälde. **G. Jacob,** Böhlitz-Ehrenberg, Leipziger Str. 64.

Tausche: 2 Harzer Kanarienhähne Ia Vögel, geg. e. photogr. Objektiv (Doppelanastigmat) m. Verschl. 9×12, Lichtst. 4:5. Angeb. an **J. Mertl,** Dachau b. München, Bahnhofstr. 9. [562

Tausche:

1,1 Safranfinken, 1,4 Schmetterlingsf., 1,12 Amaranten, 1,0 Gimpel geg. sprechende Blaustirnamazone.
K. Noch, Neustettin, Bahnhof 4. [563

Verkaufe

wegen Platzmangel: 1,1 gr. Wellensittich, erprobtes Zuchtpaar, für 20 ℳ mit P. und Verp., do. Männchen verunglückt: 0,1 gr. Wellensittich, guter Zuchtvogel, für 12 ℳ mit Porto und Verp. [5—
Dr. Stoltze, Böblingen (Württbg.), Waldburgstr. 36. A. Z.-Mtgl. 237. [564

Gartenbau-Bücherei

Herausgegeben von
Prof. **Dr. Udo Dammer,** Kustos des Botanischen Gartens Berlin-Dahlem.

Jeder Band 1.20 M.

Bd. 1. **Monatskalender des Pflanzen- und Gartenfreundes.** Von Prof. Dr. Dammer. 2. Auflage.

Bd. 2. **Zimmerblattpflanzen.** Von Prof. Dr. Dammer. 2. Auflage. Mit 48 Abbildungen.

Bd. 3. **Gewürzkräuter.** Von Obergärtner Bode. Mit 6 Abb.

Bd. 4. **Balkonpflanzen.** Von Prof. Dr. Dammer. 2. Auflage. Mit 41 Abbildungen.

Bd. 5. **Zimmerblütenpflanzen.** Von Prof. Dr. Dammer. 2. Auflage. Mit 23 Abbildungen.

Bd. 6. **Die ein- und zweijährigen Gartenpflanzen.** Von Gartenbaudirektor Goeschke. Zurzeit nicht lieferbar!

Bd. 7. **Der Gartenrasen.** Von Obergärtner Bode. Mit 14 Abb.

Bd. 8. **Die Farnpflanzen unserer Gärten.** Von Inspektor Mönkemeyer. Mit 15 Abbildungen.

Bd. 9. **Der Zwergobstbau.** Von Gartenbaudirektor Koopmann. Mit 6 Abbildungen. Zurzeit nicht lieferbar!

Bd. 10. **Die Staudengewächse.** Von Gartenbaudirektor Goeschke. Mit 35 Abbildungen.

Bd. 11. **Gemüsebau auf Gartenbeeten.** III. Teil. Von Gartenbauinspektor Lindemuth. Mit 20 Abbildungen. Vergriffen.

Bd. 12. **Pfirsiche und Aprikosen.** Von Obergärtner Kotelmann. Mit 13 Abbildungen.

Bd. 13. **Schönblühende Zwiebelgewächse.** Von Gartenbauinspektor Lindemuth. Mit 30 Abbildungen.

Bd. 14. **Blütensträucher.** Von Gartenbaudirektor Goeschke. Mit 28 Abbildungen.

Bd. 15. **Gemüsebau auf Gartenbeeten.** I. Teil. Von Gartenbauinspektor Lindemuth. Mit 22 Abbildungen.

Bd. 16. **Die Beerensträucher.** Von Gartenbauinspektor Maurer. 2. Auflage. Mit 14 Abbildungen.

Bd. 17. **Bunte Gehölze.** Von Gartenbaudirektor Goeschke. Mit 1 Tafel.

Bd. 18. **Gemüsebau auf Gartenbeeten.** II. Teil. Von Gartenbauinspektor Lindemuth. Mit 22 Abbildungen.

Bd. 19. **Gurke, Melone, Kürbis.** Von Inspektor Lange. Mit 15 Abbildungen.

Bd. 20. **Der kleine Villengarten.** Von Gartenarchitekt Pfyffer v. Altishofen. Mit 20 Abbildungen und 8 Tafeln.

Bd. 21. **Das Mistbeet.** Von Obergärtner Bode. Mit 5 Abbildungen.

Bd. 22. **Die Gartenlaube.** Von Landschaftsgärtner Klawun. Mit 14 Abbildungen.

Bd. 23. **Das Weinspalier.** Von Gartenbaudirektor Koopmann. Mit 17 Abbildungen.

Bd. 24. **Die Kultur der schönblühenden Orchideen.** Von Inspektor Lebien. Mit 7 Abbildungen.

Bd. 25. **Zimmer- und Freiland-Aquarienpflanzen.** Von Inspektor Mönkemeyer. Mit 26 Abbildungen.

Bd. 26. **Rosen.** Von Gartenbaudirektor Koopmann. 2. durchgesehene und ergänzte Auflage. Mit 17 Abbildungen.

Bd. 27. **Einfassungspflanzen.** Von Gartenbaudirektor Goeschke. Mit 44 Abbildungen.

Bd. 28. **Nadelhölzer.** Von Prof. Dr. Dammer.

Bd. 29. **Schönblühende Knollengewächse.** Von Gartenbauinspektor Lindemuth. Mit 20 Abbildungen.

Bd. 30. **Der Spargel.** Von Inspektor Dreßler. Mit 10 Abb.

Bd. 31. **Die Erdbeere.** Von Dozent Dr. Zürn. Mit 13 Abb.

Bd. 32. **Palmen.** Von Prof. Dr. Dammer. Mit 29 Abbildungen.

Bd. 33. **Gewächshaus des Privatmannes.** Von Inspektor Lebien. Mit 8 Abbildungen. Zurzeit nicht lieferbar!

Bd. 34/36. **Gartenfeinde und Gartenfreunde.** Die dem Gartenbau schädlichen und nützlichen Lebewesen. Von Prof. H. Kolbe. Mit 75 Abbildungen. 3.60 M.

Bd. 37/39. **Theorie der Gartenarbeiten.** Ein Katechismus des Pflanzenbaues. Von Prof. Dr. Udo Dammer. Mit 23 Abbildungen. Preis 4.60 M.

Die Tabakpflanze. Ein Handbuch zu ihrer Anzucht und Verwertung für jedermann. Von A. Oertel. 2. Auflage. —.60 M.

In Vorbereitung: **Champignon-Zucht. — Kakteen.**

Die besten Speiseschwämme von Gotth. Hahn. Mit naturgetreuen kolorierten Abbildungen auf 12 Tafeln. 1.20 M.

Zu beziehen durch:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlg., Magdeburg
Postschließfach 148.

Zoologen, Kenner, Liebhabern

wird Gelegenheit gegeben, sich in einer **Seltenheit** aus Siam zu
Nach Feststellung von Herrn Prof v. Hambg. Museum handelt es si eine ganz seltene Art Bartooge Capitoniden, Gattg. Cyanops völlig unbekannt. Es ist ein selten essanter Vogel. Preis 200 ℳ.
1 fingerz. kl. Gelbhaubenkakadu
1 seltener Peru-Sittich, zahm . .
1 Brasl. Glockenvogel . . . .
schöne Kappenblauraben . . . à
1 wundersch. Gelbschnabelmakau
Affen und Papageien stets vo

Herm. Rat
Zoologische Handlun
Hamburg 4,
Sophienstraße 34 Nordsee

In gesunden, gutbefiederten
plaren offeriere:
Calif. Schopfwachteln,
Rote Kardinäle,
Braunohr-Sittiche, Zuc
Wellensittiche,
Mossambik-Zeisige.
Anfrage bitte Rückporto beifüg

Zoologische Großhandl
H. Ditzell,
Leipzig-Gohl., Wilhelmst

Empfehle meine

Nachtigall-Edel-Kana

Jahrgang 1923, Stamm Reich-B
Ausgewählte Ia Sänger zum Pre
70—100 ℳ.
Ferner: schneeweiße und schn
hermelin gezeichnete

Nachtigall-Kanari

zum Preise von 100—120 ℳ.
Aug. Kok, Oldenburg
Langestraße 1.

---

3 erprobte erstklassige Zuchtpaa
Mövchen, P. 14 ℳ, 2 do. Zebr
P. 15 ℳ, grüne junge Wellen
à 5 ℳ hat abzugeben **Bernd**
Lötzen, Ostpr. A. Z.-Mtgl. 26

Offeriere freibleibend in nur e
freien erstklassigen Exemplaren:

Gouldsamandinen, rot- u. schwarzköpfige . .	Paar
Spitzschwanzamandinen	„
Maskenfinken . . .	„
Purpurtangaren . .	„
Tigerfinken	„
Reisfinken	„
Weißkopfnonnen . .	„
Schwarzkopfnonnen .	„
Muskatfinken . . .	„
Silberschnäbel . . .	„
Elsterchen	„
Graunelsänger . . .	„
Moffambikzeisige . .	„
Webervögel	„
Atlasfinken	„
Orangebäckchen . . .	„
Grauastrilden . . .	„
Amaranten	„
Mönchsittiche	„
Wellensittiche grün .	„
Wellensittiche gelbe .	„
Mulucken Kakadu . .	Stück
Schamadrosseln, pr. Sänger	„
Dajaldrosseln . . .	„
Goldstirnblattvogel .	„
Dreifarb. Prachtglanzstare	„
Tarant. Unzertrennliche	Paar

Täglich frische Ameisenei
Porto u. Verpackung z. Selbstkos

Tierhandlung
Max Klein
Berlin NO. 18, Strausberger
Fernruf Alexander 331

Inserate
für das am 31. Juli 1924 z
gabe gelangende Heft 24 d
Welt erbitten bis 26. Juli 19

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Berlin-Hermsdorf; für den Anzeigenteil: Rolf Kretschmann, Magdeburg, Postschließfach
Verlag der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck: August Hopfer, Burg Bz. Magdbg.

Ideal-Vogelstube nach Dr. Karl Ruß

Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Jahrg. 53 | Den 31. Juli 1924 | Heft 24

(Druckort: Burg, Bezirk Magdeburg.)

Zur Frage der Weichfresserfütterung.

Von M. Jacobs.

(Nachdruck verboten.)

Herr Dr. L. v. Boxberger hat in Heft 1 von 1923 in dankenswerter Weise die Frage der Weichfresserfütterung behandelt. Er wird damit manchem Vogelliebhaber einen Dienst erwiesen haben. Die Fütterungsfrage ist nun einmal das Sorgenkind aller Zunftgenossen und jede Förderung dieser Frage findet naturgemäß deren Anerkennung. Die Fütterung ist das ABC der Vogelhaltung, und wer das nicht kennt, soll sich mit der Pflege von Insektenfressern überhaupt nicht befassen, weil er keine Freude daran haben wird. Wie wir aus dem Redaktionsbriefkasten der „Gef. Welt" zur Genüge ersehen können, gehen viele Stubenvögel an Erkrankungen der Unterleibsorgane, also offenbar an falscher Ernährung zugrunde. Es entsteht daher die Frage, wie wir diesen Übelstand beseitigen, und ob es nicht möglich ist, zu einer allgemein werdenden Fütterungsweise zu gelangen.

Die Ursache der Erkrankungen wird in der Hauptsache in unpassenden oder verdorbenen Futtermitteln zu suchen sein. Demnach wird es in erster Linie auf die Auswahl richtiger, d. h. naturgemäßer Futtermittel und sodann auf sorgfältigste Präparierung derselben ankommen. Reine Insektenfresser, wie Nachtigall, Sprosser, Rotschwanz, Rohrsänger, Laubvogel, Schmätzer, Fliegenschnäpper, Würger, Stelzen, Meisen, Goldhähnchen, Zaunkönig müssen vorzugsweise mit animalischen Stoffen, Beeren fressende Vögel, wie Grasmücken, Rotkehlchen, Blaukehlchen vorzugsweise mit Beeren, Lerchen und Braunellen zusätzlich mit Körnerfutter ernährt werden. Im Sommer pflegt man zumeist blank mit frischen Ameisenpuppen zu füttern. Sobald solche nicht mehr erhältlich sind, muß ein Ersatzfutter gewählt werden, d. i. ein Futtergemisch, welches die von dem Vogel benötigten Stoffe enthält. In Ruß' Handbuch II „Einheimische Stubenvögel" sind im Abschnitt „Fütterung der einheimischen Stubenvögel" eine Reihe solcher Futtergemische aufgezählt, die sich vorzugsweise aus gleichen Teilen getrockneter Ameisenpuppen, Weißwurm, geriebenen Weißbrotes, Möhren und gekochten Rinderherzens mit etwas zerquetschtem Hanf zusammensetzen. Das Gemisch wird in der Regel durch die Möhre etwas angefeuchtet gereicht. Bei dieser Fütterung, die regelmäßig wohl nur jeden Morgen erneuert wird, besteht die Gefahr, daß die leicht säuernden Bestandteile, wie Weißbrot und Möhre, bei warmer Witterung über Nacht verderben und in diesem Zustande vom Vogel gefressen werden. Sie hat außerdem den Nachteil, daß der Vogel aus dem Gemisch die ihm zusagenden Bestandteile heraussucht und das Übrige vergeudet. Um diesen Übelstand zu vermeiden, empfiehlt es sich, die einzelnen Bestandteile der Mischung dem Vorschlage des Herrn Dr. v. Boxberger entsprechend im Mörser oder in der Kaffeemühle zu zerkleinern, um auf diese Weise den Vogel zu zwingen, das Gemisch wahllos aufzunehmen. Zur Verhütung der Gefahr der Verderbnis des Futtergemisches bin ich auch Gegner der Anfeuchtung mit Wasser oder dem Saft der Möhre und halte es für zweckmäßig, das Anfeuchten dem Vogel zu überlassen. Ich weiß auch, daß ich mit dieser Ansicht keineswegs allein stehe, denn aus früheren Jahrgängen der „Gef. Welt" habe ich ersehen, daß auch andere Vogelwirte die Trockenfütterung der Anfeuchtung vorziehen. Unter andern verteidigt der verstorbene Vogelhändler Rausch wenigstens beim „Schwarzplättchen" die Trockenfütterung. Er sagt auf S. 122 seines Handbuchs über die gefiederten Sängerfürsten: „Das Mischfutter für die Schwarzplättchen soll stets möglichst trocken und nicht naß sein, weil es sonst sehr leicht Darmkatarrh erzeugt und den Vogel verdirbt. Ich meine, was in dieser Beziehung vom Schwarzplättchen gilt, das muß erst recht für die zarten Insektenfresser gelten. Insbesondere wird auch das „Rheinische Nachtigallfutter" nur mit gutem, reinem Baumöl ganz schwach angefeuchtet, wie auf S. 365 in Ruß' vorerwähntem Handbuch, 2. Auflage, zu lesen ist. Ebenso führen die Händler auf Seereisen nach Ruß ein solches Gemisch, aber an Stelle der Möhren mit Mohnkuchenmehl und anstatt des Baumöls mit Schmalz angefettet. Ein geringer Fettgehalt wird meines Dafürhaltens auch schon allein durch den Zusatz eines geringen Quantums im Mörser gestoßenen Hanfes und Mohnes geschaffen.

Dieses Futtergemisch hat verschiedene, nicht zu unterschätzende Vorzüge: Es kann in großem Vorrat zubereitet werden und hält sich, ohne zu verderben. Da Futterreste bei einem Futter, welches jeden Morgen nur aufgefüllt zu werden braucht, in Wegfall

kommen, hat die Trockenfütterung außerdem den Vorteil der Zeitersparnis.

Wie ich schon sagte, bestanden die Futtergemische für Insektenfresser bislang vorzugsweise aus gleichen Teilen getrockneter Ameisenpuppen, Weißwurm, Möhre und Weißbrot. Auch hier muß meines Erachtens Wandel geschaffen werden, da die Ameisenpuppen von Jahr zu Jahr teurer werden und Weißwurm kaum noch erhältlich ist. Beide Stoffe enthalten das zur Erhaltung der Vögel benötigte Eiweiß. Ist dasselbe in dieser Form nicht mehr oder nur zu verhältnismäßig hohen Preisen zu beschaffen, so muß eben eine Ersatzwahl stattfinden. Ich denke dabei an Maikäferschrot, Heuschreckenschrot, Garnelenschrot, Fischmehl und Fleischmehl. Alle diese animalischen Stoffe enthalten Eiweiß in größerer oder geringerer Menge und sind somit zum Ersatze der Ameisenpuppen und des Weißwurms an sich geeignet. Maikäferschrot habe ich im letzten Jahre, da mir Mehlwürmer, Ameisenpuppen und Weißwurm nicht zur Verfügung standen, bei Unterhaltung meiner vier Insektenfresser, zwei Rotkehlchen, eines Schwarzplättchens und einer Zaungrasmücke, selbst erprobt in einem Futtergemisch von etwa 75 % Maikäferschrot, 15 % Holunderbeeren, 10 % Eierbrot nebst etwas gestoßenem Hanf und Mohn und habe meine Vögel damit sämtlich gut durch den Winter gebracht. Maikäferschrot hat den Vorzug, daß es in Flugjahren des Maikäfers leicht und, wenn man die Käfer selbst sammelt, kostenlos zu beschaffen ist. Es enthält aber, selbst wenn man sich der Mühe unterzieht, nach erfolgter Dörrung der Käfer die unverdaulichen Ober- und Unterflügel, die Beine und die Sporen zu entfernen, was im Handel des dadurch verursachten Zeitverlustes halber kaum geschehen dürfte, reichlich viel Ballast. Herr Vogelhändler Hiltmann teilte mir deshalb auch wohl auf Anfrage mit, daß er seine Insektenfresser niemals mit Maikäferschrot füttern würde. Es bleibt aber in jedem Falle ein Notbehelf.

Mit Garnelenschrot und Fischmehl habe ich selbst noch keine Fütterungsversuche gemacht. Meines Dafürhaltens müßten sich diese Futtermittel als Grundstoff für ein Futtergemisch, dem dann noch etwa 10 % Eierbrot, sowie etwas gestoßener Hanf und Mohn — letzterer zur mehreren Bindung der Ausleerungen — zuzusetzen wären, ebensowohl eignen, wie Heuschreckenschrot. Die Einschaltung dieser an sich viel billigeren Grundstoffe würde auch das Mischfutter verhältnismäßig verbilligen. Obwohl ich mit der Verwendung der Möhre meines Wissens gerade noch keine schlechten Erfahrungen gemacht habe, möchte ich aber doch empfehlen, an Stelle der Möhre der Futtermischung 15 % Holunder- oder Ebereschenbeeren — alles getrocknet und fein gestoßen, der Futtermischung zuzusetzen, da das Beerenfutter der natürlichen Nahrung der Insektenfresser mehr entspricht, als die Fütterung mit Möhren. Alle Beeren fressenden Vögel müßten dann das Beerenfutter als Grundstoff, Eierbrot und den animalischen Stoff als Zusatz erhalten. Zwecks Verwendung des Garnelenschrots und Fischmehl als Futter für feine Insektenfresser müßte natürlich mit Sorgfalt darauf gehalten werden, daß die zu verarbeitenden Garnelen oder Fische möglichst frisch, also bevor sie stinkig werden, zur Dörrung gebracht werden. Ich zweifle nicht, daß dem Handel dann Rechnung getragen werden würde, sobald seitens der Vogelliebhaberei dahingehende Wünsche geäußert würden. Über gute Bezugsquellen für Garnelenschrot, Fischmehl und Heuschreckenschrot bin ich leider nicht informiert, vielleicht kann der eine oder andere Liebhaber darüber Auskunft geben. Um die Fütterungsfrage ein für allemal zu klären, wäre es überall erwünscht, wenn die mit der Fütterung von Garnelenschrot, Fischmehl und Heuschreckenschrot gemachten Erfahrungen jetzt hier zur Sprache gebracht würden, um sie noch bei der bevorstehenden Gewöhnung der Vögel an das Ersatzfutter, die zweckmäßig möglichst frühzeitig einzuleiten ist, verwenden zu können. Nur der Austausch der gemachten Erfahrungen kann die Fütterungsfrage fördern. Daß wir unseren Lieblingen außer dem regelmäßigen Futter auch Abwechslung bieten, ergibt sich daneben von selbst. Mein Müllerchen erhält jeden Morgen die Sahne von der gesottenen Milch und vom Mittagessen ab und zu etwas gekochte Kartoffel, auch Milchreis, ferner regelmäßig eine Feige oder sonstige Früchte, als Birnen, Stachelbeeren u. dgl. zum Auspicken, im Winter auch jeden Morgen einige Teelöffel voll gesottener Milch. Mit Vorliebe frißt es aus Gries hergestellte sog. Schwemmklößchen. Vorteilhaft wird es auch sein, die Vögel, wie Herr Dr. v. Boxberger empfiehlt, zuweilen mit rohem Fleisch zu füttern. Herr Pastor Schwabe in X. bei Gotha setzt dem Mischfutter mit gutem Erfolge etwas Knochenmehl zu. Vielleicht ist dieser Zusatz der Fütterung mit Ei- oder Sepiaschale vorzuziehen. Ich zweifle auch nicht daran, daß die Fütterung mit Knochenmehl vorteilhaft auf die Mauser wirken wird. Mehlwürmer habe ich in den letzten Jahren nicht gefüttert, weil ich keine hatte. Man sieht also, daß es auch ohne Mehlwürmer geht. Nachdem ich meinen Bestand an Insektenfressern neuerdings um einige Häupter vermehrt habe, erschien es mir aber doch zweckmäßig, meine Mehlwurmhecke wieder einzurichten. Inzwischen ist es mir auch gelungen, ein Mittel zur längeren Konservierung frischer Ameiseneier zu finden. Da ich sie mir selbst beschaffen muß, wird vielleicht manchem Vogelliebhaber damit gedient sein, zu erfahren, wie man am einfachsten in den Besitz derselben gelangt. Man gebraucht dazu einen Gänsefittich, um die in der Nähe des einhaltigen Ameisenhaufens anzulegenden mehreren Fang- oder Sammelplätze zu säubern, mehrere Servietten je 40 cm im Quadrat oder gleichgroße Zeitungen, von denen je eine auf jeder Sammelstelle ausgebreitet wird, eine Anzahl trockener Fichtenzweige, welche man an Ort und Stelle von den Fichten sammelt, und ferner ebensoviel Zeitungen, als Sammelstellen vorhanden sind. Nun legt man an jeder Sammelstelle etwa 5 bis 6 Fichtenzweige auf die Serviette oder Zeitung übereinander und breitet dann oberhalb dieser Fichtenzweige wieder eine Zeitung aus, um mehrere Hände voll Ameisenpuppen nebst den Ameisen, die man vermittels eines geräumigen Taschentuches aus dem Ameisenhaufen herbeiholt, darauf zu legen. Man kann gleichzeitig immer mehrere solcher Sammelstellen anlegen. Die Ameisen suchen nun ihre Brut zu

bergen und tragen sie fein säuberlich auf die unter dem Fichtenreisig ausgebreitete Serviette oder Zeitung. Entfernt man nun nach Verlauf von $^1/_2$—1 Stunde von jeder Sammelstelle das Reisig mit dem darauf ausgebreiteten Ameisenmulm, um ihn wieder zum Haufen zu schaffen, was geschehen muß, um das Volk nicht zu sehr zu schwächen; so kann man die auf der Serviette oder der an ihrer Stelle ausgebreiteten Zeitung Eier in die eigens dazu mitgebrachte Düte sammeln. Nicht verhindern läßt es sich, daß einige wenige Ameisen ihre Brut begleiten, ebensowenig daß sich infolge der Manipulation mit den ihre Brut durch Ameisensäure verteidigenden Tierchen nachträglich die Finger etwas schälen. Daran muß man sich gewöhnen. Schüttet man die Ameisenpuppen nunmehr in einen eisernen oder irdenen Topf und setzt sie darin am luftigen Fenster den heißen Sonnenstrahlen aus, so erreicht man, daß sie sich viele Wochen lang halten, ohne zu verderben, sie trocknen nur etwas ein. Wer es nicht glaubt, möge selbst die Probe darauf machen.

Abttangare (s. unten).

Neueinführungen und Seltenheiten.

Von Karl Neunzig.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Ein anderer kleiner Webefink aus Abessinien, der

Abessinische Amarant — Lagonosticta senegala carlo *Zedl.*

ist gleichfalls im Vogelhause zu finden. Er unterscheidet sich von dem westlichen Amaranten durch intensivere Färbung des Rot der Unterseite, brauner Oberseite und tieferes Rot des Bürzels. In den Maßen kaum von der typischen Form unterschieden. Seine Verbreitung erstreckt sich über das Hauaschthal und Nordsomaliland.

Eine bisher noch nicht eingeführte Tangara brachte August Fockelmann, Hamburg-Großborstel, auf den Markt, die prächtig gefiederte

Abttangare — Tanagra abbas *Licht.*

„Im Freileben", so berichtet Federico Eichlam („Die in Guatemala vorkommenden Tangaren", „Gef. Welt" 1901) „gehört diese Tangare zu den gewöhnlichsten Erscheinungen und ist überall heimisch, in den Gärten, in nächster Nähe der Städte, wie im Urwald, an der Küste und in den Tälern, wie in der höchsten Gebirgsregion. Die gelbgebänderte Tangare" — Eichlam gibt ihr diesen Namen wegen der gelben Binde auf den Schwingen — „ist Standvogel, und doch wird sie oftmals durch Nahrungsmangel gezwungen, ihren Standort zu verlassen und während der Trockenheit vom Gebirge in die Niederungen zu gehen, wo infolge der Niederschläge das ganze Jahr der Tisch gedeckt bleibt. Besonders wenn vom Norden der Zedernvogel" — der amerikanische Seidenschwanz — „eintrifft (dieser Vielfraß hat nämlich in wenigen Tagen mit allem Genießbaren aufgeräumt), verschwindet die Tangara auf einige Wochen, kommt aber bei erster Gelegenheit wieder zurück. In der Freiheit scheint die Hauptnahrung in Früchten zu bestehen, besonders lieben die Vögel die Früchte des Jokotebaumes, an welchem sie teilweise erheblichen Schaden anrichten können. Aber auch Insekten und Sämereien werden nicht verschmäht. Letztere bilden sogar zu bestimmten Zeiten die ausschließliche Nahrung des Vogels. Das Nest ist vorherrschend auf hohen Fruchtbäumen mit dichten Kronen in einer Astgabel in der Nähe des Stammes angebracht, aber auch in den Blattwinkeln hoher Palmen ist das Nest zu finden. Die Nistperiode beginnt im April mit einem Gelege von meistens drei weißen (?) Eiern, welche nach Angaben anderer ganz fein rot gepunktet sein sollen." Bezüglich der Eifarbe will Eichlam noch weitere Beobachtungen anstellen. „Das Nest ist im dichtesten Gezweig überaus locker aus dürren Halmen und Würzelchen errichtet." Die Nester der meisten Tangaren sind sehr leicht gebaut, sie sind aber so geschützt angelegt, daß Regen und Wind den lockeren Bau nicht leicht zerstören können. Häufig nisten mehrere Paare auf einem Baum. Nach Erledigung der zweiten Brut ist gegen Ende Juli meist das Brutgeschäft beendet. „Die gelbgebänderte Tangare hat ein viel lebhafteres Temperament als alle

anderen Arten, keinen Augenblick sitzt der Vogel still. In der Gefangenschaft gewöhnt sie sich rasch ein und ist hier kein Kostverachter. Ich käfigte im Laufe der letzten Jahre sehr viele Vögel dieser Art und ich hatte auch anfänglich infolge ihrer ausgesprochenen Dreistigkeit viel Freude an ihnen. Sie wurden gleich in den ersten Tagen zahm, fraßen Bananen, eingeweichtes Weißbrot, eihaltiges Weichfutter und hin und wieder einen kleinen Käfer, dabei blieben aber Bananen die Hauptnahrung. Doch leider gingen mir alle Vögel stets innerhalb Jahresfrist an ein und derselben Krankheit zugrunde und wurden bei bester körperlicher Beschaffenheit blind, indem ein dicker weißer Belag plötzlich die Augen überzog, dem alsdann in wenigen Tagen der Tod folgte. Aber selbst die erblindeten Vögel wußten das Futter noch zu finden, allerdings blieben sie alsdann in möglichster Nähe des Futterplatzes sitzen. Ich glaube aber, daß diese Tangare viel ausdauernder ist und die von mir beobachtete Hinfälligkeit nur auf unrichtige Ernährung und damit verbundener Blutzersetzung zurückzuführen gewesen ist.

Meine Vögel erfreuten sich stets eines großen, gesunden Flugraumes, und ich bin nunmehr gewillt, demnächst diese Tangaren im Käfig zu halten, um besondere Beobachtungen und Versuche betreffs ihrer Ausdauer und Ernährung anzustellen. Die auf den Markt gebrachten Vögel sind meistens sehr billig und für etwa 50 Pf. für den Kopf käuflich, doch befinden sich die so angebotenen Vögel größtenteils in einem überaus zerlumpten Gefieder, da die Käfige fast ohne Ausnahme überfüllt sind. Längere Zeit so untergebrachte Vögel beißen sich gegenseitig tot oder hacken sich die Haut vom Kopfe, so daß unter blutigen Rändern die nackte Hirnschale zum Vorschein kommt. In einem größeren Raum ist diese Tangare verträglich und ich konnte nie derartige böse Raufereien beobachten . . ."

Die Erfahrungen, welche Eichlam mit der Abttangare in der Gefangenschaft gemacht hat, entsprechen den Mitteilungen, welche die deutschen Liebhaber mit den Vögeln der Gattung Tanagra gemacht haben. Einzeln im Käfig gehalten sind sie wenig anmutig, aber im großen Flugraum, in dem sie friedlich mit allen Vögeln, auch mit der eigenen Art, leben, entfalten sie den ganzen Reiz ihres Wesens und die Pracht ihres Gefieders.

Ihre Verbreitung erstreckt sich über das südliche Mexiko, durch Guatemala, Brit. Honduras, Honduras bis zum Segoviafluß.

Gefiederbeschreibung: ♂ Kopf, Hals kobaltblau, etwas ins Purpurblaue gehend, nach der Kehle zu trüber und etwas ins Graue gehend; Zügel schwarz; Rücken oliv, bei gewissem Lichteinfall mit bläulichem Schein, die Federmitten schwärzlich, eine schuppenartige Zeichnung hervorbringend; Schulterfedern, Bürzel, Oberschwanzdecken satt gelblicholiv, letztere beiden grau überlaufen; übrige Unterseite reiner gelblicholiv, vorn und an den Seiten mehr oder weniger purpurblau glänzend; kleine Flügeldecken bläulicholiv, mittlere und große olivgelb, letztere schwach bläulich gespitzt; Flügelbug, Handdecken schwarz, schmal blau gesäumt; Schwingen schwarz mit Ausnahme der äußersten und den drei inneren Handschwingen an der Wurzel leuchtend gelb, welches bei den Armschwingen z. T. von den Armdecken verdeckt ist; Unterflügeldecken fahl gelb, außen breit bläulicholiv gerandet; Schwanzfedern schwarz mit trüb olivfarbenen Außensäumen, welche am Grunde breiter sind; Schnabel schwarz. Grund des Unterschnabels bläulichgrau; Auge dunkel; Füße schwarz. Lg. 168, Fl. 98, Schw. 68, Schn. 12, Lf. 22 mm.

♀ kleiner, dem ♂ ähnlich, das Blau trüber, das schwarze Gefieder matter.

Jugendkleid oberseits graoliv, auf dem Rücken dunkler; unterseits mattoliv, nach hinten gelblich; Flügel, Schwanz mattschwarz; das Gelb auf den Flügeln trüber und weniger scharf begrenzt.

Zwei bisher noch nicht eingeführte ostafrikanische Glanzstare, welche dem großen abessinischen Tiertransport, der in den Berliner Zoolog. Garten gelangte, entstammen, zeigen die Abb. auf S. 189 u. S. 190.

Einer der farbenprächtigsten Glanzstare, der in mehreren Stücken im Vogelhaus des Zoolog. Gartens untergebracht ist, der

Königsglanzstar — Cosmopsarus regius *Rchw.*,

ist erst seit dem Jahre 1879 bekannt und zuerst von Reichenow beschrieben worden. Die Angehörigen der Gattung Cosmopsarus *Rchw.* unterscheiden sich von denen der bekannten Gattung Lamprotornis hauptsächlich durch ihre schlankere Gestalt, die schmaleren Federn des gestuften Schwanzes und den Charakter der Färbung. Ihr gehören zwei in Ostafrika lebende Arten an.

Unter den in wunderbar metallfarbenschimmernden Glanzstaren ist der Königsglanzstar einer der schönsten. Die Stärke des seidenartigen Glanzes und die satte Färbung des zarten Gefieders wird von keinem andern übertroffen. Wunderbar wirkt der Gegensatz des blauen, grünen, veilchen- und bronzefarbenen Gefieders zu dem seidigen Goldgelb des Unterkörpers des schlanken Vogels. Elliot sagt: „Er ist eine der auffallendsten Erscheinungen, wenn sein prächtiges Gefieder in den Sonnenstrahlen glänzt."

Fischer berichtet, daß er „diesem prachtvollen Glanzstar" zweimal in lichten Akazienhainen in Flügen von 6—8 Vögeln begegnet sei. Er ist sehr scheu, was auch Elliot bestätigt, und vorsichtig. Im Fluge wird meistens der Schwanz fächerartig ausgebreitet getragen. Den Magen eines erlegten Exemplars fand Fischer angefüllt mit Termiten, und zwar mit den großen schwarzen, welche kräftige Zangen besitzen. Erlanger nennt ihn eine häufige Erscheinung in der Nähe eines Ortes in Abessinien. Er fand die Nisthöhle dieses Stares in einem dürren Baumaste, vier Meter über dem Boden, „das Nest war aus Rindenbast, Halmen und wenig Blättern verfertigt, aber — anfangs April — noch leer. Die beiden Vögel flogen mit Baustoff ein und setzten sich selbst auf den Baum", während einer der Begleiter Erlangers die Nisthöhle erweiterte. Ein zweites Nest wurde andern Tags gefunden. Es stand 80 cm über dem Boden in einer Baumspalte und konnte von oben eingesehen werden. Es war aus feinen Wurzeln, Federn und Stücken Schlangenhaut erbaut und enthielt zwei von den Jungen, welche im Begriff waren, auszuschlüpfen, bereits geöffnete Eier. „Die hübschglänzenden Eier sind schön hellblaugrün gefärbt und spärlich und fein, äußerst blaß rost- und lehmfarben gefleckt (25 × 19 mm).

Die Verbreitung erstreckt sich über Ostafrika von Somaliland bis zum Pangani.

Gefiederbeschreibung: ♂ Kopf, Hals stahlgrüngläuzend, Ohrgegend bläulich; schmaler Zügelstrich schwarz; Rücken, Oberschwanzdecken stahlblau; Kropfgegend kupferrötlich; übrige Unterseite mit seidenartig glänzend Goldgelb; Flügelfedern stahlblau mit veilchenfarbenem Glanz; Unterflügeldecken goldgelb, außen stahlblau; Schwanzfedern bronzeglänzend; Auge weiß; Schnabel, Füße schwarz; Lg. 280—340, Fl. 120—135, Schw. 170—215, Schn. 19—22, Lf. 30—32 mm.

♂ dem ♀ ähnlich, kleiner.

Jugendkleid: Kopf, Hals, Rücken braun; Unterkörper trüb und fahlgelb. (Fortsetzung folgt.)

Erinnerungen an meine Gartenvoliere.

Von Adolf Voigt, Jena.

(Schluß.) (Nachdruck verboten.)

Ich will nun auf meine Zuchtergebnisse etwas näher eingehen. Zunächst wirkte die — allerdings beschränkte — „Freiheit" in dem großen Flugraum, der freien ungehinderten Sonne, auf die Wellensittiche. Sie waren wie umgewandelt, sobald sie aus der Stube kamen! Von früh bis spät lebendig flogen und kletterten sie, kosten sich, schrien und sangen. Der Wellensittich ist so recht der Vogel für Gartenvolieren, hier fühlt er sich wohl, hier kommen alle seine Schönheiten, sein ganzes liebenswürdiges Gebaren voll zur Geltung. Bald verschwand ein Weibchen im Nistkasten, um nur ab und zu mal diesen zu verlassen, stets begleitet von dem zärtlichen Gatten, der sich in Liebkosungen, Singen, Aus-dem-Kropf-füttern, gar nicht erschöpfen konnte.

Das erste Gelege enthielt fünf Eier, die Brut begann sofort nach Ablage des ersten Eies. Dies war bei allen Bruten der Wellensittiche der Fall, so daß stets Eier und Junge der verschiedensten Altersklassen vorhanden waren. Als Aufzuchtfutter wurde gereicht weiße Hirse, Glanz, wenig Mohn und Hanf, täglich einige frische Ameisenpuppen. Eierbrot wurde nicht angenommen, ebensowenig gequollene trockene Ameisenpuppen. „Grünzeug" gab ich täglich in nicht allzu großen Mengen, um Durchfall zu verhüten. Während die anderen Körnerfresser viel Grünzeug bei der Aufzucht der Jungen vertragen, kommt es doch oft vor, daß junge Wellensittiche daran eingehen. Gern wurden auch Mehlwürmer verzehrt. Ich hatte oft bis 30 junge Wellensittiche und habe auch verschiedene Junge dem Nistkasten entnommen, von denen zwei später sprechen lernten. Der eine lebt noch heute in Berlin im Alter von 11 Jahren und spricht ganze Sätze. So ein Flug von 20—30 Wellensittichen in einer großen, von der Sonne durchfluteten Gartenvoliere bietet ein Bild, dessen Farbenwirkung man einfach nicht schildern kann.

Auch die Gimpel erwiesen sich bei mir als fleißige, zuverlässige Brüter. Sie erbauten in einem Wacholderbusch 1910 ein Nest, das bald vier Eier und nach der üblichen Brutzeit vier Junge enthielt. Das Männchen hatte sich so bösartig gezeigt, daß ich sie von den kleineren Vögeln getrennt hatte. Als Aufzuchtfutter verwendeten die Alten sehr viel Unkrautsämereien aller Art: Vogelmiere, Kreuzkraut, Melde, Löwenzahn, halbreife Getreidearten und Schwarzwurzelsamen, vom üblichen trockenen Futter wurde sehr wenig genommen, dagegen wurden frische Ameisenpuppen und Mehlwürmer viel verzehrt. Alle mit Blattläusen besetzten Zweige und Blätter wurden besonders gern entlaust, ich hatte Melde, die stark mit schwarzen Läusen besetzt war, und gerade diese Läuse wurden besonders gern gefressen. Auch die ausgeflogenen 2,2 Jungen hielten sich an das In-

Königsglanzstar (s. S. 188).

sekten- und Grünfutter, vermauserten gut und wurden z. T. im nächsten Jahre wieder mit Erfolg zur Zucht verwendet. Bis in die 3. und 4. Generation habe ich so von diesem Stamme gezüchtet. Das Rot der Männchen war stets sehr lebhaft, dagegen ist es mir nur einmal gelungen, bei einem Bluthänfling wieder das schöne Rot hervorzubringen.

Auch die Grünfinken züchtete ich mit vollem Erfolg. Sie fraßen wenig Insekten, dagegen nur halbreife Sämereien während der Aufzucht der Jungen.

Bastarde zog ich von Stieglitz und Kanarienvogel, und zwar fütterte das Stieglitzmännchen fleißig die Jungen mit Insekten.

Die Kanarien bauten ein freistehendes Finkennest im Wacholder. Ende April 1912 brütete das Weibchen, es kam Regen und Schnee ins Nest, trotzdem ließ es sich nicht stören, die drei Jungen entwickelten sich bei Insektenfutter schnell und gut. Sehr viel Grünfutter nahmen auch die Kanarien, Rübsen wurde von keinem einzigen Vogel jemals gefressen, ich habe

deshalb nie wieder welchen gekauft. Der Gesang der unter all den anderen Vögeln aufgewachsenen Kanarienjungen war sehr hübsch, ein Potpourri von Stieglitz-, Hänfling- und Kanariengesang. Zahm wurden besonders Zeisige und Gimpel, sie kamen stets auf den in der Hand gehaltenen Futternapf und holten sich dort Leckerbissen. Die prächtigen Dompfaffen weiterzuzüchten, und zwar gewissermaßen wie Kanarien, wäre eine dankbare Aufgabe, zu der ich anregen möchte. Lernen doch gepäppelte Gimpel Lieder pfeifen, warum sollte da derselbe Gimpel nicht auch ein guter Sänger werden und den Gesang vererben? Der jetzige Kanariengesang hat mit dem des wilden Kanarienvogels auch nicht das geringste zu tun.

Gehäubter Rotflügelglanzstar (Text f. folgendes Heft).

Etwas ausführlicher will ich noch vom Füttern sprechen: Ich gab nie gemischtes Körnerfutter, sondern stets in allen Volieren jedes Futter in einem besonderen Napf. Kleine Blumenuntersetzer, die für 10 Pfg. pro Stück zu haben waren, hatte ich dutzendweise angeschafft. Für Wellensittiche und kleine Ausländer gab ich Hirse und Glanz. Einige Versuche mit der billigeren deutschen bunten Hirse brachten mich zur Überzeugung, daß man trotzdem billiger wegkommt, wenn man Ia weiße, großkörnige Silberhirse füttert. Die Vögel fressen von der kleinen, gelben Hirse noch einmal so viel und befinden sich bei der weißen Hirse viel wohler. Auch vom Glanz gilt dies, man sollte den anscheinend teureren, ganz hellen Glanz bevorzugen, da er viel besser nährt, dünnere Schale und mehr Kern hat, so stellt sich seine Verfütterung auch nicht teurer als die des geringeren, bräunlich-gelben. Hafer nahmen die Wellensittiche ab und zu an, doch nur besten, ungeschälten Saathafer. Auch Mohn, Hanf, Sonnenrosenkerne und Negersaat wurde gereicht. Letztere fraßen alle Vögel leidenschaftlich gern, sie enthält sehr viel Fett. Fichten-, Birken- und Erlensamen wurde von unsern Körnerfressern, ab und zu auch von den Ausländern gefressen. Ich kaufte ihn in der Klengelanstalt mit höchster Keimkraft, dabei hatte ich dann Gewißheit, daß er möglichst frisch war. Salatsamen zog ich selbst und verfütterte ihn an alle Vögel in allen Reifestadien, ebenso den noch wenig als Vogelfutter bekannten Schwarzwurzelsamen, der indes nur halbreif, dann aber sehr gern von Stieglitzen, Zeisigen, Hänflingen und Gimpeln gefressen wird. Rübsen fraß kein Vogel, wie ich schon erwähnte. Da in einer großen Voliere die Gefahr des Fettwerdens nicht besteht, ließ ich ihn fort und entzog den Vögeln nur ab und zu mal dieses oder jenes Futtermittel. Kalk nahmen sie von den Wänden und in Form von zerstoßener Eierschale. Ich bin jedoch im Zweifel, ob der Kalk in unorganischer Form wirklich imstande ist, zum Aufbau des Tierkörpers oder doch wenigstens der Eischale zu dienen. Halbreife Unkraut- und Getreidesamen von unseren kalkreichen Bergen um Jena vermögen dies sicher besser, deshalb gab ich diese den ganzen Sommer hindurch, und zwar täglich 1—2 Eimer voll. Im Winter gab es Nadelholz- und Obstbaumzweige mit Knospen. Grünfutter säte sich stets in Hülle und Fülle selbst aus, der Boden der Volieren war stets grün, und hier holten sich die Vögel auch allerlei kleine Kerbtiere, die aus dem Garten immer wieder einwanderten. Gartenameisen wurden im Sommer mit Puppen und Erde mittels der Schaufel einfach hineingeschippt und fanden sofort „Abnehmer“. Auch die Kerfe selbst wurden verzehrt. Ich habe an manchen Tagen infolge von Grün- und Insektenfütterung fast gar kein Körnerfutter nachfüllen brauchen, so wenig hatten die Vögel davon gefressen. Eierbrot und gequellte Ameisenpuppen wurden nur selten und wenig angenommen, da im Sommer zur Brutzeit fast stets lebende Insekten vorhanden waren. Nur die Weichfresser in den Käfigen bekamen dies. Zeitweilig ließ ich auch Blaukehlchen, Amsel, Schwarzplättchen in der Voliere fliegen, die Amsel natürlich nur bei den Nymphensittichen. Versuchsweise setzte ich einige Wellensittiche dazu und auch diesen hat die Amsel nie etwas zuleide getan.

Viel mehr Zuchterfolge als mit „Einheimischen“ hatte ich mit den Ausländern. Die Zebrafinken, kleine, immer bewegliche, prächtig buntgefärbte Amandinen brachten gleich im ersten Jahre und dann alljährlich mehrere Bruten gut auf. Die gezüchteten Jungen dienten dann als Tauschobjekte für die Erwerbung anderer Vögel. Auch sie nahmen als Aufzuchtfutter besonders gern frische Ameisenpuppen, daneben zerschnittene Mehlwürmer und Eierbrot.

Japanische Möwchen züchtete ich sowohl in der Voliere als auch im Käfig. Es sind zarte, verweichlichte Tiere. Ich versuchte, durch Kreuzung mit einem Bronzemännchen und Weibchen (der ursprünglichen Stammutter der Möwchen)*) wieder neues Blut hineinzubringen, doch verhinderte der Krieg die Versuche. In der Voliere erlebte ich es auch mal, daß Silberschnäbelchen und Möwchen gleichzeitig brüteten und dann Junge hatten. Zwischen den jungen Möwchen fand sich ein Silberschnabelbastard, der also die Eheirrung des Möwchenweibchens bewies. Auch die prächtigen, kleinen, roten Amaranten züchtete ich mit Erfolg. Sie fingen sich, als Junge im Nest waren, den ganzen Tag über kleine Insekten, die sich am Boden der Voliere aufhielten und fütterten sie. Während mir Bruten des kleinen Elsterchens nicht glückten, brüteten Zwergelsterchen einmal mit Erfolg. Auch die Bandfinken, die ich in der zweiten Voliere hielt, machten mehrere erfolgreiche Bruten, ebenso die Mossambikzeisige. Das Männchen des Mossambikzeisigpaares war ein arger Raufbold und deshalb mußte dies Paar auch von den Prachtfinken getrennt werden. Der Gesang ist sehr schön, lauter und feuriger als der unseres Zeisigs.

Tigerfinken bauten wohl, doch kam es nie zum Nisten; ebensowenig Erfolg hatte ich mit den Sonnenvögeln, den Schmetterlingsfinken, den Reisvögeln, den Blutschnabelwebern, den Nymphensittichen und den Weißkehlpfäffchen. Interessant waren die Nester des Blutschnabelwebers: Im ersten Jahre noch ungeschickte „Knüpfarbeiten", im zweiten schon nesterähnliche Gebilde, im dritten Jahre wahre Kunstwerke! Übrigens ist es nicht ganz gefahrlos, junge Wellensittiche in einem Raume fliegen zu lassen, in dem sich Webernester befinden. Ich habe es erlebt, daß sich ein Wellensittich darin erdrosselte, ein zweiter hing an einem Beine fest, konnte aber noch befreit werden. Ich ging 1914 dann dazu über, die Zahl der Vögel zu verringern und neben guten Zuchtpaaren ab und zu ein Paar seltenere Prachtfinken zu erwerben, aber durch den Ausbruch des Krieges wurde nichts mehr daraus und ich löste dann meinen ganzen Vogelbestand auf. Dazu kam der Umzug in ein neues Einfamilienhaus. So schlief denn die Vogelhaltung bei mir einige Jahre und nur einzelne Rotkehlchen, ein Kreuzschnabel, ein Hänfling, ein Zeisig, auch hin und wieder mal eine Braunelle hielt ich bis 1922.

Nun ist mein Sohn erwachsen und erfreulicherweise tritt er in die Fußtapfen von Vater, Großvater und Urgroßvater. Mit Zebrafinken und Wellensittichpaaren beginnt er die Passion des Vaters aufzunehmen, trotz aller Ungunst der Verhältnisse. Und wenn man heute auch als Minderbegüterter auf andere Passionen verzichten muß, so ist doch die Vogelhaltung wohl geeignet, andere, oft zweifelhafte „Genüsse" zu ersetzen.

Wanderelster
(s. Redaktionsbriefkasten K. P., Worms).

*) Es ist zweifellos, daß die japanischen Möwchen von einem der als „Bronzemännchen" bekannten Webefinken abstammen. Man unterscheidet aber eine ganze Reihe von Bronzemänchenarten. Welche von diesen die Stammeltern des Möwchens sind, steht bisher noch nicht fest. N.

Kleine Mitteilungen.

Für die Leser der „Gef. Welt" wird es von Interesse sein, zu erfahren, daß es auch mir heuer gelungen ist, von einem Paar **blauen Wellensittichen**, die ich durch das ganz besondere Entgegenkommen des Herrn Emmerich Häusler, Tierhändler in Wien, im Dezember 1923 erwerben konnte, sehr schöne Nachzucht zu erzielen. Die alten Tiere wurden in sehr mäßig erwärmtem Zimmer überwintert, können also, da sie hier Temperaturen von nur 8—10° C ausgesetzt waren, durchaus nicht als weichlich bezeichnet werden. Das erste Gelege bestand aus 8 Eiern, wovon 6 schöne blaue Junge erzielt wurden; die zuerst gelegten Eier waren unbefruchtet. Züchtung erfolgte im Kistenkäfig im Freien, Größe 100×80×120 cm in Berlepschschen Nistkasten.

Norbert Grasl, A. Z. Nr. 41.

Vom tarantinischen Unzertrennlichen und vom Rußköpfchen. Auf die Mitteilungen des Herrn Lichtenstaedt betr. tarantinische Unzertrennliche in Heft 16 und 22 möchte ich an dieser Stelle nicht näher eingehen, kann mich aber nicht enthalten, allen Liebhabern diese nach den von meinen Freunden und mir gemachten Erfahrungen als mit Wellensittichen und allen andern Vögeln durchaus verträglich und in jeder Hinsicht zur Haltung anregend zu empfehlen. Dies um so mehr, als bei dem letzten Transport wenig Verluste zu verzeichnen waren, ganz im Gegensatz zu dem vorhergehenden. — Näher eingehen möchte ich auf die an den Leserkreis gerichtete Frage: „Wo bleiben die entzückenden Rußköpfchen?" Die Antwort lautet auf einfachste Weise, sie bleiben da, wo sie geboren werden. — Es werden im Auslande, insbesondere England, sehr vereinzelt Rußköpfchen angeboten, doch handelt es sich hierbei fast ausnahmslos um in der Gefangenschaft gezüchtete und somit Nachkommen der vor dem Kriege importierten. Der letzte Südafrikatransport der Firma August Fockelmann bedeutete für alle daran interessierten Liebhaber eine große Enttäuschung, da ursprünglich beabsichtigt war, neben den vielen begehrten

Astrilden auch Rußköpfchen u. a. Unzertrennliche herüber zu bringen. Merkwürdigerweise befand sich nichts von all diesem darunter. Wie mir der langjährige Reisende der Firma, Herr Voß, erzählte, hätte er zweimal Rußköpfchen gekauft, doch beide Male keine Gelegenheit gehabt, dieselben des Ausfuhrverbotes wegen herauszuschaffen. Das zweitemal wäre es nicht einmal möglich gewesen, die Tiere über die Grenze in das portugiesische Lorenzo Marques zu schaffen. Hätte mir Herr Voß, ein durchaus vertrauenswürdiger Mann, diese Erklärung nicht selber gegeben, so würde ich sie nicht geglaubt haben, zumal doch andere Vögel, wie verschiedene Weichfresser, Rotkopfamandinen, Alariofinken, div. Weber und Widas mitgekommen waren. Wenn man bedenkt, daß die Heimat Rhodesien, insbesondere der nordwestliche Teil, ist, so kann man sich die Schwierigkeit der Erlangung schon vorstellen. Die Aufkäufer in Kapstadt und andern Küstenstädten erwerben die Vögel gemeinhin von Eingeborenen. Die Reisenden der Importfirmen kaufen zum Teil von diesen Aufkäufern drüben. Sollen ganz besonders seltene Vögel aus bestimmten Verbreitungsgebieten, in diesem Falle also Rußköpfchen, angeschafft werden, so müssen hierzu Fänger besonders beauftragt werden, falls der Reisende nicht vorzieht, den Fang selber zu übernehmen. Ein Blick auf die Landkarte besagt ohne weitere Erklärung die Schwierigkeit einer solchen Reise ins Innere. Und dazu jetzt noch das Ausfuhrverbot! Nicht einmal nach England, das doch ganz andere Interessen in Afrika hat, gelangen Rußköpfchen. Wenn es einem findigen Importeur gelingt, einen Schwarm dieser und anderer zum Teil überhaupt noch nicht eingeführter Unzertrennlicher — Agapornis zenkeri, fischeri, personatus, lilianae — nach hier zu bringen, so dürfte derselbe ein glänzendes Geschäft gemacht haben. Durch die Liebenswürdigkeit eines bekannten Wiener Liebhabers gelangte ich in den Besitz von Rußköpfchen, die friedlich mit allen andern die große Voliere bewohnen und von denen ich in zwei Bruten bisher einmal fünf und das zweitemal sieben Eier erhielt, die sich nach eifriger Bebrütung leider als unfruchtbar herausstellten. Nach Austausch des Männchens hoffe ich in diesem Jahr einen weiteren Zuchtversuch anstellen zu können. A. Krabbe.

Sprechsaal.

(Steht den Abonnenten kostenlos zur Verfügung.)

Antworten.

Auf Frage 7: Schon während der Brutzeit erhalten meine Möwchen neben dem üblichen Körnerfutter, bestehend aus Hirse und Glanz, ab und zu ein wenig Eifutter, welches ich zwei Tage vor dem Schlüpfen der Jungen regelmäßig reiche. Das Eifutter wird aus fein gehacktem hart gekochten Eigelb (kein Weißei) und Eierbrot zubereitet. Früher mengte ich unter das Eifutter gequellte Ameisenpuppen, jedoch gingen viele Junge dadurch ein. Seitdem ich die Ameisenpuppen weglasse, habe ich keine Verluste mehr zu verzeichnen. Die Ameisenpuppen setzten sich nämlich am Ausgang des Kropfes fest und verstopften diesen, so daß keinerlei Nahrung in den Magen gelangen konnte, und die Jungen starben allmählich. Sind die Jungen erst älter, so kann man ihnen unbesorgt Ameisenpuppen reichen, diese werden ihnen dann nicht schaden. Man kann aber auch die Puppen durch ein scharfes Sieb reiben, in welchem die Häute zurückbleiben, und vermengt nur den durchfallenden Kern der Ameisenpuppen mit den üblichen Stoffen.

Artur Schiebe, A. Z. 282.

Vom Vogelmarkt.

Von seltener auf den Vogelmarkt kommenden Vögeln werden angeboten:

Zoologische Großhandlung H. Ditzell, Leipzig-Gohl., Wilhelmstr. 68: Kalif. Schopfwachteln, Rote Kardinäle, Zuchtpaar Braunohr-Sittiche.

Max Kleinert, Berlin NO 18, Strausberger Str. 13: Gouldsamandinen, rot- u. schwarzköpfige, Spitzschwanzamandinen, Maskenfinken, Purpurtangaren, Weißkopfnonnen, Schwarzkopfnonnen, Atlasfinken, Orangebäckchen, Mönchsittiche, Molukken-Kakadu, Schamadrosseln, Dajaldrosseln, Goldstirnblattvogel, dreifarb. Prachtglanzstare, Tarant. Unzertrennliche.

Aug. Kok, Oldenburg i. O., Langestraße 1: Nachtigall-Edel-Kanarien, schneeweiße und schneeweißhermelin gezeichnete Nachtigall-Kanarien.

Herm. Rath, Zoologische Handlung, Hamburg 4, Sophienstraße 34, Nordsee 3385: 1 kl. Gelbhaubenkakadu, 1 Peru-Sittich, zahm, 1 Brasil. Glockenvogel, Kappenblauraben, 1 Gelbschnabeltukan.

Herrn R. S., Weinheim. Von Sittichen sind bisher gezüchtet: Wellensittich*, Nymphen-*, Schwalben-, Ziegensittich, Spring-, Alpen-, Bourk-, Fein-, Schmuck-, Klippen-, Schön-, Sing-*, Vielfarben-, Paradies-, Blutbauch-, Blaßkopf-*, Rosella-*, Pennant-*, Stroh-*, Gelbbauch-*, Barnard-*, Ringsittich*, Rotflügel-, Königs-, Schild-, Bergsittich, großer Alexander-, Halsband-, Pflaumenkopf-, Rosenkopf-, Rosenbrustsittich, Sonnen-, Jendaja-, Karolina-, Nanday-, Goldstirn-, Weißkopf-, Blumenau-, Tovi-, Mönch-*, Katharinasittich, Sperlingspapagei. — Im ungeheizten frostfreien Zimmer können alle Arten überwintert werden, wenn sie völlig gesund und kräftig sind. Bei den mit * bezeichneten ist diese Art der Überwinterung mehrfach erprobt.

Herrn J. F., Karlsruhe. Die Oberseite des Männchens der Wanderdrossel ist bräunlich schiefergrau, die Federn des Oberrückens haben meist schwärzlichen Mittelfleck. Beim Weibchen ist die Oberseite bräunlich.

Herrn K. P, Worms. Die Wanderelster (s. Abb. S. 191) ist in ihrem Benehmen in der Gefangenschaft völlig elsterartig. Sie ist im geräumigen Käfig sehr munter und läßt andauernd die mannigfaltigsten Töne hören. Liebhabern von Rabenvögeln ist sie sehr zu empfehlen. Mit kleineren Vögeln kann sie ebensowenig zusammengehalten werden wie unser Rabenvogel.

Herrn M. G., Tasdorf b. Kalkberge ist brieflich Bescheid zugegangen.

Herrn A. K., Demmin; Herrn N G., Wien; Herrn A. S., Zschopau i. Sa.; Herrn Pastor G., Sakro b. Forst; Herrn Prof. F. B., Danzig; Frl. A. L., Friedenau-Berlin: Beiträge dankend erhalten.

Herrn Dr. U., Lübeck. Der junge Kanarienvogel ist infolge von Darmentzündung eingegangen. Kanarienvögel in diesem Alter sind sehr warm zu halten, und wenn sich auch bei noch vorhandenen Jungen Krankheitsmerkmale zeigen, ist alles Weichfutter vorerst zu entziehen und nur Mohnsamen, amerikanische Hafergrütze, Spitzsamen zu reichen, als Getränk 4—5 mal täglich dünner, erwärmter Haferschleim.

Herrn A. Sch., Zschopau. Gewiß können die genannten Prachtfinken nach sorgfältigster Eingewöhnung, falls sie gesund und kräftig sind, auch in Räumen mit niederer Temperatur gehalten werden. Aber es muß dabei sehr vorsichtig verfahren werden, und es dürfen dazu auch nur Tiere verwendet werden, welche schon mindestens das Frühjahr und den Sommer hindurch in unserem Klima leben und gezeigt haben, daß sie bei dem gereichten Futter, es ist das aller Prachtfinken, gesund, lebhaft und kräftig bleiben. Weichlich sind die genannten nicht, aber häufig von dem langen Transport arg mitgenommen. Sie eignen sich auch zur Züchtung, müssen zu diesem Zweck aber im Winter in erwärmten Räumen gehalten werden.

Herrn E. K., Schwerte. Es ist zu empfehlen, allmählich die Schamadrossel auch an die Annahme eines guten Futtergemisches zu gewöhnen, daneben aber auch reichlich frische Ameisenpuppen zu füttern. Die Mauser findet im August statt und geht meist glatt vonstatten. Die Schamadrossel steht den Schmätzern nahe. Sie kann wohl auch im Zimmer mit geringeren Wärmegraden gehalten werden, aber sie wird dann kaum singen und Ihnen wenig Freude machen. Besser ist es dann schon, sie in der Küche zu halten.

(Fortsetzung auf der 3. Umschlagseite.)

Aus den Vereinen.

Angemeldet ist Herr Heinrich Pauer, Düsseldorf 53, Talstraße 60.

A. Krabbe.

Verein Vogelschutz und -pflege zu Dresden. Versammlung jeden Donnerstag, abends 8 Uhr, im Vereinslokal, „Schillers Restaurant", Ecke Stifts- und Ehrlichstraße. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen.

Bernhard Kühn, Vorsitzender.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei zu Hamburg. Sitzungen finden statt jeden 1. und 3. Dienstag im Monat bei Hüttmanns Hotel, Poolstr. 22, abends 8¼ Uhr. Nächste Sitzung Dienstag, den 5. August 1924.

J. A.: Arnold Weber, 1. Vorsitzender.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig. Vereinssitzungen jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat im Vereinslokal, „Bauers Brauereirestaurant", Taubchenweg. Nächste Sitzung am 7. August 1924. Gäste stets willkommen. J. A.: Johann Birk, 1. Vorsitzender.

Verein der Vogelfreunde Leipzig-Plagwitz. Vereinslokal: „Gosenschlößchen", Leipzig-Plagwitz. Sitzungen an jedem 1. und 3. Montag des Monats, abends 8 Uhr. Vogelfreunde sind stets willkommen.

J. A.: Karl Scholtissek, 1. Vorsitzender, Leipzig-Plagwitz, Lauchstädter Straße 30.

Verein der Vogelliebhaber zu Mannheim. Versammlungen finden alle 14 Tage Samstag abend 8 Uhr im Vereinslokal „Restauration z. gold. Falken" statt. S. 1. 17. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen.

Johann Daubmann, 2. Schriftführer.

Verein der Vogelliebhaber zu Lübeck (Ziervogelverein). Versammlung am Montag, den 7. Juli 1924. Tagesordnung: 1. Verlesen des Protokolls; 2. Einladung zur Ausstellung in Flensburg; 3. Besprechung über den Vogelliebhaberverband Landesverband Preußen; 4. Verbandstag in Harburg am Sonntag, den 20. Juli; 6. Verschiedenes. Um 8½ Uhr eröffnete der 1. Vorsitzende Herr H. Wischendorf die Versammlung. Das Protokoll der letzten Versammlung wurde verlesen und genehmigt. Darauf wurde ein Brief des Verbandes der Vogelliebhaber Landesverband Preußen verlesen, indem der fällige Beitrag von den Verband angemahnt wurde. Herr Strehlke, unser ehemaliger Vorsitzende, hatte durch ein Versehen den Verein ohne Einwilligung bei dem Verband angemeldet und wurde deshalb mit der Abmeldung beauftragt, da er jedoch inzwischen erkrankte und starb, so ist die Abmeldung dadurch wahrscheinlich unterblieben, und wurde deshalb selbiges an den Verband berichtet und um Rückziehung der Beitragsforderung gebeten. Hierauf wurde eine Einladung des Flensburger Vereins zur diesjährigen Ausstellung dortselbst vorgelesen. Trotzdem die Ausstellung eine Woche vor unserer stattfindet, soll dieselbe von uns beschickt werden. Zum kommenden Verbandstage in Harburg wurden die Herren Steinhagen und Bösel entsandt. Es wurde dann beschlossen, auf der Vereinsausstellung wie in früheren Jahren wieder eine Verlosung zu veranstalten. Da weiter nichts vorlag, wurde die von Mitgliedern besuchte Versammlung um 9¼ Uhr geschlossen. In der Sammelbüchse befanden sich 1,36 M.

Hermann Bösel, Schriftführer, Lübeck, Adolfstr. 13.

„Ornis", Freie Bezugs-Vereinigung der Waldvogelliebhaber Deutschlands. Gegründet 1912. Auf vielseitigen Wunsch der alten Mitglieder wollen sich die Waldvogelliebhaber wieder in der „Ornis" zusammenschließen. Als amtliches Organ ist die „Gef. Welt" ausersehen worden, und werden die Artikel, die früher in den „Ornis-Blättern" erschienen, in obiger Zeitschrift gebracht werden. Aus diesem Grunde bittet die Geschäftsführung um eifrige Mitarbeit, damit unserer Waldvogelpflege wieder der Platz eingeräumt wird, der ihr gebührt. Anmeldungen sind unter Beifügung von 2 M. an den Geschäftsführer zu richten; Mitglieder erhalten auf Mischfutterbestellungen 5 % Rabatt.

Mit treudeutschem Gruß

Martin Sperling, Halle a. d. S., Südstr. 49.

Zool. Verein zu Zwickau i. S. Sommers-Zeit. „Noch sind die Tage der Rosen, noch ist ja die blühende goldene Zeit", beginnt ein allbekanntes deutsches Volkslied. Fürwahr, es ist doch die schönste Zeit im ganzen Jahre. Wer denkt nicht gern an die wundervollen Sommerabende vergangener Jahre zurück? Zurückstehen muß dagegen der Winter mit seinen Reizen, das Frühjahr mit dem großen Erwachen der Natur, der Herbst, welcher gleich einem ergrauten Manne an uns vorüberzieht. Um nun einen solch herrlichen Sommerabend neben Beobachtung unserer Vogelwelt einmal unter uns zu verleben, wurde die letzte Mitgliederversammlung außerhalb der dumpfen Stadtmauern im nahegelegenen Weißenborn abgehalten. Leider war uns der Wettergott nicht gut gesonnen. Ein mächtiger Nordwest pfiff über die Felder und hielt manchen vom geplanten Abendspaziergang ab. Der Aufenthalt im Garten war ungemütlich, und die Versammlung mußte infolgedessen im Gastzimmer stattfinden. Waren auch nicht alle erschienen, so unterhielt man sich in geselliger Runde doch vortrefflich. Daß dabei unsere Lieblinge nicht zu kurz kamen, bedarf wohl keiner besonderen Erwähnung. Schnell verging der Abend, und in vorgeschrittener Stunde trat man dann den Heimweg an.

NB. Zum Zwecke der Agitation, um unsern Mitgliederstand zu heben, ferner um alle im hiesigen Gebiet wohnenden, uns noch fernstehenden Vogelliebhaber dem Deutschen Reichsverband zuzuführen, sowie sie selbst und ihre Rechte zu wahren, erließ die Vereinsleitung in den örtlichen Tageszeitungen mehrmals Inserate, in denen alle Sportkollegen auf das Bestehen des Zool. Vereins, hier, aufmerksam gemacht und ihnen der Beitritt in denselben nahegelegt wurde. Mögen die genannten Zeilen auf fruchtbaren Boden gefallen sein. — Nächste Versammlung findet am 8. August ds. Js. im Stammlokal „Zur Bleibe", Katharinenkirchplatz, abends 8 Uhr, statt. Gäste stets willkommen. J. A.: W. Fritsche, Schriftführer.

Für Entomologen.

...n's Schmetterlingsbuch. Zum Selbstbestimmen aller in Deutschland, Österreich, Ungarn und der Schweiz vorkommenden Groß- sowie der vorzugsweise gesammelten Klein-Schmetterlinge. Mit 67 Textabbildungen. Kart. 4.— M.

...u's Käferbuch. Zum Selbstbestimmen der in Deutschland, Österreich-Ungarn und der Schweiz vorkommenden Koleopteren. Mit 144 Textabbildungen. Kart. 4.— M.

...e Käfer- und Schmetterlingssammler. Anleitung zur Herstellung und Handhabung der beim Fange, der Zucht und dem Präparieren von Käfern, Schmetterlingen und Raupen als geeignet bewährten Geräte, sowie zur Anlage und Erhaltung von Insektensammlungen. Von Karl Wingelmüller. Mit 32 Abbildungen. Geh. 1.50, geb. 2.— M.

...ädlinge und Nützlinge der Kleintierwelt. Ein Lehrbuch für jedermann von Prof. Dr. L. Glaser. Mit 85 Textabbild. Kart. 3.— M.

Für Bienenzüchter.

Dzierzon's rationelle Bienenzucht. Von Pfarrer Dr. Dzierzon. 2. Auflage. Mit vielen Textabbildungen. Kart. 3.— M.

Bienenzucht im Zargenbreitwabenstock. Von Jak. Luers. Mit 25 Abbildungen im Text. Kart. 2.— M.

Leben und Zucht der Honigbiene. Ein gemeinverständliches Lehrbuch über Behandlung der Bienen und über Tätigkeit, Nutzen und Anatomie der Biene von Prof. Dr. O. Krancher. 2. verbesserte Aufl. Mit 1 Tafel, 82 Abbild. u. 7 Kopfleisten. Kart. 3.— M.

Für Hundefreunde.

Gebrauchs- und Luxushunde. Von Emil Ilgner. 2. Auflage mit 87 Abbildungen im Text. Kart. 3.— M.

Der kurzhaarige deutsche Vorstehhund. Von Camillo Morgan. Mit 13 Abb. berühmter kurzhaariger deutscher Vorstehhunde. 2.—M.

Der Foxterrier, seine Zucht, Pflege und Erziehung für Jagd und Stube, von Emil Ilgner. 2.50 M.

...reutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg / Postschließfach 148

Anzeigenteil

Die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 20 G.-Pf. berechnet. Aufnahme erfolgt gegen Voreinsendung des Betrages in Reichsge
Brief od. auf unseren Zahlstellen: Postscheckkonto: Magdeburg 3148, Wien 156 687, Bern III 4326, Prag: Creditanstalt d. Deutschen unter Angabe des Zw

Käfige u. Gerätschaften

Gimpelbauer

mit Drahtstäben 17½ cm lang, 17 cm hoch, 13 cm breit pro Dtzd. 14 ℳ; fertige alle Sorten Käfige und Utensilien für Kanarien an. [570

A. Janson, Barbis a. H.

Futtermittel

Ornis-Haus
Halle-Saale

Gegründet 1912

Spezialität:
Individuelle Weichfresserpflege nach Angaben des Herrn Apotheker Adalbert Jena-Biberach-Riß. (Alleiniges Herstellungsrecht.)

Reform-Normal I, Volierenm.,
Reform-Normal II, f. Rotkehlchen, Schwarzplatten usw.,
Reform-Normal III, f. Nachtigall., Sprosser usw.,
Reform-Normal IV, f. Gelbspött., Goldhähnchen usw.,
Reform-Normal V, f. Schama usw.,
Körnerfutter Ia für jede Vogelart. [571

Inhaber langjähriger Fachmann, siehe „Ornis-Buch" (90 S.) Mk. 1
Preisliste auf Wunsch!

Mehlwürmer neue, feinste Qualität, Pfd. 8 ℳ
572] **Jeitner, Breslau,** Weinstr. 12.

Mehlwürmer

geg. Einsend. v. 2.— Rentenmark ¼ Pfd. franko versend. **D. Waschinski & Co.,** Biesenthal I (Mark). [573

Vogelfutter [574

für Kanarien, Waldvögel, Exoten, Papageien, Weichfresser. Anfragen nur gegen Rückporto. Liste 13 über Vogelfutter, Liste 5 über Vogelkäfige, Zuchtgeräte usw. mit etwa 400 Abbild.

W. Göpel, Leipzig,
Tröndlinring 1. Telephon 14 958.

Empfehle:

Harzer Gebirgs-Sommerrübsen, hochfeine, milde, nußsüße Qualität, Postkolli 4 ℳ franko.

Heydenreichs Harzer Heilmittel gegen Rotleibigkeit, Freßsucht u. sonstige Magen- u. Darmkrankheiten aller Vögel, 1000fach im Gebrauch, 2.50 ℳ.

Prima Kanarienhähne, auch diesjährige zum Selbstausbilden, von 8 ℳ an.
Schneeweiße Kanarienweibchen.

Richard Heydenreich
575] **Bad Suderode, Harz**
Harzer Kanarien-Feinzucht
Staatspreis, viele gold. Med.

Ameiseneier, stets frische prima saubere Ware, à Liter 1.50 ℳ. **Karl Edel, Würzburg,** Augustinerstraße 13. [576

Vögel

Verk. junge grüne Wellensittiche v. imp. Eltern à 6 ℳ, fast ausgef. 7,50 ℳ, **1 amerikanische Spottdrossel** 30 ℳ, tausche gegen andere Vögel. [577
Galler, Planegg, Christinestraße 7.

Suche zu kaufen

8 **Wellensittichweibchen,** können auch 24er Jungtiere sein.

Verkaufe

1,0 Sperlingspapagei.
Erich Richter, Bernstadt (O.-Lausitz).
A. Z.-Mtgl. 235. [578

Gebe in Tausch:

2 Nachtigallen, Frühjahrswildf. 1924, Ia Vögel, geg. **sehr gute Heidelerche.**

1 Ia schönes Blaukehlchen, Frühjahrsf. 1924, geg. **1 gute Haubenlerche.**

1 schönes Blaukehlchen, 1924, gegen **Schwarzkopf,** nur gegen gute Vögel.

Robert Thiele, Altona (Elbe), Lohmühlenstraße 6 II. [579

Junge fingerzahme Wellensittiche,

frei auf dem Finger sitzend, Stück 15 ℳ.

Wellensittich-Nistkästen,

neu, seit Jahren als beste erprobt, Stück 1.50 ℳ (zahme junge Wellensittiche lernen leicht sprechen). [580

Frau Klara Neugebauer, Steinau a. O., früher: Raudten (Bez. Breslau).

Seltene brasilianische Drosseln!

Von Brasilien brachte ich je 2 Exemplare mit von:
Turdus albicollis, T. amaurochalinus, T. flavipes und **T. fumigatus.**

Würde **Ia nordamerikan. Spottdrossel und Schamadrossel** in Tausch nehmen. [581

Anfragen mit Rückporto an **Georg E. F. Schulz,** Berlin-Friedenau, Hertelstraße 1 II.

Verkaufe

1 purpurroten Gelbmantel-Lori, vor ½ Jahr aus Hamburg bezogen, kerngesund, ganz zahm, ferner **1,1 Goulds** und **1,1 Spitzschwanz-Amandine.**

Offerten unter **Nr. 24** an die Exped. der „Gefiederten Welt". [582

Prächtige große weiße Gelbhaubenkakadus Stück 60 ℳ, **grüne Wellensittiche** Stück 8 ℳ, **Mönchssittiche** Stück 6.50 ℳ, bei 10 Stück zus. 50 ℳ, **sonstige Sing- und Ziervögel** in großer Auswahl; **zahme Javaäffchen,** an Kette gewöhnt, Stück 80 und 100 ℳ. [583
Bei Anfragen Rückporto, Preisliste gratis.
Friedrich Frank, München, Gabelsbergerstraße 9.

Vertausche zahmen Star,

vielseitig. Spötter, imitiert roten Kardinalgesang, Hühnergegacker, Drosselrufe, Kanariengesang usw., äußerst fleißig. Sänger, gegen **junge Kanarienhähne** oder **andere Sänger.**
N. Diwersy, Merzig a. Saar.
A. Z.-Mtgl. 183. [584

Vertausche roten Kardinal,

in vollem Schlag, zahm und schön befiedert, gegen **Dajaldrossel, Goldstirnblattvogel** od. **amerik. Spottdrossel,** evtl. auch gegen **Schamadrossel,** bei letzterer zahle zu.
N. Diwersy, Merzig a. Saar.
A. Z.-Mtgl. 183. [585

Verkaufe im Auftrage:

20 Stück Wildgänse
(Grangans) 24er, à 10 ℳ,
4 Stück Mäusebussarde
24er, à 10 ℳ,
3 Stück Nebelkrähen
24er, à 5 ℳ,
1 weißen Storch,
ausgef. 50 ℳ,
1 Fischreiher
50 ℳ.

Sämtlich. Tiere sind, da von Liebhaber aufgezog., ganz zahm u. unglaublich zutraulich.
Paul Frenzel, Breslau 3,
Bergstraße 32 II. [586

Gartenbau-Bücherei

- Herausgegeben von
Prof. **Dr. Udo Dammer,** Kustos des Botanischen Gartens Berlin-Dahlem.

Jeder Band 1.20 M.

Bd. 1. **Monatskalender des Pflanzen- und Gartenfreundes.** Von Prof. Dr. Dammer. 2. Auflage.
Bd. 8. **Gewürzkräuter.** Von Obergärtner Bode. Mit 6 Abb.
Bd. 23. **Das Weinspalier.** Von Gartenbaudirektor Koopmann. Mit 17 Abbildungen.
Bd. 25. **Zimmer- und Freiland-Aquarienpflanzen.** Von Inspektor Mönkemeyer. Mit 26 Abbildungen.
Bd. 33. **Gewächshaus des Privatmannes.** Von Inspektor Lebien. Mit 8 Abbildungen. Zurzeit nicht lieferbar!
Bd. 34/36. **Gartenfeinde und Gartenfreunde.** Die dem Gartenbau schädlichen und nützlichen Lebewesen. Von Prof. H. Kolbe. Mit 75 Abbildungen. 3.60 M.
Bd. 37/39. **Theorie der Gartenarbeiten.** Ein Katechismus des Pflanzenbaues. Von Prof. Dr. Udo Dammer. Mit 23 Abbildungen. Preis 4.60 M.
In Vorbereitung: **Champignon-Zucht. — Kakteen.**
Die besten Speiseschwämme von Gotth. Hahn. Mit naturgetreuen kolorierten Abbildungen auf 12 Tafeln. 1.20 M.
Die Tabakpflanze. Ein Handbuch zu ihrer Anzucht und Verwertung für jedermann. Von A. Oertel. 2. Auflage. —.60 M.

Zu beziehen durch:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlg., Magdeburg
Postschließfach 148.

Offeriere in einwandfreien erstkl
Exemplaren:

Goulds amandinen, rot- u. schwarzköpfige . .	Paar	4
Spitzschwanzamandinen	„	4
Masken finken . . .	„	4
Purpurtangaren . .	„	30
Reisfinken	„	
Schwarzkopfnonnen .	„	
Weißkopfnonnen . .	„	1
Muskatfinken . . .	„	
Silberschnäbel . . .	„	
Elsterchen	„	
Granedelsänger . .	„	
Mossambikzeisige . .	„	
Webervögel	„	
Atlasfinken . . .	„	
Orangebäckchen . .	„	
Grauastrilden . . .	„	
Amaranten	„	
Wellensittiche, grüne .	„	1
Wellensittiche, gelbe .	„	2
Große weiße Gelbhaubenkakadus . .	Stück	7
Molukken-Kakadus .	„	27
Schamadrosseln, pr. Sänger	„	7
Goldstirnblattvögel .	„	4
Dreifarb. Prachtglanzstare	„	6
Tarant. Unzertrennliche	Paar	7

Täglich frische Ameiseneier
Porto u. Verpackung z. Selbstkoste
Tierhandlung
Max Kleine
Berlin NO. 18, Strausberger S
Fernruf Alexander 3313.

Für Kanarienzüch

Soeben erschienen:

Die Farben- und Gest kanarien
nebst Beschreibung alle schied. Kanarienrassen, Entstehung, Form- u. F veränderung, Bastardz Farbenfütterung v. A. W brenner. Mit vielen haltigen Abb. Kart. 1.

Wichtig zur Zucht:

Der Kanarienvogel,
seine Naturgeschichte, u. Zucht von Dr. Karl 14. Auflage. Mit 2 F tafeln und zahlreicher abbildungen. Bearbei Karl Neunzig.
Kart. 2.

Die Bastardkanarien zucht.
Von Walter Barth 20 Abbildungen und drucktafel. 1.

Der Kanariengesang
Allgemeinverständlich musikalische und pho Darstellung von W. K 1.

Zu beziehen durch
Creutz'sche Verlags handlung, Magdeb
Postschließfach 148.

Inserate

für das am 7. August 1924 gabe gelangende Heft 25 Welt erbitten bis 2. Aug. 1

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Berlin-Hermsdorf; für den Anzeigenteil: Rolf Kretschmann, Magdeburg, Postschließfach
Verlag der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck: August Hopfer, Burg Bz. Mgdbg.

Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Jahrg. 53 | Den 7. August 1924 | Heft 25

(Druckort: Burg, Bezirk Magdeburg.)

Von meinen Vögeln.

Von Fritz Braun.

(Nachdruck verboten.)

Wie ich die Tür zu dem hohen, fast kapellenartigen Bodenraum öffne, auf dem meine Vögel untergebracht sind, tönt uns ein leiser, beinahe leiernder Singsang entgegen, dem Liede eines ganz leise singenden Grünfinken täuschend ähnlich. Der Künstler ist aber kein Grünling, sondern — eine Kohlmeise, die dort in ihrem Käfig unablässig von Stange zu Stange hüpft und fortwährend das leise Getön zum besten gibt, das man kaum von ihr erwarten mochte, weil sich sein Rhythmus so wenig den energischen, kraftvoll gegeneinander abgesetzten Bewegungen anpaßt. Vor kurzem waren ihrer noch zwei, aber die andere beschenkte ich etwa vor einem Monat mit der Freiheit, weil ihr Kot überlang und wurmförmig dick wurde und ihre Augen zu tränen begannen. Es handelte sich also um das alte Leiden gefangener Meisen, das wir beinahe schlechthin als Meisenkrankheit bezeichnen könnten. Da der Vogel noch vollkommen beweglich war, mag er draußen in unserm geräumigen Park, dessen Obstgehege von allerlei Getier wimmeln, bald wieder zu Schick gekommen sein. Miteinander lebten die beiden Meisen vordem ganz verträglich, wozu der Umstand viel beitragen mochte, daß jede ihr besonderes Schlafhaus hatte. Anders stand es mit den Meisen, die mein ornithologischer Genosse Wiesner entgegen meiner Warnung in seinen geräumigen Flugkäfig hineinwarf; zwei Leinfinken mußten daran glauben und ein Erlenzeisig trug wenigstens schwere Wunden davon.

Neben den Meisen litten sonst in meiner Vogelstube vor allem die Ammern an chronischen Verdauungsstörungen, deren ich trotz aller angewandter Mühe nur selten Herr werden konnte, denn wenn ich erst auf die Symptome des Leidens aufmerksam wurde, schien der Gesamtorganismus der Tiere schon zu sehr in Mitleidenschaft gezogen zu sein. Der Goldammer, der dort in dem kleinen Flemmingkäfig sitzt, ist dagegen kerngesund, obgleich er schon dreimal in der Gefangenschaft vermausert hat. Vielleicht hängt das damit zusammen, daß er nichts anderes als Glanzsaat fressen will. Selbst an Hirse will er nicht herangehen und hungert lieber, als daß er sich zu solcher Kost bequemt. So habe ich die sichere Gewähr, daß er niemals ölhaltige Sämereien zu sich nahm, die den Ammern so schlecht zu bekommen pflegen. Die Liebhaber möchte ich auf diesen Vogel besonders aufmerksam machen, weil er den Beweis erbringt, daß einförmige Kost den Pfleglingen nicht unter allen Umständen schädlich zu sein braucht. Hätte der Goldammer das Mischfutter meiner Körnerfresser angenommen und von allen darin enthaltenen Sämereien gleicherweise gefressen, so wäre er wohl kaum noch in so gutem Gesundheitszustand. Gerade jetzt im Mittsommer (21. August) singt der Ammer an sonnigen Nachmittagen ganz unermüdlich, während er im Lenz viel schweigsamer war, eine Gewohnheit, die mir schon oft an gefangenen Ammern aufgefallen ist.

Auch der Berghänfling, der daneben in dem kleinen Finkenkäfig an dem Wegerichstengel knabbert, ist jetzt Ende Juli im vollsten Gesange. Vor zwei Jahren kaufte ich mir im Winter eine ganze Menge dieser unermüdlichen Zwitscherer. Die übrigen verschenkte ich im Laufe der Zeit und behielt nur die beiden kräftigsten Männchen, die ich wegen ihrer Zahmheit und stets regen Gesangeslust recht lieb gewann. Mit dem Liede des Rothänflings können sich ihre Weisen an Kraft, Feuer und Mannigfaltigkeit ja sicherlich nicht vergleichen, aber ihre hellen Rufe tönen trotzdem so fröhlich und sonnighell, daß man des Berghänflings auch neben guten Sängern nicht überdrüssig wird. Die Berichterstatter, welche seine Weisen schlechthin mit dem Geschetter des Leinfinken vergleichen, haben sicherlich nicht alte Männchen in höchster Brunst verhören dürfen. Auf Wegerichstengel sind meine Berghänflinge rein versessen, so wenig sie sich sonst aus Grünfutter zu machen pflegen. Es ist überhaupt unglaublich, welche Mengen davon bei mir im Hochsommer und Frühherbst verbraucht werden. Dabei habe ich die feste Überzeugung, daß es den Vögeln eigentlich nur um den Spaß zu tun ist, an dem Samenstand zu knabbern, denn den größten Teil des Stoffes finde ich nachher im Boden und auch die wirklich verzehrten Teilchen dürften doch zur Hauptsache aus Wasser bestehen. Sind die Samen erst reif, so will nur selten noch ein Vogel etwas von den Wegebreithalmen wissen.

Den Rothänfling findet ihr bei mir in einer ganzen Anzahl von Männchen, und fast alle sind vorzügliche Sangesmeister. Im Laufe der Jahrzehnte habe ich ihrer schon Dutzende und Aberdutzende besessen, aber ihre herrlichste Weise bekam ich doch nur recht

selten zu hören. Es ist eine aus kurzen, knappenden Lauten bestehende Strophe, die überlaut anfängt, immer leiser und leiser wird und schließlich fast tonlos endet. Sollte ich sie zeichnerisch darstellen, so würde ich eine nach innen gewundene Spirale andeuten und diesen Bleistiftstrich mit Kugeln besetzen, die wie Perlen an dem Faden stecken und nach innen zu immer kleiner werden. Die Zahl dieser Kugeln müßte, der der Töne entsprechend, etwa 20—25 betragen. Ich habe dies Lied, obgleich ich sicher fünf, sechs Dutzend Hänflinge besaß, im Laufe eines Menschenalters höchstens 10—12 mal gehört, und zwar nur an sonnigen, heißen Mittsommertagen. Da es auch solche Hänflinge sangen, die als Jungvögel in meinen Besitz kamen und es sicherlich draußen und drinnen niemals gehört hatten, darf ich wenigstens von dieser Weise mit völliger Sicherheit behaupten, daß sie Erbgut darstellt, obgleich sie von ganz besonderer Vollkommenheit zu sein scheint.

Doch nun beseht auch einmal diesen Star, der gerade in voller Mauser ist. Sieht er nicht aus, als ob er in Pluderhosen stecke? So weich und lang sind die Federn, welche die Beine decken, aus dem übrigen Gefieder hervorgewachsen. Solche Schnell- und Langwüchsigkeit des Gefieders begegnete mir an gefangenen Staren in sehr vielen Fällen. Bald handelt es sich dabei um die Nackenfedern, bald um das Brustgefieder, bald auch um die Federn der Weichengegend. Diese Erscheinungen erbringen wohl den Beweis dafür, daß die Neigung, Federbüsche und Federnantillen zu bilden, der ganzen Gattung tief im Blute steckt, und daß auch unser Star unter veränderten Verhältnissen leichtlich zu einem Schopfträger nach Art der Rosen- und Mainastare werden könnte.

Warum jener große Käfig leer steht? — In ihm steckte ein Kleiber, der vor wenigen Tagen gestorben ist. Er hätte meiner Ansicht nach schon ein Recht dazu, denn er lebte schon beinahe fünf Jahre in der Gefangenschaft seit jenem Wintertage, da er mir in Dt.-Eylau ins Fangbauer ging. Daß diese Frist von seiner Lebensdauer in der Natur wesentlich übertroffen wird, möchte ich bei seiner starken Vermehrung kaum annehmen. Alle die Jahre hindurch war er mir ein lieber Hausgenosse, der Jahr für Jahr den Frühling mit hellem Ruf einläutete, so daß es durch die ganze geräumige Wohnung klang. Die Geschmäcker sind ja verschieden, und so habe ich wohl ein Recht zu der Behauptung, daß mir ein fleißig rufender Kleiber mindestens ebensoviel gilt wie ein mittelmäßiger Buchfink. Allerdings machte mir gerade dieser Vogel manche Schererei, weil ich das bewegliche Tier nicht in einen kleinen Behälter stecken mochte und er seinen großen Flugkäfig mit niemand teilen wollte. Ein anderer Kleiber, den ich ihm beigesellte, mußte daran glauben, und als ich nun den mürrischen Einsiedler in anderen Flugkäfigen unterbringen wollte, in der Hoffnung, der Neuling werde sich zwischen den alten Insassen schüchtern benehmen, hatte ich die Rechnung wieder ohne den Wirt gemacht und mußte ihn schleunigst herausfangen. Trotzdem denke ich an seine hellen Rufe gern zurück und werde mich im nächsten Winter eifrig bemühen, der kleiberlosen Zeit möglichst bald ein Ende zu machen. (Schluß folgt.)

Nochmals über Wellensittichzucht.

Von Jos. Meyer, Luzern.

(Nachdruck verboten.)

Wer schon 30 Jahre diese hübschen Ausländer züchtet wie ich, verfolgt eifrig alles, was darüber geschrieben wird. Der Aufsatz in Heft 11 von Herrn Dr. Bilfinger, Schwenningen, findet meine volle Zustimmung. Man kann nicht genug beobachten, um zu verhüten, daß bösartige Weibchen (denn immer sind es nur diese) Unheil anrichten. Das ekligste, was mir je passierte, geschah vor drei Jahren in unserer städtischen Voliere (die ich, nebenbei bemerkt, seit zwölf Jahren beaufsichtige und verwalte). Jede Woche revidiere ich zweimal sämtliche Nistkasten, und es ist oft sehr nötig. Bei der vorgängigen Revision war in einem Kasten eine Brut mit vier zwölftägigen Jungen. Bei der folgenden Revision alle Jungen tot, abscheulich zerbissen, die Mutter ebenfalls skalpiert und breitgequetscht, darauf zwei frischgelegte Eier und die Megäre brütend in diesem Kadaverhaufen. Der Kasten hoch hinauf voll Blut, Fleisch und Federteile! Einfach scheußlich! Gewöhnlich sind es recht hochhängende Kasten, die begehrt sind. Und da helfe ich mir jeweilen, daß ich dem Störenfried an einem Flügel die neun ersten Federfahnen sauber abschere, daß nur der nackte Kiel stehen bleibt. Das hilft gewöhnlich, da das Flugvermögen dann stark beschränkt ist, und sich der Wüterich dann mit einer tiefergelegenen Wohnung begnügt. Kasten sind immer mindestens zwei pro Paar zur Verfügung. Als Bodenbelag in die Nistkasten gebe ich seit langem nur noch feinen Torfmull und habe damit die besten Erfahrungen gemacht. Sobald alle Jungen geschlüpft sind, wird aller Unrat ausgeräumt und eine starke Handvoll frischer feiner Torfmull eingeschüttet und dann die junge Brut drauf. Hei! wie da die Burschen wachsen und gedeihen. Von Milben und Ungeziefer weiß ich sozusagen nichts mehr, seit ich dies strikte durchführe. Als Futter bekommen meine Zuchtvögel je zwei Teile weiße und gelbe Hirse, dito Kanariensamen und ein Teil schweren guten Pferdehafer, dazu stets Salatrippen. Als bestes erprobtes Weichfutter, dazu sehr ökonomisch, gebe ich, sobald viele Junge in den Kasten sind, den sog. Eierkäse. Rezept: Drei Eßlöffel Vollmilch wird in kleinen Pfännchen zum Sieden gebracht, dann sofort ein vorher gut verklopftes ganzes frisches Hühnerei, dem eine Tischmesserspitze Grableys Mineralsalz beigefügt war, eingerührt, und sobald das Ganze anfängt zu dicken, d. h. zu Rührei wird, eine starke Handvoll Zwiebackmehl eingerührt und unter stetigem Rühren noch eine halbe bis eine Minute auf dem Feuer gelassen. Das gibt dann eine prächtige brösliche flockige Masse, schön trockenfeucht, und die Hauptsache, sie wird bei größter Hitze nicht sauer. Mit einer solchen Portion füttere ich zwei Tage 18—23 Jungvögel, d. h. auf je zwei Jungvögel einen Teelöffel voll. Auch meine jungen Kanarien gedeihen dabei prächtig, keine Darmstörungen. Man kann auch scharf ausgetrocknetes zerriebenes Brot nehmen, Zwieback ist aber entschieden besser. Dies aus meinen Erfahrungen. Und nun noch zu den himmelblauen Wellensittichen, siehe Heft 9, Kleine Mitteilungen von Herrn Stadtarchitekt Pracht in Düsseldorf. Ja, es

sind wunderbare Vögel, diese blauen Wellensittiche. Die ersten sah ich im Jahre 1906, sie kamen aus Belgien an meine Adresse zur Verpflegung als Zwischenstation auf der Reise nach Mailand und kosteten die schöne Summe von 1200 Lire, damals gleich wie Schweizerfranken. Das kühlte mein heißes Begehren! Sie waren ein Drittel kleiner als gewöhnliche grüne. Ich konnte die herrlichen Tierchen nicht mehr vergessen. Da gingen in den Jahren 1916 und 1917 viele hundert Paare grüne Wellensittiche durch meine Hand, zum Export nach Amerika bestimmt. Mein Kennerauge entdeckte bald einzelne Vögel darunter, die deutlichen blauen Schimmer und Anflug zeigten. Holla, jetzt ist deine Zeit gekommen, dachte ich mir, suchte diese Exemplare peinlich heraus und sah im Geiste schon einen ganzen Flug dieser herrlichen Blauen. Ojerum! Weil diese Abstämmlinge, unzweifelhaft blauen Blutes, etwas gering und schwächlich waren und ich Krüppel fürchtete als Nachzucht, beging ich die kapitale Dummheit und kreuzte dieselben mit meinen großen kräftigen grünen Wellensittichen, die ich züchtete und mußte somit volle fünf Jahre warten, bis das blaue Blut wieder dominierte. Endlich, im Juni 1922, geschah für mich das Ereignis, das ich nie vergessen werde. Bei der Revision eines Kastens im Estrichzimmer droben, wo ich die Vögel züchte, ergab sich: zwei himmelblaue und zwei dunkelolivgrüne. Ich brach beinahe das Genick, bis ich im zweiten Stock drunten war und meinen Angehörigen die Botschaft melden konnte. In folgender Brut ein himmelblauer, ein smaragdgrüner und ein dunkelgrüner. In der dritten Brut vier Stück, aber alle schön dunkelgrün mit bläulichem Anfluge. Und dann war Schluß! Während ich einmal fütterte, sank das Männchen dieses Paares vom Schlage getroffen zu Boden und war tot. Letztes Jahr gab ich der Mutter als Ersatz einen der dunkelgrünen Söhne erster Brut, nachdem sie sich mit dem blauen Sohne nicht paaren wollte, das Resultat war gut, d. h. erste Brut zwei himmelblaue und zwei dunkelgrüne, zweite Brut fünf grüne, davon zwei hell- oder smaragdgrüne und drei dunkelgrüne. Dieses Jahr habe ich nun fünf Paare zusammengestellt unter möglichster Vermeidung allzu naher Verwandtschaft, alle mit stark blauem Blute, d. h. je zwei Weibchen direkt reinblau, und habe heute bereits 24 junge Vögel, starke gesunde Tierchen, doch kein einziger rein himmelblau, aber ich hoffe noch welche zu erhalten. Die Jungen sind teils smaragdgrün, teils dunkelgrün, teils mehr ins Olivgrüne ziehend, aber alle mit vielem blauen Anfluge und fast reinblauem Unterschwanzgefieder. Interessant ist, daß dieses Jahr in der Schweiz an drei Orten, wo ich von meinen letzt- und vorjährigen grünen Vögeln abgab, je ein blauer gefallen ist. Leicht ist es auf keinen Fall, aus grünen reinblaue herauszuzüchten, und blaue unter sich sind schwächlich, degenerieren rasch und verblassen, d. h. gehen bald ins Weißliche über, bis sie schließlich reinweiß werden. Nur durch Zuführen von Grün, aber Blaublut, wird die satte, tiefhimmelblaue Farbe erhalten, und diese Farbe ist einfach herrlich. Ich bin jeden Tag wieder närrisch, wenn ich vor meinen „Blauen“ stehe. In Frankreich und Belgien züchtet man jetzt bereits „Violette“,

Somalibülbül (s. S. 172).

mauerfarbige, also rein violette mit rotem Schimmer, aber der Preis nimmt einem jeden Appetit! Ein tüchtiger Züchter in der französischen Schweiz, der viel nach Frankreich kommt, versicherte mir kürzlich, er dürfe wetten, was ich wolle, es vergehen keine zehn Jahre, so haben wir auch rosafarbene Wellensittiche. Also unbegrenzte Möglichkeiten.

Der Gelbspötter.

Von J. Birk, Leipzig.

(Nachdruck verboten.)

Wenn ich heute über den Gelbspötter schreibe, trotzdem erst vor kurzer Zeit eine Arbeit über diesen Vogel in der „Gef. Welt“ erschienen ist, so muß ich bemerken, daß gerade diese Arbeit von Herrn Nieselt, Lausa, der Grund ist, welcher mir die Feder in die Hand drückt, um auch vom Standpunkt meiner langjährigen Liebhaberpraxis aus meine Erfahrungen mit der von Herrn Nieselt empfohlenen Verpflegungsmethode zu vergleichen. Absichtlich habe ich erst geraume Zeit seit Erscheinen des bewußten Gelbspötterartikels verstreichen lassen in der Annahme, aus den Kreisen der erfahrenen Liebhaber würde sich eine Stimme erheben, um die gemachten Erfahrungen mit denen des betreffenden Artikelschreibers zu vergleichen. Dies wäre unbedingt nötig gewesen, wenn es nicht den Anschein gewinnen sollte, daß die langjährigen Liebhaber erst jetzt belehrt wurden, wie eigentlich ein Gelbspötter als Stubenvogel verpflegt werden muß. Offen muß ich gestehen, daß diese Arbeit nicht unwidersprochen hingenommen werden kann, noch dazu dieselbe in einer seit über 50 Jahre bestehenden Liebhaberzeitung steht, die wirklich ernst zu nehmen ist, bedeutet doch die mit drastischen Worten anempfohlene Verpflegungsmethode eine revolutionäre Umwälzung auf dem Gebiete der Gelbspötterpflege. Wohl jeder Liebhaber, der bis jetzt Gelbspötter käfigte, wird anders verfahren sein als Herr Nieselt, den alten Praktiker wird auch eine derartige Arbeit nicht schaden, er wird höchstens mit einem kühlen Lächeln im Geiste an seine in der Gelbspötterpflege errungenen Erfolge zurückdenken, und sein Urteil ist fertig. Anders verhält es sich mit Liebhabern, die Anfänger sind oder wenigstens noch etwas unsicher auf diesem Gebiete arbeiten, ihnen soll meine heutige Arbeit gewidmet sein, nehme natürlich an, daß auch erfahrene Gelbspötterpfleger die Arbeit mit Interesse verfolgen, denn nirgends gibt es mehr Wege, die beschritten werden können, als in der Stubenvogelpflege. Diese Wege müssen aber auch leicht gangbar sein, das heißt, der Liebhaber muß dabei darauf hingewiesen werden, wie am leichtesten und nicht am schwierigsten ein Vogel verpflegt wird, denn unter rationeller Vogelpflege verstehe ich, wie ich am einfachsten und gleichzeitig auch vollen Erfolg versprechend meine Vögel käfige. Wer nur seiner Liebhaberei leben kann und dieselbe das Mittel zu diesem Zwecke mit ist, daß er die Stunden des Tages damit verschönert, sozusagen auch seine ihm zur Verfügung stehende Zeit damit totschlägt, wohl dem, es ist ihm von ganzen Herzen zu gönnen, wer aber, wie fast alle, noch eine anstrengende Berufsarbeit zu erledigen hat, kann sich mit derlei umständlichen, viel Zeit erfordernden Methoden niemals befreunden. Für mich gilt als Leitmotiv in meiner Liebhaberei, niemals der Sklave meiner Liebhaberei zu werden, sondern ein ihr freudig dienender Anhänger zu sein, nicht einmal meine ganze, von der Berufsarbeit freie Zeit soll ihr gehören, warum, nun weil mir meine langjährige, von guten Erfolgen begleitete Liebhaberpraxis gelehrt hat, daß es auch anders geht. Aus diesem Grunde will ich, auch unter der Gefahr, daß ich ebenfalls als ein vom Starrsinn befallener Liebhaber nach der Ansicht des Herrn Nieselt bin, meine Gedanken und Erfahrungen in der Gelbspötterpflege veröffentlichen, denn ich gestehe offen, ich werde mir nicht baldmöglichst, sondern niemals die gutgemeinten Erfahrungen des Herrn Nieselt zu Herzen nehmen —. Warum —, der einzige Grund ist der, weil mich meine Praxis gelehrt hat, wie man zum Erfolge kommt, und so wird es mit mir wohl noch manchem alten Praktiker geben, der ebenso denken muß wie ich. Dies soll aber keinesfalls als Überhebung aufgefaßt werden, denn auch wir, wie wohl alle Liebhaber, sind für jeden, auch den kleinsten Fingerzeig in der Vogelpflege dankbar, denn es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, wir müssen alle lernen und täglich sogar lernen, denn gerade die Verschiedenheit der Individualität der Vögel gibt auch dem alten Praktiker noch manches Rätsel auf, dies zu lösen ja das Vorhandensein einer Liebhaberzeitung zwecks gegenseitigen Austausches der Erfahrungen und Beobachtungen der beste Weg ist. Darum will ich hervorheben, daß es auch Herrn Nieselt sein gutes Recht ist, seine Methode bekannt zu geben, es ist dies sogar willkommen, wenn dies rein sachlich geschieht, aber eins muß ich mir schon beim Schreiben einer Arbeit gewiß sein, daß es so geschrieben sein muß, daß es auch eine sachliche Kritik vertragen kann. Denn wenn wir in den Fehler verfallen, alles kritiklos und zu Recht bestehend hinzunehmen was geschrieben wird, so kennt sich am Ende der nach der Oberfläche des Wissens drängende Liebhaber zum Schlusse selbst nicht mehr aus, im Gegenteil, auch in der Liebhaberei muß der Weizen von der Spreu getrennt werden, ersterer kommt in die Schatzkammer des Wissens, letztere wird dem Winde preisgegeben, damit er dieselbe recht weit von uns entführt, dabei muß aber beachtet werden, daß dies so geschieht, daß die Spreu nicht auf das Gebiet unseres gleichgesinnten Nachbars fliegt. Diese meine Einleitung soll dem Zwecke dienen, um kein Mißverständnis aufkommen zu lassen, auch Herr Nieselt wird mich verstehen, wenn ich sachlich bleibe, ihn aber von meinen Erfahrungen dermaßen zu überzeugen, daß er seine Methode über Bord werfen soll, liegt mir vollständig fern, es würde mir auch niemals gelingen. Jeder Liebhaber wähle aus, was er aus diesen beiden Arbeiten für gut befindet, bei Herrn Nieselt, wie ich annehme und auch voraussetze, langjährige Praxis, ebenso auch bei mir, und von diesem Standpunkt aus bitte ich auch meine Arbeit zu betrachten.

Der Gelbspötter, als beliebter und sehr gesuchter Sänger bei den Liebhabern, ist ein Zugvogel, der von seinem Verehrer in den letzten Tagen des April, meistens aber erst Anfang Mai mit Sehnsucht er-

wartet wird, zählt er doch mit zu den Vogelarten, die den Beschluß machen in der Periode des Frühjahrzuges. Er ist wirklich ein guter Sänger und haben wir etwas vor uns, was mit Ia bezeichnet werden muß, so rangiert der Gelbspötter unter den ersten mit in der Reihe der edlen Sänger. Man soll niemals einen Mischer, wie der Gelbspötter ist, der seinen Originalgesang mit Imitationen aus den Gesängen anderer Vogelarten kunstvoll verflicht, mit einem Originalsänger vergleichen, warum — weil für ein derartiges Urteil jeglicher Maßstab fehlt. Leider kenne ich die Nachtigallen im Großen Garten zu Dresden nicht in ihrem Können, trotzdem muß ich es, um unserer Sangeskönigin, der Nachtigall, Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, ganz strikte zurückweisen, wenn ihr Schlag im Vergleich zu dem Gesang des Gelbspötters durch die Bezeichnung „Sperlinge" herabgewürdigt wird; ich habe auch schon viele Nachtigallenstümper abgehört in der Natur, aber dies geht doch entschieden zu weit. Nachtigallenschlag ist eben kein Gelbspöttergesang und umgekehrt ist es ebenso dasselbe; will ich Gesang vom Gelbspötter, muß ich diesen käfigen, will ich Nachtigallenschlag, so muß ich jene käfigen, aber diese Gesänge zu Vergleichen heranzuziehen, um einen Sänger davon in die vorderste Reihe zu stellen, ist doch ein zu gewagtes Unternehmen, was niemals ernst genommen werden kann. Der Fang des Gelbspötters geschieht bei seiner Ankunft vermittels des Wichtels oder unter Verwendung eines Lockvogels, indem man die günstigsten Stellen in der Nähe des Kauzes oder Lockers mit Leimruten besteckt, ebenso wird er auch mittels Leimruten öfters zufällig an der Tränke gefangen, alles Fangmethoden, die nur der darin Eingeweihte mit Erfolg ausführen kann, noch dazu wo das Auge des Gesetzes wacht. Gleichfalls kann der Gelbspötter, wenn es sich um einen ausgesuchten guten Sänger handelt, auch am Neste, wenn die Jungen ziemlich flügge sind, mittels Leimruten oder am Boden mittels Schlaggarn, indem man das Nest in eine Vertiefung am Boden stellt, mit Sicherheit gefangen werden. Diese Methode ist aber verwerflich, weil sie auf Kosten der Elternliebe geht, aber es ist auch zu verzeihen, wenn es sich um einen ausgesuchten Sänger handelt. Der Vogelfang ist eben ein heikles Thema, weil verboten, aber auch ein ebenso notwendiges Anhängsel unserer gesetzlich erlaubten Liebhaberei, denn ohne Vogelsang keine Vogelliebhaberei, nur human muß derselbe betrieben werden und nur zur Befriedigung des allernotwendigsten Bedürfnisses. Die Fangmethode von Herrn Nieselt ist gut und bequem, sie wird aber wohl nur wenigen Liebhabern von Nutzen sein, denn erstens, wer hat es so gut, daß er vor seiner Wohnung einen Garten hat mit Bäumen, auf denen sich ein Gelbspötter befindet, und ist dies der Fall, bringt es jeder fertig, einen solchen Sänger, der eine Zierde für einen Hausgarten bedeutet, für den Käfig zu fangen; mag sein, daß es gerechtfertigt ist, nach meinem seelischen Empfinden zu urteilen, verwerfe ich jeden Vogelfang in der Nähe von menschlichen Wohnungen, wenigstens wenn dieselben dort Standvögel sind. Zum Thema Vogelfang will ich nur erwähnen, daß ein richtiger, erfahrener Liebhaber

Elster.

doch etwas mehr wissen muß, als nur das, daß die Vögel der Vogelfänger im Säckchen aus dem Walde bringt, er muß auch wissen, wann, wo und wie dieselben dort hineinkommen, das erhöht das Ideale an unserer Liebhaberei. (Fortsetzung folgt.)

Rabenvögel in der Gefangenschaft.

Von Rudolf Neunzig.

(Nachdruck verboten.)

Zu meinen besonderen Lieblingen aus der Vogelwelt gehören die Rabenvögel. Sie sind zweifellos sehr intelligente Vögel. Gerade ihre psychologische Einstellung ist es, was mir ganz besonders beachtenswert erscheint. Ich will hier nicht über psychologische Fragen rechten und auch nichts darüber berichten; ich will hier nur einiges über ihre Pflege, die, wie es mir scheint, nicht die gebührende Beachtung findet, angeben. Selten findet man in Jahrgängen der „Ges. Welt" einen Bericht über diese Vogelgruppe. Es mag hauptsächlich wohl die Raumfrage sein, welche die Vogelpfleger davon abhält, die verhältnismäßig großen Vögel zu be-

herbergen; ferner spielt wohl auch das meist schlichte Federkleid der Vögel eine Rolle dabei. Die Futterfrage kommt kaum in Betracht, da gerade diese Vögel verhältnismäßig wenig kostspielig werden.

Im Laufe der Jahre habe ich eine größere Anzahl von Rabenvögeln verpflegt und aufgezogen und habe dabei manche Erfahrungen gesammelt. Im allgemeinen macht die Aufzucht dem Nest entnommener Vögel keine Schwierigkeiten. Doch ist sie nicht so einfach, wie oft angenommen wird. Auch die jungen Rabenvögel bedürfen einer sorgfältigen, möglichst naturgetreuen Aufzucht. Sind diese Voraussetzungen gegeben, so wird der Pfleger auch Freude an seinen Tieren haben; sind sie nicht gegeben, so wird er Todesfälle zu verzeichnen haben, oder seine Zöglinge sind nicht lebensfähig genug, sie gehen an irgendwelchen rachitischen Erscheinungen später zugrunde. Der Fehler, der bei der Aufzucht der Rabenvögel oft gemacht wird, ist, daß man diese Vögel mit allem Möglichen und Unmöglichen füttert, ferner fehlt es an der nötigen Sorgfalt, Pünktlichkeit und Sauberkeit. Wer dies alles nicht erfüllen kann, der läßt lieber die Jungen im Nest, denn er hat doch keine Freude an seinen Pfleglingen. Ich habe eine Anzahl von Dohlen, Elstern, Eichelhähern und Krähen aufgezogen und habe dabei immer die Erfahrung gemacht, daß fast ganz flügge Vögel, die gerade vor dem Verlassen des Nestes stehen, am geeignetsten sind. Oft wird empfohlen, jüngere Vögel, bei denen gerade die Kiele durchbrechen, zu nehmen. Doch glaube ich, daß die Zeit, in welcher junge Rabenvögel gefüttert werden müssen, bis sie selbst fressen lernen, zu lang ist und dabei vieles unterlassen wird. Auch glaube ich, daß die von den Eltern bis zu diesem Stadium aufgezogenen Jungen meist kräftiger sind, da sie dort ihre natürliche Nahrung hatten. So soll die Aufzucht ganz junger Saatkrähen kaum möglich sein. Als Aufzuchtfutter verabreiche ich stets frische Ameisenpuppen, frisches und gekochtes Fleisch, später auch Milchsemmel und ein Gemisch aus angefeuchtetem Weißbrot, etwas Garnelen, Fleischmehl, wenig Spratts Kükenfutter und wenig Weizenkleie. Dazwischen erhalten meine Vögel stets Ameisenpuppen und Fleisch. Auch kann man in das Mischfutter etwas Kartoffeln, Reis oder Haferflocken geben. Aber ersteres scheint mir das Bessere zu sein. Dohlen und Krähen lassen sich häufig noch lange füttern, trotzdem sie erwachsen sind, dann erhalten sie dasselbe Futter wie die alten Vögel. Allmählich lernen sie dann das Futter aufnehmen und fressen, besonders wenn sie einige Male nicht gefüttert werden, was ihnen nichts schadet. Wenn man seine Zöglinge recht zahm halten will, so erhalten sie auch später, wenn sie schon selbst fressen, einen Bissen aus der Hand. Sie betteln ja noch lange darum.

Die Fütterung der alten Rabenvögel macht wenig Schwierigkeiten. Doch darf man es nicht an Abwechslung fehlen lassen. Meine Vögel erhalten ein Gemisch aus gekochtem Reis, ausgedrücktem Weiß- oder Schwarzbrot oder Kartoffeln, etwas Spratts Kükenfutter, Fleischmehl, Garnelen, Kleie und stets etwas rohes oder gekochtes Fleisch. Zur Abwechslung läßt man bei dem Futter ein und das andere weg und ersetzt es durch gekochte Kartoffeln, Haferflocken, gekochte Mohrrüben oder auch gekochte Hülsenfrüchte. Nebenbei erhalten sie stets etwas Körnerfutter: Weizen, Gerste und Hafer. Grünkraut, Beeren und Obst bilden weitere Zugaben. Viele fressen sehr gern Kuchen und Zwieback. Bei dieser Fütterung halten sie sich sehr gut. Trink- und besonders Badegelegenheit sind nicht zu vergessen.



Dreizehenspecht.

Mittelspecht. Elsterspecht.

Bevor ich auf meine Rabenvögel zu sprechen komme, möchte ich ihre Behausung beschreiben. Sie bewohnen eine 6 m lange, $2^1/_2$ m breite und hohe Voliere, welche sich an einen gemauerten großen Stall anlehnt und, da sie einstmals Hühner beherbergte, ein Schlupfloch in das Innere des Stalles hat; diesen können die Vögel im Winter aufsuchen. Das Innere der Voliere ist mit einigen Fichten, Holunder und Spiraeen bepflanzt, außerdem ist ein Schutzdach gegen Regen und ein zementierter Ententeich vorhanden. Der Raum ist von großen Fliederbüschen an verschiedenen Stellen umwachsen. Sitzstangen, Badegelegenheit und Futternäpfe vervollständigen die Einrichtung. Der Zugang zur Voliere erfolgt durch eine kleinere (4 m lang). In letzterer befindet sich ein 3 m^3 großer Flugraum, in dem die jungen Rabenvögel untergebracht werden. Die Gemeinschaft mit alten dürfen sie erst nach längerem Selbständigsein teilen.

Den großen Flugraum bewohnen augenblicklich: 1 Nebelkrähe, 1 alte Dohle, 1 diesjährige Dohle, 1 diesjährige Rabenkrähe und 2 Elstern; den kleinen: 2 junge Dohlen, 1 junge Nebelkrähe und 1 junger

Eichelhäher. Der älteste Insasse der großen Voliere ist eine fünfjährige weibliche Dohle, die ich 1919 aufzog. Sie ist sehr schön im Gefieder und hat ein schönes weißlichblaugraues Nackenband. Trotz ihrer großen Zahmheit flog sie mir einige Tage vor Pfingsten 1920 weg und kehrte nicht, wie sonst, zurück; im Hochsommer 1921 erfuhr ich durch Zufall, wo sich die Dohle befindet und an einem besonderen Kennzeichen erkannte ich sie sofort. Der neue Besitzer wollte sie mir trotz der verlockendsten Angebote nicht herausgeben, da der Vogel so zahm sei. Er trieb sich tagsüber in dem großen Garten umher und schlief nachts im Hühnerstall, den er abends aufsuchte. Ich hatte nun alle Hoffnung aufgegeben, den Vogel wieder zu erhalten. Da eines Tages, im November 1921, es waren $1^1/_2$ Jahre seit dem Verschwinden der Dohle verstrichen, als ich von einem Nachbar, der mir gegenüber wohnte, den Vogel wiedererhielt. Der kleine Sohn der Leute hatte ihn gegriffen, als er ihm gerade ein Stück Keks aus der Hand nehmen wollte. Nun lebte die Dohle zwischen Hühnern und Tauben in einer Voliere. Im vorigen Jahre baute sie im Stalle ein Nest, legte zweimal fünf Eier, die sie sehr lange bebrütete. Am Nest war sie sehr bissig. Sie antwortete vom Nest her stets auf ihren Namen. Sie ahmt allerlei Laute nach, wie Bellen und ähnliche, und spricht deutlich ihren Namen Jak. Lange Zeit war ihr Freund ein Eichelhäher, den ich im Jahre 1915 erhielt und der ebenfalls sehr zahm war. Er flog mir einige Male weg, doch kam er, oder ich erhielt ihn stets zurück. Doch vor zwei Jahren kam er im Herbst zufällig aus seiner Voliere heraus und kehrte nicht mehr zurück. Als Ersatz habe ich in diesem Jahre einen jungen Eichelhäher aufgezogen.

Großer Buntspecht.

In den früheren Jahren erhielt man in den zoologischen Handlungen häufiger junge Rabenvögel, was in demselben Jahre, abgesehen von Dohlen, nicht der Fall war. So erhielt ich trotz eifriger Nachfrage keine Elstern und Saatkrähen. Die Nachfrage nach ihnen scheint sehr gering zu sein. Vergeblich habe ich mich bemüht, Kolkraben, Tannenhäher, Alpendohlen und Alpenkrähen zu erhalten. Dies wären alles zur Beobachtung lohnende Objekte. Die diesjährigen drei jungen Dohlen, die ich aufzog, ließen sich, wie gewöhnlich, lange füttern. Sehr unangenehm ist der Spektakel, den sie beim Füttern anstellen. Über sie läßt sich sehr wenig berichten, ebenso über eine Nebelkrähe, die ich vor einigen Tagen erhielt. Die alte Nebelkrähe, welche die Voliere mitbewohnt, erhielt ich im Winter dieses Jahres als halbverhungertes Tier, sie erholte sich schnell und ist nicht recht zahm geworden. Sie ist nicht unbändig, jedoch hält sie sich sehr reserviert. In letzter Zeit hat sie sich mit einer zahmen jungen Rabenkrähe angefreundet. Da mir die Nebelkrähe zu scheu war, wollte ich sie im Frühjahr fliegen lassen und jagte sie zweimal aus der Voliere, die sie verließ, aber jedes Mal bald wieder dorthin zurückkehrte. Nun behielt ich sie. Die erwähnte Rabenkrähe stammt aus Süddeutschland. Sie ist bis jetzt sehr zahm und verspricht ein liebenswürdiger, netter Vogel zu bleiben. Zum Schluß will ich noch der Elster gedenken, die ich als Wildfang erhielt. Sie hat sich gut eingelebt, ist aber ebenso zurückhaltend wie die Nebelkrähe. Eines Tages fing ich sie heraus, da sie mir etwas mager zu sein schien und setzte sie in eine kleine Voliere, sie erholte sich, doch rupfte sie sich in wenigen Tagen die Unterseite kahl. Solange der Vogel abgesondert gehalten wurde, ließ er diese Unart nicht. Seitdem er wieder im alten Flugraum ist, habe ich es nicht mehr beobachtet.

So bietet die Haltung und Pflege der Rabenvögel des Interessanten genug. Ich habe hier nur einen kleinen Ausschnitt aus der Pflege und dem Leben meiner Vögel gegeben, und ich hoffe, daß meine Zeilen dazu beitragen, dieser geistig hochstehenden und beachtenswerten Gruppe aus dem Vogelreich neue Freunde zu werben.

Sprechsaal.

(Steht den Abonnenten kostenlos zur Verfügung.)

Auf Frage 10. Zur Mehlwurmzüchtung bedient man sich am besten einer Holzkiste von beliebiger Größe, die aber nicht höher als 30 cm sein sollte. Die Holzkiste wird mit dünnem Blech im Innern ausgeschlagen. Verschlossen wird die Kiste mit einem aus dünnen Brettern verfertigten Holzdeckel, der auf im Innern der Kiste angebrachten Leisten ruht. In der Mitte des Deckels schneidet man ein etwa 1 □cm großes Loch heraus und nagelt darüber Drahtgaze. In die Kiste schüttet man etwa 20 cm hoch im Ofen vorher gutgedörrte grobe Weizenkleie. Das Dörren geschieht, um die etwa in der Kleie vorhandenen Mehlmilben zu töten. Im Zuchtkasten vorhandene Mehlmilben können die ganze Zucht gefährden, und es ist mühsam, die kleinen Schmarotzer aus dem Zuchtkasten zu vertreiben. Oben auf den Kleiesatz legt man ein nicht zu dünnes, etwa 10×20 cm großes, mit rundem Rand versehenes Brett, auf welches das Futter für die Mehlwürmer und Mehlkäfer gelegt wird. Dieses besteht in frischem Brot oder mit Wasser angefeuchtetem und gut ausgedrücktem älteren Brot, Möhrenscheiben, Salatstrunken. Das Futter muß feucht sein, damit Würmer und Käfer auch die nötige Feuchtigkeit aufnehmen können. Feuchtigkeit darf aber nicht in den Kleiesatz dringen. Aus diesem Grund nehme man das Futterbrett nicht zu dünn. Das Futter wird erneuert, sobald es aufgezehrt oder trocken geworden ist, was im Sommer gewöhnlich innerhalb zwei Tagen der Fall ist. In die so eingerichtete Kiste, die man in gewöhnlicher Stubenwärme hält, schüttet man möglichst

große Würmer, und zwar auf eine Bodenfläche von 25 × 25 cm etwa 1000 Würmer. Am besten ist es, die Züchtung mit zwei Zuchtkisten zu beginnen. Die Verwendung von Tongefäßen, die vielfach üblich, ist nicht zu empfehlen.

Aus den Verbänden.

Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber, Sitz Leipzig. Tausch-Vermittlung. Wie bereits in dem in Nr. 17 der „Ges. Welt" veröffentlichten Bericht über die am 7. Mai 1924 stattgefundene Vorstandssitzung des Reichsverbandes bekanntgegeben, beabsichtigt der Vorstand für die Mitglieder des Reichsverbandes eine Kauf- und Tauschvermittlung einzurichten.

Nach eingehender Prüfung aller in Frage kommenden Gesetze usw. hat der Vorstand beschlossen, daß die „T.-V." am 15. August 1924 ihre Tätigkeit aufnehmen soll. Da nach den in Sachsen gültigen Gesetzen der Verkauf und auch die Verkaufsvermittlung von in Sachsen geschützten Vögeln das ganze Jahr verboten bzw. strafbar ist, ergibt sich von selbst, daß die „T.-V." mit wenigen weiter unten angeführten Ausnahmen nur Tauschgesuche weitergeben bzw. vermitteln kann. Alles weitere wollen die Mitglieder aus den hier folgenden Richtlinien ersehen.

1. Die Tätigkeit der „T.-V." beschränkt sich in jedem Falle nur auf die Vermittlung von Anschriften. Alles weitere ist einzig und allein Angelegenheit der Austauschenden. In etwa vorkommenden Fällen, in denen offensichtliche, grobe Vorstöße gegen Treu und Glauben nachgewiesen werden können, ist ein entsprechender Bericht mit allen Unterlagen an den 1. Vorsitzenden des Reichsverbandes, Herrn Joh. Birk in Leipzig-Mockau, Beuthstr. 29, einzusenden.

2. Die „T.-V." kann von allen Mitgliedern des Reichsverbandes kostenlos benutzt werden. Um den tauschenden Mitgliedern im voraus eine gewisse Garantie geben zu können, sind die Tauschgesuche von Mitgliedern, welche durch einen Verein dem Reichsverbande angeschlossen sind, mit dem in Frage kommenden Vereinsstempel zu versehen.

3. Die Vermittlung von Kaufangeboten und -gesuchen kann nur erfolgen, soweit sich dieselben auf Käfige, Utensilien zur Vogelpflege, Futtermittel, Literatur, optische Instrumente und die nachstehend aufgeführten Vögel beziehen: Rebhühner, Wachteln (nur in der Zeit vom 1. September bis 31. Januar j. J.), Raben, Krähen, Elstern, Dohlen, Häher, wilde Tauben, Würger (alle Arten), Singvögel nur soweit dieselben nachweislich im Käfig gezüchtet bzw. geboren sind (Bastarde), endlich Kanarien und Exoten. (Auch der Verkauf bzw. die Kaufsvermittlung von aus dem Auslande bezogenen, in Sachsen geschützten Vögeln ist verboten.)

4. Tauschgesuche können nur vermittelt werden, wenn auf denselben (soweit ein Tausch von in Sachsen geschützten Vögeln in Frage kommt) das Tausch- und Eintauschobjekt genannt sind. Ein Preis bzw. ein ziffernmäßig ausgedrückter Wert des Vogels darf nicht angegeben werden. Tauschgesuche von geblendeten Vögeln können nicht vermittelt werden.

5. Um die Arbeit der „T.-V." zu erleichtern, wird gebeten, die Tauschgesuche nach dem hier folgenden Schema in Postkartengröße auszufüllen:

Biete zum Tausche an:
Schwarzplättchen gegen Rotkehlchen
(oder „ Feldlerche)
Falls Vermittlung nicht möglich, Rückantwort nach ..... Tagen erbeten.

Vereinsstempel. Name .....
Wohnung .....

Es wird gebeten, für jede einzutauschende Vogelart eine aparte Karte (Zettel) einzusenden. Eine Rückantwort resp. Vermittlung kann ausnahmslos nur erfolgen, wenn eine frankierte Postkarte mit der genauen Adresse des Absenders beigelegt wird. Wie oben angegeben, bitten wir um Angabe, nach welcher Zeit die Rückantwort an den Absender zurückgesandt werden soll, falls ein entsprechendes Gegenangebot nicht vorliegt.

6. Im Interesse aller sich am Austausch beteiligenden Mitglieder wird dringend gebeten, die „T.-V." nach Erledigung eines Tauschgesuches sofort zu benachrichtigen.

7. Die Erledigung der Arbeiten der „T.-V." hat der 2. Schriftführer des Reichsverbandes Herr Richard Vorwerk in Leipzig-Lößnig, Merveldtstr. 39 II übernommen und sind alle Tauschgesuche nur an denselben einzusenden.

Auch eine Kaufgelegenheit (innerhalb der gesetzlich zulässigen Frist) ist vorgesehen. Die Angelegenheit ist jedoch noch nicht soweit gediehen, daß sie zur Kenntnis unserer verehrten Mitglieder gebracht werden kann. Ein Bericht hierüber wird nach günstigem Abschluß der Verhandlung in Aussicht gestellt.

Der Vorstand.
J. A.: Petters, 1. Schriftführer.

Anmerkung zu Abs. 3. Durch das „Gesetz zur Abänderung des Feld- und Forstpolizeigesetzes vom 1. April 1880, vom 8. Juli 1920" ist im Freistaat Preußen der Rotkopfwürger und der Schwarzstirnwürger, der Kolkrabe das ganze Jahr hindurch geschützt, der Tannenhäher, die Turteltaube und Hohltaube sind vom 1. März bis zum 31. August geschützt.

Die Schriftleitung.

Vom Vogelmarkt.

Von seltener auf den Vogelmarkt kommenden Vögeln werden angeboten:

N. Diwersy, Merzig a. Saar (A. Z.-Mtgl. 183): Roter Kardinal.

Friedrich Frank, München, Gabelsbergerstraße 9: Große Gelbhaubenkakadus, Mönchssittiche.

Paul Frenzel, Breslau 3, Bergstraße 32 II: Wildgänse (Graugans), Mäusebussarde, Nebelkrähen, 1 weißer Storch, 1 Fischreiher.

Max Kleinert, Berlin NO 18, Strausberger Str. 13, Fernruf Alexander 3313: Goulds-amandinen, rot- u. schwarzköpfige, Spitzschwanzamandinen, Maskenfinken, große Gelbhaubenkakadus, Molukken-Kakadus, Schamadrosseln, Goldstirnblattvögel, dreifarb. Prachtglanzstare, Tarant. Unzertrennliche.

Saller, Planegg, Christinestraße 7: 1 amerikanische Spottdrossel.

Georg E. F. Schulz, Berlin-Friedenau, Hertelstraße 1 II: Turdus albicollis, T. amaurochalinus, T. flavipes und T. fumigatus.

Offerten unter Nr. 24 an die Exped. der „Ges. Welt": 1 purpurroter Gelbmantel-Lori, 1,1 Goulds, 1,1 Spitzschwanz-Amandine.



Herrn E. J., Stettin. 1. Junge Bachstelzen verlassen das Nest, sobald sie flugfähig sind, was im Alter von etwa 14 Tagen der Fall ist. 2. Im Nestkleid sind die Geschlechter nicht zu unterscheiden, im Alter von 5—6 Wochen mausern die jungen B. das Kleingefieder. Diese Mauser ist nach 3—4 Wochen erledigt. Das Männchen ist dann an dem dunkleren Grau am Hinterkopf kenntlich. 3. Ernährt werden die jungen Vögel mit frischen Ameisenpuppen, weichschaligen Kerfen, später kommen hierzu gut gequollene trockene Ameisenpuppen, mageres klein gewiegtes Fleisch (Herz), hartgekochtes Eigelb und allmählich alle die Stoffe, welche den alten Vögeln als Nahrung gereicht werden.

Herrn Pastor G., Sakro. Besten Dank für die Mitteilung. Die gewünschte Adresse ist: Duisburg, Mülheimer Str. 75.

Frl. F. L., Oberkirch. Der größere Star ist sicher ein ♂, der kleinere vielleicht ein ♀. Ein Käfig 75 × 50 ⊥ 50 cm ist geeignet.

Herrn S. L., Bln.-Johannisthal; Frl. A. L., Bln.-Friedenau; Herrn E. B., Hamborn: Beiträge dankend erhalten.

(Fortsetzung auf der 3. Umschlagseite.)

Aufruf!

Eine Anzahl Freunde unserer einheimischen Sänger beabsichtigen einen „Liebhaberverein" zu gründen, und zwar für die Kreise Gotha, Langensalza, Mühlhausen und Erfurt. Mittelpunkt könnte Gotha werden. Liebhaber, die sich für unsere Sache interessieren, wollen sich baldigst bei mir melden.

Großenbehringen b. Gotha, im Juli 1924.

Pfarrer Schwabe.

Aus den Vereinen.

Angemeldet ist Herr Wilhelm Simmerlein, Althaldensleben, Provinz Sachsen, Lindenplatz 12. Aufgenommen ist Mitgl. Nr. 400 Herr Heinrich Pauen, Düsseldorf 53, Talstr. 60.

A. Krabbe.

Verein Vogelschutz und -pflege zu Dresden. Versammlung jeden Donnerstag, abends 8 Uhr, im Vereinslokal, „Schillers Restaurant", Ecke Stifts- und Ehrlichstraße. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen.

Bernhard Kühn, Vorsitzender.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei zu Hamburg. Sitzungen finden statt jeden 1. und 3. Dienstag im Monat in Hüttmanns Hotel, Poolstr. 22, abends 8¼ Uhr. Nächste Sitzung Dienstag, den 5. August 1924.

J. A.: Arnold Weber, 1. Vorsitzender.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig. Vereinssitzungen jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat im Vereinslokal, „Bauers Brauereirestaurant", Täubchenweg. Nächste Sitzungen am 7. und 21. August. Gäste stetswillkommen.

J. A.: Johann Birk, 1. Vorsitzender.

Verein der Vogelfreunde Leipzig-Plagwitz. Vereinslokal: „Gosenschlößchen", Leipzig-Plagwitz. Sitzungen an jedem 1. und 3. Montag des Monats, abends 8 Uhr. Vogelfreunde sind stets willkommen.

J. A.: Karl Scholtissek, 1. Vorsitzender, Leipzig-Plagwitz, Lauchstädter Straße 30.

Verein der Vogelliebhaber zu Mannheim. Versammlungen finden alle 14 Tage Samstag abend 8 Uhr im Vereinslokal „Restauration z. gold. Falken" statt. S. 1. 17. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen.

Johann Daubmann, 2. Schriftführer.

Für Entomologen.

Bau's Schmetterlingsbuch. Zum Selbstbestimmen aller in Deutschland, Österreich, Ungarn und der Schweiz vorkommenden Groß- sowie der vorzugsweise gesammelten Klein-Schmetterlinge. Mit 67 Textabbildungen. Kart. 4.— M.

Bau's Käferbuch. Zum Selbstbestimmen der in Deutschland, Österreich-Ungarn und der Schweiz vorkommenden Koleopteren. Mit 144 Textabbildungen. Kart. 4.— M.

Der Käfer- und Schmetterlingssammler. Anleitung zur Herstellung und Handhabung der beim Fange, der Zucht und dem Präparieren von Käfern, Schmetterlingen und Raupen als geeignet bewährten Geräte, sowie zur Anlage und Erhaltung von Insektensammlungen. Von Karl Wingelmüller. Mit 32 Abbildungen. Geh. 1.50, geb. 2.— M.

Schädlinge und Nützlinge der Kleintierwelt. Ein Lehrbuch für jedermann von Prof. Dr. L. Glaser. Mit 85 Textabbild. Kart. 3.— M.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg / Postschließfach 148

Von folgenden **Farbentafeln** der **„Gefiederten Welt"** sind noch einige Exemplare vorrätig, welche wir, solange der geringe Vorrat reicht, zum Preise von **1 G.-M. für die Tafel** zuzügl. **20 G.-Pf.** Porto u. Verpackung **für jede Sendung** bei vorheriger Einsendung des Betrages auf unser Postscheckkonto **Magdeburg 3148** abgeben.

1898 Tafel III: Schwarzspecht. (Schwarzdrucktafel.)
1899 Tafel IV: Nest des Gartenrotschwänzchens mit Weibchen, Jungem und Ei. (Schwarzdruck.)
1900 Tafel I: Madagaskar-, Napoleons-, dottergelber, Samt-, Blutschnabelweber.
1900 Tafel II: Kl. Alexander-, Bunt-, Wellensittich, Rosenpapagei, kl. Gelbhaubenkakadu.
1900 Tafel III: Sonnenvogel, blauer Hüttensänger, Rosenstar, Schamadrossel, weißohriger Bülbül.
1900 Tafel IV: Paradieswitwe, Mozambikzeisig, Grauer Kardinal, Safranfink, Papstfink.
1901 Tafel III: Kleinspecht, Kleiber, Wendehals.
1902 Tafel I Kohl-, Schwanz-, Hauben-, Tannenmeise.
1902 Tafel II: Goldammer, Baumpieper, Feldlerche.
1902 Tafel IV: Diamant-, weißbäckige Gürtel-, Masken-, Gürtelamandine.
1903 Tafel I: Hausrotschwanz, Sprosser, Nachtigall, Rotkehlchen.
1903 Tafel II: Bluthänfling, Grünling, Kernbeißer, Buchfink.
1903 Tafel III: Mistel-, Wacholder-, Wein-, Singdrossel.
1903 Tafel IV: Zwergstrandläufer, Wachtel, Weißflüglige Seeschwalbe, Sandregenpfeifer.
1904 Tafel I: Zaun-, Garten-, Dorn-, Mönchgrasmücke.
1904 Tafel II: Schneefink, Steindrossel, Alpenbraunelle, Steinsperling.
1904 Tafel III: Binden-, Kiefern-, Fichtenkreuzschnabel.
1904 Tafel IV: Bartmeise, Rohrammer, weiße Bachstelze, Sumpfrohrsänger.
1905 Tafel I: Schwarzbürzel-, Spitzschwanzbronzemännchen, weißes, gelbbuntes, braunbuntes jap. Möwchen.
1905 Tafel II: Grau-, Orange-, Erz- und Schmuckpfäffchen.
1905 Tafel IV: Schwarzkehl-, Dreifarben-, Weißkopf- u. Schwarzkopfnonne.
1906 Tafel II: Lein-, Erlenzeisig, Berghänfling, Stieglitz.
1906 Tafel III: Stein-, braunkehliger und schwarzkehliger Wiesenschmätzer.
1907 Tafel II: Weißsterniges, rotsterniges, Wolfsches Blaukehlchen, Blaukehlchen ♀.
1907 Tafel III: Kleines, Zwerg-, Glanz-, Riesen-, rotrückiges und Gitterflügel-Elsterchen.
1907 Tafel IV: Karmin- und Hakengimpel, Gimpel.
1908 Tafel II: Braunrückengold- ♂ ♀, Schwarzkopf- und Goldsperling ♂ ♀.
1908 Tafel IV: Pünktchenastrild, Amarant ♂ ♀, dunkelroter Astrild, Tigerfink ♂ ♀.
1909 Tafel I: Orangegesichtiger Unzertrennlicher, Rosenpapagei, Rußköpfchen, Tarantinischer Unzertrennlicher, Grauköpfchen.
1909 Tafel II: Klarinetten- u. Mennigvogel, braunkehliger Blauschnäpper.
1909 Tafel III: Schwarzbäckchen-, Elfen-, Bunt- und Granatastrild, gemalter Astrild.
1909 Tafel IV: Orange-, Rotkopf-, Blutschnabel-, Napoleons- und Madagaskarweber.
1910 Tafel I: Grauer, Trauer-, Halsband-, Zwergfliegenschnäpper.
1910 Tafel IV: Zipp-, Garten-, Zaun-, Kappenammer.
1911 Tafel I: Rotrücken-, Raub-, Schwarzstirn-, Rotkopfwürger.
1911 Tafel II: Zeresastrild, Malabarfasänchen, Muskatfink, Silberschnäbelchen.
1911 Tafel III: Gartensänger, Fitislaub-, Weidenlaub- u. Waldlaubvogel.
1911 Tafel IV: Goldköpfiges ♂ ♀, feuerköpfiges Goldhähnchen, Zaunkönig.
1912 Tafel II: Wieners, Aurora-, Tropfen-, Wachtel- und Rebhuhnastrild.
1912 Tafel III: Magellan-, Kapuzen-, mexikanischer, Yarells und Trauerzeisig.
1912 Tafel IV: Dorn-, Sonnen- Binsen- und Gitterflügelastrild, Zebrafink.
1913 Tafel II: Violettblauer u. Rotbauchorganist, Purpur-, Dreifarben- und schwarzblaue Tangare.
1913 Tafel III: Paradies-, Dominikaner-, Königs-, Fischers, Rotscheitel- und Gelbrückenwidafink.
1913 Tafel IV: Goldschulter-, Fein-, Sing-, Browns Singsittich.
1914 Tafel I: Schwarzkopf-, Rosenbrust- u. mexik. Gelbkernbeißer, dunkelblauer Bischof, roter Kardinal.
1914 Tafel III: Diuka-, Grau-, Kron- u. Morgenammerfink, Graukardinal.
1914 Tafel IV: Pikui-, Kap-, Diamant-, Tamborin- u. Friedenstäubchen, chinesische Zwergwachtel.
1915 Tafel I: Sammetköpfchen, Sperber-, Orpheus- und Bartgrasmücke.
1915 Tafel III: Diamantfink-, Masken-, Weißwangen- und Spitzschwanzamandine, Gürtelgrasfink.
1915 Tafel IV: Star, Pirol, Rosenstar.
1920 Tafel I: Nandy-, Jendaja-, Guajakil- und Goldstirnsittich.
1920 Tafel II: Schuppenköpfchen, Schnurrbärtchen, dottergelber, Zwergmasken- und Textorweber.
1920 Tafel III: Tui-, Ziegen-, Mönch-, Tuipara- u. Katharinasittich.
1920 Tafel IV: Reisfink, weißer Reisfink.
1921 Tafel I: Gelber Wellensittich und Wellensittich.
1921 Tafel II: Kleiner Gelbhaubenkakadu.
1921 Tafel III: Kleiner Alexandersittich.
1921 Tafel IV: Domingo-, Cuba- und Rotbugamazone.

Da die Nachfrage nach Farbentafeln sehr groß ist, bitten wir sofort zu bestellen.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg / Postschließfach 148

Anzeigenteil

Die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 20 G.-Pf. berechnet. Aufnahme erfolgt gegen Voreinsendung des Betrages in Reichsgeld per Brief od. auf unseren Zahlstellen: Postscheckkonto: Magdeburg 3148, Wien 156 687, Bern III 4326, Prag: Creditanstalt d. Deutschen unter Angabe des Zweckes.

Käfige u. Gerätschaften

Gimpelbauer

mit Drahtstäben 17½ cm lang, 17 cm hoch, 13 cm breit pro Dtzd. 14 ℳ; fertige alle Sorten Käfige und Utensilien für Kanarien an. [588

A. Janson, Barbis a. H.

Schindler-Sprosser- und Zaunkönig-Käfig

sowie 2 and. Drossel-Käfige gebe zu ⅗ ihres Nennwertes ab.

Otto Leuschner, Berlin NW 52,
589] Werftstraße 10 III v.

Futtermittel

Empfehle:

Echt engl. Farbenfutter

zur Anfütterung leuchtend hochgelber bis orange Farben, ½ kg 10 ℳ.

Heydenreichs Harzer Heilmittel gegen Rotleibigkeit, Freßsucht u. sonstige Magen- u. Darmkrankheiten aller Vögel, einfache praktische Anwendung, keine Futter- u. Wasserquacksalberei, 1000fach im Gebrauch, 2.50 ℳ.

Prima Kanarienhähne und Weibchen meines tiefen, vielseitigen durchgezüchteten Stammes.

Schneeweiße Kanarien.

Richard Heydenreich

590] **Bad Suderode, Harz**

Harzer Kanarien-Feinzucht
Staatspreis, viele gold. Med.

Vogelfutter [591

für Kanarien, Waldvögel, Exoten, Papageien, Weichfresser. Anfragen nur gegen Rückporto. Liste 13 über Vogelfutter, Liste 5 über Vogelkäfige, Zuchtgeräte usw. mit etwa 400 Abbild.

W. Göpel, Leipzig,
Tröndlinring 1. Telephon 14 958.

Mehlwürmer neue, feinste Qualität, Pfd. 8 ℳ
592] **Jeltner, Breslau,** Weinstr. 12.

Mehlwürmer

geg. Einsend. v. 2.— Reutenmark ¼ Pfd. franko versend. **D. Waschinski & Co.,**
Biesenthal I (Mark). [593

10 Ltr. Ia trock. Ameisencier à 1,80 M., in Tausch nehme diesjährige junge Schwarzbl., Männchen und Weibchen. **Suche** gut erhalt. Vogelorgel z. kaufen.

Jos. Ehrlich, Würzburg,
594] Weißenburgstraße.

Vögel

2 pr. Schamadrosseln

Männchen, hervorragende Sänger, abzugeben. Preis à 65 Mark.

Tausche gegen: Jap. Möwchen, Zebrafinken, div. Sittiche und andere Exoten.

Ferner suche

einige kleine Zimmervolieren (ca. 1,25 m lang). [595

S. Lichtenstaedt,
Berlin-Johannisthal, Nieberstr. 10.

Harzer Kanarien

garantierte Männchen, 24er, Stück 8 M., Dutzend 85 M., sichtbar verpackt.
596] **Beck,** Tierimport, **Stuttgart.**

Gartenbau-Bücherei

Herausgegeben von
Prof. **Dr. Udo Dammer,** Kustos des Botanischen Gartens Berlin-Dahlem.

Jeder Band 1.20 M.

Bd. 1. **Monatskalender des Pflanzen- und Gartenfreundes.** Von Prof. Dr. Dammer. 2. Auflage.

Bd. 2. **Zimmerblattpflanzen.** Von Prof. Dr. Dammer. 2. Auflage. Mit 48 Abbildungen.

Bd. 3. **Gewürzkräuter.** Von Obergärtner Bode. Mit 6 Abb.

Bd. 4. **Balkonpflanzen.** Von Prof. Dr. Dammer. 2. Auflage. Mit 41 Abbildungen.

Bd. 5. **Zimmerblütenpflanzen.** Von Prof. Dr. Dammer. 2. Auflage. Mit 23 Abbildungen.

Bd. 6. **Die ein- und zweijährigen Gartenpflanzen.** Von Gartenbaudirektor Goeschke. Zurzeit nicht lieferbar!

Bd. 7. **Der Gartenrasen.** Von Obergärtner Bode. Mit 14 Abb.

Bd. 8. **Die Farnpflanzen unserer Gärten.** Von Inspektor Mönkemeyer. Mit 15 Abbildungen.

Bd. 9. **Der Zwergobstbau.** Von Gartenbaudirektor Koopmann. Mit 6 Abbildungen. Zurzeit nicht lieferbar!

Bd. 10. **Die Staudengewächse.** Von Gartenbaudirektor Goeschke. Mit 35 Abbildungen.

Bd. 11. **Gemüsebau auf Gartenbeeten.** III. Teil. Von Gartenbauinspektor Lindemuth. Mit 20 Abbildungen. Vergriffen.

Bd. 12. **Pfirsiche und Aprikosen.** Von Obergärtner Kotelmann. Mit 13 Abbildungen.

Bd. 13. **Schönblühende Zwiebelgewächse.** Von Gartenbauinspektor Lindemuth. Mit 30 Abbildungen.

Bd. 14. **Blütensträucher.** Von Gartenbaudirektor Goeschke. Mit 28 Abbildungen.

Bd. 15. **Gemüsebau auf Gartenbeeten.** I. Teil. Von Gartenbauinspektor Lindemuth. Mit 22 Abbildungen.

Bd. 16. **Die Beerensträucher.** Von Gartenbauinspektor Maurer. 2. Auflage. Mit 14 Abbildungen.

Bd. 17. **Bunte Gehölze.** Von Gartenbaudirektor Goeschke. Mit 1 Tafel.

Bd. 18. **Gemüsebau auf Gartenbeeten.** II. Teil. Von Gartenbauinspektor Lindemuth. Mit 22 Abbildungen.

Bd. 19. **Gurke, Melone, Kürbis.** Von Inspektor Lange. Mit 15 Abbildungen.

Bd. 20. **Der kleine Villengarten.** Von Gartenarchitekt Pfyffer v. Altishofen. Mit 20 Abbildungen und 3 Tafeln.

Bd. 21. **Das Mistbeet.** Von Obergärtner Bode. Mit 5 Abbildungen.

Bd. 22. **Die Gartenlaube.** Von Landschaftsgärtner Klawun. Mit 14 Abbildungen.

Bd. 23. **Das Weinspalier.** Von Gartenbaudirektor Koopmann. Mit 17 Abbildungen.

Bd. 24. **Die Kultur der schönblühenden Orchideen.** Von Inspektor Lebien. Mit 7 Abbildungen.

Bd. 25. **Zimmer- und Freiland-Aquarienpflanzen.** Von Inspektor Mönkemeyer. Mit 26 Abbildungen.

Bd. 26. **Rosen.** Von Gartenbaudirektor Koopmann. 2. durchgesehene und ergänzte Auflage. Mit 17 Abbildungen.

Bd. 27. **Einfassungspflanzen.** Von Gartenbaudirektor Goeschke. Mit 44 Abbildungen.

Bd. 28. **Nadelhölzer.** Von Prof. Dr. Dammer.

Bd. 29. **Schönblühende Knollengewächse.** Von Gartenbauinspektor Lindemuth. Mit 20 Abbildungen.

Bd. 30. **Der Spargel.** Von Inspektor Dreßler. Mit 10 Abb.

Bd. 31. **Die Erdbeere.** Von Dozent Dr. Bürn. Mit 13 Abb.

Bd. 32. **Palmen.** Von Prof. Dr. Dammer. Mit 29 Abbildungen.

Bd. 33. **Gewächshaus des Privatmannes.** Von Inspektor Lebien. Mit 8 Abbildungen. Zurzeit nicht lieferbar!

Bd. 34/36. **Gartenfeinde und Gartenfreunde.** Die dem Gartenbau schädlichen und nützlichen Lebewesen. Von Prof. H. Kolbe. Mit 75 Abbildungen. 3.60 M.

Bd. 37/39. **Theorie der Gartenarbeiten.** Ein Katechismus des Pflanzenbaues. Von Prof. Dr. Udo Dammer. Mit 23 Abbildungen. Preis 4.60 M.

In Vorbereitung: **Champignon-Zucht. — Kakteen.**

Die besten Speiseschwämme von Gotth. Hahn. Mit naturgetreuen kolorierten Abbildungen auf 12 Tafeln. 1.20 M.

Die Tabakpflanze. Ein Handbuch zu ihrer Anzucht und Verwertung für jedermann. Von A. Oertel. 2. Auflage. —.60 M.

Zu beziehen durch:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlg., Magdeburg
Postschließfach 148.

Vogelhandlung

zu kaufen, evtl. **Beteiligung an solcher gesucht.** Angebote mit Preis unter **100** an die Geschäftsstelle der „Gefiederten Welt". [597

Suche

1,0 Schama, nur prima Vogel, und gebe in Tausch:
1,2 vorjähr. Möwchen, bewährtes Zuchtpaar Weißkopfnonne-Möwchen nebst 1,0 vorjähr. Bastardjungen, 0,1 Zebrafink u. 1,1 vorjähr. gar. reine Fuchskanarien, tadellose Zuchtvögel. **R. Langenbuch,**
598] Lübeck-Siems, Post Rücknitz.

Gebe wegen Platzmangels ab;
Schwefelgelb. Girlitz (sehr selten), ♂ **Leclancheri-Fink,** Paar **Grünkardinal,** ♂ **Weißflügelwitwe** (in Pracht), Paar **Braunrückenelsterch.,** ♂ **Braunkopfamarant,** alle vollst. akklimatisiert. [599

A. Adlersparre,
Handtverkaregat 90,
Stockholm (Schweden).

Für Kanarienzüchter!

Soeben erschienen:

Die Farben- und Gestaltskanarien

nebst Beschreibung aller verschied. Kanarienrassen, deren Entstehung, Form- u. Farbenveränderung, Bastardzucht u. Farbenfütterung v. A. Aschenbrenner. Mit vielen stichhaltigen Abb. Kart. 1.75 M.

Wichtig zur Zucht:

Der Kanarienvogel,

seine Naturgeschichte, Pflege u. Zucht von Dr. Karl Ruß. 14. Auflage. Mit 2 Farbentafeln und zahlreichen Textabbildungen. Bearbeitet von Karl Neunzig.
Kart. 2.50 M.

Die Bastardkanarienvogelzucht.

Von Walter Barth. Mit 20 Abbildungen und 1 Tondrucktafel. 1.50 M.

Zu beziehen durch:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg.
Postschließfach 148.

Inserate

für das am 14. August 1924 zur Ausgabe gelangende Heft 26 der Gefiederten Welt erbitten bis 9. Aug. 1924 früh

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Berlin-Hermsdorf; für den Anzeigenteil: Rolf Kretschmann, Magdeburg, Postschließfach 148.
Verlag der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck: August Hopfer, Burg Bz. Mgdbg.

Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Jahrg. 53 | Den 14. August 1924 | Heft 26

(Druckort: Burg, Bezirk Magdeburg.)

Von meinen Vögeln.

Von Fritz Braun.

(Schluß.) (Nachdruck verboten.)

Jenes Rotkehlchen ist mir im letzten Winter zugeflogen. Zuerst hauste es wochenlang im Keller, sich von den Abfällen meiner Vogelstube nährend, die dort den Hühnern vorgeworfen werden, dann stieg es im Treppenflur aufwärts und gelangte durch Zufall in meinen Korridor. Im Zimmer war es von vornherein recht vertraut, aber im kleinen Bauer desto ungestümer. Ich widmete diesem Vogel von vornherein große Teilnahme, weil er ein Musterbeispiel dafür ist, wie die berühmten „Gäste des Landmanns", von denen uns die Schulbücher berichten, in die Gefangenschaft gelangen.

Recht leid ist es mir, daß auch jenes Kanarienbauer mit dem angehängten Badehäuschen leer steht, so gemein und allbekannt auch sein Insasse sein mochte. Es handelte sich nämlich um einen Haussperling, der zweieinhalb Jahre von mir verpflegt wurde. Ich erbeutete den Vogel als altes Männchen im Treppenflur und steckte ihn in jenes Bauer, weil er sich in anderen Käfigen jämmerlich zerstieß. Hier fand er in dem trockenen Badehaus eine sichere Zufluchtsstätte, die er regelmäßig aufsuchte, wenn sein Behälter gereinigt und mit Futter und Trinkwasser versehen wurde. Aber so dummscheu er sonst auch erschien, dumm im eigentlichen Sinne des Wortes war er durchaus nicht und entwischte mir alle Monate mindestens einmal, so vorsichtig ich auch mit dem Ausreißer umging. Dann trieb er sich im Gebälk des Dachstuhls umher und zeigte sich dabei viel zutraulicher als im Bauer, wo er nach Jahr und Tag noch immer nicht zahm werden wollte. Dennoch konnte ich ihm den Freiflug nicht gönnen, weil dieser Spatz die törichte Gewohnheit hatte, sich mit zuckenden Flügeln und weit ausgebreitetem Schwanz an die Drahtwände der kleinen Käfige anzuhängen und wütend nach deren Insassen zu hacken, die dann, so ungefährlich das Treiben auch sein mochte, immer wieder unsinnig umhertobten.

Und leider habe ich derlei Hasenfüße, die durch alles und nichts in Furcht versetzt werden, so zahm sie sonst auch sein mögen, wieder eine ganze Menge. Jener Dompfaff kommt eigentlich nie dazu, ganze Schwungfedern zu besitzen, denn wenn er wirklich einmal so weit ist, schlägt er sich ganz gewiß in einer der nächsten Nächte den einen Flügel wieder zuschanden. Und dieser Zeisig in dem winzigen Käfig treibt's nicht besser. Darum habe ich ihn auch zu Einzelhaft verurteilt, denn im Flugbauer ist die Gefahr gar zu groß, daß er andere Vögel mit seinen nächtlichen Tobsuchtsanfällen ansteckt. Hochsommerliche Gewitternächte, wo grellaufleuchtende Blitze den Bodenraum immer wieder und wieder in lohender Glut aufleuchten lassen, sind in dieser Hinsicht besonders gefährlich. An manche andere Störungen gewöhnen sich die Vögel viel leichter. Beispielsweise kümmern sie sich nicht mehr um die nächtliche Beweglichkeit und das Schnabeltrommeln der Leinfinken, die namentlich jetzt im Hochsommer kaum je völlig zur Ruhe kommen. Diese schmucken Nordländer sind eben in voller Pracht; manche glänzen über und über in sattestem Karminrot, so daß mir fast wehmütig zumute wird, wenn ich mir vorstelle, daß nach ein paar Wochen diese rosige Prachtfarbe für immer dahin sein soll.

Noch zahlreicher als hier trieben sich im letzten Winter die großen Gimpel umher, die monatelang geradezu als Charaktervögel aller Gärten und Baumgänge gelten konnten. Ihrer waren so viel, daß mein Vogelfänger ihnen kaum noch nachstellte, da sich auch bei den billigsten Preisen keine Käufer mehr finden ließen.

Überaus spaßige Gesellen sind die Feldsperlinge in jenem Flugbauer. Ein paar Weibchen brüten wieder. Das heißt, sie sitzen in den Winkeln des Käfigbodens und werden erst nach 14 Tagen wieder beweglicher, wenn sie normalerweise ihre Brut gezeitigt hätten. Anfänglich wurde ich durch ihr Tun recht nervös, weil ich die braunscheiteligen Schelme für krank hielt. Jetzt lasse ich sie ruhig brüten, so lange sie lustig sind.

Ebenso überflüssigem Tun gibt sich meine Blaustirnamazone hin, die fortwährend aus dem Kropf füttert und die breite Sitzstange dabei hoch mit Speisebrei bedeckt. Merkwürdigerweise ist sie während dieser Zeit besonders redselig, so daß man mitunter den Eindruck gewinnt, sie wolle auf ihre gar nicht vorhandenen Sprößlinge einreden.

Nicht weniger geschlechtlich erregt als Frau Lora ist mein streitlustiger Grauedelsänger, obgleich der graue Zwerg schon mindestens 14 Jahre auf dem Buckel hat. Als mir der Postbote im Sommer 1912 den kleinen Schelm zutrug, der schon im Versandkäfig aus Leibeskräften schmetterte, ließ ich's mir nicht träumen, daß er anno 1924 noch die gleiche Frische und Sangeslust zeigen würde. Daß solch Gezwerge ein so hohes Alter erreichen könne, wußte ich wohl, aber ich glaubte nie, daß ihre geschlechtliche Fähigkgit so lange vorhalte. Augenscheinlich ist das aber doch der Fall, denn sobald ich irgend einen Vogelkäfig mit einem beliebigen Vogelmännchen neben den Behälter meines grauen Kämpen halte, schmettert er ihm allsogleich seine feurigsten Brunstlieder entgegen.

Leider habe ich gerade diese Art niemals ausgiebig genug beobachten dürfen; ich glaube nicht mehr als fünf, sechs Edelsänger besessen zu haben. Aber heute gibt es ja, Gott sei Dank, solche Ausländer wieder zu Preisen, denen sich eine Danziger Schulmeisterbörse anzuschmiegen vermag, und so soll mir mein neuer Geschäftsfreund Lenger demnächst ein paar weitere Grauedelsänger schicken, deren Zahl sich dann quartaliter vergrößern dürfte, bis ich über diese dem Liebhaber so dankbare Finkenart ebenso gut Bescheid weiß wie über ihre grünen girlitzartigen Vettern und die finkenartigen Vögel unserer deutschen Heimat.

Der Gelbspötter.

Von J. Birk, Leipzig.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Wir wollen nun dahingestellt lassen, auf welche Methode der Frischfang in die Hände des Liebhabers kommt, die Hauptsache ist, daß er im Eingewöhnungskäfig sitzt, ob sein zukünftiger Pfleger dabei die Rolle des „Selbstversorgers" oder die des „Versorgten" gespielt hat, ist Nebensache. Man hat in den langen Jahren seiner Liebhaberei gar manchen „Frischen" eingewöhnt, auch gar manchen Gelbspötter, nichts halte ich für leichter als dieses, ja, ich möchte hier behaupten, daß es bedeutend schwieriger ist, einen „Körnerfresser" einzugewöhnen als einen „Weichfresser". Setzt man den Gelbspötter in seinen verhüllten Käfig, am besten ist für ihn als Frischfang ein sogenannter Eingewöhnungskäfig von ungefähr 35 cm Länge, so stelle man ihm einen Napf mit Wasser und einen solchen mit lebenden Mehlwürmern auf den Käfigboden und überlasse ihn dann der Ruhe. Für zweckdienlich halte ich, wenn jedem Frischfang, der einem längeren Transport ausgesetzt war, vor dem Einsetzen in den Käfig ein paar Tropfen abgestandenen Wassers eingeflößt werden. Dies geschieht, indem man die Fingerspitze ins Wasser taucht und den daran hängenden Tropfen dem Vogel auf die Schnabelspitze tropfen läßt, er wird sofort schlucken. Ist der Durst des Vogels gestillt, so wird er um so eher an die Mehlwürmer gehen; sehr von Vorteil ist es auch, wenn die Mehlwürmer in einen Napf gezählt werden, wo ein Entrinnen unmöglich ist, fehlen Würmer, so ist der Beweis erbracht, daß der Vogel bereits gefressen hat, er kann also durch Nichtaufnahme von Nahrung niemals ermatten, der Liebhaber kann rechtzeitig mit dem Stopfen von Mehlwürmern demselben vorbeugen. Hat der Wildfang den Napf mit Würmern geleert, so erhält er in demselben frische Ameisenpuppen, denen auch lebende Mehlwürmer mit beigefügt werden, damit das ungewohnte Futter durch die Bewegungen der Würmer etwas lebendig aussieht, einen Teil Mehlwürmer zerschneidet man nach Eindrücken des Kopfes mit einer Schere und mengt sie ebenfalls unter die frischen Puppen. Hat nun der Vogel die lebenden Würmer erledigt, geht er auch an die zerschnittenen und mit ihnen nimmt er auch von den Puppen zu sich, die an dem Safte der zerschnittenen Mehlwürmer kleben. Frißt der Frischfang die lebenden Mehlwürmer, so ist gewonnene Sache, frißt er auch frische Puppen, gilt er als futterfest und eingewöhnt, wenigstens vom Natur- ans Ersatzfutter. Warum Herr Nieselt bei der Eingewöhnung die frischen Ameisenpuppen erst mit abgekochter Milch zusammenfügt, ist mir nicht begreiflich, und noch dazu den Saft von gekochten Kirschen oder Feigen, ist mir noch unverständlicher, da doch der Gelbspötter zur Zeit seines Fanges im Frühjahr ein reiner Insektenfresser ist. Dem Gelbspötterfrischfang schaden Mehlwürmer nie, man braucht in der Zahl derselben also nicht ängstlich zu sein, selbstverständlich müssen es vegetabilisch, das heißt mit Pflanzenkost ernährte Würmer sein, animalisch ernährte, denen man tote Tiere zur Nahrung bietet, sind in der Stubenvogelliebhaberei zu verwerfen. Daß natürlich auch Eierbrot ein gutes Futter für Mehlwürmer ist, will ich gern glauben, doch bin ich glücklich, wenn ich derlei Sachen meinen gefiederten Lieblingen direkt und nicht erst mit den damit gemästeten Mehlwürmern zuführen kann. Ist der Gelbspötterfrischfang im Gesang, so erhält er, bis er abgesungen hat, bei ständig verhülltem Käfig, der auf den im Anfang gewählten Platz bleibt, nur sein bei der Eingewöhnung gereichtes Futter, welches in frischen Ameisenpuppen mit täglich gegen ein Dutzend Würmern besteht, weiter bis zur Übergewöhnung an ein Weichfuttergemisch. Läßt sich ein Frühjahrsfrischfang nicht im Gesang hören, was nur selten der Fall ist, so dürfen Mehlwürmer in nicht zu großer Anzahl gereicht werden, es genügen 6—8 Stück täglich. Von der von Herrn Nieselt empfohlenen Spezialisierung in der Futterdarreichung nach Tagen, Wochen usw. halte ich gar nichts, denn warum soll der Gelbspötter in den zweiten 14 Tagen seiner Käfigung ein anderes Futter erhalten als in den ersten 14 Tagen, warum soll er in der fünften Woche Eierbrot und Apfel ans Gitter gesteckt bekommen, warum soll er gerade von der dritten Woche ab ein Badehaus erhalten, warum soll der Käfig erst vor das Fenster in verhülltem Zustande, dann ins Zimmer unverhüllt in $2^1/_3$ m Höhe, warum soll er von der fünften Woche ab tiefer gehängt werden? Diese und noch andere schwer verständliche Maßnahmen bedürfen zumindest einer Begründung, da doch die Praxis für diese Maßnahmen bestimmend gewesen sein muß. Meine Erfahrungen in der Praxis haben mich gelehrt, daß ich meinen Gelbspötterfrischfang an einen ruhigen lichten Ort bringe, sein Käfig bleibt verhüllt, bis der Vogel abgesungen

hat, erst dann lüfte ich die Käfighülle nach und nach; nun erst beginnt für mich eine liebevolle Beschäftigung mit dem Frischfang. Bis zum Nachlassen der frischen Ameisenpuppen wird er nur blank damit gefüttert mit Beigabe von Mehlwürmern. Die Übergewöhnung an ein Weichfuttergemisch ist nicht schwer, doch heißt es dabei den Vogel eingehend beobachten, man warte mit der Übergewöhnung ja nicht so lange, bis es keine frischen Puppen mehr gibt, sondern beginne damit schon eher, damit dem Mischfutter noch Puppen mit beigefügt werden können, man verringere letztere immer mehr, bis sie endlich ganz fehlen. Den Gelbspötter habe ich als einen Vogel kennengelernt, bei dem man mit dem Mehlwurmbehälter stets bei der Hand sein muß. Vor allem muß der Liebhaber ein wachsames Auge auf die Körperbeschaffenheit des Gelbspötters haben. Ist die Brust nicht fleischig rund, sondern etwas spitz, so greife man zu Mehlmürmern, es können mageren Vögeln ohne Bedenken täglich in zwei Rationen bis gegen 30 Würmer gereicht werden, dies schadet mageren Vögeln nie, im Gegenteil, es dauert nicht lange, und die Brust ist wieder fleischig rund. Zweckdienlich ist es sogar, wenn ein Spötter im Herbst einen kleinen Fettansatz zeitigt, nur darf dieser Fettansatz zu keinem die Brust überziehenden Fettpolster werden. Man muß daher scharf aufpassen, daß er in den Tagen der Überwinterung nicht zu mager wird. Ist dies der Fall, Vermehrung der täglichen Mehlwürmerzahl, nicht zu fett, Verringerung derselben, überhaupt ist die Darreichung von Mehlwürmern für alle etwas mageren Vögel, gleich welcher Art, von großem Vorteil. Nicht zu vergessen ist, daß dem Gelbspötter in den kurzen düsteren Herbst- und Wintertagen auch, wenn nötig, Gelegenheit gegeben werden muß, sich noch einmal abends bei Lichte zu sättigen, ob dies zu geschehen hat, darüber gibt die Körperbeschaffenheit des Vogels Auskunft, bei mageren ist es dringend nötig, bei verfetteten nicht. Ganz besonders möchte ich den Liebhaber darauf aufmerksam machen, daß es leichter ist, eine Verfettung zu verhindern als eine solche zu entfernen, denn wenn der Pfleger denkt, mit Radikalhungerkuren dies zu erreichen, so hat er seine Rechnung ohne den Gelbspötter gemacht, er quittiert ihm dies mit lockerem, aufgeplustertem Gefieder und kleinen matten Augen, dann ist die höchste Gefahr für das



Klunkerstar (s. S. 204).

Leben des Vogels. Wer es unterläßt oder es nicht versteht, seine Gelbspötter betreffs Körperzustand zu kontrollieren und richtig einzuschätzen, wird wenig Freude an ihm erleben. Erst wenn der Spötter in den Gesang kommt, was meistens gleichzeitig mit der Ende Februar bis Anfang März beginnenden Mauser geschieht, kann die Zahl der Mehlwürmer ohne Sorge täglich auf einige Dutzend gebracht werden. So wie alle Wintermauserer braucht unser Gelbspötter zwar keine zu hohe, doch zu mindestens eine ziemlich gleichmäßige Zimmertemperatur, am schädlichsten sind zu starke Temperaturschwankungen. Bei gleichmäßiger Temperatur beansprucht er keine zu hohen Wärmegrade. Den besten Beweis gab mir ein in einem ungeheizten Zimmer überwinterter Gelbspötter, der in eine glatte Mauser und auch in den Gesang kam. Eine solche Ausnahme ist natürlich keine Regel, doch ein Beweis,

daß der Gelbspötter nicht zu empfindlich gegen eine mehr kühle Überwinterung ist, dies ist er vielmehr gegen hohe Temperaturschwankungen. Recht hat Herr Nieselt, wenn er sagt, daß der Gelbspötter während der Zugzeit allmählich in einem an der Zimmerdecke aufgehängten Säckchen nicht durch sein Geflatter stört, noch viel weniger sich verletzen kann, trotzdem kann ich dieser täglichen „Herausfangerei" und „Säckchensteckerei" keinen Geschmack abgewinnen. Da ich bereits über die Hälfte meines Lebens Vögel käfige und dazu so ziemlich alle als Zimmervögel in Betracht kommenden Arten unserer Kleinvogelwelt, so muß ich sagen, daß ich in diesem Vierteljahrhundert noch keinen Vogel, und war es auch der stürmischste Bursche, in einem Säckchen an die Zimmerdecke gehängt habe. Erstens ist mir diese Methode für meine Vögel zu aufregend zweitens ist es auch eine zeitraubende Beschäftigung, täglich gegen 15 Weichfresser abends auf- und morgens abzuhängen, natürlich die Säckchen und nicht die Vögel, drittens würde ich dieses nie tun, weil ich weiß, daß ich in meiner jahrelangen Praxis auch so durchgekommen bin, trotzdem es Tober gibt, die man des Nachts wirklich regelrecht aufhängen könnte, so ruhestörend toben sie. Wer natürlich gesunde Nerven und einen ebensolchen Schlaf hat wie ich, bei dem muß schon der Käfig von der Wand kommen, wenn er aus seinen seligen Träumen gerissen werden soll, wer hingegen durch Nervosität unruhig und leise schläft, für den sind tobende Vögel selbst in einem Nebenraum lästige Ruhestörer, da heißt es natürlich mit einem solchen Unverbesserlichen: „Marsch ins Säckchen". Was die Behandlung der getrockneten Puppen anbetrifft, das Kochen in Milch mit einer Handvoll Kirschen oder dem Saft einer gekochten Feige, so möchte ich fragen, wodurch wird dies als zu Recht bestehend begründet, verwerfen direkt will ich es nicht, weil mir darüber die praktische Erfahrung fehlt, aber als überflüssig muß ich es nach meinen Erfahrungen und denen der mir bekannten Vogelliebhaber bezeichnen. Zugeben muß ich, daß Herr Nieselt ebenfalls recht hat, wenn er behauptet, daß beim Waschen von getrockneten Ameisenpuppen eine schmutziggelbe Brühe mit Schwefelgehalt entsteht, vorausgesetzt, daß es sich um sogenannte geschwefelte Ware handelt. Zum größten Teile sammle ich mir meinen Bedarf an frischen Puppen sowie für den Winter selbst, da ist kein Waschen nötig, doch muß ich gestehen, daß ich auch gekaufte Puppen noch niemals gewaschen, noch handverlesen habe, trotzdem habe ich in der Hauptsache gesunde und sangesfreudige Vögel in meinen Käfigen gehabt. (Schluß folgt.)

Neueinführungen und Seltenheiten.

Von Karl Neunzig.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Nicht so farbenprächtig wie der Königsglanzstar, aber doch mit einem Gefieder von schönem Metallglanz bedeckt ist der

Rotflügel-Helmglanzstar — Galeopsar salvadorii *Sharpe.*

Er ist der einzige Vertreter seiner Gattung, deren wesentliches Kennzeichen der durch die aufwärts gerichteten Stirnfedern gebildete „Helm" ist, der das Aussehen einer Bürste hat (s. Abb. S. 190). Er lebt im westlichen Somaliland bis zum Viktoriasee. Baron Erlanger berichtet über ihn im J. f. O. 1905, daß die Verbreitung dieser schönen Starenart eine ganz lokale zu sein scheine. Er habe sie nur einmal im Gallalande bei den Windlawhöhlen vor Kalksteinfelsen gefunden. „Dort, wo der Fluß Web seinen unterirdischen Lauf beginnt, woran sich so manche Sage knüpft, schlängelt er sich vorher durch ein prachtvolles Felsenbett. Turmhohe Felswände von kreideweißgebleichten Kalksteinen bargen anscheinend die Niststätten der kleinen Kolonie." — Am Webi-Schebelli im Arussi-Gallaland sah Erlanger an dessen Ufer diesen Vogel ebenfalls riesige Felswände emporsteigen.

Gefiederbeschreibung: ♂ glänzend schwarz mit stahlblauem, auf Kopf, Hals, Unterkörper und Flügeln mehr grünlichem Glanz; Handschwingen außer der ersten, welche ganz schwarz ist, rotbraun mit schwarzer Spitze; Schwanzfedern mattschwarz mit stahlgrünlich glänzenden Säumen; Auge rot; Schnabel, Füße schwarz; Lg. etwa 380, Fl. 157—163, Schw. 235—250, Schn. 23, Lf. 33 mm.

♀ kleiner, Glanz matter, an Kehle, Hinterkopf, Kopfseiten mehr ins Grünliche, an den Kopfseiten etwas ins Graue gehend; Fl. 147—154, Schw. 185—228 mm.

Ein in mehreren Stücken eingeführter Star, der

Klunker- oder Lappenstar — Perissornis carunculatus *(Gm.)*

ist ein sehr merkwürdiger Geselle. Einmal geben ihm die häutigen lappen- bzw. kammartigen Anhängsel, auf dem unbefiederten Kopf ein merkwürdiges Aussehen, dann aber auch interessiert uns besonders seine Lebensweise. Er führt wie die Kreuzschnäbel, ein Zigeunerleben. Wie jene die Nadelholzwälder aufsuchen, in welchen der Same gut geraten, und da auch zur Brut schreiten, so folgt der Star den Schwärmen der Wanderheuschrecke, welche die Felder verwüsten, und liegt da dem Brutgeschäft ob, wo die schädlichen Kerfe ihre Eier abgelegt haben. In ihrem Verbreitungsgebiet, dem östlich-südlichen Steppengebiet Afrikas, wandert der Lappenstar hin und her, unbeeinflußt von der Jahreszeit, plötzlich in Scharen, die zuweilen nach Starks Angabe nach Zehntausenden zählen; für einige Tage oder Wochen bleibt er in einer Gegend, die er vielleicht erst nach Jahren wieder aufsucht, wenn wiederum die Scharen der Wanderheuschrecken ihn dorthin führen. Eigenartig, anscheinend ganz planmäßig wird von den Vögeln die Jagd der Heuschrecken betrieben. „Wenn sie einen Schwarm Wanderheuschrecken verfolgen, führen die Vögel die verschiedensten Flugkünste aus, um einen Teil des Heuschreckenschwarms abzutrennen und zu umzingeln. Zuerst in eine kugelförmige Masse sich im Fluge zusammenballend, breiten sie sich plötzlich fächerartig aus, ordnen sich dann in einem Halbkreise, um endlich einen hohlen Zylinder zu bilden, in dem ein Teil der Heuschrecken eingeschlossen ist. Sobald die Kerfe vernichtet sind, füllt die fliegende Vogelschar den Zylinder wieder aus, nimmt abermals Kugelform an und verfolgt von neuem die wandernden Heuschrecken. Der Strich des Erdbodens, über den die Vogelschar hingezogen, ist mit den Entleerungen der Vögel und mit den abgebissenen Beinen

und Flügeln der Heuschrecken bedeckt." Aber nicht nur im Fluge den fliegenden Heuschreckenschwärmen folgend wird die Jagd von den Lappenstaren gemeinsam betrieben. So berichtet Stark, dem wir auch die obige Schilderung verdanken, daß sie die jungen Heuschrecken auch auf dem Erdboden gemeinsam jagen. Sie bewegen sich dann in langen Reihen, drei oder vier Vögel tief auf der Erde, wobei die hinteren Reihen beständig die vorderen überfliegen. Zu andern Zeiten sieht man die Stare auch von den oberen Zweigen eines Baumes oder Busches aus nach den fliegenden Heuschreckend stoßend. Die großen Flüge der Lappenstare sind vollständig abhängig von dem Auftreten und Wandern der Heuschrecken. Man findet aber auch einzelne Vögel meist mit Glanzstaren zusammen. Es handelt sich bei diesen um Vögel, welche aus den großen Flügen zurückgeblieben sind. Diesen werden Wanderheuschrecken nicht zur Verfügung stehen. Sie ernähren sich wie auch die zu großen Scharen vereinigten in Ermangelung dieser Kerfe von allen möglichen anderen Insekten, deren Larven, von Würmern und auch von Früchten. Nach E. Holubs Angabe frißt er auch Sämereien. Holub hält ihn für bedeutend scheuer als andere Stare, so daß sich der Forscher stets längere Zeit bemühen mußte, um an die Stare nahe genug heranzukommen. Heuglin dagegen sagt: „Er ist nicht scheu und ist sehr ruhig und schweigsam." Auf der Erde läuft er starartig einher.

Über das Brutgeschäft dieses Vogels berichtet Stark, der ihn im Kaplande beobachtete, daß sie in großen Kolonien in Gegenden, wo die Heuschrecken ihre Eier abgelegt haben, brüten. „Auf weite Strecken, oft Hunderte von Metern, sind die Dornbüsche mit den napfförmigen Nestern vollgepackt. Selbst zwischen zwei Nestern wird häufig noch ein drittes gebaut, und sie stehen infolgedessen zuweilen so dicht, daß nur schmale Gänge zum Ein- und Ausschlüpfen bleiben. Barber sah Akazien, die durch die neben- und übereinandergebauten Nester so überbürdet waren, daß sie bei einem einsetzenden Sturm niederbrachen und die zerbrochenen Eier und die hilflosen Jungen eine Beute der Ameisen wurden. Falls in den Zweigen durchaus kein Raum für ein Nest ist, so bauen sie dieses auf dem Erdboden, hinter und unter Steinen oder in Erdlöchern. Aber auch hier kommen die Jungen meist nicht auf. Sie werden eine Beute kleiner Säuger und der Schlangen. Über andere Gefährdungen der Bruten erfahren wir von Baker, daß es vorgekommen sei, daß die Lappenstare zu spät mit der Brut begonnen hatten und die Heuschrecken ihre Wanderung begannen, bevor die jungen Stare flugfähig waren. Die alten Stare konnten anfangs den Heuschrecken folgen und noch genügend Nahrung zu den Nestern zurückbringen. Aber bald waren sie, da die Entfernung immer größer wurde, nicht mehr imstande, die Jungen zu ernähren, die sie bald ihrem Schicksal überließen, um den Heuschreckenschwärmen zu folgen.

Das Gelege besteht aus 4—5 bläulichweißen Eiern, die bisweilen am dickeren Ende schwarze Tüpfel zeigen (29—30 × 20—22 mm).

Der Lappenstar ist der einzige Vertreter seiner Gattung.

Gefiederbeschreibung: ♂ Kopf, Kehle unbefiedert, Stirn, Scheitel mit zwei Lappen, vordere Wangen, Kinn, Kehle mit am Ende gespaltenen Lappen schwarz, ebenso schmales den übrigen gelb gefärbten Teil des Kopfes begrenzendes Band; übrige Oberseite hell fahlgraubraun, nach hinten zu heller, fast weiß, Unterkörper wie Oberseite aber heller, Mitte und Unterschwanzdecken reinweiß; kleine Flügeldecke fahl graubraun, Arm-, Handdecken weiß; Afterflügel, Schwingen, Schwanzfedern schwarz mit mattem grünlichen Glanz; Schnabel gelblichweiß, Auge rot; Füße gelb. Lg. 200—220, Fl. 115—123, Schw. 65—75, Schn. 21—24, Lf. 27—30 mm.

Schwarzkopfweber — Hyphantornis nigriceps *Lay.* (Text im nächsten Heft.)

♀ dunkler als Männchen, Bürzel weiß, Oberschwanzdecken graubraun, Arm- und Handdecken schwarz, Schnabel schwarzbraun; Auge braun, Füße bleigrau, Kopf befiedert, nur grünlichgelb, Augengegend und ein Längsstreif auf jeder Seite der Kehle unbefiedert.

Bei den Vögeln im Berl. Zool. Garten stehen die Hautlappen auf Stirn und Oberkopf nicht aufrecht, wie die Abb. auf S. 203 zeigt, sondern hängen seitwärts herab. Heuglin ist der Ansicht, daß beim Männchen die Lappen nur zur Paarungszeit besonders entwickelt zu sein scheinen. In Brit. Katal. werden sie als aufrecht stehend bezeichnet; auch Dr. Karl Ruß, der in früheren Jahren importierte Lappenstare beobachtete, sagt, „auf dem Oberkopf befinden sich zwei aufrechtstehende und an der Kehle ein ebensolcher bis walnußgroßer gelber Hautlappen". Bezüglich der Färbung liegt hier wohl ein Irrtum vor, die Lappen sind schwarz gefärbt. Stark bringt in seinem Werk „Die Vögel Süd-

afrikas“ die Abbildung eines Kopfes des Lappenstares mit aufgerichteten Lappen. Besonders letzteres hat mich bestimmt, den Vogel so darzustellen, wie ihn die Abb. S. 203 zeigt. (Fortsetzung folgt.)

Ein arger Räuber!

Von Vincenz Sommer, Münster i. W.

(Nachdruck verboten.)

Frühlingsstürme wehen durch das Land. Am Himmel jagt zerrissenes, flatterhaftes Gewölk. Nur hin und wieder huscht das Licht des Mondes zur Erde. Der Boden atmet würzig warmen Geruch. Alles wächst und webt, auch jetzt während der Nacht. Aus dem nahrhaften Vorjahrslaub sprießen die Frühlingskinder in allen Farben, überwuchern alte tote Stämme und wurzeln in den Überresten des vergangenen Jahres. Bei den Weidenkätzchen herrschte bis tief in die Nacht hinein noch fröhliches Leben und Treiben. Von allen Seiten kamen Falter, Bienen, Fliegen und Käfer zum freien Ausschank. In großen Massen wurde von dem lustigen Völkchen der Honigseim verputzt. In übermütiger Laune, stark angeheitert vom langentbehrten Genuß, flatterten, krabbelten und wankten sie dann in später Abendstunde nach Hause. Verträumt schauen die Weidenkätzchen in die Frühjahrsnacht, jedem Honigschlecker ein freies Mahl bietend. In den knospenden Nußsträuchern sitzen, das Köpfchen unter dem Flügel, ein paar kleine Vögelchen. Ab und zu ein leiser, sanfter, bald verklingender Ton, ein schnell verwehtes Piepsen im Traum. Ein wonniger Traum in lauer Frühlingsnacht. Da durchbrechen die Stille der Nacht widerlich kreischende Laute. „Kraitsch, kraitsch, krätsch“. Die lauten Stimmen dringen aus der Höhe aus etwa dreißig Kehlen. Ein arger Mißton, ein gewaltsamer Eingriff in die ruhige Natur. Und doch ist es nur Freude über den Frühling, Sehnsucht nach der nahen Heimat. Hoch oben in den Lüften ziehen die Reiher, ein ganzer Schwarm in schräger Fluglinie, heimwärts, aus dem sonnigen Süden kommend, zur alten Heimat, zum alten Nest. In rauschendem Fluge, unter Freudentönen geht's weiter — heimwärts. Und ganz weit hinten, dort wo Himmel und Erde zusammenfließt, lassen sich die Reiher im Rohrdickicht des Flusses nieder. — — — — — — — — — — — —

Dort, wo der Fluß eine Biegung macht, hat sich vor vielen hundert Jahren eine Bucht gebildet, die tief in das Land einschneidet. Rohr, Schilf, Kalmus, Riesenampfer und hohe Seggen bilden hier mit Weidengestrüpp einen mächtigen Wall, dessen Ränder je nach der Jahreszeit die verschiedenartigsten Blumen schmücken. Nur an einer Stelle leuchtet ein weißer Strand, den nur einzelne Gräser und weiter aufwärts Disteln, Habichtskraut und Sauerampfer zieren. Auch der uralte Wald, der die Ufer des Flusses säumt, mußte damals eine Biegung machen, und so schließt dann der wilde Wald mit all seinem Unterholz die Bucht vollkommen ein. Im dichten Röhricht herrscht reges Leben. Hin und wieder huscht eine Maus über das feuchte Schilf am Ufer. Das zahlreiche Vogelvolk lärmt und raschelt und schilt im Rohr. Auch im Wasser geht es lebhaft zu. Muntere Weißfische schießen gewandt hin und her, springen blitzschnell aus dem Wasser und fallen im selben Augenblick laut klatschend in die nassen Fluten zurück. Ein ganzer Schwarm von Mücken und Eintagsfliegen tanzt über dem Wasserspiegel seinen Hochzeitsreigen. Die Schwalben fahren

Großer Birkenzeisig (s. Redaktionsbriefkasten unter Herrn O. P., Berlin).

hin und her, ab und zu tauchen sie bis zur Brust ins Wasser. Dicke, grüne Grasfrösche paddeln mit ihren schlanken langen Beinchen murrend durch das schwimmende Grasland. Zwischen den gelben, von all den Winterstürmen zerzausten Rohrrändern rudert kopfnickend ein Wasserhuhnpaar. Beide haben Hunger. Ein Sprung kopfüber — fort ist das Wasserhühnchen und das Wasser zieht Ringe. Ein hastiges Gründeln unten im Teichmorast, dann ein Flügelschlag, und dann wiegt sich das Tier wieder auf dem Wasserspiegel, atmet, lockt einige Male laut und verschwindet abermals. Ganz in der Ferne ziehen hoch am Himmel ein paar Krähen lautlos vorüber. Langsam und bedächtig ist ihr Flügelschlag. Aber noch weiter, da wo sich der dunkle Wald am Horizont hinzieht, wird jetzt ein kleiner Punkt sichtbar, der sich in kurzer Zeit merklich vergrößert. Er kommt gerade auf die Bucht zu. Es ist das alte Fischreihermännchen, das schon seit Jahren hier in der fischreichen Bucht die Fischerei ausübte. Kopf und Hals zurückgelegt und die langen Ständer nach hinten ausgestreckt, rudert der Fisch

räuber durch die Lüfte, dem gewundenen Lauf des Flusses folgend. Entsetzen ergreift die kleine Vogelwelt, alles flüchtet und verbirgt sich in Risch und Rohr. Eine graue Maus huscht verängstigt ins Dickicht. Selbst die Frösche ziehen ihre vorwitzigen, breiten Mäuler unter die Wasseroberfläche zurück. Wie ein Schatten kommt er auf seinen breiten, weitausladenden Flügeln näher. Endlich, über der Bucht angelangt, beschreibt er einen weiten Kreis, ein-, zweimal und schraubt sich dann, nachdem er sich so vor Überraschungen gesichert hat, in einer immer enger werdenden Spirale zu Boden. Ganz am Rande des Schilfgürtels ist unter dem Wasser eine Untiefe, eine Erhebung. Hell leuchtet hier der reine Sand aus den Fluten und bildet über Wasser eine kaum armlange Insel. Eben noch wippte hier die gelbe Bach-

Königstangare
(s. Kleine Mitteilungen).

elze und fischte begierig nach dem Auswurf der einen Wellchen. Jetzt ist der Platz leer. Hier läßt ch der Fischreiher nieder. Aber anstatt den Platz ber dem Wasser zu beanspruchen, schreitet er im egenteil einen halben Meter tief ins Wasser. Bis 1 den Oberschenkeln stehen die Ständer in der Flut. eden Morgen kam das Reihermännchen hier zum ischen. Es ist ein altes, ganz ausgewachsenes Tier. nstatt wie alle Artgenossen auf der Unterseite weiß nd auf dem Rücken aschgrau gefärbt zu sein, war ich sein Rücken fast ganz weiß. Manches hatte das te Männchen schon mitgemacht. In seiner frühesten ugend waren zwei Geschwister, die neben ihm im est lagen, von einem Kolkrabenpaar geraubt worden. in paar Wochen darauf, als der Jüngling schon if dem Nestrand saß und den futterholenden Alten tgegenkrächzte, donnerte und krachte es plötzlich ganz recklich von unten, Schrote pfiffen um seine wackeligen tänder. Nur durch einen Purzelbaum kopfüber ins est schien er sich gerettet zu haben. Auch in späteren Jahren hatte sein Leben oft nur an einem Faden gehangen. So war das Tier denn vorsichtig, überaus klug geworden. Auch seine eigentümliche Färbung, die ihn von seinen Genossen unterschied, hatte ihm so manchen Feind gebracht. Besonders die bösen Menschen mit ihrem Blitz und Donner hatten ihm oft nachgestellt. Auch jetzt in der Ruhe ist er stets fluchtbereit, vorsichtig späht und lauscht er nach allen Seiten. Der Kopf mit dem langen, gefährlichen Schnabel liegt auf dem unteren, dem Kropf entsprechenden Bogen des Halses auf. (Schluß folgt.)

Kleine Mitteilungen.

Von den etwa 700 Arten der Familie Tyrannen, welche meist die tropischen Striche Amerikas bewohnen, kommt höchst selten einmal ein Vogel auf den europäischen Vogelmarkt. Die wenigen, welche eingeführt werden, gelangen meist in die Käfige der zoologischen Gärten, in denen sie gewöhnlich stumpfsinnig umherhocken und kaum das Interesse eines Vogelliebhabers erwecken. Zumeist gelangen nur einige der größeren Arten nach Europa. Unter diesen auch der auf S. 207 abgebildete **Königstyrann** — Tyrannus tyrannus (*L.*), der Königsvogel (kingbird) der Amerikaner. Er ist einfach gefärbt, oberseits schwarzgrau, unterseits weiß, die Schwingen haben schmale weiße Säume, die Schwanzfedern weiße Spitzenflecke, auf dem Scheitel ein orangerot bis scharlachroter Fleck, der meist unter den seitlichen Federn versteckt nur sichtbar ist, wenn er das Gefieder sträubt. Er ist ein Bewohner der gemäßigten Striche Nordamerikas. In den tropischen Gebieten ist er Wintergast. Er wurde auch im laufenden Jahre im Anzeigenteil angeboten. Zu seiner Beherbergung gehört ein großer Käfig, den er allein bewohnt. In diesem machen ihn seine Munterkeit, Ausdauer und eigentümliche Zutraulichkeit dem Pfleger besonders wertvoll.

Sprechsaal.

(Steht den Abonnenten kostenlos zur Verfügung.)

Betrifft Versendung von Vögeln. Im vorigen Jahre erhielt ich von einem Leipziger Liebhaber 1,1 jap. Mövchen. Im selben Transportkasten, in welchem die Mövchen angekommen waren, sollte ich als Gegenleistung ein Paar andere Vögel senden. Bemerken möchte ich, daß der Kasten, in welchem die Mövchen ankamen, außergewöhnlich klein war. Ich brachte meine Vögel wie vereinbart auf den Weg, erhielt aber von dem betreffenden Herrn nach acht Tagen die Nachricht, daß meine Vögel in Leipzig nicht angekommen wären. Ich begab mich sogleich auf das Hauptpostamt Liegnitz, wo die Auflieferung erfolgt war, und konnte dort nur erfahren, daß die Vögel an dem Tage, an welchem ich sie aufgeliefert hatte, auch expediert wurden. Nach drei Tagen wurde mir die Sendung vom Liegnitzer Postamt als „verloren" gemeldet. Ich beantragte nun Schadenersatz, es waren 33200 M. Nach drei Wochen erhielt ich eine Postanweisung vom Postamt Liegnitz, es waren 6020 M., mit folgendem Vermerk: „Ersatzbetrag für das in Verlust geratene Paket an .... Leipzig". Damit war ich selbstverständlich nicht zufrieden und begab mich abermals auf das Postamt. Der diensttuende Beamte erklärte mir kurz und bündig: „Sie hätten die Vögel als Wertpaket senden müssen, bei gewöhnlichen Paketen wird nur das Gewicht bezahlt." Bald darauf hatte ich wieder Vögel zu versenden. Diesmal wollte ich dieselben, um im Falle eines Falls „sicher" zu sein, als Wertpaket senden. Am Annahmeschalter wurde mir das Paket von dem betreffenden Beamten mit folgendem Vermerk abgewiesen: „Vögel, welche unter „Dringend" versendet werden, dürfen nicht als Wertpaket gehen!" Zum Versand verwende ich jetzt, wenn es auch nur ein einziger Vogel ist, stets größere Versandkasten, denn diese gehen nicht so leicht „verloren" wie kleine.

Artur Schiebe (A. Z. 282).

Vom Vogelmarkt.

Von seltener auf den Vogelmarkt kommenden Vögeln werden angeboten:

A. Adlersparre, Stockholm (Schweden): Handtverkare-gat 90: Schwefelgelber Girlitz, Mchn. Leclancherifink, Paar Grünkardinal, Mchn. Weißflügelwitwe, i. Pracht, Paar Braunrückenelstechen, Mchn. Braunkopfamarant.

R. Langenbuch, Lübeck-Siems, Post Kücknitz: 1,0 vorjähriges Bastardjunges Weißkopfnonne-Mövchen, 1,1 vorjährige gar. reine Fuchskanarien.

S. Lichtenstaedt, Berlin-Johannisthal, Nieberstr. 10: 2 Schamadrosseln.

Herrn O. P., Berlin. Die bei den Vogelhändlern erhältlichen Birkenzeisige gehören fast ausschließlich der typischen Art — Acanthis flammea flammea (*L.*) an. Selten befindet sich darunter eine der anderen Arten, wie das bei dem in Ihrem Besitz gewesenen Vogel der Fall war. Es war der große Birkenzeisig — A. fl. holboelli (*Brehm*), der durch seine Körpergröße (Flügel 75—81,5 mm) und auch durch den stärkeren und längeren Schnabel kenntlich ist (s. Abb. S. 206).

Herrn P, Düsseldorf-Gerr.; Herrn A. Sch., Zschopau; Herrn W F, Neustrelitz; Herrn C. D., Hamburg; Herrn M. J., Göttingen; Herrn O. K., Braunschweig; Herrn E. B., Hamborn; Herrn H. G., Koblenz; Herrn J. H., Braunschweig: Beiträge dankend erhalten.

Herrn E. M., Küllstedt. Die Tangare war ein Männchen. Sie ist infolge von Darmentzündung eingegangen.

Herrn K. B., Hamburg. Die bei dem eingegangenen Würger gefundenen Würmer waren Fadenwürmer. Eine Art Filaria nodulosa wird bei Würgern häufig unter der Haut, besonders der Kopfhaut gefunden. Wie alle Fadenwürmer sind sie nicht auf die Innenfläche der Hohlorgane des Vogelkörpers beschränkt, sondern bohren sich durch das Gewebe und leben unter der Haut, den Muskeln usw. Ein anderer Fadenwurm — F. tridens — kommt bei Würgern auch in der Bauchhöhle und in den Bronchien vor. Bei der angegebenen Länge — etwa 3 cm — kann es sich nur um einen solchen handeln und nicht um den Kehlkopfwurm. Dieser ist blutrot und das kleinere Männchen ist dauernd und fest mit dem größeren Weibchen verbunden. Ein Kehlkopfwurmpaar sieht etwa aus wie ein lateinisches Y (Ypsilon). Das Weibchen erreicht eine Länge von höchstens 16 mm, das Männchen etwa 6 mm. Daß der rotrückige Würger häufig mit dem Kehlkopfwurm behaftet sei, ist nicht zutreffend, wenn auch nicht ausgeschlossen ist, daß einmal ein mit diesen Parasiten behafteter Rotrückenwürger vorkommt. Sie gelangen in den Vogelkörper durch Aufpicken von Embryonen der Würmer oder der Würmer selbst, welche von befallenen Vögeln ausgehustet sind, vielleicht auch mit dem Kot ausgeschieden werden, und an Grashalmen, auf dem Boden, im Wasser — in Geflügelzüchtereien, Fasanerien usw., auch in Futter- und Trinknäpfen sich befinden.

Herrn X., Los Angeles. Die Ernährung ist im allgemeinen richtig. Es ist möglich, daß die Wellensittiche auch tierische Stoffe als Nahrung verlangen. Das ist nicht immer der Fall. Es ist zu versuchen, ob die üble Gewohnheit eingestellt wird, wenn mit dem Weizenbrot feingeriebenes hartgekochtes Ei vermengt gereicht wird. Da Ei bei warmer Witterung schnell verdirbt, wird das Gemisch täglich mehrmals in kleinen Mengen, jedesmal frisch zubereitet, gereicht. Dieses Mittel hilft nicht immer. Meist sind es einzelne alte Vögel, in der Regel alte Weibchen, welche in alle mit Jungen belegten Nistkasten einschlüpfen und den Jungen Schwingen und Schwanzfedern abfressen. Um das festzustellen, gibt es kein anderes Mittel, als 3—4 Paare in kleinen Flugräumen unterzubringen und den Missetäter, der bei sorgfältiger Beobachtung unschwer zu finden ist, zu entfernen. — In der Mauser würden die abgebissenen Federn wieder durch neue ergänzt werden. Es kommt aber bei Wellensittichen infolge der Inzucht auch vor, daß Junge erbrütet werden, die niemals Schwingen und Schwanzfedern bekommen. Selbst ganz flügellose Junge werden erbrütet.

Herrn M. Sch., Castellaun. Das Ei des Schreiadlers — Aquila clanga *Pall.* ist kurz, rundlich und sehr bauchig oval, Schale: stark, rauh, grobkörnig, glanzlos, mit vielen kräftigen Poren. Häufig Knötchenauflagerungen, innen gründurchscheinend. Größe: maximal 67,5 : 59,7 mm, minimal 61,8 : 50,5 mm. Gewicht: maxim. 13,33 g, minim. 10,5 g. Farbe: weiß, schwach ins Blaugrünliche ziehend, violettgrüne Schalenflecke, mehr oder weniger dicht kastanienbraun gefleckt und bespritzt, selten ungefleckt. Zuweilen ist die rotbraune Fleckung sehr dicht und an einem Ende so stark, daß wenig von der weißen Schale durchschimmert; fast alle Eier zeigen gelbliche oder grünliche Mistflecke. Roter Milan — Milvus milvus (*L.*). Gestalt meist etwas gestreckt; Schale mäßig stark glanzlos, Korn fein bis mittelstark; Größe maxim. 59,5 : 43,4, minim. 54,1 : 40,2 mm; Gewicht maxim. 6,44 g, minim. 3,81 g. Farbe: weiß, schwach ins Grünliche ziehend mit Punkten, Spritzern und groben Kritzeln von dunkel rotbrauner Farbe; Zeichnungen meist nicht allzureichlich, häufen sich manchmal an einem, meist dem dickeren Ende, manche Eier fast ohne Zeichnung. Es kommen auch solche mit lehmgelben Schalenflecken vor. Der innere Schein der Eier ist grünlich. Wespenbussard — Pernis apivorus (*L.*). Gestalt: kurz, gedrungen, etwas konisch oder ganz rund; Schale matt, feinkörnig, Poren kaum sichtbar, innen gelb oder grünlich durchscheinend; Größe maxim. 53,6 : 44,4, minim. 47,4 : 40,7 mm; Gewicht 3,66 : 2,9 g; die schwach ins Grünliche spielende gelblichweiße Grundfarbe ist durch ineinanderfließende rostgelbe oder bleichrostfarbene Zeichnungen meist ganz bedeckt. Auf dieser Färbung stehen zum Teil blassere, zum Teil tief dunkelrostbraune Flecken, Spritzer und Marmorierungen, die zuweilen die ganze Schale bedecken oder auch kranzartig angeordnet sind. Der dunkle Farbstoff ist so dick aufgelagert, daß er häufig schon beim Legen verwischt wird. Beim Brüten werden sie zum Teil abgescheuert und verbleichen.

Herrn O. H., Lauterbach. Der am 3. d. Mts. eingegangene Vogel gelangte erst am 7. d. Mts. in meinen Besitz. Die Fäulnis war so stark fortgeschritten, daß eine Feststellung der Todesursache nicht mehr möglich war.

Herrn G., Neuulm. Der Vogel war der schwefelgelbe Girlitz — Serinus sulfuratus (*L.*) aus Südafrika.

Herrn A. H., Potsdam. Das ist eine schwierige Frage. Mir ist der Gesang des Erlenzeisigs schon wegen der drolligen Art des Vortrages lieber als der des Zitronenzeisigs, obgleich letzterer vielleicht wohllautender ist. Der Bluthänfling singt fleißiger und besser als der Berghänfling, der wohl mit „Grauhänfling" gemeint ist. Über den Gesang des letzteren berichtet Prof. Braun in der Arbeit an der Spitze dieses Heftes.

Herrn F. M., Dirschau. Das zur Fütterung der Nachtigall benutzte Mischfutter ist gut. Es muß mit geriebener Möhre versetzt gereicht werden, und da die N. zu Fettwerden neigt, können noch eine gehörige Menge trocken Ameisenpuppen beigegeben werden. Auch die Fütterung mit frischen Ameisenpuppen ist zu empfehlen. Der in Ihren Besitz befindlichen Nachtigall können im Herbst und Winter trockene Puppen gereicht werden, da sie eben ein starker Fresser ist und allzuleicht fett wird. Mehlwürmer können bei dieser Fütterung täglich 2—5 gereicht werden. Das Quantum Ameisenpuppen wird deshalb nicht verringert. Die Futtergabe richtet sich nach dem Ernährungszustand des Vogels, der häufiger festgestellt werden muß. Die frühzeitige Mauser schadet der Gesundheit des Vogels nicht. Der Vogel hört infolgedessen aber früher auf zu singen, fängt aber, wenn er gesund ist und richtig verpflegt wird, auch früher damit an. Schnabelwucherungen entstehen aus unbekannten Ursachen. Es ist ein krankhaftes Wachstum des Schnabelhorns.

Herrn M. K., Düsseldorf. Aus Ihrer Mitteilung ist nicht zu ersehen, ob das Schnabelhorn sich verlängert hat und die Schnabelspitzen infolgedessen kreuzweise übereinanderliegen oder ob der sonst normale Schnabel nicht geschlossen werden kann. Ohne nähere Angabe kann Rat nicht erteilt werden.

(Fortsetzung auf der 3. Umschlagseite.)

Aus den Vereinen.

Aufgenommen ist Mitgl. Nr. 401 Herr Wilhelm Simmerlein, Althaldensleben, Prov. Sachsen, Lindenplatz 12. — Binnen kurzem wird eine Vorschlagsliste für die diesjährige Versammlung an den Ausschuß gehen, den ich schon jetzt um sofortige Erledigung und Rücksendung nach Empfang bitte, da mit den Vorbereitungen in Kürze begonnen werden muß.

A. Krabbe.

Verein Vogelschutz und -pflege zu Dresden. Versammlung jeden Donnerstag, abends 8 Uhr, im Vereinslokal, „Schillers Restaurant", Ecke Stifts- und Ehrlichstraße. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen.

Bernhard Kühn, Vorsitzender.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei zu Hamburg. Sitzungen finden statt jeden 1. und 3. Dienstag im Monat in Hüttmanns Hotel, Poolstr. 22, abends 8¼ Uhr. Nächste Sitzung Dienstag, den 19. August 1924.

J. A.: Arnold Weber, 1. Vorsitzender.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig. Vereinssitzungen jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat im Vereinslokal, „Bauers Brauereirestaurant", Täubchenweg. Nächste Sitzung am 21. August. Gäste stets willkommen. J. A.: Johann Birk, 1. Vorsitzender.

Verein der Vogelfreunde Leipzig-Plagwitz. Vereinslokal: „Gosenschlößchen", Leipzig-Plagwitz. Sitzungen an jedem 1. und 3. Montag des Monats, abends 8 Uhr. Vogelfreunde sind stets willkommen.

J. A.: Karl Scholtissek, 1. Vorsitzender, Leipzig-Plagwitz, Lauchstädter Straße 30.

Verein der Vogelliebhaber zu Mannheim. Versammlungen finden alle 14 Tage Samstag abend 8 Uhr im Vereinslokal „Restauration z. gold. Falken" statt. S. 1. 17. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen.

Johann Daubmann, 2. Schriftführer.

Für Entomologen.

Bau's Schmetterlingsbuch. Zum Selbstbestimmen aller in Deutschland, Österreich, Ungarn und der Schweiz vorkommenden Groß- sowie der vorzugsweise gesammelten Klein-Schmetterlinge. Mit 67 Textabbildungen. Kart. 4.— M.

Bau's Käferbuch. Zum Selbstbestimmen der in Deutschland, Österreich-Ungarn und der Schweiz vorkommenden Koleopteren. Mit 144 Textabbildungen. Kart. 4.— M.

Der Käfer- und Schmetterlingssammler. Anleitung zur Herstellung und Handhabung der beim Fange, der Zucht und dem Präparieren von Käfern, Schmetterlingen und Raupen als geeignet bewährten Geräte, sowie zur Anlage und Erhaltung von Insektensammlungen. Von Karl Wingelmüller. Mit 32 Abbildungen. Geh. 1.50, geb. 2.— M.

Schädlinge und Nützlinge der Kleintierwelt. Ein Lehrbuch für jedermann von Prof. Dr. L. Glaser. Mit 85 Textabbild. Kart. 3.— M.

Für Bienenzüchter.

Dzierzon's rationelle Bienenzucht. Von Pfarrer Dr. Dzierzon. 2. Auflage. Mit vielen Textabbildungen. Kart. 3.— M.

Bienenzucht im Zargenbreitwabenstock. Von Jak. Luers. Mit 25 Abbildungen im Text. Kart. 2.— M.

Leben und Zucht der Honigbiene. Ein gemeinverständliches Lehrbuch über Behandlung der Bienen und über Tätigkeit, Nutzen und Anatomie der Biene von Prof. Dr. O. Krancher. 2. verbesserte Aufl. Mit 1 Tafel, 82 Abbild. u. 7 Kopfleisten. Kart. 3.— M.

Für Hundefreunde.

Gebrauchs- und Luxushunde. Von Emil Ilgner. 2. Auflage mit 87 Abbildungen im Text. Kart. 3.— M.

Der Foxterrier, seine Zucht, Pflege und Erziehung für Jagd und Stube, von Emil Ilgner. 2.50 M.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg / Postschließfach 148

Von folgenden **Farbentafeln** der **„Gefiederten Welt"** sind noch einige Exemplare vorrätig, welche wir, solange der geringe Vorrat reicht, zum Preise von **1 G.-M. für die Tafel** zuzügl. **20 G.-Pf.** Porto u. Verpackung **für jede Sendung** bei vorheriger Einsendung des Betrages auf unser Postscheckkonto **Magdeburg 3148** abgeben.

1898 Tafel III: Schwarzspecht. (Schwarzdrucktafel.)
1899 Tafel IV: Nest des Gartenrotschwänzchens mit Weibchen, Jungem und Ei. (Schwarzdruck.)
1900 Tafel I: Madagaskar-, Napoleons-, dottergelber, Samt-, Blutschnabelweber.
1900 Tafel II: Kl. Alexander-, Bunt-, Wellensittich, Rosenpapagei, kl. Gelbhaubenkakadu.
1900 Tafel III: Sonnenvogel, blauer Hüttensänger, Rosenstar, Schamadrossel, weißohriger Bülbül.
1900 Tafel IV: Paradieswitwe, Mozambikzeisig, Grauer Kardinal, Safranfink, Papstfink.
1901 Tafel III: Kleinspecht, Kleiber, Wendehals.
1902 Tafel I Kohl-, Schwanz-, Hauben-, Tannenmeise.
1902 Tafel II: Goldammer, Baumpieper, Feldlerche.
1902 Tafel IV: Diamant-, weißbäckige Gürtel-, Masken-, Gürtelamandine.
1903 Tafel I: Hausrotschwanz, Sprosser, Nachtigall, Rotkehlchen.
1903 Tafel II: Bluthänfling, Grünling, Kernbeißer, Buchfink.
1903 Tafel III: Mistel-, Wacholder-, Wein-, Singdrossel.
1903 Tafel IV: Zwergstrandläufer, Wachtel, weißflüglige Seeschwalbe, Sandregenpfeifer.
1904 Tafel I: Zaun-, Garten-, Dorn-, Mönchgrasmücke.
1904 Tafel II: Schneefink, Steindrossel, Alpenbraunelle, Steinsperling.
1904 Tafel III: Binden-, Kiefern-, Fichtenkreuzschnabel.
1904 Tafel IV: Bartmeise, Rohrammer, weiße Bachstelze, Sumpfrohrsänger.
1905 Tafel I: Schwarzbürzel-, Spitzschwanzbronzemännchen, weißes, gelbbuntes, braunbuntes jap. Möwchen.
1905 Tafel II: Grau-, Orange-, Erz- und Schmuckpfäffchen.
1905 Tafel IV: Schwarzkehl-, Dreifarben-, Weißkopf- u. Schwarzkopfnonne.
1906 Tafel II: Lein-, Erlenzeisig, Berghänfling, Stieglitz.
1906 Tafel III: Stein-, braunkehliger und schwarzkehliger Wiesenschmätzer.
1907 Tafel II: Weißsterniges, rotsterniges, Wolffsches Blaukehlchen, Blaukehlchen ♀.
1907 Tafel III: Kleines, Zwerg-, Glanz-, Riesen-, rotrückiges und Gitterflügel-Elsterchen.
1907 Tafel IV: Karmin- und Halsgimpel, Gimpel.
1908 Tafel II: Braunrückengold- ♂ ♀, Schwarzkopf- und Goldsperling ♂ ♀.
1908 Tafel IV: Pünktchenastrild, Amarant ♂ ♀, dunkelroter Astrild, Tigerfink ♂ ♀.
1909 Tafel I: Orangegesichtiger Unzertrennlicher, Rosenpapagei, Rußköpfchen, Tarantinischer Unzertrennlicher, Grauköpfchen.
1909 Tafel II: Klarinetten- u. Mennigvogel, braunkehliger Blauschnäpper.
1909 Tafel III: Schwarzbäckchen-, Elfen-, Bunt- und Granatastrild, gemalter Astrild.
1909 Tafel IV: Orange-, Rotkopf-, Blutschnabel-, Napoleons- und Madagaskarweber.
1910 Tafel I: Grauer, Trauer-, Halsband-, Zwergfliegenschnäpper.
1910 Tafel IV: Zipp-, Garten-, Zaun-, Kappenammer.
1911 Tafel I: Rotrücken-, Raub-, Schwarzstirn-, Rotkopfwürger.
1911 Tafel II: Zeresastrild, Malabarfasänchen, Muskatfink, Silberschnäbelchen.
1911 Tafel III: Gartensänger, Fitislaub-, Weidenlaub- u. Waldlaubvogel.
1911 Tafel IV: Goldköpfiges ♂ ♀, feuerköpfiges Goldhähnchen, Zaunkönig.
1912 Tafel II: Wieners, Aurora-, Tropfen-, Wachtel- und Rebhuhnastrild.
1912 Tafel III: Magellan-, Kapuzen-, mexikanischer, Yarells und Trauerzeisig.
1912 Tafel IV: Dorn-, Sonnen- Binsen- und Gitterflügelastrild, Zebrafink.
1913 Tafel II: Violettblauer u. Rotbauchorganist, Purpur-, Dreifarben- und schwarzblaue Tangare.
1913 Tafel III: Paradies-, Dominikaner-, Königs-, Fischers, Rotscheitel- und Gelbrückenwidafink.
1913 Tafel IV: Goldschulter-, Fein-, Sing-, Browns Singsittich.
1914 Tafel I: Schwarzkopf-, Rosenbrust- u. mexik. Gelbkernbeißer, dunkelblauer Bischof, roter Kardinal.
1914 Tafel III: Diuka-, Grau-, Kron- u. Morgenammerfink, Graukardinal.
1914 Tafel IV: Pikui-, Kap-, Diamant-, Tamborin- u. Friedenstäubchen, chinesische Zwergwachtel.
1915 Tafel I: Sammetköpfchen, Sperber-, Orpheus- und Bartgrasmücke.
1915 Tafel III: Diamantfink-, Masken-, Weißwangen- und Spitzschwanzamandine, Gürtelgrasfink.
1915 Tafel IV: Star, Pirol, Rosenstar.
1920 Tafel I: Nandy-, Jendaja-, Guajakil- und Goldstirnsittich.
1920 Tafel II: Schuppenköpfchen, Schnurrbärtchen, dottergelber, Zwergmasken- und Textorweber.
1920 Tafel III: Tui-, Ziegen-, Mönch-, Tuipara- u. Katharinasittich.
1920 Tafel IV: Reisfink, weißer Reisfink.
1921 Tafel I: Gelber Wellensittich und Wellensittich.
1921 Tafel II: Kleiner Gelbhaubenkakadu.
1921 Tafel III: Kleiner Alexandersittich.
1921 Tafel IV: Domingo-, Cuba- und Rotbugamazone.

Da die Nachfrage nach Farbentafeln sehr groß ist, bitten wir sofort zu bestellen.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg / Postschließfach 148

Anzeigenteil

Die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 20 G.-Pf. berechnet. Aufnahme erfolgt gegen Voreinsendung des Betrages in Reichsgeld p
Brief od. auf unseren Zahlstellen: Postscheckkonto: Magdeburg 3148, Wien 156 687, Bern III 4326, Prag: Creditanstalt d. Deutschen unter Angabe des Zwecke

Käfige u. Gerätschaften

Gimpelbauer

mit Drahtstäben 17½ cm lang, 17 cm hoch, 13 cm breit pro Dtzd. 14 ℳ; fertige alle Sorten Käfige und Utensilien für Kanarien an. [600

A. Janson, Barbis a. H.

Vogelbauer,

22 Stück gebrauchte, mit Zubehör verkauft **Pritzwein,** Anatomisch-biolog. Institut, Berlin, Luisenstr. 56. [601



Prima Vogelleim,

reine Leinölware, Büchse gegen Einsendung von 2,20 ℳ versendet [602

Rudolf Rose,
Meuselbach (Thüringen).

Futtermittel

Ornis-Haus
Halle-Saale
Gegründet 1912

Spezialität:
Individuelle Weichfresserpflege nach Angaben des Herrn Apotheker Adalbert Jena-Biberach-Riß. (Alleiniges Herstellungsrecht.)

Reform-Normal I, Volierenm.,
Reform-Normal II, f. Rotkehlchen, Schwarzplatten usw.,
Reform-Normal III, f. Nachtigall., Sprosser usw.,
Reform-Normal IV, f. Gelbspött., Goldhähnchen usw.,
Reform-Normal V, f. Schama usw.,
Körnerfutter Ia für jede Vogelart. [603

Inhaber langjähriger Fachmann, siehe „Ornis-Buch" (90 S.) Mk. 1
Preisliste auf Wunsch!

Empfehle:
Echt engl. Farbenfutter
zur Anfütterung leuchtend hochgelber bis orange Farben, ½ kg 10 ℳ.

Heydenreichs Harzer Heilmittel gegen Rotlaufbigkeit, Freßsucht u. sonstige Magen- u. Darmkrankheiten aller Vögel, einfache praktische Anwendung, keine Futter- u. Wasserquacksalberei, 1000fach im Gebrauch, 2.50 ℳ.

Prima Kanarienhähne und Weibchen meines tiefen, vielseitigen durchgezüchteten Stammes. Ia Zuchtpärchen (1,1) reingelb 10 ℳ. Porto und Verpackung 4 ℳ.

Richard Heydenreich
604] **Bad Suderode, Harz**
Harzer Kanarien-Fetnzucht
Staatspreis, viele gold. Med.

Vogelfutter [605

für Kanarien, Waldvögel, Exoten, Papageien, Weichfresser. Liste 13 über Vogelfutter, Liste 5 über Vogelkäfige, Zuchtgeräte usw. mit etwa 400 Abbild. Bei Anfragen bitte auf die „Gefiederte Welt" Bezug zu nehmen.

W. Göpel, Leipzig,
Tröndlinring 1. Telephon 14958.

Habe noch weiter Bedarf evtl. bis Mitte Oktober an alten und jungen Insektenfressern. Suche besonders je **3 Männchen Ia Schamadrossel,** Sprosser, Alpenbraunelle, Grasmücken, Lerchen usw. laut meinem Inserat in „Gef. Welt" Nr. 4 vom 21. Februar 1924, am liebsten Vögel, welche schon vermausert sind, für richtige **Männchen** und Gesang muß volle **Garantie** gegeben werden. Kann abgeben, alles Männchen 1923 und schön vermausert: zahme Singdrossel, Schwarzkopf, Baumpieper, Zeisig><Kanarien-Bastard und aufgezogenen Grünhänfling. Verkaufe 12 Bände **Naumann,** Halbleder gebunden, tadellos erhalten, Band 2, 3 u. 4 gebe einzeln ab, weil doppelt; evtl. gegen Ia Schama u. Sprosser zu tauschen. Suche zu kaufen prima luftgetrocknete Laub-Ameiseneier, Eintagsfliegen, Daphnien, Seidenwürmer, Muska und etwa 12 kg Mehlwürmer. [606

Peter Matzen, Göttingen.

Mehlwürmer neue, feinste Qualität, Pfd. 8 ℳ
607] **Jeltner, Breslau,** Weinstr. 12.

Mehlwürmer

geg. Einsend. v. 2.— Rentenmark ¼ Pfd. franko versend. **D. Waschinski & Co.,** Biesenthal I (Mark). [608

Suche:

Ia Ameiseneier, deutsche, getrocknete, saubere Ware. Gebe auch **Kanarien** in Tausch! [609

Richard Heydenreich,
Bad Suderode (Harz).

Getrocknete deutsche
Laubwald-Ameiseneier
(Ernte 1924) per Liter 2 G.-M. empfiehlt in altbekannter Güte [610
Fr. G. Müller, Berlin SW 61, Blücherstraße 61.
Preisliste auf Wunsch!

Vögel

Harzer Kanarien
garantierte Männchen, 24er, Stück 8 M., Dutzend 85 M., sichtbar verpackt.
611] **Beck,** Tierimport, **Stuttgart.**

Der Not der Zeit gehorchend verkaufe meine
schneeweißen Farbenkanarien
zu nur 50 ℳ pro Stück. Gefl. Aufträge unter **C. B.** an die Geschäftsstelle der „Gefiederten Welt" erbeten. [612

Feuerflügelsittiche,

tadellos befiedertes, gesundes Paar 40 ℳ, 2 tadellose **Zuchtpaare grüne Wellensittiche** à 20 ℳ, junge Wellensittiche Stück 6 ℳ. [613
Mertes, Mainz, Wallaustraße 62.
A.Z.-Mtgl. 339.

Gebe

je 1,1 Reisfink, Silberschnäbel, Muskatfink und Bandfink **in Tausch** gegen Graudelsänger, Graukardinal, Sittiche oder Sonnenvogel. [614
Becker, Naffau (Lahn), Steinstraße.

Blaustirnamazone, [615
hervorragend begabt, tadellos im Gefieder 55 ℳ, Gelblingamazone 35 ℳ, erstkl. Alexandersittich 10 ℳ zu verkaufen.
Fritz Müller, Grohn-Vegesack, Auf dem Berge 87. A.Z.-Mtgl. 120.

Weiße, isabellfarbene und
Goldkanarien,
gesanglich durchgezüchtet, und bewährte gelbe **Haubenweibchen,** die bereits bastardiert haben, zu verkaufen. Kaufe zur Blutauffrischung **Goldisabellen.**
B. Matern, Lotzen (Ostpr.).
A.Z.-Mtgl. 117. [616

Tausche

junge Mönchssittiche und **grüne Wellensittiche,** in der Freivoliere gezüchtet, gegen **gelbe Wellensittiche, Nymphensittiche** oder **Sperlingspapageien.** [617
Rudolf Schmidt,
Weinsheim b. Worms a. Rh.,
Postweg 17.

3 weiße diesj. **Kanarien,** eig. Zucht, Stück 30.— ℳ, schöne kräftige Vögel, und 0,3 **Bandfinken,** à 1.— ℳ, hat abzugeben **Bernd Negge,** Lötzen in Ostpr. A.Z.-Mtgl. 264. [618

Bestellungen für September sofort der Post übergeben!
Bestellzettel für Deutschland.

Postbestellzettel.

Hiermit bestelle ich für den Monat September 1924
1 „Die Gefiederte Welt"
(eventuell mit Nachlieferung). — Erscheinungsort Burg Bz. Mgdb.

Name: .....

Wohnung: .....

Postquittung: .....Mk. .....Pf. sind heute bezahlt worden.

Ort: ..... den .....

Postannahme

.....

Offeriere in einwandfreien erstklassig Exemplaren sofort lieferbar:

Graupapageien	Stück	95.—
Blaustirnamazonen	„	45.—
Große weiße Gelbhaubenkakadus	Stück	58.—
Molukken-Kakadus	„	275.—
Kaktus-Sittiche	Paar	13.—
Wellensittiche, grüne	„	15.—
Wellensittiche, gelbe	„	16.—
Goulds amandinen, rot- u. schwarzköpfige	„	50.—
Spitzschwanzamandinen	„	50.—
Maskenfinken	„	50.—
Orangeblaufinken, ♂	Stück	30.—
Jap. Möwchen, weißbraun	Paar	20.—
Goldbrüstchen	„	6.—
Orangebäckchen	„	3.50
Grauastrilden	„	3.50
Reisfinken	„	5.50
Schwarzkopfnonnen	„	3.75
Schamadrosseln, Mch.	Stück	70.—
„ Wbch.	„	60.—
Amerik. Spottdrosseln, garant. Zuchtpaar		70.—
Goldstirnblattvögel	„	45.—
Rotohrbülbüls	„	15.—
Purpurtangaren	Paar	25.—
Glockenvögel	Stück	75.—
Blaupötter	„	48.—

Auf Mitte August eintreffende Bö nehme Vorausbestellungen entgegen

Rote Araras	Stück	45.—
Katharinasittiche	Paar	45.—
Elfenbeinsittiche	„	45.—
Goldstirnsittiche	„	18.—
Papstfinken	„	35.—
Indigofinken	„	35.—
Mexikanische Zeisige	„	45.—
Rote Kardinäle	Stück	28.—

Tierhandlung
Max Kleiner
Berlin NO. 18, Strausberger Str.
Fernruf Alexander 3313. [

Suche

ein gutes **zweisitziges Motorr** Gebe **Kanarien** und **Exoten** do und zahle ev. noch zu. [
Syré, Lehrer, Viernau i. Thür

Beschwerden weg Nichtzustellung der „G fiederten Welt" sind be zuständigen Postamt a zubringen.

Für Kanarienzüchte

Soeben erschienen:
Die Farben- und Gestal kanarien
nebst Beschreibung aller schied. Kanarienrassen, d Entstehung, Form- u. Far veränderung, Bastardzuc Farbenfütterung v. A. Asc brenner. Mit vielen f haltigen Abb. Kart. 1.75

Zu beziehen durch:
Creutz'sche Verlagsbu handlung, Magdebur
Postschließfach 148.

Inserate

für das am 21. August 1924 zur gabe gelangende Heft 27 der Welt erbitten bis 16. Aug. 1924

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Berlin-Hermsdorf; für den Anzeigenteil: Rolf Kretschmann, Magdeburg, Postschließfach 148
Verlag der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck: August Hopfer, Burg Bz. Mgdbg.

Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Jahrg. 53 | Den 21. August 1924 | Heft 27

(Druckort: Burg, Bezirk Magdeburg.)

Ein Grünflügelarara.

Von A. Munsterhjelm.

(Nachdruck verboten.)

In meinen Fähnrichsjahren kaufte ich ihn einmal während meiner Studentenzeit in Stockholm. Es war ein Grünflügelarara, ziemlich jung und prachtvoll im Gefieder. Alle Farben erschienen intensiv rot, resp. blau oder grün, wie man es nur selten sieht. Bloß einen Fehler hatte er an seinem Äußeren: das letzte Glied des rechten Flügels war umgedreht, um ihn flügellahm zu machen, so daß die zwei oder drei ersten Schwungfedern immer in verkehrter Lage starrten. Wenn er sich etwas unruhig fühlte, ließ er ein diskretes „urre — urre" hören und bekam so leichtverständlich den Namen Urre.

Als ich ihn bekam, war ich in der Pflege von Papageien noch ganz unbewandert. Ich hatte einen Ständer anfertigen lassen, der außer anderen unnötigen Schnörkeln noch Sitzstangen besaß, die unvernünftigerweise mit Kupferblech überzogen waren. Nun, der Vogel hielt seinen Einzug bei mir und wurde von allen Seiten bewundert. Er war daran gewöhnt, den Ständer niemals zu verlassen, obschon er ganz frei ohne Kette darauf saß. Er war im Anfang ganz fürchterlich böse, kein Mensch wagte sich ihm zu nähern, ich ebensowenig wie alle anderen. Es galt, ihn bloß aus Entfernung zu bewundern. Das Füttern war ein Kunststück für sich: mit der einen Hand mußte man seine Aufmerksamkeit irgendwie abzulenken versuchen, während man mit der anderen den Futternapf erreichte. Mit anderen Worten, die rechte Hand sollte nicht wissen, was die linke tat. Urre war so gewöhnt, daß er das Trinkwasser nicht stets bei sich hatte, sondern drei- bis viermal täglich getränkt wurde. Als man das Wasser ihm vorhielt, löschte er zuerst seinen Durst ganz artig und sanftmütig, als wäre er der friedfertigste Vogel der Welt, dann zog er die Pupillen ganz klein — und paß' mal auf, da mußte man schon sehr eilig retirieren, um nicht einen kräftigen Schnabelhieb zu bekommen. Allmählich wurden wir doch bessere Freunde, so daß er mir Futter aus der Hand nahm, ohne auf Hintergedanken zu brüten. Ich nahm ihn auf einen Stock, und wenn er mit seinem Schnabel in gefährlicher Nähe der einen oder anderen von meinen Händen geriet, zog ich die Hand weg, den Stock mit der anderen haltend, und wenn er sich an diese wandte, wurde der Kunstgriff nur umgekehrt erneuert, bis sich Urre vollständig verwirrt fühlte und sich beruhigte.

Nun will ich erzählen, wie wir eigentlich einander näher kamen, einander besser verstehen lernten. Wie gesagt, waren die Sitzstangen mit Kupfer überzogen. Entweder durch Kupfervergiftung oder durch irgendeinen Diätfehler zog sich Urre schon in der ersten Woche eine schwere Darmentzündung zu. Lange schwebte er zwischen Leben und Tod, schon war ich überzeugt, den schönen Vogel zu verlieren. Da bekam ich leihweise „Die Amazonen" und fing an zu studieren. Von da ab datiert sich mein besseres Verständnis für die Haltung und Pflege der Papageien. Urre bekam nun Haferschleim, Rotwein usw. Nichts blieb unversucht. Doch, er wurde immer hinfälliger, wollte nicht mehr seinen Haferschleim und das andere Zeug anrühren. Da entschloß ich mich, ihm Tee zu geben, um ihn etwas zu stimulieren, und — das schmeckte ihm. Er trank in langen Zügen, und von dem Tage an wurde er Tag für Tag besser. Während der Krankheit ließ er sich von mir natürlich alles gefallen, so hinfällig und schwach wie er war. Nun war ich gespannt zu sehen, ob unser Verhältnis in der Rekonvaleszenzzeit sich verschlechtern würde, aber von da ab waren wir die besten Freunde. Ich konnte mit ihm anfangen, was ich nur wollte. Er saß auf, meiner Schulter, betastete mein Ohr, meine Nase selbst die Augenwimpern mit seiner Zunge und seinem fürchterlichen Schnabel, ohne daß ich einen Augenblick fürchten brauchte, er würde mich beißen. Ich konnte jede Stelle seines Körpers berühren, konnte ihn auf den Rücken legen, an den Pfoten hängend halten, kurz, alles tun, und kein einziges Mal hat er mich seitdem gebissen. Urre war vollständig zahm geworden. Aber — all seine Zärtlichkeit galt bloß mir. Allen anderen Menschen gegenüber war er so böse wie auch früher. Er gehörte zu der Gemütsart, die nur einen lieben kann, und als solcher blieb er sein ganzes Leben. Später war ich wegen langen Aufenthalts im Auslande gezwungen, den Vogel meiner Schwester in „Vollpension" zu geben, und als ich wieder erschien — kannte er mich nicht mehr,

wollte wenigstens nichts von mir wissen. Inzwischen hatte er meine Schwester liebgewonnen und behandelte mich wie einen Fremden, das heißt, drohte mir mit dem Schnabel. Von einer „Hundetreue" war hier also keine Rede, und schweren Herzens beschloß ich, das Tier meiner Schwester zu schenken, denn „sie hatten einander so lieb". Ob diese Untreue nun auf schlechtem Gedächtnis beruhte oder ob der Vogel sonstwie meine Schwester bevorzugte, habe ich nie feststellen können. Ich habe später gutmütige sowie bösartige Araras gesehen. Eine allgemeine Schlußfolgerung von dem Benehmen meines Vogels zu ziehen, wäre wohl schon deshalb unrichtig.

Noch einige Worte über meinen Arara. Wie erwähnt, studierte ich damals in Stockholm und nahm ihn immer mit zu den Ferien nach Hause in Finnland. Sommer und Winter hat er das Ålandsmeer in beiden Richtungen gekreuzt, und wenn es auch in einer Holzkiste unter guter Wartung geschah, kann er doch nicht weichlich genannt werden. Nach der ersten schweren Krankheit bekam er einen sachgemäß eingerichteten Ständer und war dann stets kerngesund. Als Futter bekam er bloß Sonnenblumenkerne, als Leckerbissen außer Frucht auch Nüsse, besonders Paranüsse liebt er sehr. Die knochenharten Nüsse knackte er spielend mit größter Leichtigkeit. Mehlhaltige Samen ließ er immer unberührt. Mit erweichtem Mais machte ich vielmals Versuche, doch immer ohne Erfolg. Auch kalkhaltige Stoffe, wie z. B. Sepia, hat er niemals genommen. Er mauserte sehr regelmäßig jedes Jahr; auch die schönen langen Schwanzfedern hat er regelmäßig gewechselt. Dadurch hielt er sich immer in wunderschönem Kleid, das von keinem Käfiggitter beschädigt wurde. Spraybad liebte er sehr. Sein wüstes, rauhes Geschrei ließ er ziemlich selten hören, aber wenn das mal geschah, besonders wenn er lange einsam gewesen, ging es los, so daß die Fensterscheiben schmetterten. Doch hat er niemals sehr lange auf einmal geschrien. Eben deshalb finde ich, daß man sein Geschrei besser leiden konnte als das mancher anderen großen Papageien, die oft andauernd Lärm machen. Vom Sprechen ist nicht viel zu sagen, vielleicht lag die Schuld auch an den Lehrmeistern. Nur zwei Worte brachte er ganz deutlich hervor, nämlich: Kakadu(a) und Aurora (vielleicht gekäfigte Nachbaren von einer früheren Periode in seinem Leben!). In unserer Villa hatte er für sich, seines jeden Gegenstand zerstörenden Schnabels wegen, einen Bodenraum mit einfacheren Möbeln, wo er sich auch außerhalb des Ständers bewegen durfte. Hier hatte er einen großen Holzkasten, an der Wand hängend. Im Kasten waren Kleiderstücke usw., und da hatte er immer sehr viel zu tun. Eines Tages lag im Kasten ein regelrechtes Ei! Er entpuppte sich also als ein Weibchen, und wir dürfen wohl jetzt von ihm das Wort „Sie" gebrauchen. Hier erinnere ich mich einer lustigen Geschichte: Nach einer tierärztlichen Hochschule wurde einmal ein Papagei von einer alten Dame gebracht, die ganz erschüttert war, weil ihr Papagei ein Ei gelegt hatte. Die Kandidaten erklärten, daß es als ein ganz normales Ereignis betrachtet werden müßte, die Dame aber rief: „Oh nein, hat er sich doch immer Gustav genannt." — Nun also, dann hat mein Arara mit der Zeit noch viele Eier gelegt. Oft lag sie den ganzen Tag im Kasten, hätte wohl auch gut genistet, wenn sie bloß einen passenden Kameraden gehabt hätte. An schönen Sommertagen war sie frei im Garten und kletterte lustig in den Bäumen umher. Die leuchtenden Farben ihres Gefieders paßten doch schlecht zu dem bescheidenen Grün unserer nordischen Bäume, sie fordern eine üppigere Vegetation mit bunten Blumen, heißer Sonne und dunklen, tiefen Schatten. In solcher echten Umgebung eine Schar von diesen schönen Vögeln zu sehen, wäre wohl wie ein Traum, aus dem man nicht aufwachen wollte.

Zum Schluß möchte ich noch betonen, daß ich die Araras für sehr klug halte. Die Nachahmungslust, vielleicht auch die Begabung, Worte nachzusprechen, ist nicht sehr ausgeprägt. Sonst gehören sie zu den schönsten und prachtvollsten unter allen großen Papageien. Wohleingewöhnt, sind sie nichts weniger als weichlich. Allerdings, wenn man viel Freude von ihnen haben will, muß man ihnen, des langen Schwanzes halber, einen sehr großen Käfig geben, wenn sie nicht frei auf dem Ständer sitzen bleiben. In engen Käfigen ist ihr schönster Schmuck, der lange Schwanz, immer abgebrochen, weshalb ein solcher Vogel einen traurigen Eindruck macht. Beklemmung fühlt wohl auch ein jeder Vogelfreund beim Anblick eines an der Stange festgeketteten armen Vogels. Auch glaube ich, daß solche Vögel immer stumpfsinniger bleiben als die, denen man genügende Freiheit bieten kann.

Der Gelbspötter.

Von J. Birk, Leipzig.

(Schluß.) (Nachdruck verboten.)

Man soll zwar die zur Verwendung kommenden Futterbestandteile, seien es Ameisenpuppen, Weißwurm, Hanf, Möhren usw., stets auf ihre einwandfreie Beschaffenheit prüfen, doch muß ich gestehen, daß ich für derlei zeitraubende Methoden beim besten Willen keine Zeit erübrigen kann. Damit soll aber nicht gesagt sein, daß stark geschwefelte Ware ungewaschen verfüttert werden soll. Was die Fütterung von Insekten, wie Spinnen usw., anbetrifft, so war ich noch niemals darüber in Sorge, daß ich damit einem meiner Vögel Schaden zufügen könnte. Die Beurteilung, was für welche der betreffende Vogel in der Freiheit frißt, überlasse ich dem Naturinstinkt desselben, denn die Natur hat unseren Vögeln schon soviel Unterscheidungsvermögen mitgegeben zum Kampf ums Dasein, daß sie ihnen schädliche Insekten nicht fressen. Was ich erwischen kann an Käfern, Spinnen, Schmetterlingen usw., wandert in die Käfige, da habe ich die Beobachtung gemacht, daß dieses oder jenes Insekt von dieser oder jener Vogelart nicht angerührt wird, also hilft und schützt sich der Vogel selbst vor eventuell schädlichen Insekten. Wenn Herr Nieselt vor Verwendung von Mohrrüben, Karotten und Quark dringend warnt, so muß ich, rein sachlich gesagt, hervorheben, daß eine derartige Behauptung wohl als unverantwortlich bezeichnet werden muß. Diese Behauptung, hätte sie auch nur die leiseste Berechtigung, würde die gesamte bis dato geübte Praxis der Vogelpflege regelrecht auf den Kopf stellen. Der in der

Praxis ergraute Liebhaber hat nur ein ungläubiges Lächeln für eine derartige Verdrehung der Tatsachen. Doch muß hier an dieser Stelle hervorgehoben werden, daß trotz Möhren und Quark viele mir bekannte Liebhaber ebenso wie ich geradezu glänzende Resultate in der Vogelpflege zu verzeichnen hatten und noch haben. Wenn sich Herr Nieselt oder irgendein anderer Liebhaber dafür interessiert, wie Vögel aussehen und singen, deren Futter zu mindestens aus zwei Teilen Mohrrübe besteht, so sind sie eingeladen, meine Vögel sowie die der übrigen Leipziger Liebhaber zu besichtigen; ganz besonders kann ich da meinen Freund Herrn Schwarz, Leipzig, Südstr. 67, empfehlen, der sechs Gelbspötter fast ständig überwintert, ebenso auch Sumpfrohrsänger. — Erfolg: glatte Mauser, fleißigen, feurigen Gesang, mehr Beweis wie unbegründete Verwerfung dieser Futtermittel. Selbstverständlich ist Mohrrübe kein idealer Naturfutterersatz, doch wenn Vegetabilien für geregelte Verdauung und lange Lebensdauer (?) sorgen, so tun dies wohl auch Möhren und Karotten, denn es sind ja auch Vegetabilien. Alle die Liebhaber, die ich kenne und die mit Erfolg Gelbspötter pflegten, haben ebenso wie ich gute saftige Mohrrüben als Anfeuchtungs-, Streckungs- und auch als Zuführungsmittel von vegetabilischen Substanzen in ihrem Weichfuttergemisch. Betreffs der Verwendung von Quark in der Weichfresserpflege stehe ich nach dem, was mich die Praxis gelehrt hat, auch auf einem gegenteiligen Standpunkt. Vorausschicken muß ich, daß ich von der chemischen Zusammensetzung der von uns in unserem Weichfuttergemisch verwendeten Bestandteile nichts verstehe. Dies zu untersuchen und bekanntzugeben, bleibe einem Fachmann, der gleichzeitig ein praktischer Vogelwirt sein müßte, vorenthalten. Aber was mir in der Praxis Erfolge brachte, was nicht nur von mir, als einzelnen Vogelpfleger, sondern von sehr vielen bekannten und unbekannten Vogelliebhabern als gutes Futter gepriesen wird, läßt sich nicht mit ein paar gar nichts sagenden, jeglicher Begründung entbehrenden Worten abtun. Für mich bleibt einwandfreier, frischer, süßer, nicht bereits saurer Quark ein ideales nahrhaftes Futter nicht nur für Gelbspötter, sondern für alle Weichfresser. Interessant wäre wohl, zu hören, was Herr Nieselt für langjährige, gründliche Erfahrungen damit gemacht hat, sollte vielleicht doch auch von ihm bereits in Säuerung übergegangener Quark verwendet worden sein, dieser ist Gift für den Vogelmagen. Wie Quark von allen Vogelliebhabern verwendet wird, weiß ich nicht, doch will ich meine beiden Methoden kurz streifen, damit für neue Anhänger von Quarkfütterung Richtlinien vorhanden sind. Bei beiden Methoden ist Bedingung, daß der Quark ganz frisch, auf natürlichem Wege, nicht durch Zusetzung von irgendwelchen chemischen Mitteln, aus der Milch gewonnen wurde. Ersteres geschieht wohl bei jedem Landwirt, wie es damit in Großbetrieben, wie Dampfmolkereien, gehandhabt wird, entzieht sich meiner Kenntnis. Süßer, nicht bereits gesäuerter Quark wird in einem weißen Linnen so ausgedrückt, daß alles ihm anhaftende Wasser entfernt wird. Hierauf wird der Quark im Beutel an die Luft, am besten ans Fenster gehängt so lange, bis er vollständig trocken und hart geworden. Sodann kann der Quark auf dem Reibeisen gerieben täglich frisch dem Weichfutter zugesetzt werden. Gerieben wird nur soviel, wie für das Tagesquantum nötig ist. Wird der so präparierte Quark an der Luft auch hart wie Stein, es schadet nichts, um so besser, es ist ein Zeichen, daß alle Nässe entfernt ist, und er hält sich, bis er vollends verbraucht ist. Die zweite Methode ist ebenso einfach, doch muß hierbei ganz besonders beachtet werden, daß keine Säuerung resp. Moderung des Futters eintritt. Man nimmt ein Pfund Quark oder auch mehr — das Quantum des Quarks spielt keine Rolle — nur muß er selbstverständlich von dem überflüssigen Wasser entleert sein, und mischt, je nachdem was der Liebhaber für gemahlenes Gebäck, gemahlene weiße Semmel oder Zwieback — Biskuit ist ausgeschlossen — verwendet, nach und nach soviel von dem Gebäck mit dem Quark, bis von dem Quark überhaupt keine Spur mehr zu sehen ist. Selbst kleine Klümpchen von Quark dürfen nicht mehr zu sehen sein, bis dies der Fall ist, muß gerührt und gemischt werden. Nur der Geruch an dem Gebäck und der Feuchtigkeitsge-



Ani (s. S. 213).

halt lassen noch das Vorhandensein des Quarks vermuten. Haben wir nun eine ganz kleinkrümelige Masse, so wird diese auf einem Brett oder starkem Papier, nicht bedrucktes Papier, zum Trocknen ausgebreitet. Nach einigen Tagen und öfterem Wenden ist diese Masse vollständig trocken und kann entweder gleich zur Mischung eines größeren Quantums Weichfutter, indem die übrigen Bestandteile, wie Ameisenpuppen, Weißwurm usw., einfach zugesetzt werden, Verwendung finden. Wer sein Futter erst täglich in seinen Bestandteilen zusammenmischt, setzt einfach der geriebenen Möhre das nötige Quantum Gebäck mit dem darin enthaltenen Quark zu. Niemals darf bei der Mischung von Gebäck und Quark auf den Irrtum verfallen werden, daß vor Abtrocknung die Masse in einen Behälter kommt, sonst wird er modrig und schimmelig, daher gefährlich und unbrauchbar. Es war notwendig, daß ich, wenn ich der Quarkfütterung das Wort rede, auch die von mir geübten Methoden ausführlich schilderte, denn es kann durch ein Versehen, indem der Quark sauer oder verdorben ist, der Gesundheit des Vogels die größte Gefahr bereitet werden. Eins muß ich noch hervorheben, der Liebhaber darf ja nicht glauben, daß er, wenn er von den besten Futtermitteln und in genügenden Mengen dieselbe reicht, auch besten Erfolg in der Gelbspötterpflege erzielen wird. Nur der Körperzustand des Gelbspötters soll das Thermometer in der Futterzusammensetzung sein. Darin liegt die ganze Kunst der Überwinterung des Gelbspötters, zu beachten, daß der Vogel wohl genügend genährt, das heißt, daß die Brust vollfleischig rund, aber nicht verfettet ist, etwas Fett an Hals und Bauch ist sogar gut, niemals darf aber der Gelbspötter schlecht genährt, das heißt die Brust fleischlos und spitz sein. Im ersteren Falle Einschränkung der Mehlwürmergabe sowie des Weißwurms, in letzterem Falle Vermehrung der Mehlwürmer auf mindestens das doppelte Quantum, Verbesserung des Futters in qualitativer Hinsicht und vor allem Beleuchtung des Käfigs zur genügenden Futteraufnahme in den Abendstunden. Verfettete Gelbspötter mausern nicht oder nur ganz schlecht, magere hingegen besitzen nicht die nötigen Kräfte und Säfte im Organismus zu einer Mauser und gehen schon vor derselben ein. Darum ziemlich gleichmäßige, nicht schwankende Temperatnr des Überwinterungsraumes und normaler Körperzustand des Vogels sind die Gewähr für den Erfolg in der Gelbspötterpflege.

Als Sänger stelle ich den Gelbspötter mit in die erste Reihe, wenn ich ihn vom Standpunkt des „Mischers“ ans betrachte, der seinen Originalgesang mit den Imitationen aus den Liedern anderer Vögel kunstvoll vermischt, ja so vermischt, daß wohl sogar der gute Vogelstimmenkenner scharf achtgeben muß, wenn er eine dem Originallied des betr. Sängers täuschend ähnliche Imitation erlauschen will. Die Kunst dieses Mischens und Zusammenmodulierens von Originalgesang und Imitationen in solch vollendeter Form ist keinem zweiten Sänger eigen, und gerade dieses macht den Gesang des Gelbspötters so wertvoll. Er verflicht, er verschmilzt Originalgesang und Imitationen so geschickt, daß man wirklich nicht weiß, wo der Originalgesang aufhört und die Imitation anfängt. Einen mehr von Lebenslust und -übermut durchfluteten Vogelgesang gibt es nicht. Die kleine Kehle des begabten Sängers sprudelt über von den unaufhaltsam hervordrängenden Touren, immer bringt er sein ihm eigenes Können und das abgelauschte Repertoir von anderen Vogelstimmen in anderer Modulation. Er kennt keine Regel in der Vortragsweise, er komponiert seinen Gesang in verschiedener Reihenfolge und Zusammensetzung der Touren, und dieses ist es, was das Ohr niemals müde werden läßt beim Lauschen des Gesanges dieses vielseitigen Künstlers. Als Imitator gewertet stellen ihn fast alle in dieser Hinsicht geschätzten Sänger, wie rotrückiger Würger, Sumpfrohrsänger, Haubenlerche, Blaukehlchen und Schwarzplatte in den Schatten, ja jeder Vogelgesang, sei es der eines Originalsängers, eines Mischers oder Originalspötters, wie der des rotrückigen Würgers, hat seine Eigenheiten, hat sein Bezauberndes, ein jeder dieser Vogelgesänge kann als schön bezeichnet werden. Nur darf man dabei nicht auf den Gedanken kommen und Vergleiche ziehen wie z. B. zwischen Gelbspötter und Nachtigall, denn wie es im Volksmund heißt, läßt sich über den Geschmack streiten. In wohlweislicher Vorsehung hat es die Natur eingerichtet, Abweichung in der Nahrung, im Federkleid, im Brntort, im Gesang usw., und dies ist gut, denn was wäre unsere Natur, wenn alle Sänger in den Lautäußerungen übereinstimmten, es wäre ebenso, wenn die Monate im Jahre sich im Naturbilde gleichen würden, und wäre es selbst der Wonnemonat Mai.

Der Gelbspötter ist wirklich nicht der als ganz und gar weichlich verschrieene Käfigvogel. Bei gewissenhafter Pflege, die natürlich eine gute Kenntnis in der Weichfresserpflege voraussetzt, wird er nach der ersten überstandenen Wintermauser ein dankbarer Stubengenosse sein. Wer sich dennoch mit der Käfigung eines Gelbspötters befassen will, wähle eine einfache, aber auch einwandfreie Fütterungsmethode, je schwieriger eine solche ist, desto mehr Fehler können gemacht werden. Zeit ist Geld, und sei es auch die freie Zeit des Vogelliebhabers, wenigstens bei mir ist es so, die brauche ich nicht allein zum Füttern von einem reichlichen Dutzend von Weichfressern, sondern zum Lauschen ihres Gesanges, denn wenn man lange füttert, singen sie lange nicht.

Sollten diese meine Zeilen von allen so aufgefaßt worden sein, was sie eigentlich sein sollen, ein ungezwungener Meinungsaustausch zum besten unseres kleinen gelben Künstlers, so haben sie einen Zweck und sind nicht umsonst geschrieben.

Neueinführungen und Seltenheiten.

Von Karl Neunzig.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Eine recht seltene Erscheinung in früheren Jahren sowohl wie auch jetzt noch ist der dem bekannten Textorweber nahestehende

Schwarzkopfweber — Ploceus cucullatus nigriceps (Lay),

dessen Verbreitungsgebiet sich über Südafrika nordwärts im Westen bis Angola, im Osten bis zum Viktoriasee und Jubafluß erstreckt. Auch er gelangt

mit dem großen von der Verwaltung des Zoologischen Gartens zu Berlin unternommenen ostafrikanischen Tierimport in das Vogelhaus als seltener Gast (s. Abb. S. 205). Der Schwarzkopfweber versteht es wie der Textorweber, sich an den verschiedensten Örtlichkeiten einzurichten. Während aber der letztere sich gern in den Negerdörfern und auch im gemischten Steppengelände aufhält, scheint der Schwarzkopfweber nach den bisher vorliegenden Berichten die Ufer von Gewässern und Sümpfen zu bevorzugen. In manchen Gegenden sind sie die am häufigsten vorkommenden Webervögel. Sie leben wohl überall, wo sie vorkommen, in großen Flügen. „Morgens", so berichtet Fischer, „in der Frühe fliegen sie von ihren Rastplätzen, meistens größeren, am Wasser stehenden Bäumen, auf Nahrung aus", die fast ausschließlich in Getreide besteht. In großen Scharen fallen sie besonders in die Reisfelder, in denen sie, wie auch in anderen Getreidefeldern, großen Schaden



Weißbauchpapagei.
Aufnahme von S. Lichtenstädt (s. die Arbeit von Fritz Pölz S. 25).

anrichten. Junge Erbsen werden gleichfalls in großen Mengen von ihnen verzehrt. Den sengenden Strahlen der Mittagssonne suchen sie sich im schattigen Laubwerk der Bäume zu entziehen. Am Spätnachmittag gilt ihr unerwünschter Besuch wiederum den Kulturländereien der Eingeborenen. Mit Sonnenuntergang verlassen sie diese und „eilen in Scharen, bestimmte Wege einschlagend, zu gewissen Versammlungsorten, wo sie, ähnlich unseren Sperlingen, unter lautem Gezwitscher sich umhertummeln", bis sie sich zur Ruhe begeben. Die Nacht verbringen sie teilweise in Ruhenestern, welche leichter und weniger sorgfältig gebaut als die Brutnester, gern in den Zweigen der Bäume, welche über Wasser herabhängen, verfertigt zu jahrelanger Benutzung. Böhm teilt mit, daß sie in dem dichten Schilf der Sumpfgebiete übernachten. Die großen Scharen dieses Webers, welche Böhm in Deutsch-Ostafrika beobachtete, fand er in der Nähe von Wasser und Sümpfen, wo die Vögel mit rauschendem Flügelschlage und dem bekannten anschwellenden und wieder nachlassenden verworrenen Geschrei bald in Pflanzendickichte über dem Wasser einfielen, bald sich auf benachbarten Bäumen sammelten. Sie nisten wie der Textor kolonienweise. Die Form des Nestes ist fast kugelrund, wenig länger als breit mit seitlich unterem Schlupfloch, vor dem sich ein kurzer Röhrenansatz befindet. Oben ist das Nest zuweilen in eine Spitze ausgezogen, mit der es an einem Zweige oder Halme befestigt ist. Als Baustoff wird frisches Gras und Schilf verwendet, wie von den meisten Webern. Das Nest wird an verschiedenen Örtlichkeiten gefunden. Fischer fand sie an Zweigen und sehr häufig an Palmwedeln, besonders denen der Kokospalme, befestigt, und zwar so, daß die Äste oder die Blätter der Palmwedel in die Seitenwand des Nestes oder oben am Nest eingewebt waren, während in den Nistkolonien, welche Ayres in Südafrika sah, die Nester an Flußufern, an den Spitzen überhängenden Grases befestigt waren. Zum Nisten werden unter großem Lärm sowohl alte Nester ausgebessert wie neue angelegt. Das Gelege besteht in der Regel aus drei einfarbigen blaßblauen oder weißen Eiern, oder die Eier sind auf blaßblauem, weißem oder rötlichweißem Grunde rostbräunlich gefleckt (22—25 × 14—16 mm).

Gefiederbeschreibung: ♂ Kopf, Kehle bis auf die Kropfmitte schwarz, an Halsseite und Kropf oft schmal goldbraun umsäumt; Nacken, Halsseiten goldgelb, Federn des Rückens, Schultern schwarz mit goldgelben Spitzen; Bürzel gelb oder grünlichgelb; Oberschwanzdecken grünlichgelb; Unterseite goldgelb; Flügelfedern schwarz mit gelben Säumen, kleine Deckfedern mit gelben Spitzen; Unterflügeldecken blaßgelb; Schwanzfedern olivenbräunlich, gelblichgrün verwaschen, Säume gelblichgrün; Schnabel schwarz; Auge orange bis rot; Füße rötlichbraun, Lg. 150—170; Fl. 80—90; Schw. 50—60; Schn. 18—22; Lf. 22—23 mm.

♀ Kopf olivengelbgrün, zuweilen mit dunkelbraunen Schaftstrichen (junger Vögel), blaßgelber Augenbrauenstreif; Oberseite graubraun, Rücken mit dunkelbrauner Federmitte; Vorderhals blaßgelb; Mitte des Unterkörpers weiß, z. T. gelblich verwaschen, Seiten graubräunlich; Flügelfedern schwarzbraun mit gelblichen z. T. weißlichen Säumen. Schwanz olivbräunlich mit gelblichen Säumen; Auge gelbrot; Schnabel schwarzbraun, Unterschnabel heller; Füße hornbräunlich.

Die Importe der großen Tierhandelshäuser und besonders der des Berliner Zoologischen Gartens waren nicht nur reich an Arten, unter denen sich viele der Vogelliebhaberei bisher unbekannte befanden, sondern auch in bezug auf die Anzahl der Individuen. Das zeigen sowohl die reichen Bestände des Vogelhauses wie auch die Vogelhandlungen. Selbst in den Jahren vor dem Weltkrieg sah man kaum so große Mengen beisammen. Hunderte oder gar Tausende der gewöhnlichsten Prachtfinken sah man wohl auch früher häufig, aber 300 Paare Gouldamandinen, rot- und schwarzköpfige, 100—150 Paare Spitzschwanz- und Maskenamandinen, wie sie in Flugkäfigen der Firma Paul Kleinert zu sehen waren, sind ein ungewohnter Anblick, der auch in früheren Jahren kaum geboten wurde. Es kommt hinzu, daß sich alle diese Vögel im schönsten Gefieder und in voller Lebenskraft zu befinden scheinen.

Im Vogelhaus des Berliner Zoologischen Gartens fesseln auch einige seltenere Vögel Amerikas unsere Aufmerksamkeit.

Eine auffallende Erscheinung ist der zur Familie der Kuckucke gehörende

Ani — Crotophaga ani *Gm.*,

dessen Verbreitungsgebiet sich von den südlichen Vereinigten Staaten südlich bis nach Argentinien erstreckt (s. Abb. S. 211). Die Gattung der Maden-

Kleiber.

hacker — Crotophaga *L.* zeichnet sich durch den stark seitlich zusammengedrückten hohen Schnabel mit schmalem kielartigen Aufsatz auf der Firste aus. Die rundlichen oder ovalen Nasenlöcher liegen wie bei den meisten Kuckucken frei, näher der Schnabelschneide als der Firste. Zwei Zehen sind nach vorn, zwei nach hinten gerichtet, der nur aus acht Federn bestehende schwachstufige Schwanz ist viel länger als die Flügel. Die Gattung ist in drei Arten über Mittel- und Südamerika verbreitet. (Fortsetzung folgt.)

Meine gefiederten Lieblinge.

Von Gerichtsaktuar Walter Fiedler, Neustrelitz.

(Nachdruck verboten.)

Scharf fegte der Novemberwind um die Häuserecken, er trieb den Schnee durch die Straßen und rüttelte an Fenstern und Türen. Ein richtiger Wintertag! So ungemütlich es für die armen Vögel draußen im Freien war, so mollig und geschützt saßen meine Vögel in ihrem großen Flugraume. Ich schloß des Sturmes wegen das Fenster, vor dem eine kleine dünne Gaze, die das Entweichen meiner Lieblinge verhindern sollte, gespannt war, und beobachtete die lebenslustigen frohen Tierchen. Unermüdlich rutschte der Kleiber an dem Stück Kieferstamm in der Ecke am Fenster rauf und runter, versteckte sich in der rissigen Borke Sonnenblumenkerne und kletterte kopfunter und kopfüber an den zahlreichen Zweigen und Ästen herum. Seit zwei Tagen besaß ich ihn erst, und jetzt schon war er völlig zahm und zeigte nicht die geringste Scheu. Ganz dicht kam er zu mir heran und holte sich in ungeschickter und hastiger Weise Kürbiskerne aus dem Futternapf. Wunderhübsch leuchtete seine gelbe Brust, vorzüglich sahen seine blaßblauen Flügeldecken aus und so lang sein starker kräftiger Schnabel war, so kurz und unscheinbar erschien sein schmaler Schwanz. Allerliebst machte sich der schwarze dünne Strich, der sein kluges hübsches Gesicht verzierte, und interessant waren seine Kletterfüße, die sich fest an Borke und Zweige klammerten.

„Schaffen Sie sich einen Kleiber an", hatte mir ein befreundeter Vogelliebhaber gesagt, „der macht Ihnen viel Spaß und bringt Leben in die Bude." Er hatte recht, jener Naturfreund. Von den vielen Vögeln, die ich schon besessen und mit großer Liebe gepflegt hatte, trug keiner solche Lebhaftigkeit und Lebensfreudigkeit zur Schau wie dieser Kleiber, diese allezeit rührige Spechtmeise.

Ganz das Gegenteil von ihm war mein gleichfalls im Flugraum befindlicher Dompfaff. Sanftmütig und ruhig war sein Wesen, still und zufrieden „knabbelte" er die im Herbste von mir an der Zinnower Chaussee gesammelten roten Ebereschen, ließ ab und zu sein sanftes, weiches „tütütü..." ertönen, fraß in erhabener Ruhe von dem Hanf, nahm ab und zu einen Mehlwurm, vorausgesetzt, daß der Kleiber ihn ihm nicht vor der Nase wegnahm, und hüpfte zwischen den grünen frischen buschigen Kiefernzweigen stillvergnügt umher. So selten er seinen eigenartigen Sang ertönen ließ, so hübsch sah er mit seiner roten Brust, den blendend weißen Streifen der Flügeldecken und dem tiefschwarzen Kopf aus. Es war mein hübschester Vogel. Auch große Zutraulichkeit legte er an den Tag. Allen andern Vögeln gegenüber zeigte er sich stets friedfertig und niemals sah ich ihn bösartig werden.

Weniger friedfertig zeigten sich meine beiden Kohlmeisen. Auch sie schwirrten gleich dem Kleiber unstätig in dem geräumigen Flugraum umher, hüpften von Zweig zu Zweig, huschten zum Fenster, flogen auf die zahlreichen Sitzstangen, sangen oft ihr kurzes, hübsches Lied, waren stets mobil, aber — zankten sich oft, trotzdem sie ein Pärchen waren! Die Keilerei dauerte aber gewöhnlich nicht lange, bald waren sie wieder die dicksten Freunde und schliefen nachts dicht nebeneinander auf einer Stange dicht unter der Zimmerdecke und glichen zwei runden Federbällen. Pack schlägt sich und Pack verträgt sich!

Sobald ich Mehlwürmer reichte, waren sie zur Stelle. Schnell pickte der spitze Schnabel in den Futternapf, holte sich einen Wurm heraus, dann ging's auf irgendeinen Zweig, der Mehlwurm wurde zwischen die dünnen, flinken, zierlichen Füße genommen, Stück für Stück verschwand im Vogelmagen, schnell wetzten sich die Meisen den Schnabel am Zweig und flogen wieder zum Futternapf hinab und holten sich einen neuen gelben Wurm. Der Kleiber hielt sich stets „ran" und kam nie zu kurz. Während die Kohlmeisen jedesmal nur einen Wurm nahmen, „langte" er verschiedentlich mehrmals zu, flog gleichfalls zu einem Zweig, war aber sogleich wieder zur Stelle und holte sich weitere Würmer.

War das Wetter nicht stürmisch, so öffnete ich stets das Fenster und heller Sonnenschein flutete durch die dünne Gaze in den mit schönduftenden Kiefernzweigen geschmückten Vogelraum, dessen Fuß-

boden mit Sand, leeren Sonnenblumen- und Kürbiskernen sowie entleerten Hanfhülsen bedeckt war. Herrlich leuchteten die Wangen meiner Kohlmeisen, wunderhübsch machte sich ihre kräftig gelbe Brust und die prächtig schwarze Kehle sowie der gleichfalls schwarze Bauchstreifen, der bei dem Männchen fast bis zum Schwanz herunterreichte. Zwar waren sämtliche Farbenschattierungen des Weibchens, das übrigens erheblich kleiner als das Männchen war, nicht voll so lebhaft wie beim Männchen, aber wunderhübsch sah sie auch aus in ihrem herzerfreuenden Federkleid. Anfangs waren beide Meisen etwas wild, bald gewöhnten sie sich aber an ihre neue Umgebung, lernten in mir nicht ihren „Kerkermeister", sondern ihren sie liebenden Pfleger kennen und wurden nach und nach sehr zutraulich. Stets waren sie in Bewegung, durchkrochen alle Winkel des Flugraums, kletterten in den dünnsten schaukelnden Zweigen umher, ließen mich ziemlich nahe herankommen, badeten sehr häufig in dem großen Badenapf und ordneten dann am Fenster im hellen Sonnenschein ihr klatschnasses Gefieder. Auch der Kleiber badete häufig und sah dann fast schwarzgrau aus. Bald hatte er aber mit dem Schnabel alle Federn sorgsam zurechtgelegt, schwirrte mit den hübschen Flügeln und spazierte von neuem ruckweise kopfunter und kopfüber an der Kiefernborke herum.

Als ich eines Tages einen zweiten Kleiber in das Zimmer setzte, in der Hoffnung, daß sich die Vögel vertragen würden, stürmte mein Kleiber auf seinen neuen Artgenossen sofort los, so daß sich letzterer ängstlich verkroch und erst nach Stunden zaghaft wieder zum Vorschein kam. Es half nichts, ich mußte den zweiten Kleiber, ein gleichfalls wunderschönes Exemplar, in einen besonderen Käfig setzen, er wurde von seinem „Kollegen" einfach nicht geduldet. Die Meisen kümmerten sich dagegen um den Neuling nicht im geringsten. Dagegen nahmen sie ein nach kurzer Zeit gleichfalls neu erhaltenes Kohlmeisenweibchen keineswegs freundlich auf. Sie verfolgten es auf Schritt und Tritt, bissen es und stellten ihm fortwährend nach. Es blieb mir weiter nichts übrig, als jenes bedrängte Weibchen, das übrigens einen Ring der Vogelwarte Rositten trug, von seinen lieblosen Kameraden zu trennen. Beide „verstoßenen" Vögel schenkte ich meinem Bruder.

Nach wenigen Tagen erhielt ich zwei allerliebste Sumpfmeisen. Auch sie setzte ich in den Flugraum, wo sie ohne weiteres geduldet wurden. Sonderbar!

Meine Freude an den zierlichen kleinen Sumpfmeisen dauerte aber nicht lange, sie entdeckten sehr bald ein kleines Loch in der Gaze und waren plötzlich verschwunden. So behielt ich also nur noch das Kohlmeisenpärchen, den Dompfaffen und den Kleiber. Tagtäglich schaute ich den liebgewonnenen Tierchen zu,

Eisvogel.

erfreute mich an ihrem munteren, kecken, dreisten, lebensfrohen Wesen und hegte und pflegte sie mit großer Sorgfalt und Liebe. Mit meinen zuvor gekäfigten Weichfutterfressern: zwei Rotkehlchen und einer Singdrossel, hatte ich wenig Glück gehabt — sie waren mir eingegangen —, doch diese Vögel bereiten mir dagegen so manche frohe Stunde, ich gewann sie lieb, war sehr oft in ihrer unmittelbaren Nähe, fütterte sie mit größter Freude und hing mit ganzer Seele an meinen Schutzbefohlenen. Wenngleich auch keiner von ihnen zu den „Sängerfürsten" zählte, ein blankes, frohes, dankbares, kluges Auge hatten sie doch und ein herzgewinnendes liebes, zutrauliches Wesen.

Ein arger Räuber!

Von Vincenz Sommer, Münster i. W.

(Schluß.) (Nachdruck verboten.)

Augenblicklich ordnet der Vogel sein lockeres Gefieder. Da, wo er nicht mit dem Schnabel hinreichen kann, muß die Mittelzehe helfen. Der Nagel der Mittelzehe ist gezähnt, so daß er wunderschön auf diese Weise das Gefieder ordnen kann. Ganz besondere Freude macht es ihm, die langen Schmuckfedern am Nacken, Unterhals und Rücken zu ordnen. Einzeln glättet er sie und legt diese dann schön an ihre Stellen. Ordentlich stolz ist er auf seine Kleidung. Wohlig läßt er seinen Balg von der glühenden Sonne bescheinen. Endlich ist das Männchen mit der ersten Morgenarbeit fertig. Der Magen regt sich, und so beschließt er dann, erst mal diesen zu beruhigen. Langsam und bedächtig schreitet der Hungrige noch einen halben Schritt tiefer hinein in die nassen Fluten. Da steht er nun, ganz ruhig, mit einem hochgezogenen Ständer steif wie ein Pfahl. Die kleinen, stechenden Augen des Reihers bekommen einen lauernden, tückischen Ausdruck. Plötzlich

wird der Kopf bis zur vollen Länge des Halses hervorgestoßen, tief in das Wasser. Der messerscharfe, gezähnte Schnabel faßt einen zweifingerlangen Weißfisch über den Kopf; ein Hochschnellen des Halses, ein Zurückwerfen des Kopfes, und schnabelgerecht verschwindet das Fischchen mit einem Ruck im Kropf des Räubers. Und so geht es einem zweiten und einem dritten. Auch eine halbwüchsige Rotfloffe ging den Weg alles Irdischen. Der dicke Grasfrosch, der die Bucht durchpaddelte, sah nicht den Fischreiher, seinen schlimmen Feind, er sah nur inmitten der Bucht eine kleine Insel und in der Nähe derselben, im Wasser, einen grauweißen Pfahl. Noch einmal prüfte er mit seinen großen Glotzaugen die Umgebung, und dann macht sich der Kaltblüter mit einem tadellosen Kopfsprung auf die Beine. Der Arme sieht nicht zwei tückische Augen funkeln, er sieht nur das kleine Inselchen. Plötzlich sieht er, wie sich der Pfahl da vor ihm bewegt und eine fürchterliche Gestalt annimmt. Aber anstatt nun unterzutauchen und sein Heil in schleunigster Flucht zu suchen, streckt der arme Kerl alle Viere auf dem Wasserspiegel von sich, starr vor Schrecken. Da — ein Niedersausen des Schnabels, und an einem Hinterbein festgehalten wird der Frosch in die Höhe geschnellt. In Todesangst glotzen die hervorstehenden Quellangen und dann — ist alles vorbei. Heftig würgt und schluckt der Raubfischer die schlüpfrige kalte Beute herunter. So steht er noch lange Zeit bis zu den Oberschenkeln im Wasser, bis der alte Herr plötzlich seinen Rheumatismus wieder spürt. Langsam und bedächtig, vorsichtig die Beine hochhebend, stolziert der Reiher zu der kleinen Sandbank. Eine Zeitlang läßt er seine Ständer im warmen Sande von der heißen Sonne bescheinen. Da fällt ihm plötzlich ein, daß er schon drei Tage lang nicht mehr das Röhricht revidiert hat. Hier im Rohr wimmelt es von allerlei Getier, von Schnecken, Egeln, Libellen- und Schwimmkäferlarven, Köcherwürmern, Bachflohkrepsen und Ruderwanzen; auch Elritzen und Stichlinge huschen hin und her. Aber das ist nichts für den Reiher. Da plumpst es neben ihm im Wasser. Eine hitzige Jagd beginnt. Hin und her folgt mit dem Schnabel der Räuber. Schließlich rettet sich die Wasserspitzmaus in das Wasser, taucht darin unter und läuft einen Augenblick auf dem Boden, durch all die faulenden Pflanzenreste, entlang. Aber auch hier folgt das Tier mit der Mordwaffe; ein einziges zielsicheres Niedersausen, und die Maus ist verschlungen. Langsam stolziert er weiter. Auch die vier Jungen des Teichrohrsängers, die in ihrem tiefen Nest so wohlig lagen, müssen daran glauben. Unter dem mörderischen Zeterschrei der Alten werden sie verschlungen. Plötzlich wird der Reiher mißtrauisch. Knackte es da nicht im Walde und raschelte es jetzt nicht im Schilfe? Jedenfalls kann Vorsicht nicht schaden. Rumpf, Hals und Kopf senkrecht in die Höhe streckend, sucht er ein lebloses Stück Holz, einen Pfahl oder einen Ast vorzutäuschen. Lange steht der Räuber so, aufmerksam äugt er umher. Aber nichts regt sich. Im Rohr raschelt und rauscht der Wind. Trotzdem kann der Reiher einer gewissen Unruhe nicht Herr werden; unruhig stellt er sich von einem Ständer auf den anderen. Mit ein paar weit ausholenden Schritten stolziert er zu dem kleinen Inselchen, um von da aus die Bucht und den Fluß zu überblicken. Da sieht er plötzlich wieder die verdächtige Bewegung im Rohr, hört das Rascheln im Schilf, und da wird es ihm unheimlich. Mit einigen unbeholfenen Sprüngen torkelt er hoch; aber schon bald hat er das Gleichgewicht und schraubt sich leicht in die Höhe. Aber zu spät! Ein Schuß, dem sofort der Knall folgt, durchdröhnt die Luft. Getroffen, mit durchschossenen Ständern, gelähmten Flügeln stürzt der Reiher zu Boden. Plump fällt er in einem Weidengebüsch auf, mit gebrochenen Ständern bleibt er liegen. Rot sickert das warme Blut aus den Flügeln, tropft zur Erde und bleibt als rote Rubine im Moos liegen. In ohnmächtiger Wut, rasend vor Schmerz beißt das angeschossene todwunde Tier nach Steinen und Hölzern. Da — ein fernes Rascheln, ein Rauschen in der Nähe, und im selben Augenblick starren ein Paar Hundeaugen auf den Fischräuber. Ein wütendes blutgieriges Bellen, und der Hund will den weidwunden Vogel zuschanden beißen. Aber mit der letzten Kraft wehrt sich das Tier. Ein wohlgezielter Stoß trifft den Hund über dem Auge; das Blut strömt sogleich heftig hervor und hemmt das Sehvermögen. Ein zweiter Stoß trifft das Maul. Jaulend springt der Hund zurück, um aus sicherer Entfernung den todwunden gefährlichen Feind anzubellen. Mühsam versucht das alte Männchen hochzukommen, aber die Ständer versagen den Dienst, die Fittiche hängen kraftlos hernieder. Da ertönt aus nächster Nähe ein neuer Schuß — und langsam sinkt der Kopf des Reihers zu Boden, ein einziger Tropfen Blut steht auf seiner Hirnschale. Ein letztes Zucken, ein Schlagen mit den Beinstümpfen — und dann ist es zu Ende. — Nur mühsam kann der Hund davon abgehalten werden, den weißscheckigen Raubfischer zu zerreißen.

Kleine Mitteilungen.

Ein mir als guter Ornithologe und zuverlässiger Beobachter bekannter Herr erzählte mir, daß er vor einigen Tagen am Plauer See in Mecklenburg folgendes merkwürdige Erlebnis gehabt habe. Er sah von weitem einem Angler zu, der unbeweglich am Ufer saß und seine Angelrute übers Wasser hielt, als plötzlich ein **Eisvogel** herangeflogen kam und sich auf die Angelrute setzte. So überrascht der Angler war, er ließ sich nicht aus der Fassung bringen, griff zu und „hatte ihm". Mein Gewährsmann eilte hin und bekam den Vogel, der dem Angler ganz unbekannt war, ausgeliefert und ließ dann das Tierchen, nachdem er den Fänger darüber belehrt, wieder in die Freiheit fliegen. Er meint, der Vogel habe auf ihn durchaus nicht etwa den Eindruck eines kranken Vogels gemacht! Gewiß ein eigentümlicher Fang! Pastor Groß, Sakro.

Vom Vogelmarkt.

Von seltener auf den Vogelmarkt kommenden Vögeln werden angeboten:

Max Kleinert, Berlin NO, Strausberger Str. 13: Große weiße Gelbhauben-, Molukkenkakadus, Kaktus-, Katharina-, Elfenbein-, Goldstirnsittiche, rot- und schwarzköpf. Gould-, Spitzschwanzamandinen, Masken-, ♂ Orangeblau-, Papst-, Indigofinken, Schama-, amerik. Spottdrosseln, Goldstirnblattvögel, Rotohrbülbüls, rote Araras, Purpurtangaren, Glockenvögel, Blauspötter, mexik. Zeisige, rote Kardinäle.

B. Matern, Lötzen (Ostpr.): Weiße, isabellfarb. u. Goldkanar.

Mertes, Mainz, Wallaustr. 62: Feuerflügelsittiche.

Fritz Müller, Grohn-Vegesack, Auf dem Berge 87: Gelblingamazone, Alexandersittich.

Bernd Regge, Lötzen (Ostpr.): 3 weiße diesj. Kanarien.

Rudolf Schmidt, Weinsheim b. Worms a. Rh., Postweg 17: Junge Mönchssittiche, in der Freivoliere gezüchtet.

Off. unter C. B. a. d. „Ges. Welt": Schneeweiße Farbenkanar.

(Fortsetzung auf der 3. Umschlagseite.)

Aus den Vereinen.

Verein Vogelschutz und -pflege zu Dresden. Versammlung jeden Donnerstag, abends 8 Uhr, im Vereinslokal, „Schillers Restaurant", Ecke Stifts- und Ehrlichstraße. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen.

Bernhard Kühn, Vorsitzender.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei zu Hamburg. Sitzungen finden statt jeden 1. und 3. Dienstag im Monat in Hüttmanns Hotel, Poolstr. 22, abends 8¼ Uhr. Nächste Sitzung Dienstag, den 2. September 1924.

J. A.: Arnold Weber, 1. Vorsitzender.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig. Vereinssitzungen jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat im Vereinslokal, „Bauers Brauereirestaurant", Täubchenweg. Nächste Sitzungen den 21. August und Donnerstag, den 4. September. Gäste stets willkommen.

J. A.: Johann Birk, 1. Vorsitzender.

Verein der Vogelfreunde Leipzig-Plagwitz. Vereinslokal: „Gosenschlößchen", Leipzig-Plagwitz. Sitzungen an jedem 1. und 3. Montag des Monats, abends 8 Uhr. Vogelfreunde sind stets willkommen.

J. A.: Karl Scholtissek, 1. Vorsitzender, Leipzig-Plagwitz, Lauchstädter Straße 30.

Verein der Vogelliebhaber zu Lübeck (Ziervogelverein). Versammlung am Montag, den 4. August 1924. Tagesordnung: 1. Verlesen des Protokolls; 2. Bericht über den Verbandstag am Sonnabend, den 20. Juli, in Harburg; 3. Bestellung der Zuchtringe für das Zuchtjahr 1923; 4. Ausstellungsangelegenheit; 5. Verschiedenes. Um 8½ Uhr eröffnete der erste Vorsitzende die Versammlung. Herr A. Steinhagen berichtete dann über den Verlauf und die Beschlüsse des Verbandstages. Das Protokoll der letzten Versammlung wurde verlesen und genehmigt. Für das kommende Zuchtjahr sollen 800 Kanarienfußringe beim Verband bestellt werden. Zu Punkt 4 wurde festgelegt, daß künftig nur Preise vergeben werden sollen, die bis zur Prämiierung im Besitze des Vereins sind. Von den drei Verbandsmedaillen, die der Verein zur Ausstellung bekommt, sollen zwei in der Selbstzuchtklasse und eine in der allgemeinen Klasse zur Verteilung gelangen. Für Reiseunkosten wurden Herrn A. Steinhagen 6 M. vergütet. Hierauf sprach der Vorsitzende den Herren A. Steinhagen und Bösel den Dank des Vereins aus für die Vertretung seiner Interessen auf dem Verbandstage. Ein Brief der Vereinigung der Vogelliebhaber Landesverband Preußen wurde verlesen und um 10 Uhr wurde die von 12 Mitgliedern besuchte Versammlung geschlossen. In der Sammelbüchse befanden sich 2,05 M.

Hermann Bösel, Schriftführer.

Verein der Vogelliebhaber zu Mannheim. Versammlungen finden alle 14 Tage Samstag abend 8 Uhr im Vereinslokal „Restauration z. gold. Falken" statt. S. 1. 17. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen.

Johann Daubmann, 2. Schriftführer.

Herrn Stadtarchitekt P., Düsseldorf. ♀ bl. Wellensittich ist infolge von Darmentzüngung eingegangen. Ich halte es für etwa einjährig, der Vogel war sehr schwächlich.

Herrn K. B. in E. Der Vogel war das gemeine Rotschwänzchen, und zwar ein Weibchen. Er ist infolge von Darmentzündung eingegangen.

Von folgenden **Farbentafeln** der **„Gefiederten Welt"** sind noch einige Exemplare vorrätig, welche wir, solange der geringe Vorrat reicht, zum Preise von **1 G.-M. für die Tafel** zuzügl. **20 G.-Pf.** Porto u. Verpackung **für jede Sendung** bei vorheriger Einsendung des Betrages auf unser Postscheckkonto **Magdeburg 3148** abgeben.

1898 Tafel III: Schwarzspecht. (Schwarzdrucktafel.)
1899 Tafel IV: Nest des Gartenrotschwänzchens mit Weibchen, Jungem und Ei. (Schwarzdruck.)
1900 Tafel I: Madagaskar-, Napoleons-, dottergelber, Samt-, Blutschnabelweber.
1900 Tafel II: Kl. Alexander-, Bunt-, Wellensittich, Rosenpapagei, kl. Gelbhaubenkakadu.
1900 Tafel III: Sonnenvogel, blauer Hüttensänger, Rosenstar, Schamadrossel, weißohriger Bülbül.
1900 Tafel IV: Paradieswitwe, Mozambikzeisig, Grauer Kardinal, Safranfink, Papstfink.
1901 Tafel III: Kleinspecht, Kleiber, Wendehals.
1902 Tafel I Kohl-, Schwanz-, Hauben-, Tannenmeise.
1902 Tafel II: Goldammer, Baumpieper, Feldlerche.
1902 Tafel IV: Diamant-, weißbäckige Gürtel-, Masken-, Gürtelamandine.
1903 Tafel I: Hausrotschwanz, Sprosser, Nachtigall, Rotkehlchen.
1903 Tafel II: Bluthänfling, Grünling, Kernbeißer, Buchfink.
1903 Tafel III: Miftel-, Wacholder-, Wein-, Singdrossel.
1903 Tafel IV: Zwergstrandläufer, Wachtel, weißflüglige Seeschwalbe, Sandregenpfeifer.
1904 Tafel I: Zaun-, Garten-, Dorn-, Mönchgrasmücke.
1904 Tafel II: Schneefink, Steindrossel, Alpenbraunelle, Steinsperling.
1904 Tafel III: Binden-, Kiefern-, Fichtenkreuzschnabel.
1904 Tafel IV: Bartmeise, Rohrammer, weiße Bachstelze, Sumpfrohrsänger.
1905 Tafel I: Schwarzbürzel-, Spitzschwanzbronzemännchen, weißes, gelbbuntes, braunbuntes jap. Möwchen.
1905 Tafel II: Grau-, Orange-, Erz- und Schmuckpfäffchen.
1905 Tafel IV: Schwarzkehl-, Dreifarben-, Weißkopf- u. Schwarzkopfnonne.
1906 Tafel II: Lein-, Erlenzeisig, Berghänfling, Stieglitz.
1906 Tafel III: Stein-, braunkehliger und schwarzkehliger Wiesenschmätzer.
1907 Tafel II: Weißsterniges, rotsterniges, Wolffsches Blaukehlchen, Blaukehlchen ♀.
1907 Tafel III: Kleines, Zwerg-, Glanz-, Riesen-, rotrückiges und Gitterflügel-Elsterchen.
1907 Tafel IV: Karmin- und Hakengimpel, Gimpel.
1908 Tafel II: Braunrückengold- ♂ ♀, Schwarzkopf- und Goldsperling ♂ ♀.
1908 Tafel IV: Pünktchenastrild, Amarant ♂ ♀, dunkelroter Astrild, Tigerfink ♂ ♀.
1909 Tafel I: Orangegesichtiger Unzertrennlicher, Rosenpapagei, Rußköpfchen, Tarantinischer Unzertrennlicher, Grauköpfchen.
1909 Tafel II: Klarinetten- u. Mennigvogel, braunkehliger Blauschnäpper.
1909 Tafel III: Schwarzbäckchen-, Elfen-, Bunt- und Granatastrild, gemalter Astrild.
1909 Tafel IV: Orange-, Rotkopf-, Blutschnabel-, Napoleons- und Madagaskarweber.
1910 Tafel I: Grauer, Trauer-, Halsband-, Zwergfliegenschnäpper.
1910 Tafel IV: Zipp-, Garten-, Zaun-, Kappenammer.
1911 Tafel I: Rotrücken-, Raub-, Schwarzstirn-, Rotkopfwürger.
1911 Tafel II: Zeresastrild, Malabarfasänchen, Muskatfink, Silberschnäbelchen.
1911 Tafel III: Gartensänger, Fitislaub-, Weidenlaub- u. Waldlaubvogel.
1911 Tafel IV: Goldköpfiges ♂ ♀, feuerköpfiges Goldhähnchen, Zaunkönig.
1912 Tafel II: Wieners, Aurora-, Tropfen-, Wachtel- und Rebhuhnastrild.
1912 Tafel III: Magellan-, Kapuzen-, mexikanischer, Yarells und Trauerzeisig.
1912 Tafel IV: Dorn-, Sonnen- Binsen- und Gitterflügelastrild, Zebrafink.
1913 Tafel II: Violettblauer u. Rotbauchorganist, Purpur-, Dreifarben- und schwarzblaue Tangare.
1913 Tafel III: Paradies-, Dominikaner-, Königs-, Fischers, Rotscheitel- und Gelbrückenwidafink.
1913 Tafel IV: Goldschulter-, Fein-, Sing-, Browns Singsittich.
1914 Tafel I: Schwarzkopf-, Rosenbrust- u. mexik. Gelbkernbeißer, dunkelblauer Bischof, roter Kardinal.
1914 Tafel III: Diuka-, Grau-, Kron- u. Morgenammerfink, Graukardinal.
1914 Tafel IV: Pikui-, Kap-, Diamant-, Tamborin- u. Friedenstäubchen, chinesische Zwergwachtel.
1915 Tafel I: Sammetköpfchen, Sperber-, Orpheus- und Bartgrasmücke.
1915 Tafel III: Diamantfink-, Masken-, Weißwangen- und Spitzschwanzamandine, Gürtelgrasfink.
1915 Tafel IV: Star, Pirol, Rosenstar.
1920 Tafel I: Nandy-, Jendaja-, Guajakil- und Goldstirnsittich.
1920 Tafel II: Schuppenköpfchen, Schnurrbärtchen, dottergelber, Zwergmasken- und Textorweber.
1920 Tafel III: Tui-, Ziegen-, Mönch-, Tuipara- u. Katharinasittich.
1920 Tafel IV: Reisfink, weißer Reisfink.
1921 Tafel I: Gelber Wellensittich und Wellensittich.
1921 Tafel II: Kleiner Gelbhaubenkakadu.
1921 Tafel III: Kleiner Alexandersittich.
1921 Tafel IV: Domingo-, Cuba- und Rotbugamazone.

Da die Nachfrage nach Farbentafeln sehr groß ist, bitten wir sofort zu bestellen.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg / Postschließfach 148

Anzeigenteil

Die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 20 G.-Pf. berechnet. Aufnahme erfolgt gegen Voreinsendung des Betrages in Reichsgeld per Brief od. auf unseren Zahlstellen: Postscheckkonto: Magdeburg 3148, Wien 156 687, Bern III 4326, Prag: Creditanstalt d. Deutschen unter Angabe des Zweckes.

Käfige u. Gerätschaften

Gimpelbauer

mit Drahtstäben 17½ cm lang, 17 cm hoch, 13 cm breit pro Dtzd. 14 ℳ; fertige alle Sorten Käfige und Utensilien für Kanarien an. [621

A. Janson, Barbis a. H.

Vogel-Fangkäfige 2.50 und 4.50 ℳ, Schlagnetze f. kl. schädl. Vögel 1.00 ℳ, f. größ. 2.10 u. 2.40 ℳ. Katalog gratis. **J. Tannen**, Gronau 58 (Westf.). [622

Suche zu kaufen:

Wiener 2-Sprung-Kistenkäfige, Größe 28×15×20 cm. [623

O. Pensler, Erfurt, Nerlystr. 5 III.

Futtermittel

Vogelfutter [624

für Kanarien, Waldvögel, Exoten, Papageien, Weichfresser. Anerkannt bewährteste Mischungen auf Grund langjähriger Erfahrung. Liste 13 über Vogelfutter, Liste 5 über Vogelkäfige, Zuchtgeräte usw. mit etwa 400 Abbildungen.

W. Göpel, Leipzig,

Tröndlinring 1. Telephon 14958.

Bei Anfragen bitte auf die „Gefiederte Welt" Bezug zu nehmen.

Mehlwürmer

geg. Einsend. v. 2.— Rentenmark ¼ Pfd. franko versend. **D. Waschinski & Co.**, Biesenthal I (Mark). [625

Mehlwürmer neue, feinste Qualität, Pfd. 8 ℳ

626] **Jeitner, Breslau**, Weinstr. 12.

Getrocknete deutsche

Laubwald-Ameiseneier

(Ernte 1924) per Liter 2 G.-M. empfiehlt in altbekannter Güte [627

Fr. G. Müller, Berlin SW 61, Blücherstraße 61.

Preisliste auf Wunsch!

Selbstgetrocknete

Ameiseneier

à Liter 2 ℳ, bei Einsendung von 10 ℳ 5 Liter franko. **R. Seyfert**, Magdeburg, Lödischehofstraße 3. [628

Empfehle:

Echt engl. Farbenfutter

zur Anfütterung leuchtend hochgelber bis orange Farben, ½ kg 10 ℳ.

Heydenreichs Harzer Heilmittel gegen Rotleibigkeit, Freßsucht u. sonstige Magen- u. Darmkrankheiten aller Vögel, einfache praktische Anwendung, keine Futter- u. Wasserquacksalberei, 1000fach im Gebrauch, 2.50 ℳ.

Prima Kanarienhähne und Weibchen meines tiefen, vielseitigen durchgezüchteten Stammes. Ia Zuchtpärchen (1,1) reingelb 10 ℳ. Porto und Verpackung 4 ℳ.

Richard Heydenreich

629] **Bad Suderode, Harz**

Harzer Kanarien-Feinzucht Staatspreis, viele gold. Med.

Vögel

Suche Steinrötel, Alpenlerche, Alpenbraunelle zu kaufen. Gefl. Angeb. mit Preis an **Quaiser, Reichenberg** (Böhmen), Herrengasse, erbeten. [630

Offeriere in einwandfreien erstklassigen Exemplaren sofort lieferbar:

Graupapageien	Stück	95.— ℳ
Blaustirnamazonen	„	45.— „
Große weiße Gelbhaubenkakadus	Stück	58.— „
Molukken-Kakadus	„	275.— „
Kakus-Sittiche	Paar	13.— „
Wellensittiche, grüne	„	15.— „
Wellensittiche, gelbe	„	16.— „
Gouldsamandinen, rot- u. schwarzköpfige	„	50.— „
Spitzschwanzamandinen	„	50.— „
Maskenfinken	„	50.— „
Orangeblaufinken, ♂	Stück	30.— „
Jap. Möwchen, weißbraun	Paar	20.— „
Goldbrüstchen	„	6.— „
Orangebäckchen	„	3.50 „
Granastrilden	„	3.50 „
Reisfinken	„	5.50 „
Schwarzkopfnonnen	„	3.75 „
Schamadrosseln, Mch.	Stück	70.— „
„ Wbch.	„	60.— „
Amerik. Spottdrosseln, garant. Zuchtpaar	„	70.— „
Goldstirnblattvögel	„	45.— „
Rotohrbülbüls	„	15.— „
Purpurtangaren	Paar	25.— „
Glockenvögel	Stück	75.— „
Blauspötter	„	48.— „

Auf Mitte August eintreffende Vögel nehme Vorausbestellungen entgegen:

Rote Araras	Stück	160.— ℳ
Katharinasittiche	Paar	45.— „
Elfenbeinsittiche	„	45.— „
Goldstirnsittiche	„	18.— „
Papstfinken	„	35.— „
Indigofinken	„	35.— „
Mexikanische Zeisige	„	45.— „
Rote Kardinäle	Stück	28.— „

Tierhandlung

Max Kleinert

Berlin NO. 18, Strausberger Str. 13, Fernruf Alexander 3313. [631

Grüne

Wellensittiche,

in Freivoliere gezüchtet u. von blutsfr. Eltern (import.), ausgefärbte Weibch. pro Stck. 10 ℳ, do. Männch. pro Stck. 8 ℳ. Unausgefärbte Jungtiere pro Paar 16 ℳ. Porto und Verpackung Selbstkostenpreis.

Richard Huth, Perleberg. [632

1,1 sibir. Seidenschwänze

ganz zahm, 16 ℳ. [633

Suche Amandinen.

Baron, Kynau (Schlesien).

Verkaufe: 1,1 Möwchen 15 ℳ, 1,1 Isabell-Fuchs-Kanarien 15 ℳ, 1,0 Zebrafink 8 ℳ, 1,0 Hauben-Kanarie 10 ℳ. **A. Steinhagen**, Lübeck, Brandenb.-Landstr. 161. [634

Chin. Nachtigallen . . Stck. 12 ℳ
Amaranten . . . . . Paar 4 ℳ
Astrilden . . . . . „ 4 ℳ
Orangebäckchen . . . „ 4 ℳ
Elsterchen . . . . . „ 5 ℳ
Paradieswitwen, in Pracht kommend . . . . . „ 6 ℳ
Dominikanerwitwen . . 6 ℳ
Goldbrüstchen . . . . 6 ℳ
Rotschwänze . . . . . 5 ℳ
Weißstirnpfäffchen . . „ 10 ℳ
1,0 Jakarinifink . . . 7 ℳ

E. Schöndube, Berlin

635] **Elisabethkirchstr. 1.**

Achtung!

Ab 15. September große Posten Waldvögel ständig lieferbar: [636

Zeisige, Girlitze, Stieglitze, Rothänflinge, Rote Dompfaffen, Kreuzschnäbel, Schwarzblattel usw., prima Vogelleim ständig lagernd.

Rudolf Passian,

Reckziegels Nachfolger,

Zier- und Singvogelhandlung,

Dönis bei Grottau in Böhm.

Verkaufe

Edelkanarien 1924!

Schneeweißer Hahn 60 ℳ, schneeweißhermelin gezeichnete 50 ℳ. Tausche auch diesjährige Zuchtpaare, gelbe, satinfarbige oder blaublütige Wellensittiche oder Goldfasanen-Hennen. [637

Graf Centrum, Nippenburg, Post Schwieberdingen, Württemberg.

Schneeweiße Kanarien

verkauft [638

C. Balfer, Fulda, Zickengarten.

Wellensittich,

jung, sehr zahm, frei auf dem Finger sitzend, 15 ℳ (junge zahme Wellensitt. lernen leicht sprechen). **Nistkästen** für Wellensittiche und andere Höhlenbrüter Stck. 1.50 ℳ. Frau Klara Neugebauer, Steinau a. d. Oder. [639

Gebe ab: 1,1 grüne Wellensittiche (1923 er), 1,1 Schönbürzelchen sowie je 0,1 Amarant, Atlasfink und Kanarie. Alles Ia im Gefieder. **Paul Beling**, Rudolstadt i. Thür., Roonstraße 9 I. [640

Großabnehmer

ab 1. Oktober 1924 für

Zeisige, Stieglitze, Hänflinge, rote und blaue Gimpel, Kreuzschnäbel sowie alle Arten Waldvögel in größeren Partien wird gesucht.

Vögel werd. franko dort gebracht.

Freundliche Angebote zur Anknüpfung von Verbindungen wolle man unter „Reelles Geschäft" an die Geschäftsstelle der „Gefiederten Welt" richten. [641

Astrilde

Paar 3 ℳ, Goldbrüstchen, Schmetterlingsfinken, kl. Elsterchen Paar 5 ℳ, hochrote gesunde Amaranten P. 3.50 ℳ, Bandfinken, Silberschnäbel, Atlasfinken, Orange-, Feuer- u. Napoleonsweber Paar 3.50 ℳ, Paradieswitwe in Farbe Paar 8 ℳ, außer Farbe Paar 3.80 ℳ, Atlasfinken in Farbe Paar 6 ℳ, Dominikanerwitwe i. Farbe Paar 10 ℳ, Blutschnabelweber i. Farbe Paar 5 ℳ, Dottergelbe Weber P. 3.60 ℳ, Maskenweber in Farbe Paar 10 ℳ, Edelsänger u. Mossambikzeisig P. 10 ℳ, gemischt nach meiner Wahl 25 P. 80 ℳ, 50 Paar 140 ℳ, 100 Paar 250 ℳ, blaue Reisfinken Paar 10 ℳ, Wellensittiche Paar 25 ℳ, Mönchsittiche Paar 20 ℳ, Kanarienhähne, jung abgestempelt, Stck. 8 ℳ, 12 Stck. 85 ℳ, 24 Stck. 150 ℳ, Stieglitz×Zeisig-Bastarde Stck. 15 ℳ, Graupapagei, viel sprechend, 300 ℳ, Gelbkopfamazone, sprechend, 100 ℳ, Elstern zahm Stck. 8 ℳ, Raben, Dohlen Stück 6 ℳ, Lachtauben Paar 10 ℳ, 6 Paar 50 ℳ, 1,2 Alpensteinhühner prima zus. 120 ℳ, Mohren- u. Rosuaffen, an Stange u. Kette gewöhnt, ohne Fehler Stück 100 ℳ, Javaaffen Stück 70 ℳ, weiße Mäuse Paar 1.50 ℳ, 50 P. 50 ℳ, Siebenschläfer P. 12 ℳ, Baumschläfer Paar 14 ℳ, alles sichtbar verpackt. Garantie für gute Ankunft.

Beck, Tierimport,

Stuttgart. [64

Sofort abzugeben:

8 junge prima Wellensittiche bester Abstammung, etwa 3 Monate alt, einzeln 6 ℳ ausschließlich, zusammen 50 ℳ einschl. Porto. Verpack. einsen[d] **Dr. Stoltze**, Böblingen (Württbg.), Waldburgstr. 36. A. Z.-Mtgl. 237. [64

Gebe ab:

„Gefiederte Welt" Jahrgang 193[0] 1911 gebunden, 1911, 1914, 1919, 192[0] 1921, 1922 und 1923 ungebunden, gege[n] Gebot. Nehme in Tausch Ia Sänge[r] oder gut erhaltenen Weichfresserkäfi[g] **H. Beißner**, Düsseldorf, Bilkerallee 129. [64

Suche

ein gutes **zweisitziges Motorrad**. Gebe **Kanarien** und **Exoten** dafü[r] und zahle ev. noch zu. [6[4]

Syré, Lehrer, Biernau i. Thür.

Beschwerden wege[n] Nichtzustellung der „Ge[-] fiederten Welt" sind bei[m] zuständigen Postamt an[-] zubringen.

Inserate

für das am 28. August 1924 zur Au[s]gabe gelangende Heft 28 der G[e]fiederten Welt erbitten bis 23. Aug. 1924 frü[h]

Bestellungen für September sofort der Post übergeben!

Bestellzettel für Deutschland.

Postbestellzettel.

Hiermit bestelle ich für den Monat September 1924

1 „Die Gefiederte Welt"

(eventuell mit Nachlieferung). — Erscheinungsort Burg Bz. Mgdb.

Name: .....

Wohnung: .....

Postquittung: ..... Mk. ..... Pf. sind heute bezahlt worden.

Ort: ..... den .....

Postannahme

.....

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Berlin-Hermsdorf; für den Anzeigenteil: Rolf Kretschmann, Magdeburg, Postschließfach 148. Verlag der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck: August Hopfer, Burg Bz. Mgdbg.

Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Jahrg. 53 | Den 28. August 1924 | Heft 28

(Druckort: Burg, Bezirk Magdeburg.)

Zur Frage der Weichfresserfütterung.

Von Heinrich Groebel.

(Ornis-Mitglied Nr. 310.)

(Nachdruck verboten.)

Motto: Was du ererbt von deinen Vätern,
erwirb es, um es zu besitzen.

Vieles ist schon orakelt worden zu obiger Frage. So sei es auch mir als langjährigem Vogelliebhaber und -pfleger erlaubt, zu dieser Frage Stellung zu nehmen. Angeregt dazu wurde ich durch den Artikel des Herrn M. Jacobs in der „Gef. Welt" Nr. 24 d. J.

Ich verpflege stets Nachtigallen, Sprosser, Grasmücken, Gelbspötter, Rotrückenwürger, Rotkehlchen, Heide- und Feldlerche, Zaunkönig, Goldhähnchen und verschiedene Meisen. Augenblicklich bin ich, da ich erst vor kurzem in meine Heimat zurückkehren konnte, im Besitze von 3 Rotrückenwürgern, 2 Nachtigallen, 1 Sprosser, 1 Rotkehlchen, 2 Schwarzplättchen, je 1 Garten- und Sperbergrasmücke, 1 Feld-, 1 Heidelerche, 1 Zaunkönig, 2 Goldhähnchen und 2 Blaumeisen. Alle Vögel mit Ausnahme der fünf letzteren sind in Einzelkäfigen untergebracht.

Ich gehe mit Herrn Jacobs vollkommen zusammen, wenn er die Fütterung das Abc der Vogelhaltung nennt. Aber in allem anderen kann ich ihm nicht folgen. Hätte er einmal das Vorwort zur ersten Auflage von M. Rausch: „Die gefiederten Sängerfürsten" in der zweiten Auflage gelesen, dann hätte er sich sicher die wohlbegründeten Worte gemerkt, daß „viele Vogelliebhaber die Erfahrungen unserer ältesten Praktiker wieder mehr oder weniger durch allerlei Neuheiten, die sie entweder selbst erfinden oder anderen Liebhabern ablauschen, nach Gutdünken zu ändern versuchen, hierdurch aber die Vögel verderben und so ihre eigene Liebhaberei schädigen. Diese Unbeständigkeit aber, dieses fortwährende Haschen und Suchen nach Neuigkeiten bei der Pflege der Vögel ist eben die eigentliche Ursache aller Mißerfolge." Herr Jakobs meint, wer die Fütterung nicht verstehe, soll die Finger von der Vogelliebhaberei lassen; sehr richtig! Ich sage aber noch: „Wer keine Ameisenpuppen hat, lasse die Finger von Weichfressern, denn erstere sind der Grundstock, auf dem sich die ganze Weichfresserfütterung aufbaut."

Meine Fütterung besteht seit langen Jahren im Sommer aus frischen Ameisenpuppen. Im Herbst gehe ich dann langsam zu Mischfutter über, welches ich aus trockenen Ameisenpuppen, Weißwurm, geriebenem Zwieback, Käferschrot, getrockneten schwarzen Waldameisen, gemahlenem Hanf und trockenen Beeren herstelle. Dieses Futtergemisch feuchte ich, solange ich frische rote oder schwarze Holunderbeeren finde, mit diesen an, später nehme ich Möhre. Trockenfütterung halte ich höchstens bei Drosseln für angebracht, doch erhalten dieselben bei mir auch oben beschriebenes Futtergemisch. Rausch empfiehlt in seinen Gef. Sängerfürsten auch nicht die direkte Trockenfütterung fürs Schwarzplättchen, sondern er schreibt (S. 127): „Mischfutter für die Schwarzplättchen soll stets möglichst trocken sein und nicht naß, weil es sonst sehr leicht Darmkatarrh erzeugt und den Vogel verdirbt." Nebenbei bemerkt geht jeder Vogel an nassem Futter zugrunde, selbst die Drossel, was ich heute wieder bei einem jungen Liebhaber feststellen konnte. Rausch wollte nach meiner Ansicht damit folgendes sagen: „Das Futter soll, wenn es angefeuchtet ist, so beschaffen sein, das es aussieht, als wären die ganzen Bestandteile frisch wie im Sommer, also, die ganze Feuchtigkeit muß in die Futterbestandteile übergehen, so daß diese nicht feucht, sondern frisch scheinen. Gerade darin, daß die Futterzubereitung nur in der Praxis erlernt werden kann, liegt für die meisten Liebhaber und Auchliebhaber der Fehler. Sie denken, man brauche nur das Mischfutter naß zu machen, ähnlich wie man Kartoffelsalat mit Essig und Öl anmacht, und es sei fertig. Nein, nein! Ich bereite mein Futter abends zu; jetzt ist es auch nicht naß, sondern kaum feucht zu nennen. Dasselbe drücke ich dann in einer Ecke des Napfes fest zusammen und lasse es bis zum Morgen kühl stehen. Wird es nun aufgelockert, dann erscheint es wie frisch, von Feuchtigkeit ist keine Spur vorhanden. Diese Fingerfertigkeit, wenn ich so sagen soll, will jedoch erlernt sein. Das Anfeuchten mit Wasser ist nicht gut, da es zu schnell verdunstet und die Futterbestandteile hart werden. Die Zubereitung des rheinischen Nachtigallenfutters mit gutem Baumöl ist auch lange überlebt. In Ruß: „Einheimische Stubenvögel" heißt es darüber: „Zubereitung des

Futters mit anderen Bindemitteln als geriebener Möhre oder im Herbst mit zerdrückten Holunderbeeren (nach Dr. Otto) sind nicht zu empfehlen, da besonders Öle und Fette das Ranzigwerden des Futters bedingen." Ich füge dem Mischfutter auch ein über den andern Tag eine Prise vegetabilisches Nährsalz von Dr. Lahmann hinzu, da ich von seiner vorzüglichen Wirkung auf den Ernährungszustand des Vogels überzeugt bin. Ameisenpuppen durch Garnelenschrot oder Fischmehl zu ersetzen, habe ich probiert oder auch nicht, denn ich bezog vor Jahren von Pfannschmidt in Emden selbiges. Nach acht Tagen jedoch verschenkte ich den ganzen Rest eines Postkollis an einen Geflügelzüchter, da ich den Gestank, der durch dieses Futter entstand, nicht aushalten konnte. Soviel ich auch in diesen acht Tagen feststellen konnte, nahmen die Vögel dasselbe nur mit Widerwillen an, und der Gesang ließ merklich nach. Als Leckerbissen reiche ich Mehlwürmer, Küchenschaben, Spinnen und sonstige Insekten, die ich mit dem Schleppnetz in Wald und Feld erbeute. Früher fütterte ich Ornis-Mischfutter, und dasselbe steht auch noch heute an erster Stelle.

Sämtliche Futtermittel gewinne ich seit einigen Jahren selbst. Rote und schwarze Holunderbeeren trockne ich im Backofen, da ich über keinen Trockenspeicher verfüge und ein Zentner Beeren (getrocknet) nicht wenig ist. Ebenso Ebereschen. Der rote Holunder reift schon im Juli. Man muß, wo er so selten ist wie hier am Rhein, zeitig bei der Hand sein, sonst kommt uns der Schwarzkopf zuvor. Die Weißwurm- oder rheinisch Austfliegenernte (Augustfliegen) findet diesen Monat ihren Anfang und ihr Ende. Zu diesem Zwecke passe ich ganz genau auf, wenn der Weißwurm zu schwärmen beginnt. Sobald er schwärmt, gehe ich gegen Abend auf eine der zahlreichen Moselkribben. Dort wird mit Fackeln oder einigen Schüsseln Teer Feuer angezündet. Durch das Licht werden die Fliegen angelockt, verbrennen sich die Flügel, sammeln sich rundum auf der Erde, werden nachher zusammengekehrt und in einem Sack nach Hause gebracht. Hier werden sie gedörrt, dann ausgebreitet und die Flügel und Beine mit einem Blasebalg hinausgeblasen. Für diesen Fang habe ich in den letzten drei Jahren sieben Nächte geopfert und durchschnittlich im Jahre 47 Pfund trockenen Weißwurm erbeutet. Es gibt aber auch Jahre, in denen die Weißwurmernte sehr knapp ausfällt, was ich für dieses Jahr befürchte, denn der Weißwurm schwärmt nur in windstillen, klaren Nächten.

Meine Ameisenpuppen gewinne ich auf folgende rentable Weise. Den Anfang dazu bildete die Anleitung von Rausch in den „Gef. Sängerfürsten" 2. Auflage, Seite 39, die hier anzuführen Raum und Zeit fehlt. Durch die alljährliche Praxis habe ich diese Anleitung jedoch bedeutend verbessert. Morgens, ehe die Hähne krähen, gehe ich mit einem anderen Liebhaber, hier Strömpper genannt, zusammen los. Die Ameisenhaufen werden vorsichtig geöffnet. Der eine hält einen Leinensack auf, während der andere die Puppen mit Mulm und Ameisen hineinfüllt. Sind die vorgemerkten Haufen abgesucht, dann geht es an eine je nach dem Wetter verabredete Stelle, wo der dritte im Bunde bereits die Leinentücher ausgebreitet hat. Diese Tücher bestehen aus zwei oder drei aneinandergenähten Bettüchern. Die Seiten sind nach innen 30 cm umgelegt. In die vier Ecken ist je ein schwerer Stein gelegt, der die Tücher spannt. Unter den Umschlag ist soviel Laub gelegt wie möglich. In der Mitte liegt wiederum ein Tuch, welches an allen Seiten bis an das Laub heranreicht. Darauf wird der Inhalt der Säcke geleert. Die Ameisen tragen nun ihre Brut unter das Laub. Je mehr Tücher man hat und je dünner die Puppen mit dem Mulm ausgebreitet werden, um so schneller ist man fertig. Sind die Puppen ausgetragen, dann wird das eingelegte Tuch mit dem Mulm fortgenommen, das Laub und die Steine aus dem Umschlag entfernt, das Tuch nun an allen Ecken angefaßt, hochgehoben und die Puppen sammeln sich nun in der Mitte des Tuches, von wo sie in einem Leinensäckchen nach Hause getragen werden. Hier wandern sie sofort in den Backofen und bleiben dort so lange, bis die mitgefangenen Ameisen tot sind, denn jetzt ist auch der Keim in den Puppen tot, die Puppen sind abgeschwelkt. Die Puppen sind jetzt feucht und kleben aneinander, trocknen aber sofort und fallen wieder auseinander, sobald sie an die Luft kommen. Das Abschwelken ist unbedingt nötig, um dieselben haltbar zu machen. Ich warne aber jeden, die Puppen ohne abgeschwelkt der Sonne auszusetzen. Denn hierdurch entwickelt sich der Keim in den Puppen riesig schnell weiter, sie werden grau und laufen schon nach einem Tag aus. Auch ohne abgeschwelkt die Puppen dunkel aufzubewahren, hat mich einmal in Erstaunen versetzt. Ich kam, durch ein Gewitter verspätet, erst abends nach Hause. Der Ofen brannte nicht mehr. Darum wollte ich die Puppen am andern Morgen abschwelken. Ich schüttete sie schon am Abend in den Backofen. Am andern Morgen waren sie alle grau und die Hälfte ausgelaufen. Wenn aber nun viele denken, nach meiner Anleitung sofort ans Werk gehen zu können, dann irren sie, denn dazu gehört vor allem jahrelange praktische Arbeit. Daß meine Arbeit aber auch praktisch und rentabel ist, darüber lasse ich die werten Leser selbst urteilen. Ich habe bis jetzt in diesem Jahre, beginnend mit dem 1. Juni, dem Tage meiner Rückkehr in die Heimat, ungefähr 150 Pfund frische Puppen gesammelt. Darum werden mich viele beneiden. Aber ich glaube, die meisten hätten von einem Tage genug. Denn man muß es sich gefallen lassen, von oben bis unten schwarz von Ameisen zu sein. Gegen ihre Bisse wird man mit der Zeit abgehärtet, ausgenommen bei einigen empfindlichen Stellen am Körper. Meine Hände schälen sich auch schon zum vierten Male für dieses Jahr, und ich bin froh, wenn ich in den nächsten Tagen die Jagd abblasen kann, um mich nun dem Vogelherd zu widmen. Ich glaube, daß manchem Leser beim Wahrnehmen meiner Beute der Ruf „Raubbau" entfährt. Aber das ist nicht der Fall. Die Waldungen, aus denen ich meine Puppen gewinne, erstrecken sich bis 50 km die Mosel, den Rhein und die Lahn entlang. Dieses Revier ist in Bezirke eingeteilt und auf einer Generalstabskarte verzeichnet. Ebenso jeder einzelne Haufen. Nun wird jeder Bezirk frühestens alle drei Jahre besucht. Ist ein Haufen zu niedrig, so daß die Pup-

pen aus dem Wurzelwerk der umstehenden Bäume nur sehr schwer zu erlangen sind, so wird er mittels trockenen Laubes und Tannennadeln künstlich erhöht, was die schwarze Waldameise gerne annimmt. Sie trägt dann ihre Puppen in den erhöhten Haufen und erleichtert uns die Arbeit. Über einen qm große Haufen werden geteilt, da nur ein-, zwei- oder dreijährige Haufen Erfolg versprechen und rentabel bleiben. Auch der Mulm, der nach der Puppengewinnung mit den Ameisen übrigbleibt, wird zu Neuansiedlungen verwandt. Bei dieser Puppengewinnung spielt das Wetter eine große Rolle. So lernte ich dieses Jahr erst, daß sich bei großer Hitze die Ameisen unter dem Laub vor den Sonnenstrahlen schützen und ihre Brut im Stiche lassen. Es waren aber auch 40 ° C in der Sonne. Darum bei großer Hitze in den Schatten. Möglichst viel Laub unter die umgeschlagenen Seiten! Ist es zu wenig, dann tragen die Ameisen ihre Brut aus dem Tuch fort ins Gras oder ein sonstiges Versteck. Man merkt dies gewöhnlich erst, wenn es zu spät ist. Die Ameisenpuppengewinnung des Herrn Jacobs halte ich nicht für schlecht, wenn die Haufen nur klein sind und aus jedem ein oder zwei Hände Puppen einschließlich Mulm zu erbeuten sind. Sollte jedoch einer mehr dabei zu erhoffen wagen, so kann ich ihm schon jetzt abraten, denn sobald die Ameisen nicht mehr genug Schutz ihrer Brut finden, was ja bei einer Zeitung oder Serviette der Fall ist, tragen sie die Puppen weiter fort, bis sie wieder in ihrem Haufen landen.

Doch nun will ich für heute Schluß machen. Über die andere Futtergewinnung später an gleicher Stelle. Sollte jedoch einer der Leser schon jetzt Interesse daran haben, um meine Erfahrungen noch dieses Jahr zu erproben, so bin ich gern bei Anfragen mit Rückporto und einer kleinen Vergütung für Arbeit und Papier zu näherer Auskunft und Belehrung bereit. Auch werde ich dann genaue Skizzen, in Tusche ausgeführt, beifügen. Alle Weichfresserliebhaber bitte ich jedoch, an den Erfahrungen unserer alten Praktiker festzuhalten. Auch verweise ich jeden auf die Artikel des Vorsitzenden des Vereins für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig, Herrn Joh. Birk, in den letzten Zeitungen vor der Inflation, denn ich halte Herrn Birk für einen der gewiegtesten Praktiker der Jetztzeit. Wenn ich nun Schluß mache, so tue ich das in der Hoffnung, manchem Liebhaber, der bis jetzt noch wie ein Rohr im Winde hin- und herschwankte, den rechten Weg in der Weichfresserfütterung gezeigt und so auch manchem Vogel die Gefangenschaft erleichtert und vielleicht auch von dem Tode errettet zu haben.

Aus meiner Vogelstube.

Von Walther Voigt jun., Jena.

(Nachdruck verboten.)

Nicht nur über Zuchterfolge und anderes Erfreuliche aus der Vogelstube soll man in unserer Zeitschrift berichten — ebensoviel Interesse verdienen sicher auch Mißerfolge und sonstiges Pech, das der Vogelliebhaber mit seinen gefiederten Freunden hat. So will ich nun vorwiegend über Unerfreuliches berichten.

Riesenhabia (Text im nächsten Heft).

Schon als Bub wurde ich eifriger Vogelfreund. Was war das auch zu verwundern, wenn man Vater und Großvater als eifrigen Vogelliebhaber sieht und vom Großvater erzählen hört, daß auch dessen Vater stets Vögel käfigte. So entstand auch bei mir der Wunsch, selbst Vögel zu besitzen.

Zum Weihnachtsfeste 1917 schenkte mir mein Vater einen Zeisig und einen Hänfling, von denen der erstere noch heute lebt, letzterer der Freiheit wieder gegeben wurde, da er scheu blieb und sehr wenig sang. Auch ein Rotkehlchen käfigte ich jahrelang.

Im Sommer 1922 machte ich die Bekanntschaft des unter holländischen Vogelliebhabern bestens bekannten Futtermittelfabrikanten U. J. Beume, Groningen, dessen Abbildung seiner Volieren in mir den Wunsch immer lebhafter werden ließ, selbst einen

größeren Flugraum für alle ausländischen Vögel zu schaffen. Genannter Herr stiftete mir als Anfang dazu 1,1 Wellensittich, 1,1 Grauastrild und 1,1 Schmetterlingsfink. Ich errichtete mir in meinem Stübchen eine Zimmervoliere von etwa 2×1×2,50 m, in der sich die Vögel sehr wohlfühlten, da hinreichend Sonne durch die nach Süden und Osten gelegenen Fenster des Eckstübchens kam. Auch weiße Hirse und Glanz rollten über die Grenze, da damals hier in Deutschland nur ganz minderwertiges Zeug zu erhalten war. 1,1 Möwchen und 1,1 Zebrafinken folgten bald, und nun war die Freude groß und die Zucht mußte ja nun eigentlich gelingen! Es kam aber anders, als ich gedacht hatte! Das Wellensittichweibchen legte ein Gelege nach dem anderen, brachte es aber nie zu Jungen, die Möwchen entpuppten sich bald als zwei Männchen, die Zebrafinken bauten ein Nest nach dem anderen, legten dutzendweise Eier, brüteten aber nie! Die Grauastrilde rührten sich überhaupt nicht. Nur die Schmetterlingsfinken bauten zweimal, aber ohne zu brüten, die dritte Brut fiel in den Anfang November, zwei Junge schrien im Nest, Frost, Regen und Schneewetter setzten ein —, vergeblich durchstöberte ich die Wiesen nach Ameisenhaufen, aber nichts war zu finden, und so mußte ich zusehen, wie die schon gut befiederten Jungen eingingen. Ei und gebrühte Ameisenpuppen nahmen die Schmetterlingsfinken nicht zur Aufzucht an. So schloß das erste Jahr mit einem vollen Mißerfolg ab. Von Hamburg hatte ich ein Paar blaubürzelige Sperlingspapageien erhalten, die ich zu den Wellensittichen meines Vaters setzte, und tadellos haben diese sich mit ihnen vertragen. Auch im Winter, als sie einen kleinen Käfig mit unserem alten Zeisig teilen mußten, erwiesen sie sich nie als bissig.

Wenn aber einer der verehrl. Leser glaubt, durch diese Mißerfolge hätte ich, wie so viele junge Anfänger, die Lust und den Mut verloren, irrt er sich gewaltig. Das Gegenteil war der Fall, ich beschloß, meine eigene kleine Stube zu opfern und eine große Zimmervoliere neben der kleinen zu errichten. Da ich das Geschick zu allerlei Handarbeiten besitze (ich fertige mir alle Käfige selbst), war der Plan bald ausgeführt. Mit elektrischem Licht versehen, mit Nistgelegenheiten aller Art ausgestattet, enthält heute das Stübchen, mit je einem Fenster nach Osten und Süden, neben der kleinen Voliere und vier Käfigen an den übrigen Wänden, nunmehr noch die größere Voliere von 2×2,5×2,5 m. Es ist knapp Platz für den Ofen und das Sofa, auf welchem ich zum Teil schlafen muß. Aber schön ist es hier oben und Langeweile gibt es nicht.

Da ich weder rauche noch Bier trinke, opfere ich das Geld, das mancher hierfür ausgibt, zur Anschaffung und Unterhaltung von Vögeln. Und dies habe ich bis heute noch nie bereut!

So ging es gut vorbereitet in das zweite Jahr hinein. Besetzt wurde die große Voliere mit folgenden Vögeln: 1,1 blaub. Sperlingspapageien, 1,1 Grauedelsänger, 1,1 Amaranten, 1,1 Grauastrild, 0,1 Schmetterlingsfink, 1,0 Erlenzeisig, 1,1 Zebrafink, 1,1 kleiner Kubafink.

Im Laufe des Frühjahrs folgten dann noch einige andere hinzu. In die kleine durch Drahtwand getrennte Voliere setzte ich noch ein zweites Paar Zebrafinken sowie kleine Kubafinken, 1,1 Möwchen waren in einem Käfig untergebracht.

Am Südfenster des Zimmers wurde ein Drahtvorbau angebracht (1,30×0,60×0,85 m).

An Futter reichte ich gelbe, bunte und weiße Hirse, Mohn, Spitzsamen und alle Tage gebrühte Ameisenpuppen mit selbstgebackenem Eierbrot, darunter 15—20 Mehlwürmer zerschnitten. Anfang März wurde der „Betrieb" eröffnet. Das Öfchen heizte mollig ein, und alle Vögel fühlten sich außerordentlich wohl. Im Anfang fanden sich besonders Amaranten, Schmetterlingsfink, kleine Kubafinken und Zebrafinken allein an dem Futternapf, der die Mehlwürmermischung enthielt, ein, und gerade diese taten sich besonders gütig daran. Die Folge davon war, daß alle besonders lebhaft wurden infolge des anreizenden Futters. Im Mai setzte dann plötzlich arge Hitze ein, und die Vögel saßen stundenlang in der Prellsonne des Drahtvorbaues. Und nun kam das Unglück: Beide Amaranten, die Morgens noch sehr lebendig in der Voliere herumflogen, lagen mittags tot am Boden. In kurzer Frist folgten ihnen 1,1 Kubafinken, 2,1 Zebrafinken, 1,0 Grauastrild, 0,1 Schmetterlingsfink! Bei vier Vögeln waren wir zugegen, als sie starben: Sie flogen lebhafter als sonst in der Voliere umher, und mitten im Flug stürzten sie tot zu Boden. Ein Zebramännchen war nur bewußtlos, wurde in einen kleinen Käfig gesetzt, wo es jedoch nach zwei Tagen ebenfalls starb, nachdem es fast alle fünf Minuten Krampfanfälle erhielt.

In Abständen von etwa 5—6 Tagen gingen immer noch einige Vögel ein, so daß ich schon daran war, alle einem Händler zu verkaufen, jedoch wenn ich mittags heimkehrte, hatte sich mein Entschluß schon geändert. Lieber meine Lieblinge bei mir sterben lassen, als in fremden Händen!

Die Mehlwurmfütterung ließ ich nun fort, schaffte mir noch ein Paar Schönbürzelchen und ein Paar Schmetterlingsfinken an, die ich sorgfältig im Einzelkäfig mit gequellter weißer Hirse eingewöhnte. Nachdem sie aber kaum acht Tage in der Voliere waren, starben die Grisbleu und das Weibchen Schmetterlingsfink unter denselben Erscheinungen. Alle Sektionen, die Herr Neunzig vornahm, stellten Herzschlag fest. Wir standen vor einem großen Rätsel. Am Futter konnte es nicht liegen, denn dieselben Futtermittel verwendeten Wellensittiche und Möwchen für sich und ihre Bruten, und die Jungen gediehen sehr gut dabei. — Ich habe den Vorbau außer Betrieb gesetzt, das Südfenster nicht wieder geöffnet, und bis heute nach acht Wochen ist kein Vogel mehr eingegangen. So muß also doch der Einfluß der Sonnenstrahlen schuld gewesen sein, denn auch übermäßiger Fettansatz ist nicht schuld, die Vögel waren zwar gut beileibe, aber durchaus nicht zu fett. Sie hätten ja den Schatten der Voliere aufsuchen können, taten es aber fast nie, es sei denn abends, wo der Vorbau auch geschlossen wurde.

Die kleine Kammer, in der mein Vater Wellensittiche usw. züchtet, liegt nach Osten, und hier wirkt nur die Morgensonne auf den Drahtvorbau, auch gehen die Wellensittiche und Kanarien der starken Mittagshitze aus dem Wege. In der Vogelstube

öffne ich jetzt nur das nach Osten gelegene Fenster und habe immer verhältnismäßig kühle Luft im Zimmer. Auch nachts lasse ich dasselbe offen.

Nur Mißerfolge habe ich bis jetzt buchen können, hoffe aber, daß der Herbst mir mehr Glück bringt, denn alle meine Lieblinge befinden sich jetzt wohl und munter, bauen und brüten zum Teil bereits.

Im übrigen bin ich der Ansicht, daß man nicht bloß des Zuchtgewinnes wegen Liebhaber sein soll —, ich freue mich auch an dem bunten Federkleid, dem ganzen Tun und Treiben meiner kleinen gefiederten Freunde.

Zur Pflege unserer heimischen Finkenvögel.

Von Berta Schuster.

(Nachdruck verboten.)

Die Pflege der heimischen Finkenarten wird von vielen Vogelliebhabern geübt. Und mit Recht, denn sie hat des Anziehenden genug. Können wir doch in der Gefangenschaft so manches von den Gepflogenheiten und Eigentümlichkeiten gerade unserer uns in der freien Natur am häufigsten begegnenden Vögel ablauschen. Ein größerer Flugkäfig, ja schließlich auch der einzeln gehaltene Fink, oder eine Voliere mit einigen Paaren der Finkenvögel besetzt, ist die Sehnsucht mancher Liebhaber. Besonders anziehend wird die Haltung dieser Vögel, sobald sie uns einen näheren Einblick in das engere Familienleben, sei es die Brutpflege, sei es die Aufzucht der Jungen, geben. Im allgemeinen schreiten ja unsere Finken nicht allzu häufig zur Brut. Doch gibt es einige Arten, bei denen schon recht häufige Zuchterfolge erzielt worden sind. Da gibt es für den Liebhaber genügend Arbeit und Anleitung zur Beobachtung. Gilt es doch die Brutdauer, den Brutbeginn, Ausschlüpfen der Jungen, die Beteiligung der beiden Gatten am Nestbau, am Brutgeschäft, an der Auffütterung der Jungen festzustellen. Auch die Färbung des Dunenkleides, die Verteilung der Dunen auf dem Körper, die Färbung des aufgesperrten Rachens, die Jugendkleider, das Federwachstum, die Gewichtszunahme und noch vieles andere gibt Arbeit, dem Pfleger Anregung genug, zumal doch alles genau aufgezeichnet werden muß. Viele Pfleger scheuen sich davor, ihre Lieblinge beim Brutgeschäft zu stören. Doch glaube ich, daß mit Vorbedacht und Vorsicht wohl jeder das Nest eines Finkenvogels kontrollieren kann. Wie oft stellt man mit Bedauern bei manchen Berichten in unserer Zeitschrift fest, daß genauere Angaben über Brutdauer usw. fehlen. Gerade hier kann der Vogelliebhaber biologische Arbeit leisten und sein Teil zur wissenschaftlichen Forschung beitragen. Das gilt natürlich nicht nur für heimische Finken, sondern auch für alle die vielen anderen Pfleglinge, die in die Hände der Liebhaber gelangen. Besonders sind derartige Angaben auch bei ausländischen Vogelarten von Wert, da häufig biologische Angaben aus der Freiheit und Heimat dieser Vögel fehlen. Natürlich müssen derartige Ergebnisse mit Vorbedacht verwertet und nicht verallgemeinert werden. Schließlich geht doch das Brutgeschäft eines Vogelpaares in der Gefangenschaft unter anderen Bedingungen vor sich wie in der freien Natur.

Nach diesen Abschweifungen vom eigentlichen Thema, die nötig waren, um manchen Liebhaber auf all die Freuden und auch Mühen, die ihm bei der Pflege seiner Vögel entgegentreten, aufmerksam zu machen und besonders den Anfängern in der Stubenvogelpflege einige Fingerzeige zu geben.



Buntkehlhabia. Nördl. Buntkehlhabia.

(Text im nächsten Heft.)

Die Käfigfrage spielt ja zunächst eine große Rolle. Nun wird ja am meisten ausschlaggebend der Geldbeutel und die Räumlichkeit des Pflegers sein. Natürlich ist eine Vogelstube, in der die Vögel frei umherfliegen können, das Verlockendste; doch wohl den wenigsten wird derartige Freude zuteil. Doch auch der größere Flugkäfig, in dem sich ein oder gar mehrere Paare unterbringen lassen, hat seine Reize. Wer natürlich den Hauptwert auf Gesangsleistung legt, der pflegt die als Sänger in Betracht kommenden Arten einzeln. Über alle diese Fragen geben ja die Jahrgänge der „Gef. Welt" und die Lehrbücher genügend Auskunft und es erübrigt sich, diese Dinge immer wieder zu behandeln. Ich will nur hier meine Erfahrungen, die ich bei der Pflege der Finkenarten gesammelt habe und die wohl kaum von denen anderer abweichen, niederschreiben.

Meine Vogelstube bewohnten zeitweise nur Finkenvögel: Zeisige, Stieglitze, Birkenzeisige usw.

Oft waren von einer Art eine größere Anzahl beisammen. Bei dieser Haltung von mehreren Vögeln derselben Art in einem größeren Raume hat man viel Freude. Hier kann man besonders gut das Benehmen der einzelnen gegenüber ihren anderen Artgenossen beobachten. So verlockend die Haltung von mehreren gleichartigen Vögeln ist, so kommt man doch bald davon ab, da ja auch andere Arten ihren Einzug halten wollen. Im allgemeinen hatte ich keine Schwierigkeiten bei dem Zusammenhalten verschiedener Arten. Allerdings unterließ ich es stets, Bergfinken und Kreuzschnabel hinzuzusetzen. Die Bergfinken, soweit ich sie verpflegte, waren stets äußerst zänkisch und bissig. Ihre Bissigkeit ging so weit, daß bei einem kürzeren Transport von dreien dieser Racker nur einer nach zwei Stunden noch am Leben war. Es ist zu schade, daß dieser schöne Vogel oft so unleidlich in der Vogelstube ist. Bei den üblichen Zänkereien der Finken am Futternapf werden häufig Kreuzschnäbel und Kernbeißer wegen ihrer gefährlichen Schnäbel gefährlich. Doch lohnt es sich selbstverständlich reichlich, diese Arten allein mit ihresgleichen zu verpflegen, und sie machen jedem Pfleger recht viel Freude, besonders wenn er es versteht, sich mit ihnen näher vertraut zu machen.

Beim Zusammenhalten der anderen Arten, wie Erlenzeisig, Stieglitz, Hänfling, Birkenzeisig, Steinhänfling, Girlitz, Gimpel, Grünling und Buchfink, habe ich keine Schwierigkeiten gehabt. Die Vögel vertrugen sich, abgesehen von den schon erwähnten Zänkereien an den Futternäpfen, gut. Meist halten die einzelnen Pärchen zusammen und kümmern sich wenig um die anderen. Im Frühjahr erleidet häufig infolge der Brütlustigkeit der Männchen die Eintracht Einbuße. Oft befehden sich dann die einzelnen Männchen, besonders der kleine Girlitz ist dann sehr bissig und raufluſtig. Grünfinken und Girlitz schreiten meist zur Brut, während Buchfink, Gimpel und die Hänflingsarten schon schwerer dafür zu haben sind.

Die Fütterung in einem derartigen Flugraume und Durcheinander der Arten stößt häufig auf Schwierigkeiten. Sollen doch sämtliche Insassen in einem möglichst normalen Futterzustande gehalten werden, was nicht so einfach ist. Den besten Erfolg hatte ich stets bei reichlicher Verabreichung von Rübsen. Zunächst möchte ich noch bemerken, daß ich die Sämereien gesondert füttere. Als Hauptfutter erhalten sie, wie schon erwähnt, Rübsamen, dann etwas Spitzsaat, wenig Hirse, Hanf, Negersaat, Leinsaat und Mohn; als Beigaben werden Salatsaat, Kornblumensaat, Sonnenblumen, Nachtkerze, Distel und andere Sämereien der Unkräuter, die von einzelnen Arten in der Freiheit genommen werden, gereicht. Die Sämereien wechseln häufig ab, niemals werden alle zu gleicher Zeit verabreicht. Von den ölhaltigen, wie Hanf, Negersaat usw., wird nur wenig gegeben. Im Sommer bilden Weichfutter und frische Ameisenpuppen Abwechslung in der Fütterung. Grünkraut, wie Zweige mit Knospen, Vogelmiere usw., und Beeren sind wichtige Bestandteile des Futters. Für Trink- und Badegelegenheit muß ausreichend gesorgt werden, da die meisten Finken gern baden. Bei der Fütterung muß natürlich auf die Zusammensetzung der Insassen der Voliere geachtet werden, da einige Arten die Sämereien, die andere gern fressen, verschmähen.

Die Einrichtung einer Vogelstube oder eines Flugraumes für Finkenvögel sei möglichst einfach. Das Anbringen von lebenden Pflanzen ist zwecklos, da diese bald den Schnäbeln der Insassen zum Opfer fallen werden. Etwas Gesträuch an den Wänden und

Zebrafink (s. S. 220).

in den Ecken geschmackvoll angebracht, dazu Zweige von Kiefern, einige stärkere Äste, Harzer Bauerchen zum Nisten, das genügt vollständig. Als Bodenbelag diene Sand oder schwarze Erde und für die Futternäpfe und Wassergefäße je ein größerer Zinkkasten. In einem Flugraum, günstig gelegen, fühlen sich die Vögel sehr wohl, und der Pfleger wird es ihnen anmerken.

Nach diesen kurzen Mitteilungen über das Halten der Finken im Flugraum will ich noch kurz die einzelnen Arten behandeln. Am häufigsten wird wohl der Buchfink gekäfigt, und wohl im allgemeinen einzeln, da ja besonders auf seinen Schlag viel Wert gelegt wird. Hier im Einzelkäfig kommt der schöne Vogel kaum zur Geltung. Weit mehr hat man von ihm im größeren Käfig oder im Flugraum. Hier kann man ihn so recht in seinem Benehmen und Leben beobachten. Die Pflege des Buchfinken ist verhältnismäßig einfach. Er ist anspruchslos. Neben Sämereien bedarf er während der Sommermonate ein Insektenfresserfuttergemisch, Ameisenpuppen und Mehlwürmer. Während diese

Zeit reiche ich sämtlichen Finkenvögeln etwas Weichfutter und Ameisenpuppen. Häufig ist es zur Aufzucht der Jungen notwendig. Frischgefangene Buchfinken sind häufig sehr scheu, und sie müssen erst im verhängten Käfig sich etwas beruhigen. Der Buchfink badet gern, und es ist ihm hierzu häufig Gelegenheit zu geben. Seine Züchtung ist einige Male gelungen. Auch sind Mischlinge mit Kanarienvogel und Bergfink gezüchtet worden. Über die Haltung des Bergfinken gilt das vom Buchfinken Gesagte. Als Sänger kommt er gar nicht in Betracht. Doch sein schönes Gefieder und seine eleganten, etwas scheuen Bewegungen lassen ihn als einen angenehmen Vogel gelten, der allerdings meist allein mit seinesgleichen gehalten werden sollte. Seine Ernährung sei recht abwechslungsreich. Er frißt gern Nadelholzsamen, Ebereschen- und Wacholderbeeren Seine Züchtung ist bisher nicht vollständig gelungen, und es lohnt sich schon der Mühe, mit ihm Züchtungsversuche anzustellen. (Schluß folgt.)

Neueinführungen und Seltenheiten.

Von Karl Neunzig.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Der Ani in seinem stets abgeschabten und zerschlissenen schwärzlichen Gefieder, das sich anscheinend in steter Erneuerung befindet, mit seinem hohen krummen Schnabel, ist in seinem großen Verbreitungsgebiet ein allbekannter Vogel, der sich einer großen Anzahl volkstümlicher Namen erfreut. Sein Äußeres verschafft ihm den Namen „kleine schwarze Hexe“, auf Kuba nennt man ihn nach seinem Ruf „Judio“ oder „Louis“, in anderen Gegenden erfreut er sich wegen seiner andauernd ausgestoßenen, mürrisch klagenden und wimmernden Laute des Namens „schwarzer Wimmerer“, und da, wo seine nützlichste Tätigkeit, das Ablesen von Insekten vom Rücken der weidenden Rinder, besonders geschätzt wird, wird er „Zeckenfresser“ genannt.

Schönbürzelchen (s. S. 220).

Er ist im Gegensatz zu den Kuckucken, welche den Wald oder doch baumreiche Gegenden bewohnen, der Kuckuck der offenen Savanne, der ausgedehnten Waldbestand durchaus meidet. Am meisten bevorzugt er die großen Weideplätze in der Nähe der Ortschaften, die mit einzelnen Bäumen bestanden sind, mit Gebüsch bestandene Bachufer sucht er häufig auf, und auch in der Capoeira, brachliegendes Land, welches wieder zu Urwald wird und bereits zwei bis drei Meter hohe Bäume aufweist, wird er häufig gefunden.

Niemals sieht man ihn einzeln, meist lebt er in Flügen von sechs und mehr Individuen. Sein Geselligkeitstrieb ist eine seiner ausgesprochensten Eigenschaften. Dabei ist er dreist und anscheinend furchtlos, verabsäumt aber nie das Nahen eines Menschen anzuzeigen, und sie werden so die Warner aller Vögel, welche dem Menschen nichts Gutes zutrauen. Sobald sich ein Mensch naht oder sonst eine Gefahr droht, z. B. ein gefürchteter Raubvogel sichtbar wird, „so wenden sie — so berichtet der verstorbene Karl Lehl — den Kopf ängstlich hin und her; plötzlich läßt einer seinen Warnungsruf erschallen, und nun strecken alle die Köpfe nach vorn, wiederholen das warnende Quii-quii, machen einige Flügelschläge und schweben dann, mit dem ausgebreiteten Schwanz die Richtung angebend, laut schreiend nacheinander einem fernstehenden Baume oder größeren Busch zu“. Dieses Benehmen stimmt wenig mit dem überein, was Alexander v. Humboldt von der Dreistigkeit des Vogels berichtet. Er sagt, daß sie so wenig Scheu vor dem Menschen hätten, daß Kinder sie oft mit der Hand fangen und daß sie sich ruhig auf den Rand seiner Hängematte setzten, während er selbst darin der Ruhe pflegte. Vermutlich hat sich das Benehmen der Ani dem Menschen gegenüber, nachdem er ihn besser kennengelernt hatte, geändert. Jedenfalls berichten neuere Forscher derartiges nicht mehr. Mit anderen Vögeln, welche seinen Aufenthaltsort mit ihm teilen, wie Tyranniden, Fliegenschnäpper, Stärlinge und Grackeln, verträgt er sich gut, d. h. er beachtet sie gar nicht, genau wie ihn die weidenden Rinder völlig zu übersehen scheinen, obgleich er sie von dem peinigenden Geziefer befreit. Er wagt „sich dreist an die Köpfe und Füße der weidenden Rinder und Pferde heran, um die von diesen aufgescheuchten Heuschrecken, Käfer und Spinnen“ fortzufangen. „Es sieht drollig aus, wie diese Vögel so emsig suchend dem Vieh,

Pferden sowohl wie Kühen, folgen, dabei den Schwanz am Boden nachschleifen oder hochheben und etwas ausbreiten, um sich so dem bergigen Boden anzupassen und das Gleichgewicht zu erhalten" (K. Lehl). Häufig sieht man ihn auf dem Rücken der Rinder mit dem Ablesen des Ungeziefers, zumeist der vollgesogenen Zecken, beschäftigt. Während sie sich auf dem Boden äußerst gewandt und schnell bewegen, ist ihr Flug ziemlich schwerfällig und langsam, nach einigen Flügelschlägen schwebt er eine kurze Strecke, um dann wieder einige Male die Flügel zu bewegen. Er ist im ganzen mehr ein Schweber von Baum zu Baum.

Neben den Kerfen und Würmern werden auch kleinere Kriechtiere und mancherlei Obst und Beeren verzehrt.

Sein eigenartig mürrisch wimmernder Ruf oook=eck ist bei jeder Verrichtung zu hören. Der Ruf wird, wie stets bei der Wiedergabe von Vogelstimmen, von den einzelnen Beobachtern verschieden wiedergegeben, der eine hört ein langgezogenes „qu=iid" oder „qu=iii", der andere „ju=di=o" usw. Sein näselnder Ruf ist nicht allzu laut.

Am ausgezeichnetsten zeigt sich der Geselligkeitstrieb des eigenartigen Vogels beim Nisten. „Wie die Landleute hier erzählen," so berichtet Kämpfer im J. f. O. 1924, „bauen diese Vögel große gemeinschaftliche Nester, in die sie schichtweise bis 100 Eier legen, von denen nur die obersten ausgebrütet werden sollen. Ich habe trotz aller Bemühungen ein derartiges Nest nie zu Gesicht bekommen, wohl aber Nester mit 4—5 Eiern. Sie befinden sich meistens einzeln in lichten Bäumen 2—3 Meter über dem Boden und bestehen aus einem ziemlich regelmäßig runden Geflecht aus Grashalmen." (Fortsetzung folgt.)

Sprechsaal.

(Steht den Abonnenten kostenlos zur Verfügung.)

Antworten.

Auf Frage 13: Auch ich habe in diesem Jahre ein Nest mit acht jungen Gartenrotschwänzen gefunden und beobachtet. Da ich weiß, daß Rotschwänze sechs bis sieben Junge haben, war ich ganz erstaunt, in dieser Kinderwiege acht zu finden. Das Nest war in einer hohlen Kopfweide und in der Nähe eines großes Teiches angelegt, und ich nehme an, daß gerade die Ernährungsfrage in diesem außergewöhnlichen Fall mitspricht. Auch sind alle Junge großgezogen und ausgeflogen, wie ich beobachtet habe. Auch haben sich die Alten gar nicht stören lassen bei meinem häufigen Nachsehen. Da ich bis vor einigen Tagen fort war in Urlaub, kann ich erst heute diese Mitteilung auf die Anfrage des Herrn H. N. in Aachen machen.

Albert Kieprat, Braunschweig.

Betrifft Versendung von Vögeln. Herr Dr. Alfred Schrödter in Leipzig=Connewitz legt Wert darauf festzustellen, daß er nicht der in den Ausführungen des Herrn Artur Schiele im Sprechsaal S. 207 gemeinte Liebhaber, der sich beim Versand ungewöhnlich kleiner Versandkästen bediente, ist. Wir bringen das hiermit zur Kenntnis unserer Leser.

Vom Vogelmarkt.

Von seltener auf den Vogelmarkt kommenden Vögeln werden angeboten:

C. Balser, Fulda, Zickengarten: Schneeweiße Kanarien.
Beck, Tierimport, Stuttgart: Orange=, Feuer= u. Napoleonsweber, Blutschnabelweber, Dottergelbe Weber, Maskenweber, Mönchstittiche, Stieglitz×Zeisig=Bastarde, Gelbkopfamazone, 1,2 Alpensteinhühner.
Graf Leutrum, Nippenburg, Post Schwieberdingen Württemberg: Schneeweißer Kanarienhahn und schneeweißhermelin gezeichnete.
E. Schöndube, Berlin, Elisabethkirchstr. 1: Weißstirnpfäffchen, 1,0 Jakarinifink.
A. Steinhagen, Lübeck, Brandenb. Landstr. 161: 1,1 Möwchen, 1,1 Isabell=Fuchs=Kanarien.



Herrn H. R., Osnabrück. Für den Anfänger eignen sich zu Züchtungszwecken von heimischen Vögeln Grünling, Erlenzeisig Gimpel, von ausländischen Vögeln japanische Möwchen, Silberschnäbelchen, Kleinelsterchen, Zebrafinken, Wellensittiche. Mit Ausnahme der beiden letzteren Arten ist es schwer die Geschlechter zu unterscheiden. Ein zuverlässiger Verkäufer wird aber jedenfalls bemüht sein, ein richtiges Paar zusammenzustellen.

Frau A. L., Münster. Ernähren Sie Ihre Weichfresser mit einem der im Anzeigenteil empfohlenen Universalfutter. Dazu sind je nach der Art des Vogels, der Jahreszeit und sonstigen Umständen Zugaben zu reichen. Nähere Ausführungen hierüber können an dieser Stelle nicht gegeben werden (s. das Buch „Einheimische Stubenvögel", Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg). Die Mauser bringt stets Gefahren für gefangene Vögel. Diese bedürfen in dieser Zeit besonders sorgfältiger Behandlung und kräftiger Ernährung. Wenn man für mausernde Weichfutterfresser kein Futter hat, so darf man sich nicht wundern, daß dieselben eingehen. Wenn zum Lüften die Fenster geöffnet werden, dürfen die Vögel im Zimmer bleiben, wenn sie so aufgestellt sind, daß sie vor Zug bewahrt und starken Temperaturschwankungen nicht ausgesetzt sind. Letztere Gefahr besteht hauptsächlich in der kälteren Jahreszeit. Turmschwalbe ist dasselbe wie Mauer= oder Turmsegler. Es ist sehr fraglich, ob die Turmschwalbe wieder flugfähig wird. Wenn Sie dieselbe nicht behalten können, so geben Sie dieselbe an tierfreundliche Leute, welche die Pflege dieser Tiere verstehen und sich auch der Mühe des Futtergebens usw. unterziehen wollen. Wenn ein aus dem Nest gefallener junger Vogel aufgepäppelt wurde und kräftig gediehen, auch flugfähig und voll entwickelt ist, so wird er sich bei rechtzeitigem Aussetzen wahrscheinlich den abziehenden Artgenossen anschließen. Es kommt dabei auch auf die Art an.

Herrn K. P., M.=Gladbach. 1. Die alten Federn sind abgenutzt und zerschlissen, die neuen haben unabgenutzte Ränder und sind als neue zu erkennen. Wenn man sich also überzeugen will, ob ein Vogel gut gemausert hat, muß man das Gefieder daraufhin prüfen. 2. Um in einer von vielen Vögeln bevölkerten Voliere diesem oder jenem Vogel, der zur bestimmten Zeit mit Mehlwürmern reichlicher als andere gefüttert werden soll, diese auch zukommen zu lassen, ist es nötig, ihn so zahm zu machen, daß er die Würmer aus der Hand nimmt. Gewiß befördert es den rechtzeitigen Eintritt und den guten Verlauf der Mauser, wenn sich die Vögel in einem großen Raum frei bewegen können. Wenn der angegebene Weg nicht gangbar ist, müssen die Vögel allerdings in einen Einzelkäfig gebracht werden. 3. Gegen die Verwendung von Sägemehl in feuchtem Zustand als Bodenbelag unter Zugabe von Rasenplatten, Sand, Erde usw. ist nichts einzuwenden. Man kann statt des Sägemehles auch Torfmull verwenden, was wohl den natürlichen Verhältnissen mehr entsprechen würde. 4. Wellensittiche mit unseren Weichfutterfressern zusammen zu halten, kann ich nicht empfehlen.

Fl. O. G., Berka a. Werra. Bluthänflingmännchen etwa 1 Jahr alt, ist stark abgemagert. Es ist infolge der mit Abzehrung verbundenen Ernährungsstörung eingegangen. Der Hänflinge häufiger zum Opfer fallen. Diese Vögel bleiben lange Zeit scheu. Man hängt ihre Käfige hoch auf und umgibt sie mit Nadelholzzweigen.

Herrn Th. B., Schwerin. Anfragen nach Bezugsquelle ist Antwortkarte beizufügen.

(Fortsetzung auf der 3. Umschlagseite.)

Aus den Verbänden.

Vereinigung der Vogelliebhaber Landesverband Preußen. Unseren werten Mitgliedern des Landesverbandes Preußen zur gefälligen Kenntnisnahme: Wiederholt sind Verbandsbeiträge von den uns angeschlossenen Vereinen eingegangen mit der Bemerkung: „für den Reichsverband". Diese Bestimmung ist irrtümlich. Zur näheren Erläuterung geben wir nochmals den Aufbau unserer Organisation bekannt. Der Reichsverband der deutschen Vogelliebhaber Sitz Leipzig setzt sich aus den Landesverbänden Preußen, Sachsen, Groß-Thüringen, Bayern und Einzelmitgliedern, welche keine Gelegenheit haben, sich einem Landesverbande anzuschließen, zusammen. Die Landesverbände bestehen aus Ortsgruppen. Dieses sind die bestehenden Vereine in den verschiedenen Städten der betreffenden Landesverbände und Einzelmitglieder, welche an Orten wohnen, in denen keine Vereine existieren. Die laufenden Jahresbeiträge zum Landesverband Preußen betragen pro Mitglied 1.— Mark nach dem Stand der Mitgliederliste vom 1. April eines jeden Vereines. Einzelmitglieder zahlen pro Jahr 3.— Mark. Von dieser 1.— Mark pro Mitglied zahlt der Landesverband Preußen je 0.30 Mark an den Reichsverband. Die verehrlichen Kassierer und Vorstände der uns angeschlossenen Vereine bitten wir hiervon gefälligst nochmal Notiz zu nehmen. Ferner wurde um Übersendung der Statuten des Landesverbandes Preußen von einem Vereine gebeten. Wir bitten vorläufig die Nummern der „Gefiederten Welt" einzusehen, in denen die Statuten zum Abdruck gelangt sind. Es werden in Kürze Statuten gedruckt und dann dieselben den uns angeschlossenen Vereinen übersandt werden. Bisher mangelte es immer noch an Geld. In dieser Hinsicht bitten wir um freundliche Unterstützung unserer werten Vereine und Einzelmitglieder. Ferner geben wir bekannt, daß vom 19.—23. November d. J. eine große Vogelschau in den Sophien-Sälen, Berlin, Sophienstraße, stattfindet. Nach den Vorbereitungen, welche schon jetzt getroffen werden, ist zu erwarten, daß diese Ausstellung die erste, in den Posthörsälen stattgefundene, noch bei weitem übertrifft. Wir bitten unsere auswärtigen Mitglieder, sich darauf einzurichten und diese Ausstellung wieder zahlreich zu besuchen. Weitere Bekanntmachungen werden später noch erfolgen.

J. A.: P. Böhme, 1. Schriftführer.

Vereinigung der Vogelliebhaber Landesverband Sachsen und Groß-Thüringen. Die freudvollste Zeit für uns Vogelliebhaber im Jahreslauf ist vorüber, und wir dürfen nun gewiß einiges Interesse für uns beanspruchen. In der klugen Erkenntnis der Vorbedingungen für gedeihliche Entwicklung unserer Bestrebungen hat bereits der Reichsverband an dieser Stelle Wünsche zum Ausdruck gebracht, die zu beherzigen sind. Wir bitten die angeschlossenen Vereine um Einreichung ihrer Mitgliederlisten, außerdem ist Mitteilung erwünscht über etwaige örtliche Einschränkungen der Liebhaberei durch die Behörden. Geld wird dringend benötigt. Wenn auch der Pleitegeier in unserem Wirtschaftsleben sein Unwesen treibt, wir müssen uns auch mit diesem „Vogel" abfinden. Bei gutem Willen werden die bescheidenen Beiträge zu erledigen sein, auch Teilbeträge sind willkommen. Versäumen wollen wir nicht, alle uns noch fernstehenden Liebhaber herzlich einzuladen, sich uns anzuschließen. Die kommende Gesetzgebung wird unsere Rechte berühren, dann kann nicht allein das Bewußtsein der Berechtigung unseres Tuns Einfluß haben, sondern nur eine zielbewußte Vertretung aller Liebhaber, und ihrer sind doch wahrhaftig nicht wenig. Nachstehend die Adressen für Mitteilungen und Geldüberweisungen: Hermann Höhne, 1. Vorsitzender, Leipzig-Volkmarsdorf, Eisenbahnstraße 84; Max Hunger, 1. Schriftführer, Leipzig-Gohlis, Polizeigebäude Zimmer Nr. 196; Ludwig Böttcher, Kassierer, Leipzig, Inselstraße 17.

Der Gesamtvorstand. J. A.: gez. Höhne.

Aus den Vereinen.

Aufgenommen ist Mitgl. Nr. 100 Herr Dr. P. Weste, Ovenstädt, Krs. Minden (früher Adolphsdorf unter derselben Mitgliedsnummer. — Mitgl. Nr. 41 wohnt jetzt Wien XXI/5, Erzherzog-Karl-Str. 131.

A. Krabbe.

Vereinigung der Liebhaber einheimischer Vögel zu Berlin. Sitzung jeden 2. Donnerstag nach dem 1. und 15. des Monats im Vereinslokal zum „Alexandriner", Alexandrinenstraße 37a. Gäste stets willkommen.

J. A.: P. Böhme, Schriftführer,
Berlin O 17, Rüdersdorfer Str. 69.

Verein Vogelschutz und -pflege zu Dresden. Versammlung jeden Donnerstag, abends 8 Uhr, im Vereinslokal, „Schillers Restaurant", Ecke Stifts- und Ehrlichstraße. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen.

Bernhard Kühn, Vorsitzender.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei zu Hamburg. Sitzungen finden statt jeden 1. und 3. Dienstag im Monat in Hüttmanns Hotel, Poolstr. 22, abends 8¼ Uhr. Nächste Sitzung Dienstag, den 2. September 1924. Gäste sowie auch Exotenliebhaber stets willkommen.

J. A.: Arnold Weber, 1. Vorsitzender.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig. Vereinssitzungen jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat im Vereinslokal, „Bauers Brauereirestaurant", Täubchenweg. Nächste Sitzung Donnerstag, den 4. September. Gäste stets willkommen.

J. A.: Johann Birk, 1. Vorsitzender.

Verein der Vogelfreunde Leipzig-Plagwitz. Vereinslokal: „Gosenschlößchen", Leipzig-Plagwitz. Sitzungen an jedem 1. und 3. Montag des Monats, abends 8 Uhr. Vogelfreunde sind stets willkommen.

J. A.: Karl Scholtissek, 1. Vorsitzender, Leipzig-Plagwitz, Lauchstädter Straße 30.

Verein der Vogelliebhaber zu Mannheim. Versammlungen finden alle 14 Tage Samstag abend 8 Uhr im Vereinslokal „Restauration z. gold. Falken" statt. S. 1. 17. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen.

Johann Daubmann, 2. Schriftführer.

Für Entomologen.

Bau's Schmetterlingsbuch. Zum Selbstbestimmen aller in Deutschland, Österreich, Ungarn und der Schweiz vorkommenden Groß- sowie der vorzugsweise gesammelten Klein-Schmetterlinge. Mit 67 Textabbildungen. Kart. 4.— M.

Bau's Käferbuch. Zum Selbstbestimmen der in Deutschland, Österreich-Ungarn und der Schweiz vorkommenden Koleopteren. Mit 144 Textabbildungen. Kart. 4.— M.

Der Käfer- und Schmetterlingssammler. Anleitung zur Herstellung und Handhabung der beim Fange, der Zucht und dem Präparieren von Käfern, Schmetterlingen und Raupen als geeignet bewährten Geräte, sowie zur Anlage und Erhaltung von Insektensammlungen. Von Karl Wingelmüller. Mit 32 Abbildungen. Geh. 1.50, geb. 2.— M.

Schädlinge und Nützlinge der Kleintierwelt. Ein Lehrbuch für jedermann von Prof. Dr. L. Glaser. Mit 85 Textabbild. Kart. 3.— M.

Für Bienenzüchter.

Dzierzon's rationelle Bienenzucht. Von Pfarrer Dr. Dzierzon. 2. Auflage. Mit vielen Textabbildungen. Kart. 3.— M.

Bienenzucht im Zargenbreitwabenstock. Von Jak. Luers. Mit 25 Abbildungen im Text. Kart. 2.— M.

Leben und Zucht der Honigbiene. Ein gemeinverständliches Lehrbuch über Behandlung der Bienen und über Tätigkeit, Nutzen und Anatomie der Biene von Prof. Dr. O. Krancher. 2. verbesserte Aufl. Mit 1 Tafel, 82 Abbild. u. 7 Kopfleisten. Kart. 3.— M.

Für Hundefreunde.

Gebrauchs- und Luxushunde. Von Emil Ilgner. 2. Auflage mit 87 Abbildungen im Text. Kart. 3.— M.

Der kurzhaarige deutsche Vorstehhund. Von Camillo Morgan. Mit 13 Abb. berühmter kurzhaariger deutscher Vorstehhunde. 2.— M.

Der Foxterrier, seine Zucht, Pflege und Erziehung für Jagd und Stube, von Emil Ilgner. 2.50 M.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg / Postschließfach 148

Anzeigenteil

Die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 20 G.-Pf. berechnet. Aufnahme erfolgt gegen Voreinsendung des Betrages in Reichsgeld per Brief od. auf unseren Zahlstellen: Postscheckkonto: Magdeburg 3148, Wien 156 687, Bern III 4326, Prag: Creditanstalt d. Deutschen unter Angabe des Zweckes.

Käfige u. Gerätschaften

Gimpelbauer

mit Drahtstäben 17½ cm lang, 17 cm hoch, 13 cm breit pro Dtzd. 14 ℳ; fertige alle Sorten Käfige und Utensilien für Kanarien an. [646

A. Janson, Barbis a. H.

Vogel-Fangkäfige 2.50 und 4.50 ℳ, Schlagnetze f. kl. schädl. Vögel 1.90 ℳ, f. größ. 2.10 u. 2.40 ℳ. Katalog gratis. **J. Taunen**, Gronau 58 (Westf.). [647

648] **Voliere, Gesellschafts-Weichfresserkäfige,** gebraucht, billig abzugeben. **Merz, Friedenau,** Wilhelm-Hauff-Straße 14 II.

Futtermittel

Mehlwürmer neue, feinste Qualität, Pfd. 8 ℳ
649] **Jeltner, Breslau,** Weinstr. 12.

Mehlwürmer

geg. Einsend. v. 2.— Rentenmark ¼ Pfd. franko versend. **D. Waschinski & Co.,** Biesenthal I (Mark). [650

Selbstgetrocknete
Ameiseneier
à Liter 2 ℳ, bei Einsendung von 10 ℳ 5 Liter franko. **R. Seyfert,** Magdeburg, Lödischehofstraße 3. [651

Vogelfutter [652

für **Kanarien, Waldvögel, Exoten, Papageien, Weichfresser.** Anerkannt bewährteste Mischungen auf Grund langjähriger Erfahrung. Liste 13 über Vogelfutter, Liste 5 über Vogelkäfige, Zuchtgeräte usw. mit etwa 400 Abbildungen.

W. Göpel, Leipzig,
Tröndlinring 1. Telephon 14958.
Bei Anfragen bitte auf die „Gefiederte Welt" Bezug zu nehmen.

Ornis-Haus
Halle-Saale
Gegründet 1912
Spezialität:
Individuelle Weichfresserpflege nach Angaben des Herrn Apotheker Adalbert Jena-Biberach-Riß. (Alleiniges Herstellungsrecht.)
Reform-Normal I, Volierenm.,
Reform-Normal II, f. Rotkehlchen, Schwarzplatten usw.,
Reform-Normal III, f. Nachtigall., Sprosser usw.,
Reform-Normal IV, f. Gelbspöti., Goldhähnchen usw.,
Reform-Normal V, f. Schama usw.,
Körnerfutter Ia für jede Vogelart. [653
Inhaber langjähriger Fachmann, siehe „Ornis-Buch" (90 S.) Mk. 1
Preisliste auf Wunsch!

Vögel

Vertausche [654

1,0 Stieglitz, 1,0 Girlitz, 1,0 Zeisig, 2,0 Birkenzeis., 1,0 Rothänf., 1,0 Dompf., 1,0 Bergfink
zus. geg. 1,0 tadell. Kanarien-Vorsänger. **Brandt,** Wartha t. Schl., Hauptstr. 44.

Astrilde

Paar 3 ℳ, Goldbrüstchen, Schmetterlingsfinken, kl. Elsterchen Paar 5 ℳ, hochrote gesunde Amaranten P. 3.50 ℳ, Bandfinken, Silberschnäbel, Atlasfinken, Orange-, Feuer- u. Napoleonsweber Paar 3.50 ℳ, Paradieswitwe in Farbe Paar 8 ℳ, außer Farbe Paar 3.80 ℳ, Atlasfinken in Farbe Paar 6 ℳ, Dominikanerwitwe i. Farbe Paar 10 ℳ, Blutschnabelweber i. Farbe Paar 5 ℳ, Dottergelbe Weber P. 3.60 ℳ, Maskenweber in Farbe Paar 10 ℳ, Edelsänger u. Mossambikzeisig P. 10 ℳ, gemischt nach meiner Wahl 25 P. 80 ℳ, 50 Paar 140 ℳ, 100 Paar 250 ℳ, blaue Reisfinken Paar 10 ℳ, Wellensittiche Paar 25 ℳ, Mönchsittiche Paar 20 ℳ, Kanarienhähne, jung abgestempelt, Stck. 8 ℳ, 12 Stck. 85 ℳ, 24 Stck. 150 ℳ, Stieglitz × Zeisig-Bastarde Stck. 15 ℳ, Granpapagei, viel sprechend, 300 ℳ, Gelbkopfamazone, sprechend, 100 ℳ, Elstern zahm Stck. 8 ℳ, Raben, Dohlen Stück 6 ℳ, Lachtauben Paar 10 ℳ, 6 Paar 50 ℳ, 1,2 Alpensteinhühner prima zus. 120 ℳ, Mohren- u. Resusaffen. an Stange u. Kette gewöhnt, ohne Fehler Stück 100 ℳ, Javaaffen Stück 70 ℳ, weiße Mäuse Paar 1.50 ℳ, 50 P. 50 ℳ, Siebenschläfer P. 12 ℳ, Baumschläfer Paar 14 ℳ, alles sichtbar verpackt. Garantie für gute Ankunft.

Beck, Tierimport,
Stuttgart. [655

Verkaufe
Edelkanarien 1924!

Schneeweißer Hahn 60 ℳ, schneeweißhermelin gezeichnete 50 ℳ. Tausche auch diesjährige Zuchtpaare, gelbe, satinfarbige oder blaublütige Wellensittiche oder Goldfasanen-Hennen. [657

Graf Leutrum, Nippenburg, Post Schwieberdingen, Württemberg.

Ia Zuchtpaar
Weißkehlpfäffchen,

Männchen, fleißiger Sänger, 1 Jahr gekäfigt, tadellos schön und gesund, gebe ab für 18 ℳ mit Verp., tausche gegen **Zuchtpaar gelbe Wellensittiche.**
R. Diwersy, Merzig a. Saar.
658] A. Z.-Mtgl. 183.

Junge Wellensittiche

grün, bes. kräftige Tiere aus Gartenvoliere v. import. Zuchtp., pro Stck. 10 ℳ inkl. Porto u. Verpack. unter Garantie
659] gesund. lebend. Ankunft.
Johannes Clauß, Grimma i. Sa.

Abzugeben: 1,1 Goldstirnsiti. 15 ℳ, 5,0 braunbt. Mövchen à 8 ℳ, 1,1 Safranfink 10 ℳ. Transportk. verlangt.
Jos. Porzelt, München, Klarastr. 3.
660] A. Z.-Mtgl. 19.

Suche Steinrötel, Alpenlerche, Alpenbraunelle zu kaufen.
Gefl. Angeb. mit Preis an **Quaiser, Reichenberg** (Böhmen), Herrengasse, erbeten. [661

Großabnehmer

ab 1. Oktober 1924 für
Zeisige, Stieglitze, Hänflinge, rote und blaue Gimpel, Kreuzschnäbel sowie alle Arten Waldvögel in größeren Partien wird gesucht.
Vögel werd. franko dort gebracht.
Freundliche Angebote zur Anknüpfung von Verbindungen wolle man unter „Reelles Geschäft" an die Geschäftsstelle der „Gefiederten Welt" richten. [662

Papageien-Pärchen, [663

Doppelgelbköpfe, klimaf., handz., s. gelehrig, a. liebst. z. Zuchtvers., ev. a. einz. abzug. **Homann,** Stettin, Kochstr. 15.

Verkaufe im Auftrage:

1,1 Rosella 200 ℳ
1,1 Schama 120 ℳ
1,1 Schwarzbl. Tangaren 100 ℳ
1,0 Bl. Zuckervogel 35 ℳ
Suche 0,3 Buntastrilde und ♂♂ Brandweber, ferner **blaue Wellensittiche.** [664

Pracht, Düsseldorf-Gerr.

Graupapageien, ganz zahm und sprechend		130 ℳ
Blaustirn-Amazonen, fingerzahm u. schon anfang. zu sprech.		45 „
Gelbnacken-Amazonen, fingerzahm, jung u. gelehrig		80 „
Mohrenkopfpapageien, jg.		30—45 „
Kl. Gelbhaubenkakadus		70 „
Gr. Gelbhaubenkakadus		150 „
Weißhaubenkakadus		100 „
Jg. Alexandersittiche	Stück	13 „
Kakatussittiche	Paar	14 „
Wellensittiche	Paar	17 „
Wellensittiche, junge	Paar	10 „
Grünhäher, mex.	Paar	65 „
Glockenvogel Ia.		45 „
Rotbauchdrossel		45 „
Damadrossel		45 „
Dayaldrossel		40 „
Rote Kardinäle, eingew.		35 „
Rotrückige Würger		10 „
Karmingimpel, mexik.		8 „
Tahaweber	Paar	15 „
Papstfinken, Gefieder etwas defekt	Paar	12 „
Mövchen	Paar	18 „
Zebrafinken	Paar	18 „
Kanarienhähne		8—15 „
Nachtigall-Edelkanariensänger m. tief. Nachtigalltouren	Jungtiere von	35 ℳ an
Vorsänger		50—60 ℳ
Reinweiß und schwarzgescheckte	von	50—100 „

E. W. Lenger, Berlin N. 58,
Schönhauser Allee 70 a. [665
Fernruf Humboldt 5730.

Die Geldknappheit ist zwar noch nicht ganz gehoben, aber immerhin sind Anzeichen einer Besserung sichtbar. Man kann schon wieder mancherlei kaufen, was nicht zu den unbedingten Notwendigkeiten gehört. Heute kann ich einen hübschen kleinen Band von 368 Seiten Umfang auf holzfreiem Papier ungebunden für ℳ 1,20, hübsch eingebunden für ℳ 1,80 (Porto besonders) anbieten, der manchem Vogelfreund Freude bereiten wird. Es ist die neue Ausgabe von Alfred Brehm, „Die Singvögel", ein Auszug aus dem im Herbst vollständig erscheinenden billigen „Brehms Tierleben" und eine sehr schöne Ergänzung zu dem mit 96 farbigen Tafeln geschmückten Band von Fehringer, „Die Singvögel Mitteleuropas". Was den hübschen Band für den Vogelfreund wertvoll macht, sind die anziehenden Schilderungen Brehms, die selbst erfahrenen Vogelfreunden noch Freude bereiten werden. [666

Alfred Troschütz,
Buchhändler und Antiquar, Hannover, Große Aegidienstr. 4.

Für Kanarienzüchter!

Soeben erschienen:

Die Farben- und Gestaltskanarien
nebst Beschreibung aller verschied. Kanarienrassen, deren Entstehung, Form- u. Farbenveränderung, Bastardzucht u. Farbenfütterung v. A. Aschenbrenner. Mit vielen stichhaltigen Abb. Kart. 1.75 M

Wichtig zur Zucht:

Der Kanarienvogel,
seine Naturgeschichte, Pflege u. Zucht von Dr. Karl Ruß 14. Auflage. Mit 2 Farbentafeln und zahlreichen Textabbildungen. Bearbeitet von Karl Neunzig.
Kart. 2.50 M

Die Bastardkanarienvogelzucht.
Von Walter Barth. Mit 20 Abbildungen und 1 Tondrucktafel. 1.50 M

Der Kanariengesang.
Allgemeinverständliche sowie musikalische und phonetische Darstellung von W. Kluh
1.00 M

Zu beziehen durch:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg.
Postschließfach 148.

Beschwerden wegen Nichtzustellung der „Gefiederten Welt" sind bei zuständigen Postamt anzubringen.

Bitte!

In eigenem Interesse wollen die pp. Einsender beachten, daß

a) **alle für die Redaktion** der „Gefiederten Welt" bestimmten **Zuschriften** (Sprechsaal-Anfragen und -Antworten, Vereinsnachrichten usw.) und **Sendungen** (tote Vögel, Manuskripte) nur an **Herrn Karl Neunzig, Hermsdorf bei Berlin,** Neue Bismarckstr.,

b) **alle Bestellungen** auf **Abonnements,** auch vom Ausland, **nur durch die Post,**

c) **Inserate** und dergl. Geschäftliches nur an die **Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg,** Postschließfach 148,

zu richten sind.

Inserate

für das am 4. Sept. 1924 zur Ausgabe gelangende Heft 29 der Gefiederten Welt erbitten bis 30. Aug. 1924 spätestens

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Berlin-Hermsdorf; für den Anzeigenteil: Rolf Kretschmann, Magdeburg, Postschließfach 148.
Verlag der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck: August Hopfer, Burg Bz. Mgdbg.

Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Jahrg. 53 | Den 4. September 1924 | Heft 29

(Druckort: Burg, Bezirk Magdeburg.)

Meine Oryxweber und ihre Zucht.

Von Stadtarchitekt Pracht.

(Nachdruck verboten.)

Ich hatte von einem Vogelliebhaber, dessen Namen ich mich nicht mehr entsinnen kann, unter Rotkopfamandinen auch 1,1 Weber bekommen. Ob diese mir damals unter Orange-, Feuer- oder Oryxweber angeboten bzw. überlassen wurden, weiß ich nicht mehr zu sagen. Die Tiere kamen, wenn ich mich recht entsinne, im Jahre 1921 sehr zeitig im Frühjahr in meinen Besitz. Sie waren keineswegs in Farbe, so daß man leider beide nicht unterscheiden konnte. Doch ging das Gefieder des Männchens nach einiger Zeit in eine teilweise Umfärbung über, die jedoch bald wieder ganz zurückging, um kurz darauf doch in richtiges Prachtgefieder auszuklingen. Oryxweber sind von ähnlich großen Feuerwebern ziemlich sicher daran zu erkennen, daß sie im grauen Federkleide auf der Brust senkrecht gestricheltes Gefieder tragen, ähnlich dem Rückengefieder.

Ich lasse hier die genaue Gefiederbeschreibung nach Neunzig, Fremdländische Stubenvögel folgen.

Männchen: Stirn, Scheitel, Kopfseiten, Kehle schwarz; Rücken rotbräunlich oder blaß scharlachrot; übrige Teile des Kopfes, Halses, Ober-, Unterschwanzdecken scharlachrot; übriger Unterkörper schwarz; Schenkel hell rostgelb, zuweilen scharlachrot verwaschen; Flügel, Schwanz schwarzbraun mit hellen Säumen; Unterflügeldecken hellbräunlich; Auge dunkelbraun; Schnabel schwarz; Füße hellbräunlich fleischfarben; Lg. 130—136, Fl. 70—78, Schw. 40—50, Schn. 15—16, Lf. 20—22 mm. Männchen im Winterkleid oberseits auf fahlbraunem Grunde mit breitem, dunkelbraunem Mittelfleck; schmaler Augenbrauenstreif rostgelblich; Kopfseiten, Unterseite fahlbräunlich, heller als oberseits, mit schwarzbraunen Schaftstrichen; Steißgegend, Unterschwanzdecken ohne Strichelung; Flügel, Schwanzfedern wie oben; Schnabel rötlichhorngrau; Unterschnabel heller. Weibchen wie Männchen im Winter, Kehle weißlich; infolge geringer Ausdehnung der schwarzen Mitte der Federn der Oberseite heller. Verbreitung: Südafrika, Kapkolonie, nördlich bis Angola und Maschonaland, meist auf feuchten Wiesen, im Rohrwuchs an den Rändern der Wasserstellen und Flüsse, auch an anderen Orten, wo er Nahrung (Samen) findet; macht an Getreidefeldern großen Schaden, im Winter zu großen Flügen von Tausenden, auch mit Finken und anderen Webern vereinigt umherstreichend, übernachten im Rohr oder Gebüsch; das Männchen im Brutkleid schwebt in bedächtig gleitendem Fluge über dem Röhricht, wobei das Gefieder, besonders das des Unterrückens, gesträubt, das des Halses wie eine Halskrause aufgerichtet ist, umtänzelt dann das Weibchen und zeigt sich ihm von allen Seiten; nistet oft in großen Kolonien im Rohre; das aus Gras und Schilfblättern gebaute Nest ist eiförmig, oben mit seitlichem Eingang, das Innere mit Grasrispen gepolstert; es ist zwischen 2—4 Rohrhalmen etwa 1—1,50 m über dem schlammigen Grund oder über Wasser angeheftet; Gelege: 4—5 bläuliche oder grünlichblaue Eier (19—25, 14—18 mm); Junge werden anfangs mit kleinen Käfern und anderen Insekten oder deren Larven ernährt.

Von alters her eingeführt, besonders Männchen, Weibchen selten; Wesen wie Orangeweber, stürmisch; befehdet zur Brutzeit Männchen der eigenen und nahestehenden Arten aufs heftigste; verfolgt Weibchen lange unter schnurrigem Balzen, dann noch erregter als andere, aber mehr zum Nisten in der Gefangenschaft geneigt. Züchtung mehrfach gelungen, baut etwa 1—1,50 m hoch in hängenden Birken- oder anderen Zweigen häufig mehrere ovale Nester aus Bast, Agavefasern, besonders gern aus frischem Gras mit Flugröhre. Gelege: 4—5 Eier, mehrere Bruten. Jugendkleid fahlbraun, Oberrücken dunkel schaftstreifig, unten weißlich; breiter Augenbrauenstreif fahlgelblich; gleicht mit zwei Jahren dem Weibchen, im dritten Jahre Prachtgefieder.

Nachdem diese Zeilen niedergeschrieben sind, komme ich zu der Erkenntnis, daß ich die in Rede stehenden Vögel schon im Jahre 1918 oder 1919 bekommen haben muß. Die gegenwärtig beschriebenen Brutnotizen entnehme ich meinem Taschenkalender vom Jahre 1921.

Oryxweber, die zu den Feuerwebern ihrer brennenden Farbenpracht wegen zu zählen sind, sind allgemein betrachtet etwas zierlicher als ihre Verwandten, wie Orange- und Napoleonweber u. a. m. Ihr Liebesspiel ist ganz wie das der Verwandten, Flügelheben

und -senken. Kopf im Nacken und den ganzen Körper senkrecht aufgerichtet, das Gefieder aufgeblasen zum Federball, so hüpft das Männchen vor seinem Weibchen und singt es mit zischenden und kreischenden Tönen an. So harmlos das Zischen und Kreischen der Webervögel wohl meistens auch bei den größeren Arten ist, meine Erfahrungen mit Oryxwebern geben wieder der auf Seite 405 des genannten Buches von Neunzig gegebenen Charaktereigenschaft recht. Mein Männchen ist ungemein stürmisch, kein Vogel darf sich in der Nähe aufhalten, so daß diesem Oryxweberpaar mit einem Schamapärchen eine große Abteilung meines Vogelhauses allein zur Verfügung gestellt werden mußte, wenn ich mir durch den im Paarungszustande teuflisch mordgierigen Gesellen nicht noch mehr, als geschehen, Vögel abmorden lassen wollte.

Die Oryxweber holten sich das jedem meiner Körnerfresser gereichte Grün. Ich gebe mit Vorliebe in Ähren stehende Grashalme. Am liebsten nehmen dieses sämtliche Samenfresser, wenn an den kleinen Ähren Blüten- oder Staubfäden hängen. Mit diesen Halmen im Schnabel geht's zu einem geeignet erscheinenden Zweig, der so hängt, daß dem beabsichtigten Flechtwerk des Nestes nichts im Wege steht. Nun wird zunächst ein kreisrunder ziemlich genau senkrecht stehender Reif gewebt von etwa 8 cm Durchmesser. Gleichzeitig beginnen sie an mehreren Stellen solche Reifen einzuflechten, und schließlich, ehe man sich versieht — bei mir in der Zeit von zwei Tagen —, ist ein Nest fertig. Der senkrechte Reif wird nach oben und vorn weiter überbaut, seine untere Hälfte dient als Fußpunkt beim Ein- und Ausschlüpfen. Der Nestkorb wird in Verbindung mit dem vorderen Überbau als ein sackartiges Gebilde gewebt. Innen etwas ausgepolstert, fand ich in allen zwei Zuchtjahren, daß nur das Legenest als Auspolsterung Daunen und zarte Federchen enthält. Infolge der mit vielen Dutzend Webernestern gesammelten Erfahrungen habe ich an eine wirkliche Brut gar nicht gedacht, um so befriedigter fand ich denn, daß das mit Federchen gepolsterte Nest nach Abflug des Weibchens 2 blaugrüne Eier enthielt. Auch die weiteren 3 Bruten im ersten Zuchtjahre enthielten je 2 Eier. Im zweiten Zuchtjahre wurde in einem Harzerkörbchen zur Abwechslung ein Nest gebaut. Es wurde mit 3 Eiern belegt, während 2 Eier auf dem Boden sich befanden.

In Augenhöhe über dem Erdboden, Einschlüpfloch stets nach Südwest angebracht, war die Beobachtung des brütenden Weibchens leicht. Ich habe außer bei Kanarien keine bessere Brüterin und Mutter gefunden als das in Rede stehende Oryxweberweibchen. Selbst unter das brütende Tierchen fassend, konnte ich mich von den Eiern und später den Jungen überzeugen. Nach meinen Notizen war die 1. Brut junger Oryxweber im Juli 1921 bei mir ausgeschlüpft, die 3. Brut am 14. Okt. 1921. Bei den Jungen fällt auf: Schnellwüchsigkeit, hohe Beine, sehr kurzer Schwanz, selbst nach dem Ausfliegen ist dieser noch bescheiden kurz und steht in keinem Verhältnis zu der sonst fertigen Körperverfassung der Jungvögel. Der Schweif holt erst nach dem Ausfliegen das nach, was ihm im Nest äußerst hinderlich gewesen wäre. Die Jungen wurden am vierten Tage nach dem Schlüpfen mit geschlossenen Fußringen versehen. Als äußerst kräftige Jungvögel flogen sie bald herum und wurden außerhalb des Nestes vom Vater nicht gefüttert.

Als Aufzuchtfutter wurde genommen: Feingehacktes hartgekochtes Hühnerei mit Vogelbiskuit und frischen oder aufgebrühten Ameisenpuppen gemischt. Daneben gereichte Heuschrecken wurden mit Gier genommen, zerkaut und den Jungen gereicht.

Eines Tages kam ich noch gerade zur rechten Zeit, um zu sehen, wie der Vater eines seiner selbständigen Jungen skalpierte. Dieser Vogel war verloren. Die anderen Jungen sperrte ich sodann ab, wenn der Schutz, den sie durch die fütternde Mutter hatten, nachließ, was sich zeitig mit dem Selbständigwerden der Jungvögel deckt. Bis dahin läßt sie der Vater in Ruhe. Aber wehe dann! Kaum ist das Weibchen zu einer neuen Brut bereit, so überkommt dem Vater mit dem Paarungstriebe auch die Mordgier, und Sie können es glauben oder nicht, solch einen Mordteufel habe ich noch nicht besessen.

Er war ein guter Vater bis zur Selbständigkeit der Jungen, aber nach drei Zuchtjahren habe ich ihn fortgegeben. Er wird die Reise über den großen Teich überstanden und — bei seiner Veranlagung bestimmt annehmbar — seine Art in Amerika fortgepflanzt haben, sofern ihm dort Ersatz für das hierbehaltene Weibchen gegeben wurde. Der ungewöhnlich liebenswürdige Besitzer einer der besten deutschen Großhandlungen gab mir für ihn andere Vögel und mit einem ganz gewaltigen Weber-, Witwen- und Kanarien-Transport hat er das Land des Dollars erreicht.

Das Zuchtweibchen und ein Junghahn, die ich behielt, fielen der Zeit zum Opfer, die es mir unmöglich machten, jeden Schaden am Vogelhaus rechtzeitig abzustellen. Unter den ausgleitenden Fußtritten unserer dicken Putzfrau zerbrach eine Drahtglas-Dachscheibe. Das große Loch zu melden, „bin ich vergessen", so sagte die Dicke, und als ich's merkte, waren u. a. auch meine weiteren Oryxweberhoffnungen zerstört.

Düsseldorf, Juni 1924.

Garnelenschrot und Dörrfleisch als Weichfresserfutter.

Von Helmut Hampe.

(Nachdruck verboten.)

Angeregt durch den Artikel des Herrn M. Jacobs in Heft 24 der „Ges. Welt" vom 31. Juli 1924, möchte ich in folgendem über meine Erfahrungen in diesem Sommer bei der Verfütterung von Garnelenschrot und Dörrfleisch an Weichfresser berichten. Da die im Handel befindlichen fertig gemischten Universalfutter unverhältnismäßig teuer sind, trotzdem sie — wenigstens die mir bekannten — Ameiseneier meist nur verschwindend wenig enthalten, vielmehr zum größten Teil aus Zwieback bestehen, beschloß ich, in diesem Frühjahr ein Weichfresserfutter selbst zusammenzusetzen, das bedeutend billiger, doch ebenso gut, wenn nicht besser wie ein fertiges Universalfutter sein sollte.

Wenn der Grundsatz zu Recht besteht, daß Insektenfresser am naturgemäßesten mit fleischlichen Stoffen zu ernähren sind, käme als geeigneter Ersatz am ehesten Garnelenschrot, Dörrfleisch und Fischmehl in Betracht, wenn man von den allzu teueren und noch dazu oft kaum zu beschaffenden Ameiseneiern und Weißwurm absieht. In zweiter Linie wäre Zwieback, evtl. auch Erbsen-, Hanf- und Mohnmehl zu berücksichtigen. Mit letzteren, ebenso wie mit Fischmehl, das oft etwas reichlich Salz enthalten soll, habe ich bislang keine Versuche gemacht. Garnelenschrot und Dörrfleisch werden von verschiedenen Küken- und Hundefutterfabriken angeboten, meist zu einem Preise von etwa 3—4 M. für das 9-Pfd.-Paket frei Haus. Das ist also 3—4 mal billiger wie ein gutes Universalfutter. Ich bezog meinen Bedarf von der Firma Beck in Elze bei Hannover. Das Garnelenschrot hatte den bekannten Seegeruch; das Dörrfleisch wird in verschiedenen Formen hergestellt, als Grieß, Mehl, Schrot, Stücken und anderen. Für Vögel kommen wohl nur die beiden ersten in Betracht. Der Fleischgrieß roch angenehm, genau wie Liebigs Fleischextrakt, das Mehl dagegen machte keinen angenehmen Eindruck, es sah nicht gerade schön aus und roch auch nicht angenehm, doch durchaus nicht etwa faulig. Die Vögel, deren Geruchsvermögen ja nicht sehr ausgebildet ist, fressen scheinbar beides gleich gern. Es ist nun die Frage, welches man vorziehen soll. Vielleicht ist das Mehl leichter verdaulich und wird besser ausgenutzt als der gröbere Grieß. Auch das Garnelenschrot enthält manche größere Stücke. Vielleicht ist es vorteilhaft, auch dieses fein gemahlen zu verwenden, ebenso die übrigen Zusätze. Man bekäme dann ein sehr inniges Gemisch, aus dem die Vögel sich nicht besonders Zusagendes herausholen könnten. Das hat zweifellos viel für sich, doch habe ich eigentlich immer gefunden, daß die Tiere ein etwas gröberes Gemisch vorzogen. Ich glaube, daß beide Arten ihre Berechtigung haben. Vielleicht wäre für zarte Vögel die feine Mischung vorzuziehen; ich kann mir darüber kein abschließendes Urteil erlauben.

Beim Zusammensetzen der Mischung nahm ich etwa 3—4 Teile Garnelenschrot und 1 Teil Fleischmehl oder -grieß. Letzterer muß vor Gebrauch einige Stunden eingeweicht werden. Man nimmt soviel Wasser, daß die betreffende Portion gut davon bedeckt ist. Es quillt stark auf und wird fast wie frisches Fleisch. Ausdrücken halte ich nicht für zweckmäßig, da dadurch vielleicht wertvolle Nährstoffe verlorengehen. Außerdem setze ich der Mischung 1 bis 2 Teile Zwiebackmehl oder statt dessen ein einfacheres Universalfutter ohne Ameiseneier zu. Alle paar Tage gebe ich eine Kleinigkeit in Wasser aufgelöstes Dr. Lahmannsches Pflanzennährsalzextrakt hinzu. Angefeuchtet wird das Ganze in der üblichen Weise mit Mohrrübe oder gelegentlich mit Wasser, Milch und anderem. Doch habe ich bislang beobachtet, daß er mit Mohrrübe am liebsten genommen wird.



Oryxweber (s. S. 225).

Je nach dem Ernährungszustand der Tiere kann man natürlich die Mischung verändern, mehr Möhre — evtl. welke Möhre — und Zwieback nehmen oder umgekehrt. In der kritischen Zeit der Mauser und gegen Ende des Winters wird es sich empfehlen, frische, bzw. getrocknete, gut aufgequellte Ameiseneier und Mehlwürmer zuzusetzen. Aber auch sonst gebe ich als Zugaben zu obigem Hauptfutter, um den Speisezettel abwechslungsreich zu gestalten und den Tieren manche in den gedörrten Nahrungsmitteln vielleicht fehlenden Stoffe zuzuführen, in bunter Folge die verschiedensten Leckerbissen, als lebende Tiere, wie Raupen, Käfer, Würmer, Schnecken u. a., Beeren, Früchte, Grünzeug, Milchhaut, Milchsemmel, rohes Fleisch, Kartoffeln und anderes mehr.

Dieses Futtergemisch verabreiche ich seit über zwei Monaten an 5 Nachtigallen, 3 Rotkehlchen,

2 Gartengrasmücken, 2 Schwarzplättchen, 2 Singdrosseln, 1 Tüpfelsumpfhuhn. Sämtliche Vögel, bis auf 1 Nachtigall und das Sumpfhuhn, habe ich dies Jahr aufgepäppelt. Die Drosseln und das Sumpfhuhn sitzen in Einzelkäfigen von je etwa 60 × 88 ⊥ 100 cm, die übrigen in einem Flugkäfig von 240 × 80 ⊥ 100 cm. Den nächsten Frühling will ich mit ihnen in meiner Gartenvoliere Zuchtversuche anstellen. Nach dem Selbständigwerden bekamen sie noch eine Zeitlang frische Ameiseneier und wurden dann allmählich an obiges Futtergemisch gewöhnt. Sie fressen es recht gern, sind munter und im guten Ernährungszustand. Zum Teil sind sie schon tadellos vermausert. Eine Drossel und 2 Nachtigallen „dichten" eifrig. Dabei sind so junge und noch dazu aufgepäppelte Tiere im allgemeinen doch besonders empfindlich.

Bis jetzt sind also die Erfolge mit diesen Futtermitteln durchaus zufriedenstellend, doch läßt sich natürlich noch kein abschließendes Urteil fällen. Dazu ist die Beobachtungszeit zu kurz. Man muß erst abwarten, wie die Tiere durch den Winter kommen und ob sie mit ihrem Gesang nicht zurückhalten werden. Doch hoffe ich fest, zu gegebener Zeit günstig darüber berichten zu können.

Neueinführungen und Seltenheiten.

Von Karl Neunzig.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Die ersten Mitteilungen über das gesellige Nisten des Ani gibt Buffon, der sagt, daß die „gesellige Gemütsart" dieses Vogels so groß sei, daß mehrere zusammen in einem Nest die Eier ablegen und bebrüten und es dementsprechend sehr groß bauen, und zwar richte sich die Größe nach der Zahl der Kameraden, mit denen zusammen sie brüten wollen. Man habe 5—6 Weibchen in einem Nest brüten sehen. Ähnliches berichtet Azara, hat aber ebenso wie Burmeister und Schomburgk den Ani nur immer paarweise brütend gefunden. Azara ist der Ansicht, daß die Vögel in seinem Beobachtungsgebiet große zum gemeinsamen Brüten geeignete Nester nicht bauen infolge der häufigen Störungen, denen sie dort ausgesetzt seien. Die Baue, die er gefunden, waren nur von sehr mäßigem Umfang und enthielten 5—6 Eier. Bestimmte Mitteilung über das gesellige Nisten bringt Euler. Er fand Nester mit 11 Eiern, beobachtete bei demselben Nest Junge in verschiedenem Alter, z. T. noch im Nest, z. T. auf den Zweigen in der Nähe des Nestes. Auf den beobachteten Nestern fand er mehrere Vögel brütend, stets aber in der Nähe des Nestes 4—10 erwachsene Vögel. Die Nester standen in dem oberen Gezweig von Limonen- und Orangenbäumen im Laube versteckt. Sie hatten die Form einer breiten, flachen Mulde und waren auf einer dicken festen Unterlage aus Reisern und Pflanzenstengeln erbaut und innen mit grünen Blättern ausgelegt. Die Eier lagen in Schichten von 4 bis 5 Stück übereinander, häufig mit den zur Auskleidung des Nestes verwendeten grünen Blättern vermischt. In ähnlichem Sinne berichten auch andere Forscher, wie Hill und Gundlach.

Die Eier des Ani sind von hellbläulich grüner Grundfarbe. Diese Farbe ist aber völlig durch eine kartenblattdicke kreidige Kalkschicht verdeckt. Sie erscheinen also kreideweiß (34 × 24 × 25 mm).

Gefiederbeschreibung: ♂♀ schwarz, Federn an Kopf und Hals mit bronzefarbenen, an Rücken, Kropfgegend, Brust, Bauch mit breiten stahlblauglänzenden Säumen; Flügel mit veilchenfarbenem Glanz; Auge dunkel; Schnabel, Füße schwarz; Lg. 35 36; Fl. 13—15; Schw. 17—18 mm.

Jugendkleid: Gefieder ohne Glanz; Federn des Kopfes und Halses wollig; Schnabel ohne kammartig erhöhte Firste.

Die auf S. 219 und S. 221 abgebildeten Vögel, seltene Gäste auch im Vogelhaus des Berliner Zoologischen Gartens, gehören zu der Gattung Habia — Saltator. Habias sind größere Vögel mit starkem, gestrecktem Schnabel, der an der Spitze mit einem schwachen Haken versehen ist und eine flache Zahnauskerbung vor ihr zeigt. Die Gattung wird wegen der Form des Schnabels häufig zu den Tangaren gestellt. Reichenow, Ridgway und andere stellen sie zu den Finken, der letztere in die Reihe der Kardinäle (Cardinalis).

Die Habias bewohnen in etwa 25 Arten die tropischen und subtropischen Striche Amerikas. Ihr Verbreitungsgebiet erstreckt sich von Südmexiko bis zum südlichen Brasilien und über einige der Kleinen Antillen.

Habias sind Baumvögel, welche z. T. in Wäldern leben, während andere hauptsächlich niederes Gebüsch, besonders Hecken und lebende Zäune, vorziehen. So fand Frantzius, welcher die

Riesenhabia — S. grandis *(Lcht.)*

in Kostarika beobachtete, diesen Vogel zur Brutzeit in den Hecken und in der Nähe von Ortschaften sowohl in der Ebene wie im Gebirge. Sie belebten mit anderen Verwandten, wie S. magnoides, und mit der kleinen Musendrossel und der sangesbegabten Graysdrossel die auf der Hochebene längs der Wege überall angepflanzten Heckenzäune, welche sie gewandt durchschlüpfen. In diesen bauen sie auch ihr napfförmiges Nest, das ziemlich locker aus allerlei Genist hergestellt ist. Sie sind keine guten Flieger, und auch auf dem Erdboden bewegen sie sich nicht besonders gewandt. Ihre Stimme ist laut, und manche Arten sollen gute Sänger sein. Leider fehlen darüber genauere Angaben aus dem Freileben wie aus der Gefangenschaft. Da die Geschlechter gleichgefärbt sind, ist es möglich, daß bei der sehr seltenen Einführung von Habias Männchen bisher nur in sehr geringer Zahl in die Hände von Liebhabern gelangten. Da sie Früchte, Beeren-, Blatt- und Blütenknospen neben Insekten und Sämereien verzehren, werden sie in den Gärten der menschlichen Niederlassungen schädlich.

Die Riesenhabia — S. grandis (*Lcht.*) (Abb. S. 219) ist bisher nur einmal in den Berl. Zool. Garten gelangt, und zwar im Jahre 1911 mit einem der ersten größeren Importe August Fockelmanns aus Mexiko. Ihr Verbreitungsgebiet erstreckt sich durch das südöstliche Mexiko südwärts bis Kostarika.

Gefiederbeschreibung: Oberseits tiefbräunlichgrau, an Bürzel und Oberschwanzdecken mehr oder weniger olivgrün überlaufen; Kopfseiten und Hals tiefbraungrau ein breiter weißer Augenbrauenstreif und ein ebensolcher

Streif über Kinn und Kehle, dieser, zuweilen gelblich verwaschen, ist an den Seiten durch ein schwarzgraues Band begrenzt; Brust, Brustseiten dunkelgrau oder olivgrau, zuweilen stark mit hellgelblichbraunen Federn vermischt, ebenso die Flanken; übrige Unterseite hellzimmetbraun; Flügelfedern wie Oberseite, Unterflügeldecken hellgelblichbraun; Schwanz wie oberseits, etwas mehr ins Braune gehend; Auge dunkel; Schnabel, Füße schwarzbraun; Lg. 18,7—23,7; Fl. 71—105; Schw. 86—108; Schn. 18—22; Lf. 25—28 mm.

Die bekannteste der drei abgebildeten Arten ist die

Buntkehlhabia — S. magnus *(Müll.)*.

Sie lebt in den Wäldern, im dichten Hochwalde wie im offenen Buschwald, ihres weiten Verbreitungsgebietes, welches die nordwestlichen Staaten Südamerikas, südlich bis zum südöstlichen Peru, aber auch Venezuela, Guiana und große Teile Brasiliens umfaßt.

Gefiederbeschreibung: ♂♀ oberseits olivgrün, Kopfseiten aschgrau, matter Augenbrauenstreif weiß; unterseits hellaschgrau, mehr oder weniger mit Rotbraun gemischt; Kinn, Kehle weiß mit schwarzem Seitenstreif; Kropfgegend rostgelb, allmählich in das Grau der Unterseite übergehend; Aftergegend rostgelb; Flügel, Schwanz wie Oberseite olivgrün; Unterflügeldecken rostgelb Auge rotbraun; Schnabel schieferschwarz, Grund des Unterschnabels weißlich; Füße schiefergrau; Lg. 137, Fl. 90, Schw. 87 cm.

Waren die beiden vorstehenden Arten bisher sehr selten eingeführt, so handelt es sich bei der dritten Art, welche der Buntkehlhabia nahesteht und sie im nördlichen Gebiete vertritt, um eine Neueinführung.

Die Gelbkehlhabia — S. magnoides magnoides Lafr.

lebt im südlichen Mexiko und in Kostarika. Bei der Besprechung der Riesenfabia wurde erwähnt, daß Frantzius sie mit jener zusammen in den Heckenzäunen

Grünflügelara (s. S. 209).

an Wegen beobachtet hat. Im übrigen wird sie in der Lebensweise kaum von den verwandten Arten abweichen.

Gefiederbeschreibung: ♂♀ Stirn, Scheitel rauchschwarz, auf dem Hinterkopf in Dunkelgrau übergehend; übrige Oberseite gelblicholivgrün; schmaler Augenbrauenstreif, der kurz hinter dem Auge endigt, Längsstreif über Kinn und obere Kehle weiß, letztere zuweilen schwarz gefleckt, untere Kehle gelblich ockerfarben, die helle Zeichnung des Vorderhalses ist durch ein breites schwarzes Band umsäumt; Kopfseiten dunkel schiefergrau; Unterschwanzdecken gelblich ockerfarben, Federmitte zuweilen oliv überlaufen; übrige Unterseite schiefergrau; an den Seiten olivfarben, am Bauch zuweilen ockerfarben überlaufen; Auge rotbraun; Schnabel schwarzgrau, Unterschnabelwurzel heller; Füße dunkel horngrau; Lg. 19,3—21,5, Fl. 91,5—10,4; Schw. 93—102 mm.

Die wenigen bisher eingeführten Habias haben sich in der Gefangenschaft unter allen Verhältnissen als anspruchslose und sowohl untereinander als mit anderen Vögeln verträgliche Bewohner der Käfige

Sie ist gewandter als andere Habias, weniger scheu und läßt häufig ihre lauten durchdringenden Pfeiftöne hören. . Euler (Beiträge zur Naturgeschichte der Vögel Brasiliens) nennt sie einen im niedrigen Gebüsch häufigen Vogel. „Sein Nest fand ich in der der Kapoeira am Boden auf einem herabgefallenen dürren Ast in dessen Zweiggabel erbaut. Die Hauptbestandteile des geräumigen Napfes sind sehr große, breite dürre Blätter, welche gut, doch locker, zusammengesteckt sind, von wenigen Pflanzenstengeln durchzogen und gehalten. Die Nestmulde ist mit Wurzeln, feinen Halmen und Ranken ausgelegt." Die beiden Eier des Geleges waren glänzendblaugrün mit feinen schwarzen kreuz und quer durcheinanderlaufenden Querlinien bedeckt (24—30×18—19 mm). Burmeister fand das Nest im niedrigen Unterholz aus Farnkrautstengeln, kleinen Zweigen und Moos erbaut. In der Nahrung stimmt diese Habia mit der vorstehenden überein.

und Vogelstuben gezeigt. Eine einzelne Habia müßte im Drosselkäfig oder in noch größerem Behälter untergebracht werden. Ein gutes Drosselfutter mit Beigaben von allerlei süßem frischem oder getrocknetem Obst, Beeren, Mehlwürmern, Ameisenpuppen wäre zu reichen, daneben Sämereien wie Hirse, Spitzsamen, Sonnenblumenkerne. Die Samen werden im Schnabel mit den Hülsen zerkleinert durchkaut und dann heruntergeschluckt. (Fortsetzung folgt.)

Zur Pflege unserer heimischen Finkenvögel.

Von Berta Schuster.

(Schluß.) (Nachdruck verboten.)

Aus der Familie der Kreuzschnäbel gelangt ja am häufigsten der Fichtenkreuzschnabel in die Käfige der Liebhaber. Auch er wird am besten allein mit seinen Artgenossen zusammen gehalten, da er, wie schon erwähnt, anderen Vögeln wegen seines kräftigen Schnabels gefährlich werden kann. Selbstverständlich ist er auch häufig und ohne Schaden mit anderen Finken zusammen gehalten worden. Seine Ernährung ist ähnlich der des Bergfinken. Ihm reicht man noch Fichtenzapfen mit Samen, die er sehr gern zerknabbert. Seine schöne Färbung und sein unterhaltendes Benehmen machen ihn zu einem liebenswürdigen Stubenvogel. Die Züchtung des Kreuzschnabels ist bisher selten gelungen. Er brütet ja in der frühen Jahreszeit, von Januar bis April. Kiefern- und Bindenkreuzschnäbel gelangen selten auf den Vogelmarkt und in die Käfige der Vogelfreunde.

Durch sein schönes Federkleid, seine Zahmheit und die Fähigkeit, Lieder nachpfeifen zu können, sind dem Gimpel viele Freunde zugeführt. Manche dieser schönen Vögel sind oft hinfällig und gehen plötzlich ein, andere wieder erreichen in der Gefangenschaft ein hohes Alter. Seine Eingewöhnung verursacht im allgemeinen keine Schwierigkeiten. Neben den üblichen Sämereien frißt er gern Heidekraut- und Beifußsamen und Ebereschenbeeren. Jung aufgezogene Gimpel bleiben sehr zahm und sind allerliebste Stubenvögel. Die Aufzucht der Körnerfresser ist im allgemeinen schwieriger als die der Weichfresser. Am besten eignen sich hierzu nicht ganz flügge Junge, bei denen gerade die Federkiele durchsprießen. Sie sind meist sehr schnell zum Sperren zu bewegen. Den jüngeren Vögeln reicht man zunächst Insekten und Ameisenpuppen, dann gewöhnt man sie, nach meinen Erfahrungen am besten, an irgendein Hafermehlpräparat, das mit frischen Ameisenpuppen durchmischt wird. Erst allmählich mengt man zerquetschten gequollenen Rübsen dazwischen und gewöhnt die Vögel zunächst an gequollenen Rübsen, um sie allmählich an die üblichen Sämereien im harten Zustande zu gewöhnen. Die Zeit des Selbständigwerdens ist bei den Körnernfressern die kritischste. Wenn bei der Aufzucht und allmählichen Gewöhnung an Körnerfutter der Liebhaber nicht behutsam vorgeht, wird er manchen Verlust haben. Gimpel sind



Alpenlerche (s. Redaktionsbriefkasten unter „Herrn F., Karlsruhe").

schon wiederholt in der Gefangenschaft gezüchtet worden. Leider verblaßt bei diesem schönen Vogel häufig das Rot in der Gefangenschaft, so wie es beim Bluthänfling, Birkenzeisig, Berghänfling und Karmingimpel der Fall ist. Karmingimpel und Hakengimpel gelangten bisher nur selten in unsere Käfige. Doch sind diese schönen Vögel für unsere Käfige und Volieren eine Zierde.

Wohlbekannt und wohlgelitten in den Käfigen der Liebhaber ist der kleine Girlitz. Er wird sehr zutraulich und angenehm. Im Flugraum ist er verträglich. Nur zur Brutzeit ist er sehr raufluſtig. Seine Ernährung ist wie die der anderen Finken: Rübsen, Mohn, Salat, Spitzsaat, Erlen- und Birkensaat. Er ist wiederholt gezüchtet worden, doch weit mehr sind Mischlinge von ihm mit Kanarienvögeln gezüchtet worden.

Neben dem Buchfinken gilt als hervorragendster Sänger unserer heimischen Finkenvögel der Bluthänfling. Des Gesanges wegen wird er häufig einzeln im Käfig gehalten. Er ist meist etwas scheu

und wird wohl niemals so zahm wie Gimpel und Zeisig. Seine Ernährung im Käfig geschieht am besten mit Rübsaat, wenig Leinsaat und Spitzsaat, als Zugaben ab und zu etwas Mohn und gequetschter Hanf. Im Flugraum ist er ein scheuer Gesell, der allerdings auch hier seinen schönen Gesang ertönen läßt. Seine Züchtung ist selten gelungen.

Ganz das Gegenteil vom Bluthänfling ist der Birkenzeisig. Anfangs etwas scheu, wird er wie sein Vetter, der Berghänfling, bald zahm und zutraulich. Beide sind liebliche Vögel, die sich schnell das Herz des Pflegers erobern. Ihre possierlichen, netten Bewegungen, die besonders im Flugraum zur Geltung kommen, machen jedem viel Freude. Es lohnt wohl, von ihnen eine größere Anzahl im Flugraum zu halten. Auch ihr schmuckes Federkleid besonders das des Birkenzeisigs, machen sie zur Zierde des Käfigs. Die Ernährung der beiden Arten, die in den letzten Jahren häufig im Handel waren, macht keine Schwierigkeiten. Ihre Züchtung ist selten gelungen. Ihnen reiht sich, was Zahmheit und Zutraulichkeit anbetrifft, der Erlenzeisig an. Er ist mir der liebste aller heimischen Körnerfresser, und ich möchte ihn nie missen. Sein drolliges Benehmen und der ulkige Gesang des Männchens machen ihn zum Freunde des Vogelpflegers. Sehr nett war eine Gesellschaft von einigen Paar Zeisigen, die ich vor Jahren in meiner Vogelstube mit einigen Stieglitzen zusammen hielt. Besonders niedlich war es, wenn die ganze Gesellschaft im Herbst an den Stauden der Nachtkerzen, die ich ihnen hineingestellt hatte, herumturnte und die Samen aus den Hülsen fraß. Die kleinen Zänkereien, die kleinen Turnkunststückchen und all ihr Benehmen kann man stundenlang genießen. Ihre Züchtung ist verschiedene Male gelungen, auch wurden häufig Mischlinge mit Kanarien gezogen.

Einer der schönsten heimischen Finken ist zweifellos der Stieglitz. über den schon vieles berichtet worden ist. Er gleicht etwas im Benehmen dem Zeisig, doch scheint er mir weniger zutraulich zu sein. Eine Züchtung ist wiederholt gelungen. Die Fütterung all dieser kleinen Arten der Finken macht wenig Schwierigkeiten: Rübsaat, Spitzsaat, Mohn, Erlen- und Birkensamen, Salat- und Nachtkerzensamen und andere mehr werden von ihnen gern genommen. Viele Finkenvögel neigen leicht zur Fettsucht, die oft ihren Tod zur Folge habt; ihr Körperzustand muß stets kontrolliert werden, um danach die Fütterung zu richten.

Zum Schluß möchte ich noch den Grünling, der häufig in der Gefangenschaft gezüchtet wurde, und den Kirschkernbeißer erwähnen. Beide verdienen die Beachtung der Liebhaber, und ihre Pflege ist lohnend.

Am Schlusse meiner Zeilen angelangt, hoffe ich, daß sie dazu beitragen werden, den heimischen Finkenvögeln einige Freunde zu gewinnen. Neues haben sie nicht gebracht. Die Haltung der ausländischen Vögel scheint jetzt im Vordergrunde zu stehen, was ja nach den Jahren des Mangels an Ausländern erklärlich ist. Doch mancher Liebhaber kann sich aus Mangel an den nötigen Mitteln oder hauptsächlich aus Mangel an einem geheizten Raum, in welchem er im Winter seine Pfleglinge unterbringen kann, keine Exoten halten, und er wird daher zu den heimischen Arten greifen. Da gibt es noch vieles zu beobachten. Abgesehen vom Grünling und Girlitz sind die heimischen Finken nicht häufig gezüchtet worden, einige ja sogar recht selten. Oft fehlen die biologischen Angaben, die ausgefüllt oder neu bestätigt werden können. Auch bietet die Mischlingszucht Verlockendes genug.

Schmalschnabelkardinal
(s. unter Kl. Mitteilungen).

Kleine Mitteilungen.

Fußkrankheiten beim grauen Hänfling. Ich halte u. a. seit mehreren Jahren in Einzelkäfigen (50 cm) (Fabrikat Flemming, Globenstein) stets mehrere graue Hänflinge. Trotzdem ich darauf achte, daß die Sitzstangen nicht glatt werden und verschieden stark sind, habe ich des öfteren bemerkt, daß sich die Hänflinge mit der Zeit die Ballen unter den Zehen, hauptsächlich am hinteren Zeh, breit treten und sich schließlich wunde Druckstellen bilden, die dem Vogel Schmerzen bereiten, daß er meist mit dem ganzen Körper auf der Stange liegt. Vor einigen Jahren hatte ich einen

prächtigen Hänfling, bei dem dieses Übel sehr böse auftrat und alle Heilungsversuche, das Auswechseln der Sitzstangen und nach Angabe eines Vogelhändlers Einreiben der Füße mit Zinksalbe nichts nützten, so daß ich ihn schließlich schweren Herzens fliegen lassen mußte. Augenblicklich leidet mein bereits im fünften Jahre gekäfigter Hänfling an dieser Fußkrankheit. Bei diesem Vogel hatte ich noch nie etwas gemerkt, und jetzt seit einiger Zeit zeigen sich an den Hinterzehen diese Entzündungen. Ob dies vielleicht auf die etwas stark gewählten Sitzstangen zurückzuführen ist? Ich habe sofort sämtliche Sitzstangen entfernt und diese durch frische noch mit rauher Rinde umgebene Stangen aus Tannenholz ersetzt. Die Füße des Vogels betupfe ich von Zeit zu Zeit mit leichter Jodtinktur. Nach meinen bisherigen Beobachtungen ist bereits eine Besserung eingetreten; der Hänfling sitzt wieder ganz aufrecht auf der Stange und hüpft ohne Zeichen von Beschwerden lebhaft umher. Ich hätte nun gern aus Liebhaberkreisen Beobachtungen über gleiche und ähnliche Fälle sowie deren Behandlung gehört. Dankbar wäre ich besonders für Mitteilungen, was man für die Heilung getan hat, und ob Sitzstangen mit Rinde und Behandlung mit Jodtinktur zweckmäßig sind.

F. Hempel.

Frühjahrsbeobachtungen. Erste Beobachtung bei Leipzig. 6. 1. 3 Gänsesäger, 26. 2. Stare, 9. 3. Kiebitz, 16. 3. Ringeltaube, 21. 3. Singdrossel, 23. 3. Lachmöwe, Rotschenkel, 28. 3. Blaukehlchen, Bekassine, Weidenlaubvogel, Hausrotschwanz, 30. 3. Rohrammer, Löffelenten, Wasserhuhn, 31. 3. Rotkehlchen (Hauptzug), Wiesenpieper, 1. 4. Höckerschwan (Sumpfgelände bei Gundorf), 11. 4. Rauchschwalbe, 15. 4. Zaungrasmücke, 18. 4. Trauerfliegenschnäpper, Baumpieper, Gartenrotschwanz, Fitis, Knäck-, Pfeif-, Spießente, 19. 4. Nachtigall, Mönchgrasmücke, 24. 4. Mauersegler, 26. 4. Kuckuck, Wendehals, Steinschmätzer, 3. 5. Gartensänger, Drosselrohrsänger, 10. 5. Gartengrasmücke, Pirol, Schwirl, grauer Fliegenschnäpper, 25. 5. Wiedehopf, 22. 6. Nachtschwalbe. Karl Scholtissek, Leipzig-Plagwitz.

Unter der Bezeichnung „**Kardinäle**“ werden gewöhnlich von den Liebhabern und im Vogelhandel zwei Gattungen von Vögeln vereinigt (oder gar drei, wenn der „**grüne** Kardinal“ einbezogen wird), die eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben. Gemeinsam ist ihnen mit wenig Ausnahmen der rote Federschopf auf dem Oberkopf. Die Gattung der roten Kardinäle — Cardinalis unterscheidet sich vor allem durch die Form des Schnabels von den grauen Kardinälen — Paroaria. Die Angehörigen der ersteren Gattung sind Kernbeißer, ihr Schnabel ist ein Kernbeißerschnabel, der bei dem auf S. 231 abgebildeten Schmalschnabelkardinal am stärksten ausgeprägt ist. Der Schnabel der Graukardinäle ist gleichfalls kräftig, aber gerade ohne Zahn und Haken. Auch die Nahrung beider Gattungen ist eine ganz verschiedene, soweit es sich um pflanzliche Nahrung handelt. Die roten Kardinäle fressen hauptsächlich ölhaltige Samen, Blattknospen, Beeren und Früchte, während die grauen Kardinäle hauptsächlich mehlhaltige Samen neben Grünkraut usw. verzehren, also ein ähnliches Nahrungsbedürfnis haben wie unsere Ammern.

Vom Vogelmarkt.

Von seltener auf den Vogelmarkt kommenden Vögeln werden angeboten:

Beck, Tierimport, Stuttgart: Blutschnabel-, Dottergelbe, Maskenweber, Mönchsittiche, Stieglitz×Zeisig-Bastarde, Gelbkopfamazone, Elstern, Raben, Dohlen, 1,2 Alpensteinhühner.

N. Diwersy, Merzig a. Saar, A. Z.-Mtgl. 183: Zuchtpaar Weißkehlpfäffchen.

Homann, Stettin, Kochstr. 15: Doppelgelbköpfe.

E. W. Lenger, Berlin N. 58, Schönhauser Allee 70a, Fernruf Humboldt 5730: Gelbnacken-Amazonen, Mohrenkopfpapageien, kl. Gelbhaubenkakadus, gr. Gelbhaubenkakadus, Weißhaubenkakadus, jg. Alexandersittiche, Kaktussittiche, mex. Grünhäher, Glockenvogel, Rotbauchdrossel, Damadrossel, Dayaldrossel, rote Kardinäle, rotrückige Würger, mex. Karmingimpel, Tahaweber, Papstfinken, Mövchen, Nachtigall-Edelkanariensänger, reinweiß und schwarzgescheckte.

Jos. Vorzelt, München, Klarastr. 3, A. Z.-Mtgl. 19: 1,1 Goldstirnsittiche, braunbt. Mövchen, 1,1 Safranfink.

Pracht, Düsseldorf-Gerr.: 1,1 Rosella, 1,1 Schama, 1,1 schwarzbl. Tangaren, 1,0 bl. Zuckervogel.



Herrn F, Karlsruhe. Wenn ihnen aus Tirol eine Alpenlerche mitgebracht worden ist, so ist es wohl möglich, daß dieser Vogel, vorausgesetzt, daß es sich wirklich um die auf S. 230 abgebildete Alpenlerche und nicht um die Alpenbraunelle (s. Abb. S. 3) handelt, in Tirol gefangen ist, und zwar als ein in Tirol sehr seltener Wintergast. Möglich ist auch, daß der Vogel im nördlichen Gebiete gefangen und von hier nach Tirol gesandt ist. Nach den vorliegenden Veröffentlichungen ist es nur in 3 Fällen erwiesen, daß diese Lerche in Tirol vorgekommen ist. Sie ist ein nordischer Vogel, der trotz seines Namens mit den Alpen nichts zu tun hat.

Herrn L. B., Calefeld; J. G., Neuulm, Herrn Dr. te K., Bad Salzschlirf ist brieflich Bescheid zugegangen.

Herrn A. F., Hemelingen; Herrn K. S., Leipzig-Plagwitz; Frl. L. H., Aubstadt; Herrn A. M., Mainz; Herrn R. M., Wien: Beiträge dankend erhalten.

Herrn Dr. te K., Salzschlirf. Karte ist mit Adresse versehen weiter befördert.

Herrn M. M., Dresden. Eine sachliche Kritik der gekennzeichneten Umstände kann jederzeit veröffentlicht werden.

Herrn M. K., Hamburg. S. „Kl. Mitteilungen“ unter Kardinäle.

Herrn E. Sch., Ingolstadt. Die Behandlung des Kuckucks ist richtig. Im Redaktionsbriefkasten S. 184 unter „Herrn K. Z., Nauen“ ist Näheres zu finden.

Herrn G. V., Schlawe. Für die Aufzucht der Pfauen gilt das auf S. 126 unter „Herrn K., München“ über Aufzucht von Fasanen Gesagte. Dem etwa 2—3 Wochen alten kann daneben auch krümelig gekochter Bruchreis mit dem von den Hundekuchenfabriken hergestellten Fasanenaufzuchtfutter reichlich mit gehacktem Grünkraut vermengt gegeben werden und von Samen Spitzsamen, Hirse, Buchweizen, wozu von der vierten Woche an auch Hanf und Weizen gegeben wird. Von der sechsten Woche ab kann das Eigemisch fortbleiben. Von der achten Woche an wird dem Fasanenaufzuchtfutter auch Fleischkrissel, feingewiegtes gekochtes Fleisch, Garnelenschrot beigemischt. Sie werden dann wie die Alten gefüttert.

Herrn K. T., Braunschweig. Aus der Futtermischung, die sonst einwandfrei ist, bleibt Hanf und geschälter Hafer am besten fort. Wenn Hafer gereicht werden soll, so wird am besten solcher in Hülsen oder in ganzen Ähren gereicht. Das Benehmen des Vogels ist nach der gegebenen Schilderung das eines an Legenot leidenden Vogels. In dem Bericht fehlt die Angabe des Geschlechts, und ich weiß infolgedessen nicht, ob es sich um ein Weibchen handelt. Falls dies der Fall ist, müßte der Vogel bei Wiederauftreten der geschilderten Erscheinungen in einem kleinen Behälter (Transportkasten) höherer Wärme ausgesetzt werden (Herd). Meist wird dann nach kurzer Zeit das Ei, das dem Vogel zu legen Schwierigkeiten macht, ausgestoßen. Falls es sich um eine Geschwulst handelt, so ist es nicht möglich, einen Rat zur Beseitigung dieser zu erteilen, da hier der Charakter der Geschwulst unbekannt ist.

Herrn C. J., Bodenheim. Zur Mischlingszucht können Kanarienweibchen in jeder Färbung, auch gescheckte, verwendet werden. Vorteilhafter und eher den gewünschten Erfolg verbürgend ist es, als Männchen einen Wildvogel und als Weibchen einen Kanarienvogel zu verwenden, weil letztere zuverlässiger brüten als die Weibchen der Wildvogelarten. Man kann natürlich auch das Umgekehrte versuchen, besonders wenn man ein sehr zahmes, am besten ein aufgefüttertes Wildvogelweibchen zur Verfügung hat.

Herrn K. B. in E. Der Vogel war ein Weibchen. Er ist infolge von Gelbsucht eingegangen.

(Fortsetzung auf der 3. Umschlagseite.)

Aus den Vereinen.

Vereinigung der Liebhaber einheimischer Vögel zu Berlin. Sitzung jeden 2. Donnerstag nach dem 1. und 15. des Monats im Vereinslokal zum „Alexandriner", Alexandrinenstraße 37a. Gäste stets willkommen.

J. A.: P. Böhme, Schriftführer,
Berlin O 17, Rüdersdorfer Str. 69.

Alte Vereinigung der Vogelliebhaber zu Dresden. Nach längerer Pause ist es wohl angebracht, auch wieder einmal an die Öffentlichkeit zu treten. Vorerst wäre zu berichten, daß die Herren Ritschel als erster Vorsitzender und Groß als Schriftführer ihre Ämter niederlegten. Herr Ritschel war aus Gesundheitsrücksichten gezwungen, bleibt jedoch dem Verein als Mitglied und eifrigster Förderer und Berater treu. Bis zur Jahreshauptversammlung sind die Herren Horst Frohberg als erster Vorsitzender und Matthias Meys als Schriftführer gewählt. Unsere Vereinsabende wurden einige Male benutzt zu Abendausflügen, zwecks ornithologischer Beobachtungen. Leider ließ das Wetter manchmal zu wünschen übrig. Am 24. 6. wurde ein Familienausflug durch den herrlichen „Weißtropper Park" nach der Schiebock-Mühle gemacht. Nachdem man sich daselbst etwas gestärkt, wetteiferten jung und alt im Schwingen des Tanzbeines. Doch gar schnell vergingen die schönen Stunden. Die Herren Huhn und Scholz feierten ihre 25jährigen Ehejubiläen. Beide wurden vom Verein mit den besten Wünschen bedacht. Möge es beiden Paaren vergönnt sein, auch die goldene Hochzeit noch gesund und rüstig zu verleben. Kollege Scholz ließ es sich nicht nehmen und lud den Verein mit Frauen zu diesem Fest ein. Alle verlebten ein paar frohe und genußreiche Stunden. Erst beim Morgengrauen entschloß man sich, die eigenen vier Wände wieder aufzusuchen. — Seit Anfang Juli sind wir in unser neues Vereinslokal „Blasewitzer Hof" übergesiedelt. Unsere Versammlungen finden jeden Freitag abends 8 Uhr statt. Im Winterhalbjahr finden nun auch wieder Vorträge über unsere gefiederten Freunde statt. Vogelliebhaber als Gäste sind stets willkommen. An den letzten Vereinsabenden wurde uns die Ehre zuteil, Herrn O. Reupert aus Breslau und Herrn H. John aus München als Gäste zu begrüßen.

J. A.: Matth. Meys, Schriftführer.

Verein Vogelschutz und -pflege zu Dresden. Versammlung jeden Donnerstag, abends 8 Uhr, im Vereinslokal, „Schillers Restaurant", Ecke Stifts- und Ehrlichstraße. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen.

Bernhard Kühn, Vorsitzender.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei zu Hamburg. Sitzungen finden statt jeden 1. und 3. Dienstag im Monat in Hüttmanns Hotel, Poolstr. 22, abends 8¼ Uhr. Nächste Sitzung Dienstag, den 16. September 1924. Gäste sowie auch Exotenliebhaber stets willkommen.

J. A.: Arnold Weber, 1. Vorsitzender.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig. Vereinssitzungen jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat im Vereinslokal, „Bauers Brauereirestaurant", Täubchenweg. Nächste Sitzungen Donnerstag, den 4. September und Donnerstag, den 18. September. Gäste stets willkommen. J. A.: Johann Birk, 1. Vorsitzender.

Verein der Vogelfreunde Leipzig-Plagwitz. Vereinslokal: „Gosenschlößchen", Leipzig-Plagwitz. Sitzungen an jedem 1. und 3. Montag des Monats, abends 8 Uhr. Vogelfreunde sind stets willkommen. — Der Verein veranstaltet sein 1. Stiftungsfest am 20. September 1924 im Etablissement „Gosenschlößchen" in L.-Plagwitz. Beginn 7 Uhr abends. Vogelliebhaber und Vogelfreunde sind herzlichst eingeladen.

J. A.: Karl Scholtissek, 1. Vorsitzender, Leipzig-Plagwitz,
Lauchstädter Straße 30.

Verein der Vogelliebhaber zu Mannheim. Versammlungen finden alle 14 Tage Samstag abend 8 Uhr im Vereinslokal „Restauration z. gold. Falken" statt. S. 1. 17. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen.

Johann Daubmann, 2. Schriftführer.

Von folgenden **Farbentafeln** der **„Gefiederten Welt"** sind noch einige Exemplare vorrätig, welche wir, solange der geringe Vorrat reicht, zum Preise von **1 G.-M. für die Tafel** zuzügl. **20 G.-Pf.** Porto u. Verpackung **für jede Sendung** bei vorheriger Einsendung des Betrages auf unser Postscheckkonto **Magdeburg 3148** abgeben.

1898 Tafel III: Schwarzspecht. (Schwarzdrucktafel.)
1899 Tafel IV: Nest des Gartenrotschwänzchens mit Weibchen, Jungem und Ei. (Schwarzdruck.)
1900 Tafel I: Madagaskar-, Napoleons-, dottergelber, Samt-, Blutschnabelweber.
1900 Tafel II: Kl. Alexander-, Bunt-, Wellensittich, Rosenpapagei, kl. Gelbhaubenkakadu.
1900 Tafel III: Sonnenvogel, blauer Hüttensänger, Rosenstar, Schamadrossel, weißohriger Bülbül.
1900 Tafel IV: Paradieswitwe, Mozambikzeisig, Grauer Kardinal, Safranfink, Papstfink.
1901 Tafel III: Kleinspecht, Kleiber, Wendehals.
1902 Tafel I Kohl-, Schwanz-, Hauben-, Tannenmeise.
1902 Tafel II: Goldammer, Baumpieper, Feldlerche.
1902 Tafel IV: Diamant-, weißbäckige Gürtel-, Masken-, Gürtelamandine.
1903 Tafel I: Hausrotschwanz, Sprosser, Nachtigall, Rotkehlchen.
1903 Tafel II: Bluthänfling, Grünling, Kernbeißer, Buchfink.
1903 Tafel III: Mistel-, Wacholder-, Wein-, Singdrossel.
1903 Tafel IV: Zwergstrandläufer, Wachtel, weißflüglige Seeschwalbe, Sandregenpfeifer.
1904 Tafel I: Zaun-, Garten-, Dorn-, Mönchgrasmücke.
1904 Tafel II: Schneefink, Steindrossel, Alpenbraunelle, Steinsperling.
1904 Tafel III: Binden-, Kiefern-, Fichtenkreuzschnabel.
1904 Tafel IV: Bartmeise, Rohrammer, weiße Bachstelze, Sumpfrohrsänger.
1905 Tafel I: Schwarzbürzel-, Spitzschwanzbronzemännchen, weißes, gelbbuntes, braunbuntes jap. Mövchen.
1905 Tafel II: Grau-, Orange-, Erz- und Schmuckpfäffchen.
1905 Tafel IV: Schwarzkehl-, Dreifarben-, Weißkopf- u. Schwarzkopfnonne.
1906 Tafel II: Lein-, Erlenzeisig, Berghänfling, Stieglitz.
1906 Tafel III: Stein-, braunkehliger und schwarzkehliger Wiesenschmätzer.
1907 Tafel II: Weißsterniges, rotsterniges, Wolfsches Blaukehlchen, Blaukehlchen ♀.
1907 Tafel III: Kleines, Zwerg-, Glanz-, Riesen-, rotrückiges und Gitterflügel-Elsterchen.
1907 Tafel IV: Karmin- und Hakengimpel, Gimpel.
1908 Tafel II: Braunrückengold- ♂ ♀, Schwarzkopf- und Goldsperling ♂ ♀.
1908 Tafel IV: Pünktchenastrild, Amarant ♂ ♀, dunkelroter Astrild, Tigerfink ♂ ♀.
1909 Tafel I: Orangegesichtiger Unzertrennlicher, Rosenpapagei, Rußköpfchen, Tarantinischer Unzertrennlicher, Grauköpfchen.
1909 Tafel II: Klarinetten- u. Mennigvogel, braunkehliger Blauschnäpper.
1909 Tafel III: Schwarzbäckchen-, Elfen-, Bunt- und Granatastrild, gemalter Astrild.
1909 Tafel IV: Orange-, Rotkopf-, Blutschnabel-, Napoleons- und Madagaskarweber.
1910 Tafel I: Grauer, Trauer-, Halsband-, Zwergfliegenschnäpper.
1910 Tafel IV: Zipp-, Garten-, Zaun-, Kappenammer.
1911 Tafel I: Rotrücken-, Raub-, Schwarzstirn-, Rotkopfwürger.
1911 Tafel II: Zeresastrild, Malabarfasänchen, Muskatfink, Silberschnäbelchen.
1911 Tafel III: Gartensänger, Fitislaub-, Weidenlaub- u. Waldlaubvogel.
1911 Tafel IV: Goldköpfiges ♂ ♀, feuerköpfiges Goldhähnchen, Zaunkönig.
1912 Tafel II: Wieners, Aurora-, Tropfen-, Wachtel- und Rebhuhnastrild.
1912 Tafel III: Magellan-, Kapuzen-, mexikanischer, Yarells und Trauerzeisig.
1912 Tafel IV: Dorn-, Sonnen- Binsen- und Gitterflügelastrild, Zebrafink.
1913 Tafel II: Violettblauer u. Rotbauchorganist, Purpur-, Dreifarben- und schwarzblaue Tangare.
1913 Tafel III: Paradies-, Dominikaner-, Königs-, Fischers, Rotscheitel- und Gelbrückenwidafink.
1913 Tafel IV: Goldschulter-, Fein-, Sing-, Browns Singsittich.
1914 Tafel I: Schwarzkopf-, Rosenbrust- u. mexik. Gelbkernbeißer, dunkelblauer Bischof, roter Kardinal.
1914 Tafel III: Diuka-, Grau-, Kron- u. Morgenammerfink, Graukardinal.
1914 Tafel IV: Pikui-, Kap-, Diamant-, Tamborin- u. Friedenstäubchen, chinesische Zwergwachtel.
1915 Tafel I: Sammetköpfchen, Sperber-, Orpheus- und Bartgrasmücke.
1915 Tafel III: Diamantfink-, Masken-, Weißwangen- und Spitzschwanzamandine, Gürtelgrasfink.
1915 Tafel IV: Star, Pirol, Rosenstar.
1920 Tafel I: Nandy-, Jendaja-, Guajakil- und Goldstirnsittich.
1920 Tafel II: Schuppenköpfchen, Schnurrbärtchen, dottergelber, Zwergmasken- und Textorweber.
1920 Tafel III: Tui-, Ziegen-, Mönch-, Tuipara- u. Katharinasittich.
1920 Tafel IV: Reisfink, weißer Reisfink.
1921 Tafel I: Gelber Wellensittich und Wellensittich.
1921 Tafel II: Kleiner Gelbhaubenkakadu.
1921 Tafel III: Kleiner Alexandersittich.
1921 Tafel IV: Domingo-, Cuba- und Rotbugamazone.

Da die Nachfrage nach Farbentafeln sehr groß ist, bitten wir sofort zu bestellen.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg / Postschließfach 148

Anzeigenteil

Die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 20 G.-Pf. berechnet. Aufnahme erfolgt gegen Voreinsendung des Betrages in Reichsgeld per Brief od. auf unseren Zahlstellen: Postscheckkonto: Magdeburg 3148, Wien 156 687, Bern III 4326, Prag: Creditanstalt d. Deutschen unter Angabe des Zweckes.

Vogel-Fangkäfige 2.50 und 4.50 ℳ, Schlagnetze f. kl. schädl. Vögel 1.90 ℳ, f. größ. 2.10 u. 2.40 ℳ. **Katalog gratis.** **J. Tannen**, Gronau 58 (Westf.). [667

Vogel-Mistelleim

zum Fangen schädlicher Vögel, Ia klebend bei jeder Witterung, garantiert gebrauchsfähig, Dose 1,50 ℳ fr. von **A. Freitag Nchf., Frankenberg i. S. 6.** Wiederverkäufer hohen Rabatt. [668

Verkaufe oder tausche

Zimmervoliere 120 l., 104 h., 43 br., zum abt., 30 Gm., **2 Flugbauer** 80 l., 52 h., 32 br., Hartholz, je 7 Gm., **2 Heckbauer** 50 l., 33 h., 25 br., je 4 Gm., **2 zweit. Kistenheckbauer** 77 l., 34 h., 24 br., je 5 Gm., **Drahtbauer** 52 l., 48 h., 35 br., 6 Gm., **1 Flemmigbauer** 60 l., 42 h., 35 br., 6 Gm., **gegen Exoten, Sittiche, Papageibauer oder Nuß, Fremd-**
669] **ländische Stubenvögel.**

M. Sachs, Plauen,
Mozartstraße 27.

Vogelfutter [670

für Kanarien, Waldvögel, Exoten, Papageien, Weichfresser. Anerkannt bewährteste Mischungen auf Grund langjähriger Erfahrung. Liste 13 über Vogelfutter, Liste 5 über Vogelkäfige, Zuchtgeräte usw. mit etwa 400 Abbildungen.

W. Göpel, Leipzig,
Tröndlinring 1. Telephon 14 958.
Bei Anfragen bitte auf die „Gefiederte Welt" Bezug zu nehmen.

Selbstgetrocknete
Ameiseneier

à Liter 2 ℳ, bei Einsendung von 10 ℳ 5 Liter franko. **R. Seyfert,** Magdeburg, Lödischehofstraße 3. [671

10 Ltr. Ia trockene Ameiseneier à Liter 1.80 ℳ
Trockene Matkäfer à Liter 1.40 ℳ
J. Ehrlich, Würzburg
672] Weißenburgstraße.

Mehlwürmer

geg. Einsend. v. 2.—Rentenmark ¼ Pfd. franko versend. **D. Waschinski & Co.,** Biesenthal I (Mark). [672a

Mehlwürmer Pfd. 8 ℳ, ¼ = 2 ℳ franco. Voreins.
673] **Jeitner, Breslau,** Weinstr. 12.

Suche

mehrere Weibchen rotköpfige Gouldamandinen, 1,0 Buntastrild und andere seltenere Prachtfinken.
674] **Prof. Dr. Otto Goetze**
Frankfurt a. M., Paul-Ehrlich-Str. 50

6 gelehrige Vögel 10 ℳ [675
Braut-, Mandarin-Enten P. 120 ℳ
Schlößchen Allersberg b. Nürnbg.

Zoologische Handlung

Umstände halber zu verkaufen in großer Stadt Hessens.

Offerten unt. Z. U. an die Geschäftsstelle
676] der Gefied. Welt.

Gebe ab: 3 Stück prima junge
gelbe Wellensittiche
à 7 ℳ. Tausche erprobtes Zuchtpaar
grüne Wellensittiche.
Edwin Pangritz, Zittau i. Sachs.
A. Z.-Mtgl. 383. [677

Tarantin. Zwergpapageien

gut eingefüttert, Paar 40 Gm.
Weibchen 16 Gm.
Schopfwachteln
Paar 36 Gm.
Grünflügeltauben
Paar 36 Gm.
Rotgehäubte Kardinäle
Stück 8 Gm.
Liste über sonstige Vögel gratis.
Vogelexport Joh. Götz,
678] **Neu-Ulm** (Bayern).

Verkaufe!

[682

1 Bey	50	ℳ
1 Rosella-Männchen	35	„
Guatemalasittiche	à Paar 30	„
Elfenbeinsittiche	„ 45	„
Mex. blaubürzl. Sperlingspapageien	à Paar 25	„
Papstfinken	„ „ 35	„
„ (Männchen in Pracht)	à Stück 20	„
Indigofinken	„ Paar 35	„
Trupiale	„ Stück 30	„
Mex. Häher	„ „ 30	„
Massena-Wachteln	„ Paar 60	„
Klarinos	„ Stück 50	„
Mex. Spottdrosseln	„ „ 30	„

Willy Odenwald,
Fulda, Vogelexport und -import.

Wellensittiche

1,0 grün 1923, 1,0 gelb 1923, 1,1 grün Januar 1924, 1,0 Blutschnabelweber, alles gesunde prima Tiere, wegen Aufgabe der Zucht, Preis zus. mit Pack. 35 ℳ. **Schöll, Garmisch in Bayern.** [683

Rote Araras

sehr schön, 200 ℳ

Große weiß. Gelbhaubenkakadu	60 ℳ
Guatemalasittiche . . . Paar	60 ℳ
Elfenbeinsittiche . . . . „	50 ℳ
Kaktussittiche . . . . . „	15 ℳ
Mönchssittiche . . . . „	15 ℳ
Wellensittiche, grün . . „	15 ℳ
10 Paar 130 ℳ, 50 Paar	600 ℳ
Wellensittiche, gelb . . . „	18 ℳ
10 Paar 150 ℳ, 50 Paar	700 ℳ
Schwarz- u. rotköpf. Gould-, Spitzschwanz- u. Maskenamandinen Paar	50 ℳ
Orangeblaufink . . . . Stck.	40 ℳ
Rote Kardinäle . . Stck. 28 u.	40 ℳ
Klarinos, fleißig schlagend . Stck.	75 ℳ
Mittlerer Bey, fleiß. plappernd „	50 ℳ
Purpurtangaren, sehr schön Paar	30 ℳ
Zebrafinken „ „ „	25 ℳ
Jap. Mövchen „ „ „	20 ℳ
Dominikaner-Kardinäle . Stck.	15 ℳ
Graue Kardinäle . . . „	12 ℳ
Sonnenvögel . . . . . Paar	18 ℳ
Massena-Wachteln . . . „	60 ℳ
Amerik. Wanderdrosseln, sehr schön und fleißig singend . . . Stck.	20 ℳ
Papstfinken, Gefied. etw. defekt Paar	25 ℳ
Indigofinken „ „ „ Stck.	15 ℳ
Schwarzkehl- u. Spiegeltrupi. „	25 ℳ
Seidenstare, graue Reisfinken, Safranfinken . . . . . Paar	10 ℳ
Hahnenschweifwitwen . . Stck.	35 ℳ
Senegalfinken, Weber Paar	3.50—7 ℳ
Dominikanerwitwen . . . Stck.	8 ℳ
Einfarbdrosseln . . . . Stck.	20 ℳ
Sehr schön gezeichneter Stieglitzbastard mit viel Weiß . . . Stck.	40 ℳ
Sehr schöne weiße u. braune Kanarienhähne . . . . . Stck.	30 ℳ
Sehr schöner weißer Haussperling (Albino) . . . . . Stck.	30 ℳ
Junge Kanarienhähne Stck. 10 ℳ, Dtz. 90 ℳ, 100 Stck.	700 ℳ
Ganz zahmer Nasenbär . „	150 ℳ

687] offeriert
Friedrich Frank, München
Gabelsbergerstr. 9.

10000 Kataloge
über Käfige, Nistutensilien usw. versende an Züchter und Liebhaber **gratis und franko.** [679
Sendet sofort Adresse ein.
H. Fockelmann, Hamburg 8.

Offeriere in einwandfreien erstklassigen Exemplaren sofort lieferbar:

Rote Araras	Stück 160.—	ℳ
Graupapageien . . .	„ 95.—	„
Blaustirnamazonen . .	„ 50.—	„
Große wetße Gelbhaubenkakadus . .	Stück 58.—	„
Molukken-Kakadus .	„ 275.—	„
Wellensittiche, grüne .	Paar 15.—	„
Wellensittiche, gelbe .	„ 16.—	„
Gouldamandinen, rot- u. schwarzköpfige . .	„ 50.—	„
Spitzschwanzamandinen	„ 50.—	„
Maskenfinken . . .	„ 50.—	„
Jap. Mövchen . . .	„ 15.—	„
Zebrafinken	„ 18.—	„
Goldbrüstchen . . .	„ 6.—	„
Schamadrosseln, Mch.	Stück 70.—	„
Wbch.	„ 60.—	„
Purpurtangaren . .	Paar 25.—	„
Glockenvögel	Stück 75.—	„
Blauspötter	„ 48.—	„
Rote Kardinäle . . .	„ 28.—	„
Indigofinken	Paar 35.—	„
Papstfinken	„ 35.—	„
Elfenbeinsittiche . . .	„ 45.—	„
Tukan	Stück 60.—	„
Marmorettaffen . . .	„ 30.—	„
Mexikanische Eichkätzchen	„ 30.—	„

Tierhandlung
Max Kleinert
Berlin NO. 18, Strausberger Str. 13,
Fernruf Alexander 3313. [680

Wellensittiche!

Gebe ab: 16 Stück Ia junge große Wellensittiche. Zum Teil 6 Monate alt. Nach Abstammung durch Fußringe gezeichnet. Stück 5 ℳ. Am liebsten zus. für 80 ℳ. Post- und Emballagefrei.
Dentist Jacobsen, [684
Sonderburg (Dänemark) Brandtsgade 3.

Junge Wellensittiche

4 grüne, blaublütig, 5 gelbe, reinfarbig, tadellos im Gefieder, aus Gartenflugraum, je 7.50 ℳ, abzugeben. Gesucht Gefiederte
685] Welt Jahrgang 1905.
Dr. Wagner, Bad Salzbrunn (Schl.)

Zu verkaufen oder gegen erstklassige Exoten zu vertauschen: Großer Ruß, Bd. 2—4, geb. je 30 ℳ. Finsch: Die Papageien, 3 Bd. Halbl. zus. 30 ℳ. Brehms Tierl.: Vögel, Bd. 1, 2 je 10 ℳ, Halbl., gr. Ausg. 1911. Gadow: Systematik d. Vögel, Halbl. 1893 10 ℳ. Journ. f. Ornithol. v. Cabanis, Jahrg. 1922 brosch. 8 ℳ. Hartlaub: Die Vögel Madagaskars 1877 brosch. 10 ℳ. Erlanger: Beitr. z. Vogelfauna Nordostafrikas 1904/5, 2 Bd., brosch. m. 27 farb. Taf. 18 ℳ. Finsch-Hartlaub: Ornithol. d. Viti-, Samoa- u. Tonga-Ins. 1867, brosch. m. 14 farb. Taf. 8 ℳ. Parrot: Beitr. z. Ornithol. Sumatras u. d. Insel Banka 07 brosch. 3 ℳ. Convolut v. 17 ornith. klein. Schriften 15 ℳ. Gef. Welt, Jahrg. 3—6, 9, 12, 14, 15, 32, 33, 35, 37—41, 48, sämtl. tadell. u. gebd. Bd. 3—6 je 10 ℳ, übrigen je 6 ℳ. Der Zool. Gart., Jahrg. 1—35 u. 43, teilw. gebd. pro Jahrg. 2 ℳ. Aquila, Zeitschr. f. Ornithol. (ungar. u. deutsch), Jahrg. 1904 brosch. 10 ℳ. Alpenflora von Dr. Hegi, gebd., neu mit 30 Farbtafeln 5 ℳ. [686
Hermann Bauer, Unterhaching bei München, Pittingerplatz 21.

Vertausche

gegen kl. Exoten oder Kanarien: Blaukehlchen, Schwarzköpfe, Grasmücken, Rotkehlchen, Heckenbraunellen u. a. Verkaufe 1,1 gelbe u. 2,0 grüne Wellensittiche, 1½ Jahre alt. [681
Emil Urban, Karlsruhe, Hirschstr. 89.

Gebe ab: 1,0 kl. Kubafink, ½ Jahr alt, 1,0 blaub. Sperl.-Pap., 1 Jahr in Vogelstube, 1,1 braunb. Mövchen, erprobtes Zuchtpaar, 0,2 gelbe wetterharte Kanarien, 0,1 Wellensittich, 4 Monate alt, 0,1 Reisfink, ein Jahr gekäfigt. Anfr. mit Rückporto an
W. Voigt, Jena
688] Feodorastr. 13.

Gebe ab: 1,1 Wellensittich, 1,1 Mövchen, 2,0 Hartlaubzeisig, jg. Zebrafinken; suche bessere Astrilde. [689
Brock, Osnabrück, Schloßstraße 49.

Vertausche

ein gut befiedertes kräftiges Zuchtpaar gelber Wellensittiche gegen ein selbiges Paar grüner
690] **Wellensittiche.**
Reinhard Fünfstück
Neugersdorf i. Sa.

1,1 Zwergara

Paar 60 ℳ, 1,0 Bandfink 2 ℳ, 0,1 Paradleswida 1 ℳ, 1,0 Kanarie 1924 6 ℳ, 0,5 Kanarie 1923/24 2 ℳ, 1,0 Zeisig 2 ℳ, 1,0 Amsel 10 ℳ, 1 Ernemann-Kamera 4½/6×6,8 mit 3 Kopierrahmen u. 1 Filmpack für 60 ℳ zu verkaufen oder zu vertauschen gegen Exoten oder gute Hühner.
Eugen Müller,
Rüllstedt im Eichsfeld. [69

Inserate

für das am 11. Sept. 1924 zur Ausgabe gelangende Heft 30 der Gef. Welt erbitten bis 6. Sept. 1924 früh

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Berlin-Hermsdorf; für den Anzeigenteil: Rolf Kretschmann, Magdeburg, Postschließfach 148.
Verlag der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck: August Hopfer, Burg Bz. Magdbg.

Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Jahrg. 53 | Den 11. September 1924 | Heft 30

(Druckort: Burg, Bezirk Magdeburg.)

Ein Beitrag zur Weichfresserfütterung.

Von J. Birk, Leipzig.

(Nachdruck verboten.)

Wenn wir vom Stande der modernen Vogelliebhaberei sprechen, so ist damit gesagt, daß wir dieselbe von der bis jetzt erreichten höchsten Stufe aus betrachten wollen, oder wollen wir gleich offen sein, ist denn überhaupt im Verlauf des letzten Vierteljahrhunderts ein ins Auge fallender Fortschritt auf diesem Gebiete zu verzeichnen?

Diese Frage können wir einesteils mit Ja, aber ebenso gut auch mit Nein beantworten. Es kommt nur darauf an, wie wir die Sache betrachten. Zugegeben muß werden, daß die Verbreitung der Kenntnis einer sachlichen Vogelpflege die Fachzeitschriften, ebenso wie die Literatur und nicht letzten Endes auch die Liebhabervereine in dankenswerter Weise erledigten. Wenn wir unsere heutigen praktischen Weichfresserkäfige mit denen vor 25 Jahren gebräuchlichen vergleichen, so fällt vor allem eine einen guten Geschmack für das Äußerliche verratende Bauart auf. Die praktische Inneneinrichtung eines solchen Käfigs ist wohl so ziemlich einwandfrei, denn Verbesserungen sind in dieser Hinsicht wohl zu verzeichnen, doch weicht die Unterschiedlichkeit zwischen einst und jetzt nicht derartig voneinander ab, daß wir von großen Errungenschaften reden können. Noch viel bescheidener sind dieselben auf dem Gebiete der Fütterung, wenigstens was die Bestandteile des Weichfuttergemisches anbetrifft; wir finden heute ebenso noch geriebene Möhre, geriebene Semmel oder Zwieback, Ameisenpuppen, Weißwurm, gemahlenen Hanf usw. wie dereinst. Für jeden Vogelpfleger ist es sicherlich klar, daß wir bei der Fütterung mit diesen Futterbestandteilen nicht von einer Darbietung von natürlichem Futter reden können. Unser heutiges Weichfuttergemisch ist also, ebenso wie das früherer Zeiten, kein Ersatz des Naturfutters in bezug auf seiner Zusammensetzung von vegetabilischen und animalischen Stoffen, sondern nur ein Futterersatz, weil die Beschaffung eines Naturfutters einfach nicht möglich ist, das dazu dient, um diejenigen Stoffe, seien es pflanzliche oder tierische, die zur Erhaltung des Organismus ebenso notwendig sind wie zur Bildung desselben, dem Vogel zuzuführen. Ob dem Vogel die wichtigsten Stoffe, wie Eiweiß, Kohlehydrate, Fett usw., durch das lebende Insekt oder in einer anderen Bindung zugeführt werden, ist wohl wichtig, aber nicht so schwerwiegend. Viel schwieriger ist, alle diese lebenswichtigen Stoffe prozentual dem Bedürfnisse des gesunden Organismus angepaßt zu reichen. Wie viel braucht denn eigentlich dieser oder jener Vogel an vegetabilischen sowie tierischen Stoffen zur natürlichen Funktion des Organismus? Wieviel Prozent Eiweiß, Fett, Kohlehydrate, Mineralien, Wasser, überhaupt wieviel verdauliche und wieviel unverdauliche Stoffe enthält das Naturfutter unserer Insektenfresser? Dies festzustellen, wäre wohl eine leichte Aufgabe des Chemikers, wenn wir nur wüßten, welche Insekten usw. dieser oder jener Vogel ausschließlich in der Natur aufnimmt und welches Quantum davon täglich. Meiner auf diesem Gebiete unfachmännischen Meinung nach dürfen wir in bezug auf eine stets gleichmäßige Zuführung von den nötigen Stoffen weniger ängstlich sein als in bezug auf eine genügende Menge derselben. Heute reichen wir z. B. unseren Vögeln neben dem täglichen Hauptfutter diesen oder jenen Leckerbissen, morgen wieder einen anderen, den andern Tag gar keinen, die Hauptsache bleibt immer wieder, daß das tägliche Futterquantum die nötigen Stoffe zur Existenz des Organismus enthält, ob dabei prozentual das Quantum von diesem oder jenem Stoff stets dasselbe ist, spielt meiner Ansicht nach gar keine Rolle, im Gegenteil, Abwechslung in der Futtergabe, also eine Verschiebung der darin enthaltenen Stoffe in prozentualer Hinsicht halte ich sogar als an das Natürliche grenzend, denn auch der wildlebende Vogel wird, je nachdem der Tisch gedeckt ist, zur äußersten Abwechslung sowohl in qualitativer sowie quantitativer Hinsicht gezwungen. Wenn ich mich nun auf ein Thema einlasse und ein Gebiet betrete, auf dem ich keine anderen fachmännischen Kenntnisse besitze als die eines langjährigen Vogelpflegers, so tue ich es nur, um auch meinerseits vielleicht einen Fingerzeig geben zu können in dem schwierigen Problem der Weichfresserfütterung. Daß wir bei dem heutigen Stand der Fütterung vielleicht gar schon dem Ideal nahe sind, wird wohl zu behaupten niemand wagen. Daß wir dieses Ideal jemals erreichen, wohl ebenfalls nicht, daß wir aber mit den uns bis jetzt zur

Verfügung stehenden Bestandteilen unseres Weichfuttergemisches in der Lage sind, mit Erfolg die Pflege unserer Kerbtierfresser in bezug auf Wohlbefinden und Lebensdauer erfolgreich durchzuführen, ist nach den Erfahrungen der Praxis eine erwiesene Tatsache. Betrachten wir uns einmal die wichtigsten Bestandteile unseres Weichfutters nach der Tabelle des Chemikers in bezug auf ihre Zusammensetzung, so werden wir sehen, daß in denselben genügende Stoffe zur Erhaltung des Vogelorganismus enthalten sind. Das natürlichste oder wenigstens das bekömmlichste Futter für unsere Stubenvögel sind frische Ameisenpuppen. Würde es uns möglich sein, dieselben dauernd zu beschaffen, so wäre die Pflege selbst unserer zartesten Weichfresser etwas spielend Leichtes. Die Praxis hat uns gelehrt, daß frische Ameisenpuppen, trotzdem sie 75 % Wasser, aber nur 6 % Minerale, 13 % Eiweiß, 3,5 % Fette, 2,5 % Kohlehydrate enthalten, vollständig genügen, um den Vogelorganismus in natürlicher Lebensäußerung zu erhalten. Wann beginnen denn die Sorgen des Vogelpflegers, stets dann, wenn draußen in den Waldungen die Ameisenhaufen anfangen zu versiegen, dann erst beginnt die Kunst des Pflegers, dann erst kann man von einer Umstellung des Vogelorganismus an das wirkliche Ersatzfutter reden, und dann leider machen sich auch nur gar zu bald die Folgen einer falschen Fütterungsweise an dem Vogel bemerkbar. Viel wichtiger, als das Futter nur auf den Gehalt an Prozenten von diesen oder jenen Stoffen zu prüfen, halte ich, das Futter in einer leicht verdaulichen Form zu reichen. Daß, wenn das Futter in leichtverdaulicher Form gereicht wird, wie bei Fütterung mit frischen Ameisenpuppen, schon ganz geringe Prozentsätze der lebensnotwendigen Stoffe zur Erhaltung des Organismus genügen, beweist der geringe Prozentsatz von Eiweiß, Fett usw. von frischen Ameisenpuppen. Betrachten wir uns einmal die anderen hauptsächlichsten und auch wichtigsten Bestandteile unseres Weichfuttergemisches nach ihrem Nährwert, so werden wir finden, daß dieselben viel mehr Eiweiß, Fett, Kohlehydrate, Minerale und gar kein oder bedeutend weniger Wasser aufweisen als frische Ameisenpuppen, und doch der Erfolg ein so entgegengesetzter. Getrocknete Ameisenpuppen enthalten 50 % Eiweiß, 25 % Minerale, 15 % Fette, 10 % Kohlehydrate, Weißwurm 70 % Eiweiß, 15 % Fette, 11 % Minerale, 4 % Kohlehydrate. Schon diese unsere beiden hauptsächlichsten, aber auch wertvollsten Futtermittel genügen, um dem Vogelorganismus alle diejenigen Stoffe zuzuführen, die zu seiner Erhaltung notwendig sind. Die Hauptsache dürfte bei der Fütterung unserer Weichfresser sein, alle die gebräuchlichen Futterstoffe dem Vogel in einer leichtverdaulichen Form zuzuführen, dies wäre am besten zu erreichen, wenn wir alle nur in pulverisiertem Zustande dem Futtergemisch beigäben. Erstens sind alle Stoffe dann leicht verdaulich und zweitens richtete sich dabei die Menge von diesem oder jenem Bestandteil nach dem beigemengten Quantum des Pflegers und nicht nach der individuellen, futterwählerischen Veranlagung des Vogels. Mit der von Herrn Dr. v. Boxberger vertretenen Ansicht (Heft 1 (1923) „Gef. Welt") betreffs unserer Weichfresserfütterung ist meine diesbezügliche Ansicht vollkommen identisch, kann mir also von dem, was in dieser Arbeit zu lesen, eine Wiederholung ersparen. Nur einzig und allein an einer ungenügenden Nahrungsaufnahme gehen die meisten unserer zarten Weichfresser, wie Gelbspötter, Sumpfrohrsänger usw., zugrunde, darum erstens soviel als möglich alles in pulverisiertem Zustande reichen, zweitens nicht nur bei Tageslicht an den kurzen Wintertagen fressen lassen, sondern auch bei erleuchtetem Raume. Diese Methode kann aber nun nicht nach Schema F bei allen Vögeln angewandt werden, denn wir haben auch viele Vögel, die bei einer derartigen verlängerten Futteraufnahme gleichfalls an Fettsucht zugrunde gehen würden, denn tatsächlich geht auch der größte Teil der Stubenvögel an den Erscheinungen einer Überfütterung zugrunde, nicht nur bei den Körnerfressern, sondern auch bei den Weichfressern. Meiner Ansicht nach wird der Verdauungsapparat des Vogels durch die Aufnahme bedeutender Mengen schwerverdaulichen Futters mit der Zeit derartig geschwächt, daß unbedingt Verdauungsstörungen durch Erschlaffung der übermäßig arbeitenden Muskulatur des Magens und der Gedärme eintreten müssen. Arbeiten erst diese Zersetzungs- und Ableitungsorgane nicht mehr naturgemäß, indem die Zuführung der nötigen Stoffe ins Blut schlecht funktioniert, so entstehen Krankheiten, die fast alle in der unsachgemäßen Fütterung ihren Ursprung haben, ja, hätte der Vogel im Käfig für den mit kraftbildenden Stoffen überheizten Körper auch die Ausarbeitung für seinen Organismus, wie sie die Nahrungssuche mit sich bringt, so wäre dies lange nicht so schädigend wie bei beschränkter Bewegungsfreiheit im Käfig. So eins ich mich mit den Ausführungen des Herrn Dr. v. Boxberger fühle, ebenso entgegengesetzt ist meine Meinung betreffs der in Heft 24 erschienenen Arbeit „Zur Frage der Weichfresserfütterung" von Herrn Jacobs.

Sehr recht hat dieser Herr, wenn er die Fütterungsfrage das Sorgenkind des Vogelliebhabers nennt, denn mit der Anwendung einer sachgemäßen Fütterung steht der Erfolg in der Liebhaberei, mit einer unsachgemäßen Fütterungsmethode fällt derselbe. Zu Recht besteht auch die von Herrn Jacobs aufgeworfene Frage, wie wir diesen Übelstand in unserer Weichfresserfütterung beseitigen, und ob es nicht möglich ist, zu einer allgemein werdenden Fütterungsweise zu gelangen. Wenn ich nun an der Hand dieser Arbeit auf Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Verfasser und meiner Wenigkeit hinweise, so denke ich, wird mir Herr Jacobs diese sachliche Kritik im Interesse unserer Liebhaberei nicht übel deuten. Ja, ich glaube sogar, so gut gemeint und anerkennenswert die Anregung dieses Herrn betr. Weichfresserfütterung ist, daß vielleicht Herrn Jacobs doch eine langjährige Liebhaberpraxis fehlen dürfte, behaupten kann ich dies nicht, doch beschleicht mich dieses Gefühl beim Lesen dieser Arbeit. Schon in der Einteilung in reine Insektenfresser und beerenfressende Vögel kann ich nicht ganz derselben Ansicht sein, Meisen z. B. sind naturgemäß auch für vegetabilische Kost sehr empfänglich, Hanf, Sommerrosenkerne usw., Blaukehlchen hingegen sind in der Natur, ebensowenig wie im Käfig, nicht zu den

beerenfressenden Vögeln zu zählen, dies wird mir wohl jeder Liebhaber bestätigen müssen. Wenn wir eine derartige Ausnahme, daß ein Vogel im Käfig auch mal gelegentlich Beeren mitfrißt, als eine Regel hinstellen wollen, so müssen wir nach meinen Erfahrungen und denen anderer Liebhaber auch Sprosser, Nachtigall, Gartenrotschwanz usw. zu den beerenfressenden Vögeln zählen, denn derartig individuell veranlagte Vögel kommen auch in der Freiheit vor, viel weniger im Käfig. Z. B. Nachtigallen, Gartenrotschwänze usw. habe ich schon öfters in Gesellschaft von Grasmücken und Rotkehlchen beim Naschen von roten Holunderbeeren ertappt, im Käfig gewöhnen sich sogar verschiedene Arten, die von Natur aus keinesfalls Beerenfresser sind, das Fressen von Beeren an. Was die Säuerung des Weichfuttergemisches anbetrifft, so wird es wohl keinem erfahrenen Vogelpfleger einfallen, das Futter, welches am Tage vorher früh frisch zubereitet gereicht wurde, in der warmen Jahreszeit noch über Nacht in den Futternäpfen stehen zu lassen, damit der Vogel gleich früh wieder weiter fressen kann. Überhaupt ist es ganz gut so einzurichten, daß das tägliche Futterquantum auch vollends aufgebraucht wird und nicht die Näpfe noch bis zur Hälfte gefüllt bis zum andern Morgen im Käfig sind. Ja, gerade in diesem Punkte wird von vielen Liebhabern viel gesündigt, speziell von solchen, die da denken, den Vogel dadurch richtig zu pflegen, indem sie recht große Näpfe voll Futter verabreichen. Nicht ein möglichst großes Quantum an Nährwert armen Futters soll gereicht werden, sondern ein aufs äußerste eingeschränktes Quantum sehr nahrhaften Futters soll es sein, man muß hierbei selbstverständlich die betr. Vogelart berücksichtigen. Daß starke Fresser, wie zum Beispiel eine Gartengrasmücke gegen einen Gelbspötter, neben einem größeren Quantum auch ein mehr vegetabilisches, an Nährwerten ärmeres Futter gebrauchen, ist selbstverständlich. Es richtet sich stets danach, wie ein Vogel zur Fettanlage neigt, ja, diese Neigung ist selbst innerhalb ein und derselben Art individuell, hier heißt es beobachten und demnach die Quantität sowie die Qualität des Futters einstellen. Daß unsere zarteren Weichfresser, wie Sumpfrohrsänger, Gelbspötter usw., ein sehr nahrhaftes, mehr animalisches Futter zu ihrer Erhaltung brauchen, muß der Liebhaber stets beachten, nur an einer ungenügenden, in Qualität, daher Nährwert armen Nahrungszufuhr liegt der Hauptgrund des so häufigen Mißerfolges bei der Pflege dieser zarten Vögel. Gerade weil die Liebhaber die an Nährwert reichen Futtermittel infolge ihrer stets teuren Beschaffung, wie Ameisenpuppen und Weißwurm, im Futter so kärglich bemessen, sind die zarten Vögel meistens unterernährt und gehen langsam, aber sicher der Auszehrung entgegen. Wer gezwungen ist, bei der Fütterung von zarten Weichfressern aus Sparsamkeitsrücksichten mit diesen bis jetzt unübertroffenen vollwertigen Futtermitteln zu geizen, tut wohl am besten, er befaßt sich nicht mit der Pflege dieser anspruchsvollen zarten Vögel, sondern sucht die Befriedigung seiner Liebhaberei durch Haltung weniger empfindlicher Arten, er wird auch dabei mehr Freude und Genüsse ernten als bei den zarten Sängern.

(Schluß folgt.)



Schwefelgelber Girlitz (s. S. 235).

Neueinführungen und Seltenheiten.

Von Karl Neunzig.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Einen sehr selten eingeführten Girlitz, der bei seiner Größe und dem starken Schnabel bei oberflächlicher Betrachtung an einen Gimpel erinnert und wohl aus diesem Grunde auch schon als „Grüngimpel" angeboten wurde, brachte die Firma Götz, Neu-Ulm, im Laufe des Sommers auf den Vogelmarkt, den

Schwefelgelben Girlitz — Serinus sulfuratus (*L.*),

den die Abb. auf S. 235 darstellt.

Er ist einer der größten Vertreter seiner Gattung. Die Verbreitung erstreckt sich über Südafrika. In

manchen Teilen des Kaplandes ist er ein ziemlich gemeiner Vogel, der sich sowohl im offenen Weideland wie im Buschwald umhertreibt. Im afrikanischen Winter treibt er sich in großen Flügen häufig mit anderen Finken zusammen umher, um auf dem Boden liegenden Samen zu suchen. Seine Hauptnahrung besteht in dem Samen von kleinen Früchten, welche er mit dem kräftigen Schnabel öffnet, um ihn zu erlangen. Der Gesang dieses Girlitzes wird von Stark als sehr angenehm geschildert. Er ist laut und hat liebliche Töne. Aus diesem Grunde wird er, der „Geel Seisje" der Buren, in seiner Heimat vielfach im Käfig gehalten und soll häufig nach Europa gebracht werden. Letzteres ist unzutreffend, denn der Vogel ist auch in England sehr selten auf den Vogelmarkt gelangt und dann nur zu sehr hohen Preisen. Er brütet im Kapland gewöhnlich im September. Das Nest ist ein ziemlich kleiner, hübsch napfförmiger Bau und steht fast immer etwa 1 m hoch über dem Boden in einem Busch. Es ist aus trockenem Gras und feineren Pflanzenstengeln erbaut und im Innern mit feinen Halmen und Pflanzenwolle ausgelegt. Das Gelege besteht gewöhnlich aus 4 Eiern von länglicher Form, zartschalig und feinkörnig (19,5—21×14,2—15 mm). Sie zeigen auf glänzend grünlichweißem Grunde am dicken Ende einzelne bräunlich veilchenfarbene Schalenflecke und meist rundliche rotbraune und kastanienbraune Oberflecke und dazwischen einzelne schwarze Kritzel. Das Gelege wird etwa 14 Tage bebrütet. Die Jungen bleiben 3—4 Wochen im Nest, von den Alten mit Insekten und auch aus dem Kropfe gefüttert.

Ein englischer Pfleger dieses Vogels versuchte vergeblich mit ihm und einem Kanarienweibchen Mischlinge zu züchten. Im großen Flugraum war er durchaus verträglich. Von dem Gesang war der Pfleger wenig begeistert. Der Vogel wisperte ein paar Töne, kaum wert des Namens Gesang. Möglich ist es, daß es sich im vorliegenden Fall um ein Weibchen handelte.

Gefiederbeschreibung: ♂ Stirnband in der Mitte durch die Färbung des Oberkopfes unterbrochen, Augenbrauenstreif, Band über dem Bartstreif gelb; Kopfseiten, Bartstreif, Oberseite gelbgrün, letztere breit und matt dunkel gestrichelt; Kropfgegend, Körperseiten hellgrün, übrige Unterseite gelb; Flügel-, Schwanzfedern schwarzbraun, gelbgrün gesäumt; Auge dunkel; Schnabel oben hell hornbraun, unten gelblichweiß; Füße bräunlichhorngrau; Länge 150–160 mm.
♀ matter.

Ein, wie der auf S. 205 abgebildete Schwarzkopfweber, ziemlich selten eingeführter Weber ist der in Nordostafrika verbreitete

Larvenweber — Ploceus cucullatus abyssinicus *(Gm.)*

(s. Abb. S. 237), der in größerer Anzahl mit den abyssinischen Importen des Berliner Zoologischen Gartens in das Vogelhaus gelangte. In früheren Jahren kam er ab und zu auf den Vogelmarkt, meist als Art nicht erkannt und als Textorweber angeboten, dem er auch nahesteht.

Über sein Freileben berichtet sehr eingehend Emin Pascha, der bei seinen Dienstreisen im Sudan reichlich Gelegenheit fand, diesen Weber in den verschiedensten Gebieten zu beobachten. „Sein Hochzeitskleid", sagt Emin, „legt er je nach dem Beginn der Regenzeit in den verschiedenen Ländern zu verschiedenen Zeiten an: in Lado Ende April, gegen Süden hin etwas früher, und wo zwei Regenzeiten mit kurzem regenfreiem Zwischenraum existieren, da mag auch er wie viele andere Vögel stets gleichgefärbt bleiben. Von zänkischem, lebhaftem Temperament, ist er nichtsdestoweniger gesellig, und selten sieht man ihn allein, sondern gewöhnlich mehrere zusammen. Da hört dann das Zirpen und Erzählen gar nicht auf. Dabei ist er so wenig scheu, daß er ... die Gehöfte besucht und auf den Rohreinzäunungen Umschau zu halten liebt. Nachstellungen machen ihn neuerdings scheu. Einen sehr belebten Anblick gewährt eine Nestkolonie dieser Vögel, denn auch beim Brüten verleugnen sie ihren Gesellschaftstrieb nicht. Mengen der Beutelnester hängen an schwanken Zweigen über dem Wasserspiegel, oft ganz niedrig, jedoch so, daß auch das höchste Anschwellen des Flusses sie nicht erreicht. Da nimmt der Lärm der zu- und abfliegenden Vögel kein Ende. Einer bessert an seinem Neste oder ist eifrig mit der Konstruktion eines neuen Nestes beschäftigt; ein anderer sitzt auf seinem Neste und singt aus Leibeskräften dem brütenden Weibchen seine Lieder vor; ein dritter trägt den eben entschlüpften Jungen Futter zu. Alle aber singen und schreien und zirpen und rätschen, daß man seine Herzensfreude an dem lustigen Getriebe hat. In einem der Nester fand ich im Monat Juni (Lado) auf einer sehr spärlichen Unterlage von feinem Heu je zwei ziemlich große Eier (24×15,5 mm) von länglicher Gestalt. Sie sind von türkisblauer Farbe mit violetten, gegen das stumpfe Ende hin dichter gestellten Pünktchen bespritzt. Nur die Weibchen brüten und auch diese verlassen um Mittag für einige Zeit das Nest, um zu fressen. Die Nahrung ist eine gemischte. Früchte werden geradeso gern angegangen, als Insekten aufgenommen werden. Die Hauptnahrung aber bleiben Sämereien und Korn, und da die großen Vögel auch viel Nahrung brauchen und ihren kräftigen Schnabel nur zu gut zum Entkörnen der Maiskolben und der Durrabüschel zu gebrauchen wissen, möchten dann aber, wie alle Weber, viel Futter verwüsten, so sind sie den Eingeborenen recht unerwünschte Gäste. Sie klettern an den Durrastengeln sehr geschickt; auf der Erde, die sie viel besuchen, hüpfen sie mit aufgerichtetem Körper ziemlich steif umher."

Am Ufer des Albertsees fand Emin auf einer hohen Borassus eine Nestkolonie dieses Webers. Daß es in der Kolonie nicht immer friedlich zugeht, schließt Emin aus den unter der Borassuspalme am Boden liegenden abgerissenen Nestern und Eischalen. Gewöhnlich hält das Männchen Wache bei den Nestern. Letztere werden nach Heuglin auch nach der Brutzeit, wenn diese Weber zu großen Zügen vereinigt umherstreifen, zur Nachtruhe wieder aufgesucht.

Gefiederbeschreibung: ♂ Die Form der schwarzen Kopf- und Kehlzeichnung ist aus der Abb. S. 237 ersichtlich; Hinterkopf, Umsäumung der schwarzen Zeichnung goldbraun bis rotbraun, Unterseite goldgelb, bei alten Vögeln goldbraun überlaufen, oberseits goldgelb mit zwei schwarzen auf dem Unterrücken sich vereinigenden Schulterstreifen; Flügeldecken schwarz, kleine mit gelben Spitzen, größere gelbgesäumt; Schwingen schwarzbraun mit gelblichen Außen- und fahlen Innensäumen; Schwanzfedern olivbraun, grünlich-

gelb verwaschen; Schnabel schwarz; Auge braunrot; nach Emin bei alten Vögeln feuerrot bis organgerot; Füße rötlich hornbraun; Lg. 165—175, Fl. 85—95, Schw. 55—65 mm.

♀ Ober-, Hinterkopf olivgrün mit matter bräunlicher Federmitte; Kopfseiten hellgrünlichgelb; verschwaschener Augenbrauenstreif, Kehle mattgelb; übrige Oberseite, Halsseiten matt graubräunlich oliv, Rücken mit dunklen Schaftstrichen; übrige Unterseite trübweiß; Bauchmitte, Unterschwanzdecken weiß; Körperseiten bräunlich verwaschen; Flügelfedern schwarzbraun mit gelblichgrünen Säumen; große Deckfedern außen und Spitzen weißlich; Schwanzfedern braun, oliv verwaschen mit olivgrünen Außensäumen, Schnabel dunkelhornbraun, Unterschnabel heller; Auge dunkelbraun; Füße hellhornfarben.

Mit dem kräftigen Schnabel können diese Weber heftig beißen, worunter die Negerknaben, welche diese Vögel in Schlingen fangen, nach Emins Bericht, zu leiden haben. (Fortsetzung folgt.)

Larvenweber (s. S. 236).

Mein erster Sumpfrohrsänger.

Von A. Freiwald, Hemelingen.

(Nachdruck verboten.)

Nachdem ich als alter Vogelfreund schon jahrelang Weichfresser, auch Gelbspötter, teils ohne, zum größten Teile, und zwar die letzten Jahre immer mit Erfolg gekäfigt habe, stand mein Sinn schon lange nach einem Sumpfrohrsänger. Im Frühjahr 1923 hörte ich mit einem Freunde in der Bremer Umgebung die Rohrsänger ab, und wir hatten auch bald einen am Osterholzer Friedhofe gefunden, der ein Primus seiner Gattung war. Den folgenden Abend ging's mit dem Kauz los, in einer halben Stunde war der Rohrsänger mein. Freudestrahlend ging es nach Hause, und mein Piepmätzchen kam in den verhangenen Käfig. Die Eingewöhnung ging glatt vonstatten mittels Mehlwürmer und frischer Ameisenpuppen. Mehlwürmer verzehrte er die erste Zeit 50—60 Stück täglich, und wurden dieselben allmählich auf 20 Stück reduziert. Nach etwa 14 Tagen fing der Sumpfrohrsänger an zu singen, und konnte ich nie müde werden, seinem herrlichen Potpourri zu lauschen. Mitte Juli stellte mein Vogel den Gesang ein und wurde nun allmählich aufgedeckt. Hänschen wurde bald zahm und zutraulich. Anfang August ging es an die Übergewöhnung zum Mischfutter, welches ohne Schwierigkeiten genommen wurde. Gereicht wurde $^1/_3$ geriebene Möhre, $^2/_3$ Ameisenpuppen, zur Abwechslung rohes Fleisch, gekochtes Herz, Ei, Quark. Sehr erpicht war der Vogel auf Rahmhaut, welche als Leckerbissen gereicht wurde. Bei Vögeln, wie Gelbspötter, Rohrsänger, muß man, wie Herr Birk so treffend bemerkt, mit dem Mehlwurmtopf bei der Hand sein, mein Vogel bekam täglich 10—15 Stück. Um Weihnachten sah der Vogel nicht sehr einladend aus, kahle Stellen am Kopf, den Schwanz abgestoßen und zu fett. Nun kam Hänschen in einen Käfig 80×30×100 cm, und in vier Wochen war das Bäuchlein verschwunden. Anfang März fing mein Rohrsänger an zu mausern, zu gleicher Zeit setzte der Gesang ein. Die Mauser ging glatt vonstatten, und sang der Vogel jetzt sehr fleißig, besonders morgens und abends, am Tage sang er weniger. Meine Hoffnungen haben sich erfüllt, und hat der Sumpfrohrsänger sich für die Mühe seiner Verpflegung als ein dankbarer und fleißiger Sänger bewährt. Nun noch ein paar Zeilen zu den Ausführungen des Herrn Nieselt, betreffend Gesang des Gelbspötters und der Nachtigall. Wie Herr Nieselt den Nachtigallenschlag als Sperling im Vergleich zum Spöttergesang ansprechen kann, ist mir unerfindlich. Gewiß ist ein Gelbspötter, wenn er Ia ist, ein Meister unserer Sängerfürsten. Aber wer Nachtigallen, und zwar die besten Sänger, jahrelang verpflegt hat, wird über den Vergleich des Herrn Nieselt spöttisch lächeln. Ich möchte einmal wissen, was Herr Nieselt als Nachtigallen angesprochen hat, als er dieses Urteil fällte. Wir haben hier in Bremen ein Sprichwort, das lautet: Wat dem enen sien Uhl is, is dem annern sien Nachtigall.

Zum Schlusse noch einiges über den Fang des Sumpfrohrsängers, welcher nicht so schwierig ist. Ein ausgestopfter Kauz oder eine andere Eule wird

auf einen 1 Meter hohen Stock gebunden und zwei bis drei Meter von dem Gebüsch, in dem sich der Sumpfrohrsänger aufhält, fest in die Erde gesteckt. Nun nimmt man 3—4 fingerdicke Stöcke, befreit sie von allen Nebenästen, schneidet Kerben ein und steckt in dieselben kleine Leimruten, so daß dieselben querab zum Stock stehen. Diese Fangstöcke stellt man dicht vor das Gebüsch, aber so, daß dieselben von allen Seiten frei stehen. Nun wird an dem Stock, an dem sich der Kauz befindet, ein dünner Faden befestigt, der Fänger zieht sich 10—15 Meter zurück und setzt den Kauz durch Ziehen in schaukelnde Bewegung, gleichzeitig mit dem Munde zischende Laute ausstoßend. Es wird nicht lange dauern, dann sitzen die Vögel der Umgebung auf dem Busch und zetern auf den Kauz. Der Sumpfrohrsänger kommt meistens aus den unteren Teilen des Busches zum Vorschein und will nun auf Fangstöcken von einem Ast zum andern springen, kommt auf die Leimruten und ist gefangen. So einfach der Fang ist, so erfordert er doch immerhin eine gewisse Routine.

Erlebnisse mit Nymphen.

Von Ado Mertens.

(Nachdruck verboten.)

Mit den größten Hoffnungen auf gute Zuchterfolge richtete ich mir im Frühjahr dieses Jahres eine Vogelstube „Abteilung Nymphen“ ein. Dazu wurde in einer Mansarde an der Fensterseite ein Raum von etwa 3,50 × 2,50 × 2,50 m, teils durch Bretterverschlag, teils durch Drahtgeflecht abgetrennt. Das ausgehängte Fenster ersetzte ich durch einen mit Drahtgeflecht bespannten Holzrahmen. Ein Baumstamm in der Mitte, an dem auch ein Nistkasten aufgehängt wurde, und sonstiges Geäst, so angebracht, daß es die Flugmöglichkeit möglichst wenig behindert, vervollständigt die Einrichtung. Den Boden bedeckte ich mit einer 4—5 cm hohen Sandschicht, die später während der Brutzeit täglich naß gesprengt wurde. An Nistkästen hängte ich zur größeren Auswahl außer dem obenerwähnten noch drei Stück auf, alle in verschiedener Höhe und den einen davon so hoch wie möglich und dahin, wo am wenigsten Licht hinkommt. Ich erwähne dies ausdrücklich, weil gerade dieser Kasten später ein „Streitobjekt“ wurde.

Nymphensittiche.

Das Sommerheim war also fertig und meine zwei Paare „gehäubte Australier“ hielten Einzug. Das eine Paar ist ein in Deutschland gezüchtetes, aber doch blutsfremd, das zweite ein importiertes. Ende Mai merkte ich, daß alle Nistkasten auf ihre Tauglichkeit eingehend untersucht wurden. Schließlich wählten die Importierten den Kasten im Dunkeln und die anderen den am Baumstamme. Es dauerte nicht lange, da waren auch Eier da, und Männchen und Weibchen brüteten abwechselnd sehr eifrig. Doch kurz vor Ablauf der Brut fing der Boden des Nistkastens der Importen an zu reißen, und der Riß wurde schließlich bald fingerbreit! Da auch die Gipsmulde im Innern gerissen war, fiel alles Sägemehl heraus, und die vier Eier lagen auf dem blanken Boden bzw. Riß. Pech! Die Brut war leider verloren, denn das Paar verließ nach Ausbesserung des Nistkastens die Eier. Bei der Kontrolle ergaben sich vier vollständig entwickelte Junge in den Eiern. Das zweite Paar an seinem Baumstamme hatte auch die ganze Zeit eifrig gebrütet und ich hoffte mit jedem Tage, daß Junge schlüpfen würden. Wieviel Eier im Kasten waren, wußte ich nicht, denn ich hatte nicht kontrolliert, um nicht zu stören. Nach einer Brutdauer von etwa 25 Tagen hatte das Paar auf einmal scheinbar die Lust verloren und gab das Weiterbrüten auf. Erfolg: 3 Eier davon eines unbefruchtet, eines schon früh abgestorben und im dritten ein vollkommen ausgebildetes abgestorbenes Junges. Die war nun der ganze Erfolg der ersten Brut meiner Nymphen, und ich vertröstete mich auf die zweite! Im „Baumstammkasten“ waren schon bald wieder Eier, aber das „Importen-Paar“ ließ diesmal lange auf sich warten — ich glaube es waren vier Wochen. Legen und auch Brüten gin bei beiden Paaren wieder normal vor sich. Paar I hat fünf Eier. Davon eines nach 21 Tagen ausgegange eines unbefruchtet, zwei abgestorben und aus Nr. kroch, als das erste Junge schon drei Wochen a war, noch ein kleiner „Gelbflaum!“ Dieser Nachkömmling ging jedoch nach einem Tage schon ei denn er wurde von den Alten nicht gefüttert. B Paar II (importiertes) ging von drei Eiern eine aus, die beiden anderen waren klar. In der Zwischer

zeit hatte sich nun der Nachwuchs von Paar I gut entwickelt und war, etwas mehr als fünf Wochen alt, ausgeflogen. Die alten zeigten sich nun wieder sehr brütlustig und machten Annäherungsversuche an den „Kasten im Dunkeln". Während meiner Abwesenheit mußte es heftige Kämpfe abgesetzt haben, bei denen schließlich die Importen unterlagen, obwohl sie ein viel stärkeres Paar als das andere sind. Als ich morgens zum Füttern nach oben kam, lag das importierte Weibchen totgebissen am Boden, unter anderem war ihm eine Fußzehe abgebissen. Mein Ärger war groß, aber es war nichts mehr zu ändern! Paar I hielt noch am selben Tage Einzug in der neuen Wohnung, und nun noch das Allerschönste — es fütterte das drei Wochen alte Junge des gemordeten Weibchens, und nach acht Tagen war

Massenawachtel.

das erste Ei im Kasten! Gebrütet wurde vorläufig nicht, sondern man wartete damit, bis das Junge nach weiteren acht Tagen ausgeflogen war, und bis dahin waren es auch 7 Eier. Ein Ei, das beschädigt war, nahm ich weg. Nun ist wieder Ruhe und das Mörderpaar brütet fleißiger als zuvor und will mich scheinbar durch besonders guten Erfolg wieder versöhnen!

Aufruf!

Es kommen in letzter Zeit Sperlingspapageien und kleinere südamerikanische Sittiche in steigendem Maße mit ein- oder beiderseitig beschnittenen Flügeln auf den Markt. Wenn es unsern Händlern und Importeuren nicht gelingt, die südamerikanischen Vogelhändler und -Aufkäufer zu bewegen, von den Indianern nur Vögel mit unbeschnittenen Flügeln zu kaufen, so müssen wir Liebhaber uns dagegen verwahren. Ich fordere alle Käufer und Pfleger dieser Vögel auf, nur unbeschnittene Tiere zu verlangen und flugunfähige unbedingt abzulehnen. Es liegt mir fern, unsere Händler zu schädigen, vielmehr erscheint es mir angebracht, daß sich diese dadurch vor Verlusten schützen, daß sie auch ihrerseits die Abnahme geschändeter Vögel ablehnen. Es ist ein trauriger Anblick, die bedauernswerten Geschöpfe hilflos am Boden hocken zu sehen, wenn sie erschreckt von der Stange gefallen sind, und ihren Pfleger mit entsetzten Augen anstarren. Bis zur nächsten Mauser, manchmal viele Monate müssen diese Vögel in kleinen Käfigen mit dichtem Gesträuch gehalten werden, bevor man sie in die Flugräume einsetzen kann, eine Qual für Vogel und Pfleger. Die Eingewöhnung wird durch die apathische Ruhe der Frischfänge nur erschwert und gelingt in vielen Fällen da nicht, wo flugfähige Tiere durchgekommen wären. Das Beschneiden der Schwungfedern — manchmal von roher Hand den ganzen Flügel bis an die Handwurzel — ist eine ebenso scheußliche wie unnötige Manipulation und wird m. W. von den Fängern lediglich deswegen ausgeführt, damit die Vögel auf der Stange während des Transportes sitzen bleiben müssen und nicht flattern und entfliehen können. Im Interesse unserer Liebhaberei ist sehr zu wünschen, daß die Unsitte recht bald verschwindet. Ich hoffe, daß mein Aufruf im Kreise der Leserschaft ein Echo findet.

A. Krabbe.

Sprechsaal.

(Steht den Abonnenten kostenlos zur Verfügung.)

Frage 14: Welcher von den verehrten Lesern kann mir vielleicht unter obiger Fragenummer mitteilen, wie ich am radikalsten und nachhaltigsten diese lästigen Milben von den Vögeln resp. Gebauern vernichte und fernhalte? Trotz allerpeinlichster Sauberkeit, Auspinseln, Waschen, Beizen mit Petroleum und Insektentötungstropfen (Drogerien) ist es mir bisher nicht gelungen, über diese, ich möchte sagen, „Landplage" Herr zu werden, immer wieder und wieder erscheinen sie und machen mich nervös, rasend, ja, bringen mich fast zur Verzweiflung. Erwähnen möchte ich noch, daß ich an den Sitzstangen, auf welchen die Vögel des Nachts schlafen, diese Milbenfänger (Ölhalter) befestigt habe. Ich wundere mich, alle Möglichkeiten werden im Sprechsaal befragt und beantwortet. Da liest man von: Mehlwurmzüchtung, bester Käfigung der Vögel, bester Fütterung der Vögel usw. usw., nur von Milbenvertreibung las ich nichts. Pardon! Außer diesem einen von einem Herrn Apotheker vor nicht langer Zeit geschriebenen Aufsatz, der nur so von Fremdwörtern wimmelte und den ein Mann aus dem Volke, der nur die Volksschule besucht hat, nicht versteht! Leiden andere liebe Leser mit ihren Vögeln und Käfigen nicht unter den Milben? Mir wäre eine kleine, besser noch „große Diskussion" resp. Beantwortung hierüber sehr erwünscht.

M. N.

Aus den Verbänden.

Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber, Sitz Leipzig.

I. Um Zweifel zu beseitigen, bringen wir unseren Verbandsmitgliedern wiederholt zur Kenntnis, daß die Beiträge zum Reichsverband wie folgt festgesetzt sind: 0,30 M. für die Liebhaber, die durch einen Verein über einen bestehenden Landesverband Mitglieder des Reichsverbandes sind, 0,30 M. für die Liebhaber, die durch einen Verein ohne Vorhandensein eines Landesverbandes Mitglieder des Reichsverbandes sind, 1,00 M. für die Liebhaber, die durch einen Verein unter Umgehung eines bestehenden Landesverbandes Mitglieder des Reichsverbandes sind, 2,00 M. für Einzelmitglieder. Die Zahlung erfolgt von den Vereinen nur an die Landesverbände, wo kein Landesverband besteht, an den Reichsverband. Einzelmitglieder, die einem Landesverband angehören, zahlen ebenfalls nur an den Landesverband, im anderen Falle an den Reichsverband.

II. Anzeichnerisch begabte Mitglieder unseres Verbandes haben wir folgende Bitte: Der Reichsverband beabsichtigt, sich Briefbogen herstellen zu lassen. Als Briefbogenkopf benötigt er eine Versinnbildlichung des Verbandsgedankens, in der aber nicht allein der Gedanke des Zusammenschlusses, sondern auch das Sinnbild unserer Liebhaberei künstlerisch dargestellt werden möchte. Welche Liebhaber bieten uns hierzu die Hand? Den Entwurf bitten wir uns im Interesse der idealen Sache kostenlos überlassen zu wollen, wie auch die Auswahl unter etwa mehreren eingehenden Entwürfen. Erwünscht wäre die Einsendung der Entwürfe bis 1. Oktober 1924. J. A.: Petters, 1. Schriftführer.

Vom Vogelmarkt.

Von seltener auf den Vogelmarkt kommenden Vögeln werden angeboten:

Friedrich Frank, München, Gabelsbergerstr. 9: Rote Araras, große weiße Gelbhaubenkakadus, Guatemalasittiche, Elfenbeinsittiche, Kaktussittiche, Mönchssittiche, schwarz- u. rotköpfige Gould-, Spitzschwanz- u. Maskenamandinen, Organgeblaufink, rote Kardinäle, Klarinos, mittlerer Beo, Purpurtangaren, Dominikaner-Kardinäle, Massena-Wachteln, amerik. Wanderdrosseln, Papstfinken, Indigofinken, Schwarzkehl- u. Spiegeltrupiale, Seidenstare, Hahnschweifwitwen, Einfarbdrosseln, Stieglitzbastard mit viel Weiß, weiße u. braune Kanarienhähne, weißer Haussperling (Albino).

Joh. Götz, Vogelexport, Neu-Ulm (Bayern): Tarantin. Zwergpapageien, Schopfwachteln, Grünflügeltauben, rotgehäubte Kardinäle.

Max Kleinert, Berlin NO 18, Strausberger Str. 13: Rote Araras, große weiße Gelbhaubenkakadus, Molukken-Kakadus, rot- u. schwarzköpfige Gouldamandinen, Spitzschwanzamandinen, Maskenfinken, Schamadrosseln, Purpurtangaren, Glockenvögel, Blauspötter, rote Kardinäle, Indigofinken, Papstfinken, Elfenbeinsittiche, Tukan.

Eugen Müller, Küllstedt im Eichsfeld: 1,1 Zwergara.

Willy Odenwald, Fulda: Beo, Rosella-Männchen, Guatemalasittiche, Elfenbeinsittiche, mex. blaubürzl. Sperlingspapageien, Papstfinken, Indigofinken, Trupiale, mex. Häher, Massena-Wachteln, Klarinos, mex. Spottdrosseln.

Schlößchen Allersberg b. Nürnbg.: Braut-, Mandarin-Enten.

W. Voigt, Jena, Feodorastr. 13: 1,0 kl. Kubafink, 1,0 blaub. Sperlingspapagei.

Dr. Wagner, Bad Salzbrunn (Schles.): Junge grüne (blaublütige) Wellensittiche.



Herrn F. R., Rathenow. Fast alle fremdländischen Finken sind schon in ungeheizten, aber frostfreien Räumen überwintert worden. Die Voraussetzung ist, daß sie völlig gesund, kräftig und voll befiedert sind, ferner, daß für geeignete Übernachtungsgelegenheiten und richtige Ernährung gesorgt ist. In einem geräumigen Flugraum können Wellensittiche mit den verschiedensten anderen Sittichen zusammen gehalten werden, z. B. mit Nymphensittichen, den Plattschweifsittichen, Sperlingspapageien, auch den kleinen Edelsittichen, wie Rosen-, Pflaumenkopfsittich, während die größeren Edelsittiche und die gewandten Keilschwanzsittiche ihnen gefährlich werden können.

Herrn M., Naustadt; Herrn J. M. M., Koburg ist brieflich Bescheid zugegangen.

Herrn J. F., Herrn W. S., Speyer: Beiträge dankend erhalten.

Herrn T. L., Leipzig; Herrn E. P., Düsseldorf. „Schwarzbäuchige Tigerfinken" als neu eingeführte Form des Tigerfinken sind mir unbekannt. Das Männchen des gemeinen Tigerfinken ist im Brutkleid immer mehr oder weniger schwarzbäuchig. Schon die Federn an Kehle und Brust sind am Grunde schwarz, und nur der übrige Teil der Federn zeigt das schöne Rot. Das Rot schwindet nach hinten immer mehr, so daß der Bauch mehr oder weniger Schwarz zeigt, der hintere Teil des Bauches, die Aftergegend und Unterschwanzdecken sind immer schwarz. Es gibt aber eine Form des Tigerfinken, die in Birma, Tenasserim, auf Flores und Timor vorkommt, die im allgemeinen dem gemeinen Tigerfinken gleicht, aber niemals schwarzes Gefieder an der Unterseite zeigt. Diese ist bei ihm stets leuchtend ockergelb. Der gelbbäuchige Tigerfink — Sporaeginthus flavidiventris *(Wall.)* gelangte in einem Paar im Jahre 1914 in den Besitz des Herrn Horst Wagner in Bln.-Schöneberg.

Herrn L. M., Karlstadt. Der Graupapagei ist infolge einer Lebererkrankung eingegangen. Die Leber war vergrößert, mit Blut überfüllt und in ihrer Konsistenz brüchig. Der Vogel litt außerdem an Tuberkulose.

Herrn R. D., St. Veit a. Glan. Der Wunsch, ein sicheres Kennzeichnen für eine männliche Nachtigall zu erfahren, ist begreiflich, aber die Erfüllung dieses Wunsches ist kaum möglich. Alle die üblichen Angaben über Kopffärbung, Schwanzlänge, Lebhaftigkeit und Größe der Augen, Länge des Laufs, des Schnabels, Gestalt usw. sind nicht stichhaltig. Rausch sagt: „Das sicherste geschlechtliche Unterscheidungsmerkmal ist . . . bei der gemeinen Nachtigall im Frühjahr die sichtbare Steißspitze. Fehlt dieselbe im Mai, so ist der Vogel ein sicheres Weibchen." Vielleicht bieten aber die Flügelmaße einen Anhalt zur sicheren Bestimmung der Geschlechter. Die Länge des Flügels, gemessen vom Flügelbug bis zur Spitze der längsten Schwinge, ist beim ♂ 84—87 mm, beim ♀ 79—84 mm. Man könnte danach, vorausgesetzt, daß man einen Vogel mit unverletzten Schwingen vor sich hat, mit einiger Sicherheit annehmen, daß Nachtigallen, deren Flügellänge mehr als 84 mm beträgt, Männchen sind.

Herrn K. Z., Nauen. Der Käfig genügt zur Beherbergung des Vogels. Das vorläufig gereichte Futter ist richtig. Neben dem Genannten können auch Hafer, Rübsen, Spitzsamen, Sonnenblumen-, Kürbis-, Apfel-, Birnenkern und Nadelholzsamen (Kiefern, Fichten, Tannen), auch Zirbelnüsse gereicht werden. Alles in steter Abwechslung und guter Qualität. Besonders beim Einkauf der Nadelholzsamen ist darauf zu achten, das sie nicht taub sind. Man kann diese Samen auch in den Zapfen reichen. Fichtenzapfen können die Kreuzschnäbel meist leicht öffnen, Kiefernzapfen legt man einige Zeit auf den warmen Herd, dann sich die Schuppen öffnen. Frische Nadelholzzweige, Grünkraut, Beeren und ab und zu ein Mehlwurm sind zuträglich.

Herrn R. H., München. Die Massenawachtel (s. Abb. S. 239) ist eine recht selten eingeführte Wachtel aus Mexiko. Sie gehört zu den am schönsten gefärbten Wachteln. Die dunklen Zeichnungen am Kopf sind schwarz, ebenso die Unterseite, die hellen Zeichnungen an diesen Körperteilen reinweiß, die Mitte der Kropfgegend, die Brust und der Bauch tief kastanienbraun. Die Oberseite ist rostbräunlich mit hellen Säumen und Schaftstrichen; die mehr oder weniger runden lichen Flecken auf Flügel und Schwanz sind schwarz, die helle Umgebung graugelblich, die Schaftstriche rostgelb, die Lg. ist 250 mm.

Herrn K. P., M.-Gladbach. Der Vogel, ein Weibchen, Organgeweber, ist infolge von Darmentzündung eingegangen.

(Fortsetzung auf der 2. Umschlagseite.)

hrgang 53 | 11. September 1924 | Heft 30

DIE GEFIEDERTE WELT.

ZEITSCHRIFT FÜR VOGELLIEBHABER

Begründet von Dr. Karl Ruß

Herausgegeben von Karl Neunzig in Berlin-Hermsdorf

Inhalt:

Ein Beitrag zur Weichfresserfütterung. Von J. Birk, Leipzig.
Neueinführungen und Seltenheiten. Von Karl Neunzig. (Fortsetzung.)
Mein erster Sumpfrohrsänger. Von A. Freiwald, Hemelingen.
Erlebnisse mit Nymphen. Von Ado Mertens.
Aufruf - Sprechsaal - Aus den Verbänden - Vom Vogelmarkt - Redaktionsbriefkasten - Aus den Vereinen.

Abonnement monatlich (4 Nummern) 1.50 Gm. — Einzelpreis des Heftes 50 Gpf.
vermittelt das nächste Postamt bzw. der zuständige Briefbote. / Postversand ab Burg Bez. Magdeburg.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung / Magdeburg / Postschließfach 148

Aus den Verbänden.

Vereinigung der Vogelliebhaber-Landesverband Preußen. Am Donnerstag, dem 18. September, findet abends 8 Uhr eine ordentliche Sitzung im Aquarium, Berlin, Kurfürstendamm 9, Sitzungssaal des Vereins „Agintha", statt. Alle dem Verbande angeschlossenen Mitglieder, auch solche von auswärts, welche zufällig in Berlin anwesend sind, werden freundlichst dazu eingeladen. Die Tagesordnung wird in der Sitzung bekanntgegeben. Um pünktliches Erscheinen bittet

Der Vorstand. J. A.: P. Böhme, 1. Schriftführer.

Aus den Vereinen.

Vereinigung der Liebhaber einheimischer Vögel zu Berlin. Sitzung jeden 2. Donnerstag nach dem 1. und 15. des Monats im Vereinslokal zum „Alexandriner", Alexandrinenstraße 37a. Gäste stets willkommen.

J. A.: P. Böhme, Schriftführer,
Berlin O 17, Rüdersdorfer Str. 69.

Alte Vereinigung der Vogelliebhaber zu Dresden. Versammlung jeden Freitag, abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Blasewitzer Hof". Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. J. A.: Matth. Meys, Schriftführer.

Verein Vogelschutz und -pflege zu Dresden. Versammlung jeden Donnerstag, abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Schillers Restaurant", Ecke Stifts- und Ehrlichstraße. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen.

Bernhard Kühn, Vorsitzender.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei zu Hamburg. Sitzungen finden statt jeden 1. und 3. Dienstag im Monat in Hüttmanns Hotel, Poolstr. 22, abends 8¼ Uhr. Nächste Sitzung Dienstag, den 16. September 1924. Gäste sowie auch Exotenliebhaber stets willkommen.

J. A.: Arnold Weber, 1. Vorsitzender.

Vereinigung hannoverscher Vogelliebhaber. 43. Mitgliederversammlung, 13. Juli 1924. Anwesend waren 13 Mitglieder und 4 Gäste. In Vertretung des behinderten Herrn Appel eröffnet Herr Greite die Versammlung. Herr Eskuche verlaß einen Aufsatz über den Gelbspötter von Paul Rückert aus der neuen Berliner Zeitschrift „Der Vogelliebhaber". Aus dem verlesenen Aufsatz verdient hervorgehoben zu werden, daß Rückert seine Gelbspötter im Winter ausschließlich mit trockenen Ameisenpuppen und Mehlwürmern fütterte. Bei dem Übergang von Sommerfutter reichte er anfangs 3—6 Würmer täglich und steigerte dann die Gaben bis zu 30 Stück (in zwei bis drei Zeiten). Mit dieser einfachen Fütterungsweise gelang es Rückert, seine Gelbspötter mehrere Jahre zu überwintern. Herr Greite berichtet sodann von dem sogenannten Kaiserfink in der Eilenriede, der anfangs wie ein guter Fink schlägt und dann ein paar Takte eines nicht zu bestimmenden Gesanges anhängt. — Sodann verliest Herr Eskuche einen zweiten Aufsatz aus der schon erwähnten Zeitschrift über Rotkehlchenpflege von Johann Birk. Auch hier wird, wie so oft, betont, daß der Vogel zur vollen Erhaltung seiner Gesundheit und zur rechten Entfaltung seiner Eigenheiten einen großen Käfig braucht, und daß daher Liebhaber, die ihre Tiere in enge Gelasse sperren, keine Freude an dem Gedeihen ihrer Lieblinge und auch an ihrer Beobachtung haben werden. — 44. Mitgliederversammlung, am 15. August 1924. Anwesend 20 Mitglieder. Eröffnung der Versammlung durch Herrn Becker. Herr Greite bot Mineralsalze, Normalin und Nährsalzextrakt an. Ein Mitglied zeigte ein Paar Kreuzschnäbel herum und bot sie zum Tausche an. Dann hielt Herr Ottens aus Eilvese einen sehr interessanten Vortrag über „Praktischen Vogelschutz". Er führte darin aus, daß erst nach den Freiheitskriegen die Abnahme der Vogelwelt begonnen hätte, besonders begünstigt durch das Abholzen der Waldungen, die Begradigung der Flüsse und den Gebrauch von Feuerwaffen, weitere Verminderung sei dann durch die Verkoppelung und das Urbarmachen eingetreten, da dadurch die vielen Knicks verschwunden sind. Auch die intensive Landwirtschaft und die Reinkultur in der Forstwirtschaft hat der Vogelwelt manchen Schaden zugefügt. Ferner die Entdeckung der Heide mit ihren Folgeerscheinungen, die Zunahme der Wanderungen, und dann der Krieg. Dieser Verminderung haben sich dann Männer wie Liebe entgegengestellt und den Vogelschutz wachgerufen, der sich allmählich entwickelt und zur Einführung des Vogelschutzgesetzes beigetragen hat. Weiter führte der Vortragende an, daß es auf dem Lande noch teilweise schlecht mit dem Vogelschutz aussehe, und daß besonders die neuen, modernen Jäger viel Schaden anrichten. Dann kam er auf das Thema: wie können wir praktischen Vogelschutz treiben, und wies darauf hin, daß man Brutgelegenheit schaffen und die Feinde in Schach halten müsse. Besonders wurde auf das Anpflanzen von Beerensträuchern hingewiesen. An den Vortrag schloß sich eine Besprechung an, in der Herr Becker auf die geschichtliche Entwicklung des hiesigen Vogelschutzvereins hinwies. Ferner wurde der Vogelschutzverein gebeten, zur Verminderung der Krähen in der Eilenriede Mittel zu schaffen, da diese sich als arge Nesträuber erwiesen hätten. Herr Schnetter wies darauf hin, daß man in Schrebergärten keine Windmühlen anbringen dürfe, da hierdurch die Singvögel vertrieben würden. Dann stellte Herr Troschütz den Antrag, der Arbeitsgemeinschaft für deutsche Vogelforschung beizutreten. Der Antrag wurde einstimmig angenommen. Ferner wurden noch finnische Ameisenpuppen angeboten, das Pfund 3.60 Mark.

Verein von Vogelfreunden Karlsruhe. Gegr. 1888. Monatsversammlung jeden 1. Donnerstag im Monat. Vorstandssitzung jeden 1. Donnerstag nach dem 15. Nächste Vorstandssitzung 18. September im Vereinslokal „Goldener Adler".

Verein der Vogelliebhaber Königsberg (Pr.). Sitzung an jedem Freitag nach dem 1. und 15. des Monats, abends 8 Uhr im Vereinslokal „Kaiser-Kaffee", Kaiserstraße, Ecke Schnürlingsstraße. Gäste sind willkommen.

J. A.: Ernst Reinholdt, 1. Vorsitzender.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig. Vereinssitzungen jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat im Vereinslokal „Bauers Brauereirestaurant", Täubchenweg. Nächste Sitzung Donnerstag, den 18. September. Gäste stets willkommen.

J. A.: Johann Birk, 1. Vorsitzender.

Verein der Vogelfreunde Leipzig-Plagwitz. Vereinslokal: „Gosenschlößchen", Leipzig-Plagwitz. Sitzungen an jedem 1. und 3. Montag des Monats, abends 8 Uhr. Vogelfreunde sind stets willkommen. — Der Verein veranstaltet sein 1. Stiftungsfest am 20. September 1924 im Etablissement „Gosenschlößchen" in L.-Plagwitz. Beginn 7 Uhr abends. Vogelliebhaber und Vogelfreunde sind herzlichst eingeladen.

J. A.: Karl Scholtissek, 1. Vorsitzender, Leipzig-Plagwitz, Lauchstädter Straße 30.

Verein der Vogelliebhaber zu Mannheim. Versammlungen finden alle 14 Tage Samstag abend 8 Uhr im Vereinslokal „Restauration z. gold. Falken" statt. S. 1. 17. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen.

Johann Daubmann, 2. Schriftführer.

„Ornis", Freie Bezugs-Vereinigung der Waldvogelliebhaber Deutschlands. Gegründet 1912. Auf vielseitigen Wunsch der alten Mitglieder wollen sich die Waldvogelliebhaber wieder in der „Ornis" zusammenschließen. Als amtliches Organ ist die „Ges. Welt" ausersehen worden, und werden die Artikel, die früher in den „Ornis-Blättern" erschienen, in obiger Zeitschrift gebracht werden. Aus diesem Grunde bittet die Geschäftsführung um eifrige Mitarbeit, damit unserer Waldvogelpflege wieder der Platz eingeräumt wird, der ihr gebührt. Anmeldungen sind unter Beifügung von 2 M. an den Geschäftsführer zu richten; Mitglieder erhalten auf Mischfutterbestellungen 5 % Rabatt. Mit treudeutschem Gruß

Martin Sperling, Halle a. d. S., Südstr. 49.

Zoolog. Verein zu Zwickau i. S. Versammlung jeden Freitag nach dem 1. und 15. jeden Monats, abends 8 Uhr, im Restaurant „Zur Bleibe", Katharinenkirchhof. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen.

J. A.: Paul Schmidt, 1. Vorsitzender,
Zwickau i. S., Bosenstr. 44.

Vereinsbericht des Zoologischen Vereins zu Zwickau i. S. Der erste Vorsitzende eröffnete 8^{45} Uhr die Versammlung und begrüßte die Erschienenen. Eingegangen waren unsere Vereinszeitschrift sowie mehrere Probehefte eines neuen Fachblattes „Der Vogelliebhaber". Ferner kam man auf unsere nächstjährige Ausstellung zu sprechen. Da es nunmehr an der Zeit ist, mit den Vorarbeiten für dieselbe zu beginnen, wurden hierzu die verschiedenen Aus-

(Fortsetzung auf der 3. Umschlagseite.)

schüsse gewählt. Den weiteren Teil des Abends füllte eine längere Debatte über unsere Lieblinge aus, worauf 11³⁰ Uhr vom Obengenannten die anregend verlaufene Versammlung geschlossen wurde. — NB. Um der Öffentlichkeit das Vorhandensein eines Vogelliebhabervereins in Erinnerung zu bringen, erläßt die Vereinsleitung von Zeit zu Zeit in den hiesigen Tageszeitungen Artikel über unser sportliches Gebiet, deren letzter im nachstehenden wiedergegeben sei:

Fliegende Edelsteine.

Fliegende Edelsteine werden sie genannt, die prächtigen Kolibris auf dem amerikanischen Kontingent, mit ihrem metallisch schimmernden und glitzernden Gefieder. Die große Mehrzahl aller Sterblichen kommt leider niemals in die Lage, die verschwenderische Farbenfülle tropischer Zonen mit eigenen Augen zu bewundern. Möge ihnen zum Trost gereichen, daß auch unsere deutsche Heimat demjenigen, der Verständnis und Liebe zur Natur und ihren Geschöpfen besitzt, guten Ersatz bietet. Wie lieblich und zart klingt in würz'ger Waldesluft der einfache Gesang unseres Stieglitzes, welcher im bunten Federkleide manchem tropischen Vertreter nicht nachsteht. — Nur wenigen dürfte bekannt sein, daß hier in Zwickau auch ein Verein für Freunde der Vogelwelt besteht. Vor mehr als zwei Jahrzehnten schlossen sich hiesige Bürger zusammen und gründeten einen ihrem Zweck entsprechenden Verein, den „Zoolog. Verein zu Zwickau". Ursprünglich als Vereinigung für die gesamte Tierwelt geplant, entwickelte sich im Laufe der Jahre das Interesse mehr und mehr für die Vogelwelt, so daß heute nur noch Vogelkunde, -schutz- und -liebhaberei geübt wird. — Der Verein beabsichtigt nächstes Jahr eine Ausstellung zu veranstalten. — Die Versammlungen finden jeden Freitag nach dem 1. und 15. jeden Monats im Restaurant „Zur Bleibe", Katharinenkirchhof, abends 8 Uhr statt. Zielbewußte Liebhaber als Gäste jederzeit willkommen. — Vogelliebhaber! Erwacht aus eurer Lauheit. Schließt euch einem Verein an, ehe es zu spät ist. Wie bald könnten unsere Gegner im Land- und Reichstag wieder versuchen, durch verschärfte Gesetzesbestimmungen unsere schöne Liebhaberei zu unterbinden. Demzufolge ist es Pflicht eines jeden Vogelliebhabers, sich einem Verein anzuschließen, welcher dem Landes- oder Reichsverband der Vogelliebhaber angehört. Auskunft erteilt jederzeit gern der 1. Vorsitzende, Paul Schmidt, hier, Bosenstraße 44.

Zoolog. Verein zu Zwickau i. S.
Mitglied des Landesverbandes „Sachsen" für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei.
Mitglied des Reichsverbandes „Deutscher Vogelliebhaber".
J. A.: W. Fritzsche, Schriftführer.

Empfehlenswerte Bücher:

Für Freunde der heimischen Vogelwelt.

Die deutsche Vogelwelt nach ihrem Standort. Ein Beitrag zur Zoogeographie Deutschlands und zugleich ein Exkursionsbuch zum Kennenlernen der Vögel. Von Werner Hagen. Mit 74 Abbildungen und 4 Schwarzdrucktafeln. Kart. 8.— M.

Die einheimischen Stubenvögel, ihre Naturgeschichte und Zucht. Von Karl Neunzig (zugleich 6. Auflage des Dr. Karl Rußschen Handbuchs für Vogelliebhaber Band II). Mit 22 Farbentafeln und 188 Textabbildungen. Geh. 14.—, geb. 17.— M.

Die gefiederten Sängerfürsten des europäischen Festlandes, ihre Naturgeschichte, sachgemäße Käfigung, Behandlung und Pflege als Stubenvögel. Von Mathias Rausch. 2. Auflage. Mit 8 Farbendrucktafeln und 16 Textabbildungen. Kart. 8.— M.

Die Hauptregeln der Sprosserpflege. Scherzreime von Oskar M. Kisch. Mit 2 Abbildungen. 1.— M.

Der Dompfaff, seine Naturgeschichte, Pflege, Abrichtung und Zucht. Auf Grund 54jähriger Erfahrung von F. Schlag. 8.—10. Auflage. Mit 2 Schwarzdrucktafeln. Kart. 1.— M.

Die deutschen Sumpf- und Strandvögel. Von Dr. Curt Floericke. Mit 44 Abb. auf 15 Tafeln in Schwarzdruck. Kart. 4.50 M.

Die deutschen Schwimm- und Wasservögel. Von Dr. Curt Floericke. Mit ca. 45 Abb. auf 15 Tafeln in Schwarzdruck. Kart. 4.50 M.

Die mitteleuropäischen Vögel. Von Dr. E. Babe. Band I. Singvögel. Mit 1 Farbentafel, 4 Schwarzdrucktafeln, 81 Tafeln in Photographiedruck u. 144 Textabbild. von Nestern, Eiern u. Vogelteilen. Geb. in Ganzleinen 5.— M.

Allerlei sprechendes gefiedertes Volk. (Raben- und Krähenvögel, Staroögel usw.) Ein Hand- und Lehrbuch von Dr. Karl Ruß. Mit 5 Vollbildern in Schwarzdruck. Kart. 8.— M.

Gefiederte Hausfreunde I. Von Karl Neunzig. Kurze Unterweisung üb. d. Pflege heimischer Stubenvögel. Kart. 1.— M.

Die Fänge der Raubvögel Mitteleuropas. Von Prof. Dr. Carl R. Hennicke. Mit 33 lithogr. Tafeln. Kart. 5.— M.

Für Liebhaber fremdländischer Vögel.

Die fremdländischen Stubenvögel, ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht. Von Karl Neunzig. (Zugleich 5. Auflage des Dr. Karl Rußschen Handbuchs für Vogelliebhaber Band I.) Mit 42 Farbentafeln und 400 Textabb. Geh. 30.—, geb. 35.— M.

Die fremdländischen Weichfutterfresser (Insekten- od. Kerbtierfresser, auch Wurmvögel genannt, Frucht- od. Beerenfresser u. Fleischfresser). Mit Anhang: Tauben- und Hühnervögel. Von Dr. Karl Ruß. (Die fremdländischen Stubenvögel Bd. II.) Mit 16 Farbentafeln. Geh. 30.— M.

Gefiederte Hausfreunde II. Von Karl Neunzig. Kurze Unterweisung über die Pflege fremdländischer Stubenvögel. Mit 51 Abbildungen. Kart. 1.— M.

Dr. Karl Ruß, Die fremdländischen Stubenvögel, ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.
Bd. I—IV. Geh. 150.— M., in Halbleder geb. 175.— M.
Bd. I. Körnerfresser ist einzeln nicht käuflich.
Bd. II. Weichfresser. Geh. 30.— M. Bd. III. Papageien. Geh. 30.— M.
Bd. IV. Lehrbuch d. Stubenvogelpflege. Geh. 40.— M.

Webervögel und Widafinken, ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht. Von Dr. Karl Ruß. Kart. 3.— M.

Bilder aus der Vogelstube. Schilderungen aus dem Leben fremdl. u. einheim. Stubenvögel. Von Dr. Karl Ruß. Kart. 3.— M.

Für Papageien-Pfleger.

Die Papageien, ihre Naturgeschichte, Pflege, Züchtung und Abrichtung. Von Dr. Karl Ruß. (Die fremdländ. Stubenvögel Bd. III.) Mit 10 Farbentafeln. Geh. 30.— M.

Der Wellensittich, seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht. Von Dr. Karl Ruß. Sechste, von Karl Neunzig gänzlich umgearbeitete und vermehrte Auflage. Mit 1 Farbendrucktafel und 31 Textabbildungen. Kart. 2.50 M.

Sprechende Papageien. Ein Hand- u. Lehrbuch von Dr. Karl Ruß. 3. verb. Aufl. Mit 2 Farben- u. 32 Schwarzdrucktaf. Kart. 4.50 M.

Der Graupapagei, seine Naturgeschichte, Pflege, Abrichtung und Züchtung. Von Dr. Karl Ruß. 2. von Karl Neunzig bearbeitete Auflage. Mit einem buntfarbigen Aquarelldruck, 16 Textabbildungen und 1 Verbreitungskarte. Kart. 2.50 M.

Der Graupapagei in der Freiheit und in der Gefangenschaft. Von Dr. Carl R. Hennicke. Mit 1 Buntbild. Geh. 1.50 M.

Die Amazonen-Papageien, ihre Naturgeschichte, Pflege, Abrichtung und Züchtung. Von Dr. Carl Ruß. 2. von Karl Neunzig bearbeitete und vermehrte Auflage. Mit 1 buntfarbigen Aquarelldruck und 21 Textabbildungen. Kart. 2.50 M.

Behandlung und Heilung der Krankheiten von grauen und grünen Papageien. Von O. Majewski. Geh. 1.— M.

Für Kanarienzüchter.

Der Kanarienvogel, seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht. Von Dr. Karl Ruß. 14. Aufl. mit 8 Farbentaf. u. zahlreich. Textbild Bearb. u. herausgeg. von Karl Neunzig. Kart. 2,50 M.

Die Bastardkanarienvogelzucht. Von Walter Barth. Mit 20 Abbildungen und 1 Tontafel. 1.50 M.

Die Farben- und Gestaltskanarien nebst Beschreibung aller verschied. Kanarienrassen, deren Entstehung, Form- u. Farbenveränderung, Bastardzucht und Farbenfütterung von A. Aschenbrenner. Mit vielen stichhaltigen Abbildungen. 1.75 M.

Der Kanariengesang. Allgemeinverständliche sowie musikalische und phonetische Darstellung von W. Kluhs. 1.— M.

Für Vogelschutz.

Handbuch des Vogelschutzes. Von Prof. Dr. C. Hennicke. Mit 9 Doppeltontaf., 1 Karte u. mehr als 200 Textabbild. Geh. 8.— M., geb. 10.— M.

Für Geflügelzüchter.

Der Brutapparat in der Geflügelzucht. Darstellung der Herkunft, Bauart, Nutzanwendung und Herstellung des Brutapparates. Von Max Schwarzlose. Mit 10 Abb. im Text. 1.— M.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg

Postschließfach 148

Anzeigenteil

Die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 20 G.-Pf. berechnet. Aufnahme erfolgt gegen Voreinsendung des Betrages in Reichsgeld Brief od. auf unseren Zahlstellen: Postscheckkonto: Magdeburg 3148, Wien 156 687, Bern III 4326, Prag: Creditanstalt d. Deutschen unter Angabe des Zwec

Käfige u. Gerätschaften

Vogel-Mistelleim

zum Fangen schädlicher Vögel, Ia klebend bei jeder Witterung, garantiert gebrauchsfähig, Dose 1,50 M fr. von **A. Freitag Nchf.**, Frankenberg i. S. 6. Wiederverkäufer hohen Rabatt. [692

Vogel-Fangkäfige 2.50 und 4.50 M, Schlagnetze f. kl. schädl. Vögel 1.90 M, f. größ. 2.10 u. 2.40 M. Katalog gratis. **J. Tannen**, Gronau 58 (Westf.). [693

Futtermittel

Ornis-Haus Halle-Saale

Gegründet 1912

Spezialität:
Individuelle Weichfresserpflege nach Angaben des Herrn Apotheker Adalbert Jena-Biberach-Riß. (Alleiniges Herstellungsrecht.)

Reform-Normal I, Volterenm.,
Reform-Normal II, f. Rotkehlchen, Schwarzplatten usw.,
Reform-Normal III, f. Nachtigall., Sprosser usw.,
Reform-Normal IV, f. Gelbspött., Goldhähnchen usw.,
Reform-Normal V, f. Schama usw.,
Körnerfutter Ia für jede Vogelart. [694

Inhaber langjähriger Fachmann, siehe „Ornis-Buch" (90 S.) Mk. 1
Preisliste auf Wunsch!

Mehlwürmer Pfd. 8 M, 1/4 = 2 M franco. Voreins. 695] **Jeitner, Breslau**, Weinstr. 12.

Mehlwürmer

geg. Einsend. v. 2.— Rentenmark 1/4 Pfd. franko versend. **D. Waschinski & Co.**, Biesenthal I (Mark). [696

Vogelfutter [697

für Kanarien, Waldvögel, Exoten, Papageien, Weichfresser. Anerkannt bewährteste Mischungen auf Grund langjähriger Erfahrung. Liste 13 über Vogelfutter, Liste 5 über Vogelkäfige, Zuchtgeräte usw. mit etwa 400 Abbildungen.

W. Göpel, Leipzig,
Tröndlinring 1. Telephon 14 958.

Bei Anfragen bitte auf die „Gefiederte Welt" Bezug zu nehmen.

Ich suche zur laufenden Lieferung:

Muska, Weißwurm, Insektenschrot und Seidenraupenschrot, sackweise, und bitte um Zusendung 698] **von Preisen.**

Alfred Böcher,
Heidelberg-Kirchheim.

Vögel

Ich suche 4 Stieglitze

(2 Sechsspiegler sowie 2 Achtspiegler) und bitte um gelegentliches Angebot, wenn auch erst in einigen Wochen lieferbar.

Angeb. unt. **„Reelles Geschäft"** a. d. Geschäftsstelle d. Gefied. Welt. [699

Verkaufe! [700

1 Bco	50	M
1 Rosella-Männchen	35	„
Guatemalasittiche	à Paar 30	„
Elfenbeinsittiche	„ „ 45	„
Mex. blaubürzl. Sperlingspapageien	à Paar 25	„
Papstfinken	„ „ 35	„
„ (Männchen in Pracht)	à Stück 20	„
Indigofinken	„ Paar 35	„
Trupiale	„ Stück 30	„
Mex. Häher	„ „ 30	„
Massena-Wachteln	„ Paar 60	„
Klarinos	„ Stück 50	„
Mex. Spottdrosseln	„ „ 30	„

Willy Odenwald,
Fulda, Vogelexport und -import.

Sperlingspapagei,

blaubürzl., bereits 5 Monate in Freivoliere, ganz tadellose Exemplare, 3,3, à Paar 18.— M. Verpackung u. Porto extra. **K. Blüm, Mainz,** Bebelring 46. [701

Verkaufe oder tausche

6 Kanarienhähne, kräftige Vögel aus erster Brut, fleißig singend, à 10 M mit Verpackung; tausche eotl. gegen amerik. Spottdrossel, Goldstirnblattvogel, Schamadrossel oder sprechenden Papagei; zahle eotl. zu. **M. Diwersy,** [702 Merzig (Saargebiet). A. Z.-Mtgl. 183.

Büffelweber in Pracht	Stück 17.—
3 Stück 45.—, 10 Stück 120.—	
Tarantin. Unzertrennliche	Paar 45.—
3 Paar 120.—, 10 Paar 340.—	
Sperlingspapageien	Paar 18.—
Kaktussittiche	„ 13.—
junge Alexandersittiche	Stück 13.—
junge Mohrenkopfpapageien	„ 45.—
Kl. Gelbhaubenkakadu	„ 70.—
Gr. Gelbhaubenkakadu	„ 50.—
Weißhaubenkakadus	„ 100.—
Glockenvogel	„ 45.—
Mexikanische Grünhäher	„ 30.—
Rote Kardinäle t. Gesang	„ 35.—
Karmingimpel, Männchen	„ 8.—
3 Stück 18.—, 10 Stück 50.—	
Tahaweber in Pracht	Paar 15.—
Möwchen	„ 18.—
Kanarienhähne	Stück 8.—, 10.—, 15.—
Kanarienweibchen	Stück 1.50 u. 2.—

Nachtigall-Edel-Kanarienfänger mit tiefen Nachtigalltouren, Jungtiere Stück 35.—
reinweiß und hermelingezeichnete Nachtigall-Kanarien-Edelsänger, Jungtiere Stück von 50.— an Vorsänger, 1923er 70.— bis 100.—
Kapuziner-Affen, Husarenaffen, Meerkatzen, kleine Drill, Hundspaviane, Javaner Affen, helle Piton-Schlangen.

Versand per Nachnahme, Porto und Verpackung 3.50, als dringend 6.50.

E. W. Lenger,
Berlin N 58,
Schönhauser Allee 70a. [703

Für Sammler.

Der Präparator und Konservator. Eine praktische Anleitung zum Erlernen des Ausstopfens, Konservierens und Skelettierens von Vögeln und Säugetieren. Für Naturfreunde herausgegeben von Rob. Boegler. 4. verb. und erweiterte Auflage. Mit 38 Abbildungen im Text. 2.— M.

Der philosophische Bauer oder Anleitung, die Natur durch Beobachtung und Versuche zu erforschen, von Johann Andreas Naumann. Neudruck nach der ersten Orig.-Ausgabe von 1791, besorgt u. herausgeg. von Paul Leverkühn. Geh. —.50 M.

Für Aquarienfreunde.

Praxis der Aquarienkunde. Aus der Praxis für die Praxis. Von Dr. E. Bade. 4. und 5. Auflage. Mit 1 Farbentafel, 12 Schwarzdrucktafeln und 203 Textabbildungen. Kart. 5.— M.

Die ausländischen Aquarienfische, ihre Naturgeschichte, Pflege und Züchtung. Von Dr. E. Bade. Mit einer Farbentafel und vielen Abbildungen im Text. (Erscheint demnächst! Preis ca. 5.— M.)

Katechismus für Aquarienliebhaber. Fragen und Antworten über die Einrichtung, Besetzung und Pflege des Süßwasser-Aquariums sowie über Krankheiten und Züchtung der Fische. Von Wilh. Geyer. 8. u. 9. von Hans Geyer besorgte Aufl. Kart. 3.— M.

Zimmer- und Freiland-Aquarienpflanzen. Von Mönkemeyer. Mit 26 Abbildungen. Kart. 1.20 M.

Der Schleierschwanz und der Teleskopschleierschwanz, ihre Zucht, Pflege und die Beurteilung ihres Wertes. Von Dr. E. Bade. Mit 5 Schwarzdrucktafeln u. 19 Textabbildungen. Geh. 2.— M.

Die künstliche Fischzucht. Von Dr. E. Bade. Mit 2 Schwarzdrucktafeln und 16 Textabbildungen. Geh. 1.— M.

Das Seewasser-Aquarium, seine Einrichtung, seine Bewohner und seine Pflege. Mit einem Anhange: Das Brackwasser-Aquarium. Von Dr. E. Bade. Mit 1 Farbentafel, 14 Schwarzdrucktafeln u. 104 Textabb. Kart. 5.—, geb. 6.— M.

Für Terrarienfreunde.

Deutschlands Amphibien und Reptilien. Eine Beschreibung und Schilderung sämtlicher in Deutschland und den angrenzenden Gebieten vorkommenden Lurche und Kriechtiere. Von Bruno Dürigen. Mit 12 Farbentafeln u. 47 Textabb. Geb. 20 M.—.

Praxis der Terrarienkunde. Terrarium und Terra-Aquarium. Von Dr. E. Bade. Vergriffen! Neue Auflage Ende des Jahres!

Katechismus für Terrarienliebhaber. Fragen und Antworten über Einrichtung, Besetzung und Pflege des Terrariums. Von Hans Geyer. Vergriffen.

Die Giftschlangen Europas, beschrieben und in ihrer Lebensweise geschildert von H. Lachmann. Mit 9 Textabb. Geh. 1.— M.

Zu beziehen durch:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlg., Magdeburg
Postschließfach 148.

Rote Arara

selten schön, Stück 160 M

Graupapageien, zahm und sprechend	Stck. 9
Blaustirnamazonen, junge, sehr gelehrige	„ 4
schon sprechende	„ 5
Kleiner weißer fingerzahmer Kakadu, sprechend	„ 7
Große weiße Gelbhauben-Kakadus	„ 5
Elfenbeinsittiche	Paar 4
Wellensittiche, grün u. gelb	„ 1
Gouldamandinen, rot- und schwarzköpfige	„ 5
Spitzschwanzamandinen	„ 4
Maskenfinken	„ 4
Pabstfinken	„ 3
Indigofinken	„ 3
Zebrafinken	„ 1
Jap. Möwchen	„ 1
Gilbweber, in Pracht	„ 1
Tahaweber, in Pracht	„ 1
Bichweber, schön im Gefied.	Stck. 1
Taraut. Unzertrennliche, sehr gut eingewöhnt	Paar 4
Dreifarb. Prachtglanzstare, selten schön	Stück nur 3
Langschwanz-Glanzstare	Stck. 4
Kragen-Schwarzvogel	„ 3
Rote Kardinäle	„ 3
Graue Kardinäle, mit roter Haube	„ 1
	Paar 2
Dominikaner-Kardinäle	Stck. 1
Blauspötter	„ 4
Purpurtangaren, ausgefärbt	Paar 2
Glockenvogel, gut schlagend	Stck. 6
Kleine zahme Meerkatzen	„ 3
Mexikanische Eichkätzchen	„ 3
Junge Kanarienhähne	„

Dutzendweise bedeutend bil

empfiehlt

Tierhandlung
Max Kleine

Berlin NO. 18, Strausberger St
Fernruf Alexander 3313.

Vertausche

gegen kl. Exoten oder Kanarien: 2 kehlchen, Schwarzköpfe, Grasmü Rotkehlchen, Heckenbraunellen Verkaufe 1,1 gelbe u. 2,0 grüne W sittiche, 1 1/2 Jahre alt.

Emil Urban, Karlsruhe, Hirschst

Wer gibt

ein Zuchtpaar grüne We sittiche oder getrockn. Ameisei für Stieglitz-Kanarien-Bas prima im Gesang, eine Para witwe im Schmuck und ein Z 706] paar Bandfinken.

Karl Homann, Erfu
Löberstr. Nr. 58.

Ia Schwarzplättche desgl. Rotkehlche

verschiedene Körnervögel z tauschen. Anfr. unter A. 1 an di schäftsstelle der Gefied. Welt.

Beschwerden we Nichtzustellung der „ fiederten Welt" sind b zuständigen Postamt zubringen.

Inserate

für das am 18. Sept. 1924 zur gabe gelangende Heft 31 der Welt erbitten bis 13. Sept. 192

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Berlin-Hermsdorf; für den Anzeigenteil: Rolf Kretschmann, Magdeburg, Postschließfach 14
Verlag der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck: August Hopfer, Burg Bz. Mgdbg.

Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Jahrg. 53 | Den 18. September 1924 | Heft 31

(Druckort: Burg, Bezirk Magdeburg.)

Ein Beitrag zur Weichfresserfütterung.

Von J. Birk, Leipzig.

(Fortsetzung statt Schluß.) (Nachdruck verboten.)

Als ein Gegner von Verabreichung ganz trockenen Futters, so wie es Herr Jacobs in seiner Arbeit empfiehlt, kann ich mich keinesfalls für eine Änderung des alten, stets gut bewährten Systems der Anfeuchtung entschließen. Wenn ich dies tun sollte, dürften erstens die mit diesem System errungenen sehr guten Erfolge nicht existieren, und zweitens müßte zur Empfehlung und Verteidigung der Trockenfütterung Herr Jacobs andere stichhaltige Gründe ins Feld führen, als die mitgeteilten. Der Punkt „Anfeuchtung des Weichfutters" ist ein sehr dehnbarer Punkt, dieses habe ich mehr als zur Genüge kennen gelernt, wenn man als Leiter eines Liebhabervereins Gelegenheit hat, bei den Neuankömmlingen im Verein, die meistens auch noch Anfänger in der Weichfresserpflege sind, die Handhabung der Futtermethoden zu studieren. Daß ich bei Liebhabern beobachten konnte, daß sie ihr Weichfutter in einem nassen, breiartigen Zustand verfütterten, will ich nur nebenbei erwähnen. Was Herr Jacobs von Rausch zitiert betr. Fütterung von Schwarzplättchen, gilt nach meinen Erfahrungen von allen Weichfressern, gleich welcher Art. Die Beschaffenheit eines Weichfutters darf niemals naß und klebrig, sondern muß von ganz schwach feucht-krümeliger Beschaffenheit sein, und zwar so, daß es möglich ist, das zum Verfüttern fertige Quantum leicht auseinanderzublasen. Es gibt Liebhaber, die müssen viel Wasser oder sehr feuchthaltige Möhren nehmen, weil in ihrem verwendeten Weichfutter z. B. Weißwurm in der grobkörnigen, harten Beschaffenheit sich befindet, der durch eine schwache Anfeuchtung niemals weich und für den Vogel begehrenswert und leicht verdaulich wird. Darum ist es sehr von Vorteil, wenn eben diese Bestandteile des Futters in pulverisiertem Zustande sind, der Vogel kann dann nicht wählerisch sein und es wird nebst den übrigen Bestandteilen restlos aufgenommen und nicht verschleudert, sodann sind Futterbestandteile im pulverisierten Zustande auch viel leichter verdaulich, der Verdauungsapparat wird nicht überlastet und überanstrengt; kurz gesagt, es findet dadurch eine vollwertigere Futterzuführung sowie eine ebensolche Ausnützung für den Organismus statt. Von dem käuflichen, fertiggemischten Weichfutter war ich noch nie ein Freund, denn ein fortgeschrittener Vogelpfleger muß unbedingt wissen, was er seinen Pfleglingen anbietet. Darum stelle ich mir das tägliche Weichfutterquantum stets vor dem Gebrauch aus den verschiedenen Stoffen erst zusammen; man kann dann, was die Qualität anbetrifft, reduzieren, ebenso auch verbessern, auch hierin macht Übung, und vor allem ein klares Auge für das Bedürfnis seiner Pfleglinge, bald den Meister. Weißwurm kann auch, wenn nicht pulverisiert gereicht, vorher für sich in einem Näpfchen aufgeweicht werden. Auch so wird er im Futtergemenge sehr gerne genommen, man läuft natürlich dabei Gefahr, daß ein futterwählerischer Vogel tüchtig sortiert, ehe er das letzte Stückchen Weißwurm ergattert hat, dabei werden sehr viel wertvolle Bestandteile verschleudert. Man kann aber auch, wenn man nicht genau beobachtet und die Futterdarreichung danach einstellt, die Vögel zu argen Futtermischern resp. -verwüstern erziehen; falsch wäre es natürlich, zarte Weichfresser durch Verringerung des Quantums zu bekehren zu suchen. Alles nur dieses nicht, es würde sich bitterlich rächen, denn der Vogel geht durch Unterernährung in der Körperbeschaffenheit zurück. Dies ist die erste Etappe zur Auszehrung. Trotzdem ich mein Weichfutter stets, und solange ich Weichfresser käfige, mit guter, saftiger, aber auch süßer, roter Möhre anfeuchte, habe ich noch keine Verluste durch sauer gewordenes Futter gehabt; denn es darf nicht vorkommen, daß der Vogel Gelegenheit hat, in Säuerung übergegangenes Futter noch weiter zu verkonsumieren. Möhre halte ich mehr für ein gutes Anfeuchtungsmittel, als für ein mehr zur Ernährung bestimmtes Mittel, ist doch deren Nährwert durch den enormen Wassergehalt etwas bedingt. Möhre setzt sich aus 86 % Wasser, 5 % Eiweiß, 8 % Kohlehydrate, 1 % Minerale zusammen, für jeden Fall halte ich Möhre als Anfeuchtungsmittel für viel vorteilhafter als nur Wasser, bedeutet doch ihre Verfütterung gleichzeitig eine Zuführung vegetabilischer Stoffe.

Was Herr Jacobs für Vorteile der Trockenfütterung erwähnt, wie Herstellung größerer Futtermengen, Nichtausleerung der Futterreste, sondern gleich Nach-

füllung, daher Zeitersparnis, ist sachlich und gelinde ausgedrückt, eine Verirrung, die wohl bei der Ausübung der Stubenvogelliebhaberei niemanden angeraten werden dürfte. Hierzu will ich nur kurz bemerken, wer keine Zeit übrig hat für eine ordnungsgemäße Verpflegung seiner Vögel, tut besser, die Anzahl seiner Pfleglinge der hierfür übrigen Zeit anzupassen. Hat er hierfür keine Zeit übrig, dann Hand weg von der Verantwortung der Käfighaltung von Vögeln. Keinesfalls dürfen aus Gründen der Zeitersparnis die Kosten davon auf das Wohlbefinden der Vögel abgewälzt werden. Sehr dankbar wäre die gesamte Liebhaberwelt demjenigen Fachmann, der uns einen gleichwertigen, aber bedeutend billigeren Ersatz von Ameisenpuppen und Weißwurm beschaffen könnte, aber leider wird sich dies nicht so leicht finden lassen. Daß Käferschrot ein sehr ideales, nahrhaftes Futtermittel ist, beweist sein reichlicher Gehalt an Eiweiß, setzt sich doch dasselbe aus 47 % Eiweiß, 13 % Fette, 7 % Kohlehydrate zusammen, außerdem enthält es noch 13 % Wasser sowie 20 % unverdauliche Stoffe, ebenso steht es betreffs Eiweißgehalt mit den von Herrn Jacobs angeführten Futterstoffen, wie Fischmehl, Heuschreckenschrot, Garnelenschrot und Fleischmehl. Damit ist aber nicht gesagt, daß auch alle diese wohl Nährwert enthaltenden Stoffe auch für den Verdauungsapparat eines zarten Vogels geeignet sind. Mir geht darüber ein Urteil ab, da ich diese Stoffe wohl bei Drosseln gefüttert habe, doch auch davon abgekommen bin, weil z. B. Fleischmehl sehr stark riechende Exkremente verursacht. Darüber sind wir uns wohl alle klar, daß wir nur aus Maikäferschrot, Heuschreckenschrot, Garnelenschrot, Fischmehl und Fleischmehl kein einwandfreies Futter für unsere zarten Sänger herstellen können, höchstens für Drosseln, Stare usw., als Trockenfutter, wie Herr Jacobs dies empfiehlt, wäre es selbst für diese harten Vögel nicht von Vorteil. Warum wollen wir denn überhaupt ganz trocken füttern, etwa nur wegen der bereits angeführten Vorteile von Zeitersparnis sowie Zubereitung gleich eines größeren Quantums Futters? Wie denkt sich denn Herr Jacobs die Bemischung des gemahlenen Hanfs, doch nicht etwa auch gleich wegen Zeitersparnis mit in das in größeren Mengen gemischte Weichfutter. Hanf ist infolge seines hohen Fettgehaltes von 30 % ein sehr geschätztes Futtermittel in der Stubenvogelpflege, doch muß vor regelmäßiger Darreichung in zu großen Mengen dringend gewarnt werden, vor allem muß er als Bemischung zum Weichfutter am besten bei jeder Verabreichung frisch gemahlen werden, da er nach längerer Zeit im gemahlenen Zustande leicht ranzig wird und dann für die Vögel schädlich ist. Wenn wir einer Trockenfütterung das Wort reden wollen, müssen wir zur Begründung ebenso wie zu irgend einer Handlung in der Vogelpflege erst die Natur heranziehen, d. h. welchen Feuchtigkeitsgehalt nimmt der wildlebende Vogel mit seiner Nahrung in der Natur auf. Um ein Beispiel zu zeigen, müssen wir den Chemiker reden lassen, indem er frische Insekten folgendermaßen nach ihren in sich vereinigten Stoffen zerlegt: 13 % Fette, 12,7 % Kohlehydrate, 3 % Eiweiß, 1,3 % Minerale und endlich noch 70 % Wasser, also ein Beweis, daß der freilebende Vogel mit seiner Nahrung sehr viel Wasser mit aufnimmt und trotzdem ist dieses natürliche Futter das bekömmlichste, vergleichen wir hierzu die frischen Ameisenpuppen mit ihren 75 % Wasser und die Bekömmlichkeit für selbst die zartesten Vögel, so können wir wohl niemals einer Trockenfütterung das Wort reden oder sollen wir die Anfeuchtung dem Vogel überlassen, wie Herr Jacobs vorschlägt. Da der Speichel sowie die Magensäfte nicht ausreichen, um ein trocken zu sich genommenes Futter zu durchfeuchten, was zum Verdauungsprozeß nötig ist, so wäre dadurch der Vogel zu einem starken Trinkbedürfnis gezwungen, wie mir auch ein bekannter Liebhaber mitteilt, dem die Darreichung trockenen Weichfutters aus der Praxis bekannt ist. Er bestätigt mir, daß fast regelmäßig die Vögel nach Aufnahme eines Schnabels Futters auch tranken. Ist dies vielleicht eine Anschmiegung an die Natürlichkeit, oder soll gar behauptet werden, daß diese starke Wasseraufnahme einer leichten Anfeuchtung vorzuziehen wäre. Nach meiner Auffassung müssen alle im Weichfutter enthaltenen Stoffe leicht verdaulich, daher in erweichtem Zustande sein. Da alles, was ich auf diesem Gebiete zu sagen wage, nur ein aus der Praxis entsprungenes Urteil ist, aber keineswegs ein solches eines Chemikers oder Mediziners ist, so sollen meine ausgeführten Meinungen nur anregend sein zum Nachdenken oder auch dahingehend, daß auch einmal ein Fachmann dieses Gebiet eingehend behandelt.

(Schluß folgt.)

Neueinführungen und Seltenheiten.

Von Karl Neunzig.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Mit dem dottergelben Weber — Pl. vitellinus (*Lcht.*) wird, als besondere Art nicht erkannt, zuweilen

Reichards Weber — Ploceus reichardi ***(Rchw.)***

eingeführt und auch in den meisten Fällen als dottergelber Weber an die Liebhaber verkauft (s. Abb. S. 243). Wenn er auch dem dottergelben Weber nahesteht, so unterscheidet er sich doch wesentlich von ihm, besonders durch die weitere Ausdehnung der schwarzen Färbung an Stirn, Kopfseiten und Kehle, das kräftiger gelb gefärbte Gefieder der Oberseite, die tiefer rotbraune Färbung der Kropfgegend und ferner durch die verwaschen rotbraune Färbung des Unterkörpers. Seine Verbreitung erstreckt sich in Ostafrika von Useguhn bis zum Tanganjikasee.

Böhm fand das Nest dieses Webers in einer Sumpfwildnis des Mündungsgebietes einiger kleinen in den Tanganjika sich ergießenden Flüsse. „Trockene, kiesige und grandige Bänke wechseln dort mit überschwemmten, von hohem und dichtem Rohr, Gras und Cyperaceen bestandenen Flächen, heckenartigen Ambutschgebüschen*) und offenen Tümpeln und Teichen ab. Die Nester waren in knietief unter Wasser stehenden Ambutschsträuchern gebaut und ähnelten

*) Ein zur Gattung der Leguminosen gehörender schnellwüchsiger Strauch, welcher eine Höhe von etwa 7 m erreicht, Charakterpflanze an und in Gewässern des tropischen Afrika.

sehr denen des Schwarzkopfwebers." Das Gelege besteht aus 2 Eiern, welche auf bläulichem Grunde dunkelbraun gefleckt sind oder auf olivgrauem Grunde verwaschene Fleckenzeichnung aufweisen (18,5—20 × 14—15 mm). Die lärmende Art und das laute verworrene Geschrei gleicht dem anderer Weber, ebenso die beständigen Raufereien der Männchen.

Eine andere hierher gehörige Form ist

Heuglins Weber — Ploceus heuglini *Rchw.*,

der um die Jahreswende in einigen Exemplaren in den Besitz des Herrn Krabbe, Anklam, gelangte. Ein eingegangenes Exemplar übersandte mir Herr Krabbe zur Bestimmung; die damalige Bestimmung als Ploceus spilonotus war falsch. Es handelte sich um Heuglins Weber. Ich bitte die Unterschrift unter dem Bild auf S. 77 dementsprechend zu berichtigen. Im Jahre 1913 befand sich ein Stück dieses seltenen Webers im Berl. Zoolog. Garten,

Reichards Weber.

und im laufenden Jahre erhielt Herr Krabbe drei Vögel dieser Art mit einem südafrikanischen Transport. Es waren noch jüngere Vögel, wie die helle Farbe des Schnabels zeigte. Bisher kennt man diesen Vogel nur aus dem äquatorialen Afrika. Reichenow sagt darüber: „Verbreitung noch sehr ungenau, von Oberguinea, Njamnjam und vom Gazellenfluß bekannt." Ob nun die drei Vögel des Herrn Krabbe wirklich aus Südafrika stammen bzw. in Südafrika gefangen wurden, mag dahingestellt bleiben, wenn es auch nicht sehr wahrscheinlich ist. Über das Freileben dieser Art berichtet Heuglin (Ornithol. NO.-Afrikas): „Scheint Zug- oder Strichvogel im Gebiet des Gazellenflusses, lebt zur Regenzeit in Paaren und brütet im August und September in großen, etwas rohen Beutelnestern aus frischen Grashalmen auf höheren Bäumen, gewöhnlich an Lichtungen im Hochwald." Das Gelege besteht aus 3—4 dunkelspangrünen Eiern (21 × 14,5 mm). „Wie seine Verwandten ist er ein lebhafter, lärmender Vogel, dessen Anwesenheit von weitem schon sein scharfer, ammerartig-zirpender Lockruf verrät." Die Gefiederbeschreibung gebe ich nach Reichenow (Die Vögel Afrikas):

„Oberkopf goldgelb, kein Schwarz an der Stirn, Oberseiten vom Hinterkopf bis zu den Unterschwanzdecken gelbgrün; Kopfseiten und Kehle bis auf die Kropfmitte schwarz; Unterseite vom Kropfe bis zu den Unterschwanzdecken goldgelb; Kropf etwas goldbräunlich verwaschen; Schwingen und Flügeldecken schwarzbraun mit gelben oder grünlichgelben Säumen; Unterflügeldecken und Innensäume der Schwingen blaßgelb; Schwanzfedern fahlolivbraun mit gelblichen Säumen. Lg. etwa 130—140, Fl. 70, Schw. 40—45, Schn. 15, Lf. 17—18 mm.

Weibchen noch unbekannt."

Über die Färbung des Schnabels, der bei älteren Vögeln schwarz ist, der Augen und Füße macht Reichenow keine Angaben, wohl aber Heuglin, der die Augen als gelblichweiß beschreibt, und auch Forbes (Brit. Catal. XIII) bezeichnet die Augen als gelblichweiß, die Füße sind fleischfarben.

Über die Gefiederfärbung des Weibchens, von der Reichenow sagt, daß es noch unbekannt sei, fehlen auch im Brit. Catal. Angaben, und auch Heuglin, der die Vögel brütend angetroffen, schweigt darüber.

Anscheinend sind bei dieser Art die Geschlechter gleichgefärbt. Die Sektion des Kadavers, den Herr Krabbe mir übersandte, ergab, daß der Vogel, dessen Gefieder vollständig der von Reichenow gegebenen Beschreibung des männlichen Vogels entsprach, ein Weibchen war.

Mit dem Importe aus Abyssinien kamen auch wieder mehrere Stücke des recht selten und nur vereinzelt eingeführten

Gilbwebers — Ploceus galbula *Rüpp.*

zu uns. Sein Verbreitungsgebiet erstreckt sich über Nordostafrika und das südliche Arabien, wo ihn Erlanger als Bewohner einer Oase ungemein häufig auffand. In manchen Gegenden seines Verbreitungsgebietes tritt er seltener, z. T. vereinzelt auf, wie Heuglin berichtet, in anderen Gegenden in großer Anzahl. „Man trifft den Vogel in Gehöften, Gärten und Viehparks, namentlich aber auf vereinzelten Bäumen in Gerstenfeldern; solche Bäume sind oft ganz mit älteren und frischen Nestern behängt" (Heuglin). In anderen Gebieten, so berichtet v. Zedlitz,

ist dieser Weber ein Bewohner der Büsche im Küstenstrich, der Felder und eingesprengten Waldpartien in den Vorbergen. Sehr häufig fand ihn v. Zedlitz südlich Massaua, unmittelbar an der Küste, wo einige Wasserrisse von dichtem Buschwerk eingefaßt waren. Die Verschiedenheit der örtlichen Verhältnisse des Aufenthaltsgebietes ist vermutlich nicht nur bei dieser Art von wesentlichem Einfluß auf die Brutzeit und das Anlegen des Brutkleides, welches nach Heuglin mit dem Eintritt der Sommerregen beginnt. Der Beginn der Regenzeit ist aber in den einzelnen Gebieten, welche der Gilbweber bewohnt, ein verschiedener, und damit auch das Anlegen des Brutkleides und die Brutzeit für die Art nicht übereinstimmend.

Neben den klimatischen Verhältnissen ist für die Dauer und den Eintritt der Brutzeit und das Anlegen des Brutkleides die Art des Aufenthaltsortes von erheblichem Einfluß. Wir wissen aus dem Leben der Weber in der Gefangenschaft, daß die Männchen bei reichlicher animalischer Nahrung das Brutkleid viel längere Zeit, zuweilen über ein Jahr tragen und das Ruhekleid nach sehr kurzer Zeit wieder mit dem Brutkleid vertauschen. Ähnlich sind die Beobachtungen, welche über den Gilbweber auch in der Freiheit vorliegen. Da, wo sie unkultiviertes Gelände, fern von menschlichen Niederlassungen, bewohnen, sind für das Brutgeschäft lediglich die klimatischen Verhältnisse bestimmend, während in Strichen mit landwirtschaftlichem Charakter und bei Dörfern und Städten der dort für unsere Weber reich gedeckte Tisch von allergrößtem Einfluß auf das Brutgeschäft ist. Barnes war in den Brutkolonien dieses Webers in Aden und fand zu allen Jahreszeiten frische Gelege. Zur Erklärung dieses Umstandes weist von Zedlitz auf die besonderen örtlichen Verhältnisse hin. „Hier ist eben für einen sperlingsartigen Vogel auch in der trockenen Zeit immer viel zu holen, wenn er nur gut Bescheid weiß. Tag für Tag, vom Morgengrauen bis die Sterne am Himmel stehen, lösen sich die Viehherden ununterbrochen an der Tränke ab.“ Der Kuhmist, der an solchen Stellen in weitem Umkreis den Boden bedeckt, wird von allerlei Insekten und Würmern aufgesucht und bietet reichliche Nahrung, und die naheliegenden Dörfer mit ihren offenen Viehställen und Vorratsschuppen spenden dem Weber allerlei Genießbares. „Der enge Anschluß an die Fleischtöpfe eines von Vieh und Menschen so besonders stark besetzten Platzes dürfte ausschlaggebend sein“ für die frühzeitig einsetzende Brutzeit und ihre Ausdehnung über das Ende der Regenzeit hinaus.

Die Nester sind retortenförmig und an Zweigspitzen aufgehängt. Bald sind sie aus frischem Gras, „bald sind sie untermischt mit langen, schmalen Blättern eines gelb blühenden Baumes mit gezähnelten Seitenrändern gebaut“ (Barnes) „und erhalten durch letztere eine sehr feste Beschaffenheit“. Erlanger fand die Nester „aus starren Grasstengeln künstlich zusammengeflochten“, kugelig mit nach unten gerichtetem Flugloch mit 5—8 cm langem Röhrenansatz, der nicht immer vorhanden ist. Die Nester sind etwa 15 cm hoch und 8 cm breit. Sie hängen häufig in großen Mengen zusammen auf einem Baum.

Das Gelege besteht aus 2—4 Eiern, die, wie bei allen Webern, in der Farbe sehr verschieden sind. Es kommen reinweiße wie auch solche mit braunen Tüpfeln vor, andere haben hellgrüne Grundfarbe mit rot- oder dunkelbrauner Tüpfelung, die bald grob, bald fein, bald reichlich, bald spärlich vorhanden ist (18,5—22 × 13,5—16,5 mm).

Gefiederbeschreibung: ♂ Stirn, Kopfseiten, Kinn zuweilen auch vordere Kehle glänzend kastanienbraun; oberseits grünlichgelb, bei alten orangegelb überflogen; übriger Kopf, Unterseite gold- bis orangegelb; Flügelfedern braunschwarz mit gelben bis orangefarbenen Säumen; Schwanzfedern braun, gelblich verwaschen und außengesäumt; Auge rotbraun, Schnabel schwarz, Füße hell hornbraun; Lg. 130 bis 140, Fl. 65—73, Schw. 45—55 mm.

♀ oberseits graubraun, grünlich verwaschen, nach hinten gelbgrünlich, Rücken mit dunklen Schaftflecken; unterseits weiß, Kropfgegend gelblich; Weichen graubräunlich; Schwanz, Flügelfedern wie Männchen mit grünlichgelben, Deckfedern mit weißlichen Säumen, Schnabel blaß horngrau.

Junges ♂ hat gleichfalls hell horngrauen Schnabel, die schwarze Färbung zeigt sich zuerst am Oberschnabel.

(Fortsetzung folgt.)

Von Eisvögeln und Zaunkönig.

Von Franz Fuchs.

(Nachdruck verboten.)

Das war 'mal wieder einer jener schmerzlichen Tage, die keinem Vogelliebhaber erspart bleiben, als ich das Weibchen meines prächtigen, zahmen Eisvogelpärchens zum Präparator sandte! Schon als Schüler war ich ein Bewunderer dieses herrlichen Vogels. Die Stadt Düsseldorf war in meiner Jugend noch nicht so ausgedehnt, die nähere Umgebung voller landschaftlicher Reize, ohne Fabrikschlote, und der jetzt regulierte Düsselbach floß zwischen alten Weiden, Weidenröschen- und Vergißmeinnichtdickichten idyllisch daher. Als Knabe lernte ich dort am alten Kloster „Düsseltal“ schwimmen und konnte den blauen Fischer, der in der Uferwand sein Nest hatte, bei seinen Tauchübungen bewundern. Ich kannte auch sein Heim, aber da ich die Möglichkeit der Käfigung für ausgeschlossen hielt, war mir der Vogel heilig, und ich wagte nicht mich in Besitz eines der Jungen zu setzen. Als ich später las, daß man den Königsfischer doch schon gehalten, erwachte in mir der brennende Wunsch, solch ein Tier einmal zu pflegen, trotzdem die Berichte nicht sehr verlockend geschrieben waren. Doch, so sehr ich diesen Vogel ersehnt und so mancherlei Vögel ich auch besessen, kein Eisvogel bezog mein Heim. Ich hatte den frommen Wunsch schon an den Nagel gehangen, da überraschte mich im Frühjahr mein junger Kollege R. Waller, der nicht nur durch seine Tierbilder, sondern auch durch seine vorzüglich abgetragenen Jagdfalken in weiteren, besonders Jägerkreisen, bekannt ist, durch die prächtigen Tiere. Übrigens würde ich gerne, wenn erwünscht, an dieser Stelle über die abgerichteten Habichte und Wanderfalken berichten.

Die jungen Eisvögel brachte Herr W. von einer Reise mit, sie befanden sich bereits fünf Tage in seiner Pflege. Er erhielt sie als junge „Igel“ und konnte sie umständehalber nur zweimal täglich, und zwar nur mit rohem Fleisch füttern, demnach wären sie bei der Aufzucht nicht so sehr empfindlich. Als sie in meinem Besitz gelangten, waren sie bereits

befiedert und schnappten bald nach dem Futter, welches ich ihnen mit der Pinzette vorhielt, das hauptsächlich aus Fisch, Fleisch und hartgekochten Eiern bestand. Das rohe Fleisch wälzte ich zuvor in zerstoßener Eierschale. Sehr wählerisch waren sie nicht. Nach dem Selbständigwerden nahmen sie Fisch und Fleisch auf, Stichlinge, denen man die Stacheln entfernt, Kaulquappen, Wasser- und andere Insekten, winzige Fröschchen und Mehlwürmer; nur Ei konnte ich nicht mehr füttern, da sie ihre „Beute" auf der Stange abschlugen, flogen die Eistückchen nur so herum. Ich habe mich selten über einen Zuwachs so gefreut, wie über diese Tiere. Nun sind meine Erfahrungen ganz anders als die Berichte anderer Pfleger, und selbst mit Altmeister Liebe kann ich mich nicht eins erklären, wenigstens in punkto Gefiederhaltung und Langweiligkeit. In erster Linie wird immer die große Schmutzerei betont, da war ich doch angenehm enttäuscht. Der geräumige Käfig, den die Vögel resp. jetzt der eine bewohnt, beherbergte vorübergehend einen zahmen Star, den ich von einer bekannten Dame in Pension genommen. Mußte der Käfig für den Starmatz jeden Tag gesäubert werden, so war dies bei den blaugrünen Bewohnern nur etwa zweimal wöchentlich nötig. Allerdings spritzen die Eisvögel die dünnen Entleerungen sehr heftig, und es kam schon einmal ein Spritzer ins Zimmer, dem aber habe ich abgeholfen, indem ich die unteren Sitzstangen nur zwei Zoll über dem Käfigboden anbrachte, was wegen der kurzen Schwänze der Vögel geht. In der Mitte des Käfigs ist noch eine höhere Sitzgelegenheit angebracht, aber es geschieht sehr selten, daß Schmutz ins Zimmer kommt. Ferner wurde die Kostspieligkeit der Unterhaltung betont, diese ist auch nicht so schlimm. Eine blank gefütterte Nachtigall kostet entschieden mehr. Ich kaufe hier für 20 Pfennige ein Pfund kleiner Schellfische oder Rheinfische, das würde für eine Woche genügen, wenn sich die Fische aufbewahren ließen. Aber sie nehmen gerade so gerne Fleischbrocken und im Notfall an heißen Tagen sogar getrocknete und wieder aufgeweichte Garnelen. Den letzteren Versuch machte ich, weil die Tiere ja in der Freiheit auch Krebse verzehren. Nach Liebe sollen sie auch ihr schönes Gefieder bestoßen, tadelloser kann sich kein Vogel halten, ich hätte den toten Vogel nicht zum Ausstopfer gegeben, wenn er beschädigt gewesen wäre, und mein noch lebender sieht aus wie ein Frischfang.

Nun kommt die Langweiligkeit, ja, sie sitzen stundenlang träumend oder vor sich hinstarrend auf der Stange, aber die fröhliche Begrüßung, die uns morgens zuteil wird, und das lebhafte Geschnatter, mit dem sie auf die Hand springen sowie ihre Tauchkünste sind hochinteressant. Da das Gefieder noch zu lange naß bleibt, lasse ich den Überlebenden nicht zu häufig tauchen, es ist immerhin möglich, daß der eingegangene sich durch Erkältung sein Leiden zugezogen hat. Allerdings bin ich auch nicht ausschließlich Gesangsliebhaber, ebensowenig verlange ich vom Eisvogel die Turnkünste der Meise. Möge mir der liebe, vereinsamte Kerl, der erst sehr trauerte, noch lange erhalten bleiben! Mit dem eingegangenen Eisvogel plagte sich meine Frau sehr ab, sie hatte ihn, als er schwach wurde, auf Wärmkrüge in einen Karton gesetzt, jeden Tag mit frischem Fisch versehen usw., aber alles vergebens, es wurde dem zahmen Vogel vonseiten seiner Pflegerin auch eine Träne nachgeweint. Rührend war es, als der gesunde

Zaunkönig.

den anderen nach zwei Tagen einmal wiedersah, ein freudiges Pfeifen und Geschnatter begrüßte denselben.

Jetzt mußte der fidele Zaunkönig schon trösten, denn wer beim Anblick dieses Zwerges nicht lacht, der lacht überhaupt nicht. Ich besaß schon verschiedentlich Zaunkönige, jedoch solch' lebhaftes Exemplar noch nie. Wenn er über den Kaffeetisch schlüpft und die beiden Kuhstelzen ärgert, die ihm seine bevorzugte Behandlung neiden, oder einem Besucher, besonders wenn er einen dichten Haarschopf trägt, auf den Kopf fliegt, sich dort ein Nest bereitet, platt hinlegt, zufrieden vor sich hinzirpt, um dann plötzlich irgend etwas anderes zu unternehmen, so ist dies von einer überwältigenden Komik. Vor einigen Tagen hing ich ihm ein Badehäuschen voll Sand an seinen Käfig, weil das ewige Paddeln auf dem Käfigboden die Stube bestäubte. Da hatte ich aber einmal das Richtige getroffen, die Freude war zu groß, 50 Sandbäder nahm er mindestens innerhalb einer Stunde. Den Käfig sucht er freiwillig wieder auf, wollen wir ihn aber einfangen, bedarf es nur ihm die hohle

Hand hinzuhalten, er schlüpft sofort hinein. Für ihn unterhalte ich eine Enchyträenzucht, und kann ich nur jedem Liebhaber ähnlicher Zärtlinge selbige angelegentlichst empfehlen. Diese weißen Würmchen, welche so leicht das ganze Jahr hindurch zu züchten sind, bilden eine beliebte Abwechslung im Speisezettel und werden viel zu wenig gewürdigt. Aquarien- und Terrarienfreunde haben dieses bequeme Futter schon seit Jahren im Hause. Sonst ist mein Vogelbestand, durch die sorgenvolle Zeit bedingt, sehr klein, ein Flugkäfig mit Finkenvögeln, das bei mir nie fehlende Rotkehlchen und ein ganz vorzüglicher Schwarzkopf sind vorläufig alle meine Gefiederten. Zwei tadellose fleißige Nachtigallen ließ ich im vergangenen Sommer, seitdem ich sie seit 1919 gekäfigt, fliegen, da ich hier keine Ameisenpuppen in prima Qualität auftreiben konnte. Ich fütterte letztere sowie ähnliche Vögel schon seit langen Jahren mit allerbestem Erfolge meist trocken. Dazu kommt, daß ich selbst eine Art Mauser durchmache. Nachdem ich bei einem hiesigen Liebhaber eine große Dachvoliere mit Rasen und blühendem Flieder und als einzigen Bewohner eine schlagende Nachtigall, ferner das bunte Treiben in den großen Gartenvolieren der bekannten Herren Pracht, Stefani u. a. sah, will mir die vorschriftsmäßige Dreisprungkäfigung nicht mehr gefallen. Außerhalb der Gesangszeit bietet solche Käfigung doch zu wenig im Vergleich mit den natürlichen Bewegungen der Vögel in großen Behältern.

Übrigens kann ich mit Freuden feststellen, daß das scheußliche Nestplündern durch unsere, durch die Kriegszeit so verrohte, Jugend etwas nachgelassen hat; vielleicht trägt der Sport, der jetzt die Welt beherrscht, dazu bei, indem er die Jugend vorteilhaft ablenkt. So hatte ich Gelegenheit in einem meiner Wohnung nahe gelegenen Park, in dem sonst keine Brut hochkam, innerhalb 5 Minuten 3 Nachtigallenpärchen ihre flüggen Jungen füttern zu sehen. Auch ist eine stellenweise Zunahme von Vögeln festzustellen, z. B. haben wir jetzt den Kirschkernbeißer hier als Brutvogel und vor allem den hier vor wenigen Jahren noch unbekannten Girlitz, jetzt als einen der häufigsten Brutvögel.

Gilbweber (s. S. 243).

Neues vom lateral hermaphroditisch gefärbten Gimpel.

Von Rudolf Neunzig.

(Nachdruck verboten.)

In Heft 12 S. 93 unserer Zeitschrift berichtete ich über einen zwitterartig gefärbten Gimpel, welcher lebend in meinem Besitz ist und mit einem normalgefärbten Weibchen einen großen Käfig bewohnt Der Zwitter war bald brütlustig, was ich an seinem Benehmen, Balzgesang und Aufnahme von Niststoffen sehen konnte. Er jagte häufig das widerspenstige Weibchen umher und riß ihm dabei des öfteren Federn aus. Allmählich ließ es sich die Werbungen gefallen und begann am 28. Mai mit dem Nestbau. Dazu wurden Zweigchen von Fichten, Grashalme, Federn usw. verwendet. Der Zwitter schien sich daran nicht zu beteiligen. In wenigen Tagen war das Nest in einem Harzer Bauerchen fertiggestellt und am 1. Juni lag ein Ei darin. Das Weibchen machte während der nächsten Tagen einen kränklichen Eindruck. Es brütete nur zwei Tage und verließ dann das einzige Ei, welches ich einem Kanarienweibchen unterlegte; es ergab sich, daß es unbefruchtet war.

Bald begann der Zwitter sein Weibchen zu jagen, und es besserte das Nest etwas aus. Am 21. Juni lag das erste Ei darin. Es wurden vier Eier,

täglich eins, gelegt. Das Weibchen brütete fest, wurde von seinem Partner niemals abgelöst. Am 6. Juli lag ein wohlausgebildetes, kräftiges Junges im Nest, ein Ei war unbefruchtet, die zwei anderen im frühen Entwicklungsstadium abgestorben. Am folgenden Tage fand ich das Junge lebend vor, doch war es anscheinend von seinem Vater in rabiater Weise hergerichtet. Oberschnabel, Flügelknochen und Füße waren von ihm zerbissen und abgefressen worden. An den Folgen der Verletzungen starb es bald, und es wurde zur mikroskopischen Untersuchung konserviert. Während der folgenden vierzehn Tage wurde das Nest bis auf einen Rest zerstört und dann von neuem aufgebaut. Am 20. Juli lag wieder ein Ei im Nest und bei dem blieb es auch. Das Weibchen zeigte dieselben Erscheinungen wie bei dem ersten Brutversuch. Es brütete nur

Guatemalasittich.

einen Tag und verließ das Nest. Auch dieses Ei erwies sich als unbefruchtet.

Die Ergebnisse der Züchtungsversuche der Gimpel sind recht kümmerliche. Doch zeigen sie, daß der hermaphroditisch gefärbte Vogel männliche Funktionen ausführen kann, daß er wenigstens einseitig männlich ist. Aus der Fähigkeit, das Weibchen erfolgreich zu begatten, kann nicht geschlossen werden, daß der Vogel nur männlich ist, und daß es sich hier nur um einen halbseitig-zwitterartig-gefärbten Vogel handelt. Die endgültige Lösung kann nur die Sektion ergeben. Sie kann entweder zeigen, daß der Vogel zwei richtige Hoden und in dem Falle nur das Gefieder zwitterartig gefärbt ist, oder sie ergibt, daß er sowohl einen Hoden wie einen Eierstock hat. In dem Falle würde es sich um einen echten Zwitter handeln.

In der Literatur finden sich einige anatomische Angaben über zwei Gimpel- und einen Buchfinkenzwitter, über die zum Teil im vorhergehenden Artikel berichtet worden ist. Die Ergebnisse dieser Sektionen waren stets so, daß sowohl je ein gutaufgebauter Hoden und Eierstock gefunden wurden. Die Ausführungsgänge der weiblichen Geschlechtsprodukte waren bei den beiden Zwittern von Lorenz und Heinroth im letzten Drittel nicht ausgebildet. Wahrscheinlich hätten auch diese Vögel erfolgreich Nachkommenschaft ziehen können, da wohl der eine Hoden zur Befruchtung genügend Samenfäden liefern kann. Die Verkümmerung der weiblichen Ausführungsgänge deutet darauf hin, daß es bei diesen beiden Vögeln nicht zur Ablage von Eiern gekommen wäre.

Der Zwitter befindet sich augenblicklich noch in der Mauser. Sie ist fast vollendet, und es zeigt sich, daß das Kleingefieder wie im vorigen Jahre gefärbt ist.

Anschließend hieran möchte ich noch einen weiteren Fall zwitterartiger Färbung erwähnen. In der Sammlung des Berliner Zoologischen Museums fand ich einen Weber, der auf der einen Seite weißlich und der anderen gelblich gefärbt war, wie es bei dem Ruhekleid der Art der Fall ist. Die weißliche Färbung beruht auf den Ausfall des gelblichen Farbstoffes, was hier wahrscheinlich eine krankhafte Erscheinung ist.

Die gelben Gruben.

Von Carl Duve, Hamburg.

(Nachdruck verboten.)

Das Brausen des Südweststurmes war verklungen. Vom Golfstrom hatte er sich im Ärmelkanal Wärme entliehen und war dann dem Winter forsch an den Kragen gegangen. Der hatte sich gestern noch so recht sicher gefühlt in der weiten braunen Heide. Hart und klingend tönte des Wanderers Schritt. Und heute ist auch nicht ein graues zerrissenes Läppchen von des Winters Wams mehr vorhanden. Ganze Arbeit macht der Südwest. Aus der braunen Heide über Holstein und die Ostsee jagt er den Winter nach Nordland. Da mag der über Kopf vom Thron Gepurzelte sich wieder sammeln und rachsüchtig kleine Ränke spinnen.

In der Heide aber ist Großreinmachen. Das leckt und tropft von allen Zweigen. Blank und schier glänzen die schwellenden Rinden, und die Knospen dehnen sich und wachsen, daß es fast zu sehen ist. Noch ist der Himmel grau, aber alle Augenblicke lugt ein blaues Auge hindurch, um zu sehen, ob es wohl schon sauber wäre. Es muß aber doch wohl nicht so weit sein; denn das blaue Auge verschwindet, und

weicher, warmer Regen rieselt hernieder. Frischer werden die Wege, blanker die Zweige, schwellender die Knospen — nun schaut wieder ein Blauäuglein durch den grauen Schleier, wird größer, zerreißt ihn. Flutender Sonnenschein strömt über die Heide. Dampfend steigt's von Wegen und Zweigen.

Gleich am hohen Fichtenwald, der dampfend die Luft mit Ozon schwängert, haben unsere Großväter tiefe Wunden in den Boden gerissen. Hinaus auf die Felder brachten sie den kalkhaltigen Mergel, daß Roggen und Weizen üppiger sprossen, die Brote größer wurden. Ein buntes unstetes Gewirr von steilen, tiefen Gruben, in dem sich allerlei krautig Volk ansiedelte, blieb zurück. Mannshoher Bram und Himbeersträucher klettern in den Gruben umher. Lange, wuchernde Gräser greifen über die zerklüfteten Ränder. Vergilbte Huflattichblätter kleben am Boden, goldgelber Adlerfarn hält in den dichten Reihen rund herum Wacht. Ein paar vorwitzige Espen wagen auch schon, aber nur erst einen Fuß, in dies Reich zu setzen, während die Birken über die Espen hinweg hineinschauen.

Goldige Fluten wirft die Sonne in die Gruben; warm und kosend steigt die Luft flimmernd empor. Ein Flug Hänflinge taucht über den Fichtenwipfeln auf, bricht kurz ab und fällt mit lebhaftem Erzählen ein. Aus dem Farndickicht tauchen 2 Löffel auf, das zugehörige Häschen folgt. Schnuppernd sucht es den Rand nach Frühgemüse ab. Wie von irgendwo her sitzt plötzlich ein Rotbrüstchen in den Himbeeren. Seine tiefdunklen Augen durchforschen das welke Laub, blinzeln zur Sonne. Dann plustert es sein Gefieder auf, und ganz fein und leise zwitschert ein sprudelnd Lied vom Frühlingsahnen durch die kosenden Lüfte. Dem Zaunkönig paßt die zagende Weise nicht. Kühn schnurrt er auf den Bram hinauf, keck den Schwanz zur Höhe, und die Kehle so weit auf, wie es geht, schmettert er sein Lied. Dann steigt er schimpfend in den Bram hinab: So müßt man singen; frisch und frei. Und die verklammte Mücke, die langsam am Stamme des Ginsters kroch, mußte seinen Ärger mit ihrem Leben bezahlen. Die Hänflinge, die gerade fertig sind mit dem Samensuchen unter der großen Birke, wollen nun aber auch zeigen, daß sie es noch können. Und ganz aus der Stille heraus hebt ein kleiner Sängerwettstreit an.

Der Frühling, der gerade durch den Fichtenwald ging, um den Meisen und Goldhähnchen zu sagen, daß es Zeit wäre, das bandenmäßige Herumstrolchen einzustellen, dafür aber vom Grünspecht hell ausgelacht wurde, weil die Meisen die Zeit schon längst nicht mehr hatten erwarten können, horchte verdutzt auf den Sängerstreit. Stumm trat er in das Reich der gelben Gruben. Wie er aber den Zaunkönig so im Eifer sah, daß er bald kopfüber vom Bram gesegelt wäre und derb schimpfte, mußte er so weidlich lachen, daß ihm etliche Sonnenstäubchen in die Nase kamen. Darob mußte er nun heftig niesen. Im heftigen Wirbel flogen die Sonnenstäubchen zur Erde, und wo eins den Boden berührte, tauchte ein goldiges Blütenköpfchen auf. Das machte dem Frühling noch mehr Freude, und er gebot, daß auf ewige Zeit die Sonnenstäubchen die ersten sein sollten und ihre Blätter erst nach ihrem Sterben erscheinen dürften. Die Menschen aber nannten die Pflanze nach den großen Grabmalen „Huflattich". Von den Sonnenstäubchen aber waren sie meist nichts gewahr geworden. Das kam aber daher, weil sie damals noch hinter dem warmen Ofen saßen, sonst hätten sie sich mit dem Frühling gefreut zu den ersten sprießenden Sonnenstäubchen.

Vom Vogelmarkt.

Von seltener auf den Vogelmarkt kommenden Vögeln werden angeboten:

Max Kleinert, Berlin NO. 18, Strausberger Str. 13, Fernruf Alexander 3313: Rote Araras, kleiner weißer Kakadu, große weiße Gelbhaubenkakadus, Elfenbeinsittiche, rot- und schwarzköpfige Gouldamandinen, Spitzschwanzamandinen, Masken-, Papst- und Indigofinken, Gilb-, Taha- und Viehweber, Tarant. Unzertrennliche, dreifarb. Prachtglanzstare, Langschwanz-Glanzstare, Kragen-Schwarzvogel, rote Kardinäle, Dominikaner-Kardinäle, Blauspötter, Purpurtangaren, Glockenvogel.

E. W. Lenger, Berlin N. 58, Schönhauser Allee 70a: Büffelweber in Pracht, Tarantin. Unzertrennliche, Sperlingspapageien, Kaktussittiche, junge Alexandersittiche, junge Mohrenkopfpapageien, kleine und große Gelbhaubenkakadus, Weißhaubenkakadus, Glockenvogel, mexikanische Grünhäher, rote Kardinäle, Karmingimpel, Tahaweber, Nachtigall-Edel-Kanariensänger, reinweiß und hermelingezeichnete Nachtigall-Kanarien-Edelsänger.

Willy Odenwald, Fulda: 1 Beo, 1 Rosellamännchen, Guatemala- und Elfenbeinsittiche, mex. blaubürzl. Sperlingspapageien, Papst- und Indigofinken, Trupiale, mex. Häher, Massena-Wachteln, Klarinos, mex. Spottdrosseln.



Frl. M. H., Würzburg. Wenn man den Charakter der Geschwulst nicht kennt, ist es auch nicht möglich, Ratschläge zur Heilung zu geben, besonders wenn die Geschwulst bis zu der geschilderten Größe gediehen ist. Kanarienvögel, welche leberkranke Junge zur Welt bringen, sollte man zur Züchtung nicht verwenden. Die Jungen sind in der Regel nicht lebensfähig und gehen bald ein. Krampfanfälle können durch Verletzungen des Gehirns, des Rückenmarkes, durch Reizungen innerer Organe, durch Erschrecken, Erregung, Blutarmut, erbliche Belastung hervorgerufen werden.

Herrn R. Sch., Weinsheim. Der Goldstirnsittich gehört zu den kleineren Keilschwanzsittichen. Er ist ungefähr 280 mm lang, davon kommt die Hälfte auf den Schwanz. Stirn bis Scheitelmitte ist orangegelb, übriger Oberkopf, Zügel blau; ums Auge orangefarbene Federung; übrige Oberseite grün; Kopfseiten, Unterhals, Brust oliv; übrige Unterseite grünlichgelb; Flügelfedern grün, Schwingen nach der schwarzen Spitze zu blau; Schwanz grün, nach der Spitze zu blau; Auge orange, Schnabel, Füße schwärzlich. Im kleineren Käfig gehalten und bei reger Beschäftigung mit ihm wird er bald zahm und dreist. Wenn er jung in die Hände des Pflegers kommt, lernt er auch einige Worte nachsprechen. Er ist ein harter ausdauernder Vogel, der auch in einer Voliere im Freien gehalten werden kann. Dann wird man aber auf Zahmheit verzichten müssen. Er kann ganz kräftig schreien, aber sein Geschrei ist weniger schrill und unangenehm als das anderer Keilschwanzsittiche.

Herrn F. R., Sulingen. Nach der kurzen Beschreibung ist es sehr schwer, den Sittich zu bestimmen. Es könnte der Braunwangensittich sein — Conurus aeruginosus *(L.)* oder auch der Feuerflügelsittich — Brotogerys pyrrhopterus *(Lath.)*, möglich ist aber auch, daß es sich um einen jungen noch unausgefärbten Vogel handelt. Die Bestimmung würde erleichtert, wenn der Ort bekannt ist, an welchem der Matrose den Vogel gekauft hat.

(Fortsetzung auf der 3. Umschlagseite.)

Aus den Vereinen.

Angemeldet ist Herr Apotheker Georg Rutsch, Frankfurt a. Oder, Grüner Weg 5. — Mitgl. Nr. 288 wohnt jetzt in Darmstadt, Kahlertstr. 6. — Der Ausschuß hat beschlossen: Die diesjährige Jahresversammlung findet nicht wie ursprünglich beabsichtigt in Hamburg, sondern in Berlin statt, und zwar anläßlich der großen Vogelausstellung von seiten des Landesverbandes. Näheres hierüber wird nach weiterer Fühlungnahme mit dem Ausschuß und nach Festlegung des Programms rechtzeitig bekannt gegeben. Die Vorarbeiten würden sehr erleichtert, wenn diejenigen Mitglieder, die Versammlung, Besuch des Zoo und der Ausstellung ganz bestimmt mitmachen, schon jetzt unverbindlich ihre Anmeldung abgeben könnten. A. Krabbe.

„Aegintha", Verein der Vogelfreunde zu Berlin. Unsere Sitzungen finden an jedem 1. und 3. Donnerstag im Monat, abends 8 Uhr, im Vortragssaal des Aquariums statt. Fast in jeder Sitzung belehrende Vorträge und Besprechungen unter gütiger Mitwirkung unseres verehrten Ehrenmitgliedes Herrn Dr. Heinroth. Gäste gern willkommen. — Am Donnerstag, dem 18. September, findet ebendaselbst eine kombinierte Sitzung Aegintha, Vereinigung und Vogelhändlerverband statt, Besprechung der im November geplanten Ausstellung. Es ist Pflicht jedes Mitgliedes, zu erscheinen. Auch die weniger Interessierten müssen kommen. Der Vorstand.
J. A.: O. Vorbrodt, 1. Schriftführer, Scharnweberstr. 18.

Vereinigung der Liebhaber einheimischer Vögel zu Berlin. Sitzung jeden 2. Donnerstag nach dem 1. und 15. des Monats im Vereinslokal zum „Alexandriner", Alexandrinenstraße 37a. Gäste stets willkommen.
J. A.: P. Böhme, Schriftführer,
Berlin O 17, Rüdersdorfer Str. 69.

Alte Vereinigung der Vogelliebhaber zu Dresden. Versammlung jeden Freitag, abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Blasewitzer Hof". Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. J. A.: Matth. Meys, Schriftführer.

Verein Vogelschutz und -pflege zu Dresden. Versammlung jeden Donnerstag, abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Schillers Restaurant", Ecke Stifts- und Ehrlichstraße. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. — Am 18. d. M. Vortrag von Herrn Paul Heinrich über „Der Vogelzug".
Bernhard Kühn, Vorsitzender.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei zu Hamburg. Sitzungen finden statt jeden 1. und 3. Dienstag im Monat in Hüttmanns Hotel, Poolstr. 22, abends 8¼ Uhr. Nächste Sitzung Dienstag, den 7. Oktober 1924. Gäste sowie auch Exotenliebhaber stets willkommen.
J. A.: Arnold Weber, 1. Vorsitzender.

Verein von Vogelfreunden Karlsruhe. Gegr. 1888. Monatsversammlung jeden 1. Donnerstag im Monat. Vorstandssitzung jeden 1. Donnerstag nach dem 15. Nächste Vorstandssitzung 18. September im Vereinslokal „Goldener Adler". — Der Verein hielt am Samstag, den 6. September 1924 in den unteren Räumen des Friedrichshofs einen Familienabend mit Gabenverlosung und Tanz ab. Fast sämtliche Mitglieder nahmen an der Feier teil. Auch die eingeladenen Gäste sind zahlreich erschienen. Insbesondere war der 1. Karlsruher Kanarienzuchtverein mit Vogelschutz und -pflege sehr stark vertreten. Auch der Kanarienverein mit Vogelschutz Knielingen entsandte eine Abordnung zur Teilnahme an der Feier. Mit Unterstützung der Mitglieder konnte den Teilnehmern ein vergnügter Abend geboten werden. Reichlichen Beifall ernteten die Herren Degen und Neuheller durch ihre zum Teil sehr lustigen Gesangsvorträge. Auch der Gesangverein Concordia hat durch den herrlichen Gesang viel zu der Verschönerung des Abends beigetragen. Die gewonnene Musik hat ebenfalls ihr möglichstes geleistet. Entzückend war der schön dekorierte Glückshafen. Leider konnte mit dem festgesetzten Tanz nicht rechtzeitig begonnen werden, da das Programm zu umfangreich und infolge der starken Besetzung die Räumlichkeiten zu eng waren. Die Tanzlustigen kamen daher nicht auf ihre Rechnung.

Verein der Vogelliebhaber Königsberg (Pr.). Sitzung an jedem Freitag nach dem 1. und 15. des Monats, abends 8 Uhr im Vereinslokal „Kaiser-Kaffee", Kaiserstraße, Ecke Schnürlingsstraße. Gäste sind willkommen.
J. A.: Ernst Reinholdt, 1. Vorsitzender.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig. Vereinssitzungen jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat im Vereinslokal „Bauers Brauereirestaurant", Täubchenweg. Nächste Sitzung Donnerstag, den 18. September. Gäste stets willkommen.
J. A.: Johann Birk, 1. Vorsitzender.

Verein der Vogelfreunde Leipzig-Plagwitz. Vereinslokal: „Gosenschlößchen", Leipzig-Plagwitz. Sitzungen an jedem 1. und 3. Montag des Monats, abends 8 Uhr. Vogelfreunde sind stets willkommen. — Der Verein veranstaltet sein 1. Stiftungsfest am 20. September 1924 im Etablissement „Gosenschlößchen" in L.-Plagwitz. Beginn 7 Uhr abends. Vogelliebhaber und Vogelfreunde sind herzlichst eingeladen.
J. A.: Karl Scholtissek, 1. Vorsitzender, Leipzig-Plagwitz, Lauchstädter Straße 30.

Verein der Vogelliebhaber zu Mannheim. Versammlungen finden alle 14 Tage Samstag abend 8 Uhr im Vereinslokal „Restauration z. gold. Falken" statt. S. 1. 17. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen.
Johann Daubmann, 2. Schriftführer.

Bayrischer Vogelliebhaberverein, Sitz München (E.V.). Jeden Samstag gesellige Zusammenkunft im Pschorrbräuhaus, Bayerstraße. Jeden letzten Samstag im Monat Monatsversammlung im Vereinslokal ebendort. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen.
Rud. Engel, 1. Schriftführer.

„Ornis", Freie Bezugs-Vereinigung der Waldvogelliebhaber Deutschlands. Gegründet 1912. Auf vielseitigen Wunsch der alten Mitglieder wollen sich die Waldvogelliebhaber wieder in der „Ornis" zusammenschließen. Als amtliches Organ ist die „Gef. Welt" ausersehen worden, und werden die Artikel, die früher in den „Ornis-Blättern" erschienen, in obiger Zeitschrift gebracht werden. Aus diesem Grunde bittet die Geschäftsführung um eifrige Mitarbeit, damit unserer Waldvogelpflege wieder der Platz eingeräumt wird, der ihr gebührt. Anmeldungen sind unter Beifügung von 2 M. an den Geschäftsführer zu richten; Mitglieder erhalten auf Mischfutterbestellungen 5% Rabatt.
Mit treudeutschem Gruß
Martin Sperling, Halle a. d. S., Südstr. 49.

Zoolog. Verein zu Zwickau i. S. Versammlung jeden Freitag nach dem 1. und 15. jeden Monats, abends 8 Uhr, im Restaurant „Zur Bleibe", Katharinenkirchhof. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen.
J. A.: Paul Schmidt, 1. Vorsitzender,
Zwickau i. S., Bosenstr. 44.

Für Entomologen.

Bau's Schmetterlingsbuch. Zum Selbstbestimmen aller in Deutschland, Österreich, Ungarn und der Schweiz vorkommenden Groß- sowie der vorzugsweise gesammelten Klein-Schmetterlinge. Mit 67 Textabbildungen. Kart. 4.— M.

Bau's Käferbuch. Zum Selbstbestimmen der in Deutschland, Österreich-Ungarn und der Schweiz vorkommenden Koleopteren. Mit 144 Textabbildungen. Kart. 4.— M.

Der Käfer- und Schmetterlingssammler. Anleitung zur Herstellung und Handhabung der beim Fange, der Zucht und dem Präparieren von Käfern, Schmetterlingen und Raupen als geeignet bewährten Geräte, sowie zur Anlage und Erhaltung von Insektensammlungen. Von Karl Wingelmüller. Mit 32 Abbildungen. Geh. 1.50, geb. 2.— M.

Schädlinge und Nützlinge der Kleintierwelt. Ein Lehrbuch für jedermann von Prof. Dr. L. Glaser. Mit 85 Textabbild. Kart. 8.— M.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg / Postschließfach 148

Anzeigenteil

Die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 20 G.-Pf. berechnet. Aufnahme erfolgt gegen Voreinsendung des Betrages in Reichsgeld per Brief od. auf unseren Zahlstellen: Postscheckkonto: Magdeburg 3148, Wien 156 687, Bern III 4326, Prag: Creditanstalt d. Deutschen unter Angabe des Zweckes.

Käfige u. Gerätschaften

Vogel-Fangkäfige 2.50 und 4.50 ℳ, Schlagnetze f. kl. schädl. Vögel 1.00 ℳ, f. größ. 2.10 u. 2.40 ℳ. Katalog gratis. **J. Tannen**, Gronau 58 (Westf.). [708

Vogel-Mistelleim

zum Fangen schädlicher Vögel, Ia klebend bei jeder Witterung, garantiert gebrauchsfähig, Dose 1,50 ℳ fr. von **A. Freitag Nchf.**, Frankenberg i. S. 6. Wiederverkäufer hohen Rabatt. [709

Futtermittel

Vogelfutter [710

für Kanarien, Waldvögel, Exoten, Papageien, Weichfresser. Anerkannt bewährteste Mischungen auf Grund langjähriger Erfahrung. Liste 13 über Vogelfutter, Liste 5 über Vogelkäfige, Zuchtgeräte usw. mit etwa 400 Abbildungen.

W. Göpel, Leipzig,
Tröndlinring 1. Telephon 14 958.
Bei Anfragen bitte auf die „Gefiederte Welt" Bezug zu nehmen.

Mehlwürmer

geg. Einsend. v. 2.— Rentenmark 1/4 Pfd. franko versend. **D. Waschinski & Co.**, Biesenthal I (Mark). [711

Mehlwürmer Pfd. 8 ℳ, 1/4 = 2 ℳ franco. Voreins.
712] **Jeltner, Breslau**, Weinstr. 12.

Mehlwürmer

713] **große** gelbe Ware,
1/4 Pfd. franko geg. Voreinsend. v. Rm. 2.
Vonitas-Versand, Rostock i. M.

Vögel

Grüne Wellensittiche

30 Paar, Paar 14 Mark.
Porto und Verpackung Selbstkosten.
714] **R. Huth, Perleberg.**

Verkaufe! [715

1 Beo		50 ℳ
1 Rosella-Männchen		35 „
Guatemalasittiche	à Paar	30 „
Elfenbeinsittiche	„ „	45 „
Mex. blaubürzl. Sperlingspapageien	à Paar	25 „
Papstfinken	„ „	35 „
„ (Männchen in Pracht)	à Stück	20 „
Indigofinken	„ Paar	35 „
Trupiale	„ Stück	30 „
Mex. Häher	„ „	30 „
Massena-Wachteln	„ Paar	60 „
Klarinos	„ Stück	50 „
Mex. Spottdrosseln	„ „	30 „

Willy Odenwald,
Fulda, Vogelexport und -import.

100 Gm. Belohnung

oder eine goldene Uhr

erhält derjenige, der nachforscht und einen passenden Ort angibt, wo ein tüchtiger Uhrmacher sich etablieren kann. Gefl. Angebote unter U 100 an die Gef. Welt erbeten. [716

Ab 1. Oktober empfehle

Zeisige, Stieglitze, Nothänflinge, Rote Gimpel usw. [717
Großabnehmer gesucht.

Hermann Hornig
Vogelexporthaus
Zwickau i. S., Neusalzaer Str. 17.

Gebe ab: [718

2,2 Wellensittiche (davon 1,0 gelb), Zuchtpaar, je 20 ℳ.
Ende September: 15—20 Stück junge Wellensittiche, unausgefärbt. Anfragen mit Rückporto werden gern beantwortet.
Dr. Stoltze, Böblingen (Württenb.), Waldburgstr. 38. A.Z.-Mtgl. 237.

Tausche

1 Goldstirnsittich, 2 Kakatussittiche, fest eingewöhnt, wetterhart, gegen Terrarium, Aquarium; Rußneunzig: „Fremdländ. Stubenvögel" od. tadellose Wellensittiche, sehr gut singenden Mosambikzeisig und dto. Pfäffchen. Gefl. genaue Angebote an
Hugo Keßler, Darmstadt,
719] Kahlertstraße 6 bei Mauck.

Abzugeben

35 Paar grüne Wellensittiche, blutsfremd und in Freivoliere gezüchtet. Bei Anfrage erbitte Rückporto.
720] **Rich. Huth, Perleberg.**

1,1 Singsittiche

vollkommen gesund und garantiert blutsfremd für Gm. 125 abzugeben.
Gustav Rambausek, Wien XVIII
721] Martinstraße 88

Sittiche, Finken, Kakadus, Papageien, Erzloris, kal. Schopfwachteln, Kardinäle, Dolchstichtauben, Pfauen, Fasanen, Kanarien, Lachtauben, Falken, Affen, Zierwassergefl. usw. zu verkaufen.
722] Anfragen mit Rückporto.
Molz, Düsseldorf, Postfach.

Vertausche rhein. Nachtigall,

Wildfang 23, zahm und tadellos befiedert, guter Sänger, **gegen Zebrafinken, jap. Mövchen,** evtl. auch and. Vögel.
R. Diwersy, Merzig (Saar).
723] A.Z.-Mtgl. 183.

Suche

Zwergfliegenschnäpper und Wiedehopf, zahm,
tausche Ölbild von Hand nach Wahl. Wert bis 300 Mark.
724] **Prof. Müller-Kaempff**
Berlin W 62, Kurfürstenstraße 123.

Beschwerden wegen Nichtzustellung der „Gefiederten Welt" sind beim zuständigen Postamt anzubringen.

Inserate

für das am **25. Sept. 1924** zur Ausgabe gelangende Heft 32 der Gef. **Welt erbitten bis 20. Sept. 1924 früh.**

Natur-Aufnahmen auf Postkarten

Kleine reizende Kunstwerke, farbig oder in Kupfertiefdruck, so gut wirkend, daß sie kostspielige größere Tafeln ersetzen. Der Naturfreund sollte ihre Verbreitung in jeder Weise fördern. Der Jugend bringen sie, gesammelt, reiche Belehrung. Die Preise sind sehr billig.
24 farbige Vogelbilder m. Porto 2.50
8 farbige Vogelbilder, gezeichnet von Kammerer, m. Porto 0.45
20 wundervolle Kupferdrucke: Seevögel, aufgenommen v. Dir. Dr. Weigold m. Porto 1.10
12 farbige Postkarten: Zierfische mit Porto 1.60
Nachnahmegebühren besonders.

Alfred Troschütz
Buchhändler und Antiquar
Hannover
725] Große Aegidienstraße 4

Wer kann mir gegen Vergütung der Schreibkosten eine ausländische Vogel- oder Geflügelzeitung oder deren Verlag angeben? Suche Vogelorgeln, auch reparaturbedürftig, für Dompfaffen, Stare usw. (keine Kanarienorgeln) zu kaufen. Angebote erbittet
Johann Schalk,
726] Uhrmacher,
Westenholz 10,
Kreis Paderborn i. W.

Bitte!

In eigenem Interesse wollen die pp. Einsender beachten, daß

a) **alle für die Redaktion** der „Gefiederten Welt" bestimmten **Zuschriften** (Sprechsaal-Anfragen und -Antworten, Vereinsnachrichten usw.) und **Sendungen** (tote Vögel, Manuskripte) nur an **Herrn Karl Neunzig, Berlin-Hermsdorf,** Neue Bismarckstr.,

b) **alle Bestellungen** auf **Abonnements, auch vom Ausland, nur durch die Post,**

c) **Inserate** und dergl. Geschäftliches nur an die **Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg,** Postschließfach 148,

zu richten sind.

Bestellungen für Oktober sofort der Post übergeben!
Bestellzettel für Deutschland.

Postbestellzettel.

Hiermit bestelle ich für den Monat **Oktober 1924**
1 „Die Gefiederte Welt"
(eventuell mit Nachlieferung). — **Erscheinungsort Burg Bz. Mgdb.**

Name: .....

Wohnung: .....

Postquittung: ..... Mk. ..... Pf. sind heute bezahlt worden.

Ort: ..... den .....

Postannahme

.....

Für Kanarienzüchter!

Soeben erschienen:

Die Farben- und Gestaltskanarien
nebst Beschreibung aller verschied. Kanarienrassen, deren Entstehung, Form- u. Farbenveränderung, Bastardzucht u. Farbenfütterung v. A. Aschenbrenner. Mit vielen stichhaltigen Abb. Kart. 1.75 M

Wichtig zur Zucht:

Der Kanarienvogel,
seine Naturgeschichte, Pflege u. Zucht von Dr. Karl Ruß. 14. Auflage. Mit 2 Farbentafeln und zahlreichen Textabbildungen. Bearbeitet von Karl Neunzig.
Kart. 2.50 M

Die Bastardkanarienvogelzucht.
Von Walter Barth. M
20 Abbildungen und 1 Tondrucktafel. 1.50 M

Der Kanariengesang.
Allgemeinverständliche sowie musikalische und phonetische Darstellung von W. Kluh
1.00 M

Zu beziehen durch:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg
Postschließfach 148.

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Berlin-Hermsdorf; für den Anzeigenteil: Rolf Kretschmann, Magdeburg, Postschließfach 148.
Verlag der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck: August Hopfer, Burg Bz. Mgdbg.

Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Jahrg. 53 | Den 25. September 1924 | Heft 32

(Druckort: Burg, Bezirk Magdeburg.)

Ein Beitrag zur Weichfresserfütterung.

Von J. Birk, Leipzig.

(Schluß.) (Nachdruck verboten.)

Auch die Arbeit des Herrn Jacobs habe ich als eine willkommene Anregung aufgefaßt, da sie etwas wirklich Positives nicht enthält. Wenn uns durch die Verbilligung des Futters bei der heiklen Pflege unserer zarten Weichfresser gedient wäre, so könnte man mit Freuden nach allen in dieser Arbeit angeführten Futtermitteln greifen, die alle billiger und zum Teil auch leichter zu beschaffen sind als Ameisenpuppen und Weißwurm, aber leider ist dem nicht so, und so sind wir, so lange uns nicht andere Futterstoffe, die sich neben der Billigkeit auch durch denselben Nährgehalt auszeichnen wie Ameisenpuppen und Weißwurm zur Verfügung stehen, gezwungen, uns an diese Futterstoffe zu klammern in unserer Hilflosigkeit, in der fehlenden Beschaffung von natürlichem Futter. Es geht vieles in der Weichfresserpflege, damit soll aber noch nicht gesagt sein, daß sich alles mit dem Stande der modernen Stubenvogelpflege vereinbart, ebenso ist es mit der fehlenden Fütterung von Mehlwürmern bei Herrn Jacobs. Warum hat dieser Herr keine Mehlwürmer gefüttert, weil er eben keine gehabt hat und sich auch keine, vielleicht aus Billigkeitsgründen oder solcher beschwerlicher Beschaffung kommen ließ, darum ging es im Notfall bei Rotkehlchen, Schwarzplättchen und Zaungrasmücke. Auch ich bin kein Anhänger von zu reichlicher Mehlwurmfütterung, speziell in der gesangslosen Zeit soll der Mehlwurm nur als zur Abwechslung dienende Delikatesse gereicht werden, anders ist dies in der Mauser- und Gesangszeit, da halte ich den Mehlwurm als Förderungs- und Gesangsreizmittel wertvoll. Ebenso wertvoll ist der Mehlwurm bei schlecht genährten Vögeln, er wirkt appetitanregend fleischbildend, ebenso anreizend auf die Magensäfte. Für Vögel mit Darmentzündung halte ich den Mehlwurm nicht angebracht, sicher reizt er durch seine Schärfe die entzündeten Schleimhäute der Därme. Daß wir den Mehlwurm nicht nur als Gesangsreizmittel, sondern gleichfalls als ein wertvolles Nahrungsmittel in der Vogelpflege brauchen, ist erstens seine Eigenschaft als lebendes, wenn auch nicht im richtigen Sinne des Wortes, natürliches Futter, zweitens besitzt er neben dem Anzeig zum Gesang auch noch diejenigen Nährwerte, die wir an den vom Vogel in der Natur aufgenommenen Insekten feststellen können wie 21 % Eiweiß, 15 % Fette, 6 % Kohlehydrate, 4 % Minerale, sowie 54 % Wasser. Aus diesen Gründen und vor allem weil der Mehlwurm das einzige Insekt ist, daß wir rationell für die Vogelpflege züchten können und er dem natürlichsten Futter am nahesten kommt, ist uns der Mehlwurm unentbehrlich in der Vogelpflege. Was die Fütterung unserer Weichfresser mit Milchreis, gekochten Kartoffeln, Schwemmklößchen usw., wie Herr Jacobs berichtet, anbetrifft, so bin ich, und sei es nur als Leckerbissen gedacht, ein Gegner von derlei Extravaganzen, weil man niemals vorausahnen kann ob dieses oder jenes, diesem oder jenem Vogel bekömmlich ist, überhaupt hat man dies ja auch nicht nötig; weil die uns in der Weichfresserpflege zur Verfügnng stehenden Futtermittel ausreichen um selbst die zartesten Vögel rationell und abwechslungsreich zu füttern, ganz abgesehen davon, was wir sonst noch an Leckerbissen bieten können, wie Früchte aller Art, lebende Insekten usw.

Sehr interessant wäre es von Herrn Jacobs zu hören, worin das neue Mittel zur längeren Konservierung frischer Ameisenpuppen besteht, die Liebhaber wären für eine dementsprechende Mitteilung sehr dankbar. Erwähnen möchte ich noch, wenn Herr Jacobs in der glücklichen Lage ist seine Ameisenpuppen selbst zu sammeln, so liegt für ihn erst recht kein Grund vor, nach minderwertigeren Futtermitteln zu greifen, denn bis heute ist und bleibt das Beste in der Weichfresserpflege — Ameisenpuppen — selbstverständlich darf man dabei nicht die teuere Beschaffung in Betracht ziehen. Wie Herr Jacobs die frischen Ameisenpuppen viele Wochen frisch erhält, indem er dieselben in einem eisernen oder irdenen Topf am Fenster den heißen Sonnenstrahlen aussetzt, kann ich wirklich nicht fassen, vielleicht hat Herr Jacobs vergessen zu erwähnen, daß er vorher durch Erhitzen der Ameisenpuppen dieselben „schreckt“ oder „schwelgt“ oder richtiger gesagt durch Hitze das keimende Leben tötet und so das Insekt an seiner Weiterentwicklung hindert, denn da ich gleichfalls in frischen Ameisenpuppen „Selbstversorger“ bin, kann ich nur aus meiner Praxis bestätigen, daß „ungeschreckte“ Ameisenpuppen durch Weiterentwick-

lung des Insektes gar bald „blau", daher unansehnlich und für den Vogel weniger begehrenswert werden, gleichfalls auch an Nährwert einbüßen, „Geschwelgte" Ameisenpuppen bewahre ich, um sie lange frisch zu halten, kühl, aber nicht in einem feuchten Keller auf, da sie in einem solchen leicht anfangen zu schimmeln; will ich frische Ameisenpuppen für den Wintervorrat trocknen, so werden sie erst „geschwelgt" und dann an die Sonne zum Trocknen breitgeschüttet. Da ich gerade entgegengesetzt verfahre mit der Aufbewahrung der frischen Puppen wie Herr Jacobs, ist mir seine Methode wohl verständlich, die Wirkung derselben aber bis jetzt noch keinesfalls. Nun, eine Probe wird ja für jeden Liebhaber den Beweis bringen. Warum so viele Liebhaber von einer Mitverfütterung von Quark, der von sauergewordener oder gelabter Milch ausgeschiedene Käsestoff, ein sehr eiweißhaltiges, daher nahrhaftes Nahrungsmittel, nichts wissen wollen ist mir nicht begreiflich, komme ich doch bei sachgemäßer Fütterung von Quark ohne Weißwurm aus, höchstens, daß man damit einen sehr mageren Vogel wieder hoch helfen will. Am besten habe ich gefunden, wenn der Quark erst mit dem Gebäck, sei es gemahlener Zwieback oder Semmel in größeren Mengen verbunden wird, so wie ich es in einer früheren Arbeit beschrieben habe, das Gemisch von Gebäck und Quark wird erst wieder in ausgebreitetem Zustande an der Luft abgetrocknet und dann erst unter das Weichfutter gemischt. Wird frischer Quark direkt oder unter dem Weichfuttergemisch verfüttert, vertragen ihn viele Vögel nicht und bekommen Durchfall. Für jeden Fall ist Quark ein Futterstoff, der uns den furchtbar teuren Weißwurm, denn heute kostet 1 Pfund nur 6 M., für den minderbemittelten Liebhaber einfach unerschwinglich, darum kann ich nur jeden Liebhaber, dem die Rentenmark nicht aus der Tasche quillt, raten, ersetzt, da Not am Mann ist, den teuren Weißwurm durch Quarkfütterung, nur ganz frische Ware muß es sein und nicht bereits sauer gewordener, sonst ist er für den Verdauungsapparat des Vogels schädlich.

Wenn ich aus meiner Praxis, durch diese meine Arbeit, einen kleinen Leitweg zur Weichfresserfütterung gegeben habe, so soll damit nicht gesagt sein, daß meine Erfahrungen und Ansichten vielleicht Anspruch erheben können das einzige Richtige zu sein, im Gegenteil bei jeder Fütterungsmethode wird es Vögel geben, denen dies oder jenes nicht zusagt, da heißt es immer und immer wieder, wie in der ganzen Liebhaberei, beobachten, Ursache feststellen und darnach richtig handeln. Fehlschläge kommen auch bei den erfahrensten Liebhaber mit vor, wenn auch seltener, darum wähle man sein Weichfuttergemisch nicht schematisch nach der Vogelart, sondern trage dabei den verschiedenen Veranlagungen des einzelnen Individuums Rechnung, sowohl in qualitativer wie in quantitativer Hinsicht. Wäre eine derartige Einstellung auf das Bedürfnis des Individuums nicht nötig, so hätten wir Vogelliebhaber längst das erreicht, was Herr Jacobs, ebenso wie ich, sehnlichst wünscht, nämlich, daß wir Vogelliebhaber uns auf eine allgemeine billige Fütterungsweise bei jeder Vogelart festlegen können, nach meiner Ansicht bleibt dieses vereinfachte billige Verfahren wohl für alle Zeiten ein schöner Traum der mit Futtersorgen und Geldknappheit ringenden Liebhaber. Vogelliebhaber, Hand aufs Herz, ist das Futter für unsere Lieblinge nach dem Stand des Einkommens auch zu teuer, ist es aber so teuer, daß ihr es euren gefiederten Lieblingen entziehen wollt zum Nachteile ihres Wohlbefindens, ich glaube nie und nimmer, lieber nur einige Weichfresser richtig sachgemäß verpflegt, als viele Weichfresser aus Sparsamkeitsrücksichten falsch und ungenügend verpflegt, das sei auch fernerhin die Art des wirklich wahren Vogelliebhabers.

Trotzdem wollen wir Vogelliebhaber Hand in Hand weiterarbeiten an unserem schwierigen Futterproblem, wir wollen auch fernerhin sachlich ohne jeden persönlichen Hintergedanken unsere Erfahrungen und Meinungen in unserer Fachpresse austauschen. Es kommen dabei viel zu beschreitende Wege zur Kenntnis der Liebhaber. Um so besser. Jeder wähle dann, geführt von den Erfahrungen der Praxis, den denkbar einfachsten und billigsten, nur richtig muß er ihn führen zu dem uns vorschwebenden Ziele, zum Erfolg in der an Leiden, aber auch an um so größeren Freuden reichen Vogelliebhaberei.

Neueinführungen und Seltenheiten.

Von Karl Neunzig.

. (Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Die Sperlingsweber — Plocepasser *A. Sm.* gehören zu den seltensten Erscheinungen des Vogelmarktes. Sie sind in etwa acht Arten über Ost- und Südafrika verbreitet. Das Vorhandensein von zehn Handschwingen und die Art des Nestbaues, die typischen Kennzeichen der Weber, die sich sonst kaum von den Finken unterscheiden, sind auch bei den Sperlingswebern für ihre Zugehörigkeit bestimmend gewesen, geradeso wie bei dem Schnurrbärtchen und den Schuppenköpfchen, die dem Liebhaber durchaus nicht so recht in die Familie der Weber zu gehören scheinen.

Kennzeichnend für die Gattung der Sperlingsweber ist der schwarze Bartstreif und zwei weiße Bänder über die Flügel, welche von den weißen Spitzen oder Endsäumen der mittleren und großen Flügeldecken gebildet werden. Während der Brutzeit meist paarweise, jedenfalls nicht in großen Nistkolonien lebend, scharen sie sich nach ihr in großen Flügen zusammen, um ähnlich wie die Feldsperlinge auf den abgeernteten Feldern und Viehtriften einzufallen und der Nahrungssuche nachzugehen. Die verhältnismäßig großen backofenförmigen Nester haben ein seitlich nach unten geneigtes Schlupfloch, das meist durch hervorstehende trockene Grashalme und -stengel, aus denen das Nest gebaut ist, überdacht wird. Das Innere des Nestes ist mit Federn, Pflanzenwolle und andern weichen Stoffen gut ausgekleidet. In Akazien und Dorngebüsch werden die Nester gefunden. Der

Schwarzschnäblige Mahaliweber — Plocepasser melanorhynchus *Rüpp.*

ist in neuerer Zeit mit den ostafrikanischen Importen in mehreren Stücken eingeführt und auch in die Hände von Liebhabern gelangt, so daß erwartet

werden kann, über sein Leben in der Gefangenschaft, über das keinerlei Mitteilungen vorliegen, Näheres zu erfahren.

In manchen Gebieten ist dieser Weber ein sehr gemeiner Vogel, der den ganzen Tag in Bewegung ist und sich auch viel auf dem Erdboden im Grase aufhält, dabei lärmt und kreischt er wie andere Weber, nur übertrifft die Kraft seiner Stimme und das laute Gekrächze die meisten anderen Vogelstimmen. Der ihm sehr nahestehende südafrikanische Mahaliweber soll aber, wie Ortlepp berichtet, auch einen girlitzartigen Gesang haben und ein anderer südostafrikanischer Verwandter [P. pectoralis (*Ptrs.*)] soll nach Alexander während der Brutzeit „recht hübsch" singen, indem er klangvolle Pfiffe in die gewöhnlichen schirpenden Töne einfügt.

Eine Eigentümlichkeit des Nestbaues ist noch zu erwähnen. Das Nest ist nicht so fein gewebt wie das anderer Weber. Es ist außen rauher, da es von

Schwarzschnäbliger Mahaliweber.

ziemlich grobem Gras gefertigt ist, und vielfach ragen einzelne Grasstengel hervor. Letzteres ist besonders bei den nach unten gerichteten Einschlupföffnungen der Fall, die von den hervorstehenden Halmen dachartig überragt werden. Die Nester haben in der Regel zwei Eingangsöffnungen, wie das ja auch bei anderen Weberarten und auch einigen Webefinken der Fall ist. Zwischen den beiden Öffnungen befindet sich ein schmaler Steg, auf welchen der Vogel ruht. Zur Brutzeit aber wird die eine Öffnung mit Halmen und Blättern zugestopft und dadurch eine Nisthöhle geschaffen, in welcher das Weibchen das aus zwei bis drei Eiern bestehende Gelege sicher erbrüten kann. Sobald die Jungen, welche mit Insekten aufgefüttert werden, flügge, wird der zweite Nesteingang wieder geöffnet. Die Nahrung besteht in Insekten, Samen und Blattknospen.

Gefiederbeschreibung: Oberkopf, vordere Kopfseiten, Bartstreif schwarz; hintere Kopfseiten braun; breiter weißer Augenbrauenstreif bis auf die Schläfe; Hinterhals, Rücken braun; Bürzel, Oberschwanzdecke, Unterseite weiß; Brust, Körperseiten zuweilen graubraun verwaschen; kleine Flügeldecken braun, mittlere und große schwarzbraun mit weißen Spitzen; Schwingen schwarzbraun mit weißlichen Säumen; Unterflügeldecken braun; Schwanzfedern schwarzbraun mit weißem Endsaum; Auge braun bis rot; Schnabel schwarz; Füße hornbraun; Lg. 150—170, Fl. 95—100, Schw. 60 bis 70 mm.

♀ dem ♂ ähnlich, kleiner.

Einer der letzten abyssinischen Importe brachte wiederum einige seltenere Webefinken, darunter neben dem Zügelastrild den im Vogelhaus des Berliner Zool. Gartens befindlichen, das erstemal eingeführten

Grünen Astrild — Neisna quartinia *(Bp.))**

genannten Verwandten des bekannteren Schwarzbäckchens. Die Angehörigen der Gattung Neisna *Bp.* ähneln in ihrer Gestalt wie im Wesen denen der Gattung Estrilda. Es sind sehr kleine Webefinken mit zierlichem Schnabel, dessen obere Hälfte bei allen Neisna-Arten, man kennt deren sechs, stets schwarz, während der Unterschnabel rot gefärbt ist. Der Schwanz ist schwach gerundet, aber nicht so stark abgerundet wie bei Estrilda, und stets kürzer als der Flügel; der Bürzel ist immer rot.

Heuglin hat dieses „äußerst liebliche, muntere Wesen" paarweise und in Gesellschaften, besonders an sonnigen Hängen, in deren Nähe Gewässer sind, auf Felsen, Büschen und im Hochgrase angetroffen, Granvik sah sie paarweise oder in Flügen von sechs bis zehn Vögeln im Gebüsch längs kleiner Bergwässer hin- und herfliegend, besonders in dem Pflanzengewirr von Nachtschattengewächsen und Winden an den von der Sonne beschienenen Hängen. In seinem Wesen ist der kleine Astrild scheu und flüchtig, „der Gesang, obwohl nicht laut, recht lieblich und abwechselnd, der Lockton ein leises Zirpen" (Heuglin). Grassämereien bilden die Nahrung.

Das wenig kunstreiche Nest, eine größere regellose Anhäufung von Strohhalmen, fand Heuglin in einer Felsritze. Die Nestmulde war aus Federn, Pferdehaaren, Wolle und ähnlichen Stoffen hergestellt, während Erlanger das Nest dieser Art in Adis-Abeba freihängend in einem Rosenstrauche

*) Die Wahl des Namens „grüner Astrild" ist keine glückliche. Als „grüner" oder „olivgrüner" Astrild wurde bisher in den Kreisen der Liebhaber und auch im Zool. Garten der indische Webefink „Stictospiza formosa *(Lath.)* bezeichnet.

fand. Das Gelege besteht aus 5—6 weißen Eiern (14,2×11 mm).

Gefiederbeschreibung: ♂ Oberkopf, Nacken grau, zuweilen schwach dunkler quergewellt; Rücken, Schulterfedern olivgrünlich gelb, meist undeutlich dunkler quergewellt; Bürzel, Oberschwanzdecken leuchtend karminrot; Wangen, Vorderhals weißgrau, Kehle reinweiß; übrige Unterseite lebhaft ockergelb, nach hinten heller; Seiten grünlich; Deckfedern wie Rücken; Schwingen dunkelbraun mit gelblichgrünen Säumen; Schwanz schwarz; Auge rot; Schnabel oben schwarz, unten korallrot; Füße grauschwarz; Lg. 90, Fl. 42—47, Schw. 35 mm.

♀ unterseits blasser.

Junge Vögel haben braune Augen und ganz schwarzen Schnabel.

Schon in früheren Jahren wurde wiederholt von Mitarbeitern der „Ges. Welt" darauf hingewiesen, daß unter den eingeführten Blauastrilden sich unter anderen auch häufig solche Vögel befänden, bei denen die Färbung des blauen Gefieders von den sonst allgemein bekannten Formen dadurch abweiche, daß es einen grünlichen Ton habe. Ein solcher Blauastrild befindet sich zurzeit im Vogelhause des Zool. Gartens unter dem Namen

Dunkler Blauastrild — Uraeginthus bengalus schoanus *Neum.*

Graf Zedlitz, der sich mit der Untersuchung der Blauastrilde beschäftigte, stellt 12 Formen dieser Art fest (J. f. O. 1911) „ohne behaupten zu wollen, daß es deren nicht noch mehr gäbe". Unter Nr. 9 der Aufstellung heißt es: U. b. schoanus *Neum.* „Unterseite nicht reinblau wie bei allen vorigen, sondern grünlichblau, Oberseite kräftig rehbraun. Große Maße, Fl. 53—55 mm."

In der Lebensweise werden sie kaum von den anderen Formen abweichen. (Fortsetzung folgt.)

Bekämpfung der Milben.

Von Dr. L. v. Boxberger.

(Nachdruck verboten.)

Der Stoßseufzer des Herrn M. N. im Sprechsaal des Heftes Nr. 30 gibt mir Veranlassung, zur Milbenfrage einige Worte zu sagen, die ich schon lange auf dem Herzen habe. Erst nach vielen Jahren praktischer Liebhaberei sind mir die Augen darüber aufgegangen, daß wir in der heimtückischen, blutgierigen und in unheimlichem Grade sich vermehrenden Vogelmilbe, Dermanyssus avium, einen Todfeind unserer Zimmervögel, besonders aber der zarten Insektenfresser, zu erblicken haben, auf dessen Schuldkonto unzählige Verluste zu setzen sind, die man falscher Ernährung, ungeeignetem Käfig, Temperaturschwankungen und was sonst noch für Einflüssen zuzuschreiben pflegt, die für sich allein nicht den Tod des Vogels herbeigeführt haben würden, wenn sie nicht auf einen durch fortgesetzte Blutentziehung und ständige Störung des nächtlichen Schlafes, hochgradig geschwächten Organismus eingewirkt hätten. Man bedenke, daß der Vogel im Käfig nicht den Milben ausweichen kann, wie in der Freiheit! Bekanntlich haben die Vögel nur sehr wenig Blut, es leuchtet deshalb ein, daß ein fortdauernder regelmäßiger Blutverlust, auch wenn die entzogene Menge nächtlich nur gering ist, doch auch durch die sorgfältigste Ernährung nicht ausgeglichen werden kann und schließlich zu einem Grade von Anämie führen muß, der aus dem Vogel einen Todeskandidaten macht, der jedem Ansturm von Krankheitserregern, namentlich den gar nicht fernzuhaltenden Tuberkulosebakterien, erliegt. Und der jedesmalige Blutverlust ist in vielen Fällen gar nicht einmal so gering! Bevor ich die furchtbare Gefahr, welche von der Milbenverseuchung ausgeht, erkannt hatte, ahnte ich nicht, daß dieses Geschmeiß unter gewissen Umständen jeden nur irgendwie erreichbaren Platz am Käfig und in seiner Nähe besetzt hält, und beschränkte mich darauf, die bei der täglichen oberflächlichen Besichtigung der Käfige vorgefundenen Milbenansammlungen zu zerdrücken, was doch jedesmal einen kleinen Blutfleck am Finger hinterließ. Es handelte sich dabei um eine pfenniggroße Stelle an der Außenwand eines Lerchenkäfigs, wo er dicht an die Leiste eines Fensterflügels eingerückt stand. Da es mir unerklärlich war, woher sich diese täglich getöteten Milben täglich wieder erneuerten, untersuchte ich eines Tages nach Entfernung des Insassen voll dunkler Ahnungen den Käfig gründlich und entdeckte unter dem Überschlag des Deckentuches, also unter dem Falz, welcher an den vier Rändern des Tuchs durch die Umnähung um den Deckenrahmen entsteht, einen Befund, der mich geradezu erschaudern machte; Zu Tausenden saßen die Milben nebst ihren Ausscheidungen, einer grauen, feinwolligen Masse, in dem Falz, so daß durch ihre Zerquetschung auf dem Tuch dicke Blutspüren entstanden. Ebenso saßen diese giftigen Vernichter frohen Vogellebens in den Spalten zwischen der Sitzstange und Käfigwand, unter dem Futter- und Wassergefäß, in einem Riß des Bodens, in allen Winkeln, ja selbst im Sande des Käfigbodens in den vier Ecken der Schublade! Von nun an wußte ich, warum die Lerche und ein auf der gleichen Fensterbank stehender Spötter zusehends stiller und schwächer wurden! Eine Untersuchung des Spötterkäfigs lieferte das gleiche Ergebnis. Die Lehre, welche ich aus dieser Entdeckung zog, war nachhaltig. Alle Käfige wurden in allen Teilen mit kochendem Wasser ausgebrüht, sodann in allen Ecken, Spalten, überhaupt an allen Stellen, die als Milbenschlupfwinkel dienen konnten, mit einer starken Lysoformlösung ausgestrichen, die nach Eintrocknung nochmals angewendet wurde, und schließlich wurde das Deckentuch ausgekocht und vor seiner Aufnähung auf den Rahmen an den Rändern mit der gleichen starken Lysoformlösung getränkt sowie die Sitzstangen in der gleichen Lösung gebadet. Endlich wurden alle Schubladen mit frischem Sand versehen (ich pflege sonst bei der Reinigung den durchgesiebten Sand wieder zu verwenden). Eine Behandlung der Vögel mit Seifen- oder sonstigen desinfizierenden Bädern unterließ ich, weil derartige doch sehr lange dauernde Prozeduren durch die unvermeidliche Aufregung des Vogels sehr schädlich werden können, wohl aber stäubte ich jedem Vogel mit einer Insektenpulverspritze eine gehörige Ladung Insektenpulver von hinten ins Gefieder. Ich glaube, daß diese Behandlung gewirkt hat, denn seitdem bin ich die Milbenplage los. Allerdings bin ich auch stets mit der Lysoformlösung zur Hand, wo mir etwas verdächtig vorkommt. Leider ist das im Handel erhältliche Insektenpulver oft recht schlecht oder ganz

wirkungslos. Man muß es deshalb dadurch erproben, daß man eine Fliege, oder noch besser, einige Vogelmilben in ein Reagenzglas sperrt, das mit Insektenpulver ausgestäubt ist. Leben sie am nächsten Tage noch, so kann man das Zeug getrost wegschütten.

Ich bin davon überzeugt, daß ein energischer, nachhaltig durchgeführter Kampf gegen die Milben überraschende Ergebnisse in der Pflege der zartesten Weichfresser, wie Heidelerche, Spötter, Sumpfrohrsänger und anderer, zutage fördern würde! Dem Wunsche des Herrn M. N. auf eine recht ausgiebige Diskussion dieser so außerordentlich wichtigen Frage kann ich mich nur anschließen.

Grüner Astrild (s. S. 251).

Von einem Gimpelweibchen.

Von Ernst Marz, Chemnitz, „Ornis"-Mitglied Nr. 309.

(Nachdruck verboten.)

Vor einigen Jahren habe ich mich der Vogelliebhaberei zugewendet und mir nach und nach mehrere einheimische Körnerfresser zu Stubengenossen erwählt. Ich wollte lediglich als Liebhaber gelten, Züchtungspläne lagen mir vollständig fern, um so mehr dürfte für den Leser und Vogelwirt das folgende Vorkommnis von Belang sein:

Unter meinen Erstlingsanschaffungen befand sich ein Pärchen Dompfaffen. Das Männchen hiervon ist vor etwa einem Jahre eingegangen. Um nun das verwitwete Weibchen nicht allein in einem Käfig zu lassen, gesellte ich ihm drei Kameraden anderer Arten zu, und zwar 1 Zeisig, 1 Girlitz und 1 Buchfink; es waren dies alles Hähnchen. Vor drei Wochen nun fand ich morgens ein Ei im Käfig vor. Wie groß meine Überraschung war, wird sich der Leser vorstellen können. Da eine Züchtung nicht in meiner Absicht lag, waren natürlich entsprechende Vorbereitungen auch nicht getroffen. Die Folge davon war, daß das Ei auf den Käfigboden fiel und hierbei einen Sprung erhielt, wodurch es wertlos wurde.

Da ich die Tiere natürlich nicht fortgesetzt beobachten konnte, weil mich die Berufstätigkeit davon abhielt, so habe ich leider keinerlei Symptome bemerkt, die auf Nistlust und Paarung hinwiesen, zumal ich bei der kleinen bunten Gesellschaft ein solches Vorkommnis nie erwartet hatte. Ich traf nun sofort die nötigen Anstalten. Auf der Innenseite des Käfigs brachte ich in halber Käfighöhe ein Nistkörbchen an, legte Nistmaterial (Heu, dünnes Reisig, Wergfäden) auf den Käfigboden und wartete die Dinge weiter ab. Dompfaffweibchen und Zeisighähnchen waren stets besonders zutraulich zu ein ander, infolgedessen entfernte ich die beiden anderen Vögel aus dem Bauer. Das Dompfaffweibchen machte sich sofort mit dem Nistmaterial zu schaffen und flog auch fleißig zum Nistkörbchen hinauf, im Schnabel ein Stückchen Reisig, einige Wergfäden oder einen Grashalm tragend. Leider brachte es im Nistkörbchen nie etwas zustande; was der Vogel hineintrug, warf er beim Abfliegen unfreiwillig wieder heraus. Ich beschickte daraufhin das Nistkörbchen selbst mit dem vorhandenen Material, formte eine Mulde hinein und erwartete, daß das Tierchen von diesem nunmehrigen Neste Gebrauch machen würde. Leider vergebens. Der Vogel setzte sich auf den Korbrand und warf das gesamte Nest heraus, um nun selbst wieder zuzutragen. Letzteres geschah aber so spärlich, daß ich voraussah, daß auf diese Weise nie ein Nest entstehen kann. Die Erfahrung fehlte mir, ich mußte daher den Vogel gewähren lassen und zusehen,

wie er in der bisherigen Weise weiternistete, ohne auch nur einen Schritt dabei weiter zu kommen.

Zwei Tage nach der ersten Eiablage fand sich morgens ein zweites Ei auf dem Käfigsand vor. Der Vogel nächtigte regelmäßig auf einer höchst gelegenen Sitzstange, nie etwa im Nistkörbchen, so daß das Ei beim Auftreffen wieder einen Riß erhielt und dadurch verloren war. Die bisherige Nistarbeit setzte das Tierchen fort, ohne dabei etwas fertig zu bringen. Am nächsten Morgen war ein drittes Ei vorhanden, das dieses Mal zufällig ganz blieb und von mir bis heute sorgfältig aufbewahrt wird. Am folgenden Tage lag morgens ein viertes Ei am Käfigboden, das wiederum gesprungen und daher wertlos war. Mit diesem vierten Ei war die Eiablage beendet.

Bemerken möchte ich noch, daß ich neuerdings wieder ein Dompfaffmännchen erwarb und dieses unter Entfernung des Zeisigs dem Dompfaffweibchen zugesellte. Nach anfänglichen kleinen Streitigkeiten vertragen sich beide Tierchen jetzt sehr gut und ich beobachtete heute zum erstenmal, daß sie sich schnäbeln und das Weibchen vom Männchen Futter nimmt. Die oben beschriebene Nistweise hat das Weibchen bis heute immer noch beibehalten, aber nichts dabei erreicht.

Der Vorfall ist speziell für den unerfahrenen Züchter und Liebhaber interessant genug, um verschiedene Fragen daran zu knüpfen. Für mich selbst wäre die Beantwortung folgender Fragen von starkem Interesse: Ist eine erfolgreiche Paarung zwischen Dompfaff und Zeisig möglich oder ist die Eiablage auf einen anderen Vorgang zurückzuführen? Weiter: Wie kann ein nistlustiges Weibchen zu ernsthaftem Nestbauen gebracht werden?

Dann: Weshalb hat in dem erwähnten Falle das Weibchen die Eier niemals in das vorhandene Nistkörbchen gelegt? Zum Schlusse: Was ist zu tun, um eine zweite erfolgreiche Züchtung bei dem vorhandenen Dompfaffpärchen zu gewährleisten?

Ich würde es sehr begrüßen, wenn Herren von Kenntnissen auf diesem Gebiete ebenfalls an dieser Stelle sich ausführlich äußern und erforderliche Ratschläge erteilen würden. Der geschilderte Vorfall ist an sich ja nichts neues, doch bedarf er der Aufklärung und dieser Aufgabe sollte eine Fachzeitschrift wohl in erster Linie dienen.

NB. Ich führe die Eiablage auf eine geschlechtliche Reflexwirkung durch den Zeisig zurück, der den Eierstock zur Produktion anregte.

Sperling, Gesch. der „Ornis".

Ornithologische Beobachtungen aus Südhannover (Göttingen und Münden).

Von B. Quantz.

(Nachdruck verboten.)

Am 10. Februar bei etwa 5 Grad Kälte 8 Stieglitze bei Hann.-Münden vor Hilwartshausen an der Weser, am 14. Febr. einen Buchfink bei leisen Gesangsversuchen, Wetter trübe und ruhig, Barometerstand hoch. Am 20. Febr. haben sich zu Göttingen im Garten 2 Stare im Kampf um den Besitz eines Nistkastens auf dem Erdboden derartig ineinander verbissen, daß einer von ihnen überrascht und ergriffen werden konnte; es war ein kräftiges, wohlgenährtes Männchen, sein Schnabel an der Wurzel weißlich, in der Mitte gelblich, an der Spitze dunkel. Am 25. Febr. nach orkanartigen Regentagen ein ruhiger Tag. Rotkehlchen vormittags voll im Gesang, Buchfinkens Schlag erst am 26. Februar lauter und vollständiger, die Schwarzdrossel noch bei Vorübungen, dagegen am 28. Febr. schon im vollen Gesang. Goldammers Lied seit dem 26. Febr.

Kalifornische Schopfwachtel (s. S. 256 unter „Herrn L. M., Posen").

Am 2. März ein Gimpel beim Zwitschergesang. Rückkehr der Feldlerchen, deren Lied aber am 5. März noch nicht vollständig zu hören ist. Am 5. und 7. März kleinere und größere (Lerchen und Rabenvögel?) in östlicher Richtung ziehend beobachtet. Am 6. März fängt der Star zu bauen an; 2 Züge Kraniche nachmittags 5 Uhr von SW nach NO das Leinetal diagonal überfliegend. Am 10. März nachmittags verraten die Singdrosseln durch lauten Gesang ihre Rückkehr. Wetter klar und ruhig, Windrichtung südlich. Mitte März tragen Krähen Reisig zum Horst. Am 16. März beobachtete ich eine Kohlmeise bei der Nahrungssuche am Boden in einer Kiefernpflanzung am Hainberg, wo sie Laub (von Pappeln) umwendete. Temperatur nahe 0 Grad, geringe Niederschläge. Eine Schar von 30—40 Hänflingen ebendort singend umherstreifend und später in den hohen Bäumen unter Gesang den Einbruch der Abenddämmerung abwartend. Am Brutplatz war der Hänfling schon am 8. März angetroffen. Die erste Bachstelze

sah ich im schmucken Gefieder am 19. März auf einem Acker (Rückkunft evtl. schon einige Tage früher?).

Am 22. März, bei halbklarem, ruhigem Wetter und nordwestl. Windrichtung ca. 10 Vögel in großer Höhe auf dem Fluge gen SO beobachtet.

Am Vormittag desselben Tages fliegen die Stare wieder vor Vergnügen in der warmen Frühlingsluft umher, durch allerhand übermütige Bewegungen — Schaukeln, plötzliche Schwenkungen u. ä. — ihre Daseinsfreude verratend. Da sich diese „Lustflüge" auch später noch, im April, morgens und abends, bei schönem Wetter wiederholen, sind sie kaum als Flugübungen, wie sie etwa dem Fortzuge im Herbst vorhergehen, zu betrachten; denn sie erfolgen ja ebensogut im Frühjahr wie im Herbst.

Das erste Hausrotschwänzchen meldete sich ebenfalls am 22. März abends gegen 6 Uhr durch seinen bekannten Gesang vom Dachfirst eines Neubaues zurück. Luftdruck 755—756, südl. Wind. Höchsttemperatur am 21. März: + 12 ° C, am 22. März: + 16 ° C. Nachtfröste.

Am 24. März erfolgte die Paarung zweier Stare.

Am 26. März hörte ich den Gesang der Heckenbraunelle, die hier, nach meinen weiteren Beobachtungen, kein seltener Vogel ist, da sie sowohl in Gärten und Anlagen der Stadt als auch am Hainberg vorkommt.

Die einförmige Strophe des Weidenlaubvogels hörte ich zuerst in kurzer Wiedergabe am 27. März in den Anlagen am Feuerteich.

Des Grünfinken breiten Kreischlaut vernahm ich im Garten zuerst wieder am 30. März. Zwei Rotschwänzchen jagen sich stundenlang morgens und abends um den oberen Schornstein eines Neubaues herum. In den Anlagen am Wall hat die seit dem 27. März begonnene Wärmeperiode mit südlichen Winden und einer Tageswärme von 20 ° C (am 29. u. 30. März) und 16—18 ° C (am 31. März u. 1. April) das Vogelleben im Frühjahr zu größerer Entfaltung gebracht: ein Gezwitscher und Gesang in Baum und Strauch. Singende Rotkehlchen, eifrig bemüht, ihren Nebenbuhler aus ihrem Revier zu vertreiben; mehrere Weidenlaubvögel, die ihr „Zilp Zalp" bereits länger vernehmen lassen. Der Dompfaffen „Djü-Djü", der Goldammer einfaches Lied schlägt an mein Ohr. Der Star und die Sumpfmeise beschäftigen sich mit ihren Nisthöhlen, die sich dicht beieinander im Lindenbaume befinden und für jenen in einer künstlichen Höhle, für diese in einem vom Vogel selbst ausgehöhlten Astloch bestehen. Ein Zeisigpärchen, das in den auf dem Albani-Friedhof stehenden hohen Fichten zu nisten scheint — ich traf es hier bereits öfter an, das Männchen beim Balzfluge und -gesang, — sieht sich genötigt, ein anderes Zeisigweibchen aus seiner Nähe zu vertreiben. Im Hausgarten haben Blaumeisen ihr Nest gegen ein Kleiberpaar zu verteidigen.

Am 1. April beobachtete ich eine Gebirgsstelze beim Sammeln von Niststoffen in der Nähe des Feuerteiches, in den Anlagen zwei Amseln, die sich stundenlang um einen Bach herumjagten, so daß die Spur ihrer Tritte deutlich auf dem Boden

Mexikanischer Karmingimpel
(s. S. 256 unter „Herrn K. A., Köln").

in Form einer etwas vertieften Rennbahn (wie im Zirkus) zu sehen war. An anderen Tagen scheinen sie benachbarte Büsche benutzt zu haben, die das gleiche Kennzeichen, wenn auch nicht so deutlich, aufwiesen.

Am 2. April vernahm ich den Paarungsruf des Grünspechts. Rotschwänzchen und Weidenlaubvögel scheinen zahlreicher, letzterer an diesem Tage zuerst wieder im Park an der Reinhäuser Chaussee. Selbstverständlich kommt der 2. April als etwaiger Ankunftstermin dieses Vogels nicht in Betracht.

Der mit Gewitter am 2. April nachmittags eingeleitete Wettersturz, der vom 3.—7. April anhielt, ließ Vogelsang und Lenzeslust verstummen, und als vom 8. April an die Temperatur wieder stieg, zeigte sich, daß Hausrötel und Weidenlaubvögel die bösen Tage mit Frost und Schneefall offenbar gut überstanden hatten. Mit dem 16. April (Oster-Sonntag) setzt wieder eine auffallende Wärmeperiode ein, welche z. B. am 18. und 19. April eine Temperatur von 21—22½ ° C im Schatten zeitigte. Das richtige Vogelzugwetter, wenn auch das Barometer noch keinen besonders hohen Stand aufweist. Am 17. April sehe ich die erste

Rauchschwalbe und höre den ersten Fitislaubsänger neben den zahlreichen Weidenlaubvögeln. Am 18. April hat sich das Gartenrotschwänzchen im Garten wieder eingestellt und läßt seinen anmutigen Gesang hören. (Es muß dahingestellt bleiben, ob die unterm 17. April angegebenen Arten nicht schon einige Tage früher eingetroffen sind.) (Schluß folgt.)

Kleine Mitteilungen.

Brütende Schwalben im Gastzimmer einer Gastwirtschaft. Ein Bekannter erzählte mir, daß in der Wirtschaft „Jäger-Lust" in Talhaus, einem kleineren, im Badischen gelegenen Ort, Schwalben gebrütet und ihre Jungen trotz größtem und lebhaftestem Wirtschaftsbetrieb aufgefüttert hätten. Dies erschien mir unglaublich, und so fuhr ich selber nach Talhaus und ging in die Wirtschaft „Jäger-Lust", die gleich am Bahnhof liegt, um mich zu überzeugen. Erst konnte ich nichts von den Schwalbennestern gewahr werden, aber bald wurde ich durch das fortwährende Hin- und Hergeschwirre aufmerksam. Auf der Eisenschiene, die unter der Decke entlangläuft, waren an jeder Ecke ein Schwalbennest angebracht, welche ich nun mit eigenen Augen sah. Durch die Wirtsleute hörte ich, daß die Schwalben im Wirtsraum gebrütet und ihre Jungen aufgefüttert hätten. Unter den Nestern waren Brettchen für den herunterfallenden Kot angebracht. Es waren auch noch zwei der Jungen, schon gut befiederte und ausgewachsene Schwalben, in dem einen Nest. Auch im Nebenraum, wo es wieder sehr lebhaft zuging, flogen die Schwalben, unbekümmert um den Lärm, durch die offenen Fenster ein und aus.

Speyer a. Rh., 31. 8. 24. Werner Suchanek.

Bei rauhem, regnerischem Wetter sah ich am 10. September 1924, nachmittags 2 Uhr, 4 Stück **Mauersegler** etwas reserviert mit einem Trupp **Rauchschwalben** auf der Elbe in Cotta nach Futter jagend. Jedenfalls waren es Nachzügler oder sind durch späte Brut an ihren pünktlichen Abzug verhindert gewesen. In dieser Jahreszeit uns Ornithologen eine Seltenheit.

Paul Heinrich,
ornith. Leiter vom Dresdener Verein für Vogelschutz u. -pflege.

Sprechsaal.

(Steht den Abonnenten kostenlos zur Verfügung.)

Frage 14: Gewiß haben auch andere Liebhaber, wie Herr Fritz Braun (in seinem Artikel Ges. Welt Nr. 26) und ich die Erfahrung machen müssen, daß einzelne Exemplare unserer Körnerfresser in der Nacht sinnlos toben und sich dabei das Gefieder vollständig zerschlagen. Könnte einer der verehrten Leser mir den Grund dieses Tobens erklären? oder mir sagen, was man tun könnte, damit der resp. die Vögel diese Unart einstellen? Meine Vögel stehen in einem absolut ruhigen Zimmer, wo jede Störung ausgeschlossen ist. Merkwürdigerweise ist diese Unart in keinem Handbuch der Vogelkunde erwähnt. Carl Voigt, Leutzsch.

Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber Sitz Leipzig.

1. Vorsitzender Joh. Birk, Leipzig-Mockau, Beuthstraße 29; Geschäftsstelle: Rud. Petters, Leipzig-Probsth., Preußenstraße 31; Kassierer Werner Geßler, Leipzig, Dresdner Straße 2; Tauschvermittlung — T.-V. —: Richard Vorwerk, Leipzig-Lößnig, Merveldstraße 39.

Über die am 10. d. M. stattgefundene Vorstandssitzung ist u. a. im wesentlichen folgendes zu berichten:

1. Aufnahme in den Verband haben 6 Personen gefunden.

2. Herr Neunzig hat sich in liebenswürdiger Weise bereit gefunden, dem Verbande zur Gründung einer Bibliothek die „Gefiederte Welt" und seine Neuerscheinungen an Büchern zu schenken.

Wie bereits brieflich, so sei Herrn Neunzig auch an dieser Stelle nochmals der Dank der dem Verbande angeschlossenen Liebhaber ausgesprochen. Es finden sich vielleicht noch mehr gebefreudige Herren.

3. Leider konnte ein Antrag des Landesverbandes Preußen vom 12. Juli 1924, der den Vorstand bereits in zwei Sitzungen beschäftigt hat, noch nicht erledigt werden, weil notwendige Unterlagen nicht beschafft werden konnten. Der Antrag wird aber bestimmt in der nächsten Sitzung seine Erledigung finden und der Preuß. Landesverband Mitteilung erhalten.

4. Zur Hebung und Förderung der Liebhaberei halten wir es für erforderlich, die angeschlossenen Vereine um Veranstaltung örtlicher Ausstellungen zu ersuchen (vgl. hierüber die Aufforderung in der nächsten Nummer dieser Zeitschrift).

5. In Erinnerung wird unsere Tauschvermittlung gebracht, es liegen eine Anzahl Tauschgesuche vor, während die Tauschangebote spärlich eingehen.

6. Gleichfalls zur Hebung und Förderung der Liebhaberei ist beabsichtigt, den Rundfunk für die Liebhaber zu gewinnen. Unser 1. Vorsitzender wird versuchen, Gelegenheit zu Vorträgen zu erhalten. Mitteilung hierüber erfolgt noch.

7. In Erinnerung bringen möchten wir noch die Mitgliederlisten. Es ist beabsichtigt, in Fortsetzungen unsere Mitglieder zu veröffentlichen. Die Anlegung der Mitgliederliste muß bis zum 1. April nächsten Jahres beendet sein, um über den tatsächlichen Mitgliederbestand berichten zu können. Wenn unserer Aufforderung nicht Folge geleistet wird, kann auch keine Angabe über den Mitgliederbestand erfolgen. Der Verband bittet das zu berücksichtigen.

Rud. Petters, 1. Schriftführer.

Vom Vogelmarkt.

Von seltener auf den Vogelmarkt kommenden Vögeln werden angeboten:

Hugo Keßler, Darmstadt, Kahlertstraße 6 bei Mauck:
1 Goldstirnsittich, 2 Kaktussittiche.

Molz, Düsseldorf, Postfach: Erzloris, kal. Schopfwachteln, Kardinäle, Dolchstichtauben, Pfauen, Fasanen.

Willi Odenwald, Fulda, Vogelexport und -import:
1 Beo, 1 Rosella-Männchen, Guatemalasittiche, Elfenbeinsittiche, mex. blaubürzl. Sperlingspapageien, Papstfinken, Indigofinken, Trupiale, mex. Häher, Massena-Wachteln, Klarinos, mex. Spottdrosseln.

Gustav Rambausek, Wien XVIII, Martinstraße 88:
1,1 Singsittiche.



Herrn L. A., Pforzheim. Die Heilungsversuche bei derartigen Geschwülsten verlaufen ergebnislos. Ich empfehle eine möglichst reizlose Kost zu verabreichen, viel Obst und mit diesem niemals gleichzeitig Milchsemmel. Ferner täglich die Füße baden, gut abtrocknen und mit Kartoffelmehl einstäuben. Zuweilen tritt Rückbildung der Geschwülste ein. In den meisten Fällen stirbt die befallene Zehe ab und trocknet ein. Muß dann operativ entfernt werden.

Herrn K. A., Köln. Bei dem mexikanischen Kanariengimpel (s. Abb. S. 255) ist der Vorderkopf bis über das Auge, ein breiter Streif über den Ohrdecken, vordere Kopfseiten, Vorderhals und Bürzel leuchtend karminrot. Gewöhnlich verschwindet dieses Rot bei der ersten Mauser in der Gefangenschaft. Mischlinge zwischen Kanariengimpelmännchen × Kanarienweibchen sind verschiedentlich gezüchtet. Diese Mischlinge zeigten das Rot des Gefieders nicht. Eine Anfrage bei dem Händler, welcher diese Vögel anbietet, wird die gewünschte Aufklärung geben.

Herrn L. M., Posen. Wenn sie über eine Gartenvoliere verfügen ist die Züchtung der schönen kalifornischen Schopfwachtel (s. Abb. S. 254) sehr zu empfehlen. Gut ist es den hinteren Teil der Voliere mit Brettern zu bekleiden und zu überdachen. Ferner ist das Anpflanzen einiger kleiner Fichten zu empfehlen. Näheres s. in „Fremdländische Stubenvögel".

Herrn P. H., Dresden; Herrn Dr. v. B., Berlin-Zehlendorf; Herrn A. Sch., Halle a. S.; Herrn E. M., Chemnitz: Beiträge dankend erhalten.

(Fortsetzung auf der 2. Umschlagseite.)

Jahrgang 53 — 25. September 1924 — Heft 32

DIE GEFIEDERTE WELT.

ZEITSCHRIFT FÜR VOGELLIEBHABER

Begründet von Dr. Karl Ruß

Herausgegeben von Karl Neunzig in Berlin-Hermsdorf

Inhalt:

Ein Beitrag zur Weichfresserfütterung. Von J. Birk, Leipzig. (Schluß.)
Neueinführungen und Seltenheiten. Von Karl Neunzig. (Fortsetzung.)
Bekämpfung der Milben. Von Dr. L. v. Boxberger.
Von einem Gimpelweibchen. Von Ernst Marz, Chemnitz, „Ornis"-Mitglied Nr. 309.
Ornithologische Beobachtungen aus Südhannover (Göttingen u. Münden). Von B. Quantz.
Kleine Mitteilungen - Sprechsaal - Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber - Vom Vogelmarkt - Redaktionsbriefkasten - Aus den Verbänden - Aus den Vereinen.

Abonnement monatlich (4 Nummern) 1.50 Gm. — Einzelpreis des Heftes 50 Gpf.
vermittelt das nächste Postamt bzw. der zuständige Briefbote. / Postversand ab Burg Bez. Magdeburg.

[illegible]'sche Verlagsbuchhandlung / Magdeburg / Postschließfach 148

Aus den Verbänden.

Vereinigung der Vogelliebhaber Landesverband Sachsen und Groß-Thüringen. Der Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig hat beantragt, die Vereinsbeiträge für den Landesverband auf 0,50 M. für das Mitglied herabzusetzen. In einer Sitzung hat sich der Vorstand in Anbetracht der mißlichen Wirtschaftsverhältnisse für Annahme dieses Antrages entschieden. Wir geben dieses hiermit bekannt und bitten die Vereine, ihre Meinung darüber kundzugeben. Sollten wir bis 15. Oktober 1924 keinen Widerspruch erhalten, so nehmen wir die Zustimmung als gegeben hin. Ferner bitten wir unsere Mitglieder, zu dem vom 27.—29. September 1924 stattfindenden sächsischen Ornithologentag in Chemnitz recht zahlreich zu erscheinen. Die Vorstände vom Reichs- und Landesverband sind persönlich anwesend und werden die Gelegenheit zu einer zwanglosen Aussprache wahrnehmen.

Hunger, 1. Schriftführer.

Aus den Vereinen.

Aufgenommen ist Mitglied Nr. 18 Herr Apotheker Georg Rutsch, Frankfurt a. d. Oder, Grüner Weg 5. — Mitglied Nr. 282 wohnt jetzt in Zschopau i. Sa.

A. Krabbe.

„Aegintha", Verein der Vogelfreunde zu Berlin. Unsere Sitzungen finden an jedem 1. und 3. Donnerstag im Monat, abends 8 Uhr, im Vortragssaal des Aquariums statt. Fast in jeder Sitzung belehrende Vorträge und Besprechungen unter gütiger Mitwirkung unseres verehrten Ehrenmitgliedes Herrn Dr. Heinroth. Gäste gern willkommen.

Der Vorstand.
J. A.: O. Vorbrodt, 1. Schriftführer, Scharnweberstr. 18.

Vereinigung der Liebhaber einheimischer Vögel zu Berlin. Sitzung jeden 2. Donnerstag nach dem 1. und 15. des Monats im Vereinslokal zum „Alexandriner", Alexandrinenstraße 37a. Gäste stets willkommen.

J. A.: P. Böhme, Schriftführer,
Berlin O 17, Rüdersdorfer Str. 69.

Verein der Vogelliebhaber Dortmund u. Umgegend. Protokoll der Mitglieder-Versammlung vom 29. Juni 1924. Um 7 Uhr abends eröffnete der 1. Vorsitzende Koll. Steenkamp die Versammlung. Zu Punkt 1 Aufnahme neuer Mitglieder wurde Herr Spauke, hier, Lagerhausstraße, einstimmig als neues Mitglied aufgenommen. Punkt 2. Der Aufbau unseres Vereins. Der 1. Vorsitzende stellte zum größten Bedauern fest, daß viele Kollegen für unsere edle Sache nicht das nötige Interesse mehr zeigen, und ohne Grund aus den Versammlungen bleiben, was den Verein schwer schädigt. Aus diesem Grunde wurde einstimmig beschlossen, am 27. Juli eine außerordentliche Mitgliederversammlung anzuberaumen und alle Kollegen aus dem Verein durch Karte zu benachrichtigen. Diejenigen Kollegen, welche alsdann aus der außerordentlichen Sitzung, ohne sich durch dringenden Grund entschuldigen, fern bleiben, sollen durch Vereinsbeschluß wegen Interessenlosigkeit aus dem Verein ausgeschlossen werden. Des ferneren wurde angeregt, im Herbst eine Lokal-Ausstellung zu veranstalten, jeder kann einen oder mehr Vögel beliebig zur Schau ausstellen. Schluß der Sitzung abends 8^{10}. — Protokoll der außerordentlichen Sitzung vom 27. Juli 1924. Der 1. Vorsitzende begrüßte um 6 Uhr die erschienenen Kollegen und machte auf die sehr wichtige Tagesordnung aufmerksam. Punkt 1. Alle erschienenen Kollegen waren sich darüber einig, daß die fehlenden Mitglieder wegen Interessenlosigkeit ausgeschlossen werden sollten. Es wurden auf Beschluß 9 Mann aus unserem Verein wegen Interessenlosigkeit ausgeschlossen. Die ausgeschlossenen Herren können auf ihren Antrag neu in unseren Verein wieder aufgenommen werden, müssen aber neu das Eintrittsgeld bezahlen. Punkt 2. Aus dem Vorstand sind durch Ausschluß ausgeschieden die Herren Schulte, Bücherwart, Sondermann, Schriftführer und Bohr als Beisitzer. Das Schriftführeramt übernimmt der Vorsitzende. Der Beisitzer ist nicht neu gewählt. Punkt 3. Der Kollege Spauke übernimmt bereitwilligst das Amt des neuen Bücherwartes und Verwaltung unserer Bibliothek. Zu Punkt 4 wurde das Protokoll der letzten Versammlung vom 29. Juni vorgelesen und genehmigt. Punkt 5. Als neues Mitglied wurde in unseren Verein Herr Fritz Lueg, hier, Schützenstraße, einstimmig aufgenommen. Punkt 6. Zu diesem Punkte wurden die rückständigen Beiträge an den Kassierer bezahlt und die neue Vereinstafelangelegenheit erledigt. Punkt 7. Herr Kollege Lappe liest einen Aufsatz vor, betitelt: „Die Vernichtung der Vogelwelt durch den Menschen", ferner wurde ein Aufsatz vorgelesen über: „Der Vogelfang in Thüringen". Punkt 8. Einstimmig wurde der Beschluß gefaßt, am kommenden Sonntag morgens einen Ausflug zum „Vogelparadies" bei Mengede nach Kollege Lappe zu unternehmen. Treffpunkt 6 Uhr morgens am Hauptbahnhof. — Protokoll der Mitgliederversammlung vom 24. August 1924. Punkt 1. Verlesung des Protokolls der letzten Versammlung. Zu Punkt 2 wurden die rückständigen Beiträge an den Kassierer bezahlt. Punkt 3. Der Antrag der Kollegen Pistor und Lappe betreffend pünktliches Erscheinen in den Versammlungen wurde einstimmig angenommen, und zwar: 1. Wer 1/4 Stunde nach 6 Uhr abends zur Versammlung kommt, muß als Strafe 20 Pfennig in die Kasse zahlen. 2. Wer ohne Entschuldigung fernbleibt muß zur Strafe 1 Mark bezahlen. Punkt 4. Auf Antrag von Herrn Pistor wurde beschlossen, am 31. August morgens $6^1/_2$ Uhr einen Ausflug zum Schwerter Wald zu unternehmen. Abfahrt $6^1/_2$ Uhr ab Hauptpost Burotor nach Hörde, von da weiter bis Gockel. Punkt 5. Der Vorsitzende hat einen Artikel verfaßt, betitelt: „Unsere heimischen Vögel in der Gefangenschaft", welcher vorgelesen wurde und viel Beifall fand. Der Artikel soll in die Zeitung kommen. Punkt 6. Die Beschaffung der neuen Vereinstafel ist nunmehr erledigt. Herr Kollege Pistor stiftet dieselbe dem Verein umsonst. Nur die Kosten für die Aufschrift sind aus der Vereinskasse zu zahlen. Punkt 7. Auf Antrag von Kollegen Lappe findet in unserem Vereinslokal „Thüringerhof" in Dortmund, Mallinkerodtstraße 180, am 28. September, abends 6 Uhr, eine Lokal-Ausstellung (nur unter den Mitgliedern) statt. Freunde und Liebhaber herzlichst willkommen. Punkt 8. Verschiedenes. Es wurde beschlossen, unseren Bruderverein in Hörde zur nächsten Versammlung einzuladen, welchen Besuch wir erwidern demnächst. Des weiteren wurde den Kollegen vom Vorsitzenden nochmal ans Herz gelegt, für unseren Verein neue echte Waldvogelliebhaber zu werben, damit unser Verein blühe und gedeihe.

Paul Steenkamp, 1. Vorsitzender.

Alte Vereinigung der Vogelliebhaber zu Dresden. Versammlung jeden Freitag, abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Blasewitzer Hof". Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. J. A.: Matth. Meys, Schriftführer.

Verein Vogelschutz und -pflege zu Dresden. Versammlung jeden Donnerstag, abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Schillers Restaurant", Ecke Stifts- und Ehrlichstraße. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen.

Bernhard Kühn, Vorsitzender.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei zu Hamburg. Sitzungen finden statt jeden 1. und 3. Dienstag im Monat in Hüttmanns Hotel, Poolstr. 22, abends 8¼ Uhr. Nächste Sitzung Dienstag, den 7. Oktober 1924. Gäste sowie auch Exotenliebhaber stets willkommen.

J. A.: Arnold Weber, 1. Vorsitzender.

Verein von Vogelfreunden Karlsruhe. Gegr. 1888 Monatsversammlung jeden 1. Donnerstag im Monat. Vorstandssitzung jeden 1. Donnerstag nach dem 15. im Vereinslokal „Goldener Adler".

Verein der Vogelliebhaber Königsberg (Pr.). Sitzung an jedem Freitag nach dem 1. und 15. des Monats, abends 8 Uhr im Vereinslokal „Kaiser-Kaffee", Kaiserstraße, Ecke Schnürlingsstraße. Gäste sind willkommen.

J. A.: Ernst Reinholdt, 1. Vorsitzender.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig. Vereinssitzungen jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat im Vereinslokal „Bauers Brauereirestaurant", Täubchenweg. Nächste Sitzung Donnerstag, den 2. Oktober. Gäste stets willkommen.

J. A.: Johann Birk, 1. Vorsitzender.

(Fortsetzung auf der 3. Umschlagseite.)

Verein der Vogelfreunde Leipzig-Plagwitz. Vereinslokal: „Gosenschlößchen", Leipzig-Plagwitz. Sitzungen an jedem 1. und 3. Montag des Monats, abends 8 Uhr. Vogelfreunde sind stets willkommen.
J. A.: Karl Scholtissek, 1. Vorsitzender, Leipzig-Plagwitz, Lauchstädter Straße 30.

Verein der Vogelliebhaber zu Mannheim. Versammlungen finden alle 14 Tage Samstag abend 8 Uhr im Vereinslokal „Restauration z. gold. Falken" statt. S. 1. 17. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen.
Johann Daubmann, 2. Schriftführer.

Bayrischer Vogelliebhaberverein, Sitz München (E.V.). Jeden Samstag gesellige Zusammenkunft im Pschorrbräuhaus, Bayerstraße. Jeden letzten Samstag im Monat Monatsversammlung im Vereinslokal ebendort. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen.
Rud. Engel, 1. Schriftführer.

„Ornis", Freie Bezugs-Vereinigung der Waldvogelliebhaber Deutschlands. Gegründet 1912. Auf vielseitigen Wunsch der alten Mitglieder wollen sich die Waldvogelliebhaber wieder in der „Ornis" zusammenschließen. Als amtliches Organ ist die „Gef. Welt" ausersehen worden, und werden die Artikel, die früher in den „Ornis-Blättern" erschienen, in obiger Zeitschrift gebracht werden. Aus diesem Grunde bittet die Geschäftsführung um eifrige Mitarbeit, damit unserer Waldvogelpflege wieder der Platz eingeräumt wird, der ihr gebührt. Anmeldungen sind unter Beifügung von 2 M. an den Geschäftsführer zu richten; Mitglieder erhalten auf Mischfutterbestellungen 5% Rabatt. Mit treudeutschem Gruß
Martin Sperling, Halle a. d. S., Südstr. 49.

Zoolog. Verein zu Zwickau i. S. Versammlung jeden Freitag nach dem 1. und 15. jeden Monats, abends 8 Uhr, im Restaurant „Zur Bleiche", Katharinenkirchhof. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen.
J. A.: Paul Schmidt, 1. Vorsitzender, Zwickau i. S., Bosenstr. 44.

Empfehlenswerte Bücher:

Für Freunde der heimischen Vogelwelt.

Die deutsche Vogelwelt nach ihrem Standort. Ein Beitrag zur Zoogeographie Deutschlands und zugleich ein Exkursionsbuch zum Kennenlernen der Vögel. Von Werner Hagen. Mit 74 Abbildungen und 4 Schwarzdrucktafeln. Kart. 3.— M.

Die einheimischen Stubenvögel, ihre Naturgeschichte und Zucht. Von Karl Neunzig (zugleich 6. Auflage des Dr. Karl Rußschen Handbuchs für Vogelliebhaber Band II). Mit 22 Farbentafeln und 188 Textabbildungen. Geh. 14.—, geb. 17.— M.

Die gefiederten Sängerfürsten des europäischen Festlandes, ihre Naturgeschichte, sachgemäße Käfigung, Behandlung und Pflege als Stubenvögel. Von Mathias Rausch. 2. Auflage. Mit 3 Farbendrucktafeln und 16 Textabbildungen. Kart. 3.— M.

Die Hauptregeln der Sprosserpflege. Scherzreime von Oskar M. Kisch. Mit 2 Abbildungen. 1.— M.

Der Dompfaff, seine Naturgeschichte, Pflege, Abrichtung und Zucht. Auf Grund 54jähriger Erfahrung von F. Schlag. 8.—10. Auflage. Mit 2 Schwarzdrucktafeln. Kart. 1.— M.

Die deutschen Sumpf- und Strandvögel. Von Dr. Curt Floericke. Mit 44 Abb. auf 15 Tafeln in Schwarzdruck. Kart. 4.50 M.

Die deutschen Schwimm- und Wasservögel. Von Dr. Curt Floericke. Mit ca. 45 Abb. auf 15 Tafeln in Schwarzdruck. Kart. 4.50 M.

Die mitteleuropäischen Vögel. Von Dr. E. Bade. Band I. Singvögel. Mit 1 Farbentafel, 4 Schwarzdrucktafeln, 31 Tafeln in Photographiedruck u. 144 Textabbild. von Nestern, Eiern u. Vogelteilen. Geb. in Ganzleinen 5.— M.

Allerlei sprechendes gefiedertes Volk. (Raben- und Krähenvögel, Starvögel usw.) Ein Hand- und Lehrbuch von Dr. Karl Ruß. Mit 5 Vollbildern in Schwarzdruck. Kart. 3.— M.

Gefiederte Hausfreunde I. Von Karl Neunzig. Kurze Unterweisung üb. d. Pflege heimischer Stubenvögel. Kart. 1.— M.

Die Fänge der Raubvögel Mitteleuropas. Von Prof. Dr. Carl R. Hennicke. Mit 33 lithogr. Tafeln. Kart. 5.— M.

Für Liebhaber fremdländischer Vögel.

Die fremdländischen Stubenvögel, ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht. Von Karl Neunzig. (Zugleich 5. Auflage des Dr. Karl Rußschen Handbuchs für Vogelliebhaber Band I.) Mit 42 Farbentafeln und 400 Textabb. Geh. 30.—, geb. 35.— M.

Die fremdländischen Weichfutterfresser (Insekten- od. Kerbtierfresser, auch Wurmvögel genannt, Frucht- od. Beerenfresser u. Fleischfresser). Mit Anhang: Tauben- und Hühnervögel. Von Dr. Karl Ruß. (Die fremdländischen Stubenvögel Bd. II.) Mit 16 Farbentafeln. Geh. 30.— M.

Gefiederte Hausfreunde II. Von Karl Neunzig. Kurze Unterweisung über die Pflege fremdländischer Stubenvögel. Mit 51 Abbildungen. Kart. 1.— M.

Dr. Karl Ruß, Die fremdländischen Stubenvögel, ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.
Bd. I—IV. Geh. 150.— M., in Halbleder geb. 175.— M.
Bd. I. Körnerfresser ist einzeln nicht käuflich.
Bd. II. Weichfresser. Geh. 30.— M. Bd. III. Papageien. Geh. 30.— M.
Bd. IV. Lehrbuch d. Stubenvogelpflege. Geh. 40.— M.

Webervögel und Widafinken, ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht. Von Dr. Karl Ruß. Kart. 3.— M.

Bilder aus der Vogelstube. Schilderungen aus dem Leben fremdl. u. einheim. Stubenvögel. Von Dr. Karl Ruß. Kart. 3.— M.

Für Papageien-Pfleger.

Die Papageien, ihre Naturgeschichte, Pflege, Züchtung und Abrichtung. Von Dr. Karl Ruß. (Die fremdländ. Stubenvögel Bd. III.) Mit 10 Farbentafeln. Geh. 30.— M.

Der Wellensittich, seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht. Von Dr. Karl Ruß. Sechste, von Karl Neunzig gänzlich umgearbeitete und vermehrte Auflage. Mit 1 Farbendrucktafel und 31 Textabbildungen. Kart. 2.50 M.

Sprechende Papageien. Ein Hand- u. Lehrbuch von Dr. Karl Ruß. 3. verb. Aufl. Mit 2 Farben- u. 32 Schwarzdrucktaf. Kart. 4.50 M.

Der Graupapagei, seine Naturgeschichte, Pflege, Abrichtung und Züchtung. Von Dr. Karl Ruß. 2. von Karl Neunzig bearbeitete Auflage. Mit einem buntfarbigen Aquarelldruck, 16 Textabbildungen und 1 Verbreitungskarte. Kart. 2.50 M.

Der Graupapagei in der Freiheit und in der Gefangenschaft. Von Dr. Carl R. Hennicke. Mit 1 Buntbild. Geh. 1.50 M.

Die Amazonen-Papageien, ihre Naturgeschichte, Pflege, Abrichtung und Züchtung. Von Dr. Carl Ruß. 2. von Karl Neunzig bearbeitete und vermehrte Auflage. Mit 1 buntfarbigen Aquarelldruck und 21 Textabbildungen. Kart. 2.50 M.

Behandlung und Heilung der Krankheiten von grauen und grünen Papageien. Von O. Majewski. Geh. 1.— M.

Für Kanarienzüchter.

Der Kanarienvogel, seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht. Von Dr. Karl Ruß. 14. Aufl. mit 3 Farbentaf. u. zahlreich. Textbild. Bearb. u. herausgeg. von Karl Neunzig. Kart. 2,50 M.

Die Bastardkanarienvogelzucht. Von Walter Barth. Mit 20 Abbildungen und 1 Tontafel. 1.50 M.

Die Farben- und Gestaltskanarien nebst Beschreibung aller verschied. Kanarienrassen, deren Entstehung, Form- u. Farbenveränderung, Bastardzucht und Farbenfütterung von A. Aschenbrenner. Mit vielen stichhaltigen Abbildungen. 1.75 M.

Der Kanariengesang. Allgemeinverständliche sowie musikalische und phonetische Darstellung von W. Kluhs. 1.— M.

Für Aquarienfreunde.

Praxis der Aquarienkunde. Aus der Praxis für die Praxis. Von Dr. E. Bade. 4. und 5. Auflage. Mit 1 Farbentafel, 12 Schwarzdrucktafeln und 203 Textabbildungen. Kart. 5.— M.

Die ausländischen Aquarienfische, ihre Naturgeschichte, Pflege und Züchtung. Von Dr. E. Bade. Mit einer Farbentafel und vielen Abbildungen im Text. (Erscheint demnächst! Preis ca. 5.— M.)

Katechismus für Aquarienliebhaber. Fragen und Antworten über die Einrichtung, Besetzung und Pflege des Süßwasser-Aquariums sowie über Krankheiten und Züchtung der Fische. Von Wilh. Geyer. 8. u. 9. von Hans Geyer besorgte Aufl. Kart. 3.— M.

Zimmer- und Freiland-Aquarienpflanzen. Von Mönkemeyer. Mit 26 Abbildungen. Kart. 1.20 M.

Der Schleierschwanz und der Teleskopschleierschwanz, ihre Zucht, Pflege und die Beurteilung ihres Wertes. Von Dr. E. Bade. Mit 5 Schwarzdrucktafeln u. 19 Textabbildungen. Geh. 2.— M.

Die künstliche Fischzucht. Von Dr. E. Bade. Mit 2 Schwarzdrucktafeln und 16 Textabbildungen. Geh. 1.— M.

Das Seewasser-Aquarium, seine Einrichtung, seine Bewohner und seine Pflege. Mit einem Anhange: Das Brackwasser-Aquarium. Von Dr. E. Bade. Mit 1 Farbentafel, 14 Schwarzdrucktafeln u. 104 Textabb. Kart. 5.—, geb. 6.— M.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg
Postschließfach 148

Anzeigenteil

Die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 20 G.-Pf. berechnet. Aufnahme erfolgt gegen Voreinsendung des Betrages in Reichsgeld per Brief od. auf unseren Zahlstellen: Postscheckkonto: Magdeburg 3148, Wien 156 687, Bern III 4326, Prag: Creditanstalt d. Deutschen unter Angabe des Zweckes.

Käfige u. Gerätschaften

Kaufe Sprosserkäfig
(System Schindler), neu oder tadellos erhalten. 727]
Bad Salzschlirf. Dr. te Kamp.

Vogel-Fangkäfige 2.50 und 4.50 ℳ, Schlagnetze f. kl. schädl. Vögel 1.90 ℳ, f. größ. 2.10 u. 2.40 ℳ. Katalog gratis.
J. Tannen, Gronau 58 (Westf.). [728

Vogel-Mistelleim
zum Fangen schädlicher Vögel, Ia klebend bei jeder Witterung, garantiert gebrauchsfähig, Dose 1,50 ℳ fr. von
A. Freitag Nchf., Frankenberg i. S. 6.
Wiederverkäufer hohen Rabatt. [729

Futtermittel

Bestes Weichfutter
mit Insektenschrot für feinste, zarteste Sänger. Trockene Ameiseneier, handverlesen, im Spezialgeschäft von [730
Pichler, Wien III, Klimschgasse 18.

10 Ltr. sandfreie
trockne Ameiseneier
18 Mark franko.
5 Ltr. trockne Maikäfer
7.50 Mark franko.
Jos. Ehrlich, Würzburg,
731] Weißenburgstraße.

Mehlwürmer
732] große gelbe Ware,
1/4 Pfd. franko geg. Voreinsend. v. Rm. 2.
Bonitas-Versand, Rostock i. M.

Mehlwürmer Pfd. 8 ℳ, 1/4 = 2 ℳ franco. Voreins.
733] Jeltner, Breslau, Weinstr. 12.

Mehlwürmer
geg. Einsend. v. 2.— Rentenmark 1/4 Pfd. franko versend. D. Waschinski & Co.,
Biesenthal i (Mark). [734

Vogelfutter [735
für Kanarien, Waldvögel, Exoten, Papageien, Weichfresser. Anerkannt bewährteste Mischungen auf Grund langjähriger Erfahrung. Liste 13 über Vogelfutter, Liste 5 über Vogelkäfige, Zuchtgeräte usw. mit etwa 400 Abbildungen.
W. Göpel, Leipzig,
Tröndlinring 1. Telephon 14 958.
Bei Anfragen bitte auf die „Gefiederte Welt" Bezug zu nehmen.

Ornis-Haus
Halle-Saale
Gegründet 1912
Spezialität:
Individuelle Weichfresserpflege nach Angaben des Herrn Apotheker Adalbert Jena-Biberach-Riß. (Alleintges Herstellungsrecht.)
Reform-Normal I, Volierenm.,
Reform-Normal II, f. Rotkehlchen, Schwarzplatten usw.,
Reform-Normal III, f. Nachtigall., Sprosser usw.,
Reform-Normal IV, f. Gelbspött., Goldhähnchen usw.,
Reform-Normal V, f. Schama usw.,
Körnerfutter Ia für jede Vogelart. [736
Inhaber langjähriger Fachmann, siehe „Ornis-Buch" (90 S.) Mk. 1
Preisliste auf Wunsch!

Vögel

Ab 1. Oktober empfehle
Zeisige, Stieglitze, Rothänflinge, Rote Gimpel usw. [737
Großabnehmer gesucht.
Hermann Hornig
Vogelexporthaus
Zittau in Sachsen,
Neusalzaer Str. 17.

Habe wieder abzugeben:
5 gr. jg. Wellensittiche à 5 ℳ, 1,1 gelb. Wellensittiche 15 ℳ, 1 Paar ♂ Rotkopfamandine, ♀ Bandfink 15 ℳ (z. Zucht), 2,0 Zebrafink à 4 ℳ, 1,0 Zeisigkanarie 7 ℳ, 1,0 Grünlingkanarie 5 ℳ (beides fleiß. Säng.), 1 Graunedelsänger 3 ℳ, 1 weißbunte Kanarie 25 ℳ, 0,3 Kanar. à 1 ℳ, 0,2 Bandfinken à 1 ℳ.
738] Bernd Regge, Lötzen (Ostpr.), A. Z.-Mtgl. 264.

Ia junge
Kanarienhähne
gibt ab zu 8—10 ℳ, Weibchen 1,50 ℳ.
Tausche auch gegen Wellensittiche, Zebrafinken und jap. Möwchen.
Friedr. Bremer, [739
Ludwigslust i. M., Wasserstraße.

Offeriere in einwandfreien gesunden Exemplaren:
Grüne Wellensittiche,
ausgefärbt, Paar 15 ℳ, Junge Paar 12 ℳ, Blaubirzl, Sperlingspapageien Paar 18 ℳ, Tobisittiche Stück 12 ℳ, Papstfinken, in Pracht, Paar 30 ℳ, Männchen Stück 20 ℳ, Weibchen Orangeblaufink 12 ℳ, Weibchen Indigofink 10 ℳ, Weibchen großer Kubafink 10 ℳ, Jap. Möwchen Paar 15 ℳ, Zebrafink Paar 18 ℳ, Bronzemännchen Paar 7 ℳ, Mex. Karmingimpel, Männchen, Stück 8 ℳ, Spitzschwanzamandinen Paar 45 ℳ, Viehweber, prachtvolle Vögel, Stück 14 ℳ, bei 3 Stück à 12 ℳ, graue Reisfinken Paar 6 ℳ, Dreifarbige Glanzstare Stück 28 ℳ, Brasil. Glanzstar 5 ℳ, ganz zahmer Wellensittich, Rotkopf (selten) 60 ℳ, Doppelgelbkopfamazone, ganz zahm, 80 ℳ, junge Gelbnackenamazone 75 ℳ, Safranfinken, Männchen, in Pracht, Stück 7 ℳ, kleine zahme Meerkatzenaffen Stück 75 ℳ.
Tausche gelbe Kanarienweibchen ein à 1 ℳ.
Verp. und Porto 3.50 u. 6.50 dringend.
Paul Tzornack, Berlin,
Prenzlauer Allee 189.
740] Tel. Humboldt 2063.

Suche Hänflingbastard,
Naturfänger,
zu kaufen oder zu tauschen.
741] Oberlehrer Isser,
Bühl O./A. Laupheim (Württbg.)

Postkarten Naturaufnahmen.
Die Preise der in der letzten Nummer der „Gef. Welt" angebotenen Postkarten ändern sich leider wie folgt: „24 farb. Vogelbilder m. Porto ℳ 4.20; „8 Vogelbilder" nicht lieferbar; 20 Kupferdruckkarten „Seevögel" ℳ 1,60; „Zierfische" ℳ 1.60. 742]
Alfred Troschütz
Buchhändler und Antiquar
Hannover
Große Aegidienstraße 4

Wollaffen
ganz zahm, frei laufend
Stück 300 Mark.

Kleine Meerkatzen, ganz zahm,	Stück 70—90 ℳ
Hutaffen, sehr schön . .	Stck. 75 ℳ
Rote Araras, sehr schön .	„ 175 ℳ
Graupapageien	„ 100 ℳ
Gelbnackenamazonen . .	„ 65 ℳ
Doppelgelbkopfamazonen	„ 65 ℳ
Gelbkopfamazonen . . .	„ 48 ℳ
Blaustirnamazonen .	Stck. 45—55 ℳ
Rotkopfamazonen . . .	Stck. 50 ℳ
Bahia-Blaukopfamazonen	„ 65 ℳ
Weißkopfamazonen . .	„ 45 ℳ
Veilchenpapageien, sehr selten	„ 60 ℳ
Rosakakadus	„ 28 ℳ
Große weiße Gelbhauben-Kakadus	„ 50 ℳ
Tarant. Unzertrennliche, gut eingewöhnt . . .	Paar 40 ℳ
Elfenbeinsittiche . . .	„ 40 ℳ
Wellensittiche, grün u. gelb	„ 15 ℳ
Gouldamandinen, schwarzköpfige	„ 50 ℳ
Spitzschwanzamandinen .	„ 45 ℳ
Maskenfinken	„ 45 ℳ
Papstfinken	„ 30 ℳ
Indigofinken	„ 30 ℳ
Zebrafinken	„ 18 ℳ
Jap. Möwchen	„ 15 ℳ
Gilbweber, in Pracht . .	„ 15 ℳ
Tahaweber, in Pracht . .	„ 15 ℳ
Büffelweber, in Pracht .	Stck. 15 ℳ
Dreifarb. Prachtglanzstare	„ 25 ℳ
Langschwanz-Glanzstare .	„ 30 ℳ
Kragen-Schwarzvogel . .	„ 30 ℳ
Rote Kardinäle	„ 30 ℳ
Graue Kardtnäle, mit roter Haube .	Stück 13 ℳ, Paar 25 ℳ
Dominikaner-Kardinäle .	Stck. 10 ℳ
Purpurtangaren, ausgefärbt	Paar 25 ℳ
Glockenvogel, gut schlagend	Stck. 60 ℳ
Mexikanische Eichhörnchen	„ 30 ℳ
Kanarienhähne, gut singend	„ 10 ℳ
dutzendweise bedeutend billiger	
Frettchen, Iltis u. Albino	Stck. 16 ℳ

empfiehlt
Tierhandlung
Max Kleinert
Berlin NO. 18, Strausberger Str. 13
Fernruf Alexander 3313. [74

Für Bienenzüchter.

Dzierzon's rationelle Bienenzucht. Von Pfarrer Dr. Dzierzon. 2. Auflage. Mit vielen Textabbildungen. Kart. 3.— M.

Bienenzucht im Zargenbreitwabenstock. Von Jak. Luers. Mit 25 Abbildungen im Text. Kart. 2.— M.

Leben und Zucht der Honigbiene. Ein gemeinverständliches Lehrbuch über Behandlung der Bienen und über Tätigkeit, Nutzen und Anatomie der Biene von Prof. Dr. O. Krancher. 2. verbesserte Aufl. Mit 1 Tafel, 82 Abbild. u. 7 Kopfleisten. Kart. 3.— M.

Für Hundefreunde.

Gebrauchs- und Luxushunde. Von Emil Ilgner. 2. Auflage mit 87 Abbildungen im Text. Kart. 3.— M.

Der kurzhaarige deutsche Vorstehhund. Von Camillo Morgan. Mit 13 Abb. berühmter kurzhaariger deutscher Vorstehhunde. 2.— M.

Der Dachshund, seine Zucht, Pflege und Erziehung. Von Pelikan v. Plauenwald. 2. völlig neu bearbeitete Auflage von E. v. Otto. Erscheint Mitte 1924.

Der Foxterrier, seine Zucht, Pflege und Erziehung für Jagd und Stube, von Emil Ilgner. 2.50 M.

Zu beziehen durch:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlg., Magdeburg
Postschließfach 148.

In der Zeit vom
2. Oktober bis 28. Februar
ist der An- und Verkauf wie das Feilbieten von in Europa **einheimischen Vögeln — mit Ausnahme der Meisen, Kleiber, Baumläufer und Spechte** — zulässig, es können daher in dieser Zeit derartige Inserate in der „Gefiederten Welt" zum Abdruck gelangen! Der Insertionspreis für die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum beträgt 0.20 Gm. Aufträge erbeten an
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg
Postschließfach 148

Beschwerden wegen Nichtzustellung der „Gefiederten Welt" sind beim zuständigen Postamt anzubringen.

Inserate
für das am 2. Okt. 1924 zur Ausgabe gelangende Heft 33 der Gefiederten Welt erbitten bis 27. Sept. 1924 frühzeitig

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Berlin-Hermsdorf; für den Anzeigenteil: Rolf Kretschmann, Magdeburg, Postschließfach 148.
Verlag der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck: August Hopfer, Burg Bz. Magdbg.

Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Jahrg. 53 | Den 2. Oktober 1924 | Heft 33

(Druckort: Burg, Bezirk Magdeburg.)

Heidelerche und Baumpieper, zwei Kinder der Heide.

Von Rob. Thiele, Altona a. d. Elbe.

(Nachdruck verboten.)

In drückender Julihitze liegt die sonnige Heide. Alles sucht Schutz vor den sengenden mittäglichen Sonnenstrahlen im kühlenden Schatten. Die Vögel halten Mittagsrast und alles schweigt in der Heide bis zum Sonnenuntergang.

Das ist ein köstliches Bild, wenn die Sonne Abschied nimmt vom Tag und mit ihrem goldenen Schein das Heideland überflutet. Dann hören wir plötzlich aus der Luft den Gesang eines Vögleins, und es ist eine so liebliche Weise. Es ist ja immer wieder dasselbe, was der kleine Sänger bringt, und doch kann man immer wieder lauschen. So ergreifend ist das Lied, daß es einem ganz beklommen ums Herz wird. Wie fernes Glockengeläute klingt es und ist doch so nah. Wir stehen mitten in der Heide. Welch Vogelfreund würde nicht mit mir fühlen! Fern von der Großstadt vergessen wir die Sorgen, die unser Volk schon zehn Jahre erträgt. Da ist es die kleine Sängerin, die uns alles vergessen läßt und uns mit Ihrer zarten Engelsstimme ein bezauberndes Lied vorträgt. Es ist ein süßer Genuß, ihr zuzuhören. Wer das Glück hat, ihr kleines Liedchen in der Natur zu hören, dem kann gar nichts Besseres beschert werden. Noch bezaubernder ist ihr Gesang, wenn das Mondlicht die Heide überflutet. Dann geht uns das Lied der Heidelerche so zu Herzen, daß man ganz in Gedanken versinkt. Denn die Mitternachtsstunde ist ihr die beste, von gestern und heute. Wer im Juli die Heide durchwandert, wird sie immer antreffen. Dann ist auch schon die erste Brut selbständig, und die Jungen lernen dann das Lied vervollkommnen nach dem, was ihnen von den älteren Vögeln vorgesungen wird, schon, wenn sie noch in ihrer kleinen Scholle hocken. Sie bleiben bei ihren Eltern bis zum Wegzug, auch die zweite Brut bleibt treu zusammen. Wenn im Frühling der März gutes Wetter bringt und die Heidelerche frühzeitig nisten kann, gibt es auch wohl drei Bruten, und die Jungen aller Bruten bleiben zusammen bei den Eltern und treten Ende September die Reise ins Winterquatier an.

Ich habe es so manches Mal beobachtet in der Kißner Heide, wenn so eine kleine Gesellschaft die Heide überflog und dabei ihren lieblichen Gesang wie zum Abschied hören ließ. Dann ist es still geworden in der Heide, der Oktoberwind braust über sie. Weht aber Ende Februar schon etwas gelinde Frühlingsluft, dann kehrt sie zurück und stellt sich bald wieder im Brutgebiet ein. Dann hört man ihre liebliche Stimme wieder. Sie hält ja auch treu an ihrer engeren Heimat, ihrem Brutgebiet fest, und kein Nebenbuhler darf sich in diesem Revier blicken lassen.

Gegenüber der Heidefläche am Waldrand sitzt ein kleiner grauer Vogel in „stolzer" Haltung auf der Spitze einer Kiefer, dabei dreht er das Köpfchen nach rechts und nach links. Plötzlich steigt er in die Luft, fällt in schräger Richtung zur Erde nieder und läßt dabei aus voller Brust seinen schönen Gesang hören. Die letzte Weise seines Liedes ist der unseres Kanarienvogels ähnlich, darum wird unser Vogel, der Baumpieper, auch Waldkanarienvogel genannt. Er ist ein treuer Kamerad unserer kleinen Heidelerche. Was wäre die Heide, wenn die zwei kleinen Vögel sie nicht bewohnten und sie nicht durch ihren Gesang belebten. Auch der Gesang der Baumpieper hat so etwas Anziehendes und Anheimelndes. Sein Gesang läßt sich am feurigsten frühmorgens und gegen Abend hören, am fleißigsten, wenn das Weibchen auf den Eiern sitzt und brütet. Fast hat es den Anschein, daß sie mit den kleinen Augen nach der Kiefer hinschaut, wo das Männchen in aufrechter Haltung sitzt, und ihr von neuem sein Liedchen vorsingt. Sind nachher die Jungen erst da, da gibt es Sorgen für das Elternpaar. Da gibt es viele Feinde, die den jungen Vögeln nachstellen. Wenn diese aber erst einigermaßen selbständig geworden sind, dann folgen sie den Eltern nach in die Kieferschonung und dann wieder in die Heide. So treiben sie es Tag für Tag. Naht aber der August seinem Ende, dann rüsten sie sich zur Abreise und verschwinden, wie sie gekommen sind. Wenn aber schon lange im Frühjahr ihre getreue Nachbarin, die Heidelerche uns mit ihrem schönen Gesange beglückt, kommt Ende März der Baumpieper aus der Winterherberge im Brutgebiet an, und gleich hört man neben dem Lied der Heidelerche das des Baumpiepers, zweier echter Kinder der Heide.

Über Eingewöhnung und Haltung der Heidelerche (s. Abb. S. 262) und des Baumpiepers (s. Abb. S. 263) ist schon viel geschrieben worden. Ich will trotzdem mitteilen, wie ich diese beiden Vögel behandele, weil mein Verfahren gute Erfolge zeitigt, ohne damit sagen zu wollen, daß nicht auch andere Wege zu denselben Erfolgen führten.

Den Heidelerchenfrischfang, der Fang geschieht im Frühjahr vor der Paarung, halte ich etwa 14 Tage im verhängten Käfig damit der Vogel das Gefieder nicht so arg zerstößt. Da es noch keine frischen Ameisenpuppen gibt, so reiche ich beste trockene Ameisenpuppen in gequollenem Zustande und ein sehr gutes Insektenfresserfutter, daneben Sämereien von bester Beschaffenheit. Zwölf bis fünfzehn Mehlwürmer werden täglich gereicht.

Sobald es frische Ameisenpuppen gibt, reiche ich nur diese. Der Erfolg ist bei anscheinend bestem Wohlbefinden fleißiger Gesang und guter Verlauf der Mauser. Auf letzteres ist ja immer, aber bei Heidelerchen ganz besonders im ersten Jahr der Käfigung sorgfältig zu achten. Hat die Heidelerche im ersten Jahr nicht gut vermausert, so ist sie ein Todeskandidat. Das trifft übrigens für alle unsere Lerchen zu.

Ich halte die Heidelerche in einem großen Lerchenkäfig. Je größer dieser ist, desto besser. Der Käfig steht an einem ruhigen sonnigen Platz. Auch das ist wichtig für ihre Gesunderhaltung und für die Erhaltung des Gesangseifers. Ferner ist sorgfältig auf die Gesunderhaltung der Füße zu achten und das Ungeziefer, von dem die meisten Erdvögel reichlich heimgesucht werden, energisch zu bekämpfen. Ersteres erreicht man durch sorgfältige Sauberhaltung des Käfigs, besonders des Bodenbelages. Ich bringe in den Lerchenkäfig eine etwa 5 cm hohe Schicht besten Flußsandes. Der Vogel kann in diesem Käfig herumwaten und bequem die das Gefieder reinigenden Sandbäder nehmen.

Mit dem frischgefangenen Baumpieper verfahre ich in derselben Weise wie mit der Heidelerche. Nur gebe ich ihm einen höheren Käfig, damit er seiner Gewohnheit gemäß auffliegen kann, wenn er sein Lied vorträgt. Die Mauser geht bei ihm ohne Schwierigkeiten vonstatten.

Noch ein paar Worte über den Gesang meiner Heidelerche in der Gefangenschaft. Ich gelangte im Frühjahr in den Besitz einer Heidelerche, die mir wie keine vorher ans Herz gewachsen ist, aber mir nicht allein, sondern der ganzen Nachbarschaft. Alles ist entzückt über den lieblichen Gesang des kleinen Vogels, dessen Käfig auf der Fensterbank steht. Wenn er seine herrlichen glockenreinen Töne hören läßt, bleibt so mancher der Vorübergehenden stehen, um den kleinen Sänger zu suchen. Wenn der Mond sein bleiches Licht über die Stadt ergießt, singt die Heidelerche mit unglaublichem Eifer, am stärksten in der Zeit von 12—1 Uhr. Wir können dann meist nicht schlafen und lauschen dem wunderbaren Lied, bis uns doch die Müdigkeit übermannt.

Neueinführungen und Seltenheiten.

Von Karl Neunzig.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Unter den durch den Zoologischen Garten in Berlin eingeführten Vögeln Nordostafrikas überwiegen die Stare, Körnerfresser und Papageien. Nicht so zahlreich sind ausgesprochene Frucht- und Insektenfresser vertreten. Aber auch bei diesen fehlt es nicht an interessanten Vertretern, welche das erstemal nach Europa gelangten.

Die Gattung Droßlinge oder Lärmdrosseln — Crateropus *Sw.*, welcher die

Somalilärmdrossel — Crateropus leucopygius smithi *Sharpe*

angehört, umfaßt einige 30 Arten drosselartiger Vögel, von denen sieben in Indien, die anderen in Afrika leben. Der Schnabel der Lärmdrosseln ist etwas stärker gebogen als der der eigentlichen Drosseln und hat schlitzförmige Nasenlöcher, die ziemlich stumpfen Flügel sind etwa gleich lang mit dem stark gerundeten oder stufigen Schwanz.

Die Lärmdrosseln verdienen ihren Namen mit Recht. Eine charakteristische Beschreibung ihres Wesens gibt Emin-Pascha in seinem Tagebuch mit folgenden Worten: „Es sind äußerst unruhige, rastlose Gesellen, die flatternd und hüpfend die niederen Gebüsche und Bäume abstreifen und dabei unaufhörlich schwätzen und plärren, denn die ganze Gesellschaft schreit wirr durcheinander, und jeder sucht den anderen zu überbieten. So entsteht ein förmlicher Töneunfug, von dem man manchmal nicht recht weiß, ob man ihn belachen oder sich ärgern soll . . .“ und auch Heuglin (Ornithol. NO.-Afrikas) wirkt das wirre Geschrei der Lärmdrosseln namentlich in den Morgen- und Abendstunden oft betäubend, namentlich wenn noch andere stimmbegabte afrikanische Vögel sich an dem Lärm mit ihren Rufen beteiligen. Aber zur Brutzeit wissen die Lärmdrosseln auch zartere Töne anzuschlagen. So hörte Emin in dieser Zeit „einen recht ansprechenden Sang“ von den paarungslustigen Männchen.

Die Somalilärmdrossel ist eine Bewohnerin der Berge in Höhen von über 1700 m. Hier treibt sie sich in Flugen von 10—20 Vögeln in der geschilderten lärmenden Art im niederen Gebüsch, besonders gern im Dorngebüsch nahe den Regenstrombetten, umher, geschickt im dichten Gebüsch kletternd, hüpfend und fliegend. Ungern geht ihr Flug über größere freie Strecken. Ihre stumpfen Flügel deuten darauf hin, daß sie keine geschickten Flieger sind. Und wenn sie dann einmal gezwungen sind, das schützende Gebüsch zu verlassen, so fliegt nicht etwa die ganze Gesellschaft mit einem Male auf, sondern sie folgen einander einzeln in gewissen Abständen. Wiederholt sind sie auch auf dem Erdboden beobachtet worden, wo sie nach Art der Drosseln im dürren Laube scharren und rascheln. Die Nahrung besteht in allerlei Insekten und Würmern, Früchte und Beeren werden nicht verschmäht und ab und zu werden auch Blattknospen verzehrt.

Über das Brutgeschäft der Lärmdrosseln ist wenig berichtet. Soweit über einige Arten Mitteilungen vorliegen, steht das tief napfförmige Nest niedrig

im Gebüsch etwa in Mannshöhe und ist entsprechend der Vegetation des Aufenthaltsortes der Art aus verschiedenen Stoffen erbaut. Das Gelege mancher Arten besteht aus 3—4 blaugrünen Eiern.

Gefiederbeschreibung: Oberkopf, Nackenfedern schwarzbraun, jede Feder grau oder weißlichgrau gesäumt, so daß eine schuppenartige Zeichnung entsteht; Kopfseiten, Kinn weißlich silbergrau; Rücken braun; Bürzel weiß; Vorderhals, Brustfedern braun bis schwarzgrau mit weißgrauen Säumen, so daß eine schuppenartige Zeichnung entsteht; Bauch fahlbräunlich; Unterschwanzdecken weiß oder bräunlichweiß; Flügel, Schwanz braun wie Rücken; Unterflügeldecken fahl rostbräunlich; Auge rot, Schnabel schwarz; Füße bleigrau; Lg. 220—260, Fl. 105—115, Schw. 105 bis 115; Schn. 20—23, Lf. 33—35 mm.

Das Verbreitungsgebiet dieser Form erstreckt sich von Harar bis zum Aruffi-Gallaland.

Von kleineren Fruchtfressern sind zwei Arten von Mausvögeln eingeführt, der Blaunacken-Mausvogel — Colius macrourus und

Somali-Lärmdrossel.

Hilgerts Mausvogel — Colius leucotis hilgerti *Neum.*, letzterer eine Neueinführung, während die andere Art bereits in früheren Jahren im Vogelhause des Zoolog. Gartens vorhanden war.

Die Stellung der Mausvögel im System der Vögel ist umstritten. Reichenow stellt sie wie auch andere zu den Klettervögeln. Er sagt darüber („Die Vögel", Bd. 1): „Die Mausvögel bilden ihrer Körperform nach eine im System ganz vereinzelt dastehende Gruppe, und wenn sie hier ihrer Fußform nach den Klettervögeln eingeordnet werden, geschieht das nur, weil die Einordnung in eine andere Ordnung noch unzweckmäßiger erscheint." Sie wurden auch schon in die Nähe der Eisvögel, selbst der Nashornvögel gestellt, der ähnliche Bau des Schädels mit dem der Finkenvögel veranlaßte ihre Einordnung in diese Gruppe, und weil sie die vier Zehen des Fußes auch nach vorn richten können, brachte man sie in die Nähe der Schwalben. Man hatte dabei die große Beweglichkeit der Außen- und Hinterzehe außer acht gelassen, die sowohl nach vorn wie nach hinten gewendet werden können.

Das Körpergefieder der etwa finkengroßen Mausvögel ist weichstrahlig. Auf dem Kopf tragen sie eine aus zerschlissenen Federn bestehende aufrichtbare Haube. Der lange aus zehn, bei einigen auch nur aus acht Federn bestehende Schwanz hat mindestens die doppelte Körperlänge. Er ist stufig und die Schäfte der schmalen Schwanzfedern sind mit Ausnahme des äußeren Federpaares starr. Der finkenartige, kegelförmige Schnabel ist leicht gebogen.

In kleinen Flügen von 6—12 Vögeln durchstreifen sie ihr Aufenthaltsgebiet, das neben zahlreichen Fruchtbäumen besonders viel mit Schlingpflanzen durchwuchertes dichtes Dorngebüsch aufweist. Dorngebüsch, so dicht und mit den schärfsten Dornen besetzt, so daß das menschliche Auge kaum eindringen kann, bietet ihnen Unterschlupf und Schutz. Sie durchschlüpfen es gewandt. Im Gebüsch klettern sie umher wie unsere Meisen, und man sieht sie dabei in allen möglichen Stellungen, die wir von unseren Meisen kennen. Beim Anhängen an dicke Zweige wird häufig die Rückseite des Laufes angelegt, ähnlich wie die Sohle eines Fußes. Sie bevorzugen zusammenhängende Dickungen, in denen sie sich längere Zeit aufhalten können. Denn sie lieben es nicht, weit umherzustreichen, und wenn sie eine solche Dickung verlassen, so geschieht das in der Weise, daß einer nach dem andern herausschlüpft und in kurzem schnellen Flug einem anderen Gebüsch oder einem Fruchtbaum zustrebt. Lavaillant vergleicht dieses plötzliche schnelle Herausfliegen mit der Schnelligkeit eines vom Bogen abgesandten Pfeiles. Man sieht sie auch auf dicht belaubten hohen Bäumen, aber den Erdboden scheinen sie meist zu meiden. Es wäre falsch, anzunehmen, daß der Mausvogel

nur ein ganz verstecktes Leben führt. Graf Zedlitz (J. f. O. 1910) berichtet: „Gern klettert unser Vogel auch auf den äußersten Zweigen frei herum, nimmt auch wohl auf der höchsten Spitze eines Strauches für längere Zeit Platz." Von dem „weißwangigen Mausvogel" (C. st. leucotis) teilt Heuglin mit, daß er „gern altes Mauerwerk und Schutthaufen, wo ihre Hauptnahrung, die Schebtipflanze wächst", aufsuchen. Sonst verzehren sie alles, was an Früchten vorkommt, besonders die Früchte der Sykomoren, des Christusdorns, der Kapernsträucher u. a. Besonders gern fallen sie zur Fruchtreife in die Gärten ein, um sich an den reifen Früchten, vor allem den reifen Feigen, gütlich zu tun. „Zur Zeit der Feigenreife sind Gesicht und Hals oft ganz mit verdicktem Saft dieser Früchte überzogen" (Heuglin). Mit dem Schnabel ergriffene größere Bissen verzehren sie nach Art der Papageien, indem sie diese mit einem Fuß ergreifen und dann mit dem Schnabel zerkleinern. Wenn Reisende berichten, daß sie im Magen erlegter Mausvögel Samen gefunden hätten, so rühren diese vermutlich von Beeren oder dergleichen her, die sie verzehrt haben.

Ihre Stimme ist ein leises Pfeifen, das an die pfeifenden Töne mancher Regenpfeifer erinnert. „Das Geschrei, das besonders im Fliegen hörbar wird, ist schrill und nicht angenehm, besonders wenn, wie üblich, alle zusammen schreien" (Emin). Graf Zedlitz bezeichnet die Stimme, die man selten hört, als einen feinen, aber weithin vernehmbaren Pfiff, der meist im Fluge, zumeist aber auch im Sitzen ausgestoßen wird.

Auch während der Brutzeit bleibt der Geselligkeitstrieb der Mausvögel bestehen. Denn auch in dieser Zeit sind kleine Flüge anzutreffen, die sehr eng zusammenhalten. Diese Flüge bestehen dann nur aus Männchen, welche, während die Weibchen brüten, zusammen umherstreichen. Die Nester sind napfförmig, ziemlich klein und lose gebaut, sie stehen verschieden hoch. Man hat sie etwa 50 cm über dem Erdboden in Gebüsch gefunden bis etwa 4 m hoch im Gebüsch, auf Sträuchern, kleinen Bäumen, Weinranken u. dgl. Von den einzelnen Arten werden verschiedene Baustoffe verwendet. So fand man Nester aus 10—15 cm langen Rindenstücken, Pflanzenwolle und dünnen Zweigen, im Innern mit frischem Gras und Blättern gerundet, andere verwenden nur Blätter und trockene Halme oder Moos, Stengel und Pflanzenwolle und dergleichen mehr. Das Gelege scheint aus 3—6 Eiern von weißer Farbe zu bestehen.

Gefiederbeschreibung: Oberseits dunkel graubraun, Nacken und kleiner Teil des Oberrückens fein matt quergebändert; Vorderhals auf dunkelgrauem Grunde, tief herab dunkler quergebändert; Bauch und Schenkel bräunlichgelb; Flügel, Schwanz wie Oberseite; seitliche Schwanzfedern mit schmalem, gelblichem Rand; Auge rot; Schnabel schwarz, Unterschnabel weißlich grau; Füße rot; Fl. 93—99 mm.

(Fortsetzung folgt.)



Dr. Lahmanns Nährsalzextrakt.

Von Ing. Sperling, „Ornis"-Haus, Halle a. d. S.

(Nachdruck verboten.)

Jeder Vogel hat das Bedürfnis seinem Körper vegetabilische (d. h. Pflanzenstoffe) zuzuführen. Die meisten Körnerfresser nehmen sehr gern grüne Blätter vom Salat, Vogelmiere, Hungerkraut usw. zu sich, andere dagegen, wie Weichfresser, aber auch Körnerfresser, führen durch Raupen und andere Larven der Insekten ihrem Körper diese so nötigen Stoffe zu.

In der Gefangenschaft gehaltene Vögel müssen deshalb künstlich erzeugte Nährsalze zu ihrem Futter erhalten. An der Spitze derartiger Präparate steht noch immer das bekannte und doch noch viel zu wenig angewandte vegetabilische Nährsalz, angefertigt nach den Angaben unseres bekannten Hygienikers Dr. Lahmann. Dieses Nährsalz wird dadurch hergestellt, daß Gemüsepflanzen verschiedener Art gekocht nur so lange eingedickt werden, bis nur noch die Nährsalze übrig bleiben, das enthaltene Wasser also vollständig verdampft ist.

Dieser Extrakt läßt sich leicht wieder im Wasser auflösen und kann nun dem Mischfutter, beim Anfeuchten desselben, zugesetzt werden; hierauf möchte ich ganz besonders hinweisen.

Nach der Gebrauchsanweisung soll pro Kopf so iel wie eine Erbse aufgelöst und dem Futter zu=esetzt werden, bei Kanarienvögeln dem Zwiebackmehl ährend der Aufzucht.

Dieses Verfahren ist etwas umständlich, da jedes=al der Extrakt in der bestimmten kleinen Menge ufgelöst werden muß.

Man verwende deshalb den Extrakt am besten , daß eine größere Menge in heißem Wasser auf=löst und dann auf kleinere Flaschen gefüllt wird. achdem vorher etwas Speiseöl den Abschluß im laschenhals bildet, wird der Kork eingeschlagen; so bereitet und kühl aufbewahrt hält sich die Flüssigkeit nge Zeit und ist immer zur Hand, wenn Weichfutter ngesetzt wird. Sehr zu empfehlen ist es, die Weich=tter (Reform — Normal) mit Weißwurm (ge=

jeder Vogelpfleger dafür sorgen, daß seinen Stuben=genossen alle die Stoffe gereicht werden, die zu ihrem Wohlbefinden beitragen und hierzu gehört unbedingt „Dr. Lahmanns Nährsalzextrakt."

Ornithologische Beobachtungen aus Südhannover (Göttingen und Münden).

Von B. Quantz.

(Schluß.) (Nachdruck verboten.)

Auf einem Spaziergang am Morgen des 19. April — klares, sehr warmes Wetter — ins „Ebertal", einer vorzugsweise mit Erlen, hier und da mit Kirschbäumen bestandenen Schlucht am östlichen Hainberg, traf ich in vollem Gesang an: zahlreiche Rotkehlchen, mehrere Fitislaubvögel neben Weidenlaubvögeln, als neue Vogelart aber mehrere

Hilgerts Mausvogel (s. S. 259).

ocknete Eintagsfliege), der vorher mit warmem Extrakt=asser erweicht ist, anzufeuchten, da häufig der Weißwurm cht genommen wird, weil er dem Vogel zu hart ist.

Die Analyse besagt, daß Dr. Lahmanns Nähr=z 12 % Minerale, 9 % Eiweiß, 20 % Kohle=drate und 21 % Fette enthält (siehe Ornis=Futter=ttel=Tabelle). Der Nährsalzextrakt wird in kleinen echdosen geliefert, nur ist die Dose vor dem Öffnen f eine warme Platte, mit dem Deckel nach oben, stellen, damit sich der ganze Inhalt in dem Unter=l ansammelt.

Zum Schluß möchte ich nicht unerwähnt lassen, ß fast alle Vögel gern Milch zu sich nehmen, und ar eignen sich zur Verabreichung dieser am besten die enannten Einstecknäpfe, die einen kleinen Inhalt haben d durch die Stäbe geschoben werden können; auch der ilch wird Dr. Lahmanns Nährsalzextrakt zugesetzt.

Mit wenigen Ausnahmen ziehen fast sämtliche rnerfresser, selbst der Sperling macht keine Aus=hme, ihre Jungen mit nährsalzhaltigem Eiweiß f, in diesem Falle die Raupen; darum muß ein

Baumpieper, welche in einem Fall wenig Scheu vor dem Beobachter bewiesen. Ein Vogel ließ sich nämlich in großer Nähe von mir auf dem Boden nieder, um Halme aufzunehmen und wieder fortzuwerfen, wobei zwischendurch ein Insekt ver=speist wurde, bis er eines anderen Baumpiepers ansichtig wurde, der ebenfalls den Boden beging, und diesen mit einem dreisten Angriff vertrieb. Die Weidenlaubvögel jagten sich in einer Gruppe blühender Kirschbäume, lockende Töne dabei vernehmen lassend. Im übrigen war dieses Gelände belebt von Goldammern, Schwarz=drosseln, Buchfinken und Meisen. In den Erlen wiegten sich mehrere zwitschernde Zeisige, welche sich ebenso wie ein Schwarm zierlicher Stieglitze an den hervorbrechenden Blattknospen der Erlenbäume zu schaffen machten.

In einer hart an einen Weißdornbusch gelehnten halbwüchsigen Fichte fand ich ein vorjähriges, aus Moos mit einer schwachen Reisigunterlage bestehendes Nest, welches neben Kotansammlungen ein stattliches Häuflein Fruchtkerne des sogen. „Möllerbrotes" trug. Vielleicht hat ein Rotkehlchen mit Vorliebe hier auf diesem weichen und geschützten Ruheplätzchen die herbstliche Frucht verzehrt (?), oder sollten es Mäuse gewesen sein?

Der Morgen des 21. April führte mich in die Kiesgruben-Region des Leinetales. An diesen und den folgenden Tagen herrschte ein außergewöhnlich hoher Barometerstand (771 - 772 mm, am 20. April nur 755—757 mm), der Wind war südöstlich, klar die Luft. Eine Gebirgsbachstelze vollendete

Heidelerche (s. S. 257).

ihr Nest an der hölzernen Brücke, ein Bachstelzenpaar gewährte den spaßhaften Anblick einer Balzszene am Feldwege nahe beim Beobachter. Ein Buchfinkweibchen liest Härchen vom Boden auf und trägt sie in Begleitung des Männchens zum Nestbaum. Kreischende Stare machen mich auf einen Steinkauz aufmerksam, der hoch oben in einer einsamen Pappelgruppe still der Ruhe pflegt und neugierig auf den ebenso neugierigen Beobachter herabschaut, bis er es für rätlich findet, einen Ast höher zu fliegen, da ihm das kaum entwickelte Laub noch keine Deckung gewährt.

Im Weidicht einer alten Kiesgrube fesselt längere Zeit ein eigenartiger Gesang meine Aufmerksamkeit; der Sänger kommt schließlich zum Vorschein, hält singend Umschau auf einem Weidenzweige und sucht alsbald in hurtigem Fluge einen anderen hervorragenden Sitzplatz auf, auf dem er, mitunter seinen Schwanz hochstelzend und eine allzu dreiste Fliege verschlingend, eifrig im Gesang fortfährt. Es ist ein weißsterniges Blaukehlchen, welches hier wohl nur vorübergehend Rast macht.

Auf dem seichten, mit Schlamm und allerlei Pflanzen bedeckten Gewässer der Kiesgrube entdecke ich ferner ein Paar Knäkenten, welches sich an die in nächster Nähe auf dem Felde arbeitenden Menschen gewöhnt zu haben scheint und auch mich nahe herankommen läßt, um im letzten Augenblick aufzufliegen, bald aber sich wieder einzufinden. Anfang Mai habe ich sie nicht mehr angetroffen; auf dem Seeburger See werden sie besser dem Brutgeschäft obliegen können als auf dieser kleinen Fläche.

Ich nehme hier Veranlassung, auf vermehrten Entenschutz hinzuweisen, für den auch schon Altmeister Liebe im Jahre 1877 eingetreten ist. Es wäre immerhin schon ein kleiner Erfolg, wenn erwirkt werden könnte, daß nicht, wie es alljährlich am Seeburger See in Südhannover und auch sonst wohl geschieht, das ganze Schilf im Herbst abgemäht würde, um von den Bauern usw. als Stallstreu verwendet zu werden. Sodann aber wäre es dringend vonnöten, den zwar altberühmten, aber für den Wildentenbestand außerordentlich gefährlichen „Celler Entenfang" vermittels Garn und Lockente zu untersagen, weil bei diesem wenig weidmännischen Massenfangsystem (grausam scheint es auch zu sein, den Tieren wird der Reihe nach der Hals umgedreht) der Bestand alljährlich zu arg mitgenommen wird. Für den „Bund für Vogelschutz" in Stuttgart eine dankbare Aufgabe!

Am 22. April — die Vegetation ist erst halb entwickelt — verraten bereits die Zaungrasmücken durch ihren klappernden Schlußgesang ihre Rückkehr aus dem Süden; am 19. April glaube ich sie zuerst einmal gehört zu haben. In blühenden Schleedornbusch draußen im freien Feld (beim Lohberg) macht sie sich an jenem Tage nur durch ihr „Tack" bemerkbar. Die Amsel hat hier ihr Nest erst fertig; offen liegt es den Blicken noch da, weil das Laub des Corndickichts noch nicht genügend heraus ist. Die Eierablage soll hier erst noch beginnen. Drinnen im wärmeren Stadtgebiet konnte dieser Vogel schon Palmarum (9. April) mit dem Brüten beginnen, und Ende April fütterte er bereits seine Jungen mit kleinen Regenwürmern.

Am 23. April vernahm ich in Hann.-Münden (klares, weniger warmes Wetter, Barometerstand ca. 760 mm) den Ruf des Wendehalses und den Schwirrgesang des Girlitzes. Der Weidenlaubvogel machte sich mir durch das Eiltempo seines

Zilp-Zalp-Gesanges auffällig. In Göttingen glaube ch den Wendehals zuerst am 19. April gehört zu haben; zahlreicher war er hier vom 1. Mai ab anutreffen, ebenso der Girlitz.

Am 26. April beobachtete ich bei Göttingen das Blaukehlchen in seinem Revier in der Nähe der Leine zum ersten Male beim Balzfluge; es war im Nachmittag zwischen 4—5 Uhr, und nach langer Trockenperiode hatte endlich einmal wieder Regen Feld und Flur erfrischt. Diese veränderte Witterung hielt mit Sturm aus westlicher Richtung bis zum 30. April an. Von da ab wieder wärmere Temperatur bis zum 4. Mai, wo nördliche Winde bei meist klarem Wetter vorherrschend wurden.

Am 26. April sehe ich wiederum die Paarung zweier Stare. Der Star hat bis Ende des Monats fleißig am Nest gebaut und war am 7. Mai beim Brüten, während die Sumpfmeise an diesem Tage schon Futter zum Neste trägt — es ist das im Lindenbaum auf dem „Walle“ —. Einen Schwarm Stieglitze treffe ich in einer Ahornallee beim Absuchen von Blattläusen von den Blätterknospen an. Bei ähnlicher oder gleicher Tätigkeit beobachte ich 6—8 Zeisige in hohen zierlichen Weidenbäumen beim Feuerteich am 7. Mai morgens.

Am 21. April kam mir außerhalb der Stadt der erste Segler und 2 Rauchschwalben, am 26. April 12 Segler und 2 Schwalben am 28. April etwa 20 Segler zu Gesicht. Am 2. Mai, abends gegen 6 Uhr, waren zum ersten Male 6 Segler von meiner Wohnung aus zu sehen, ihr „Srie-Geschrei“ ertönte auch in den Straßen der Stadt, und am 4. oder 5. Mai durchschneiden sie vollzählig im jagenden Fluge die Lüfte.

Die 2 Paare Rauchschwalben, die im Pferdestall des Fuhrhalters B. in der „Kurzen Straße“ ziemlich im Zentrum der Stadt alljährlich nisten, sollen bereits am 18. April eingetroffen sein. Beim Landwirt H. war dagegen am 25. April erst das erste Paar zurück.

Am 30. April hielten sich 12 Schwalben, darunter 2 Hausschwalben, über der Wiese an der Leine auf. Unter den zahlreichen Rauchschwalben (15 bis 20 Stück), welche ich in derselben Gegend am 6. Mai antraf, befanden sich ebenfalls nur vereinzelte Hausschwalben (etwa 2 Stück).

Am 26. April wurde mir ein Hausrotschwanz gebracht, der im Garten auf dem Rücken liegend gefunden war und sich als schwach und gelähmt herausstellte. Bei mir im Zimmer zeigte er sich wenigstens vom zweiten Tage ab freßlustig, indem er die ihm vorgelegten Mehlwürmer anfangs heimlich, dann auch in meiner Gegenwart verschlang. Am ersten Tage hatte ich ihn gestopft und auch mit etwas Rotwein und Wasser tropfenweise zu erfrischen gesucht. Wenn er längere Zeit ruhig auf weichem Lager im offenen Korbe gelegen hatte, wurde er doch plötzlich von Unruhe befallen und suchte sich, auf dem Vorderkörper sich vorwärtsbewegend, in eine dunkle Ecke des Zimmers zu verkriechen. Am dritten Tage ging er ein; seine Krankheit war Magen- und Darmkatarrh gewesen, welchen er sich bei dem Umschlag der warmen Witterung in kühles Regenwetter, vielleicht durch kühlen Trunk, jedenfalls durch Erkältung zugezogen hatte. Seine zeitweise Unruhe erklärt sich deshalb wohl auch von den heftigen Leibschmerzen, die ihn peinigten.

Am 4. Mai hatte die Goldammer ihr Nest ziemlich fertig, das des Hausrotschwänzchens in einem Schuppen einer Gärtnerei war erst begonnen, während ein anderes in einem einsamen Schuppen an der Leine bereits 5 Eier enthielt.

Die erste Mönchgrasmücke sah und hörte ich im Gesang am 29. April; der Ankunftstermin des ersten Vogels mag jedoch schon auf den 26. oder 27. April zu setzen sein. Anfang Mai ist diese Grasmücke stellenweise sogar häufig anzutreffen, so

Baumpieper
(s. S. 257).

am 7. Mai in den Anlagen beim Feuerteich. Der Buchfink war Ende April noch mit dem inneren Ausbau seines Nestes beschäftigt, zu brüten begann er am 6./7. Mai. — Am 30. April ließ sich ein Schwarm von 10 Grünfinken auf einem Ackerfelde nieder. — Ziemlich frühzeitig ist der rotrückige Würger dieses Jahr eingetroffen: am 2. Mai morgens zeigte sich ein Exemplar an der Peripherie der Stadt. Flüchtig ließ es sich auf hervorragendem Gesträuch nieder, um eifrig seinen Gesang hören zu lassen. Am folgenden Tage konnte ich — vielleicht — denselben Würger an seinem Brutplatze, dem Corndickicht am Hainberg, im vollen Gesang beobachten.

Ein erneut am Morgen des 6. Mai ins Leinegebiet unternommener Ausflug gab mir Gelegenheit, mich nochmals von der Anwesenheit des Blaukehlchens im Weidicht zu überzeugen. Es singt wieder eifrig und steigt wiederholt balzend in die Luft, weshalb die Möglichkeit, daß dieser niedliche Vogel hier seinen Brutplatz hat, nicht von der Hand

zu weisen sein dürfte. Ebensosehr wie diesem gefallen auch dem braunkehligen Wiesenschmätzer („Braunkehlchen"), welchen ich hier zum ersten Male antreffe, die jungen Pappelstämmchen am Rande der alten Kiesgrube als Hochsitz. Auch dieser Vogel ist voll im Gesang. — Ich verlasse diese Gegend und betrete das einsame, von einem stehenden Graben durchzogene, saftige Wiesengelände hinter der Stegemühle. Hier scheuche ich einige Wiesenpieper auf, die nunmehr unstet die Luft durchfliegen unter ständigen „Ist"-Rufen. Auf dem Rückwege achte ich auf das Nest der Gebirgsstelze unter der Holzbrücke und erkenne, daß der Bau vollendet ist, und nun wohl die Eierablage begonnen hat. Bei einer anderen Kiesgrube mit abschüssigen Lehmwänden fliegen einige Uferschwalben umher. — Ich komme näher zur Stadt. Zahlreiche Stare lenken die Aufmerksamkeit auf mich: sie sind eifrig dabei, Maikäfer auf dem Erdboden zu töten und zu verschlingen, welche nicht etwa zufällig unter den Ahornbäumen gelegen hatten, sondern von den Vögeln eigens von den Zweigen geholt werden.

An demselben Morgen entdecke ich bei der Badeanstalt den ersten grauen Fliegenschnäpper, am Morgen des nächsten Tages einen ebensolchen beim Feuerteich. Das Barometer stand in diesen Tagen auf 759/60 mm. Windrichtung nördlich.

Sprechsaal.

(Steht den Abonnenten kostenlos zur Verfügung.)

Auf Frage 14: Milben beseitigt man nach meiner Ansicht am besten mit einem Teil Lysol und zwei Teilen Wasser. Damit sämtliche Käfige gut auspinseln, die Umgegend von den Käfigen gleichfalls. Wenn dieses Mittel angewendet wird, so verschwindet das Ungeziefer. Kleine Käfige gut vorher ausbrühen mit heißem Wasser. So behandelt, werden die Milben in kurzer Zeit verschwinden. Karl Krüger.

Fußkrankheit beim Hänfling. Pflege schon seit über 30 Jahren Hänflinge, Fußkrankheiten kenne ich nicht. Man nehme als Sitzstangen Lindenholz, möglichst junge Schößlinge, so werden keine Fußkrankheiten eintreten. Sitzstangen aus Tannenholz sind meiner Ansicht nach unpraktisch.

K. Krüger.

Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber.

1. Vorsitzender Joh. Birk, Leipzig-Mockau, Beuthstr. 29; Geschäftsstelle: Rud. Petters, Leipzig-Probstheida, Preußenstr. 31; Kassierer Werner Geßler, Leipzig, Dresdner Str. 2; Tauschvermittlung — T.-V. —: Richard Vorwerk, Leipzig-Lößnig, Merveldstraße 39.

An unsere Vereine.

Es naht die Zeit, wo unsere Stubengenossen größtenteils den Wechsel des Federkleides beendet haben und auch die, die für Beschaulichkeit Gelegenheit bietet. Der Sorge des Liebhabers um Einbringung der Futtermittel setzt der Herbst und Winter ein Ziel. Diese ruhige Zeit möchten die Vereine aber nicht im Nichtstun verbringen, sondern sie möchten Zeugnis ablegen von der Vorsorge und Sorge, die seine Liebhaber ihren Pfleglingen angedeihen ließen. Einen Beweis hierüber zu erbringen, wird den Vereinen kaum besser gelingen als durch eine Ausstellung.

In die Öffentlichkeit muß unsere Liebhaberei getragen und Gemeingut der Freunde der Natur werden. Es regt sich bereits vielerorts der freudige Geist in der Liebhaberschaft und sammelt sich zur Unterstützung größerer und kleinerer Ausstellungen. Das ist aber noch nicht genug. Überall, wo ein Verein, ob groß oder klein, vorhanden ist, soll dieses Jahr eine Ausstellung erstehen. Es gilt die Allgemeinheit für unsere Sache zu interessieren und weitere Freunde zu gewinnen.

Wenn nicht aus Eitelkeit, das Beste zu besitzen und zu bieten — diese Art der Eitelkeit ist nicht verwerflich —, so doch zum Zwecke der Aufklärung sollte jeder Verein mancherlei Bedenken fallen lassen und der Öffentlichkeit seinen Schatz zur Schau bieten. Der Erfolg wird nicht ausbleiben.

Hoffentlich fallen diese Worte auf fruchtbaren Boden.

Jeden Verein, der eine Ausstellung veranstalten will und wird, bitten wir um Mitteilung des Tages der Veranstaltung an unsere Geschäftsstelle. Petters, 1. Schriftf.

Vom Vogelmarkt.

Von seltener auf den Vogelmarkt kommenden Vögeln werden angeboten:

Max Kleinert, Berlin NO 18, Strausberger Str. 13 Fernruf Alexander 3313: Rote Araras, Gelbnackenamazonen, Doppelgelbkopfamazonen, Gelbkopfamazonen, Rotkopfamazonen, Bahia-Blaukopfamazonen, Weißkopfamazonen, Veilchenpapageien, Rosakakadus, große weiße Gelbhaubenkakadus, tarant. Unzertrennliche, Elfenbeinsittiche, schwarzk. Gouldamandinen, Spitzschwanzamandinen. Masken-, Papst-, Indigofinken, Gilb-, Taha-, Büffelweber, dreifarbige Prachtglanzstare, Langschwanz-Glanzstare, Kragen-Schwarzvogel, rote Kardinäle, graue Kardinäle, Dominikaner-Kardinäle, Purpurtangaren, Glockenvogel.

Bernd Regge, Lötzen (Ostpr.), A.Z.-Mitgl. 264: Männchen Rotkopfamandine, 1,0 Zeisigkanarie, 1,0 Grünlingkanarie, 1 weißbunte Kanarie.

Paul Tzornack, Berlin, Prenzlauer Allee 189, Tel. Humboldt 2063: Tovisittiche, Wbch. Orangeblaufink, Wbch. Indigofink, Wbch. großer Kubafink, Bronzemännchen, Mchn. mex. Karmingimpel, Spitzschwanzamandinen, Viehweber, dreifarbige Glanzstare, brasil. Glanzstar, Perusittich, Doppelgelbkopfamazone, Gelbnackenamazone, Mchn. Safranfinken.

Herrn W. K., Meuselwitz. Die Verpflegung des Vogels ist ganz richtig. Jetzt zur Samenreife wird es sich empfehlen, ihm auch ab und zu einige Hanf- und Sonnenblumenkerne zu geben. Die Federn sind nicht ausgefallen, sondern abgebrochen. Dagegen läßt sich leider nichts tun.

Herrn A. K., Anklam; Herrn R. H., Perleberg; Herrn J. C. E., Los-Angeles; Herrn Jos. B., Herne; ist brieflich Bescheid zugegangen.

Herrn H. M., Delligsen. Der Kanarienvogel ist an allgemeiner Lebensschwäche eingegangen. Herz, Lunge, Leber, Magen waren sehr klein und schlecht entwickelt. Die Folge war starke Blutarmut und die Unfähigkeit, den Organismus am Leben zu erhalten.

Herrn W. S., Penzig. Die in der Zeitschrift wiedergegebenen Bestimmungen des Vogelschutzgesetzes sind zutreffend. Aber in § 5 Abs. 3 dieses Gesetzes heißt es: Ebenso können die in Abs. 2 bezeichneten Behörden (Landespolizeibehörden) einzelne Ausnahmen von den Bestimmungen in §§ 1 bis 3 dieses Gesetzes zu wissenschaftlichen oder Lehrzwecken, zur Wiederbevölkerung mit einzelnen Vogelarten sowie für Stubenvögel für eine bestimmte Zeit und für bestimmte Örtlichkeiten bewilligen.

Herrn R. T., Altona, Herrn K. K., Eiche b. Potsdam, Herrn A. J., Biberach: Beiträge dankend erhalten.

Herrn H. D., Hamborn. Die insektentötende Wirkung der Quassiarinde könnte wohl zu Verwendung der Quassiarinde im Badewasser der Vögel anregen. Aber die Quassiarinde enthält auch narkotische Gifte, wenn auch nur in geringem Grade. Diese und vielleicht auch andere Bestandteile der Rinde könnten den Vögeln, die ja auch vom Badewasser trinken, gefährlich werden.

(Fortsetzung auf der 2. Umschlagseite.)

ahrgang 53 2. Oktober 1924 Heft 33

DIE GEFIEDERTE WELT.

ZEITSCHRIFT FÜR VOGELLIEBHABER

Begründet von Dr. Karl Ruß

Herausgegeben von Karl Neunzig in Berlin-Hermsdorf

Inhalt:

Heidelerche und Baumpieper, zwei Kinder der Heide. Von Rob. Thiele, Altona a. d. Elbe.

Neueinführungen und Seltenheiten. Von Karl Neunzig. (Fortsetzung.)

Dr. Lahmanns Nährsalzextrakt. Von Ing. Sperling, „Ornis"-Haus, Halle a. d. S.

Ornithologische Beobachtungen aus Südhannover (Göttingen u. Münden). Von B. Quantz. (Schluß.)

Sprechsaal - Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber - Vom Vogelmarkt - Redaktionsbriefkasten - Aus den Verbänden - Aus den Vereinen.

Abonnement monatlich (4 Nummern) 1.50 Gm. — Einzelpreis des Heftes 50 Gpf.
vermittelt das nächste Postamt bzw. der zuständige Briefbote. / Postversand ab Burg Bez. Magdeburg.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung / Magdeburg / Postschließfach 148

Aus den Verbänden.

Verband deutscher Farben-, Gestalt-, Bastardkanarien- und Exotenzüchter e. V. Sitz München. Die Tätigkeit des deutschen Verbandes während des abgelaufenen Quartals in kurzen Strichen niederzulegen, sei der Zweck des heutigen Berichtes. Ein Akt der Notwendigkeit war der Neudruck der in der Generalversammlung vom 11. Juni 1923 geänderten Satzungen, die mit einem kleinen Anhang, der die Zuchtrichtungen kurz spezialisiert, ausgestattet wurden. Diese Satzungen werden schon in Händen der Mitglieder sein und bitten zugleich, für den Verband zu werben und sich der den Statuten beigehefteten Aufnahmeformulare bedienen zu wollen. Eine Kardinalfrage sind auch die schlecht bestellten Kassenverhältnisse und bitten auch hier die verehrlichen Mitglieder, die noch ausstehenden Beiträge umgehend an den Verbandskassierer Herrn Max Pfaller, München, Auenstraße 78 I, einsenden zu wollen. Auch die für den Verband bestellten Bücher „Die Farben- und Gestalts-Kanarien" von unserm Mitgliede A. Aschenbrenner liegen noch hier auf, die ebenfalls noch auf Abnehmer warten, um endlich einmal mit der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung abrechnen zu können. Auch sind bei der Verbandsleitung die von dem Münchener Künstler A. Viegelmann entworfenen Vereinszeichen zum Preise von 1 Mark pro Stück zu beziehen. Die Ausstellungsfrage, die Lebensfrage des Spezialitätenzüchters, ist in Vorbereitung, doch sind bindende Beschlüsse noch nicht gefaßt und sind Verhandlungen im Gange. Einen breiten Rahmen nahm die Korrespondenz mit dem Augsburger Verein für Vogelzucht und -schutz ein, der Anschlußbeziehungen anstrebt, und die Verhandlungen von Vorstandschaft zu Vorstandschaft gepflogen wurden. Die diesbezügliche Korrespondenz fand durch den Besuch des Augsburger Vorsitzenden Herrn Hans Schweiger ihren Abschluß und führt der Verein fortab den Namen „Verband deutscher Farben-, Gestalt-, Bastardkanarien- und Exotenzüchter e. V. Sitz München — Ortsgruppe Augsburg —." Ein Propagandabesuch unsererseits soll die Mitglieder einander näher bringen und hoffen wir, daß der Münchener Gestaltsfarben-Kanarienvogel auch in Augsburg Eingang findet. Es wird unser Bestreben sein, das junge Unternehmen so viel wie möglich zu unterstützen und erwarten wir von drüben auch Verständnis für unsere Zuchtrichtungen. Der geplante Besuch fand am 3. August statt und hatten sich eine Anzahl Herren zu demselben bereitgefunden. Ein Bericht wird in der „Gef. Welt" folgen. Ein von Herrn Prof. Dr. Leißner gehaltener Vortrag „Mendel und seine Lehre" fand ungeteilten Beifall und die anschließende Diskussion zeigte das große Interesse, das derartige Vorträge auslösen. Leider sind die Sommermonate für Vorträge nicht geeignet, da der Besuch zu wünschen übrig läßt. Wir hoffen aber, derartige Vorträge im Winterhalbjahr fortsetzen zu können und bitten dabei um rege Beteiligung. Herrn Prof. Dr. Leißner sei für seine interessanten Ausführungen auch von hier aus der beste Dank der Verbandsleitung ausgesprochen. Betreffend Ausstellungen wurde angeregt, im Vereinsblatt „Gef. Welt" zu veröffentlichen, daß alle Ausstellungen durch uns beschickt werden, falls die Grundlagen hierzu gegeben sind. Anträge sind an den 1. Vorsitzenden Leopold Keibel, München, Schraudolfstraße 44 III r., zu richten.

Leopold Keibel, 1. Vorsitzender.

Verband deutscher Farben-, Gestalt-, Bastardkanarien- und Exotenzüchter und des Bayerischen Vogelliebhabervereins (e. V.) Sitz München, Ortsgruppe Augsburg. Jeden Samstag gemütliche Zusammenkunft beim Vogelwirt Joseph Leininger, Gasthof, Frohnhof—Peutingerstr. Jeden 1. Samstag im Monat Monatsversammlung ebendort. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. Als amtliches Vereinsorgan ist die „Gef. Welt" anerkannt worden.

J. A.: Hans Schwaiger, 1. Vorsitzender,
Augsburg, Schöpplerstr. 9/II.

Aus den Vereinen.

Angemeldet ist Herr Otto Böneker, Hannover, Rambergstr. 36/A/II.

A. Krabbe.

„Aegintha", Verein der Vogelfreunde zu Berlin. Unsere Sitzungen finden an jedem 1. und 3. Donnerstag im Monat, abends 8 Uhr, im Vortragssaal des Aquariums statt. Fast in jeder Sitzung belehrende Vorträge und Besprechungen unter gütiger Mitwirkung unseres verehrten Ehrenmitgliedes Herrn Dr. Heinroth. Gäste gern willkommen. — Sitzung am Donnerstag, den 2. Oktober 1924, abends 8 Uhr, im Aquarium. Vortrag unseres Mitgliedes Rudolf Hermann. Wer die Vorträge unseres Freundes Hermann von früher, als er noch nicht unser Mitglied war, kennt, weiß, daß uns ein genußreicher Abend bevorsteht. Der Vorstand. J. A.: O. Vorbrodt, 1. Schriftführer, O 112, Scharnweberstr. 18.

Vereinigung der Liebhaber einheimischer Vögel zu Berlin. Sitzung jeden 2. Donnerstag nach dem 1. und 15. des Monats im Vereinslokal zum „Alexandriner", Alexandrinenstraße 37a. Gäste stets willkommen.

J. A.: P. Böhme, Schriftführer,
Berlin O 17, Rüdersdorfer Str. 69.

Verein Vogelschutz und -pflege zu Dresden. Versammlung jeden Donnerstag, abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Schillers Restaurant", Ecke Stifts- und Ehrlichstraße. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen.

Bernhard Kühn, Vorsitzender.

Alte Vereinigung der Vogelliebhaber zu Dresden. Versammlung jeden Freitag, abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Blasewitzer Hof". Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. J. A.: Matth. Meys, Schriftführer.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei zu Hamburg. Sitzungen finden statt jeden 1. und 3. Dienstag im Monat in Hüttmanns Hotel, Poolstr. 22, abends 8¼ Uhr. Nächste Sitzung Dienstag, den 7. Oktober 1924. Gäste sowie auch Exotenliebhaber stets willkommen.

J. A.: Arnold Weber, 1. Vorsitzender.

Verein von Vogelfreunden Karlsruhe. Gegr. 1888. Monatsversammlung jeden 1. Donnerstag im Monat. Vorstandssitzung jeden 1. Donnerstag nach dem 15. im Vereinslokal „Goldener Adler".

Verein der Vogelliebhaber Königsberg (Pr.). Sitzung an jedem Freitag nach dem 1. und 15. des Monats, abends 8 Uhr im Vereinslokal „Kaiser-Kaffee", Kaiserstraße, Ecke Schnürlingsstraße. Gäste sind willkommen.

J. A.: Ernst Reinholdt, 1. Vorsitzender.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig. Vereinssitzungen jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat im Vereinslokal „Bauers Brauereirestaurant", Täubchenweg. Nächste Sitzungen Donnerstag, den 2. Oktober und Donnerstag, den 16. Oktober. Gäste stets willkommen. J. A.: Johann Birk, 1. Vorsitzender.

Verein der Vogelfreunde Leipzig-Plagwitz. Vereinslokal: „Gosenschlößchen", Leipzig-Plagwitz. Sitzungen an jedem 1. und 3. Montag des Monats, abends 8 Uhr. Vogelfreunde sind stets willkommen.
J. A.: Karl Scholtissek, 1. Vorsitzender, Leipzig-Plagwitz, Lauchstädter Straße 30.

Verein der Vogelliebhaber zu Mannheim. Versammlungen finden alle 14 Tage Samstag abend 8 Uhr im Vereinslokal „Restauration z. gold. Falken" statt. S. 1. 17. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen.

Johann Daubmann, 2. Schriftführer.

Bayrischer Vogelliebhaberverein, Sitz München (E.V.). Jeden Samstag gesellige Zusammenkunft im Pschorrbräuhaus, Bayerstraße. Jeden letzten Samstag im Monat Monatsversammlung im Vereinslokal ebendort. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen.

Rud. Engel, 1. Schriftführer.

Bayrischer Vogelliebhaberverein, Sitz München (E.V.). Die Wichtigkeit der zu fassenden Beschlüsse war es, die die Vorstandschaft veranlaßte, die am 28. Juni 1924 stattgefundene Versammlung als außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen. Die Einladung erfolgte per vorgedruckter Karte und war deshalb auch die Versammlung gut besucht. Die nach der Begrüßung der erschienenen Mitglieder durch den 1. Vorsitzenden Herrn Ing. Fritz Flierl unterbreitete Tagesordnung fand seitens der Versammlung keine Erinnerung und lautete: 1. Ausstellung; 2. Stiftungsfest; 3. Vereinsabzeichen und 4. Winterfutterbeschaffung. Zu 1 gab der Vorsitzende dem gewählten Ausstellungsleiter Herrn Keidel das Wort, der erklärte, daß die Hauptpunkte, wie Lokalfrage, Käfigtransport, Futter-

(Fortsetzung auf der 3. Umschlagseite.)

bedarf während der Ausstellungsdauer mit der Weltbundesleitung in vorhergegangener kombinierter Ausschußsitzung festgelegt wurden. Weiterhin wurde an die Mitglieder appelliert, für die Ausstellung zu werben und auch durch Halten von Tieren, die sonst nicht gekäfigt werden, die Ausstellung artenreicher und dadurch auch interessanter zu gestalten. Eine zirkulierende Liste des auszustellenden Materials fand von den Anwesenden ihre Einträge. Zu 2 war ebenfalls der 2. Vorsitzende Wortführer. Herr Keidel entwickelte in ausführlicher Weise das vorgesehene Programm, konnte aber in Punkt „Ehrung von Jubilaren" nicht die Zustimmung der Versammlung finden. Der übrige Teil der geplanten Darbietungen fand einstimmige Genehmigung und wurde der Termin vorerst noch zurückgesetzt. Aus der Versammlung heraus wurde der letzte November-Samstag vorgeschlagen. Zu 3 Vereinsabzeichen kam der Entwurf unseres Künstlermitgliedes A. Viegelmann zur Ansicht und fand derselbe nicht die einstimmige Begutachtung. Verschiedene Mitglieder, als deren Wortführer die Herren Greindl, Diem, Riegler usw., wollten gern einen natürlichen Vogel abgebildet sehen — eine Sache, die wieder in den Herren Ziegler, Keidel, John, Mader, Pöppl usw. ihre Gegner fand und die eben die originelle Komposition des Künstlers als stichhaltig anführten. Nach langen Wortgefechten zur Abstimmung geschritten, entschied man sich doch für Beibehaltung des gegebenen Entwurfes und wurde die Anschaffung in dieser Ausführung ebenfalls durch unser Mitglied Zipper gutgeheißen. Der Preis des Zeichens mit 1 M. wurde ebenfalls ohne Widerspruch gutgeheißen. Zum letzten Punkt 4 Beschaffung von Winterfutter betonte der Vorsitzende ausführlichst, jetzt schon seinen Bedarf anzuzeigen, um nicht später den Vorwurf zu bekommen, es wäre in dieser Hinsicht nichts unternommen worden. Herr Keidel und Herr Engl jun. wurden ermächtigt, von einschlägigen Firmen bemusterte Offerten einzuholen, um bei den nächsten Versammlungen damit aufwarten zu können. Da gegen 11 Uhr die Tagesordnung erschöpft war, auch seitens der Mitglieder keine Anträge mehr gestellt wurden, schloß der Vorsitzende die harmonisch verlaufene Versammlung.

J. V.: L. Keidel, 2. Vorsitzender.

„Ornis", Freie Bezugs-Vereinigung der Waldvogelliebhaber Deutschlands. Gegründet 1912. Auf vielseitigen Wunsch der alten Mitglieder wollen sich die Waldvogelliebhaber wieder in der „Ornis" zusammenschließen. Als amtliches Organ ist die „Gef. Welt" ausersehen worden, und werden die Artikel, die früher in den „Ornis-Blättern" erschienen, in obiger Zeitschrift gebracht werden. Aus diesem Grunde bittet die Geschäftsführung um eifrige Mitarbeit, damit unserer Waldvogelpflege wieder der Platz eingeräumt wird, der ihr gebührt. Anmeldungen sind unter Beifügung von 2 M. an den Geschäftsführer zu richten; Mitglieder erhalten auf Mischfutterbestellungen 5% Rabatt. Mit treudeutschem Gruß

Martin Sperling, Halle a. d. S., Südstr. 49.

Zoolog. Verein zu Zwickau i. S. Versammlung jeden Freitag nach dem 1. und 15. jeden Monats, abends 8 Uhr, im Restaurant „Zur Bleibe", Katharinenkirchhof. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen.

J. A.: Paul Schmidt, 1. Vorsitzender,
Zwickau i. S., Bosenstr. 44.

Anzeigenteil

viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 20 G.-Pf. berechnet. Aufnahme erfolgt gegen Voreinsendung des Betrages in Reichsgeld per od. auf unseren Zahlstellen: Postscheckkonto: Magdeburg 3148, Wien 156 687, Bern III 4326, Prag: Creditanstalt d. Deutschen unter Angabe des Zweckes.

ifige u. Gerätschaften

alig. Angebot!

amakäfige, 75 cm lg., 35 cm brt., hoch, Kiefernholz naturlackiert, and, Seiten halboffen, abnehmbare tuchdecke, solide Zinkkästen, Ornisverzinnter Draht, per Stck. M 22.50

esellschaftskäfige, Kiefernholz ckiert, verzinnter Draht (10 mm eite), solider Zinkkasten, Dach abar, äußerst praktische Futtereing, 60 cm lg., 30 cm brt., 50 cm hoch, per Stück M 22.—.

se exkl. Porto und Verpackung.

ermann Arold
Zoologische Handlung
in N 58, Fransecky-Str. 4.
ostscheckkonto 149951 Berlin.

Voliere,
llschafts-Weichfresserkäfige,
ebraucht, billig abzugeben.
Merz, Friedenau,
Bilhelm-Hauff-Straße 14 II.

Vogel-Mistelleim
t Fangen schädlicher Vögel,
end bei jeder Witterung, garanbrauchsfähig, Dose 1,50 M fr. von
itag Nchf., Frankenberg i. S. 6.
verkäufer hohen Rabatt. [746

-Fangkäfige 2.50 und 4.50 M,
lagnetze f. kl. schädl. Vögel 1.90 M,
2.10 u. 2.40 M. Katalog gratis.
nen, Gronau 58 (Westf.). [747

Futtermittel

lehlwürmer
große gelbe Ware,
franko geg. Voreinsend. v. Rm. 2.
as-Versand, Rostock i. M.

In der Zeit vom
2. Oktober bis 28. Februar
ist der An- und Verkauf wie das Feilbieten von **in Europa einheimischen Vögeln — mit Ausnahme der Meisen, Kleiber, Baumläufer und Spechte** — zulässig, es können daher in dieser Zeit derartige Inserate in der „Gefiederten Welt" zum Abdruck gelangen! Der Insertionspreis für die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum beträgt 0.20 Gm. Aufträge erbeten an
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg
Postschließfach 148

Für Terrarienfreunde.

Deutschlands Amphibien und Reptilien. Eine Beschreibung und Schilderung sämtlicher in Deutschland und den angrenzenden Gebieten vorkommenden Lurche und Kriechtiere. Von Bruno Dürigen. Mit 12 Farbentafeln u. 47 Textabb. Geb. 20 M.—.

Praxis der Terrarienkunde. Terrarium und Terra-Aquarium. Von Dr. E. Bade. Vergriffen! Neue Auflage Ende des Jahres!

Katechismus für Terrarienliebhaber. Fragen und Antworten über Einrichtung, Besetzung und Pflege des Terrariums. Von Hans Geyer. Vergriffen.

Die Giftschlangen Europas, beschrieben und in ihrer Lebensweise geschildert von H. Lachmann. Mit 9 Textabb. Geh. 1.— M.

Für Sammler.

Der Präparator und Konservator. Eine praktische Anleitung zum Erlernen des Ausstopfens, Konservierens und Skelettierens von Vögeln und Säugetieren. Für Naturfreunde herausgegeben von Rob. Boegler. 4. verb. und erweiterte Auflage. Mit 38 Abbildungen im Text. 2.— M.

Zu beziehen durch:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlg., Magdeburg
Postschließfach 148.

Mehlwürmer Pfd. 8 M, 1/4 = 2 M franco. Voreins.
749] Jeitner, Breslau, Weinstr. 12.

Mehlwürmer
geg. Einsend. v. 2.— Rentenmark 1/4 Pfd. franko versend. D. Waschinski & Co., Biesenthal 1 (Mark). [750

Zur regelmäßigen Lieferung in großen Posten gegen Kassa werden gesucht: Seidenraupenschrot, Muska, Zecke, Insektenschrot.
Offerten an
Quaisers Futterhandlung Reichenberg i. B.
751] erbeten.

Vogelfutter [752
für Kanarien, Waldvögel, Exoten, Papageien, Weichfresser. Anerkannt bewährteste Mischungen auf Grund langjähriger Erfahrung. Liste 13 über Vogelfutter, Liste 5 über Vogelkäfige, Zuchtgeräte usw. mit etwa 400 Abbildungen.
W. Göpel, Leipzig,
Tröndlinring 1. Telephon 14958.
Bei Anfragen bitte auf die „Gefiederte Welt" Bezug zu nehmen.

Gegen Milben
Ia frisches Insektenpulver
direkter Import [753
Spritzdose 50 Pfennig, Pfund 3,50 M.
Milbentinktur, Flasche 1 M.
Drogenhaus Hoffschildt
Breslau I, Ohlauer Straße 23.
Gegr. 1876. A. Z.-Mtgl.

Ameiseneier!

Neue Tiroler ℳ 4.80, bei 10 Pfd. ℳ 4.60.
Weiße Silberhirse eintreffend.
Sommerrübsen, extrafein 9 Pfd. ℳ 3.70.
Hanf, deutsch., 9 Pfd. ℳ 3.15.
Hanf, mandsch., 9 Pfd. ℳ 2.88.
Distel, grau ℳ 4.80, bei 10 Pfd. 4.50.
Negersaat ℳ 3.80, bei 10 Pfd. 3.50.
Hirse Marokko, 9 Pfd. 2.25.
Sämtl. Futterarten, Zirbel, Sonnenblumen usw. bei
754] **Vogelfuttergroßhandlung**
Fritz Liesenberg
München 9, Sommerstraße 5.

Ameiseneier

prima deutsche 1924er à Pfund 6 ℳ, prima finnische erster Auslese Pfd. 5 ℳ. Mein vielseitig anerkannt bestes **Weichfutter** Marke „Ornis" Pfd. 0.80 ℳ, Marke „Primus" Pfd. 2.50 ℳ.
Mehlwürmer ¼ Pfund 2 ℳ.
E. W. Lenger, Berlin N 58,
755] Schönhauser Allee 70a.

Vögel

Verkaufe

Farben- und Gestaltskanarien
756]
orangerote 24er, schlanke von engl. Yorkshire abstammend, Paar 25, 35 bis 40 ℳ.

Gesangsfarbenkanarien
in versch. Farben, Paar 40 bis 50 ℳ.

Gestaltskanarien
in versch. Farben, Paar von 30 ℳ an.

Zitronen-Hochgelbe Landkanarien
24er Hähne, Stück 8 bis 10 ℳ.
Anfragen Rückporto. Packung billigst.
Schöll, Garmisch (Bayern)

Prima echte Harzer
Kanarien-Edelroller
vielseit. Tag- u. Lichtschläger aus meiner bekannten Feinzucht, ℳ 12, Ia Zuchtpärchen ℳ 15.

Gebirgssommerrübsen,
nußsüße milde Kennerware, Postkolli ℳ 4,50 franko.

Freßsucht, Rotleibigkeit
Magen- u. Darmkrankheiten aller Vögel, auch bei Frischfängen, heilt absolut schnell und sicher mein Harzer Heilmittel. Einfache praktische Anwendung, 1000fach im Gebrauch! ℳ 2.50, ausreichend für mehrere 100 Tiere.
Rich. Heydenreich,
Bad Suderode, Harz.
Staatsmedaille, viele gold. Medaillen, seit
757] vielen Jahren an der Spitze.

Zeisige, Hähne, Stieglitze, Rothänflinge, Rote Gimpel und alle anderen Sorten Vögel empfiehlt für Liebhaber und Händler
Hermann Hornig
Vogelexporthaus [758
Zittau i. S., Neusalzaer Straße 17.

Junge gelbe und grüne Wellensittiche [759
gibi ganz besonders preiswert ab
Richard Lugebiel, Neukölln,
Siegfried-Str. 28/29. A. Z.-Mtgl. 113.

Heidelberg

Am 1. und 2. November findet in Heidelberg eine Ausstellung für Vogelschutz und Vogelpflege statt, verbunden mit einer Vogelschau. Alle Vogelschützer und Vogelliebhaber sind dazu eingeladen. Ein Teil der Besucher kann fast kostenlos untergebracht werden. Genaue Auskunft über Programm und Unterkunft erteilt gegen Porto-Ersatz

Prof. Dr. Otto Fehringer
760] **Heidelberg**

Anzeigen in der Gefiederten Welt haben guten Erfolg

Graupapageien,
große silberhellgraue Kongovögel, bekanntlich die besten Sprecher, à 100 u. 120 ℳ.

Gelbnackenamazonen,
fingerzahm, sehr leicht lernende große fehlerfreie Exemplare à 70 ℳ.

Blaustirnamazonen,
von Bahia, echte Rotbug, fingerzahm und schon anfangend einiges zu sprechen, je nach Gefieder 40, 45, 50 ℳ.

Mohrenkopfpapageien, jung u. gelehrig	Stck.	45.—
Bergpapageien, tarant.	Paar	45.—
Sperlingspapageien	Paar	18.—
Kl. Gelbhaubenkakadu	Stück	70.—
Gr. Gelbhaubenkakadu	Stück	50.—
Weißhaubenkakadu	Stück	100.—
Mexikan. Goldhäher	Stück	30.—
Weißkopfviehweber	Paar	20.—
einzelne ♂	Stück	10.—
Tahaweber	Paar	15.—
Webervögel verschiedener Art, ungefärbt	Paar	3.50
Schmetterlingsfinken	Paar	4.50
Amaranten, hochrote	Paar	4.—
Silberschnäbelchen	Paar	4.20
Kl. Elsterchen	Paar	6.—
Atlasfinken in Pracht	Paar	6.—
Atlasfinken, grau	Paar	3.50
Granedelsänger	Paar	5.—
Schuppenköpfchen	Paar	12.—
Muskatfinken	Paar	5.—
Glockenvogel	Stück	35.—
Rote Kardinäle	Stück	35.—
Karmingimpel	Stück	5.—
Stieglitze, Männchen	Stück	2.50
Stieglitze, Weibchen	Stück	1.75
Erlenzeisige, männl.	Stück	2.—
Buchfinken, männl.	Stück	2.—
rote Hänflinge, männl.	Stück	2.50
grüne Hänflinge, „	Stück	1.75
rote Dompfaffen, „	Stück	4.—
blaue Dompfaffen, weibl.	Stück	2.50
Schwarzplättchen	Stück	10.—
Rotrückige Würger	Stück	6.—

Hochelegante praktische Käfige, 40 cm lang, 22 cm breit, 30 cm hoch, Stück 7.50 ℳ, zugleich als Versandkäfig. Versand per Nachnahme. Porto und Verpackung 3.50 ℳ, als Dringend 6.50 ℳ. Wenn obiger Käfig benutzt wird, Porto 1.— ℳ billiger. [761

E. W. Lenger,
Berlin N 58, Schönhauser Allee 70a.

Vertausche
1,1 Hasenkaninchen, Preistiere mit Bewertungskarte gegen **Nachtigall, Gartenspötter, Schwarzplatt usw.**
Wilh. Höfer,
Klafeld-Geisweid, Kr. Siegen,
762] Markt 13.

Verkaufe oder vertausche gegen andere Exoten:
2 Zuchtp. gr., 1 Zuchtp. gelb., 4,0 gr., 2,0 gelbe
Wellensittiche,
0,1 Zwergpapagei.
Erich Richter, Bernstadt
763] **in Sachsen.**

1,1 Feuerflügelsittiche,
selt. schönes Paar, kräftig u. gesund, ℳ 40.

1,0 Dominikanerwitwe,
764] in Prachi kommend, ℳ 3.
Friedrich Lange, Wiesau Kr. Glogau.

1,1 Maskengrasamandinen
sehr brütlustig, gebe ab od. tausche geg.
765] **1,1 Goulds.**
Artur Schiebe, Zschopau i. Sachs.
Marienstr. 17. A. Z.-Mtgl. 282.

Kanarienhähne
gelbe Landrasse, à Stck. 8 ℳ,
766] Weibchen 2 ℳ.
D. Döhle, Loccum, Kr. Stolzenau.

Ges. Welt, Jahrgang 1904—23 (Jahrg. 05 u. 17 fehlen), gebunden, sehr gut erhalten, gegen Gebot abzugeben.
Georg Rose, Pyritz i. Pomm.
767] Bahnhofstr. 7.

Grüne Wellensittiche
aus Freivoliere, von blutsfremden Eltern, Paar 14 ℳ, gibt ab
768] **R. Huth, Perleberg.**

Ornis-Haus
Halle-Saale
Gegründet 1912
Spezialität:
Individuelle Weichfresserpflege nach Angaben des Herrn Apotheker Adalbert Jena-Biberach-Riß. (Alleiniges Herstellungsrecht.)
Reform-Normal I, Volierenm.,
Reform-Normal II, f. Rotkehlchen Schwarzplatten usw.,
Reform-Normal III, f. Nachtigall, Sprosser usw.,
Reform-Normal IV, f. Gelbspött. Goldhähnchen usw.,
Reform-Normal V, f. Schama usw.,
Körnerfutter Ia für jede Vogelart. [76
Inhaber langjähriger Fachmann siehe „Ornis-Buch" (90 S.) Mt.
Preisliste auf Wunsch!

Gebe ab vom 1. 10. a
1 prima deutsche Nachtigall, 2 Jahr käfigt, tadellos vermauserl, 20 ℳ 1 Heidelerche 10 ℳ, ferner 1 Kanar hahn (St. Seifert) 15 ℳ, 1 Haus kanarie 25 ℳ. Verp. frei, Porto ex
K. Raabe, Crimmitschau,
770] Schützenstr. 8.

Für Kanarienzüchte
Soeben erschienen:
Die Farben- und Gestal kanarien
nebst Beschreibung aller schied. Kanarienrassen, de Entstehung, Form- u. Far veränderung, Bastardzuc Farbenfütterung v. A. Asc brenner. Mit vielen s haltigen Abb. Kart. 1.75
Wichtig zur Zucht:
Der Kanarienvogel,
seine Naturgeschichte, P u. Zucht von Dr. Karl R 14. Auflage. Mit 2 Far tafeln und zahlreichen abbildungen. Bearbeitet Karl Neunzig.
Kart. 2.50
Die Bastardkanarienvo zucht.
Von Walter Barth.
20 Abbildungen und 1 drucktafel. 1.50
Der Kanariengesang.
Allgemeinverständliche musikalische und phone Darstellung von W. Kl 1.0
Zu beziehen durch:
Creutz'sche Verlagsb handlung, Magdebu
Postschließfach 143.

Beschwerden w Nichtzustellung der „fiederten Welt" sind zuständigen Postamt zubringen.

Inserate
für das am 9. Okt. 1924 zu gabe gelangende Heft 34 de Welt erbitten bis 4. Okt. 192

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Berlin-Hermsdorf; für den Anzeigenteil: Rolf Kretschmann, Magdeburg, Postschließfach 1
Verlag der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck: August Hopfer, Burg Bz. Magdg.

Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Jahrg. 53 | Den 9. Oktober 1924 | Heft 34

(Druckort: Burg, Bezirk Magdeburg.)

Webervogel und Widafinken.

Von A. Krabbe.

(Nachdruck verboten.)

Man unterscheidet gegenwärtig 600 Weberarten, von denen etwa 120 Indien, die Sunda-, papuasischen und polynesischen Inseln, Australien und Madagaskar, die Mehrzahl aber, gegen 480, Afrika südlich der Sahara, die eigentliche Heimat der Webervögel, bewohnen. Die Webervögel werden von der großen Ordnung der Singvögel — Oscines — eingeschlossen und bilden unter sich die Familie der Weber — Ploceidae —, welche in zwei Unterfamilien zerfällt, und zwar die der eigentlichen Weber — Ploceinae — und der Webefinken — Spermestinae —. Zu den eigentlichen Webern zählen die uns in dieser Abhandlung interessierenden Baya-, Gelb-, Gelbrücken-, Schwarzkopf-, Schwarzzügel-, Schwarzflügel-, Bartstrich-, Pracht-, Sperlings- und Viehweber, zu den Webefinken außer sämtlichen Astrilden und Amandinen die Widafinken, Blutschnabel- und Feuerweber. Bei den Ploceinae ist die erste Schwinge länger als die Handdecken, bei den Spermestinae ist sie kürzer, bisweilen kaum sichtbar. Diese Feder ist sozusagen der Trennungsstrich für die beiden Unterfamilien. Für die Liebhaber hat die Trennung nur eine untergeordnete Bedeutung. Ich werde mich bei der Beschreibung der Arten auch nicht hiernach, sondern nach den einzelnen Gattungen richten, von denen die Ploceinae 13, die Spermestinae 34 aufweisen und mit den Blutschnabel- und Feuerwebern beginnen, um die Widafinken als zweiten Teil anzufügen.

Für Afrika sind die Weber Charaktervögel. Im höchsten Grade gesellig und demgemäß stets in großer Menge auftretend, machen sie sich ebensowohl durch ihre Zahl wie durch ihr Lärmen, durch die Schönheit des Gefieders und die auffallenden Formen ihrer künstlichen Nester bemerkbar. Die Nahrung besteht in mehlhaltigen Sämereien, die vor dem Genuß enthülst werden. Zur Brutzeit fressen die Weber vorzugsweise Insekten, womit sie auch ihre Jungen auffüttern. Die Prachtweber sind Waldbewohner, die Baumweber beleben freies Gelände und hängen ihre Nester in die Kronen einzelner Palmen oder setzen sie in das Gezweig niedriger Bäume. Die Feuerweber, Widafinken und Sammetweber bewohnen die Steppe und nisten im hohen Grase oder niedrigen Gebüsch. Die Nester werden in sehr künstlicher Weise aus frischem geschmeidigen Gras oder abgerissenen Streifen der Palmblätter gewebt. Die Pracht- und Goldweber bauen geschlossene Nester in Kugel-, Flaschen- oder Retortenform mit einer nach unten geneigten Zugangsöffnung, die teilweise durch eine lange Röhre gebildet wird, die Feuer- und Sammetweber sowie die Widafinken ovale Nester mit Einschlupfloch in der oberen Hälfte, z. T. überdacht, welche aber nicht hängen, sondern im Gebüsch stehen oder an Zweigen oder Grashalmen angewebt sind. Eine Ausnahme im Nestbau machen die Büffelweber, die große Reiserhaufen aufschichten, und die Siedelweber, die ihre Nesterkolonie überdachen. Eine besondere Stellung aber gibt den Webern und Widas die Umfärbung der Männchen, die zur Brutzeit in den auffallendsten Farben — gelb, rot, braun, schwarz, weiß oder deren Übergänge — prangen und eine doppelte Mauser bedingen. Das sogenannte Hochzeitskleid wird zur Brutzeit durch Umfärbung und Federwechsel angelegt und nach der Brutzeit in derselben Weise wieder abgelegt, so daß dann die Männchen in dem unscheinbaren grauen, ammer- oder sperlingsartigen Gefieder von den stets schlichten Weibchen nicht oder nur sehr schwer zu unterscheiden sind.

Über die Weber sagt Ruß: „Für die Liebhaberei sind die Weber nicht von geringer Bedeutung. Sie vereinigen mit mehr oder minder herrlichen Farbenschmuck geringe Bedürfnisse, nehmen also mit einer sehr einfachen Verpflegung vorlieb und erfreuen ihren Besitzer dadurch, daß sie selbst unter minder günstigen Verhältnissen in eifrigster Weise ihre künstlichen Bauten errichten." — Brehm schreibt über die Edelweber: Wer so viele Edelweber gepflegt und gezüchtet hat wie ich, wird mir beistimmen, wenn ich sie zu den anziehendsten und deshalb empfehlenswertesten Stubenvögel rechne. Ihr schnarrender schnalzender Gesang kann sich freilich mit dem unserer oder fremdländischer, in dieser Hinsicht sich auszeichnender Körnerfresser, nicht messen, hat aber etwas so gemütliches, daß man ihn recht gern anhört, und ihre Schönheit, Zählebigkeit und Ausdauer, ihre

Bewegungsfreudigkeit, Arbeitslust, ihr ganzes Treiben und Gebahren gewähren ein fortdauerndes Vergnügen. Ich ziehe deshalb die ebenso schönen als selbstbewußten ebenso fleißigen, eifrigen, arbeitsamen als geselligen, unter sich verträglichen und fortpflanzungslustigen Edelweber den meisten Prachtfinken unbedingt vor und empfehle sie jedem Züchter, welcher in derselben Weise wie ich erfahren will oder kann, auf das angelegentlichste und wärmste."

Damit haben Ruß und Brehm klar ausgedrückt, daß die Weber wertvolle Stubenvögel abgeben, die ihrem Pfleger reichlich die aufgewendete geringe Mühe in der Haltung und Fütterung lohnen und ihm ein nie versiegender Quell von Anregung und stetem Vergnügen sind.

Ich habe im Laufe der Jahre versucht, eine möglichst vollständige Sammlung von Webervögeln und Widafinken zusammen zu bringen, um Beobachtungen zu machen über Ein- und Ausfärbung, Verträglichkeit und das Verhalten der Geschlechter zueinander. Diese Sammlung wird bei jeder sich bietenden Gelegenheit erweitert. Untergebracht ist sie in der im Jahrgang 1921 der Gef. Welt Heft Nr. 19 beschriebenen und abgebildeten Voliere I von 6,50 m x 4,40 m x 2,75 m zusammen mit einigen heimischen Finken, etlichen Prachtfinken, Wellensittichen, Unzertrennlichen und Sperlingspapageien. In derartig großen Flugräumen kommen die Vögel erst richtig zur Geltung, da sie ein naturgemäßes Leben entfalten können und von der Schablonisierung der Käfighaltung befreit sind. Ernstliche Beißereien entstehen selten, da der Schwächere dem Stärkeren, der Friedliche dem Unfriedfertigen aus dem Wege geht. Bei der großen Intelligenz dieser Vögel haben sie sich bald gegenseitig abschätzen gelernt und wissen Freund und Feind wohl zu unterscheiden. Es sind bisher bösartige Beißereien unter den Webern überhaupt noch nicht vorgekommen. Über die Schlauheit der Weber muß man des öfteren staunen, insbesondere die der eigentlichen Weber, welche auf einer höheren geistigen Stufe stehen als die meisten andern Körnerfresser, höchstens die Sperlinge können sich mit ihnen messen. Eigentlich zahm werden Weber nie, doch lernen sie schnell ihren Pfleger und dessen Gewohnheiten kennen, halten sich stets in respektvoller Entfernung, immer fluchtbereit und auf der Hut, selbst beim Mehlwurmempfang; der sie manchmal bis dicht vor die Füße ihres Pflegers führt. Während die größeren Gelbweber winterhart sind und sich deswegen für Besetzung von Freivolieren eignen, lasse man bei den Widafinken und kleineren Webern die Temperatur im Winter tunlichst nicht unter 0 Grad sinken. Im letzten strengen Winter habe ich zeitweise 5 Grad Kälte in der Vogelstube gemessen, wobei einem Orangeweber ein Fuß erfror, so daß der Vogel einging, und den gegen Kälte an den Füßen ohnehin empfindlichen Paradieswitwen die Zehen steif wurden. Ein frostfreier Raum mit täglicher Frischluftzuführung ist der geeignetste Aufenthalt während des Winters, falls man nicht über ein gleichmäßig temperiertes Zimmer verfügt. Als Futter reiche ich Hirse, Spitzsamen, Hafer, etwas Hanf, gequellte weiße und zeitweise Kolbenhirse, gequellten Hafer, Mehlwürmer und während der Sommermonate frische Ameisenpuppen; als Baustoffe Gras und Agavefasern, letztere nur anfänglich, solange die Gräser noch nicht hoch genug sind. Später gebe ich Fasern nicht mehr, da sie andern Vögeln, insbesondere jungen sehr gefährlich werden können. Badegelegenheit ist dauernd vorhanden und wird ausgiebig benutzt. Trinkwasser befindet sich in automatischen Glaskugeln, die allgemein benutzt und täglich geleert werden. Für den Nesterbau eignen sich besonders Birken, Dornen und Strauchweiden, auch Flieder u. a.

(Fortsetzung folgt.)

Vogelfangarten.

Von Martin Sperling, Geschäftsführer der „Ornis".

(Nachdruck verboten.)

Um den vielen Anfragen nachzukommen, will ich in nachstehendem versuchen, über die für uns Liebhaber in Betracht kommenden Fangmethoden einiges mitzuteilen.

Vorwegschicken möchte ich, daß der Fang von Vögeln, wie alles andere auf der Welt gelernt sein will und auch eine gewisse Veranlagung vorhanden sein muß, die den Fänger befähigt, die Situation zu erfassen und die richtige Stelle für den Fang zu finden.

Dreierlei Arten von Fanggeräten stehen uns zur Verfügung. Erstens der Leim, zweitens das Netz und drittens der Käfig mit der Klapptür.

Der sogenannte Vogelleim wird entweder aus Leinöl oder aus der Mistelbeere hergestellt, wie dies gemacht wird, ist bekannt und erübrigt sich die Beschreibung der Herstellungsweise, da sich kleinere Mengen schlecht herstellen lassen und auch andererseits guter Leim im Handel erhältlich ist. Die Hauptsache ist, daß der Leim nicht zu dünn ist, so daß er Faden zieht und auch nicht so dick, daß die Ruten zu schnell trocknen; in letzterem Falle enthält er zu viel Harze (Kolophonium) und ist unbrauchbar.

Als Ruten wähle man die schwächsten Birkenreiser, diese sind recht biegsam und zähe im Holz.

Zum Transport der Ruten nehme man ein Wachstuch, mit der Glanzseite nach innen, schmiere den Leim darauf und wickle die Ruten hinein, so daß diese mit dem unteren Ende, das von Leim reingehalten wird, herausreichen.

Sollen z. B. Stieglitze gefangen werden, so muß eine Stelle gesucht werden, wo zu bestimmten Stunden die Vögel in größeren Mengen einfallen, was häufig im Herbst dort sein wird, wo Kletten und Disteln sich in Kolonien angesiedelt haben.

Der Lockvogel, ein lebendiger Vogel mit fleißigem Ruf, wird in kleinem Käfig eingestellt und die Ruten verteilt. Auch mit dem sogenannten Quirl wird gearbeitet. Der Quirl ist ein Zweig, der in der Mitte 4—5 fingerlange Äste in Quirlform hat. Dieser wird in die Erde gesteckt und die Ruten mit dem Ende nach oben auf den Quirlstangen lose in Schlitze gesteckt, in der Nähe des Käfigs aufgestellt. Beim Einfallen benutzen die Vögel den Quirl als Anflugstange und fangen sich meist an den Brustfedern. Eine andere Art ist das Abstecken der Tränken.

Nachdem durch Beobachtung festgestellt worden ist, welche Stellen des Wassers als Vogeltränke benutzt werden, sind die Leimruten über Kreuz in die Erde zu stecken, um den Zugang zu versperren.

Schwarzplättchen werden mit Leimruten gefangen, indem man den Anflugplatz auf einem Baum feststellt und diesen mit den Ruten besteckt, hierbei ist genau zu beobachten, von welcher Seite aus der Vogel anfliegt; denn an dieser Stelle sind die Ruten leicht anzubringen.

Die Kreuzschnäbel werden mit dem Baum und Locker gefangen, an dem Ebereschenbeeren befestigt sind, die Vögel fallen in Scharen ein und kommen mit den leicht in Kerben befestigten Ruten herunter.

Das zweite Mittel ist das kleine Schlagnetz oder Garn. Es gibt zwei Arten von Netzen, die sogenannte deutsche und die französische Form; jede hat ihre Vorteile und auch Nachteile. Das deutsche Netz wird mit Klammern am Erdboden befestigt und ist oft schwer zu befestigen; entweder ist der Boden zu hart, dann gehen die Klammern nicht hinein, oder er ist zu weich, dann schlägt sich das Netz los.

Das französische Netz ist meist recht leicht gebaut und hat noch einen Unterbügel, so daß sich ein Feststecken erübrigt. Mir sagt die letzte Form mehr zu.

Beim Aufstellen des Netzes ist zu beachten, daß das Netz stets nach der Anflugseite hin zuschlägt,

Weißbindendrosselschmätzer.

Amseln kann man im Frühjahre leicht fangen, wenn ein Männchen im Käfig herausgehängt wird, vor der Paarungszeit sind die Tierchen wie blind und eine wilde Amsel befehdet den Käfigvogel.

Bald hat man heraus, an welcher Stelle die Amsel anfliegt und steckt hier eine Rute. Meist braucht man nur kurze Zeit zu warten; die Amsel kommt geflogen und sofort klebt die Rute an die Brustfedern. Trotzdem nun der Vogel volle Flugfähigkeit besitzt, läuft er trotzdem wie besessen unter großem Geschrei am Erdboden herum und kann leicht ergriffen werden.

Das Tupfen der Weichfresser und Zeisige wird des Abends vorgenommen, nachdem die Schlafplätze festgestellt sind. An einem Stock mit einer Kerbe am oberen Ende wird eine Rute befestigt und damit der Vogel berührt, die Rute klebt an und der Vogel mit Rute fällt zur Erde, ohne daß die anderen Vögel sich stören lassen.

Diese angeführten Arten sind nur einige Beispiele, die je nach Lage der Sache geändert werden müssen.

hierdurch wird der Vogel mit dem Netz in der Luft ereilt und es ist ausgeschlossen, daß der Bügel den Vogel trifft oder daß er entweichen kann.

Die meisten Weichfresserweibchen haben den Lock-Lockruf, ahmt man diesen Ruf nach, indem die Luft nach innen hineingezogen wird, so werden bald die Männchen kommen; sehen das Bündel Mehlwürmer und können nicht widerstehen.

Nach dem Aufstellen ist das Netz gut mit altem Laub abzudecken und die Würmer, im Bündel an feinem Draht befestigt, am Abzug anzubringen.

Daß bei dem Aufstellen das Laub aufgeharkt wird, hat auch seine guten Seiten, der Laie meint, es sei die Neugier, die die Vögel an den Boden treibt um zu sehen, was geschehen ist; im Grunde genommen ist es aber nur die Futtersuche, denn die Würmchen usw., die dadurch für sie erreichbar werden, sind der Anziehungspunkt und nicht die Neugier.

Neueinführungen und Seltenheiten.

Von Karl Neunzig.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Eine starke Sehnsucht der Pfleger ausländischer Sänger waren die zahlreichen grasmücken-, rohrsänger-, schmätzer- und drosselartigen Vögel Afrikas, die z. T. wenigstens so manchem Liebhaber aus Abbildungen oder den Bälgen der Museen bekannt waren. Besonders eifrig bemüht um die Beschaffung dieser Vögel war der verstorbene Major Schiller, der den älteren Lesern aus seinen Schilderungen südeuropäischer Grasmücken wohl noch im Gedächtnis ist. Er beschaffte sich aus naturwissenschaftlichen Handlungen die Bälge der Vögel, welche er gern in seinen Besitz bringen wollte, sandte diese Bälge oder Zeichnungen nach ihnen den Vögel importierenden Firmen oder auch ausländischen Händlern zu mit dem Auftrag, ihm diese zu beschaffen. In vielen Fällen gelangte er zum Ziel; seine Sammlung von Grasmücken der Mittelmeerländer wurde vielfach bewundert. Besonders am Herzen lagen ihm die in ihrer Gefiederfärbung an die Schamadrossel erinnernden Angehörigen der Gattung Drosselschmätzer — Thamnolaea *Cab.*, welche in etwa 12 Arten in Afrika und auf Madagaskar leben. Die Erfüllung seines Wunsches erlebte Herr Schiller nicht mehr. Erst mit einem der ostafrikanischen Importe des Berliner Zoologischen Gartens gelangte ein Stück dieser Gattung in das Vogelhaus, und zwar der

Weißbindendrosselschmätzer — Th. albiscapulata *Rüpp.*

Er lebt in Ostafrika von Bogos und dem Tarantapaß*) bis Ostsennar. Die Drosselschmätzer stellt Reichenow zwischen Steindrosseln und Steinschmätzer. „Obgleich nicht eben sehr leicht und zierlich gebaut, sind diese Vögel doch lebhaft. Der Schweif wird nach Art der Steinschmätzer hin und her bewegt. Die Haltung ist eine mehr wagerechte, an die Schwarzdrossel erinnernd, der Gesang zwitschernd und nicht sehr laut." (Heuglin.) Ähnlich wie Rotschwänze bald auf dem First eines Hausdaches, bald im Sparrenwerk unter dem Dache sitzend und einander lockend, beobachtete Graf Zedlitz ein Pärchen in Arvesa. Sonst traf er sie, wie auch Prof. Neumann, in den mittleren Lagen der Eritrea in Höhen von 1000—1800 m an. Die Verbreitung ist nach Zedlitz sehr lokal, nur im Bette des oberen Anseba bei Ela-Bered in etwa 1600 m Höhe war die Art häufig, sonst sah er nur vereinzelte Paare. Sehr viel treiben sich diese Vögel auf dem Erdboden umher und scheinen besonders gern auf Felsblöcken Platz zu nehmen. Sie sind lebhaft, der Schwanz meist in Bewegung. Das Benehmen erinnert an das der Steinschmätzer. Anscheinend ist ihnen die Nähe des Wassers Bedürfnis. Nicht ganz mit den Zedlitzschen Beobachtungen übereinstimmend sind die Berichte Heuglins, der sie als paarweise oder in kleinen Familien lebende Standvögel in Höhen von 1500—3000 m in buschigen oder felsigen Gegenden, an den Ufern von Wildbächen, in Ruinen und auf Strohdächern angetroffen hat, jedoch selten auf der Erde, mehr noch auf Felsstücken, Mauern und besonders in hohem Buschwerk.

Vermutlich benehmen sich die nahe verwandten Formen in ähnlicher Weise und einige Beobachtungen an diesen dürften vielleicht auch unter ähnlichen Verhältnissen für die eingeführte Art zutreffend sein. So teilt Granvik mit, daß er gelegentlich einer Jagd auf Klippschliefer eine Th. albiscapulata subrufipennis *Rchn.* aus einer Felsspalte aufscheuchte. Der Vogel lief und hüpfte aufgeregt auf den großen Felsblöcken umher mit aufgerichtetem Schwanz und hängenden Flügeln und verschwand plötzlich in derselben Felsspalte, aus der er gekommen. In dieser befand sich auch das unzugängliche Nest des Vogels, wie Granvik aus dem im Felsspalt hörbaren Gezwitscher der Nestlinge feststellen konnte.

In einem Felsenriß an dem hohen Felsufer des Ukuki fand Erlanger das Nest von Th. semirufa *Rüpp.* Es war aus Moos und Grashalmen erbaut und innen mit Haaren und Grashalmen ausgelegt. Es hatte die Größe eines kleinen Amselnestes. Das Gelege bestand aus 3 Eiern. Th. semirufa ist eine ausgesprochene Bewohnerin von Felsen, steinigen Berghängen u. dgl. Sie ist nirgends häufig und wurde immer nur in Paaren angetroffen. „Der Gesang ist abwechslungsreich und hat schöne flötende Strophen. Er wird gewöhnlich auf einem erhöhten Felsblocke vorgetragen, wobei der Schwanz oft in die Höhe gestelzt wird."

Gefiederbeschreibung: ♂ Kopf, Hals bis zur Vorderbrust glänzend blauschwarz; Bürzel, Oberschwanzdecken rotbraun, mit Ausnahme der längsten Oberschwanzdecken, welche schwarz, nur an der Wurzel rotbraun sind; übriger Unterkörper rotbraun, von dem Schwarz der Vorderbrust durch ein weißliches Band getrennt; Unterschwanzdecken schwarz mit rotbrauner Wurzel; Schenkel schwarz; kleine und mittlere Flügeldecken weiß; übrige Flügelfedern, auch Unterflügeldecken schwarz, nach außen blauschwarz; Schwanzfedern schwarz; Auge dunkelbraun; Schnabel, Füße schwarz; Lg. 190—210, Fl. 107—115, Schw. 85—90, Schn. 17—18, Lf. 28 mm.

♀ nach Reichenow ohne weiße Flügelflecke, also ganzer Flügel schwarz; das Band zwischen dem Schwarz des Vorderhalses und dem Rotbraun des Unterkörpers weniger deutlich. — Bei der sehr nahestehenden Art Th. a. subrufipennis *Rchn.* sind Kopf, Hals, Rücken, kleine und mittlere Flügeldecken schiefergrau, das rotbraune Gefieder dunkler.

Auch unter den Papageien des Vogelhauses sind einige Arten zu nennen, die nur sehr selten zu uns gelangen. Da ist unter den Spitzhaubenkakadus ein naher Verwandter des kleinen Gelbhaubenkakadus, bei oberflächlicher Betrachtung kaum von diesen verschieden und doch weicht er wesentlich von ihm ab. Er führt den Namen

Orangehaubenkakadu — Lophochroa citrinocristatus *(Fras.)*.

Die Haube sieht voller und schöner aus als die des kleinen Gelbhaubenkakadus, die Haubenfedern sind länger und breiter und ihre Farbe ist ein sattes Goldgelb, welches sich bei frischem Gefieder dem Orangegelb nähert. Sodann ist das Körpergefieder reiner weiß. Es fehlt ihm der gelbe Anflug, der sich bei jenem fast über das ganze Brustgefieder erstreckt, während bei dem Orangehaubenkakadu nur ein-

*) Nach diesem Paß wurde der „Tarantinische Zwergpapagei" benannt. N.

zelne gelbe Andeutungen auf der Brust vorhanden sind. Die nackte Augenhaut ist bei ihm weißlichgrau, der Schnabel kleiner, während er den Gelbhaubenkakadu an Größe übertrifft. Seine Heimat ist Sumbawa. In ihrem Benehmen unterscheiden sich beide wenig. Der Orangenhaubenkakadu ist von sanfterem Wesen und meist auch ruhiger als der Gelbhaubenkakadu.

Von anderen selten eingeführten Papageien, welche sich zurzeit im Neuen Vogelhaus des Zoologischen Garten befinden, wären noch drei Arten der Gattung Langflügelpapagei — Poicephalus *Sw.* zu besprechen. Von diesen ist der Benguellapapagei — P. robustus fuscicollis (*Kuhl*) meines Wissens das erstemal im Vogelhaus, während der Braunkopfpapagei — P. fuscicapillus (*Verr. Des Murs*) schon einmal, im Jahre 1914, in der Papageiensammlung vorhanden war. Eine Neueinführung ist der

Rotbauchmohrenkopf — Poicephalus rufiventris *(Rüpp.)*, der Somaliland und Schoa bis zur Panganilinie bewohnt. Er lebt in Flügen wie die verwandten Arten, besonders auf Hochbäumen in den wärmeren Strichen des Landes, nicht in dem eigentlichen Hochland. Im Hochwald macht er sich durch sein lautes Geschrei, welches das der Affen übertönt, bemerkbar. Nach Phillips soll er in Termitenhügeln brüten. Er ist der östliche Vertreter des Mohrenkopfes, von dem er sich hauptsächlich durch die mennigrote Färbung des Bauchgefieders und der Unterflügeldecken unterscheidet.

In seinem Wesen und Benehmen in der Gefangenschaft dürfte er vom Mohrenkopf kaum verschieden sein.

Gefiederbeschreibung: ♂ Kopf, Hals fahlbraun, Kopfseiten und Vorderhals mennigrötlich überlaufen; Zügel schwarz; Rücken graubraun, die Federränder bei auffallendem Licht mit matt blaugrünlichem Glanz; Bürzel, Oberschwanzdecken hell blaugrün mit grünlichgelber bis orangegelber Federmitte; Brust mennigrot; übrige Unterseite, Schenkel gelbgrün, jede Feder mit gelber bis orangefarbener Mitte; Flügeldecken wie Rücken; Schwingen dunkelbraun, heller außengesäumt, Unterflügeldecken mennigrot; Schwanz dunkelbraun; Auge orangegelb; Schnabel, Füße, nackte Augengegend schwärzlich; Lg. 230—240, Fl. 150—160, Schw. 75—85 mm.

♀ Oberkopf, Nacken, Oberrücken braungrau, Kopfseiten silbergrau; Vorderhals graubraun, schwach rötlich überflogen; Brust, Bauch hell bläulichgrün, Federmitte orange; Unterflügeldecken braungrau. (Fortsetzung folgt.)

Der Mäusebussard in Gefangenschaft.

Von Kurt Lindner.

(Nachdruck verboten.)

Wenn wir die letzten Kapitel in Neunzigs Meisterwerk über die einheimischen Stubenvögel durchblättern, stoßen wir auch auf die Raubvögel. Sie sind recht kurz behandelt, und das wohl auch mit Recht, denn für den Vogelliebhaber im allgemein üblichen Sinn kommt das Halten von Raubvogelarten so viel wie gar nicht in Betracht. Aber nachdem sich vor einiger Zeit viele Hunderte von deutschen Jägern zusammengeschlossen haben, die alte Falkenjagd wieder zu Ehren zu bringen, wäre es angebracht, daß bei einer Neuauflage des Neunzigschen Prachtwerkes auch einiges über das Halten und die Pflege der zur Falkenjagd tauglichen Raubvogelarten, wie Wanderfalk, Habicht und Sperber, gesagt würde, da sich heute schon viele Exemplare dieser Arten in Jägerkreisen befinden, die auch in einem solchen Nachschlagewerk gelegentliche Auskunft erwarten. Gehören sie auch streng genommen nicht unter die eigentlichen „Stubenvögel", so wäre die Bereicherung doch nicht zum Nachteil des Buches.

Mäusebussard.

Als ich im Jahre 1923 zum erstenmal praktische Erfahrungen auf dem Gebiet der Falkenjagd sammeln wollte, und es mir nicht vergönnt war, einen zur Beizjagd geeigneten Raubvogel zu erhalten, spielte der Zufall mir einen jungen, aber immerhin schon etwa 4 Wochen alten Mäusebussard in die Hände, mit dem ich vorliebnahm, um mich wenigstens an die Pflege eines Raubvogels zu gewöhnen, obwohl ich mir bewußt war, daß dieser Vogel zur Jagd nicht geeignet ist. Als ich „Hans", wie mein Mäusebussard getauft wurde, erhielt, war er zwar schon ziemlich ausgemausert, aber noch fast ganz flugunfähig. Das Gefieder war ausgesprochen schön gezeichnet, Kopf, Nacken, Oberrücken, Oberflügeldeckfedern und Bauch waren baigegelb mit mehr oder minder brauner Zeichnung, die übrigen Teile dagegen kaffeebraun. Ich ließ ihm anfangs in einem kleineren Stall für 3—4 Reitpferde volle Freiheit; hier hatte er sich eine ziemlich hohe und von unten gestützte Querstange zum Ruheplatz auserkoren. Anfangs reichte ich ihm kleine Stückchen gehäuteten Rehwildes, die mir gerade zur Ver-

fügung standen und die er mit sichtlichem Behagen auf der Faust kröpfte. Aber diese Zutraulichkeit sollte für einige Zeit verlorengehen, denn ich hatte ihn, um ihn in seiner Flugfertigkeit auszubilden, was im Alter von 5 Wochen unbedingt nötig war, mehrmals von einem höheren Balkon herabgeworfen, und dies hatte er mir sehr übelgenommen. Nur unwillig ließ er sich anfassen oder gar tragen. Trotzdem, und dies ist sein Hauptcharakterzug, ist er immer offen, nie „falsch, hinterlistig oder tückisch" gewesen, verbarg trotzdem natürlich nicht seine Raubtiernatur. Tagsüber hielt ich ihn im Garten an einer sechs bis acht Meter langen, dünnen Schnur. Trotzdem ich ihm Gelegenheit zum Aufblocken gegeben hatte, saß er fast immer im Gras oder auf einem nahen Kiesweg. Seine Stellung war weniger ein Sitzen als mehr ein Liegen auf dem ganzen Bauch; dabei streckte er beide Flügel weit aus und ließ sich von der Sonne bescheinen; eine Stellung, die ich in der Freiheit noch nicht beobachtet habe. Sein Durst war auch an heißen Tagen niemals groß, eine Eigenschaft, die allen Raubvögeln gleich eigentümlich ist; jedoch badete er sich an solchen Tagen oft und gern in einem kleinen Waschkübel, das ich zu diesem Zweck für ihn hatte hinstellen lassen, nur sah er offensichtlich an solch heißen Tagen weniger auf die Reinlichkeit des Wassers als gewöhnlich. Eines Abends hatte er sich die Leine am Ring, an dem diese am Ständer befestigt war, durchbissen und war bis auf eine niedere, etwa 3 m hohe Gartenlaube geflogen, wo er sich aber ruhig wieder einfangen ließ. Die ersten Nächte hatte ich ihn in den Stall zurückgebracht, hielt dieses aber der warmen Jahreszeit wegen nicht für notwendig. Da er aber immer scheuer wurde, entschloß ich mich, ihn fliegen zu lassen.

Wie wurden aber meine Erwartungen getäuscht, als ich sah, daß es meinem Hans recht gut bei mir gefallen hatte und er mich gar nicht verließ. Er konnte nun schon tadellos fliegen. Tagsüber hielt er sich in meinem oder in den Nachbargärten auf, und da er niemand etwas zuleide tat und gut bekannt war, wurde er überall geschont und gehegt. Ich sah ihn in Höhen bis zu 30 m fliegen, die er ohne Anstrengung nahm, aber auch keine Anstalten traf, zu entfliehen. Er wurde von mir allein gefüttert und gewöhnte sich so sehr gut an mich. Und was an der Leine nicht hatte gehen wollen, gelang mir jetzt, er wurde zutraulich. Ich fütterte ihn in bestimmten Zeiten, die ich einzuhalten versuchte und er kam sofort auf meinen Pfiff, bei dem ich seinen Ruf, ein leises „iä" nachzumachen versuchte. Den „Kampfschrei", den man in der Natur gewöhnlich zu hören bekommt, vernahm ich nur höchst selten und gewöhnlich nur dann, wenn der Jagdhund hinzukam, um sich seinen Teil vom Futter zu holen. Überhaupt vertrugen sich diese beiden nicht gerade gut, vor allem in „Futterfragen", während sie sich sonst im allgemeinen nicht beachteten. Auf meinen Pfiff, den er übrigens sehr weit zu hören schien, kam der Bussard herbei und nahm den Brocken immer aus der Hand, kröpfte ihn in der Nähe in einer Entfernung von 5—6 m. Näherte ich mich ihm, so blieb er ruhig sitzen, spreizte aber beide Flügel und den Schwanz weit aus und drehte den Kopf, den er übrigens um mehr als 180° bewegen kann, mir zu. Nach der Mahlzeit ließ er sich gern in den Nackenfedern krauen. Gekratzt oder gehackt hat er mich nie, ja er war sogar immer sehr vorsichtig beim Aufsetzen auf die Hand, doch sind ein Paar Schutzhandschuhe zu empfehlen. Dagegen wurde er einmal sehr energisch gegenüber ein paar Kindern, die ihn ärgerten und mit Steinen warfen, er flog einem Jungen ins Gesicht, warf die Brille herunter, kratzte dabei sehr heftig und zog sich schnell wieder zurück. Sein besonderer Lieblingsplatz war das Brückengeländer des Aquariums des benachbarten Schulgartens, wo er ebenfalls viel beobachtet wurde.

Bronzeflügeltaube.

Was die Nahrung anbelangte, war er wenig wählerisch. Natürlich bildete rohes Fleisch, vor allem von Rind und Wild, den Hauptbestandteil. Dabei ist nicht zu vergessen, daß er neben diesem auch Haare, Federn und Knochen zu seinem gesundheitlichen Wohlbefinden bekommen muß; am geeignetsten sind hierzu Mäuse und Sperlinge. Auch habe ich ihm öfters gekochtes Fleisch gereicht, ja nicht einmal Aas verschmäht er. Ist man in Futterknappheit, so nimmt er auch jederzeit gekochte Kartoffeln und zwar in ziemlichen Mengen. Überhaupt was die Quantität des Futters anbetrifft, ist er, wenn hungrig, kaum zu sättigen. Er nimmt sehr, sehr viel in sich auf und kann bequem ein Pfund Fleisch am Tag verdauen, eine Menge, die ihm jedoch keinesfalls gereicht werden darf. So gefüttert, wird er zwar nie zum Selbstfangen angeregt, aber ich habe das auch nicht bezweckt, um meinen Singvogelbestand nicht zu gefährden. Nur einmal habe ich gesehen, daß er einen Sperling fing und mit „Haut und Haaren" verzehrte. Auch Molche, die

ihm am Aquarium gereicht wurden, verspeiste er, nahm sie aber nur mit sichtlichem Unbehagen. Die Kleinvögel läßt er sonst alle in Frieden und sie nehmen ebensowenig Notiz von ihm, ausgenommen die Amseln, die durch anhaltendes „Schäckern" auf ihn reagieren. Endlich möchte ich noch ein Beispiel von der Unwissenheit der Bevölkerung über diese Tiere anführen. Als er einmal einige hundert Meter weit in einen Nachbargarten geflogen und hier eingefangen war, baten mich die Leute, ihn wieder abholen zu lassen und hatten ihm als Futter — Gras vorgeworfen!

In diesem Zustand der größten Freiheit, aber auch ebensolcher Anhänglichkeit verbrachte er etwa 10 Wochen. Leider fiel er dann einem Schießer zum Opfer.

Spiegeltrupial.

Diese erste Tätigkeit auf dem Gebiet der Raubvogelpflege hat mir manche Erfahrung eingebracht, die ich später bei meinen Falken gut zu verwerten wußte. Wenn er anfangs nicht so zahm war, wie man es erwarten konnte und ich es bei späteren Raubvögeln erreicht habe, so ist der Grund wohl hauptsächlich darin zu suchen, daß ich ihn erst im Alter von 4 Monaten erhielt und es nie versucht habe, ihn mir durch die Kappe oder tagelanges Hungern unterwürfig zu machen. Trotzdem hatte ich ihn so weit gebracht, daß er sich sein Fleisch von der Faust holte und es in nächster Nähe tröpfte. Die Beschäftigung mit ihm hat mir immer große Freude gemacht.

Unberechtigte Amtshandlung eines Polizeibeamten.

Von A. Jena, Ornis Nr. 98.

(Nachdruck verboten.)

Von befreundeter Seite erhalte ich heute einen Brief aus dem Kreise Leobschütz, Oberschlesien, zugesandt, dessen Inhalt zum Teil auch für die Leser der „Gefiederten" von großem Interesse sein dürfte.

Ich zitiere wörtlich: „aber wir sind gehindert, da wir seit neuester Zeit nicht einen einheimischen Vogel im Zimmer halten dürfen. Unsere Landjäger behaupten, es ist verboten, im Zimmer sie zu halten. Nun wurden mir, der ich weder eine Strafe, noch sonst irgend etwas am Kerbholz habe, durch den Herrn Landjäger N. die folgenden Vögel, welche schon nicht mehr fliegen konnten, weil sie zum Teil noch in der Mauser waren, ohne daß ich zu Hause war, in den Hof geworfen für die Katzen: 1. eine Kalanderlerche von einem alten Ornismitglied, welche vier Jahre alt war; 2. eine Heidelerche und ein Fink, welche ich von Freunden geschenkt bekam, und ein Zeisig, welcher von meiner ersten Frau stammt als Andenken."

Ich habe natürlich keine Gelegenheit, auch den anderen Teil zu hören, und so die Beweggründe zu obiger Amtshandlung zu erfahren. So viel mir bekannt ist, gilt in Oberschlesien immer noch das alte preußische Vogelschutzgesetz, welches in der Jagdordnung vom 15. Juli 1907 festgelegt ist, und außerdem gelten die Bestimmungen des Reichsvogelschutzgesetzes vom 30. Mai 1908. Während Bayern unterm 5. Mai 1913 und Württemberg unterm 30. Juli 1914 eigene sehr scharfe Bestimmungen als Ergänzung zum Reichsvogelschutzgesetz von 1908 herausgaben, ist mir bis heute nichts bekannt geworden, daß auch in Preußen neue Verordnungen erfolgt sind; es besteht also dort noch die Reichsverordnung allein zu Recht und nach dieser ist das Halten von Vögeln irgendwelcher Art im Zimmer mit keinem Wort verboten, sofern sie auf gesetzlich zulässige Weise erworben sind, d. h. erstens in der Zeit vom 1. Oktober bis 28. Februar jeden Jahres (§ 3), und zweitens nicht durch verbotenen Fang (§ 2), sondern durch Ankauf, Tausch oder Schenkung; verboten ist der Erwerb eines Vogels in der offenen Zeit auch dann, wenn dem Käufer bekannt ist, daß

der Verkäufer den Vogel selbst gefangen hat, ohne dazu berechtigt gewesen zu sein. § 7 bestimmt die Einziehung der verbotswidrig in Besitz genommenen, feilgebotenen oder verkauften Vögel, ohne Unterschied, ob die einzuziehenden Gegenstände (Vögel) dem Verurteilten gehören oder nicht.

Wenn ich der Schilderung obigen Briefes Glauben schenken darf und ich habe bis jetzt keine Veranlassung, es nicht zu tun, so muß ich annehmen, daß die betreffenden Vögel nicht verbotswidrig in den Besitz des Geschädigten gekommen sind, und daß auch bei den dortigen andern Vogelliebhabern irgendwelche Verstöße gegen die Verordnungen des Reichsvogelschutzgesetzes nicht vorgekommen sind, an denen der Briefschreiber direkt oder indirekt beteiligt gewesen wäre. In diesem Falle ist das eigenmächtige Vorgehen des Landjägers ganz energisch zu verurteilen und es ist dem Geschädigten zu empfehlen, sich von dem betreffenden Landjäger das Gesetzblatt zeigen zu lassen, auf das er sich bei seiner Amtshandlung gestützt hat und auch für die Behauptung der übrigen Landjäger, daß das Halten von Stubenvögeln verboten ist, würde ich mir von denselben genaue Belege einfordern, dazu hat ein freier deutscher Bürger ein gewisses Recht. Können die Belege nicht beigebracht werden, was ich nach den mir bekannten Bestimmungen kaum glaube, so würde ich Privatklage auf Ersatz des weggenommenen Besitzes erheben, auf jeden Fall aber noch wegen Tierquälerei beim Gericht Anzeige erstatten, weil die betreffenden Vögel nicht in einem solchen körperlich gesunden Zustande waren bei der sog. Infreiheitsetzung, wie es für ein Individuum, das so vielen Feinden ausgesetzt ist, unbedingt erforderlich ist. Es zeigt auch von einem vollkommenen Nichtverstehen des Gesetzes, und es lag auch dem Gesetzgeber völlig fern, wenn man z. B. in diesem Fall dem Vogel die Wohltat des Schutzes dergestalt fühlen läßt, daß man ihn in kaum flugfähigen Stadium in einen mit Katzen bevölkerten Hofraum flattern läßt, wo sein baldiger Tod mit Sicherheit anzunehmen ist. Das ist eine energisch zu bestrafende gemeine Gefühlsroheit. Dieser ganze Fall zeigt wiederum recht deutlich, wie äußerst notwendig es ist, daß sich die Vogelliebhaber mehr denn je dem Reichsverband der deutschen Vogelliebhaber Sitz, Leipzig, anschließen, damit sie eine starke Organisation bilden, die bei Neuberatungen von einschlägigen Gesetzen ihre berechtigten Forderungen vertritt und auf Milderung der bestehenden Verordnungen hinarbeitet. Im übrigen wäre es wünschenswert, wenn sich der Reichsverband auch schon dieses Falles annehmen würde, damit auch dort wieder Ordnung geschaffen wird. Den betreffenden Brief würde Herr M. Sperling, Halle a. d. S., gern zur Verfügung stellen.

Kleine Mitteilungen.

Ein Paar blaue Brieftauben erbrütete bei mir in zwei aufeinander folgenden Bruten neben einem normal blau gefärbten ein reinweißes Junges. Beide Male war das weiße, sonst gut entwickelte Tier blind. M. B.

Als Geschlechtsunterschied beim Japanischen Möwchen findet man nur immer den Gesang des Männchens angegeben. Aber auch beim Weibchen gibt es, was wenig bekannt sein dürfte, ein sicheres Erkennungszeichen, und zwar im Lockton. Dieser enthält beim Weibchen stets ein „r". Er klingt wie tr tr—tr tr. Das ♂ bringt das „r" nicht. Bei einiger Übung wird man seine Tiere bald abhören und das Geschlecht sicher feststellen können.

Berlin-Niederschönhausen. Max Beyer.

Sprechsaal.

(Steht den Abonnenten kostenlos zur Verfügung.)

Auf Frage 14. Als Mittel gegen Vogelmilben wird empfohlen, die infizierten Vogelkäfige nach gründlicher Reinigung mit heißem Sodawasser mit einer Mischung aus ½ Liter Leinöl, ¼ Liter Petroleum und ¼ Liter Teeröl zu überstreichen, während die Sprungstäbe nur an beiden Enden in die Mischung einzutauchen sind.

Auf Frage 15. Der hier geschilderte Vorgang ist jedem Vogelliebhaber, welcher mehrere Körnerfresser im größeren Käfig hält, bekannt. Er entwickelt sich in der Weise, daß einer der Insassen infolge einer beliebigen Ursache nachts erwacht, wegen einer in der näheren Umgebung des Käfigs — etwa durch Aufhängung eines Kleidungsstücks, eines Handtuchs oder dergleichen — eingetretenen Veränderung erschrickt und in seinem Schrecken dann wie unsinnig im Käfig herumtobt, auch seine Käfiggenossen mit fortreißt. Sobald man Licht macht, pflegen sich die Tiere bald wieder zu beruhigen. Als Mittel zur Abstellung dieser Unart dürfte es sich empfehlen, den Käfig während der Nachtzeit regelmäßig mit einem dunklen Tuche zu verhüllen, damit die Vögel gar nichts von ihrer Umgebung sehen. Das Erwachen eines Vogels könnte möglicherweise durch Milben verursacht sein. Es erscheint daher ratsam, zu prüfen, ob der Käfig etwa solche Plagegeister beherbergt, die dann natürlich vor allen Dingen zu beseitigen wären.

M. Jacobs.

Vom Vogelmarkt.

Von seltener auf den Vogelmarkt kommenden Vögeln werden angeboten:

Schöll, Garmisch (Bayern): Gestaltskanarien, Zitronenhochgelbe Landkanarien.

Friedrich Lange, Wiesau, Kr. Glogau: 1,1 Feuerflügelsittiche.

E. W. Lenger, Berlin N. 58, Schönhauser Allee 70a: Gelbnackenamazonen, Mohrenkopfpapageien, Bergpapageien, tarant, Weißhaubenkakadu, Mexikan. Goldhäher, Weißkopfviehweber, Tahaweber, Schuppenköpfchen, Glockenvogel, Rote Kardinäle, Karmingimpel, Rotrückige Würger.

Artur Schiebe, Zschopau i. Sachs., Marienstr. 17 (A.Z.-Mitgl. 282): 1,1 Maskengrasamandinen.



Herrn M. J., Karstlingerode; Herrn A. K., Anklam; Herrn F. F., Düsseldorf-Grafenberg; Herrn A. J., Biberach; Herrn K. K., Eiche. Beiträge dankend erhalten.

Herrn F. M. Den angebotenen Vogel zeigt die Abb. S. 270.

Herrn E. E., Barmen. Brief ist mit Adresse versehen weiter befördert worden.

Herrn Dr. L., Brüssel, ist brieflich Bescheid zugegangen.

Herrn W. S., Althaldensleben. 1. Das Zustandekommen einer Brut wird verhindert, wenn man den Wellensittichen keine Nistkasten gibt. 2. Da noch andere Vögel hinzukommen, würden 3—4 Paare W. anfänglich genügen, auch schon der besseren Überwachung der Bruten wegen. 3. Obgleich ich das Zusammenhalten von Ausländern mit heimischen Vögeln nicht gutheiße, würde ich unter den obwaltenden Umständen raten, heimische Finkenvögel in den Flugkäfig mit einzusetzen. Das Zeichen ♂ bedeutet „Männchen", ♀ „Weibchen".

Herrn A. K., Anklam. Der Vogel war der schwarzschnäblige Mahaliweber — Plocepasser melanorhynchus *Rüpp.*

(Fortsetzung auf der 3. Umschlagseite.)

Bevorstehende Vogelschauen.

Berlin. Vogelschau des Landesverbandes Preußen von Mittwoch, den 19. Nov. bis Sonntag, den 23. Nov. 1924 in den Sophiensälen, Berlin C, Sophienstr. 17/18.
Heidelberg. Vogelschau am 1. und 2. Nov. 1924.

Aus den Verbänden.

Verband deutscher Farben-, Gestalt-, Bastardkanarien- und Exotenzüchter und des Bayerischen Vogelliebhaber-vereins (e. V.) Sitz München, Ortsgruppe Augsburg. Jeden Samstag gemütliche Zusammenkunft beim Vogelwirt Joseph Leininger, Gasthof, Frohnhof—Peutingerstr. Jeden 1. Samstag im Monat Monatsversammlung ebendort. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. Als amtliches Vereinsorgan ist die „Gef. Welt" anerkannt worden.
J. A.: Hans Schwaiger, 1. Vorsitzender, Augsburg, Schöpplerstr. 9/II.

Aus den Vereinen.

„Aegintha", Verein der Vogelfreunde zu Berlin. Unsere Sitzungen finden an jedem 1. und 3. Donnerstag im Monat, abends 8 Uhr, im Vortragssaal des Aquariums statt. Fast in jeder Sitzung belehrende Vorträge und Besprechungen unter gütiger Mitwirkung unseres verehrten Ehrenmitgliedes Herrn Dr. Heinroth. Gäste gern willkommen.
J. A.: O. Vorbrodt, 1. Schriftf., O 112, Scharnweberstr. 18.

Vereinigung der Liebhaber einheimischer Vögel zu Berlin. Sitzung jeden 2. Donnerstag nach dem 1. und 15. des Monats im Vereinslokal zum „Alexandriner", Alexandrinenstraße 37 a. Gäste stets willkommen.
J. A.: P. Böhme, Schriftf., O 17, Rüdersdorfer Str. 69.

Verein Vogelschutz und -pflege zu Dresden. Versammlung jeden Donnerstag, abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Schillers Restaurant", Ecke Stifts- und Ehrlichstraße. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen.
Bernhard Kühn, Vorsitzender.

Alte Vereinigung der Vogelliebhaber zu Dresden. Versammlung jeden Freitag, abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Blasewitzer Hof". Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. J. A.: Matth. Meys, Schriftführer.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei zu Hamburg. Sitzungen finden statt jeden 1. und 3. Dienstag im Monat in Hüttmanns Hotel, Poolstr. 22, abends 8¼ Uhr. Nächste Sitzung Dienstag, den 21. Oktober 1924. Gäste sowie auch Exotenliebhaber stets willkommen.
J. A.: Arnold Weber, 1. Vorsitzender.

Vereinigung Hannoverscher Vogelliebhaber. Mitteilungsblatt niedersächsischer Vereine. Die nächste Nummer erscheint erst im November, deswegen schicken wir diese besondere Drucksache. Wir bitten genau das zu beachten, was über unsere Vereinigung in diesem Mitteilungsblatt steht, da wir das nicht immer wiederholen können. Die letzte Nummer — 4 — ist vor einigen Tagen verschickt. Bekommt jemand das Blatt nicht regelmäßig, so bitten wir um Bescheid. — Nächste Vorträge. Unsere Versammlungen sind jetzt wieder im Landesheim, Volgersweg 61, und zwar meist am zweiten Donnerstag jedes Monats 8¼ Uhr. Die nächsten Versammlungen mit Vorträgen sind am Donnerstag, dem 13. November, Troschütz: „Der Kärrekiet" und Donnerstag, dem 11. Dezember, Winter: „Das Alter der Vögel". — Futter. Beim Mitglied Determann, Schillerstr. 33, können Mitglieder, die sich in den nächsten Tagen melden, noch preiswert Weißwurm, Ameiseneier und Sitzstangen abholen. Auch können dort Bestellungen auf Dattel- und Feigen-Abfallfutter eingetragen werden. — Beiträge. Von mehreren Mitgliedern ist der Sonderzuschlag 1924 von M. 1.— für Schaffung eines Vogelhauses im neuen Zoo noch nicht bezahlt worden. Wir bitten, die rückständigen Beiträge schleunigst an Mitglied Determann abzuliefern. Das Vogelhaus muß und wird kommen, und wir wollen dabei nicht fehlen. Wer es irgend kann, möge für den Zweck eine Sonderstiftung machen. Wir sorgen dafür, daß die Gelder in unserem Sinne verwandt werden. — Sollten Mitglieder, was wir nicht hoffen, die Absicht haben, im nächsten Jahre nicht mehr Mitglied zu bleiben, so können wir solche Kündigungen nur gelten lassen, wenn sie bis spätestens 15. Oktober beim Mitglied Determann vorliegen; dann wird die neue Liste aufgestellt. — Vogelbestand. Bis Ende d. J. muß unbedingt jedes Mitglied an Mitglied Appel, Nienburger Str. 7A, seinen augenblicklichen Vogelbestand mitgeteilt haben. Wir erwarten aber auch Bescheid, wenn jemand augenblicklich keine Vögel hält. Wir wollen Anfang des nächsten Jahres wieder eine lückenlose Statistik aufstellen, die auch in den Fachzeitschriften veröffentlicht wird. Lassen Sie uns nicht so oft darum mahnen wie im Vorjahr! — Werbung. Jedes Mitglied werbe, wie manche es vorbildlich tun, neue Mitglieder, die zunächst gern als Gäste kommen können. Vor allem bitten wir nochmals diejenigen, die sich unserem Vereinsleben meist fernhalten, um regere Beteiligung. Mit der Beitragszahlung allein ist es nicht geschehen. Wir brauchen Mitarbeit und Mitglieder, die sich all das, was wir bieten können, auch zunutze machen und es wertvoll an andere weitergeben, aber wie oft betont, nicht nur Vogelhalter brauchen wir als Mitglieder, sondern auch Naturfreunde jeden Alters und Standes.
J. A.: Appel, Nienburger Str. 7A.

Verein von Vogelfreunden Karlsruhe. Gegr. 1888. Monatsversammlung jeden 1. Domerstag im Monat. Vorstandssitzung jeden 1. Donnerstag nach dem 15. im Vereinslokal „Goldener Adler".

Verein der Vogelliebhaber Königsberg (Pr.). Sitzung an jedem Freitag nach dem 1. und 15. des Monats, abends 8 Uhr im Vereinslokal „Kaiser-Kaffee", Kaiserstraße, Ecke Schnürlingsstraße. Gäste sind willkommen.
J. A.: Ernst Reinholdt, 1. Vorsitzender.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig. Vereinssitzungen jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat im Vereinslokal „Bauers Brauereirestaurant", Täubchenweg. Nächste Sitzung Donnerstag, den 16. Oktober. Gäste stets willkommen. J. A.: Johann Birk, 1. Vors.

Verein der Vogelfreunde Leipzig-Plagwitz. Vereinslokal: „Gosenschlößchen", Leipzig-Plagwitz. Sitzungen an jedem 1. und 3. Montag des Monats, abends 8 Uhr. Vogelfreunde sind stets willkommen.
J. A.: Karl Scholtissek, 1. Vorsitzender, Leipzig-Plagwitz, Lauchstädter Straße 30.

Verein der Vogelliebhaber zu Mannheim. Versammlungen finden alle 14 Tage Samstag abend 8 Uhr im Vereinslokal „Restauration z. gold. Falken" statt. S. 1. 17. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen.
Johann Daubmann, 2. Schriftführer.

Verein einheimischer Sänger Mittelthüringen. Alle, die freundlichst meinem Aufrufe gefolgt sind, werden für Sonntag, den 12. Oktober, nachmittags 2 Uhr, nach Gotha eingeladen. Treffpunkt Hotel Mahr, Inhaber David Mehlig. Weitere Freunde unserer schönen Sache sind herzlich willkommen. Pfarrer Schwabe, Großenbehringen.

Bayrischer Vogelliebhaberverein, Sitz München (E.V.). Jeden Samstag gesellige Zusammenkunft im Pschorrbräuhaus, Bayerstr. Jeden letzten Samstag im Monat Monatsversammlung im Vereinslokal ebendort. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. Rud. Engel, 1. Schriftführer.

„Ornis", Freie Bezugs-Vereinigung der Waldvogelliebhaber Deutschlands. Gegründet 1912. Auf vielseitigen Wunsch der alten Mitglieder wollen sich die Waldvogelliebhaber wieder in der „Ornis" zusammenschließen. Als amtliches Organ ist die „Gef. Welt" ausersehen worden, und werden die Artikel, die früher in den „Ornis-Blättern" erschienen, in obiger Zeitschrift gebracht werden. Aus diesem Grunde bittet die Geschäftsführung um eifrige Mitarbeit, damit unserer Waldvogelpflege wieder der Platz eingeräumt wird, der ihr gebührt. Anmeldungen sind unter Beifügung von 2 M. an den Geschäftsführer zu richten; Mitglieder erhalten auf Mischfutterbestellungen 5% Rabatt. Mit treudeutschem Gruß
Martin Sperling, Halle a. d. S., Südstr. 49.

Zoolog. Verein zu Zwickau i. S. Versammlung jeden Freitag nach dem 1. und 15. jeden Monats, abends 8 Uhr, im Restaurant „Zur Bleibe", Katharinenkirchhof. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen.
J. A.: Paul Schmidt, 1. Vors., Zwickau i. S., Bosenstr. 44.

Anzeigenteil

Die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 20 G.-Pf. berechnet. Aufnahme erfolgt gegen Voreinsendung des Betrages in Reichsgeld p
Brief od. auf unseren Zahlstellen: Postscheckkonto: Magdeburg 3148, Wien 156 687, Bern III 4326, Prag: Creditanstalt d. Deutschen unter Angabe des Zwec

Käfige u. Gerätschaften

Verk. Schindler-Voliere
(Metall) 1,85 m lang, 2,15 m hoch, 1 m tief, 3 Erker, 3 Zinkschubkasten, und 1 Tisch.
Julius Hahne, Berlin,
771] Christburger Str. 16.

Verkaufe
Weichfresserkäfige,
gut erhalten, billig. [772
Paul Oehme, Freiberg (Sachsen).

Vogel-Mistelleim
zum Fangen schädlicher Vögel, Ia klebend bei jeder Witterung, garantiert gebrauchsfähig, Dose 1,50 ℳ fr. von **A. Freitag Nchf.**, Frankenberg i. S. 6. Wiederverkäufer hohen Rabatt. [773

Vogel-Fangkäfige 2.50 und 4.50 ℳ, Schlagnetze f. kl. schädl. Vögel 1.90 ℳ, f. größ. 2.10 u. 2.40 ℳ. Katalog gratis. **J. Tannen,** Gronau 58 (Westf.). [774

Ia Mistelleim, echt laubgrün, liefert in anerkannt vorzüglichster Güte, solange Vorrat. **Adolf Kirschner,** [775 Arnsdorf-Haida (Böhm.), Roseggerstr.

Futtermittel

Vogelfutter [776
für Kanarien, Waldvögel, Exoten, Papageien, Weichfresser. Anerkannt bewährteste Mischungen auf Grund langjähriger Erfahrung. Liste 13 über Vogelfutter, Liste 5 über Vogelkäfige, Zuchtgeräte usw. mit etwa 400 Abbildungen.
W. Göpel, Leipzig,
Tröndlinring 1. Telephon 14 958.
Bei Anfragen bitte auf die „Gefiederte Welt" Bezug zu nehmen.

Mehlwürmer Pfd. 7 ℳ, 2/7 = 2 ℳ franco. Voreins.
777] **Jeltner, Breslau,** Weinstr. 12.

Mehlwürmer
geg. Einsend. v. 2.— Rentenmark 1/4 Pfd. franko versend. **D. Waschinski & Co.,** Biesenthal I (Mark). [778

Mehlwürmer
779] große gelbe Ware, 1/4 Pfd. franko geg. Voreinsend. v. Rm. 2. **Bonitas-Versand, Rostock i. M.**

Ornis-Haus
Halle-Saale
Gegründet 1912
Spezialität:
Individuelle Weichfresserpflege nach Angaben des Herrn Apotheker Adalbert Jena-Biberach-Riß. (Alleiniges Herstellungsrecht.)
Reform-Normal I, Volierenm.,
Reform-Normal II, f. Rotkehlchen, Schwarzplatten usw.,
Reform-Normal III, f. Nachtigall., Sprosser usw.,
Reform-Normal IV, f. Gelbspött., Goldhähnchen usw.,
Reform-Normal V, f. Schama usw.,
Körnerfutter Ia für jede Vogelart. [780
Inhaber langjähriger Fachmann, siehe „Ornis-Buch" (90 S.) Mk. 1
Preisliste auf Wunsch!

Ameiseneier!
Neue Tiroler ℳ 4.80, bei 10 Pfd. ℳ 4.60.
Weiße Silberhirse eintreffend.
Sommerrübsen, extrafein 9 Pfd. ℳ 3.70.
Hanf, deutsch., 9 Pfd. ℳ 3.15.
Hanf, mandsch., 9 Pfd. ℳ 2.88.
Distel, grau ℳ 4.80, bei 10 Pfd. 4.50.
Negersaat ℳ 3.80, bei 10 Pfd. 3.50.
Hirse Marokko, 9 Pfd. 2.25.
Sämtl. Futterarten, Zirbel, Sonnenblumen usw. bei
781] **Vogelfuttergroßhandlung**
Fritz Liesenberg
München 9, Sommerstraße 5.

Zur regelmäßigen Lieferung in großen Posten gegen Kassa werden gesucht: Seidenraupenschrot, Muska, Zecke, Insektenschrot.
Offerten an
Quaisers Futterhandlung Reichenberg i. B.
782] erbeten.

Prima echte Harzer
Kanarien-Edelroller
vielseit. Tag- u. Lichtschläger aus meiner bekannten Feinzucht, ℳ 12, Ia Zuchtpärchen ℳ 15. Porto, Verpack. ℳ 4.
Gebirgssommerrübsen,
nußsüße milde Kennerware, Postkolli ℳ 4,50 franko.
Freßsucht, Rotleibigkeit
Magen- u. Darmkrankheiten aller Vögel, auch bei Frischfängen, heilt absolut schnell und sicher mein Harzer Heilmittel. Einfache praktische Anwendung, 1000fach im Gebrauch! ℳ 2.50, ausreichend für mehrere 100 Tiere.
Rich. Heydenreich,
Bad Suderode 7 B, Harz.
Staatsmedaille, viele gold. Medaillen, seit 783] vielen Jahren an der Spitze.

Vögel

Grüne Wellensittiche
aus Freivoliere, von blutsfremden Eltern, Paar 14 ℳ, gibt ab
784] **R. Huth, Perleberg.**

[redacted]

Zeisige, Hähne, Stieglitze, Rothänflinge, Rote Gimpel und alle anderen Sorten Vögel empfiehlt für Liebhaber und Händler
Hermann Hornig
Vogelexporthaus [785
Zittau i. S., Neusalzaer Straße 17.

[redacted]

Vertausche
Dr. K. Ruß: „Bilder aus der Vogelstube" gebunden, Dr. K. Ruß: „Die Prachtfinken (Pflege u. Zucht)", Jahrgang 1920 Gef. Welt gebunden sowie 1923er Kanarienhahn und 2 prima Weibchen gegen Vögel jeder Art (Körnerfresser) am liebsten Exoten. Angebote an
Valentin Rohrer, Lorsch (Hessen),
786] Wormser Straße 29.

Kalanderlerchen
30 ℳ, Steinrötel 35 ℳ, Orpheusgrasmücken 35 ℳ, Stieglitze, Zeisige 1,50 ℳ, blaue Tangaren 10 ℳ, weiße Dohlen 40 ℳ, Uhu zur Jagd 200 ℳ, Haselmäuse 4 ℳ, Siebenschläfer 5 ℳ, Baumschläfer 8 ℳ, schwarze Eichkatzen 10 ℳ, Frettchen zur 787] Jagd 20 ℳ liefert
Guido Findeis, Wien, I, Wollzeile 25.

Verkaufe [788
einige junge u. alte Möwchen St. 7—8 ℳ
A.-G. v. Zitzewitz, Berlin W 50, Kurfürstendamm 243. A. Z.-Mtgl. 308.

Suche zu kaufen:
Je 1 Gold-, Grau-, Rohr-, Garten-, Zaun- u. Zippammer
1 Birkenzeisig **1 Schneefink**
1 Leinzeisig **1 Hakengimpel**
1 Berghänfling **1 Karmingimpel**
Max Sörries, Köln,
789] Alteburger Straße 79.

Jeder
Pfarrer, Lehrer, Förster, jeder Vogelliebhaber, auch jeder
Gebildete
sollte
die Zeitschrift für Vogelliebhaber
„Die Gefiederte Welt"
lesen!
Abonnement monatlich (4 Nummern) 1,50 Gm. vermittelt das nächste Postamt bezw. der zuständige Briefbote
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung
Magdeburg Postschließfach 148

Ab 1. Oktober
gebe an guten Sängern ab:
1,0 Amsel 5 ℳ, 2,0 Singdrosseln à 8
1,0 Gartengrasmücke à 8 ℳ, 2,0 R
kehlchen à 5 ℳ, ferner eine Partie L
tauben à Stück 4 ℳ.
Suche Ia Sprosser, auch Spötter.
791] **Pfarrer Schwabe,**
Großenbehringen bei Gotha

Hänfling × Kanarien
diesj. Zucht, ges., kräft. Vögel, fl
Sänger, verk. à 15 ℳ.
Max Mettendorff, Berlin N 5
792] Sonnenburger Str. 9.

Für Kanarienzüchter
Soeben erschienen:
Die Farben- und Gestaltkanarien
nebst Beschreibung aller v
schied. Kanarienrassen, der
Entstehung, Form- u. Farbe
veränderung, Bastardzucht
Farbenfütterung v. A. Asch
brenner. Mit vielen fa
haltigen Abb. Kart. 1.75
Wichtig zur Zucht:
Der Kanarienvogel,
seine Naturgeschichte, Pfle
u. Zucht von Dr. Karl Ru
14. Auflage. Mit 2 Farbe
tafeln und zahlreichen Te
abbildungen. Bearbeitet v
Karl Neunzig.
Kart. 2.50
Die Bastardkanarienvoge zucht.
Von Walter Barth.
20 Abbildungen und 1 To
drucktafel. 1.50
Der Kanariengesang.
Allgemeinverständliche so
musikalische und phonetis
Darstellung von W. Klu
1.00
Zu beziehen durch:
Creutz'sche Verlagsbu handlung, Magdeburg
Postschließfach 148.

Beschwerden weg Nichtzustellung der „G fiederten Welt" sind be zuständigen Postamt a zubringen.

Inserate
für das am 16. Okt. 1924 zur A gabe gelangende Heft 35 der Welt erbitten bis 11. Okt. 1924 f

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Berlin-Hermsdorf; für den Anzeigenteil: Rolf Kretschmann, Magdeburg, Postschließfach 148.
Verlag der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck: August Hopfer, Burg Bz. Mgdbg.

Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Jahrg. 53 | Den 16. Oktober 1924 | Heft 35

(Druckort: Burg, Bezirk Magdeburg.)

Webervogel und Widafinken.

Von A. Krabbe.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Ich gehe nun zu den einzelnen Arten über und beginne mit der

A. Gattung Blutschnabelweber — Quelea *Rchb.*, die 6 Arten zählt, von denen bisher 5 als eingeführt bezeichnet worden sind, nämlich der Blutschnabelweber aus Nordwestafrika mit seinen Variationen, dem äthiopischen Blutschnabelweber aus Nordostafrika, dem südafrikanischen Blutschnabelweber und dem Ruß' Blutschnabelweber, der in allen Verbreitungsgebieten angetroffen wird, sowie dem Rotkopfweber aus West- und Teilen Ostafrikas. An der beigegebenen Abbildung S. 274 sind die Hauptfärbungsunterschiede der drei Blutschnabelweber, nämlich Verbreitung der schwarzen Kopffärbung, deutlich sichtbar und die Unterscheidung darnach verhältnismäßig leicht.

Von den angeführten Arten besitze ich je ein schönes Männchen äthiopischer, Qu. aethiopica *(Sund.)* und Rußweber, Qu. s. var. russi *(Finsch)*. Reichenow hat den äthiopischen Blutschnabelweber aus Ostafrika, der eine in der Mitte unterbrochene Stirnbinde zeigt, mit Qu. intermedia bezeichnet. Der Rußweber ist als besondere Art nicht aufzufassen und wird von Reichenow als Variation des Blutschnabelwebers, Qu. sanguinostris, hingestellt. Der allen Vorkriegsliebhabern wohlbekannte „langjährige Vogelliebhaber" B. Wiese in Charlottenlund, früher Veile, hat sich in einen hochinteressanten Ausführungen im Jahrg. 1911 S. 163 ff. mit den Variationen des Blutschnabelwebers beschäftigt und auf Grund seiner gewissenhaften Beobachtungen 5 Typen aufgezeichnet, an Hand derer er unsere heutige Systematik verwirft. Ich muß mir versagen, näher hierauf einzugehen, empfehle aber den Interessenten die Niederschrift an der oben bezeichneten Stelle nachzulesen.

Meine beiden Weber kaufte ich als Paar aus in und demselben Transport bei der Firma Fockelmann im Mai 1923. Es ist an der Federstruktur deutlich ersichtlich, wie weit die schwarze Kopffärbung des Rußwebers gehen würde, falls sie sich etwa einstellen sollte. Während der beiden Jahre ist die Färbung konstant geblieben. — Blutschnabelweber sind, wie ich oben schon andeutete, harte und ausdauernde Käfig- und Volierenvögel von rastloser Bautätigkeit, die ihnen bei den Franzosen den Namen travailleur = Arbeiter, eingetragen haben. Im Käfig zänkisch, ohne dabei angriffslustig oder gar gefährlich, in der Voliere still vor sich hinlebend und stets mit sich und ihren nie fertig werdenden Kunstwerken beschäftigt, können sie Anfängern und Volierenbesitzern empfohlen werden, zumal sie zu den Exoten gehören, die stets in Mengen und zu den niedrigsten Preisen angeboten werden. Züchtung ist verhältnismäßig sehr selten gelungen und auch wohl wenig versucht worden. Für den Bau ihrer Nester, die zumeist halboffen als Spiel- oder Schlafnester hergestellt werden, nehmen sie am liebsten Kokos- und Agavefasern. Die Verpflegung ist die denkbar einfachste, sie begnügen sich mit einigen Sorten Hirse und etwas Spitzsamen, dazu einige Mehlwürmer, die sie, wie alle Weber, sehr lieben. Meine beiden benehmen sich wie ein Paar, weben zusammen an einem Nest, balgen sich dabei, balzen sich gegenseitig an und sind von morgens bis abends zur Unterhaltung ihres Pflegers tätig. Die Nestgeflechte können jungen und alten Vögeln gefährlich werden, weswegen sie in reichbesetzter Voliere von Zeit zu Zeit mit der Schere entfernt werden. Die Umfärbung zum Prachtkleid begann 1923 am 25. Juni und war am 20. Juli vollkommen beendet, dauerte also 25 Tage, genau dieselbe Zeitdauer wie im vorhergehenden Jahre. In großer Voliere mit freiem Licht und Sonne kommen die bei diesen Arten üblen Schwarzfärbungen — Melanismus — nicht vor, sondern die Vögel prangen in ihrem, im Vergleich zu andern Webern schlichten, aber ansprechenden Hochzeitskleid, das beim Männchen aus blutrotem Schnabel, schwarzer Kopfzeichnung — außer Rußweber —, mehr oder weniger rosarot überhauchter isabellgelber Ober- und Unterseite besteht. Über eine angenehme Stimme verfügen sie nicht, das „Schäck schäck" kann auf die Dauer im Zimmer lästig werden.

Anführen will ich noch, daß ich Mitte September im Vogelhause des Berliner Zoologischen Gartens, große Webervoliere, eine Anzahl äthiopischer Blutschnabelweber aus Abessinien gesehen habe, denen die rosarote Färbung fehlte. Ich führe dies darauf

zurück, daß sich die Vögel jedenfalls in der Ausfärbung aus dem Hochzeitskleid befanden und der rosarote Anflug als erstes verschwunden war. Die B. Gattung Feuerweber — Pyromelana *Bp.* zählt 16 Arten in Afrika, wovon 9 bereits eingeführt und als solche erkannt worden sind. Es sind dies Orangeweber, Flammenweber, Oryxweber, Tahaweber, Brand-, Sundevalls, Schwarzstirn-, Goldrücken- und Napoleonweber.

a) Orangeweber — P. franciscana.

Zu den meist bekannten, in wenigen Arten stets in Mengen angebotenen Webern gehören die Feuerweber, die ich allen Anfängern und Liebhabern farbenprächtiger und ausdauernder Exoten angelegentlichst empfehle, zumal sie selbst in beschränkten Verhältnissen noch da Vergnügen und Unterhaltung gewähren, unter denen andere Vögel stumpfsinnig ihr Dasein verbringen. Allen Besuchern meiner Vogelstube sind die leuchtend rot oder gelb und schwarz gefärbten Feuerweber sofort als besonders schön aufgefallen. Der bekannteste von allen dürfte der Orangeweber sein. Wenn Herr Pracht in seinem Zuchtbericht des Oryxwebers in Heft 29 diesen als den

Blutschnabelweber. Aethiopischer Blutschnabelweber. Südafrikanischer Blutschnabelweber.

zierlichsten der Feuerweber hinstellt, so möchte ich diese Beurteilung eher dem Orangeweber — soweit die Rotgefärbten in Frage kommen — zusprechen, denn er ist nicht nur der kleinsten einer, sondern auch der zierlichste und behendeste, ohne daß er sich so brunstverrückt gebärdet wie der Oryxweber. Alle Orangeweber, die ich bisher besessen habe, standen an feuerroter Färbung dem Flammenweber in keiner Weise nach. Unter weniger guten Verhältnissen, also im Käfig ohne Sonne und ohne Zugabe einiger Mehlwürmer — dies teure Futter wird der großen Schar wegen bei mir auch nur sparsam zugemessen — wird die Färbung mehr orangerot oder gar fahl hellrot. Dies ist aber nicht nur beim Orangeweber, sondern auch bei allen andern Feuerwebern bedingt. So tauschte ich einmal einen Napoleonweber — nach der Beschreibung des Vogels mußte es ein solcher sein — und ließ den Vogel zur Mitsendung mit andern an einen bekannten Liebhaber im besetzten Gebiet gehen. Die Empfangsbestätigung sagte mir, daß ich durch diesen Tausch in den Besitz des dritten Flammenwebers gekommen wäre und daß ein Irrtum des Absenders vorläge, welcher jedoch z. T. damit zu entschuldigen sei, daß dieser Vogel so fahl eingefärbt wäre, daß er eher gelb als rot aussähe und mit den bei mir besichtigten nicht zu vergleichen ist. Und dieses bei einem Flammenweber, der normal intensiv scharlachrot gefärbt ist. Herr Wiese berichtet im Jahrgang 1911 Seite 190, daß im Jahre 1910 eine abweichend gefärbte kleinere Form eingeführt worden ist, die sich durch leuchtend scharlachrotes Sommerkleid auszeichnete. Hinwiederum sah er einen Transport dieser Vögel, die durch gleichmäßige dottergelbe Färbung auffielen. Eine Gefiederbeschreibung des Orangewebers erspare ich mir seiner Gemeinheit wegen und verweise auf die beigegebene Abbildung S. 275 u. S. 279, die Kopfzeichnungen und damit die Hauptmerkmale von vier Feuerwebern, Flammen-, Oryx-, Orange- und Napoleonweber, deutlich zeigen. Die Länge beträgt 120 mm. Heimat ist Westafrika von Senegambien bis zum Niger, Ostafrika von Nubien bis Unjoro.

Ich habe stets Orangeweber besessen, darauf zurückzuführen, daß sich die als Napoleonweber erworbenen Vögel stets als Orangeweber einfärbten. Überzählige Tiere oder Paare gab ich dann an „Enthusiasten" ab. Jetzt besitze ich noch ein schönes Männchen. Aufgefallen ist mir, daß bei keinem andern Feuerweber als dem Orangeweber lange rote Schmuckfedern den Schwanz überragen, wodurch der Vogel einen besonders hübschen Anblick bietet. Immer haben sich diese Weber bei mir friedlich gezeigt. Sie klettern schwanke Zweige auf und nieder, balzen sich und andere Feuerweber an und erledigen unter Kopfverrenkungen und mit gesträubten Halsfedern zischend und gurgelnd ihr Gesangsrepertoir. Lebhaft, jedoch nicht stürmisch, eignet sich der Orangeweber für Gesellschaft mit Prachtfinken und dergleichen in kleinerer Voliere. Um die Weibchen kümmern sich die Männchen nicht im geringsten, so daß es für beschränkte Räumlichkeiten empfehlenswerter ist, nur die schön gefärbten Männchen zu kaufen und die stets grau gefärbten Weibchen fortzulassen, es sei denn, daß ein Zuchtversuch beabsichtigt ist. Feuerweber sind sehr schwer in der Gefangenschaft zur Brut zu bringen, mit Ausnahme des Oryxwebers, auf dessen Zuchtbericht von Herrn Pracht ich bereits hinwies. Worin dies seine Begründung hat, entzieht sich meiner Kenntnis. Mit Nesterbau haben sich meine Orangeweber nur sehr wenig beschäftigt; in den letzten Jahren ist mir nicht einmal ein halbfertiges Nest von ihnen zu Gesicht gekommen. Ein Orangeweber, den ich vor dem Kriege in einer schlecht beleuchteten Voliere von 4 cbm hielt, hatte in einen Fliederstrauch ein rundes Nest hineingewebt. (Fortsetzung folgt.)

Noch ein Wort zur Weichfresserfütterung.

Von M. Jacobs.

(Nachdruck verboten.)

In meinem Aufsatz über Weichfresserfütterung in Heft 24 vom 31. Juli d. J. hatte ich die Frage zur Erörterung gestellt, ob nicht ein geeigneter Ersatz

für Ameisenpuppen und Weißwurm zu beschaffen sei, auch gleichzeitig die Trockenfütterung verteidigt. Ich bin damit auf den Widerspruch mehrerer Vogelliebhaber gestoßen. Herr Groebel insbesondere sieht das Heil aller Vogelliebhaberei in dem Festhalten an der bisherigen Fütterungsmethode und hat mich auf eine Stelle in Rauschs „Gefiederte Sängerfürsten" verwiesen. Ich möchte darauf folgendes erwidern: Ich bin kein Neuling in der Vogelpflege, kenne die einschlägige Vogelliteratur und weiß auch die Erfahrungen eines Matthias Rausch wohl zu schätzen. Aber was nützt mir alle Theorie, wenn ich außerstande bin, dieselbe praktisch zu betätigen? Ameisenpuppen und Weißwurm sind sicher ideale Futtermittel, aber sie sind ja nicht zu beschaffen. Es geht mir mit ihnen genau so wie jenem Feinschmecker, der erklärte: „Dicke Bohnen und Bauchspeck sünd en schenes Eten, äwer wi kriegen se man nich!" Es wird kaum ein zweiter Vogelwirt in der beneidenswerten Lage des Herrn Groebel sein, jährlich 150 Pfd. frische Ameisenpuppen und 47 Pfd. Weißwurm einsammeln zu können. In Preußen ist das Einsammeln von Ameisenpuppen durch das Feld- und Forstpolizeigesetz unter Strafe gestellt und schon aus diesem Grunde mit besonderen Schwierigkeiten verbunden. Auch im Handel sind Ameisenpuppen und Weißwurm kaum zu haben. Die „Gefiederte Welt" brachte in den letzten Heften ausgerechnet nur drei Offerten getrockneter Ameisenpuppen; auf meine Bestellungen habe ich überhaupt keine Antwort erhalten, weil die Ware vermutlich inzwischen bereits verkauft war. Daß unter solchen Umständen das Streben nach Beschaffung eines Ersatzmittels berechtigt ist, wird mit Grund niemand bestreiten können. Da sich aber für einen mündlichen Gedankenaustausch hier im Gerdatale, wo weit und breit kein Vogelliebhaber aufzutreiben ist, keine Gelegenheit bot, blieb mir nur übrig, in den Spalten dieser Zeitschrift eine Aussprache zu suchen. Im verflossenen Jahre kam mir der Reichtum an Maikäfern zustatten, die mir einen erwünschten Ersatz für die fehlenden Ameisenpuppen lieferten; in diesem Jahre muß ich nach anderen Ersatzmitteln ausschauen. Der Artikel des Herrn Hampe über Weichfresserfutter in Nr. 29 der „Gefiederten Welt" bildet einen Beweis dafür, daß sich andere Vogelliebhaber in gleicher Notlage befinden. Man sollte auch meinen, daß Garnelenschrot oder Fischmehl den getrockneten Ameisenpuppen an Nährwert mindestens gleichkommen müßten, da nach einer mir vorliegenden Tabelle frischer Seefisch ohne Kopf je Pfund 50 Gramm Eiweiß und 1 Gramm Fett enthält. Bei der Verfütterung an zarte Weichfresser dürfte es allerdings darauf ankommen, diese Ersatzfuttermittel zur Vermeidung des der handelsüblichen Ware anhaftenden üblen Geruchs ungesäumt, möglichst noch am Fangtage, zur Darre zu bringen. Auch Fleischmehl muß ein geeignetes Ersatzmittel abgeben. Das in Küken- und Hundefutterfabriken präparierte Dörrfleisch für zarte Insektenfresser zu verwenden, würde ich allerdings Bedenken tragen, weil man seine Herkunft nicht kennt. Wenn man in Ermangelung von Ameisenpuppen und Weißwurm zu einem der im Handel angebotenen Universalfuttermittel greifen muß, wird man auch in der Hauptsache solche Ersatzfuttermittel erhalten. So bestand das von C. Capelle in Hannover hergestellte Universalfutter, welches in Ruß' Handbuch II für Vogelliebhaber besonders gelobt wird, früher auch von mir verwendet wurde, nach Ruß' Angabe aus Ameisenpuppen, Fleischteilen, Mohnmehl und dergl. Unter diesen Umständen wird man einen Versuch mit den bezeichneten Ersatzmitteln im Notfalle schon wagen dürfen. Bezüglich der von mir verteidigten Trockenfütterung hatte ich einen Widerspruch erwartet, da es immer gefährlich ist, an hergebrachten Gewohnheiten zu rütteln. Die Herren Groebel und Birk haben aber meine Behauptung, daß eine Unmenge zarter Weichfresser infolge der Fütterung mit angefeuchtetem Mischfutter zugrunde geht, nicht zu

Flammenweber.

Orangeweber.

Oryxweber.

Brandweber.

widerlegen vermocht. Ihre eigenen Anführungen lassen erkennen, daß namentlich von Neulingen in der Vogelpflege Fehler in der Anfeuchtung des Mischfutters gemacht werden. Solche Fehler werden durch die Trockenfütterung vermieden. Ich habe schon als Schuljunge Rotkehlchen und in späteren Jahren auch Schwarzplatten, sowie Sumpfrohrsänger und braunkehlige Wiesenschmätzer, die ich aufgezogen hatte, ohne Nachteil nur mit getrockneten Ameisenpuppen und Mehlwürmern unter Beigabe von Vogelbeeren gefüttert. Gegenwärtig gebe ich meinen Insektenfressern während des Sommers im wesentlichen frische Ameiseneier, solange solche zu haben sind. Alsdann gehe ich wieder zum Trockenfutter über. Nach meinen Notizen aus einer größeren Anzahl von Jahrgängen der „Gefiederten Welt" schwärmt man allerdings im allgemeinen nicht für Trockenfütterung, aber diese hat doch auch ihre Anhänger. Ich berufe mich in dieser Beziehung auf einen Bericht der Vereinigung Hannoverscher Vogelliebhaber in Heft 30 der „Gefiederten Welt", worin es heißt: „Herr Eskuche verlas einen Aufsatz über den Gelbspötter von Paul Rückert aus der neuen Berliner

Zeitschrift „Der Vogelliebhaber“. Aus dem verlesenen Aufsatz verdient hervorgehoben zu werden, daß Rückert seine Gelbspötter im Winter ausschließlich mit trockenen Ameisenpuppen und Mehlwürmern fütterte. Bei dem Übergang vom Sommerfutter reichte er anfangs 3—6 Würmer täglich und steigerte dann die Gaben bis zu 30 Stück (in zwei bis drei Zeiten). Mit dieser einfachen Fütterungsweise gelang es Rückert, seine Gelbspötter mehrere Jahre zu überwintern.“ Ferner beziehe ich mich auf den Aufsatz des Herrn Franz Fuchs in Heft 35 der „Gefiederten Welt“ über „Eisvögel und Zaunkönig“, worin derselbe sagt: „Ich fütterte letztere (zwei tadellose fleißige Nachtigallen) sowie ähnliche Vögel schon seit langen Jahren mit allerbestem Erfolge meist trocken.“ Nach solchen Erfahrungen kann man doch über die Trockenfütterung nicht ohne weiteres den Stab brechen! Ob die Anfeuchtung des Mischfutters oder die Trockenfütterung zweckmäßiger ist, kann schließlich nur der Erfolg entscheiden. Sehen wir uns nun einmal die erstere Methode etwas näher an. Die Anfeuchtung kann doch nur den Zweck haben, das Mischfutter verdaulicher zu machen. Diesen Zweck erreiche ich bei der Trockenfütterung dadurch, daß ich sämtliche Bestandteile trockne und im Mörser pulverisiere. Eine Gefährdung des Vogels durch Fehler in der Anfeuchtung ist bei der Trockenfütterung ausgeschlossen, ebenso ist ein Verderben des Futters durch Säuerung oder Gährung unmöglich. Ferner hat die Trockenfütterung den Vorzug, daß ich das Futtergemisch nicht täglich zubereiten muß, wie bei Verwendung geriebener Möhre, sondern den Bedarf für eine oder mehrere Wochen bereit stellen kann. Gegen die Verwendung der Möhre habe ich auch noch das besondere Bedenken, daß die Möhre durch längere Lagerung im Keller sehr an Wohlgeschmack verliert und ob sie überall für den zarten Vogelmagen verdaulich ist.

Solange mein Maikäferschrot noch reicht, füttere ich gegenwärtig etwa 50 % Käferschrot, 10 % rohes Rinderherz, 10 % Eierbrot aus 2 Pfd. Weizenmehl und 10 Eiern, 20 bis 25 % Holunder- und Ebereschenbeeren, sowie 5 bis 10 % gestoßenen Mohnsamen. Den Mohn halte ich für ein sehr wertvolles Futtermittel, er enthält 19 % Eiweiß, 18% Kohlehydrate, 41,5 % Rohfett, 6 % Rohfaser, 7 % Asche und 8 % Wasser. Er bindet die Entleerungen, gilt als Heilmittel gegen Durchfall und hat keinerlei gesundheitliche Nachteile für die Vögel, während vor der Hanffütterung gewarnt wird. Die Vögel, welche sich im Herbst vorzugsweise von Beeren nähren — dazu gehört nach Brehm auch das Blaukehlchen —, erhalten 50 % Beeren und entsprechend weniger animalische Bestandteile. Die Nachtigall füttere ich, solange ich noch keine trockenen Ameisenpuppen habe, vorläufig mit dem Universalfutter der Ornis-Vereinigung, dem ich $^1/_3$ Beerenschrot beimische. Daneben erhält sie täglich 3 Mehlwürmer. Mit dieser Fütterung habe ich bislang besten Erfolg gehabt. Die Vögel sind sämtlich gut durch die Mauser gekommen. Rotkehlchen und Zaungrasmücke sind bereits wieder im Gesang.

Die Entleerungen der Vögel haben vorschriftsmäßiges Aussehen, und zwar ohne Unterschied von denjenigen bei einer Fütterung mit Mischfutter, welchem versuchsweise frische Holunderbeeren beigedrückt waren. Diese Trockenfütterung hat unbedingt den Vorteil der Ersparung von Zeit, Mühe und Material, denn bei Verabreichung angefeuchteten Mischfutters muß ich täglich Reibe und Futternäpfe reinigen, was bei der Trockenfütterung fortfällt. Bei dieser gibt es auch keine Reste, die bei der anderen Methode nicht zu vermeiden sind. Da ich mir das Mischfutter für ein bis zwei Wochen vorbereiten kann, ohne ein Ranzigwerden des Futters befürchten zu müssen, kann ich bei Vornahme einer Reise ohne Gefahr die Fütterung meiner Vögel auch einmal anderen Händen anvertrauen. Hinsichtlich der Konservierung frischer Ameisenpuppen bemerke ich noch, daß das von mir angewandte Verfahren bereits von Ruß, wie folgt, erwähnt wird: „Der Bauführer Loffhagen (ein bekannter Berliner Vogelwirt) trocknet die Ameisenpuppen in den Sonnenstrahlen auf dem Dach halb aus, so daß er fast das ganze Jahr hindurch derartige frische Ameisenpuppen hat.“ Ich kann allerdings nicht in Abrede stellen, daß bei mir ein Teil der Ameisenpuppen blau geworden, auch ein geringer Teil ausgelaufen ist. Im wesentlichen habe ich die Ameisenpuppen aber sachgemäß verwenden können. Ich nehme jedoch mit Dank davon Kenntnis, daß das Abschwelken angeblich noch vorteilhafter ist. Zur Verfütterung des im Haushalte bereiteten Quarks habe ich mich, nachdem mir vor Jahren ein Schwarzplättchen daran eingegangen ist, noch nicht wieder entschließen können, weil der frische Quark sich nur sehr schwer mit den übrigen Bestandteilen des Futters vermischen läßt.

Haben meine Ausführungen auch nicht überall Anklang gefunden, so hatten sie doch wenigstens den Erfolg, die Anregung zu geben zu einer erneuten Erörterung der Weichfutterfrage von seiten erfahrener Vogelwirte, und auch damit wird der Vogelpflege gedient sein.

Neueinführungen und Seltenheiten.

Von Karl Neunzig.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Ein naher Verwandter des Kappapageis — Poicephalus robustus (*Gm.*) aus dem südöstlichen Teil des Kaplandes ist der

Benguellapapagei — Poicephalus robustus fuscicollis *(Kuhl).*

Er vertritt den Kappapagei in Westafrika, vom Gambia bis zum Gabun. Von englischen Forschern wird er als ein sehr wilder und scheuer Vogel geschildert, dem man sich nur nähern kann, wenn er in der trockenen Jahreszeit zum Trinken sich den Wasserstellen nähert. In seiner Lebensweise wird er sich kaum von der südlichen Form unterscheiden, von der Levaillant berichtet, daß seine Gewohnheiten und seine Lebensweise eine streng geregelte ist, eine Beobachtung, welche auch von andern Forschern bestätigt ist. Er fand sie regelmäßig des Morgens in ansehnlichen Flügen auf ganz bestimmten kahlen, toten Ästen sehr hoher Bäume, auf welchen sie sich sonnten und ihr feuchtes Gefieder trockneten. Ungefähr um 10 Uhr morgens zerstreuen sie sich, um zu fressen.

Ihre Nahrung besteht hauptsächlich in Nüssen und Samen einer eibenartigen Konifere (Podocarpus) und anderer Bäume. Die heißeste Zeit des Tages verbringen sie auf den schattenspendenden Waldbäumen; hier verhalten sie sich völlig ruhig, so daß man ihre Anwesenheit kaum merkt. Gegen Abend begeben sie sich wieder auf die Nahrungssuche. Dabei verhalten sie sich außerordentlich lärmend. Aus den Bäumen erschallt dann überall ihr lautes Gekreisch. Dann sammeln sie sich in großer Gesellschaft an den Wasserstellen, um zu trinken und zu baden. Auf kahlen Bäumen ordnen und glätten sie dann ihr Gefieder, um sich bald zu ihren Ruheplätzen für die Nacht zu begeben. Als Nest benutzen sie Baumhöhlen. Ihr Gelege, 3—4 weiße Eier, etwa von der Größe unserer Haustaubeneier, wird von beiden Gatten des Paares bebrütet. Sie fliegen sehr hoch und reißend schnell, wobei sie sehr schnell mit den Flügeln schlagen und fortgesetzt kreischen.



Benguellapapagei.

Gefiederbeschreibung: Kopf, Hals silbergrau, die Federn mit bräunlicher Mitte, unterer Teil der Wangen, Kinn bräunlicher; Federn an Stirn und Scheitel rosarot überlaufen; Zügel schwärzlich; Oberrücken, Schulter grünbraun mit reiner grünen Säumen; übrige Oberseite, Unterseite mit Ausnahme der grünlichgrauen Oberbrust, leuchtend grasgrün; Schenkel scharlachrot; Flügeldecken wie Rücken; Flügelbug und -rand scharlachrot; Schwingen und Schwanzfedern dunkelbraun; Auge braun; der sehr große, mit langen feinen Haken versehene Schnabel weißlich; Füße bleigrau; Lg. 330, Fl. 210, Schw. 85—95 cm.

Der zur selben Gattung, den Langflügelpapageien gehörende

Braunkopfpapagei — Poicephalus fuscicapillus ***(Verr. Des Murs)***

lebt in Ostafrika von Mombas bis Swasiland. In manchen Teilen seines Verbreitungsgebietes gehört er zu den am häufigsten auftretenden Papageien. Er lebt paarweise oder in kleinen Flügen und hält sich gern auf trockenen Baumwipfeln auf. In andern Gebieten belebt er die wilden Feigenbäume, welche häufig an den Ufern größerer Ströme wachsen. Die Früchte dieser Bäume bilden seine Nahrung. Die Flüge, welche in reißendem Flug mit schnellem Flügelschlagen und den üblichen Rufen dahinfliegen, fallen aber auch in die Kulturen ein, unter denen ihnen Maispflanzungen, die mit Negerhirse und Kafferkorn bestellten Felder reichlich Nahrung bieten. Er verzehrt auch allerlei Baumfrüchte und gern eine Erbsenart, die von den Eingeborenen angebaut wird. Die Pflanzungen sucht er täglich mehreremal heim.

Im Küstengebiet des Geländes um Mombasa fand Granvik diese Art sehr häufig in den Kakaopflanzungen in der Stadt selbst, wie in deren Umgebung. Er beobachtete aber nur einzelne Stücke oder einzelne Paare, niemals kleine Flüge. Seine Stimme ist schrill und weithin hörbar pfeifend, aber doch nicht so unangenehm wie die der verwandten Arten. In seinem Wesen ist er lebhaft, unruhig, ziemlich scheu und vorsichtig. Er versteht es ausgezeichnet, auch da, wo das grüne Blätterwerk ihn nicht unerkennbar macht, sich den Blicken des Beobachters oder des Jägers zu entziehen, indem er sich ähnlich wie die Spechte verhält und sich so geschickt hinter den Ästen verbirgt, daß nichts von ihm zu sehen ist. Ayres berichtet darüber, daß er oft eine halbe Stunde und länger bei einem trockenen Baume gestanden, „auf dem zwei oder drei eingefallen waren und von wo hin und wieder ihr lauter schriller Schrei ertönte, ohne sie sehen zu können,

obwohl man hätte meinen sollen, daß in dem kahlen Gezweig nicht eine Maus der Wahrnehmung entgehen könnte." Das Gelege wurde in Baumlöchern abgestorbener Bäume gefunden.

In den großen Orten Ostafrikas wird er vielfach in Gefangenschaft gehalten, und seiner Zahmheit wegen ist er sehr beliebt. Auch europäische Reisende haben über zahme Stücke dieser Papageienart berichtet.

Gefiederbeschreibung: Kopf, Hals braun, bei älteren mehr ins Graue, bei jungen ins Olivfarbene ziehend; Ohrgegend silbergrau; übriges Körpergefieder grün, an Bürzel, Oberschwanzdecken und Unterseite heller; Flügeldecken grün; am Rande der Außenfahne und der schwarzbraunen Handschwingen blaugrün; Armschwingen schwarzbraun, Außenfahne und bei den inneren auch die Innenfahne grün; Schwanzfedern schwarzbraun, Spitze und Außenfahne, die mittleren ganz grün verwaschen; Auge fahl gelb, fast weiß; Schnabel graubräunlich, Oberschnabel mehr gelblich braun, Füße dunkel grauschwarz; Lg. 220—250, Fl. 140—155, Schw. 65—75 mm.

Auf die kleinen Papageienarten, welche neu eingeführt sind, wie einige Arten Sperlingspapageien usw. komme ich später noch zurück.

Von kleineren Hühnervögeln ist mit Importen aus Mexiko wohl die schon früher ab und zu, aber recht selten in den Handel gelangte Massenawachtel — Cyrtonix montezumae (*Vig.*) (s. Abb. S. 239) von neuem zu uns gelangt und eine andere in Mexiko lebende Wachtel, die mexikanische Baumwachtel — Colinus pectoralis *J. Gd.* Beide Arten werden als „Massenawachtel" in den Handel gebracht. Ganz abgesehen von der Gefiederfärbung sind sie schon an dem plastischen Merkmal zu unterscheiden. Sie gehören verschiedenen Gattungen an. Die Gattung Breithaubenbaumwachtel — Cyrtonix *J. Gd.*, deren einzige Vertreterin die Massenawachtel ist, trägt am Hinterkopf eine aus sehr dichten, breiten, braunen Federn gebildete Haube, während die Angehörigen der Gattung Baumwachtel — Colinus *Less.* keine auffallenden Haubenfedern tragen. (Forts. folgt)

Birkhahnbalz.

Von Karl Duve, Hamburg.

(Nachdruck verboten.)

Sei ein Birkhahn, heißt was wünschen:
Habe ungestüme Triebe,
eine stark verwegene Liebe,
und im heißesten Verlangen

Braunkopfpapagei.

sei dein Ohr doch unbefangen,
spähe fest und spähe sicher!
In dem trunkensten Gekicher
sei dein Blick doch unbenommen,
ob die Feinde schleichend kommen:
Glut und Klarheit hab' zugleich. —
Ei, wer tut's dem Birkhahn gleich? (Laube.)

Ja, und auf jeder Feder trägt er noch dazu ein Auge, fügte ein alter Jäger zu diesen Versen. Grund genug, auch einmal die eigenen Sinne zu probieren und zu messen an denjenigen des Vielgerühmten. Also, auf zur Balz! Zwar Geld haben wir keins, eine Jagd zu pachten; aber da uns auch sonsten jegliche Mordgedanken an der Heide lebendiger Kreatur fehlen, brauchen wir auch keins. Ein bischen „Sinne messen" an seinen Hähnen wird uns der Jägersmann schon erlauben müssen. Wie denn unser lieber Wettermacher daheim an der Wand nach langem Wackeln und Zagen immer mehr nach der rechten, der schönen Seite, neigt, und der Himmel den fragenden Augen

seine Zustimmung erklärt mit der Prophezeiung des Wetterfingers, geht's in die Heide.

Es ist etwas eignes, so mutterseelenallein in die Heide zu wandern, wenn der Himmel seinen Festsaal droben anzündet und leise kuschelnd der Nachtwind durch die Föhren streicht; man sich selber sein Holz klaubt, sein Nachtmahl richtet und nachher zu Boden steigt in der kleinen Hütte — mit allem Freud und allem Leid allein auf seinem Lager liegt, in die Sterne schaut, den Stimmen der Nacht nachhorcht und ganz leise ins Traumland gleitet.

Rurururr rururr! Uithsch! Nee, ein Wecker war es nicht. Und sich selbst wieder finden muß man auch erst; dann wird dem Hirne so allmählich die Erinnerung lebendig. Da geht noch einmal der Balzruf, hart an der Tür. Die Augen bohren in den eben dämmernden Tag hinein. Nun aber sachte, ganz sachte — von wegen der Augen auf jeder Feder. Ich glaub', Ohren soll er ebenso viele haben. Man schleicht sich aus seinen Decken in die Hosen, in die Strümpfe bloß in einem fort, bald nahebei, bald ganz in der Ferne. Und dann kollert einer — nun, mehr als zehn Schritte voraus sicher nicht.

„Man" ist zuwege wie ein Wasserkessel drei Pointe vorm Siedepunkte. Nichts wäre blamabler, als sich von solch einem Lausehahn überlisten zu lassen, der uns im Abreiten dann recht innig zum Bewußtsein bringt, wie schwachsinnig wir im Verhältnis zum Heidehahn doch eigentlich sind. Das soll nicht, das darf nicht sein — man hätte ja den ganzen Tag an der stillen Wut zu fressen, von einem Birkhahn an der Nase herumgeführt zu sein. Und nichts kann man doch schwerer verwinden als dieses, das heißt, wenn man es überhaupt merkt. Also, die Gründe sind zu schwergewichtig, es ist besser, bäuchlings durchs Heidekraut zu kriechen. Erstens wird man da nicht so leicht gesehen, zum anderen sieht man selbst besser; denn dieser infame Nebel wallt immer dicker heran, und was noch viel infamer ist; an allen toten Heideblüten und Kiefernnadelspitzen hängt er kleine Silber-

Orangeweber (s. S. 274).

und die Stiefel. Knarrt eine Diele, jagt der Teufel durch die Nerven. Einen Augenblick überlegt man ... soll man um solch verliebten Hahn .... aber dann kollert der und hat uns schon an allen Nervenfasern feste. Wie ein Dieb schleicht man aus der eigenen Hütte — von wegen der Augen auf jeder Feder; man wirft der Waschkumme einen giftigen Blick zu, weil sie den anständigen Menschen in uns erweckte, der nach Seife und Wasser schrie. Man tötet den anständigen Menschen — von wegen der Augen auf jeder Feder. Man hat auch einen Magen, der nach der Leibordnung berechtigte Rechte auf gewisse Rechte hat. Man überhört ihn, er mahnt; man begöscht ihn, er murrt; man sendet einen inneren Fluch hinab, er schweigt — von wegen der Augen auf jeder Feder. Geladen voll Spannung wie eine Leidener Flasche geht's hinein in dickneblige, feuchte Heide. Zuweilen schlägt der Nebel seine Schwaden auseinander. Dann klopft das Herz bis zum Halse hinauf, und das Auge sieht überall Birkhähne; einmal war's aber nur eine Jungföhre, zum andermal ein Heideplacken. Von Hähnen nichts zu sehen. Die kollern und zischen tröpfchen. Das sieht nun manchmal ganz allerliebst aus, nur dann nicht, wenn man zur Balzzeit bäuchlings durch die Heide wandert. Steter Tropfen höhlt den Stein. Nun sind aber Kniebüchsen und Lodenjoppe schon lange keine Steine, und die steten Tropfen sind bald durch. Dafür macht dann die Epidermis ein ganz bitterböses Gesicht und stülpt lauter kleine Hügelchen auf, etwas, das man im gewöhnlichen Leben mit Gänsehaut bezeichnet. Nach einer Stunde Bauchweg ist man unter einer Kiefer gelandet und kämpft einen verzweifelten Kampf gegen die zwei Seelen in seiner Brust. Die eine schwärmt von warmer Hütte, Kaffeeduft und Butterbrot, die andere lockt mit Hahn übertölpeln, Sinne schärfen, sich nicht blamieren wollen. Der ersten springen Magen und Epidermis bei, der zweiten die nagende Forscherlust und des Hahnes lockend Kollern. Und während man als armes Opfer dieser zwei streitbaren Kämpen unter dem triefenden Föhrenbaum hockt, kommt der Gauch geflogen, kuckuckt siebenmal und verschwindet mit höhnischem Gekicher wieder im Nebel. Grübelnd greift man zum Aberglauben, dreht und

wendet die sieben Kuckucksrufe und weiß letzten Endes doch nichts damit anzufangen. Da hat der Nebel ein Einsehen: er schlägt seinen Faltenmantel auseinander und zeigt dem staunenden Auge ein tiefes Tal, darinnen — auch nicht ein Birkhahn. Zwar kollert einer wie toll, aber das muß drüben auf des Hügels Platte sein. Und darum eine Stunde Bauchwanderung durch feuchtes Heidekraut, darum die Mißhandlung des knurrenden Speisensackes? Beinahe hätten die, so den Leib vertreten, gewonnen; aber da machte der Hahn da drüben ein ganz wunderschönes „Uiithsch"! und auf dem Bauche lag er wieder. Nun hat uns aber einmal ein Gelehrter bewiesen, daß wir vor Urzeiten sowas wie Reptil gewesen und immer noch etwas in uns schlummere aus diesen Zeiten. Also, gilt's diese Erinnerungen auszukramen. Aber, Herrgott, muß das lang her gewesen sein; es wollte einem absolut nichts einfallen, um nun mit Hilfe reptilischer Erinnerungen bäuchlings den Berg zu bezwingen. Man griff also zur Einübung eines ganz neuen Bewegungsmodus und erreichte nach vieler Mühe einen leidlichen Fortschritt und die Höhe. Laut schoß der Jubel hoch, und doch durfte er sich nicht mucksen — von wegen der Augen auf jeder Feder. Zu sehen war vorerst auch nichts; denn das ließ der Nebel nicht zu. Aber die Ohren hatten vernommen, wie ein Hahn sein Gefieder schüttelte. Jetzt kollerte er sogar zum Greifen nahe, — nun raste geduldig und bitte den Nebel um gutes Wetter. Und er ließ sich erbitten, zog hinweg, und kaum sechs Schritte voraus stand der schwarzweiße Hahn mit den roten Nelken und tanzte, kollerte, fauchte — eine Lust anzusehen, und warm strömte das Blut zu Herzen; Ei, wer tut's dem Birkhahn gleich?" Da schoß das Blut jählings zurück; denn ganz sachte glitt der rechte Beinpfeiler des jubelnden Beobachters hinab und ihm nach der Beobachter selber. Ab polterte der Hahn, nein vier, fünf Hähne, und aus war's mit der Birkhahnbalz. Siehste woll, schrie der Magen, dafür die Quälerei räsonierte die Epidermis und „mich" haste ganz verschnupft, echote die Nase. Gebrochen schritt man heim. Als jedoch nachher die Sonne hoch stand, die Heidelerchen dududelten, der Baumpieper seinen Gleitflug machte und man längelang im Heidekraut döste, das nun schön trocken und warm war, da war die andere Seite wieder obenauf. „Und wenn die Hähne balzen, da sein wir wieder da!"

Kleine Mitteilungen.

Zu der Frage: **„Singen unsere Sommervögel in den Winterquartieren"** wird nachfolgende Angabe, entnommen der Arbeit „Die Sänger (Cantores) Ägyptens" von Prof. Alex. König, Journ. f Ornithol. 1924, interessieren. Es heißt dort S. 7 vom Weidenlaubvogel: „Nur stumm fand ich das Vögelchen, kaum daß es seinen feinen Lockton hier und da hören ließ, und niemals vernahm ich das liebliche zilp-zelp, das es im Zauber unseres Frühlings aus liebeglühender Brust so fröhlich von unsern Laubbäumen erklingen läßt." Ebenso verhielt sich der Fitislaubsänger. N.

Unser geschätzter Mitarbeiter **Herr Hans von Böttticher** in Koburg ist auf Empfehlung des früheren Zaren Ferdinand zum Direktor des Zoologischen Gartens in Sofia berufen worden.

Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber Sitz Leipzig.

1. Vorsitzender Joh. Birk, Leipzig-Mockau, Beuthstr. 29; Geschäftsstelle: Rudolf Petters, Leipzig-Probstheida, Preußenstr. 31; Kassierer Werner Geßler, Leipzig, Dresdner Str. 2; Tauschvermittlung — T.-V. —: Richard Vorwerk, Leipzig-Lößnig, Merveldstr. 39.

Nach der „Gefiederten Welt" Nr. 33 findet am 1. und 2. November d. J. in Heidelberg anläßlich der Tagung des Bundes für Vogelschutz eine Ausstellung für Vogelschutz und -pflege verbunden mit einer Vogelschau statt.

Wir möchten nicht versäumen, unseren verehrten Mitgliedern den Besuch warm zu empfehlen, weil wir versichern können, daß die Darbietungen mustergültig und außerordentlich reichhaltig sein werden. Wer Verständnis für unsere Sache hat, wird von dem Gebotenen befriedigt sein.

Unsere Aufforderung in derselben Nummer und Zeitschrift, uns zu veranstaltende Ausstellungen anzuzeigen, ergänzen wir noch dahingehend, daß beabsichtigt wird, soweit als irgend möglich zu jeder Veranstaltung einen oder mehrere Herren des Reichsverbandsvorstandes abzuordnen. Der Vorstand. J. A.: Rudolf Petters, 1. Schriftführer.

Vom Vogelmarkt.

Von seltener auf den Vogelmarkt kommenden Vögeln werden angeboten:

Guido Findeis, Wien I, Wollzeile 25: Kalanderlerchen, Steinrötel, Orpheusgrasmücken, Stieglitze, Zeisige, blaue Tangaren, weiße Dohlen, Uhu zur Jagd.

Max Mettendorff, Berlin N 58, Sonnenburger Str. 9: Hänfling×Kanarien.



Herrn F. in L. Die übersandte Auskunft für den Sprechsaal kann ich nicht veröffentlichen, denn die Folge wäre, daß der Sprechsaal ausgiebig zu Reklamezwecken benutzt würde.

Herrn H. F., Lehrte; Herrn J. G., Neuulm ist brieflich Bescheid zugegangen.

Herrn A. G., Lommatzsch; Herrn S. L., Bln.-Johannisthal; Herrn Studienrat A. K., Groß-Umstadt; Herrn O. S., Torgau; Herrn B., Bln.-Niederschönhausen: Beiträge dankend erhalten.

Herrn Studienrat O. K., Groß-Umstadt. 1. Durch das Reichsvogelschutzgesetz § 2 ist die Verwendung kleiner Netze zum Fangen einzelner Vögel nicht untersagt, sofern es nicht zur Nachtzeit, während Schnee liegt, oder in der Zeit zwischen 1. März und 1. Oktober geschieht und es sich nicht um den Fang von Vögeln handelt, welche das ganze Jahr hindurch geschützt sind. Zu beachten ist auch, daß landesrechtliche Bestimmungen der einzelnen Freistaaten, welche zum Schutze der Vögel weitergehende Verbote enthalten, unberührt bleiben. Ob solche für Hessen bestehen, ist mir nicht bekannt. Unter der Voraussetzung, daß solche Bestimmungen bezügl. der Würger für Hessen nicht bestehen, könnte der Rotrückenwürger zu jeder Zeit gefangen werden, da auf ihn nach § 8 die Bestimmungen des Gesetzes keine Anwendung finden. 2. In dem Raum können Schopfwachteln gehalten und gezüchtet werden. Schatten spenden in den Boden der Voliere eingepflanzte kleine Kiefern oder Fichten. Sie bieten der brütenden Henne auch Nistgelegenheit und Schutz.

Herrn G. Der Vogel ist die weißschnäblige Form von Müllers Edelpapagei — Tanygnathus mülleri. Der Schwanz der Vögel dieser Gattung ist abgerundet oder keilförmig, die Schwanzfedern haben aber abgerundete, nicht spitze Enden wie bei den Sittichen. Der Schwanz ist bei ihnen länger als beim Graupapagei oder bei Amazonen. Folgende Maße werden das zeigen: Müllers Edelpapagei Gesamtlänge 350 cm, Schwanzlänge 125 cm, Graupapagei Gesamtlänge 350 cm, Schwanzlänge 80 cm.

(Fortsetzung auf der 2. Umschlagseite.)

hrgang 53 16. Oktober 1924 Heft 35

DIE GEFIEDERTE WELT.

ZEITSCHRIFT FÜR VOGELLIEBHABER

Begründet von Dr. Karl Ruß

Herausgegeben von Karl Neunzig in Berlin-Hermsdorf

Inhalt:

Webervogel und Widafinken. Von A. Krabbe. (Fortsetzung).

Noch ein Wort zur Weichfresserfütterung. Von M. Jacobs.

Neueinführungen und Seltenheiten. Von Karl Neunzig. (Fortsetzung.)

Birkhahnbalz. Von Karl Duve, Hamburg.

Kleine Mitteilungen - Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber, Sitz Leipzig - Vom Vogelmarkt - Redaktionsbriefkasten - Bevorstehende Vogelschauen - Aus den Verbänden - Aus den Vereinen.

Abonnement monatlich (4 Nummern) 1.50 Gm. — Einzelpreis des Heftes 50 Gpf.
vermittelt das nächste Postamt bzw. der zuständige Briefbote. / Postversand ab Burg Bez. Magdeburg.

eutz'sche Verlagsbuchhandlung / Magdeburg / Postschließfach 148

Bevorstehende Vogelschauen.

Berlin. Vogelschau des Landesverbandes Preußen von Mittwoch, den 19. Nov. bis Sonntag, den 23. Nov. 1924 in den Sophiensälen, Berlin C, Sophienstr. 17/18.

Heidelberg. Vogelschau am 1. und 2. Nov. 1924.

Karlsruhe, Verein von Vogelfreunden. Gegr. 1888. Vogelschau und Kanarienprämiierung am 6. und 7. Dezember 1924.

Aus den Verbänden.

Vereinigung der Vogelliebhaber Landesverband Preußen. Wie schon früher erwähnt, veranstaltet obiger Verband in den Tagen vom 19.—23. November in den Sophiensälen, Berlin, Sophienstr., die „Zweite große Vogelschau". Geöffnet ist dieselbe von morgens 9 Uhr bis abends 9 Uhr. Das Eintrittsgeld beträgt 60 Pfg. Die Vorarbeiten zur Vogelschau sind in vollem Gange. Schon jetzt kann gesagt werden, daß dieselbe unstergültig werden wird. Wir bitten und hoffen, daß die Liebhabervereine, sowie Einzelmitglieder diese besonders reichhaltige Vogelschau recht zahlreich besuchen mögen. In der letzten Verbandssitzung wurde beschlossen, von einer Prämiierung abstand zu nehmen, jedoch stiftete Herr Professor Müller-Kämpf ein Gemälde von eigener Hand für beste Kollektion zarter Weichfresser. Ferner stiftete Herr Dähnick für beste Kollektion Körnerfresser 5 Fl. Weinbrand. Herr Lenger stiftete 30 M. Weitere Stiftungen sind zu erwarten. Den einzelnen Vereinen bleibt es überlassen, eine Prämiierung ihrer ausstellenden Mitglieder nach eigenem Schema vorzunehmen. Die gestifteten Gegenstände sind nur für ausstellende Liebhaber gedacht. Von seiten der Vereine werden drei unparteiische Preisrichter bestimmt. Zweck der Vogelschau ist, die Vogelkunde und Vogelliebhaberei in weiten Schichten der Bevölkerung zu tragen. In Sonderheit wird die Berliner Schuljugend zu ermäßigtem Eintrittsgeld zur Vogelschau geladen. In erfreulicher Weise hat die „A. Z." aus Anlaß der Vogelschau ihre Jahresversammlung nach Berlin verlegt. Wir hoffen, daß die Tage der Vogelschau in Berlin zum Treffpunkt aller Vogelliebhaber werden mögen.

P. Rückert. P. Böhme.

Verband deutscher Farben-, Gestalt-, Bastardkanarien- und Exotenzüchter und des Bayerischen Vogelliebhabervereins (e. V.) Sitz München, Ortsgruppe Augsburg. Jeden Samstag gemütliche Zusammenkunft beim Vogelwirt Joseph Leininger, Gasthof, Frohnhof—Peutingerstr. Jeden 1. Samstag im Monat Monatsversammlung ebendort. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. Als amtliches Vereinsorgan ist die „Gef. Welt" anerkannt worden.

J. A.: Hans Schwaiger, 1. Vorsitzender, Augsburg, Schöpplerstr. 9/II.

Verband deutscher Farben-, Gestalt-, Bastardkanarien- und Exotenzüchter (e. V.) Sitz München, Ortsgruppe Augsburg. Als Endziel langer, brieflicher Verhandlungen mit dem Verband deutscher Farben-, Gestalt-, Bastardkanarien- und Exotenzüchter (e. V.) Sitz München, kann die sportliche Fusion mit dem genannten Verband als gesichert gelten und hat auch der Augsburger Verein für Vogelzucht und Schutz die Umtaufe seines bisherigen Namens vollzogen. Der Verein führt fortab den Titel Verband deutscher usw. Ortsgruppe Augsburg und ist bei gleicher Interessen-Vertretung dem Münchner Stammverein als selbständige Gruppe angegliedert. Statuten sind die gleichen des Münchner Stammverbandes, nur ist der Jahresbeitrag statt auf 4,— auf 3,— M. festgesetzt worden, um uns die Selbstverwaltung zu erleichtern. Die Vorstandschaft setzt sich zusammen aus: 1. Vors. Herr Hans Schweiger, 2. Vors. Herr Wilhelm Huber, 1. Schriftführer Frau Marie Feuring, 2. Schriftführer Herr Anton Goß, Kassierer Karl Huber, Obmann Herr Oskar Feuring, sämtlich in Augsburg. Die Vereinsanschrift ist die des 1. Vorsitzenden Herrn Hans Schweiger, Augsburg, Schöpplerstr. 9 und sind alle Mitteilungen dorthin zu richten. Die Versammlungen finden allmonatlich am 1. Samstag im Café „Frohnhof" statt und sind gleichgesinnte Sportfreunde eingeladen.

Hans Schwaiger, 1. Vors.

Verband deutscher Farben-, Gestalt-, Bastardkanarien- und Exotenzüchter e. V. Sitz München. Der Einladung der neugegründeten Augsburger Ortsgruppe des Deutschen Verbandes nachkommend, machten sieben Münchner Mitglieder am 3. Aug. 1924 einen Abstecher dorthin und wurden vom Augsburger Vorsitzenden Hans Schweiger und den übrigen Herren des Ausschusses am Bahnhof empfangen. Ein Spaziergang im Stadtgarten und in der Stadt selbst füllten den Vormittag und hatten wir durch die Liebenswürdigkeit der Augsburger Herren Gelegenheit, die Sehenswürdigkeiten der alten Fuggerstadt kennen zu lernen. Nicht vergessen möchte ich den Besuch des Museums — wir waren alle überrascht von der Reichhaltigkeit der ornithologischen Sammlung —, sei es der heimischen oder auch fremdländischen Vogelwelt, und können wir dem dortigen ornithologischen Verein, der die Sammlung betreut, nur die vollste Anerkennung aussprechen. Besonders die heimischen Arten erfreuten durch ihre tadellose Gruppierung, naturgetreue Widergabe und großen Artenreichtum; auch die Fremdländer und da besonders die Kolibris, die in stattlicher Anzahl die Schaukästen füllten. Aber auch die tropischen Großtiere waren reichlich vertreten und kann sich die Sammlung als Kreissammlung wohl sehen lassen. Das Mittagessen wurde beim Herbergswirt eingenommen, auch ein aus alter Schule hervorgegangener Waldvogelliebhaber. Um 2 Uhr war die Versammlung anberaumt und hatten es sich die Augsburger Mitglieder nicht nehmen lassen, um zu Ehren ihr Versammlungslokal festlich zu dekorieren. Eine vorher kurz gehaltene Ausschußsitzung erledigte noch die Beitragsfrage und sonstige wichtig erscheinende Vereinsangelegenheiten. Eine Begrüßungsansprache des Augsburger Vorsitzenden Herrn Schweiger leitete die Versammlung ein und wurde vom Münchner Vorsitzenden des Deutschen Verbandes erwidert. Er begrüßte die Augsburger Vogelfreunde mit ihren Damen und dankte in bewegten Worten für die liebenswürdige Aufnahme und die freundliche Führung durch die Stadt. Weiterhin dankte er den Damen für die festliche Dekoration uns zu Ehren, die überraschend gekommen und nicht erwartet wurde. Er gab seiner Hoffnung Ausdruck auch fernerhin die Augsburger Kollegen in Fühlung zu haben und dankte besonders dem rührigen 1. Vors. Herrn Schweiger für seine Leistungen in den Vorarbeiten der Anschlußbewegung. Der übrige Teil der Versammlung war ein reges Frage- und Antwortspiel, um wiederholt mußte der Münchner Vorsitzende das Wort erbitten. Einen breiten Rahmen nahmen auch die Ausführungen des Züchterkollegen L. Heinemann-München in Anspruch, der sich in ausführlichen Worten über die Bestrebungen des Deutschen Verbandes verbreitete. Reicher Beifall belohnte die Ausführungen. Leider war die Zeit zu kurz obwohl Stoff genug vorhanden gewesen wäre, aber die Abgangszeit des Zuges drängte. Mit herzlichen Abschiedsworten, bei denen auch der feuchte Grund in Gestalt bayerischer Humpen nicht fehlte, verließen die Münchner Teilnehmer unter Wiedersehensversicherungen die gastlichen Augsburger Vogelfreunde. Ein Mitglied gab uns noch zum Bahnhof das Geleite und so schloß der Tag als Propaganda-Besuch in ungetrübter Harmonie.

L. Keidel, 1. Vorsitzende.

Aus den Vereinen.

Aufgenommen ist Mtg. Nr. 44 Otto Böneke, Hannover, Rambergstraße 36/A/II. — Die Jahresversammlung findet entweder am Bußtag, den 19. November oder Sonntag, den 23. November, nach Wahl der angemeldeten Mitglieder statt. Ich bitte zwecks Festsetzung des Programms etwaige Wünsche sofort mitzuteilen. Der Tag wird wie folgt ausgefüllt sein: Vormittags 10 Uhr Besichtigung der Ausstellung. Nachmittags 2 Uhr Besichtigung des Zoo unter Führung des Herrn Dr. He... Anschließend daran evtl. bei genügender Beteiligung, ar... von Nichtmitgliedern, Vorführung des großen Vogelfilms von Bengt Berg. Abends 7 Uhr Sitzung im „Patzenhofer" Friedrichstr. 71. Genaues Programm wird nach Festlegung des Datums bekanntgegeben

A. Krabbe, Anklam, Demminer Str. 10.

„Aegintha", Verein der Vogelfreunde zu Berl... Unsere Sitzungen finden an jedem 1. und 3. Donnerstag im Monat, abends 8 Uhr, im Vortragssaal des Aquariums statt. Fast in jeder Sitzung belehrende Vorträge und Besprechungen unter gütiger Mitwirkung unseres verehrten Ehrenmitgliedes Herrn Dr. Heinroth. Gäste gern willkommen.

J. A.: O. Vorbrodt, 1. Schriftf., O 112, Scharnweberstr. ...

(Fortsetzung auf der 3. Umschlagseite)

Vereinigung der Liebhaber einheimischer Vögel zu Berlin. Sitzung jeden 2. Donnerstag nach dem 1. und 15. des Monats im Vereinslokal zum „Alexandriner", Alexandrinenstraße 37a. Gäste stets willkommen.

Die Vereinigung begeht am Sonntag, den 19. Oktober im großen Saale des Vereinslokales „Zum Alexandriner", Alexandrinenstr 37a die Feier ihres 29. Stiftungsfestes. Anfang 4 Uhr. Einlaßkarten à 1 ℳ sind an der Kasse zu haben. Alle uns wohlgesinnten Freunde und Gönner sind hierzu freundlichst eingeladen.

J. A.: P. Böhme, Schriftf., O 17, Rüdersdorfer Str. 69.

Verein Vogelschutz und -pflege zu Dresden. Versammlung jeden Donnerstag, abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Schillers Restaurant", Ecke Stifts- und Ehrlichstraße. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen.

Bernhard Kühn, Vorsitzender.

Alte Vereinigung der Vogelliebhaber zu Dresden. Versammlung jeden Freitag, abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Blasewitzer Hof". Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. J. A.: Matth. Meys, Schriftführer.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei zu Hamburg. Sitzungen finden statt jeden 1. und 3. Dienstag im Monat in Hüttmanns Hotel, Poolstr. 22, abends 8¼ Uhr. Nächste Sitzung Dienstag, den 21. Oktober 1924. Gäste sowie auch Exotenliebhaber stets willkommen.

J. A.: Arnold Weber, 1. Vorsitzender.

Verein von Vogelfreunden Karlsruhe. Gegr. 1888. Unsere Monatsversammlungen finden künftighin jeweils jeden 1. Mittwoch im Monat statt. Lokal „Goldener Adler". Die diesjährige Vogelausstellung, verbunden mit Kanarienprämierung, findet am 6. und 7. Dezember d. J. statt. Außer Medaillen werden wertvolle Ehrenpreise vergeben. Zur Ausstellung werden nur Mitglieder unseres Vereins zugelassen. Nächste Vorstandssitzung Donnerstag, 16. Oktober d. J. im Vereinslokal „Goldener Adler", Karl-Friedrich-Str. Beginn ½9 Uhr abends.

Bang, 1. Vorstand. Boppel, 1. Schriftf.

Verein der Vogelliebhaber Königsberg (Pr.). Sitzung an jedem Freitag nach dem 1. und 15. des Monats, abends 8 Uhr im Vereinslokal „Kaiser-Kaffee", Kaiserstraße, Ecke Schnürlingsstraße. Gäste sind willkommen.

J. A.: Ernst Reinholdt, 1. Vorsitzender.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig. Vereinssitzungen jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat im Vereinslokal „Bauers Brauereirestaurant", Täubchenweg. Nächste Sitzung Donnerstag, den 16. Oktober. Gäste stets willkommen. J. A.: Johann Birk, 1. Vors.

Verein der Vogelfreunde Leipzig-Plagwitz. Vereinslokal: „Gosenschlößchen", Leipzig-Plagwitz. Sitzungen an jedem 1. und 3. Montag des Monats, abends 8 Uhr. Vogelfreunde sind stets willkommen.

J. A.: Karl Scholtissek, 1. Vorsitzender, Leipzig-Plagwitz, Lauchstädter Straße 30.

Verein der Vogelliebhaber zu Mannheim. Versammlungen finden alle 14 Tage Samstag abend 8 Uhr im Vereinslokal „Restauration z. gold. Falken" statt. S. 1. 17. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen.

Johann Daubmann, 2. Schriftführer.

Bayrischer Vogelliebhaberverein, Sitz München (E.V.). Jeden Samstag gesellige Zusammenkunft im Pschorrbräuhaus, Bayerstr. Jeden letzten Samstag im Monat Monatsversammlung im Vereinslokal ebendort. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. Rud. Engel, 1. Schriftführer.

Die Augustversammlung des Bayrischen Vogelliebhabervereins erledigte die gestellte Tagesordnung in gewohnt harmonischer Weise und konnten wir einen auswärtigen Vogelliebhaber, Herrn Fritz Rode aus Bad Salzuflen, in unserer Mitte begrüßen. Der Abend brachte neben Stiftungsfest- und Ausstellungsangelegenheiten noch weitere interne Sachen und konnten auch diese ihre Erledigung finden. Für das Winterhalbjahr stellte uns Herr Ing. Flierl einen größeren Vortragszyklus in Aussicht, ein Beginnen, das lebhafte Befriedigung auslöste. Die zirkulierenden Listen für Winterfutterbeschaffung und Ausstellungseinzeichnung lagen auf und fanden ihre Einträge. Der Schatzmeister erinnerte die Mitglieder der Beitragspflicht, da die großen Probleme, die wir zu stellen beabsichtigen, auch des klingenden Hintergrundes bedürfen und in diesem Punkte leider ein Fiasko zu verzeichnen ist. Wir appellieren also nochmal an das Pflichtgefühl der Säumigen.

Leop. Keidel, 2. Vorsitzender.

„Ornis", Freie Bezugs-Vereinigung der Waldvogelliebhaber Deutschlands. Gegründet 1912. Auf vielseitigen Wunsch der alten Mitglieder wollen sich die Waldvogelliebhaber wieder in der „Ornis" zusammenschließen. Als amtliches Organ ist die „Gef. Welt" ausersehen worden, und werden die Artikel, die früher in den „Ornis-Blättern" erschienen, in obiger Zeitschrift gebracht werden. Aus diesem Grunde bittet die Geschäftsführung um eifrige Mitarbeit, damit unserer Waldvogelpflege wieder der Platz eingeräumt wird, der ihr gebührt. Anmeldungen sind unter Beifügung von 2 M. an den Geschäftsführer zu richten; Mitglieder erhalten auf Mischfutterbestellungen 5% Rabatt. Mit treudeutschem Gruß

Martin Sperling, Halle a. d. S., Südstr. 49.

Zoolog. Verein zu Zwickau i. S. Versammlung jeden Freitag nach dem 1. und 15. jeden Monats, abends 8 Uhr, im Restaurant „Zur Bleibe", Katharinenkirchhof. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen.

J. A.: Paul Schmidt, 1. Vors., Zwickau i. S., Bosenstr. 44.

Vereinigung hannoverscher Vogelliebhaber. 45. Mitgliederversammlung, am 20. September 1924. Anwesend: 24 Personen. Als Mitglieder wurden neu aufgenommen: 143. Thies, techn. Mag.-Sekr., 144. Biewand, Oberstleutnant a. D. Unser Ehrenmitglied Decker hielt uns einen fesselnden, fein ausgearbeiteten Vortrag über die Herbstreise unserer Vögel. Er führte alle alten Vogelkenner und -wissenschaftler an, die hierüber geforscht und geschrieben haben, wie Bechstein, den alten Brehm, Palmen und vor allem Gütke-Helgoland. Trotz aller Forschungen kommt man bisher immer noch zu dem Endergebnis: „Wir wissen es nicht". Der eine sieht in dieser, der andere in jener Auffassung einen Fortschritt oder gar etwas Endgültiges, aber dann treten immer wieder neue Gesichtspunkte auf, die die bisherigen Ergebnisse verwirren. Natürlich stehen eine Reihe von Tatsachen fest, wie z. B., daß die meisten Vögel sehr hoch fliegen, ferner, wohin die Vögel gehen und auf welchen Zugstraßen, daß nordische weniger weit nach Süden fliegen als deutsche usw., aber die Beweggründe sind noch unsicher. Es wird wieder preiswertes Futter verteilt und in Aussicht gestellt. Der Vorsitzende berichtet über einen fesselnden Besuch bei Herrn Krabbe, Anklam, bei Hagenbeck und über unseren letzten Vogel-Ausflug, bei dem wir mehrere Stunden die größte Tierhandlung des Kontinents, Ruhe in Alfelo, besuchten. — Die Versammlungen werden wieder in das Landesheim verlegt. Die anwesenden Mitglieder des Lindener Nebenvereins werden gebeten, darauf hinzuwirken, daß man unserer Vereinigung treu bleibt. — Als Weichfutter wird das Ornis-Futter aus Halle gelobt. Der Vogelkundige Sunkel bittet, ihn bei seiner Forschung über Störche zu unterstützen, und an die Anregung schließt sich eine rege Aussprache über das so fesselnde Leben unserer Störche.

Bestellungen für November sofort der Post übergeben!

Bestellzettel für Deutschland.

Postbestellzettel.

Hiermit bestelle ich für den Monat **November 1924**

1 „Die Gefiederte Welt"

(eventuell mit Nachlieferung). — **Erscheinungsort Burg Bz. Mgdb.**

Name: .....

Wohnung: .....

Postquittung: .....Mk. .....Pf. sind heute bezahlt worden.

Ort: ..... den .....

Postannahme

.....

Anzeigenteil

Die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 20 G.-Pf. berechnet. Aufnahme erfolgt gegen Voreinsendung des Betrages in Reichsgeld per Brief od. auf unseren Zahlstellen: Postscheckkonto: Magdeburg 3148, Wien 156 687, Bern III 4326, Prag: Creditanstalt d. Deutschen unter Angabe des Zweckes

Käfige u. Gerätschaften

Ia Mistelleim, echt laubgrün, liefert in anerkannt vorzüglichster Güte, solange Vorrat. **Adolf Kirschner,** [793
Arnsdorf-Haida (Böhm.), Roseggerstr.

Vogel-Fangkäfige 2.50 und 4.50 ℳ, Schlagnetze f. kl. schädl. Vögel 1.90 ℳ, f. größ. 2.10 u. 2.40 ℳ. Katalog gratis.
J. Tannen, Gronau 58 (Westf.). [794

Vogel-Mistelleim

zum Fangen schädlicher Vögel, Ia klebend bei jeder Witterung, garantiert gebrauchsfähig, Dose 1,50 ℳ fr. von **A. Freitag Nchf.,** Frankenberg i. S. 6. Wiederverkäufer hohen Rabatt. [795

Futtermittel

Ameiseneier!

Neue Tiroler ℳ 4.80, bei 10 Pfd. ℳ 4.60.
Weiße Silberhirse eintreffend.
Sommerrübsen, extrafein 9 Pfd. ℳ 4.00.
Hanf, deutsch., 9 Pfd. ℳ 3.15.
Hanf, mandsch., 9 Pfd. ℳ 2.88.
Distel, grau, 10 Pfd. ℳ 4.80.
Negersaat 10 Pfd. ℳ 3.80.
Hirse Marokko, 9 Pfd. ℳ 2.25.
Sämtl. Futterarten, Zirbel, Sonnenblumen usw. bei
796] **Vogelfuttergroßhandlung**
Fritz Liesenberg
München 9, Sommerstraße 5.

Mehlwürmer

geg. Einsend. v. 2.— Rentenmark 1/4 Pfd. franko versend. **D. Waschinski & Co.,** Biesenthal I (Mark). [797

Mehlwürmer Pfd. 7 ℳ, 2/7 = 2 ℳ franco. Voreins.
798] **Jeitner, Breslau,** Weinstr. 12.

[799] **Mehlwürmer,** reine Ware, gegen Eins. von 1.75 ℳ 1/4 Pfd. franko.
Th. Witte, Niederndodeleben b. Magd.

Prima echte Harzer
Kanarien-Edelroller

vielseit. Tag- u. Lichtschläger aus meiner bekannten Feinzucht, ℳ 12, Ia Zuchtpärchen ℳ 15. Porto, Verpack. ℳ 4.

Gebirgssommerrübsen,

nußsüße milde Kennerware, Postkolli ℳ 4,50 franko.

Freßsucht, Rotleibigkeit

Magen- u. Darmkrankheiten aller Vögel, auch bei Frischfängen, heilt absolut schnell und sicher mein Harzer Heilmittel. Einfache praktische Anwendung, 1000fach im Gebrauch! ℳ 2.50, ausreichend für mehrere 100 Tiere.

Rich. Heydenreich,

Bad Suderode 7 B, Harz.
Staatsmedaille, viele gold. Medaillen, seit 800] vielen Jahren an der Spitze.

Vogelfutter [801

für Kanarien, Waldvögel, Exoten, Papageien, Weichfresser. Anerkannt bewährteste Mischungen auf Grund langjähriger Erfahrung. Liste 13 über Vogelfutter, Liste 5 über Vogelkäfige, Zuchtgeräte usw. mit etwa 400 Abbildungen.

W. Göpel, Leipzig,

Tröndlinring 1. Telephon 14 958.
Bei Anfragen bitte auf die „Gefiederte Welt" Bezug zu nehmen.

Zu Spottpreisen

lieferbar alle Arten **Einsatz- und Ausstellungskäfige, Transportbauer,** Nistkästen usw. in saubersten Verarbeitung. Auf Wunsch Musterkäfig (Weltbund) mit ausführlicher Preisliste gegen Voreinsendung von 1 R.-ℳ, welche bei Auftragserteilung wieder zurückvergütet wird. [802

G. W. Fricke, Käfigfabriken,
Braunlage-St. Andreasberg.

Händler, Exporteure Sonderrabatte.

Vögel

Zeisige, Hähne, Stieglitze, Rothänflinge, Rote Gimpel und alle anderen Sorten Vögel empfiehlt für Liebhaber und Händler

Hermann Hornig

Vogelexporthaus [803
Zittau i. S., Neusalzaer Straße 17.

Fingerzahme
Blaustirnamazone

mit Käfig 50 ℳ, **Alexandersittich** mit Käfig 30 ℳ. Verkaufe od. tausche gegen
804] **Prachtfinken.**
Julius Sauer, Leipzig,
Gewandgasse 5. A. Z.-Mtgl.

Empfehle in nur tadellosen und völlig eingewöhnten Exemplaren: [805

Singdrossel	Stck.	12.—
Schwarzdrossel	„	8.—
Gelbspötter	„	15.—
Gartengrasmücke	„	12.—
Schwarzplatte	„	10.—
Müllergrasmücke	„	6.—
Gartenrotschwanz	„	4.—
Rotkehlchen	„	3.—
Stieglitz, Männchen	„	3.50
Zeisig, „	„	3.—
Bluthänfling „	„	3.—
Girlitz „	„	3.—
Buchfink „	„	2.—

Weißwurm Ia Pfund 6 ℳ.

Friedr. Gust. Müller,

Berlin SW 61, Blücherstr. 61.

Empfehle

einige Nachtigallen

à Stück 20 ℳ

Gartengrasmücken,

große, à 8 ℳ

Schwarzplättchen

à 10 ℳ

Singdrossel (Wildfang) 10 ℳ

Amsel à 5 ℳ

Rotkehlchen à 2 ℳ [806

Die Tierchen sind ff. befiedert. Garant. Männchen und teils seit 8 Monaten in meinem Besitz. Anfrage Doppelkarte. Verpackung 1 ℳ. Nachnahme.

E. Reith, Wiesbaden

Helenenstr. 24.

Goldgelbe
Harzer Edelroller

à 10, 12 und 15 ℳ. [807
Goldgelbe Kanarien-Wbch. à 3, 4 u. 5 ℳ
Stieglitz-Kanarienhähne
à 10 ℳ, Stieg.-Kanar. Weibch. à 2 ℳ.
Bei Mehrabnahme bedeutend billiger. Streng reeller Versand. Porto extra. Verpackung einsenden.
Linda Hirsch, Aubstadt (Unterfrank.)
A. Z.-Mtgl. 233; Ornis 318.

Mandrill

(halbgroß, zahm)

Stück 225 Mark.

Wollaffe, zahm . . .	Stck.	250 ℳ
Hutaffen, kleine u. große, zahm	„	75 ℳ
Resusaffen, zahm	„	70 ℳ
Resusaffen, kleine u. große, nicht ganz zahm . . .	„	60 ℳ
Meerkatzen, zahme . . .	„	70 ℳ
Graupapageien prima . .	„	120 ℳ
Blaustirnamazonen, Riesenauswahl . .	Stck.	40—55 ℳ
Rotstirnamazonen, zahm	Stck.	35 ℳ
Weißkopfamazonen . .	„	35 ℳ
Veilchenpapageien . . .	„	60 ℳ
Tarant. Unzertrennliche .	Paar	40 ℳ
Blaubürzlige Sperlingspapageien	„	18 ℳ
Kaktussittiche	„	13 ℳ
Blaustirnsittiche	Stck.	20 ℳ
Schamadrossel, prima .	„	80 ℳ
Amerik. Spottdrossel, garantiert Männchen	„	45 ℳ
Prachtglanzstare . . .	„	30 ℳ
Büffelweber (im Gesang)	„	15 ℳ
Rotgehäupte Kardinäle .	Paar	25 ℳ
Gilbweber, in Pracht . .	„	15 ℳ
Tahaweber, in Pracht . .	„	15 ℳ
Papstfinken, gut befiedert	„	30 ℳ
Indigofinken	„	30 ℳ
Kleine Kubafinken . . .	„	25 ℳ
Jap. Möwchen	„	15 ℳ
Grauedelsänger, Männch.	Stck.	6 ℳ
Spitzschwanzamandinen .	Paar	45 ℳ
Maskenfinken	„	45 ℳ
Grüne u. gelbe Wellensittiche	„	15 ℳ
Stteglitzhähne	Stck.	3 ℳ
Bluthänflinge	„	3 ℳ
Buchfinkenhähne . . .	„	2 ℳ
Zeisighähne	„	3 ℳ
Rotkehlchen	„	2 ℳ
Graudrosseln	„	8 ℳ
Rotrückige Würger . .	„	5 ℳ

Versand gegen Nachnahme oder Voreinsendung des Betrages. Porto und Verpackung zum Selbstkostenpreis.

Tierhandlung
Max Kleinert

Berlin NO. 18, Strausberger Str. 13,
Fernruf Alexander 3313. [808

Seltenheit.

Zeisig × Grünfink-Bastard zu verk. od. Tausch geg. Gebot od. and. Vögel. Ferner gebe ab: mehrere rein durchgezücht. **Fuchskanarien** ohne weiße Federn, in Tausch nehme: Münchner-Holländer Kanar., Amandtnen, Sittiche, roten Kardinal.
Otto Steinhagen, Lübeck,
809] Beckersgrube 7.

1,2 Zebrafinken zusammen 30 ℳ
1,0 Männch. Grauedelsäng. 10 ℳ
0,2 Amaranten, imp., seit Febr. im
810] Besitz, à 4 ℳ verkauft
Moritz Zeise, Gera, R. j. L.

Tüchtige Kanariensänger

aus meiner Edelzucht fetner Gluckvögel à Stück 12 ℳ. Zuchtpaar 15 ℳ.
811] **Alfred Richter, Ranis** i. Thür.

Suche 0,1 Wellensittich,

grün oder gelb ausgefärbt, prima Zuchttier, gegen guten Preis. Gefl. Angeb. an
Louis Köhler, Hildesheim,
Jacobistr. 11 I. [812] A. Z.-Mtgl. 269.

Brehms Tierleben

Billige Ausgabe

6 Leinenbände zu je 5 Mark,
6 Halblederbände zu je 7.50 M
Über das schöne Werk unterrichtet di Beilage in dieser Nummer. Man benütze die Bestellkarte und gebe an, in welchen Zwischenräumen die Zusendung der einzelnen Bände erfolgen soll. (Porto dann 5 Pfg.) 3 Bände sind fertig. Von den fehlenden 3 Bänden erscheinen 2 bereits im Spätherbst.

Alfred Troschütz

Buchhändler und Antiquar
Hannover
Große Aegidienstraße 4
Postscheckkonto: Hannover 200 (Cruse 813] Buchhandlung).

Gimpelpärchen, das mehrfach mit Erfolg in der Gefangenschaft gebrütet hat, für 10 ℳ zu verkaufen. [81
H. Seidel, Liegnitz, Friedrichspl. 6 I

Verk. 1 Schwarzplättch., 8 ℳ, tausche au Sprosser, Nützliches. [81
Oberlehrer Günther, Lommatzsch.

Suche 2,2 Girlitz

gebe Stieglitz oder Rothänflin in Tausch. [81
K. Zwingmann, Nanen, Feldstr.

Verk. junge grüne Wellensittiche, Ia be u. kerngesund, da Freiflug, à 5 ℳ ode tausche geg. Kanarien (Harzer-, Gestal und Farbenkanarien.) [81
Saller, Planegg, Hofmarkstraße

Suche: 3,0 blaufüßige zuchtf. gelb Wellens., 1,0 desgl. grü zu kaufen evtl. Tausch geg. größere A zahl junge grüne Wellensittiche. [8
Verk.: 1,1 zuchtf. braunb. jap. Möwche 10 ℳ, od. gebe geg. obige mit in Tausc
Jos. Saller, Planegg, Hofmarkstr.

Diesjähr. Zeis.-Männch

gibt noch ab à 1.50 ℳ exkl. [8
Por. Brandt, Wartha i. Schle

Photo-Apparat 9 × 1

vollst. neu, Ia Lederausf., dopp. Bode auszug, reiche Verntcklg., alle Verstell durch Zahntrieb, umlegb. Sucher, D. 5,5 in Ibso-Verschluß 1—1/100 Sek., 6 Ka nur 95.— ℳ Nachn. (statt 145.— ℳ Volle Garantie. [8
H. Engelken, Delmenhor i. Old.

Für Kanarienzüchter

Wichtig zur Zucht:
Der Kanarienvogel,

seine Naturgeschichte, Pfle u. Zucht von Dr. Karl Ru 14. Auflage. Mit 2 Farbe tafeln und zahlreichen Te abbildungen. Bearbeitet v Karl Neunzig.
Kart. 2.50

Zu beziehen durch:

Creutz'sche Verlagsbuc handlung, Magdeburg

Postschließfach 148.

Inserate

für das am 23. Okt. 1924 zur A gabe gelangende Heft 36 der Welt erbitten bis 18. Okt. 1924 f

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Berlin-Hermsdorf; für den Anzeigenteil: Rolf Kretschmann, Magdeburg, Postschließfach 148.
Verlag der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck: August Hopfer, Burg Bz. Mgdbg.

Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Jahrg. 53 | Den 23. Oktober 1924 | Heft 36

(Druckort: Burg, Bezirk Magdeburg.)

Webervögel und Widafinken.

Von A. Krabbe.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Der b) Flammenweber — P. flammiceps *(Sw.)* (s. Abb. S. 275), so schreibt Reichenow, ist an der Goldküste in der Umgegend von Accra ein häufiger Brutvogel. Im August fand ich ausgeflogene Junge. Die Nester hängen einzeln im hohen Grase, sind an mehreren Halmen mit ihren Seitenwänden befestigt, aus feinem spröden Gras gebaut, oval mit seitlich oben angebrachtem Schlupfloch, das durch hervorragende Halme der oberen Decke dachartig geschützt wird. Die Höhe des Nestes beträgt 12, der Querdurchmesser 8, der Durchmesser des Schlupfloches 5 cm.

Böhm berichtet über ihn sehr interessant wie folgt: „Solange die Feuerfinken ihr gewöhnliches braunes Kleid tragen, fliegen sie in so enger Gemeinschaft mit Quelea aethiopica umher, daß regelmäßig ein Schuß unter die dicht gedrängten Schwärme viele Vögel beider Arten herabwirft. Abends fallen diese Flüge in das Schilf fast ausgetrockneter Sümpfe zum Trinken und Schlafen ein. ... Hat man sich in einem der dichten Büsche, in welche die Vögel einzuflattern pflegen, versteckt, so fühlt man einen ordentlichen Luftdruck, wenn die Schwärme wie eine lebende Wand an- und hineinstürmen, und geht man in der Dunkelheit durch das Schilf, so scheinen schwarze brausende Wellen, von den im Schlaf aufgestörten Vögeln gebildet, darüber hinzugleiten. Das hastige, unruhige, scheue und flüchtige Benehmen der Feuerfinken zu dieser Zeit kontrastiert merkwürdig mit ihrem behäbigen, selbstgefälligen Gebaren, wenn sie in ihrer Hochzeitstracht mit gesträubtem Gefieder, zwitschernd und flügelzitternd sich auf den Halmspitzen zu sonnen und zu brüten pflegen. Gelege von 3—5 Eiern fand ich bei Kakoma Anfang April bis Ende Mai."

Dieser hochinteressante Bericht zeigt uns, in welchen ungeheuren Mengen das Vorkommen dieser Weber in ihrer Heimat, Westafrika von Gambia bis zum Kuanza, Ostafrika von Abessinien bis zum Sambesi, ist und daß das Freileben merkwürdig zum Gefangenleben kontrastiert, bedingt durch den Wechsel der Jahreszeit und durch die ihnen gebotene sorgenlose Verpflegung. Die Länge beträgt 130 bis 145 mm, beim Weibchen 115 mm. Die schlanken Flammenweber sind von andern sofort an den schwarzen Flügel- und Schwanzfedern und schwarzen Unterflügeldecken zu erkennen, auch fallen sie dem Eingeweihten durch die Spannweite der Flügel auf. Die Weibchen unterscheiden sich vom Männchen im Winterkleid dadurch, daß die Unterflügeldecken nicht schwarz, sondern dunkelbraun sind, und ferner durch die geringere Größe. Zu erwähnen bleibt noch, daß beim Flammenweber niemals Steiß und Unterschwanzdecken rot verfärben, sondern die gleiche unscheinbar hellbraune Farbe behalten. Nicht so häufig am Vogelmarkt, finden sie trotz des gegen den Vorgenannten höheren Preises leicht Abnehmer, weil sie während der Brutzeit im Wesen ruhiger und bei weitem nicht so stürmisch sind, als beispielsweise der nachstehend behandelte, noch schönere Oryxweber. Ich besitze zwei Männchen, wovon ich das eine 1921 von Ditzell Nachflg. und das andere 1923 von einem Liebhaber aus Hannover erhielt. Die Einfärbung beider begann am 5. Juni und war am 7. Juli beendet, dauerte also 32 Tage, während ich im vorigen Jahre vom 20. Juni bis 20. Juli notierte, also rund 30 Tage. Die Ausfärbung ging in ungeheizter Vogelstube Ende Januar vor sich, so daß das Prachtkleid sieben Monate getragen wurde. Die Balzstellung ist besonders charakteristisch, mit gestrecktem Körper, hängenden Flügeln und nach hinten geworfenem Kopf balzen sie schwanzwippend auf schwankenden Zweigen auf- und abkletternd unter Zischen und Schnurren. Im Winter sind es ruhige Vögel, die sich um Zank und Streit nicht kümmern. Ich kann den Flammenweber seiner schönen Färbung und des ruhigen Benehmens wegen warm empfehlen. Zum Zusammenhalten mit Prachtfinken in kleinerer Voliere oder Käfig eignet er sich seiner Größe wegen weniger. Auch habe ich beobachtet, daß er unter diesen Verhältnissen hin und wieder seine schwächeren Käfiggenossen hartnäckig vom Futter vertreibt.

Zu den in der Vorkriegszeit gleich allen südafrikanischen Vögeln seltener und zu bedeutend höheren Preisen eingeführten Webern gehört der

c) Oryxweber — P. orix *(L.)*

aus Südafrika, nordwärts bis Mossamedes und

Maschona. Weniger bekannt, lasse ich eine Gefiederbeschreibung folgen:

Stirn und Scheitel, Kopfseiten und Kehle schwarz; Hinterkopf, Hals, Kropf, Oberkörper, Ober- und Unterschwanzdecken scharlachrot; Rücken blasser oder rotbräunlich; Unterkörper schwarz; Schenkel hellbraun, rötlich verwaschen; Schwingen, Flügeldecken und Schwanzfedern schwarzbraun, blaßbräunlich gesäumt; Unterflügeldecken isabellfarben oder gelbbräunlichweiß; Auge dunkelbraun; Schnabel schwarz; Füße hell bräunlich fleischfarben. Länge etwa 130 mm. Das Weibchen ähnelt dem vom Flammenweber, aber die Kehle ist weniger gelb verwaschen, der Schnabel kleiner.

Oryxweber erkennt man im grauen Kleid an der gedrungenen Figur und dem kurzen dicken Schnabel mit gebogener First, der beim Flammenweber schlanker und länger ist. Bei Kapstadt brütet der Oryxweber nach Layard im September und baut sein Nest an Schilf, das im Wasser steht. Drei oder vier Schilfstengel bilden immer die Träger des Nestes. Im Winter scharen sich die Vögel in Flüge zusammen und tun dann an Getreidefeldern großen Schaden. Das Gelege besteht aus 4—5 hellblauen Eiern von 25×18 mm Größe. Unzweifelhaft der schönste aller Feuerweber, versteht er es ausgezeichnet, seine Schönheit in das rechte Licht zu setzen. Kugelrund aufgeblasen, wiegt er sich mit hochgereckten Füßen singend und balzend auf einem Zweig hin und her, bis er einen Gegner gefunden hat, den er im hummelartigen Flug verfolgen kann, um darnach das Spiel an anderer Stelle sofort von neuem zu beginnen. Meine beiden Männchen — das eine im Mai 1923, das andere im Februar 1924 von Fockelmann erworben — haben sich als sehr erregt, niemals aber als für andere Vögel gefährlich erwiesen. Das erste Männchen kam im letzten Stadium der Ausfärbung zum Winterkleid zu mir, stockte damit, als ich es in die große Voliere brachte, färbte an einigen Stellen wieder ein, blieb dann gescheckt während des Winters, um Anfang Mai einzufärben und am 5. Juni in voller Pracht zu stehen. Merkwürdigerweise ist dieser Weber eher geneigt, in der Gefangenschaft zu brüten. Worin die Ursache hierfür zu suchen ist und aus welchem Grunde andere Feuerweber nicht oder nur ausnahmsweise einmal zur Brut schreiten, ist sehr schwer zu ergründen. Herr Pracht weist in seinem Zuchtbericht besonders auf die Bissigkeit des Oryxwebers während der Brutzeit hin. Ich werde bemüht bleiben, bis zum nächsten Jahre ein Weibchen zu beschaffen, um ebenfalls einen Zuchtversuch anzustellen, über dessen Ergebnis ich an dieser Stelle berichten würde. In geräumiger Voliere oder Vogelstube kann der Oryxweber ruhig eingeworfen werden; bei starker Besetzung mit kleineren Vögeln und in engen Räumlichkeiten ist Aufmerksamkeit geboten, eine unbedingte Empfehlung verdient er hier nicht. Auf jeden Fall aber bildet er eine Zierde jeder Vogelsammlung und reichlich Unterhaltung seinem Pfleger.

Ein besonderes Mißgeschick verfolgt mich bei Versuchen, endlich den

d) Napoleonweber — P. afra *(Gm.)*

zu erwerben. Die verehrten Leser, die meinen Ausführungen geduldig bis hierher gefolgt sind, werden mitleidig lächeln, doch ist Tatsache, daß ich bis heute noch nicht in den Besitz eines Männchens Napoleonweber gelangt bin. Daß sich ein angeblicher Napoleonweber als Flammenweber entpuppte, erwähnte ich bereits, und alle andern Napoleonweber färbten zu Orangewebern aus. Als ich endlich von Götz, Neu-Ulm, einen Napoleonweber erhielt, war es ein Weibchen. Ich bin hiernach geneigt anzunehmen, daß der Napoleonweber weit weniger häufig eingeführt wird, als man nach den Angeboten der Händler glauben möchte. Der Napoleonweber ist mit 100—110 mm Länge einer der kleinsten und in Westafrika von Senegambien bis Angola beheimatet. Die Gefiederfärbung, goldgelb und schwarz, setze ich als bekannt voraus.

e) Tahaweber — P. taha *(A. Sm.)*.

Im neuen Neunzig sind bei der Beschreibung des Tahawebers zwei Örtlichkeitsrassen, P. t. intercedens und P. t. stricta aufgeführt. Reichenow führt neben Pyromelana taha — P. t. intercedens auf und behandelt P. stricta und eine weitere Lokalrasse — P. ladoensis — als besondere Art. P. taha ist wie folgt gefärbt:

Oberkopf, Nacken, Oberkörper und Oberschwanzdecken goldgelb; schwarzes Nackenband, Oberrücken oft mit schwarz vermischt, Kopfseiten und Unterseiten schwarz, nur jederseits des Kropfes ein gelber Fleck; Unterschwanzdecken gelb; Schenkel blaßgelb, hellbräunlich oder gelblichweiß; Schulterfedern schwarz mit gelblicher Umsäumung; Flügeldecken, Schwingen und Schwanzfedern schwarzbraun, bräunlichweiß gesäumt; Unterflügeldecken blaß isabellfarben oder bräunlichweiß. Länge 100—110 mm. Das Weibchen ist oberseits auf fahlbraunem Grunde ammerartig schwarzbraun gestrichelt; weißer gelblich verwaschener Augenbrauenstreif; Unterseite weiß, auf Kropf und Körperseiten bräunlich verwaschen und dunkelbraun gestrichelt; Flügeldecken, Schwingen und Schwanzfedern schwarzbraun, fahlbraun gesäumt; Schnabel und Füße blaßbräunlich.

Heimat ist Südafrika, im Westen bis Mossamedes, im Osten bis zum Massailande. P. taha intercedens — nördlicher Tahaweber — bewohnt das Gallaland; der gelbe Fleck auf den Kopfseiten ist kaum angedeutet, also eine, wenn auch konstante Übergangsform. P. taha stricta — abessinischer Tahaweber — bewohnt Nordostafrika und ist auffallend größer als die Vorgenannten; Länge etwa 120 mm. Der gelbe Fleck an den Kropfseiten fehlt vollständig. P. t. ladoensis — Tahaweber aus Lado — ist dem südafrikanischen sehr ähnlich, aber kleiner und mit größerem gelben Kropffleck, schmalerer schwarzer Kopfsärbung und blasser gelber Oberseite. Die Verbreitung beschränkt sich auf das Gebiet des oberen weißen Nil. Der abessinische Tahaweber ohne gelben Kropffleck ist abgebildet (s. Abb. S. 287).

Der Tahaweber bewohnt die nächste Umgebung der Seen und nistet im Rohr und Schilf. Die Nester werden aus Gras verwebt und stehen an den Spitzen des Schilfes. Das Gelege besteht aus 4—7 weißen, fein braun getüpfelten Eiern. Nach der Brutzeit schlagen sie sich mit andern Webern zu großen Schwärmen zusammen und treiben sich im Lande umher. (Fortsetzung folgt.)

Über Heckenbraunellen.

Von A. Jena, Biberach Riß.

(Nachdruck verboten.)

Es ist nicht notwendig, daß ich mich mit einer Gefiederbeschreibung dieses allbekannten Vogels abgebe, zumal ich erwarten darf, daß jeder, der diese

Zeitschrift liest, irgend einen Neunzig, Ruß, Flöricke oder wie sie sonst alle heißen, besitzen wird, um im Zweifelsfalle darüber nachlesen zu können. Die Heckenbraunelle zähle ich zu meinen Lieblingsvögeln, weil sie wie die Heidelerche und die Dorngrasmücke zu den Charaktervögeln meiner Fränkischen Heimat gehört. Sie belebt dort dichte niedere Föhrengehölze und Weißdornhecken mit wilden Rosen und Brombeergestrüpp durchrankt, die auf sandigen Feldrainen ihr mageres Dasein fristen. Im Sommer und im Herbst bekommt man sie nur zufällig zu Gesicht, dagegen im Frühjahr von Ende März bis hinein in den Juni ist sie leicht zu beobachten, und zwar besonders am frühen Morgen und am Spätnachmittag auf irgend einem Gipfel eines niederen Bäumchens, von dem aus sie ihr anmutiges Liedchen fleißig vorträgt. Meistens sind es mehrere singende Männchen zugleich in einem verhältnismäßig kleinen Revier, so daß ich der Ansicht bin, daß die Art unter sich ganz verträglich sein kann und mehrere Paare sich wenig stören.



Heckenbraunelle.

Nicht nur in unsern sandigen fränkischen Föhrenwäldern ist die Heckenbraunelle zu Hause, auch in Oberschwaben ist sie zahlreicher Brutvogel und bevorzugt hier geschlossene dichte junge Fichtenkulturen neben sonnigen Berghängen, die mit allerhand dichtem Gestrüpp überwachsen sind. Sie verläßt uns erst Ende September, Anfang Oktober und einige bleiben auch den Winter über bei uns. So konnte ich seit 1922 jeden Winter vom Dezember bis März fast täglich ein Weibchen in meinem Hausgarten am Futterplatz beobachten, so daß ich vermuten darf, es sei wohl immer der gleiche Vogel gewesen. Ich bin nun recht begierig, ob er heuer wieder kommt. In den oft recht plötzlich und mit viel Schnee einsetzenden Nachwintern der letzten Jahre kamen die frisch angekommenen direkt an die Fenster und Türen und mischten sich unter das Hühnervolk. Sie wurden dabei von manchen Liebhabern überaus leicht mit dem Schlagnetz gefangen und mit Mohn und trockenen Ameisenpuppen eingewöhnt, wenn auch hier in Oberschwaben die Heckenbraunelle als Käfigvogel kaum in Betracht kommt, weil man außer Schwarzplatte, Gartengrasmücke, Rotbrüstchen, Zeisig und Distelfink kaum einem anderen Vogel für die Käfighaltung größere Bedeutung beimißt. Das sind natürlich Geschmacksachen, und ich war nie so konservativ, mich auf einige bestimmte Arten festzulegen, ich liebe die Abwechslung in Form und Farbe und halte nur ganz wenige Arten als dauernde Genossen. Zu diesen gehört, wie schon eingangs erwähnt, die Heckenbraunelle, welche ich seit fast 15 Jahren ununterbrochen käfige. Sie ist in den meisten Vogelbüchern als friedlicher, harmloser Käfigvogel warm empfohlen, und so im allgemeinen kann ich das auch bestätigen. Freilich hat sie ihre Zeiten, in denen sie recht schlecht aufgelegt zu sein scheint, und das liest man nicht in diesen Büchern. Im Einzelkäfig erscheint sie meist als ein etwas plumper, langweiliger Geselle, weshalb ich sie meistens bei den Finkenvögeln im Flugkäfig halte; sie paßt auch, wenn man in erster Linie die Fütterung in Betracht zieht, nirgends besser hinein. Sie führt sich dort ganz nach Belieben gequetschten Hanf, Mohn und Hirse zu Gemüte, und außerdem stelle ich ihr noch ein Näpfchen mit trockenen Ameisenpuppen und den Weichfutterresten des Vortages an einen im Flugkäfig etwas versteckteren Platz, dem sie ebenfalls mit gutem Appetit zuspricht. Im Herbst und Winter ab und zu einige Mehlwürmer und im Frühjahr und Sommer hie und da frische Ameisenpuppen, welche ich auch stets meinen sämtlichen Finken verabreiche, bilden die Abwechslung im Speisezettel. Bei dieser Ernährung haben sich meine Braunellen vorzüglich gehalten und ich habe daher gar keinen Grund, sie abzuändern. Was nun die in den Vogelbüchern geschilderte Harmlosigkeit im Gesellschaftskäfig betrifft, so kann ich dieselbe nur für die Zeit von der Mauser bis Anfang Mai gelten lassen, von Mitte Mai ab ist sie auf ihre Käfiggenossen manchmal recht schlecht zu sprechen. Sie kommt um diese Zeit in starken Trieb und dann wird sie gegen verschiedene Genossen recht aufdringlich, besonders wagt sie sich an kleinere Arten heran. Sie wird um so kampflustiger, je weniger Mitinsassen sie hat. So hatte ich vor Jahren eine Braunelle bei zwei Erlenzeisigen, welche von dieser in einem brünstigen Wutanfall nacheinander gemordet wurden, und zwar wiesen die beiden Opfer eingehauene Schädel und blutigen nacktgerupften Rücken auf. Gegen Buchfinken, Grün- und Distelfinken habe ich sie noch nichts unternehmen sehen, dagegen wurde mir eine

grüne Kanarienhenne vor zwei Jahren im Juni von einer andern Braunelle auf die gleiche Weise umgebracht wie die Zeisige. Ich bekam damals noch ein weiteres Exemplar und die beiden Braunellen lagen sofort im Streit, so daß ich dem Neuling die Freiheit schenkte. Das Männchen, welches ich zurzeit noch besitze, ist ebenfalls recht streitbar den Sommer über gewesen. Erklärlicherweise hat es sich nur mit grauen oder graubraunen Vögeln abgeben wollen, also solchen, die ihm gleichgefärbt waren. Unter diesen Liebesbezeugungen, welche durch Hängen der Flügel, Hochstellen und Ausbreiten des Schwanzes, Tänzeln auf der Sitzstange und feurigen Gesang, sowie durch recht oft versuchte plumpe Tretversuche sich kundtaten, hatten vor allen der kleine Grauedelsänger und einige Leinzeisige zu leiden. Da die Angriffe immer heftiger wurden, mußte ich den Graugirlitz entfernen, auch einem Berghänfling trug sie ihre Liebe an, der sich aber kräftig zur Wehr setzte. Zurzeit ist diese Braunelle in der Mauser und singt trotzdem ihr angenehmes Liedchen, obwohl sie recht stachlig aussieht, jedoch die Sturm- und Drangzeit ist bei ihr bis zum Mai nächsten Jahres vorbei. Bis dahin spielt sie die unschuldigste und harmloseste unter den Käfiginsassen, geht jeder Zänkerei aus dem Wege, drückt sich viel auf dem Käfigboden herum oder sitzt träumerisch und augenzwinkernd auf einer ausgesuchten Lieblingsstange.

Exoten.

Von S. Lichtenstaedt.

(Nachdruck verboten.)

1. Neues Leben blüht aus den Ruinen....

Selbst der größte Optimist hätte Ende vorigen Jahres nicht geglaubt, daß schon wenige Monate später eine wahre Invasion unserer ausländischen Lieblinge einsetzen würde. Die Rentenmark hat das Wunder vollbracht. Infolge unserer stabileren Währungsverhältnisse blieben die vielen Transporte im Lande, und der Großhändler konnte es schon eher wagen, Einkäufe zu tätigen, ohne befürchten zu müssen, für sein gutes Geld schlechtes wieder zu erhalten.

Was in den letzten Monaten alles an Exoten eingeführt worden ist, ist geradezu ungeheuer. Ich erinnere z. B. an den riesigen abessinischen Transport des Berliner Zoologischen Gartens, und wer um diese Zeit das alte und neue Vogelhaus unseres Zoos besucht hat, wird aus dem Staunen gar nicht herausgekommen sein.

Aber auch für uns Liebhaber brachen wieder goldene Zeiten an. Ich kann mich kaum erinnern, in Vorkriegszeiten derartige Transporte gesehen zu haben. Den „ausgehungerten" Liebhabern sollte der Tisch mehr als reichlich gedeckt werden. Würde man alle Neueinführungen und Seltenheiten beschreiben wollen, so würden wohl kaum ein Dutzend Hefte unserer „Gefiederten" ausreichen.

Ich will deshalb so kurz als möglich in nachstehendem meine Erlebnisse mit meinen Lieblingen in den letzten Monaten berichten. In meiner Vogelstube kreucht und fleucht wieder ein halbes Hundert bunter Tropenkinder, Licht und Sonne in unser sonst so einförmiges Dasein bringend.

Was alles in den letzten Monaten eingeführt wurde, wissen die Leser wohl am besten aus den verschiedenen Inseraten in den Fachzeitschriften, aber in welchen Mengen Exoten zeitweise importiert wurden, war geradezu fabelhaft. Trotz Ausfuhrverbote gelangten Amerikaner und Australier in großen Mengen auf den Markt, leider war der Absatz bei den Händlern noch nicht so, wie diese erwartet hatten.

Die schlechten wirtschaftlichen Verhältnisse zwangen viele Liebhaber mit ihren Anschaffungen zurückzuhalten, und die meisten suchten Ersatz in den billigeren Prachtfinken, und mußten Seltenheiten schweren Herzens zurücklassen. Auch die Gefahr des Verlustes hatte den Liebhaber vorsichtig gemacht.

Im Frühjahr gelangten große Mengen Schamadrosseln auf den Markt. Die Preise waren nur wenig höher als früher, und da bei Schamatransporten verhältnismäßig wenig Verluste eintreten, konnten die Vögel von den Händlern zu verhältnismäßig billigen Preisen weiter gegeben werden.

Anders mit besseren Prachtfinken. Ich hatte Gelegenheit, einen großen Transport von 5—600 Paaren Goulds zu besichtigen. Die Tiere waren nicht alle in bestem Zustand. Unwillkürlich drängt sich dem Liebhaber der Gedanke auf: Wäre es nicht zweckmäßiger, kleine, tadellos verpflegte Transporte zu importieren, an denen der Liebhaber hier seine Freude hat?

Spitzschwänze und Maskengrasfinken von gleichem Transport kamen in relativ besserem Zustand an, so daß bei diesen nur sehr wenig Verluste eintraten.

Große Indigo- und Papstfinkentransporte kamen verhältnismäßig gesund, doch miserabel im Gefieder hier an.

Außer den gewöhnlicheren Astrilden und Amandinen trafen auch die lange fehlenden Zebrafinken und japanischen Mövchen wieder ein.

Aus Dänemark erhielt ich meine besonderen Lieblinge, kleine Kubafinken in tadellosen Exemplaren.

Vor wenigen Wochen sah ich einen Transport jener kleinen Honigsauger, entzückende, den Kolibris ähnelnde Gestalten. Von einem Dutzend waren in acht Tagen nur noch fünf vorhanden. „Verkauft", meinte der Händler, doch glaube ich stark, daß der liebe Gott Käufer war.

Große Transporte Webervögel besichtigte ich in letzter Zeit, darunter den großen hübschen Viehweber. Kardinäle, rote und Dominikaner, kamen in großen Mengen an, unter ersteren leider, leider viele Todeskandidaten.

Groß waren die Einfuhren von Papageien. Der Kakaduliebhaber konnte sich dutzendweise große Gelbhaubenkakadus anschaffen, rote Araras waren in prächtigen Exemplaren zu haben, Zwergararas, entzückende Kerle, aber an Geschrei ihre großen Brüder noch bei weitem übertreffend, konnte man in richtigen Pärchen erstehen.

In den letzten Wochen gelangten meine besonderen Lieblinge, die Graupapageien, in großen Transporten auf den Markt.

Selten sah ich so schöne gelehrige Exemplare wie bei Herrn Kleinert in Berlin. Dort konnte der Lieb-

haber zeitweise 2—3 Dutzend erstehen. Grau- und schwarzäugige, hellsilbergraue und dunkelfarbige Exemplare waren vorhanden.

Ganz mit Unrecht ist der junge Graupapagei als besonders empfindlich verschrien. Wenn man nicht das Pech hat, Vögel von einem verseuchten Transport zu erhalten, also Sepsiskranke, so wird man bei richtiger Pflege selten Verluste haben.

Ich habe Dutzende junger Grauer aufgezogen (das Stück zu 15 Mark, selige Zeiten), ohne nennenswerte Verluste zu haben. Wer den Vögeln allerdings Hanf, Sonnenblumen und Kaffee gibt, kann sicher sein, die Vögel selten hochzubekommen.

Wer aber die jungen Tiere in großen Käfigen hält, sie sachgemäß pflegt, ihnen gesunde Luft zuteil werden läßt, wird einen gesunden jungen Jako auch unbedingt durchbekommen.

Es sei mir vergönnt, in einem späteren Artikel hierauf zurückzukommen. Bemerken möchte ich nur, daß mein Jakokäfig seinerzeit von Herrn Naclermeister Manecke angefertigt, etwa 120 cm lang, 60 cm tief und 80 cm hoch war. Als Futter erhielten meine Tiere nur weichgekochten Reis, eingeweichten Mais, Spitz, Nüsse, Obst, Weidenruten, etwas Hafer, ab und zu Kuhmilch, frische reine Luft und tüchtig Lungengymnastik, soweit sie diese in dem großen Käfig nicht selbst besorgten.

Keinen Hanf, keine Sonnenblumen, keine Dampfbäder. Mit letzteren soll man überhaupt, auch bei legekranken Vögeln, sehr vorsichtig sein.

Mexikanische Grünhäher.
Aufnahme von S. Lichtenstaedt.

Tarantinische Zwergpapageien, früher zu den größten Seltenheiten gehörend, gelangen jetzt in größerer Anzahl auf den Markt. Die Preise für diese entzückenden Papageien sind um fast zwei Drittel gesunken, auch sind die jetzigen Transporte widerstandsfähiger als die früheren. Weiter unten werde ich dem Leser noch mehr von meinen Tarantinern erzählen. Jedenfalls scheinen uns diese die fehlenden Rußköpfchen ersetzen zu können.

Sperlingspapageien gelangten ebenfalls massenhaft auf den Markt. In meiner Vogelstube befinden sich in mehreren Pärchen gemeine und mexikanische Sperlingspapageien, von denen ich weiter unten noch einiges mitteilen werde.

Besonders interessierten mich noch von den selteneren Sittichen die rotstirnigen Neuseeländersittiche, von welchen ich in den nächsten Tagen ein Pärchen resp. zwei Exemplare zu erhalten hoffe. Ich sah diese Tiere zuerst bei Herrn Tzornack und sie entzückten mich durch ihre Zutraulichkeit und ihr ansprechendes Gefieder.

Tovi-, Feuerflügel-, Elfenbein-, Guatemala-, Goldstirn- und andere kleine Sittiche trafen in großer Anzahl zum größten Teil in einwandfreien Exemplaren ein.

Eigenartigerweise gingen viele der sonst gar nicht so empfindlichen Elfenbeinsittiche in den ersten Tagen ihres Hierseins unter krampfartigen Erscheinungen ein, und sind von den Transporten nur wenig Vögel übrig geblieben.

Alle diese kleinen Sittiche sind dem empfehlenswert, der für das entsetzliche Geschrei dieser kleinen Teufel unempfindlich ist.

Wohl schreit auch meine prächtige Amazone einmal aus tiefstem Herzensgrund; diese kleinen Kerle aber haben ein so schrilles, nervenaufpeitschendes Geschrei, daß sie einem die Freude an ihrer Zutraulichkeit völlig verleiden können.

Es ist, als ob Mutter Natur ihnen diese unangenehme Beigabe mit Absicht verliehen hat, um sie ein bischen weniger begehrenswert zu machen. Denn einen entzückenderen Kerl wie einen zahmen Feuerflügelsittich kann man sich kaum denken.

Die Intelligenz dieser kleinen Sittiche ist aber nicht so groß wie viele Liebhaber zu glauben scheinen. Sie sind „dummklug", gehen zu jedem, und machen kaum einen Unterschied zwischen ihrem Herrn und einem Fremden.

Auch manche Exoten kamen herein, welche für unsere Käfige wohl weniger oder gar nicht in Frage kommen.

So die prächtig gefärbten mexikanischen Grünheher, mit leuchtend blauer Kehle, an Gestalt unserem Eichelheher ähnelnd, ferner die großen, ruhigen und langweiligen Glockenvögel. Den „Gesang" dieser Tiere hörte ich einigemal. Er hört sich an, als wenn man zwei Topfdeckel kräftig aufeinander schlägt, und man ist den Tieren meist herzlich dankbar, wenn sie ihn recht wenig zum besten geben.

Große Transporte der prächtigen Glanzstare hatte ich wiederholt zu besichtigen Gelegenheit. Von der Farbenpracht dieser Tiere kann man sich nur schwer einen Begriff machen. Ihr schmetterlingsartig leuchtendes Gefieder sieht, speziell in der Sonne, geradezu prächtig aus; und ich kann die Tiere jedem Liebhaber, welcher auf Gesang und Zucht weniger Wert legt, warm empfehlen. Auch der Langschwanzglanzstar, welcher in ziemlicher Anzahl eingeführt wurde, ist äußerlich ein prachtvoller Kerl.

Was sonst noch alles hereinkam, geht in die Tausende von Exemplaren. Der Exotenfreund braucht sich heute noch kaum einen Wunsch zu versagen, vorausgesetzt, daß das nötige Klein- resp. Großgeld vorhanden ist. In Kürze erwarte ich grünbürzelige Sperlingspapageien, auch Rosenpapageien und Blaukrönchen sollen nicht mehr allzulange auf sich warten lassen. — Neues Leben blüht aus den Ruinen. (Fortsetzung folgt.)

Mein Glanzstar und anderes.

Von L. Neuen.

(Nachdruck verboten.)

Seit einiger Zeit gehört zu den Bewohnern eines meiner Käfige ein afrikanischer Glanzstar. Dieser prächtige Vogel zeigt ein zutrauliches, fast liebenswürdiges Wesen und hatte bald meine Freundschaft erworben. Um welche Art es sich handelt aus der großen Anzahl von Glanzstaren, welche das afrikanische Festland bewohnen, ist mir nicht ganz klar; ich glaube aber, daß es der abessinische Ganzstar L. chalybaeus ist. Er ist ein Vogel, der eigentlich einfarbig ist, aber durch den verschiedenen recht starken Metallglanz des Gefieders je nach dem einfallenden Licht bald blau, bald grün, bald veilchenfarbig in verschiedenen Tönungen erscheint. Zu den allerprächtigsten Glanzstararten, welche ich im Neuen Vogelhause des Berliner Zoologischen Gartens sah, gehört er nicht.

In seinem Wesen erinnert mich mein neuer Pflegling recht wenig an das unseres munteren Stares. Er ist nicht so unruhig und beweglich, nicht so geschäftig und neugierig wie unser Starmatz: die zirkelnden Schnabelbewegungen im Futternapf sah ich ihn nie ausführen. Er wirft auch das Futter nicht aus dem Futternapf und wendet diesen und das Wassergefäß nicht um, wie wir es von unserm Star gewöhnt sind, wenn wir nicht für gute Befestigung der Gefäße sorgen. Bei seinem, wenn ich so sagen darf, „gesetzten" Wesen ist die Sauberhaltung seines Käfigs eine viel leichtere.

Anfangs war er ziemlich scheu, aber sehr bald wurde er ruhiger und zahmer. Jetzt nimmt er mir ruhig den Mehlwurm, den er sehr liebt, aus der Hand. Groß ist seine Freude, wenn er für einige Zeit den Käfig verlassen und sich im Zimmer frei bewegen kann. Mir scheint es wenigstens ein „Ausdruck der Freude" zu sein — man muß ja mit derartigen Ausdrücken Tieren gegenüber jetzt sehr vorsichtig sein, wenn man nicht den Groll unserer verehrten Tierpsychologen heraufbeschwören will —, also ein Ausdruck der Freude scheint es mir zu sein, wenn der Glanzstar, sobald er bemerkt, daß sich die Hand der Tür nähert, um sie zu öffnen, einen kurzen melodischen Ruf hören läßt. Dasselbe ist auch der Fall, wenn er sich dann irgendwo niederläßt, um einen Mehlwurm oder einige frische Ameisenpuppen in Empfang zu nehmen. Zuweilen schlägt er dabei auch mit den Flügeln, und der kurze melodische Ruf wird zu einer gleichfalls recht melodischen schmetternden Strophe. Bei seinen Ausflügen vermeidet er es, den Fußboden zu berühren.

Die Gewöhnung an das Verlassen des Käfigs geschah ganz allmählich in der üblichen Weise. Nachdem er den durchs Gitter gereichten Mehlwurm aus der Hand nahm, wurde der Wurm durch die geöffnete Käfigtür gereicht usw., bis er den Wurm von der Schwelle des Käfigs nahm und endlich auch den Käfig ganz verlassen mußte, um den Leckerbissen zu erreichen. Der Glanzstar ging dabei außerordentlich vorsichtig zu Werke, und nur ganz allmählich steigerte sich seine Vertrautheit. Während er anfangs sofort in den Käfig zurückkehrte, nachdem er den Wurm von irgendeiner Sitzgelegenheit aus abgenommen hatte, nahm er dann auch den Mehlwurm aus der Hand, indem er nach Art der Fliegenschnäpper von der Hand rüttelte. Jetzt setzt er sich ohne Scheu auf die Hand und bleibt so lange auf ihr sitzen, bis die dargebotenen Mehlwürmer oder Ameisenpuppen verzehrt sind. Aber die einmal gewonnene Freiheit

Abessinischer Glanzstar.

will er nun nicht mehr freiwillig aufgeben. Zum Aufsuchen des Käfigs veranlaßt ihn jetzt nur der in den Käfig gestellte frisch gefüllte Futternapf oder einige Mehlwürmer. Seine anfängliche Scheuheit ist einer gewissen Vorsicht gewichen, was sich immer wieder bemerkbar macht, wenn seine stete Aufmerksamkeit irgend etwas Ungewohntes wahrnimmt. So ist er bei Anwesenheit fremder Personen nicht zum Verlassen seines Käfigs zu bewegen.

Er wird ernährt wie unsere heimischen Drosseln oder wie unser Star. Zu dem Drosselfutter erhält er Würmer, frische Ameisenpuppen, Insekten, Beeren und reichlich Obststückchen. Vom Badewasser macht er täglich Gebrauch, ist aber dabei nicht ein solcher Wasserpritschler wie sein lustiger europäischer Vetter.

Eine Zeitlang hielt ich den Glanzstar mit einigen Stärlingen, je zwei Chopistaren und zwei Seidenkuhstärlingen in einem geräumigen Käfig zusammen. Die Chopistare sind wegen ihrer Mordlust, in der sie andere Vögel überfallen, nicht gut beleumundet.

Ich kann ihnen nichts Übles nachsagen. Sie zeigte sich unter den gegebenen Verhältnissen durchaus verträglich. Ich muß es doch dahingestellt sein lassen, ob sie kleinere, wehrlosere Vögel unbehelligt gelassen hätten.

Die Stärlinge weichen in ihrem Benehmen wesentlich von dem des Glanzstares ab. Sie waren scheuer, zeigten ein hastiges, unruhiges Wesen und die Bemühungen, ihr Zutrauen zu gewinnen, fielen auf unfruchtbaren Boden. Letzteres wurde vielleicht erschwert durch die paarweise Haltung. Meine Beobachtungen sollen aber kein verallgemeinerndes Urteil über diese Vögel darstellen, denn ich habe auch schon recht zahme Stärlinge in der Gefangenschaft gesehen. Ich glaube auch, daß ein Pfleger, welcher sich mit der Gruppe der Stärlinge eingehender beschäftigt, auch an diesen von den Liebhabern zu wenig gehaltenen Vögeln recht interessante Beobachtungen machen könnte. Abgesehen von ihrem schönen Aeußeren wäre es gewiß lohnend, Züchtungsversuche in größeren Flugräumen mit einigen dieser Arten anzustellen. Ich denke dabei im besonderen an die Kuhstärlinge, die recht häufig im Handel sind. Da diese Vögel ähnlich unserm Kuckuck parasitisch nisten, könnte ein Versuch sie mit amerikanischen Finkenvögeln, z. B. den Indigofinken, zusammen in einem größeren Flugraum zu halten, zu recht interessanten Ergebnissen führen.

Am häufigsten werden von den Stärlingen die schönen Trupiale gehalten, da diese auch einen recht annehmbaren Gesang haben. Aber auch diesen wird nicht die Beachtung geschenkt, welche sie verdienten.

Meine Kanarien und Kanarienbastardzucht 1924.

Von Linda Hirsch, Aubstadt.

(Nachdruck verboten.)

Es sind nun fünf Jahre, daß ich hier in Aubstadt meine Kanarienzucht wieder begonnen habe. Mit einem Kanarienhahn, Sohn meines Harzer Stammhalters, kam ich her und dieser war auch schon drei Jahre alt. Mit großer Mühe erhielt ich in Königshofen ein Kanarienweibchen, leider ein altes. Ich kannte nämlich damals noch nicht die Königshöfer Züchter und wußte mir auch niemand einen Rat, auf die „Gefiederte Welt" war ich noch nicht abonniert. Also ich tat das Pärchen zusammen und erzielte nichts, das Kanarienweibchen war wohl zu alt. Nächstes Frühjahr verschaffte ich mir ein junges Kanarienweibchen. Es kamen Junge, aber das Weibchen wollte nicht füttern. Ich konnte mich damals um die Aufzucht nicht kümmern. Im Mai stand mir für meine Züchtungen ein großes, vierfenstriges Zimmer zur Verfügung mit Morgen- und Nachmittagssonne. Jetzt nahm ich meine Kanarienzucht eifrig in Angriff, ließ mir einen 150 cm langen Käfig machen, 50 cm breit und 50 cm hoch aus Holz mit Drahtgitter und drei Schiebetüren. Ihm folgten später noch zwei ebensolche und einige kleinere Käfige und jetzt ist eine Wand vollständig mit Käfigen besetzt. Unter den günstigeren Verhältnissen erzielte ich von meinem alten Kanarienweibchen doch noch zwei Kanarienhähne; das Kanarienweibchen, welches ihre Jungen verhungern ließ, tauschte ich gegen ein anderes beim Züchter, von welchem ich es erhalten hatte, um, erhielt ein sehr schmutziges Einflügelschwalbenkanarienweibchen und war nur froh, daß ich die Rabenmutter los war. Ich hatte einen sehr guten Tausch gemacht. Bei guter Pflege wurde das Kanarienweibchen nach der Mauser sehr schön und zeigte sich als sehr fruchtbar, und als gute Mutter. Ich erzielte von 40 Eiern in fünf Bruten 16 Junge, ein sehr gutes Resultat. Dieses war nun mein Stamm und im nächsten Frühjahr wurden mehrere Hecken angelegt. Leider starb das Einflügelschwalbenweibchen während der Brutzeit. In demselben Jahre gingen 15 Kanarienhähne und mehrere Kanarienweibchen ein, die Schuld an dem Verluste gab ich einer Sorte sogenannten „Sommerrübsens", den ich aus Dresden

Tahaweber (s. S. 282).

kommen ließ, der wohl viel Hederichsamen enthielt. Überhaupt mit Sommerrübsen ist es so eine eigene Sache; nußsüßer wird immer angeboten; erhielt ich ihn, so wars Geld hinausgeworfen, denn meine Vögel fraßen ihn nicht, probierte ich ihn selber, so war er gallbitter und ich verargte es meinen Kanarien nicht, wenn sie ihn nicht mochten. Heute, wo ich dieses schreibe, habe ich den letzten Sommerrübsen verfüttert und mir vorgenommen keinen mehr zu bestellen. Nun zum laufenden Jahr. Bemerken muß ich noch, daß von 1921 an gleichzeitig meine Stieglitz-Kanarienhecke florierte, worüber ich schon in der „Gefiederten Welt 1923" berichtet habe. Am 1. Februar 1924 eröffnete ich meine Kanarien- und auch Kanarienbastardhecken nebst Bastard × Bastardhecken, und zwar in der Weise, daß ich zuerst, spätere Änderungen vorbehalten, Ehen trennte und Ehen schloß. Ich setzte zusammen: 1. Schwalbenkanarienhahn (einjährig) mit einem jungen reingelben Weibchen. 2. Reingelber Kanarienhahn, nur Flecken am Auge und ein scheckiges Kanarienweibches, beide jungfrän-

lich. 3. Kanarienhahn, gelb mit grauen Rückenfedern und gelbes Kanarienweibchen mit grauem Streifchen überm Kopf, beide jung. 4. Kanarienhahn (Goldvogel) und Käppchen-Kanarienweibchen, beide jung. 5. Kanarienhahn reingelb, Nachkommen eines geliehenen Kanarienhahnes vom Jahre vorher und ein reingelbes Kanarienweibchen, beide jung. Dann die Bastard-Hecken: 1. Alter dreijähriger Stieglitz mit zweijährigem Kanarienweibchen, reingelb. 2. Heller Stieglitz-Kanarienhahn mit einem Käppchen-Kanarienweibchen. 3. Einjähriger Stieglitz mit jungem Kanarienweibchen, reingelb. 4. Ein dunkler Stieglitzkanarienhahn mit Kanarienweibchen, reingelb mit Fleck am Halse. Später gab ich dieses Weibchen wieder weg, da es nicht fütterte und ersetzte es durch ein Stieglitz-Kanarienweibchen. 5. Kanarienhahn mit Stieglitz-Kanarienweibchen. Dann noch zwei Stieglitzkanarienhähne mit zwei Stieglitz-Kanarienweibchen, über welche ich aber nicht Buch führte, da wenig Hoffnung auf Erfolg war, was sich auch bestätigte. Auf Grund meiner Erfahrungen kann ich schon heute behaupten, daß Stieglitz-Kanarien nicht fortpflanzungsfähig sind und auch die Stieglitz-Kanarienweibchen keinen großen Wert haben, da sie zu kleine Eier legen. Doch will ich es mit diesen und auch mit meinem weißscheckigen Stieglitz-Kanarienhahn nochmals im nächsten Jahre versuchen. (Forts. folgt.)

Sprechsaal.

(Steht den Abonnenten kostenlos zur Verfügung.)

Folgende Zeilen gehen mir von einem Leser unserer Zeitschrift aus Deutschösterreich zu:

„Ich muß Ihnen einen Übelstand mitteilen, um dessen Beseitigung ich bitte. Ich habe heuer im Frühjahr als Mitglied der „A. Z" an eine Reihe von Züchtern, die in der „Gefiederten Welt" inserierten, Anfragen gerichtet und jedesmal eintausend österr. Kronen als Antwortporto beigelegt. Ich habe niemals eine Rückantwort erhalten. Vor einiger Zeit habe ich auf das Inserat in der „Gef. Welt" . . . . und . . . . zweimal geschrieben und ersucht, ob sie mir von Ihren Vögeln etwas zukommen lassen könnten. Ich legte jedesmal Kr. 1000.— bei, erhielt aber keine Antwort. Da erfuhr ich von meinen Freunden im Verein, daß es ihnen ebenso ergehe.

Das ist eine Unart, um deren Beseitigung ich Sie bitte. Durch eine solche Handlung wird der Ruf der deutschen Vogelliebhaber geschädigt und abfällig beurteilt. Das ist uns Deutschösterreichern auch nicht gleichgültig, denn wir fühlen uns eins mit den Deutschen im Reiche."

Die Berechtigung der vorgebrachten Beschwerde wird allerseits gebilligt werden.

Zur Erklärung, nicht zur Entschuldigung, des Ausbleibens der Antwort möge folgendes dienen, denn „Alles verstehen, heißt alles verzeihen." Die verehrten Leser im Auslande legen zur Freimachung der Antwortsendung ihrer Anfrage, mangels deutscher Freimarken, Geldscheine oder Postwertzeichen ihres Landes bei. Beides ist für die Freimachung der Antwort wertlos, sowohl die Briefmarken wie die kleinen Geldscheine, die keine Wechselstube einzulösen bereit ist.

Die Aussichten auf Beantwortung der Anfrage werden besser sein, wenn der Anfragende sich einer Antwortkarte bzw. der Weltpostantwortkarte bedient. K. N.

Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber Sitz Leipzig.

1. Vorsitzender Joh. Birk, Leipzig-Mockau, Beuthstr. 29; Geschäftsstelle: Rudolf Petters, Leipzig-Probstheida, Preußenstr. 31; Kassierer Werner Geßler, Leipzig, Dresdner Str. 2; Tauschvermittlung — T.-V. —: Richard Vorwerk, Leipzig-Lößnig, Merveldstr. 39.

An unsere Mitglieder!

Aus den Zeitschriften ist ersichtlich, daß der Landesverband Preußen am 19. bis mit 23. November d. J. eine Ausstellung veranstaltet. In Würdigung der Bedeutung derartiger Veranstaltungen für Vogelschutz und -pflege wollen wir nicht unterlassen, jeden sich bietenden Anlaß zu ergreifen und unsere Mitglieder darauf hinzuweisen. Es lohnt sich sehr wohl den großen Erfolg der von demselben Verband im vergangenen Jahre veranstalteten Ausstellung hervorzuheben, der unseres Wissens nicht nur ein Erfolg in den Darbietungen, sondern auch ein recht schätzbarer im Besuche war. Das wird und darf auch dieses Jahr nicht ausbleiben. Die Mühe und Arbeit, die Zeit und die Opfer dürfen nicht umsonst angewendet worden sein. Für jeden Liebhaber, ob er nun eine kurze oder längere Lehrzeit hinter sich hat, gibt eine derartig groß angelegte Ausstellung Gelegenheit zu sehen und zu lernen und wer das versäumt, der hat Uneinbringliches versäumt.

Dem Wunsche des Reichsverbandsvorstandes entspräche es, wenn diese Aufforderung zum Besuche der Berliner Ausstellung allerseits recht vielseitig entsprochen würde zum Vorteile der Liebhaber des Vogelschutzes und der -pflege.

Der Vorstand. J. A.: Rudolf Petters, 1. Schriftführer.

Vom Vogelmarkt.

Von seltener auf den Vogelmarkt kommenden Vögeln werden angeboten:

Tierhandlung Max Kleinert, Berlin NO 18, Straußberger Str. 13, Fernruf Alexander 3313: Rotstirnamazonen, Weißkopfamazonen, Veilchenpapageien, Tarant. Unzertrennliche, Kaktussittiche, Blaustirnsittiche, Schamadrossel, Amerik. Spottdrossel, Prachtglanzstare, Büffelweber, Gilbweber, Tahaweber, Papstfinken, Indigofinken, Kubafinken, Spitzschwanzamandinen, Maskenfinken.

Otto Steinhagen, Lübeck, Beckergrube 7: Zeisig × Grünfink-Bastard, Fuchskanarien ohne weiße Federn.

Linda Hirsch, Aubstadt (Unterfranken), A. Z.-Mtgl. 233; Ornis 318: Stieglitz-Kanarienhähne, Stieglitz-Kanarienweibchen.



Herrn H. H., Essen-Ruhr. Der Star ist einem Gehirnschlag erlegen. Ein starker Bluterguß hatte mit Blut durchsetzte Teile des Gehirns in die Augenhöhle gedrängt und so das Hervortreten des Auges verursacht. Das Futter war unverdorben.

Herrn R. Th., Altona; Herrn E. M., Chemnitz; Herrn K. S., Breitenhausen; Herrn J. St., Niederlößnitz; Dr. L., Brüssel; Herrn K., Anklam: Beiträge dankend erhalten.

Herrn O. H., Vogelsang i. Westf. Die vier genannten Vögel können zusammen in einem Käfig von etwa 75×40 ⊥ 50 cm im ungeheizten Raum überwintern. Im allgemeinen singen die Vögel einzeln gehalten besser und fleißiger, besonders der Buchfink. Wohl die meisten Vögel werden in Zimmern gehalten, welche durch Gaslicht beleuchtet werden. Wenn für gute Luft und Lufterneuerung gesorgt wird, wird kein bemerkenswerter Schaden durch diese Art von Beleuchtung herbeigeführt. Wenden Sie sich an das Ornis-Haus in Halle a. S.

Herrn P., Düsseldorf-G. Der Webervogel war ein Weibchen des Zwergmaskenwebers — Ploceus luteolus.

Herrn P., Parkersburg, Pa. U. S. A. Vielen Dank für die Photographien; der Vogel, dessen Federn sie sandten, kann nur der Baltimore-Trupial sein. Der in dem Nest des Indigofinken neben jungen Indigofinken erbrütete Vogel ist ein junger Kuhstar. In „Fremdländische Stubenvögel" sind nur die Vögel beschrieben, welche bis zur Herausgabe des Buches lebend nach Deutschland gelangt sind. Aus diesem Grunde konnte der Hauszaunkönig (House wreeu) keine Aufnahme in dem Buche finden.

Herrn B. S., Berlin-Lichterfelde. Der junge Wellensittich ist einer schweren Darmentzündung erlegen.

(Fortsetzung auf der 2. Umschlagseite.)

Jahrgang 53 — 23. Oktober 1924 — Heft 36

DIE GEFIEDERTE WELT.

ZEITSCHRIFT FÜR VOGELLIEBHABER

Begründet von Dr. Karl Ruß

Herausgegeben von Karl Neunzig in Berlin-Hermsdorf

Inhalt:

Webervögel und Widafinken. Von A. Krabbe. (Fortsetzung.)

Über Heckenbraunellen. Von A. Jena, Biberach (Riß).

Exoten. Von S. Lichtenstaedt.

Mein Glanzstar und anderes. Von L. Reuen.

Meine Kanarien und Kanarienbastardzucht 1924. Von Linda Hirsch, Aubstadt.

Sprechsaal - Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber, Sitz Leipzig - Vom Vogelmarkt - Redaktionsbriefkasten - Bevorstehende Vogelschauen - Aus den Verbänden - Aus den Vereinen.

Abonnement monatlich (4 Nummern) 1.50 Gm. — Einzelpreis des Heftes 50 Gpf.
vermittelt das nächste Postamt bzw. der zuständige Briefbote. / Postversand ab Burg Bez. Magdeburg.

eutz'sche Verlagsbuchhandlung / Magdeburg / Postschließfach 148

Bevorstehende Vogelschauen.

Heidelberg. Vogelschau am 1. und 2. Nov. 1924. Verbunden mit der Ausstellung ist eine Aussprache über Vogelhaltung, besonders über Käfigung und Ernährung von Stubenvögeln.

Am Sonntag, den 2. November, um 11 Uhr findet ein Lichtbildervortrag, welcher heimische Vögel in allen ihren Betätigungen vorführt, statt. Vortragender Prof. Dr. O. Fehringer. Die Ausstellung selbst wird neben einer sehr großen Zahl lebender Vögel, Käfige fast aller Systeme und Futtermittel zeigen, daneben Vogelschutzeinrichtungen, Nisthöhlen, Winterfütterung, Vogelschutzgeräte usw.

Die Veranstaltung verspricht außerordentlich interessant und lehrreich zu werden, so daß der Besuch der Ausstellung sehr lohnend sein wird.

Berlin. Vogelschau des Landesverbandes Preußen von Mittwoch, den 19. Nov. bis Sonntag, den 23. Nov. 1924 in den Sophiensälen, Berlin C, Sophienstr. 17/18.

Karlsruhe, Verein von Vogelfreunden. Gegr. 1888. Vogelschau u. Kanarienprämiierung am 6. u. 7. Dez. 1924.

Aus den Verbänden.

Verband deutscher Farben-, Gestalt-, Bastardkanarien- und Exotenzüchter und des Bayerischen Vogelliebhabervereins (e. V.) Sitz München, Ortsgruppe Augsburg. Jeden Samstag gemütliche Zusammenkunft beim Vogelwirt Joseph Leininger, Gasthof, Frohnhof—Peutingerstr. Jeden 1. Samstag im Monat Monatsversammlung ebendort. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. Als amtliches Vereinsorgan ist die „Gef. Welt" anerkannt worden. J.A.: H. Schwaiger, 1. Vors., Augsburg, Schöpplerstr. 9/II.

Aus den Vereinen.

Mtgl. Nr. 144 wohnt jetzt Misdroy, Dünenstr. 2. — Es wird wieder Nachfrage laut nach A. Z.-Briefbogen, -Karten und -Umschlägen mit und ohne Adresse, hergestellt mit unserm Klischee. Um eine Übersicht der angeforderten Anzahl zu haben, bitte ich die Bestellung darauf umgehend aufzugeben. Das Mindestquantum ist 100 Stück; bei Adressenaufdruck empfiehlt sich eine Auflage von 500. Die Preise werden mäßig sein; die Ausführung wird einer andern Druckerei als vorher übertragen werden. Versand und Rechnungserteilung erfolgt direkt von Lieferfirma. — Zwecks Einladung zur Jahresversammlung durch Drucksachenkarte bitte ich etwaigen Adressenwechsel umgehend mitzuteilen. Der 19. November — Bußtag — ist für die Versammlung in Aussicht genommen.

A. Krabbe, Anklam, Demminer Str. 10.

„Aegintha", Verein der Vogelfreunde zu Berlin. Unsere Sitzungen finden an jedem 1. und 3. Donnerstag im Monat, abends 8 Uhr, im Vortragssaal des Aquariums statt. Fast in jeder Sitzung belehrende Vorträge und Besprechungen unter gütiger Mitwirkung unseres verehrten Ehrenmitgliedes Herrn Dr. Heinroth. Gäste gern willkommen. J.A.: O. Vorbrodt, 1. Schriftf., O 112, Scharnweberstr. 18.

Vereinigung der Liebhaber einheimischer Vögel zu Berlin. Sitzung jeden 2. Donnerstag nach dem 1. und 15. des Monats im Vereinslokal zum „Alexandriner", Alexandrinenstraße 37a. Gäste stets willkommen.

J.A.: P. Böhme, Schriftf., O 17, Rüdersdorfer Str. 69.

Verein Vogelschutz u. -pflege zu Dresden. Versammlung jeden Donnerstag, abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Schillers Restaurant", Ecke Stifts- und Ehrlichstr. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. Bernhard Kühn, Vors.

Alte Vereinigung der Vogelliebhaber zu Dresden. Versammlung jeden Freitag, abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Blasewitzer Hof". Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. J. A.: Matth. Meys, Schriftführer.

Alte Vereinigung der Vogelliebhaber zu Dresden. Am 3. Oktober 1924 hielten wir unsere diesjährige Generalversammlung ab. Nach der Begrüßung der Erschienenen durch den 1. Vorsitzenden Herrn Frohberg verlas derselbe die Tagesordnung. Diese lautete: 1. Verlesen der Niederschrift; 2. Eingänge; 3. Anmeldung und Aufnahme; 4. Vortrag des Jahres- und Rechenschaftsberichtes; 5. Anträge; 6. Neuwahlen; 7. Vereinsangelegenheiten. Zu 1 verlas der Unterzeichnete die Niederschrift der letzten Monatsversammlung. Zu 2 wurden die Zeitschriften ausgelegt und zwei Schreiben dem Schriftführer zur Beantwortung überreicht. Zu 4 wurde vom Schriftführer der Jahresbericht verlesen und vom Kassierer Ferrn Frohberg der Rechenschaftsbericht. Beide wurden genehmigt von der Versammlung. Zu 5 stellt Herr Ritschel den Antrag, § 6 der Statuten zu ändern. Dieser Antrag betreffs Eintritts- und Beitragsgeld, der praktisch schon seit 1. Januar 1924 geändert ist, wurde einstimmig zu Beschluß gefaßt. Zu 6 übernimmt der 2. Vorsitzende Herr Scholz das Amt eines Wahlleiters. Hierauf schilderte Herr Ritschel in trefflichen Worten die guten Eigenschaften, die Herr Frohberg als 1. Vorsitzender zum Wohle des Vereins bisher betätigte. Herr Ritschel betonte noch, daß er auch weiterhin bei einem evtl. Vorschlag absehen müßte, das Amt eines 1. Vorsitzenden zu übernehmen. Darauf wurde Herr Horst Frohberg als 1. Vorsitzender einstimmig wiedergewählt. Herr Frohberg dankte für das Vertrauen und nimmt das Amt an. Hierauf schilderte Herr Frohberg in kurzen Zügen die bisherige Tätigkeit und hob die Verdienste, die sich Herr Ritschel nicht nur als ehemaliger 1. Vorsitzender, sondern auch als alter Praktiker und Kenner unserer Liebhaberei um unseren Verein erworben hat, hervor. Noch besonders seine opferfreudige Hingabe an den Verein sowie seinen lauteren Charakter betonend, schlug der 1. Vorsitzende vor, Herrn Ritschel als Ehrenvorsitzenden zu wählen. Diese Wahl wurde einstimmig angenommen. Sichtlich gerührt und erfreut dankte Herr Ritschel für das besondere Vertrauen. Darauf wurde Unterzeichneter als Schriftführer einstimmig wiedergewählt. Zur Wahl eines Kassierers wurde Herr Huhn vorgeschlagen und einstimmig gewählt. Herr Scholz wurde als 2. Vorsitzender einstimmig wiedergewählt. Zu 7 wurde darauf hingewiesen, daß am 28. Dezember 1924 ein kleines Weihnachtsvergnügen im engeren Familienkreis und am 24. Januar 1925 eine Fastnachtsfeier im „Herzog Albrecht" stattfindet. Weiterhin wurden einige Vorbereitungen zu einer Ausstellung sowie zu einem evtl. Vortrag getroffen. — Unser diesjähriges Stiftungsfest feierten wir am 13. September unter reger Anteilnahme und gutem Verlauf des Programms im „Herzog Albrecht". 11½ Uhr schloß der 1. Vorsitzende die Versammlung. Math. Meys, Schriftführer.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei zu Hamburg. Sitzung jeden 1. u. 3. Dienstag im Monat in Hüttmanns Hotel, Poolstr. 22, abends 8¼ Uhr. Nächste Sitzung Dienstag, den 1. November 1924. Gäste sowie auch Exotenliebhaber stets willkommen. J. A.: Arnold Weber, 1. Vors.

Vereinigung hannoverscher Vogelliebhaber. 46. Mitgliederversammlung, am 2. Oktober 1924, im Landesheim, Bolgersweg. Anwesend 30 Personen. Eine ganze Reihe von Eingängen werden erledigt und besprochen. Es wird preiswertes Futter angeboten. Durch ein Mitglied können wir ständig zu Vorzugspreisen Zwiebackmehl bekommen, das als Zusatz zum Weichfutter außerordentlich geeignet ist. Dann wird beschlossen, sich für Besteuerung und teilweises Verbot der Ausfuhr deutscher Vögel einzusetzen. Unser Mitglied Klocke und Herr Sunkel, Marburg, werden sich in dem Sinne bemühen. Verschiedene Mitglieder des Lindener Vogelvereins sind anwesend, werden begrüßt und gebeten, häufiger wiederzukommen. Wie freuen uns, wenn es überall Zusammenschluß Gleichgesinnter gibt, bitten solche Nebenvereine aber doch, unserer Vereinigung, die Vorträge und wirtschaftliche Vorteile bietet, treu zu bleiben. — Herr Klocke berichtet über die Möglichkeit eines Vogelhausbaues in unserem Zoo. Erwägungen sind im Gange, und es wird auf Vorschlag des Vorsitzenden ein Ausschuß, bestehend aus den Mitgliedern Troschütz, Klocke und Becker, gewählt, um diese Frage mit zu bearbeiten und sie so zu lösen, wie wir Vogelliebhaber es gern sähen. Der Hauptteil des Abends ist dann ein langer, trefflicher, wissenschaftlicher und doch volkstümlicher Vortrag des Herrn Sunkel aus Marburg. Jeder wird von diesem, mit verschiedenen humorvollen Einstreuungen gewürzten Vortrage etwas mitgenommen haben. Es wäre um die Frage der Naturforschung und Naturerkenntnis im deutschen Volke besser, wenn wir viele solcher echt deutschen Forscher und Naturfreunde an der Arbeit wüßten. Über Einzelheiten des Vortrages soll hier nicht gesprochen werden, darüber erscheint im Januar eine besondere Veröffentlichung. Herr Sunkel sprach dann zum Schluß noch über die Arbeit und die Ziele der in Hessen von ihm gegründeten „Arbeitsgemeinschaft für deutsche Vogelforschung", der sein Freund Panzer vorsteht. Er gab die Wege an, nach denen man arbeiten kann, z. B. erst durch Umfragen, dann durch Ein-

(Fortsetzung auf der 3. Umschlagseite.)

gaben oder Besuche bei Behörden und Schulen, drittens durch die Presse und viertens durch Schaffung einer Faunaübersicht, in dem Sinne, daß alle Naturfreunde und Vogelliebhaber selbst Beobachtungen aufzeichnen. Es können das kleine, ja größtenteils bekannte Vermerke sein, die, gesammelt und gesichtet, doch einen wertvollen Grundstock abgeben. Sunkel will uns darüber weiter auf dem laufenden halten, uns Anregungen geben und von seiner rührigen hessischen Beobachtungsstelle aus befruchten. Von unserem Mitglied Eskuche sind eine große Anzahl wertvoller Bücher für unsere Vereinigung gestiftet, auch von Mitglied Riehl ein Buch. Appel.

Verein von Vogelfreunden Karlsruhe. Gegr. 1888. Unsere Monatsversammlungen finden künftighin jeweils jeden 1. Mittwoch im Monat statt. Lokal „Goldener Adler". Die diesjährige Vogelausstellung, verbunden mit Kanarienprämiierung, findet am 6. und 7. Dezember d. J. statt. Außer Medaillen werden wertvolle Ehrenpreise vergeben. Zur Ausstellung werden nur Mitglieder unseres Vereins zugelassen. Nächste Vorstandssitzung Donnerstag, 16. Oktober d. J. im Vereinslokal „Goldener Adler", Karl-Friedrich-Str. Beginn 1/2 9 Uhr abends.
Bang, 1. Vorstand. Boppel, 1. Schriftf.

Verein der Vogelliebhaber Königsberg (Pr.). Sitzung jeden Freitag nach dem 1. u. 15. d. M., abends 8 Uhr im Vereinslokal „Kaiser-Kaffee", Kaiserstr., Ecke Schnürlingsstr. Gäste sind willkommen. J. A.: Ernst Reinholdt, 1. Vors.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig. Vereinssitzungen jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat im Vereinslokal „Bauers Brauereirestaurant", Täubchenweg. Nächste Sitzung Donnerstag, den 6. November. Gäste stets willkommen. J. A.: Johann Birk, 1. Vors.

Verein der Vogelfreunde Leipzig-Plagwitz. Vereinslokal: „Gosenschlößchen", Leipzig-Plagwitz. Sitzungen an jedem 1. und 3. Montag des Monats, abends 8 Uhr. Vogelfreunde sind stets willkommen.
K. Scholtissek, 1. Vors., L.-Plagwitz, Lauchstädter Str. 30.

Verein der Vogelliebhaber zu Mannheim. Versammlungen finden alle 14 Tage Samstag abend 8 Uhr im Vereinslokal „Restauration z. gold. Falken" statt. S. 1. 17. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen.
Johann Daubmann, 2. Schriftführer.

Bayrischer Vogelliebhaberverein, Sitz München (E.V.). Jeden Samstag gesellige Zusammenkunft im Pschorrbräuhaus, Bayerstr. Jeden letzten Samstag im Monat Monatsversammlung im Vereinslokal ebendort. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. Rud. Engel, 1. Schriftführer.

„Ornis", Freie Bezugs-Vereinigung der Waldvogelliebhaber Deutschlands. Gegründet 1912. Auf vielseitigen Wunsch der alten Mitglieder wollen sich die Waldvogelliebhaber wieder in der „Ornis" zusammenschließen. Als amtliches Organ ist die „Gef. Welt" ausersehen worden, und werden die Artikel, die früher in den „Ornis-Blättern" erschienen, in obiger Zeitschrift gebracht werden. Aus diesem Grunde bittet die Geschäftsführung um eifrige Mitarbeit, damit unserer Waldvogelpflege wieder der Platz eingeräumt wird, der ihr gebührt. Anmeldungen sind unter Beifügung von 2 M. an den Geschäftsführer zu richten; Mitglieder erhalten auf Mischfutterbestellungen 5% Rabatt. Mit treudeutschem Gruß
Martin Sperling, Halle a. d. S., Südstr. 49.

Zoolog. Verein zu Zwickau i. S. Versammlung jeden Freitag nach dem 1. und 15. jeden Monats, abends 8 Uhr, im Restaurant „Zur Bleibe", Katharinenkirchhof. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen.
J. A.: Paul Schmidt, 1. Vors., Zwickau i. S., Bosenstr. 44.

Anzeigenteil

e viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 20 G.-Pf. berechnet. Aufnahme erfolgt gegen Voreinsendung des Betrages in Reichsgeld per ief od. auf unseren Zahlstellen: Postscheckkonto: Magdeburg 3148, Wien 156 687, Bern III 4326, Prag: Creditanstalt d. Deutschen unter Angabe des Zweckes

Käfige u. Gerätschaften

ogel-Fangkäfige 2.50 und 4.50 ℳ, Schlagnetze f. kl. schädl. Vögel 1.90 ℳ, röß. 2.10 u. 2.40 ℳ. Katalog gratis. **Tannen,** Gronau 58 (Westf.). [821

Verkaufe
Weichfresserkäfige,
gut erhalten, billig. [822
ml Oehme, Freiberg (Sachsen).

Futtermittel

Prima echte Harzer
Kanarien-Edelroller
seit. Tag- u. Lichtschläger aus meiner annten Feinzucht, ℳ 12, Ia Zuchtchen ℳ 15. Porto, Verpack. ℳ 4.

ebirgssommerrübsen,
süße milde Kennerware, Postkolli ℳ 4,50 franko.

reßsucht, Rotleibigkeit
gen- u. Darmkrankheiten aller Vögel, h bei Frischfängen, heilt absolut schnell sicher mein Harzer Heilmittel. Einfache praktische Anwendung, 1000fach im rauch! ℳ 2.50, ausreichend für mehrere 100 Tiere.
Rich. Heydenreich,
Bad Suderode 7 B, Harz.
atsmedaille, viele gold. Medaillen, seit] vielen Jahren an der Spitze.

ehlwürmer Pfd. 7 ℳ, 2/7 = 2 ℳ franco. Voreins.
] **Jeltner, Breslau,** Weinstr. 12.

Enchyträen - Zuchtkisten
sehr gut bevölkert, das beste
lebende Futter
für alle kl. Weichfresser, speziell zum Eingewöhnen besserer Arten, sowie als Zugabe während der Brut für Exoten. Preis 6 M. franko gegen Voreinsend. Genaue Zuchtanweisung füge bei. [825
H. v. d. Höh, Köln, Ulrichgasse 19.

Vogelfutter [828
für Kanarien, Waldvögel, Exoten, Papageien, Weichfresser. Anerkannt bewährteste Mischungen auf Grund langjähriger Erfahrung. Liste 13 über Vogelfutter umsonst.
W. Göpel, Leipzig,
Tröndlinring 1. Telephon 14 958.
Bei Anfragen bitte auf die „Gefiederte Welt" Bezug zu nehmen.

Mehlwürmer
geg. Einsend. v. 2.— Reutenmark 1/4 Pfd. franko versend. **D. Waschinski & Co.,** Biesenthal I (Mark). [830

Ornis-Haus
Halle-Saale
Gegründet 1912
Spezialität:
Individuelle Weichfresserpflege nach Angaben des Herrn Apotheker Adalbert Jena-Biberach-Riß. (Alleiniges Herstellungsrecht.)
Reform-Normal I, Volierenm.,
Reform-Normal II, f. Rotkehlchen, Schwarzplatten usw.,
Reform-Normal III, f. Nachtigall., Sprosser usw.,
Reform-Normal IV, f. Gelbspött., Goldhähnchen usw.,
Reform-Normal V, f. Schama usw.,
Körnerfutter Ia für jede Vogelart. [831
Inhaber langjähriger Fachmann, siehe „Ornis-Buch" (90 S.) Mk. 1
Preisliste auf Wunsch!

Versäumen Sie nicht das Abonnement der „Gefiederten Welt" zu erneuern!

Ameiseneier,
vom Besten das Beste, deutsche 24, à Pfd. 6 ℳ, prima finnische, erster Auslese, Pfd. 5 ℳ, Weißwurm Pfd. 6 ℳ, Muska Pfd. 7 ℳ, feinstes kondensiertes Eigelb Pfd. 3 ℳ. Mein vielseitig anerk. Weichfutter Marke „Primus" Pfd. 2.50 ℳ, Weichfutter „Ornis" Pfd. 0.80 ℳ. Obige Futtersorten führe ich das ganze Jahr hindurch. [826
Mehlwürmer, 1/4 Pfd. 2 ℳ.
E. W. Lenger,
Berlin N 58, Schönhauser Allee 70 a.

[827 **Mehlwürmer,** reine Ware,
gegen Eins. von 1.75 ℳ 1/4 Pfd. franko.
Th. Witte, Niederndodeleben b. Magd.

Weißwurm.
Einen Posten pa. Weißwurm, diesj. Ernte, hat, solange Vorrat reicht, zum Preise von 4.50 M. per Pfund ab hier abzugeben [829
E. Schubert, Dresden,
Hammerstraße 4.

Sturms „Flora von Deutschland" 11 Bde. geb., 4 ungeb. (komplett), gegen Gebot, nicht unter 20 ℳ, zu verk. [832
Alfred Klaus, Seifhennersdorf 179.

Beschwerden wegen Nichtzustellung der „Gefiederten Welt" sind beim zuständigen Postamt anzubringen.

Vögel

Gelbnackenamazonen,
fingerzahm, anfang. mit sprechen, 70.—

Graupapageien,
silberhellgraue Kongoovögel, 100.— ℳ

Sperlingspapageien . Paar 18.—
Wellensittiche, jung . . Paar 16.—
Bergpapageien, unzertr. Paar 45.—
Kl. Gelbhaubenkakadu Stück 70.—
Weißhaubenkakadu . Stück 100.—
Grünhäher . . . . . Stück 30.—
Große Weber . . . Stück 10.—
Glockenvögel . . . . Stück 35.—
Karmingimpel . . . Stück 5.—
Silberschnäbelchen . . Paar 4.20
Webervögel . . . . Paar 3.50
Schuppenköpfchen . . Paar 12.—
Stieglitz, Männchen . . Stück 3.—
Zeisig, Männchen . . . Stück 2.50
Rothänfling, Männchen Stück 3.—
Buchfink, Männchen . . Stück 2.—
Girlitz, Männchen . . Stück 3.—
Kreuzschnabel, Männch. Stück 3.—
Rotkehlchen . . . . Stück 2.—
Sprosser . . . . . Stück 50.—

Verpackung und Porto 3.50 ℳ, als Dringend 6.50 ℳ. **Praktisch zerlegbare Käfige,** 40 cm lang, 30 cm hoch, 22 cm tief, à 7.50 ℳ komplett. Wenn bei Vogelbestellung Käfig mitbestellt wird, Porto 1.— ℳ billiger. [833

E. W. Lenger,
Berlin N 58, Schönhauser Allee 70 a.

Beo

(E. intermedius), tadellos befiedert, gegen 40 ℳ bar oder in **Tausch** gegen andere Exoten (auch Wellens., Nachtigall-Kanarie) abzugeben.

Dr. Pusching,
Klagenfurt, Römerbad
834] (Oesterreich).

Wegen Überfüllung meiner Vogelstube gebe an Liebhaber je einige Paare kerngesunder, monatelang in meinem Besitze befindlicher Exoten ab:

Zebrafinken	16 M.
Jap. Möwchen	12 M.
Tarantiner	40 M.
Sperlingspapageien . .	16 M.
Mex. dito. . .	25 M.
Kl. Kubafinken	35 M.
Gr. Kubafinken	25 M.
Goulds (schwk.)	50 M.
Spitzschwänze	50 M.

Lichtenstaedt, Berlin-Johannisthal, Nieberstraße 10. [835

1,1 Dompfaffen, 2jähr., Ia garant. erprobtes zuverl. Zuchtp., 10 ℳ; 1,1 gelbe Wellensitt. 12 ℳ; 6 jg. jap. Möwch. à 5 ℳ; 1,0 Bandf. 1 ℳ; 0,1 Amarant 1 ℳ; 2,1 Girlitzbastarde ♂ à 5 ℳ, ♀ 2 ℳ; 1,0 Zeistgbastard 6 ℳ; 1,2 Grünltngbast. ♂ 3 ℳ, ♀ 1 ℳ; folg. erprobte Zuchtp. z. Bastardz.: ♂ Hänfl. ♀ Kan. 4 ℳ; ♂ Grünling ♀ Kan. 3 ℳ; ♂ Girlitz ♀ Kan. 3 ℳ hat abzugeb. [836

Bernd Regge, stud. rer. pol.,
Lötzen (Ostpr.) A. Z.-Mtgl. 264.

[redacted]

Zeisige, Hähne, Stieglitze, Rothänflinge, Rote Gimpel und alle anderen Sorten Vögel empfiehlt für Liebhaber und Händler

Hermann Hornig
Vogelexporthaus [837
Zittau i. S., Neusalzaer Straße 17.

[redacted]

Wellensittiche 0,4, von nachweislich importiertem Pärchen gefallen, à Stück 10 M., im Umfedern begriffen, verk. zur Zucht. [838

W. Isaaks, Oberpostschaffner a. D.,
Harburg (Elbe).

In der Zeit vom

2. Oktober bis 28. Februar

ist der An- und Verkauf wie das Feilbieten von **in Europa einheimischen Vögeln — mit Ausnahme der Meisen, Kleiber, Baumläufer und Spechte** — zulässig, es können daher in dieser Zeit derartige Inserate in der „Gefiederten Welt" zum Abdruck gelangen! Der Insertionspreis für die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum beträgt 0.20 Gm. Aufträge erbeten an

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg
Postschließfach 148

Weiße Kanarien
und garantiert weißblütige **Gelbe** gebe ab. Tausche auch auf seltenere Exoten. [839

Heinrich Hahn jr., Neuß a. Rhein,
Crefelder Straße 60. A. Z.-Mtgl. 299.

Pa. Waldvögel

Stieglitzhähne 3 M., Hänflinge 2 M., Zeisige 2 M., Buch-, Berg- u. Grünfinken 1.50 M., Kreuzschnäbel 2.50 M., Weibchen die Hälfte. Garantie für Männchen und lebende Ankunft. Verpackung u. Porto zum Selbstkostenpreis.

Rudolf Rose, [840
Meuselbach, Thür. Wald

Gut singende, schön befiederte

Waldvögel

gebe sofort ab

Stieglitze 3 M., Hänflinge 2 M., Zeistge 1.80 M., Buchfinken 1.50 M., Bergfinken 1.20 M., Grünltnge 1.50 M., blutrote Dompfaffen 5 M., blaue 2 M., Pärchen 6 M., Schwarzplättchen 6 M., Rotkehlchen 4 M., Wald- od. Schwarzamseln 8 M. das Stück, Garantie f. leb. Ankunft. Versand erfolgt p. Nachnahme zuzüglich Porto und Verpackung.

Franz Bechstedt, Vogelexport,
Wildenspring (Thüringer Wald) bei
841] Großbreitenbach.

Blattvogel, blaubärt.,
Prachtvogel, fingerzahm, fleiß. Sänger und Spötter, gebe ab für 40 M. franko. Tausche gegen **amerik. Spottdrossel, Dayaldrossel** oder **Schamadrossel;** bei letzterer zahle zu. [842

R. Diwersy, Merzig (Saar).
A. Z.-Mtgl. 183.

Waldvogelverkauf.

Biete an in nur schönen Exemplaren:

Zeisighähne	1.50—2.—
Stieglitzhähne	2.50—3.—
Stieglitzweibchen	1.50
Girlitzhähne	2.—
Dompfaffen	à Paar 5.—
Rotkehlchen	2.00—3.—
Rothänflinge	2.50—3.—

Bei Anfragen erbitte Rückporto. Dutzendpreis billiger. Händler Sonder-
843] offerte.
Seifhennersdorf (Sachsen),
Gasthaus zur Weintraube.

Waldvögel

2 Schwarzplatten, prima Überschl., Frühjahrswildfänge, gute Gebirgsvögel, à 7.50 M. **1 Fitislaubvogel** (Phylloscopus trichilus) 5 M. **1,1 Zaunkönige** 8 M. **2 gute Rotkehlchen** à 3 M. verkauft [844

Trillhof, Jena, Markt 8.

Suche reinweiße Kanarienweibchen
oder
gelbe Kanarienhaubenweibchen.
Angebot mit Preis.

Konrad Meier,
Hörstmar i. Lippe. [845

Ia Steinrötel
für ℳ 35 zu verkaufen. [846
O. Sprewitz, Torgau, Schloßstr. 12.
Suche Perlstar zu kaufen.

Bestellungen für November sofort der Post übergeben!
Bestellzettel für Deutschland.

Postbestellzettel.

Hiermit bestelle ich für den Monat **November 1924**

1 „Die Gefiederte Welt"
(eventuell mit Nachlieferung). — **Erscheinungsort Burg Bz. Mgdb.**

Name: .....

Wohnung: .....

Postquittung: ..... Mk. ..... Pf. sind heute bezahlt worden.

Ort: ..... den .....

Postannahme

.....

Gebe ab
Sprosser u. Grandrosselmännch
(Doppelkarte.) [84
P. Rükert, Berlin O 11
Simon-Dach-Straße 7.

Ia Graudrossel
echte Davidzippe, 1 Jahr gek., un ermüdl. Sgr., m. nur sch. Rufen, 25 M 848] **J. Decker, Oslebshausen.**

Vorsänger und pa. Zuchtmateria rein durchgezücht. Hohl- und Schocke Stamm, 2 Staatsmedaillen, gebe preis wert ab. Am liebsten selbst kommen. [84

Paul Holzky, Cöthen IV

---

2 Jahre gek. Nachtigall, prima Vogel ℳ 25 inkl. Porto, Verpackung einsenden Tausche auch Orpheusgrasmücke ode Sprosser. [85
H. Kretzschmar, Scheubengrobsdor bei Gera R.

Verkaufe erstkl. Pirol, Nachtigall Schwarzplätt., Sperber grasmücke. Tausche od. kaufe Schama Steinrötel, Blaudrossel, Kalanderlerch 851] oder a. g. Sänger.
Strauß, Breslau 3, Bergstr. 31.

Verkaufe

1,1 Zebrafinken 24er . . .	18.—
1,1 Jap. Möwchen, braunbunt	18.—
1,3 Bandfinken . . . Stck.	2.—
1,0 Schwarzdrossel	6.—
1,0 Star, ausgefärbt	8.—

Letztere tausche auch gegen kleinere Exoten
852] **Suche**
0,1 Blutschnabelweber, 0,1 Tigerfink
Ernst Weber, Oberlind i. Thür.

Abgebe aus Freivoliere
von blutsfremden Eltern einige jung
Nymphen-Sittiche
tadellose Tiere, gegen Gebot. [85
E. Stümcke, Vegesack (Bremen).
A. Z.-Mtgl. 258.

Graudrosseln
(Davidzippen oder Singdrosseln) sow Schwarzdrosseln und Rotkehlchen, prim futterfeste Tiere, je Sorte per 6 Stü mit Verp. G.-M. 18, per 1 Stück M. Außerdem empfehle meine bekannte **Weichfutter-Spezialitäten** für alle Insektenfresser! [8
Ww. Aug. Vogel Nachf., Solinge Fernruf 2090. Tel.-Adr. Vogel Nach

---

Für Kanarienzüchter

Soeben erschienen:

Die Farben- und Gestalt kanarien
nebst Beschreibung aller ve schied. Kanarienrassen, dere Entstehung, Form- u. Farbe veränderung, Bastardzucht Farbenfütterung v. A. Asche brenner. Mit vielen stic haltigen Abb. Kart. 1.75 M

Der Kanariengesang.
Allgemeinverständliche sow musikalische und phonetisc Darstellung von W. Kluh 1.00 M

Zu beziehen durch:

Creutz'sche Verlagsbuch handlung, Magdeburg.
Postschließfach 148.

Inserate
für das am 30. Okt. 1924 zur Au gabe gelangende Heft 37 der G Welt erbitten bis 25. Okt. 1924 frü

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Berlin-Hermsdorf; für den Anzeigenteil: Rolf Kretschmann, Magdeburg, Postschließfach 148.
Verlag der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck: August Hopfer, Burg Bz. Mgdbg.

Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Jahrg. 53 | Den 30. Oktober 1924 | Heft 37

(Druckort: Burg, Bezirk Magdeburg.)

Webervögel und Widafinken.

Von A. Krabbe.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Vor dem Kriege gehörte der Tahaweber zu den seltensten Erscheinungen, ungefähr wie heute der Brandweber, und wurde mit hohem Preise bezahlt. Als nach dem Kriege dem Vogelhandel neue Gebiete erschlossen wurden und Fockelmann große Transporte aus Südafrika und Ruhe solche aus Abessinien herüberbrachte, ist auch dieser niedliche Weber in großer Zahl auf dem Vogelmarkt und wird zurzeit mit 15 Mark das Paar angeboten. Ich erhielt 1922 von einem Münchener Liebhaber ein schönes Männchen der südafrikanischen Art und im Februar dieses Jahres ein solches aus Abessinien von einem Ruheschen Transport. Eine große Anzahl der südafrikanischen Tahas sah ich bei meinen Besuchen bei Fockelmann in Großborstel. Der Tahaweber ist eine reizende Erscheinung; so ruhig er im grauen Kleid ist, so aufgeregt ist der kleine Kerl im Prachtkleid, in dem er einen überaus originellen Anblick bietet, weil ihm die gelbe Kopfplatte wie eine Kappe über den dunklen Aeuglein, die lebhaft aus dem schwarzen Gefieder herauslugen, sitzt. Während sonst die Brutzeit im August beginnt, war dieser Erstenworbene im Frühjahr einer der ersten, welche verfärbten. Die Einfärbung begann am 26. April und war am 18. Mai beendet, dauerte also 32 Tage, während die Ausfärbung aus dem Prachtkleid im Vorjahre und 25 Tage beanspruchte. Sowie sich die ersten unten Federn zeigten, wurde der Vogel lebendig und schnurrte mit gesträubter Haube im aufrechten Hummelflug singend durch die Voliere, jeden andern Vogel anbalzend und auf dem Boden merkwürdige Sprünge vollführend. Das ganze Benehmen ist so putzig, daß ich den Vogel besonders ins Herz geschlossen hatte und tiefbetrübt war, ihn im August dieses Jahres tot am Boden zu finden. Ein Herzschlag hat dem liebebedürftigen Herzen ein jähes Ende bereitet; er starb in voller Schönheit. Im Vorjahre hatte der Vogel ein niedliches kugelrundes Nest mit Einschlupfloch, dieses genau in der Mitte der oberen Hälfte und einem umgedrehten U gleichend, gebaut. Der abessinische Weber kam kurz nach der Ausfärbung aus dem Hochzeitskleid zu mir, mit noch etlichen schwarzen und gelben Abzeichen, die nie ganz verschwanden. Erst im August setzte naturgemäß die Einfärbung ein und zog sich bis Ende September hin. Nach meinen Erfahrungen wird das Brutkleid, welches unvollständig ist, bald wieder abgelegt, in Anpassung der Brutzeit an unsere Jahreszeiten. Die Größe ist beträchtlicher als die des Vorgenannten, dessen Lebhaftigkeit er nicht erlangt. In der äußersten Ecke hat er sein Standquartier, welches er nur verläßt, wenn er vertrieben wird oder Futter aufnimmt. Weitere abessinische Tahaweber sah ich im Berliner Zoologischen Garten, die mit meinem Exemplar in der Färbung übereinstimmten.

Ich kann diesen reizendsten aller Feuerweber jedem Exotenliebhaber angelegentlichst empfehlen und bin der Ansicht, daß die Beunruhigung durch die Balzflüge während der Brutzeit erträglich ist und zu Angriffen gegen Käfiggenossen nicht ausartet. Wer noch ein Pärchen dieser Zwerge, insbesondere der südafrikanischen Art, erwerben kann, der lasse die Gelegenheit nicht vorübergehen, denn die Ausfuhr aus Südafrika ist gesperrt und u. U. verschwindet er bald wieder vom Vogelmarkt.

Die lange Reihe der eigentlichen Weber eröffnen wir mit der

C. Gattung Gelbweber — Xanthophilus *Rchb.*, die 14 Arten zählt, sämtlich ohne schwarze Abzeichen am Kopf oder nur mit kleinem schwarzem Zügelstrich. Sechs Arten hiervon gelten als bereits eingeführt, und zwar der Gilbweber, Bojers, goldgelber, olivgelber, Kap- und Kaffernweber.

Im Februar dieses Jahres erhielt ich durch die Liebenswürdigkeit eines bekannten Liebhabers in Halle eine Kiste abessinischer Weber, aus der ich mir eine Anzahl aussuchte. Weber im grauen Kleid und dazu unbekannte oder seltener eingeführte Arten mit Sicherheit zu bestimmen und richtige Paare zusammenzustellen, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Daß ich beim Aussuchen meiner Vögel einen guten Griff getan habe, ist lediglich dem Zufall gutzuschreiben. Ein etwas kleinerer Vogel, meiner Ansicht nach das Weibchen eines andern, überraschte mich bald mit Gesangsvorträgen, die in den bekannten Rätsch-, Quietsch- und Gackertönen gehalten waren. Am

30. April begann dieser Weber einzufärben und entpuppte sich alsbald als

Gilb- oder Pirolweber — X. galbula *(Rüpp.)*.

Unser verehrter Herr Schriftleiter hat diesen seltenen Weber in seinem hochinteressanten Bericht „Neueinführungen und Seltenheiten" in Heft 31 ausführlich beschrieben und abgebildet, so daß ich mir weiteres ersparen kann und bitte dort über Färbung und Freileben nachzulesen.

Mit zunehmender Verfärbung machte sich bei meinem Exemplar ein starker Geschlechtstrieb bemerkbar, der manchmal in Raserei ausartete, wenn der Vogel sich an einem seiner halbfertigen Nester von unten anhängte und in dieser Kopfstellung mit ausgebreiteten Flügeln den Oberkörper, laut schreiend, hin und her wiegte. Hatte er sich hieran genug erbaut, so bettelte er die beiden Weibchen Heuglins Weber um Begattung an und unternahm auch wohl blitzschnell einen Versuch, ohne je zum Ziele zu gelangen. Mit bewundernswerter Ausdauer konnte er stundenlang flügelzitternd und balzend in der Nähe der Weibchen sitzen. Nie wurde der Vogel bösartig oder verfolgte andere, trotz seiner außerordentlichen Lebhaftigkeit, und verursachte so keinerlei Störung in der Voliere. Für nicht zu enge Räumlichkeit kann ich also nach meiner Erfahrung den Gilbweber als friedlich und durch Färbung und Benehmen gleich auffallend nur empfehlen, und zwar möglichst paarweise des starken Bruttriebes wegen. Während ich diese Zeilen niederschreibe, wird das Paar für 15 Mark angeboten. Leider wird der Bezug einzelner Vögel von geringerem Wert dem Liebhaber durch das verhältnismäßig hohe Porto ganz unmöglich gemacht. Lasse ich mir von Hamburg ein Weibchen Gilbweber für beispielsweise 5 Mark kommen, so bezahle ich der Post für Dringend und Eilboten den Vogel nochmals mit 5,30 Mark und kaufe außerdem die Kiste dazu, weil die Rücksendung einer solchen für 80 Pf. in keinem Verhältnis mehr zum Wert einer solchen steht. Ich wundere mich, daß der Händlerverband gegen eine derartige Tarifpolitik der Reichspost keinen Einspruch erhebt, zumal die Schädigung des Händlerstandes eine größere ist, als er sich vielleicht denkt*). Dies jedoch nur nebenbei.

Die bestbekannte Gattung aller Edelweber ist die der

D. Gelbrückenweber — Sitagra *Rchb.*,

die 22 kleine bis mittelgroße Arten zählt, mit schwarzer Zeichnung am Kopf und einfarbig gelbem oder gelbgrünem, ausnahmsweise mit dunkelbraunen Schaftstrichen gezeichnetem Rücken. Eingeführt worden sind 14 Arten, und zwar Heuglins, Reichards, Flügelbinden-, dottergelber, Schwarzstirn-, Pelzelns, Mönch-, Zwergmasken-, Masken-, Cabanis-, olivgrauer Weber, schwarzköpfiger Gelbweber, Gelbnacken- und Schulterstreifenweber.

Der bekannteste und unter allen Umständen empfehlenswerteste, vielfach gezüchtete ist der

dottergelbe Weber — S. vitellina *(Lcht.)*

von Westafrika, Senegambien bis Goldküste, Ostafrika, südlich bis zum Gallaland. Die Länge beträgt 120—140 mm. Die Kopffärbung im Vergleich gegen die des Cabanisswebers zeigt beigegebene Abbildung. Dieser Weber hält sich nach v. Heuglin



Dottergelber Weber.

Cabanisweber.

am liebsten in kleinen Akaziengruppen oder in andern Dorngebüschen in der Nähe von Wasser, an Stromufern, längs der Regenteiche, auf Inseln und in Büschelmaisfeldern auf. Die Nahrung besteht in Sämereien von Gräsern und in Insekten. Die Verfärbung zum Hochzeitskleid beginnt im Juni und gleichzeitig das Fortpflanzungsgeschäft. Das Nest wird an schwankenden überhängenden Zweigen auf 1—7 m Höhe befestigt. Es ist sehr zierlich, kugelförmig, mit einem schön glatt gearbeiteten Flugloche an der Unterseite, aber ohne Röhrenansatz, nach oben läuft es in eine Spitze aus, mit der es an dem Ende eines dünnen Zweiges hängt, so daß der geringste Luftzug es in eine schwankende Bewegung versetzt. Oft findet man frische Nester unbelegt. Diese werden vermutlich bei Nacht und Unwetter von den Männchen benutzt, die anscheinend auch das Weben nicht nur aus Bedürfnis, sondern auch aus Liebhaberei betreiben. Beim Bauen kann man neben der Geschicklichkeit im Verflechten des Stoffes die Gewandtheit der kleinen Baumeister im Klettern nicht genug bewundern. In allen Stellungen, oft Kopf und Körper abwärts gerichtet, laufen sie um den ganzen Bau herum und an demselben auf und ab. Reichenow fand die Nester stets an niedrigen Büschen, niemals in großen Kolonien, sondern nur einzeln oder wenige an demselben Strauch. Die von ihm gesammelten Eier, die zu je drei das Gelege ausmachten, sind auf bläulichweißem Grunde mit blaß rotbraunen und rötlichgrauen Flecken bedeckt.

Ich besitze seit dem Jahre 1921 ein Paar dottergelbe Weber, die in den darauffolgenden drei Jahren jedesmal mehrere Gelege zustande brachten und im Vorjahre aus diesen in zwei Bruten drei Junge großzogen. Im dritten Jahrbuch der A. Z. habe ich einen Zuchtbericht gegeben, woraus ich einen Auszug wiedergebe. . . . . In diesem Jahre — 1923 — sah sich das Männchen besser vor und befestigte sein Kunstwerk dicht unter der Decke an den sich dort zwängenden dünnen Ruten eines riesigen Haselnußstrauches, der dicht an der inneren Drahtwand stand. Das Gerippe war aus Agavefasern mit grünen Gräsern dicht überflochten in wenigen Tagen hergestellt und wurde bis zum Ausflug der Jungen stetig nach außen hin erweitert, bis es zu einem über doppelt faustgroßem Gebilde mit nach unten gerichtetem Einschlupfloch und weit in die nächsten Zweige hineinreichenden Verankerungen angewachsen war. Das Gewebe war durchaus sicher und hielt sogar den Schnäbeln der Unzertrennlichen stand. Das Männchen arbeitete derart, daß es sozusagen der

*) Siehe die Veröffentlichung des Reichsverbandes S. 296.

Schnabel als Nähnadel benutzte, indem es den Halm der Länge nach durchzog und dann das heraushängende Ende maschenförmig um das Nest verwob. Das Weibchen beteiligte sich am Nestbau nicht, unterzog ihn jedoch des öfteren der Besichtigung und zeigte sich überhaupt sehr interessiert. Eine Begattung habe ich nicht wahrnehmen können. Das Gelege besteht aus zwei bläulich gefärbten Eiern. Während der Brutzeit hielt sich das Weibchen viel außerhalb des Nestes auf und mußte immer erst durch den gestrengen Gatten mit Geschrei ins Nest zurückgetrieben werden, wo es aber bald wieder mit dem Köpfchen herausschaute, wenn irgend ein Geräusch seine Neugierde erregte. Den sich dem Nest nähernden Vögeln gegenüber war das Männchen sehr mutig, doch niemals bissig; es begnügte sich mit wütendem Gezisch, welches stets den gewünschten Erfolg zeitigte. Am 25. Juni bemerkte ich zuerst, daß das Weibchen fütterte. Ich gab Mehlwürmer, die das hierdurch zutraulich gewordene Tierchen beim Betreten der Vogelstube am Draht hängend erbettelte. Ameisenpuppen wurden nicht oder nur ausnahmsweise einmal genommen. Am 27. Juni vernahm ich bereits deutliches Wispern der Jungen. Das Männchen beteiligte sich erst beim Heranwachsen der Jungen an der Fütterung. Am 10. Juli flog ein Junges aus, um nicht wieder ins Nest zurückzukehren. Es bewegte sich sehr gewandt und glich bis auf den gelben Farbton der Mutter, nur daß der Vogel plumper erschien und nicht so schlank wie das Weibchen; Füße und Schnabel auffallend groß, das Schwänzchen halblang. Am 27. frißt es schon. Das Nest fand ich eines Morgens zerstört am Boden nebst einem eingetrockneten zweiten Jungen. Am 25. Juli war in wenigen Tagen in demselben Strauch ein zweites Nest vollendet, aus dem ich am 6. August wieder Stimmen vernahm. Das Männchen schien diesmal weniger an der Sache interessiert. Am 22. flog ein, am 26. das zweite Junge aus."

(Fortsetzung folgt.)

Hühnerhabicht.

Jagdfalken.

Von Franz Fuchs.

(Nachdruck verboten.)

Nach achtjähriger Pause veranstaltete der Künstlerverein „Malkasten" in Düsseldorf im Sommer 1922 eines seiner bekannten historischen Feste. Es war ein Goethe-Festspiel, welches in dem prächtigen alten Park des Vereins stattfand und das durch die wunderbaren Gruppen noch lange in der Erinnerung seiner Besucher fortleben wird. Unter einem Trupp kurfürstlicher Jäger befand sich auch ein Falkonier hoch zu Roß, der den verkappten Falken auf der Hand trug. Bei den Tierkundigen erregte es Erstaunen, daß der Falke kein gestopfter Balg, sondern ein „richtiggehender" lebender Vogel war, der auch in späterer Stunde unverkappt ruhig sitzen blieb, wenn sein Herr im dichtesten Gewühl einen Tanz riskierte.

Der Vogel war ein Habicht, nicht etwa ein aufgezogener Nestling, sondern ein Wildfang, ein Haggard-Habicht, wie ihn die Falkner nennen. Der Vogel befand sich bereits seit vier Jahren im Besitz seines Herrn, Kunstmaler R. Waller, und trug noch an den Fängen die Spuren des Eisens, in dem er gefangen wurde. Bei Kundigen, die die wilde Art derer vom Geschlechte der Sperber und Habichte kennen, muß es Verwunderung erregen, daß solche Zähmung möglich ist, und wie ich bestimmt weiß, ohne tierquälerische Maßnahmen. Jagdlich soll der Vogel hervorragend gewesen sein, ich selbst habe ihn nur in dem großen Garten des Herrn W. ohne Fessel gesehen und war über seinen Gehorsam erstaunt. In diesem Garten befindet sich der Falkenhof, geräumige Volieren, durch welche eine mit Stoff bespannte, dicke Sitzstange läuft, in welchen sich die Vögel, zurzeit ein Habicht und drei Wanderfalken, befinden. Die Stange ist mit Stoff umnagelt, um die Krallen scharf zu erhalten. Ebenso sind die Vögel durch Stoffwände getrennt, denn sie sind nicht immer die besten Freunde und ist Vorsicht am Platze; mußte doch ein prächtiger junger Wanderfalke, den ich selbst draußen arbeiten sah. durch den Habicht sein Leben lassen. Der Habicht hatte sich von der Fessel frei gemacht und den Vogel, der sich wegen seiner Fesselung nicht wehren konnte, angegriffen und erwürgt. Dieser Wanderfalke war

ein Männchen (Terzel), ganz besonders zierlich gebaut, liebenswürdig im Charakter und sehr mit dem Hunde befreundet; es war ein schönes Bild, den schmucken stolzen Vogel auf dem Jagdhund (Heidewachtel) sitzen zu sehen. Im vorigen Herbst, der Vogel war etwa halbjährig, als Herr W. die ersten Übungen ohne Fessel in freier Jagd mit ihm machte und mich dazu einlud. Eigentümlich war das Benehmen der anderen Vögel, als der Falke im freien Gelände erschien; die Lerchen suchten am Boden Deckung, und die übrigen ergriffen die Flucht. Zuerst mußte der Falke eine mitgebrachte Taube schlagen, welches ihm nach einigen Fehlstößen auch gelang. Der Tod der Beute erfolgt durch die würgenden Griffe des Falken sofort, bei größerer Beute sorgt Herr W. selbstredend dafür, daß das geschlagene Tier nicht lange leidet. Es nahten vier Krähen, und da der unverkappte Falke scharf hinäugte, wurde er geworfen; sofort nahm der Vogel die Verfolgung auf und versuchte eine etwas getrennt fliegende zu fassen, aber da hatte er sich in dem kameradschaftlichen Verhalten der Krähen geirrt, sie nahmen ihren Genossen in Schutz und griffen nun ihrerseits mit heftigen Stößen den Falken an, der nun von den Krähen abließ und auf das Winken mit dem Federspiel auf die Hand zurückkam (herbeiritt). Der Vogel wurde nun geatzt und war wohl auch durch den Kampf in der Luft etwas müde. Der Herbstnachmittag ging zur Neige, aber Herr W. wollte noch einen Versuch unternehmen und warf den Vogel nochmals, als sich in größerer Höhe Krähen zeigten. Der Falke nahm die Verfolgung auf, schraubte sich immer höher, und schließlich sah man Krähen wie Falken über dem ungefähr einen Kilometer entfernten Grafenberger Wald entschwinden. Als der Vogel nicht wiederkam, wurde ich sehr verstimmt, und tat mir Herr W. leid; ich weiß, wie schwer es hält, junge Wanderfalken zu bekommen, weiß auch, wie viele unendliche Mühe und Geduld es erfordert, einen Vogel abzutragen, aber entweder hat sich Herr W. sehr in der Gewalt, oder das Vertrauen, den Vogel wiederzubekommen, war groß, er spielte den Gelassenen, mir aber erschien er doch etwas blaß. Am folgenden Morgen war Herr W. verhindert, Nachsuche zu halten, fuhr aber am Nachmittage mit dem Rad hinaus und ging mit dem Federspiel winkend durch die Felder, obgleich von dem Falken nichts zu sehen war. Die Kartoffel ausmachenden Bauern hielten den sonderbaren Spaziergänger für nicht ganz gescheit. Da, plötzlich ein Flügelrauschen, und der Falke saß auf der Faust seines Herrn! Wie schwach muß das menschliche Auge im Vergleich zu dem Gesicht des Falken sein. Der Vogel kreiste entweder in riesiger Höhe oder blockte im entfernten Walde auf, jedenfalls war er unsichtbar und erkannte seinen Herrn oder das Federspiel auf riesige Entfernung.

Ein ganz besonderer Liebling des Herrn W. ist ein diesjähriger Wanderfalke, welcher von den drei Jungvögeln, die er diesen Sommer erhielt, wohl am besten einschlagen dürfte. Die beiden anderen, darunter ein Vogel von Herrn Prof. Dr. Thienemann, Vogelwarte Rossitten, sind noch nicht fertig, berechtigen aber auch zu den besten Hoffnungen. Herr Rittergutsbesitzer Lanz in Lohausen, einige Kilometer rheinabwärts von Düsseldorf, hat Herrn W. sein Gelände mit Jagdgerechtsamkeit aus Liebenswürdigkeit und Interesse an der Sache zur Verfügung gestellt. Dort finden die Beizversuche mit Jagdfalken hauptsächlich statt. Das Gelände ist übersichtlich und ebenfalls die gegenüberliegende Rheinseite, nach welcher Richtung die Vögel oft verschwinden, um nach einiger Zeit aus einer anderen Richtung her zurückzukommen und auf die Faust des Herrn oder einen Pfahl in dessen Nähe aufzublocken. Eigentümlich ist das Betragen von je einem Pärchen Baum- und Turmfalken, welche dort ihr Revier haben. Diese kleinen Fälkchen, im Vertrauen auf ihre Fluggewandtheit, greifen die großen Eindringlinge an, und besonders ein Baumfälkchen versetzt dem Wanderfalken Stöße in der Luft, daß die Federn stieben. Jüngst, an einem der wenigen diesjährigen Sonnentage, lag Herr W. dort im Grase, seine Lieblinge saßen frei in der Nähe und ließen sich das Gefieder durchwärmen. Der besagte junge Falke machte übermütige Flugübungen, griff Schierlingsblüten mit den Fängen usw., als er plötzlich scharf nach dem Rhein hinäugte. Es nahten niedrigen Fluges vier Reiher, sofort nahm der Falke die Verfolgung auf, die Reiher erkannten ihren Feind, gingen höher und verfielen in ein schnelleres Tempo. Der Falke warf sich gegen den Wind und stand plötzlich turmhoch über den Reihern, um sofort den ersten Stoß zu riskieren, doch durch eine geschickte Wendung des Reihers sauste der Falke vorbei, um kurz darauf mit dem gleichen Mißerfolge nochmals zu stoßen; er kehrte dann auf die Hand des beglückten Falkners zurück. War die unbeabsichtigte „Reiherbeize" auch erfolglos, so zeigte sie doch die Angriffslust des jungen Vogels und den Mut, schon auf den viel größeren Reiher, der mit seinem spitzen Schnabel kein zu verachtender Gegner ist, zu stoßen. Herr W. hat sich auch nicht in dem Vogel getäuscht, nach wenigen Tagen schlug er in hoher Luft seine erste Beute (Wildtaube). Für den Vogelfreund, auch wenn er, wie ich, nicht Jäger ist, ist der Anblick der Beize ein herrlicher Genuß, das wunderbare Flugspiel der Falken, die Anhänglichkeit und Geschicklichkeit sowie das große schöne Auge des Wanderfalken lassen uns die Beizjagd als eine der edelsten wohl begreiflich erscheinen.

Habichte und Sperberweibchen trägt Herr W. ab, weil sie auf laufendes Wild, z. B. Hasen und Kaninchen oder niedrigfliegende Hühner besser zu verwenden sind wie Edelfalken, die wegen ihrer Stoßkraft den Anprall auf den Boden scheuen.

Die im Mittelalter in hoher Blüte stehende Beizjagd, die, wie man auf alten Bildern sieht, auch von Damen ausgeübt wurde, war in Deutschland ganz eingeschlafen. Nur bei den Arabern, im Kaukasus, auf dem Balkan*), ferner in Holland,

*) Auch bei anderen Völkern Asiens wird die Beizjagd noch jetzt betrieben. „Schon Pallas und Eversmann haben uns berichtet, daß der Steinadler von den Baschkiren und anderen innerasiatischen Völkerschaften zur Jagd „abgetragen" wird. Auf unserer Reise nach Sibirien und Turkistan habe ich die riesigen Beizvögel selbst gesehen

England, Schottland und Frankreich hat sie sich mehr oder weniger stark erhalten. Nun scheint dieser Jagdzweig auch in Deutschland wieder in Blüte zu kommen; mehrere hundert Mitglieder besitzt der deutsche Falkenorden schon, dem sehr bedeutende Ornithologen und Jäger angehören. Es ist gerade, als wolle man sich in Gegensatz zu den modernen Schießern stellen, die aus den Kreisen der Neureichen hervorgegangen sind. Die Falknerei ist nichts für den, dem es um Fleischgewinn zu tun ist. Es darf der Jagdtag nicht nach dem Kilo eingeschätzt werden, sondern die Freude an der Natur

Wanderfalk.

und der Intelligenz ihrer Geschöpfe muß die unendliche Mühe des Falkners lohnen. Dies ist die mit uns Vogelliebhabern verwandte Seite dieses Sportes.

Exoten.

Von S. Lichtenstaedt.

(Nachdruck verboten.)

2. Aus meinen Freivolieren.

Mißglückte Schamazuchten.

Ich hatte mir fest vorgenommen, in diesem Sommer Schamas zu züchten. Aber der Mensch denkt, und die Schama lenkt.

Meine drei großen Freivolieren, zwei à 4 Meter, eine 2 Meter lang, wurden von der Gärtnerei Späth, Baumschulenweg, als „Tropenwald" eingerichtet.

Farne bedeckten den Boden, Schlingpflanzen und wilden Wein umrankten die Volieren, große Keulenbäume sorgten für tropisches Aussehen, kleine Tannen und andere kleine Bäume sorgten für Sitzgelegenheiten, Harzer Bauer, Holzkästchen, offene Wellensittichkästen sorgten für Nestunterlagen, und schon sah ich in Gedanken ein paar Dutzend junge Schamas in diesem Tropenwald umherfliegen.

Drei gesunde Zuchtpaare Schamadrosseln standen mir zur Verfügung. Die Vögel waren im Februar des Jahres importiert worden, die Männchen große starke, dunkel gefärbte Tiere, tadellos im Gefieder und feurige Sänger. Die Weibchen ebenfalls gesund und kräftig.

Durch die rauhe Witterung veranlaßt, setzte ich erst Anfang Mai zuerst die Weibchen und drei Tage später die Männchen in die Freivolieren. Vorschriftsmäßig sollte nun ein tolles Jagen und Beißen beginnen, und hatte ich in allen Volieren aus diesem Grunde genügende Versteckplätze angebracht. Frische Puppen gab es schon. Zum weiteren Anreiz wurden täglich 15—20 Mehlwürmer pro Kopf verfüttert, Spinnen erhielt ich aus meinen Mistbeeten, und aus denen freundlicher Nachbarn täglich dutzendweise. Aber meine Schamas wollten mir keinen Kindersegen bringen.

Wohl sangen in den ersten Tagen alle drei Männchen ihre bessere Ehehälfte feurig an, verfolgten sie auch wohl ein paarmal durch die Volieren, aber schon nach ein- bis zwei Wochen ließ das gegenseitige Interesse sichtbar nach. Die Vögel bekümmerten sich in allen drei Volieren nach kurzer Zeit überhaupt nicht mehr umeinander.

Da bemerkte ich Ende Juni ein Weibchen im Neste hockend. Es hatte sich eine kleine Versandkiste ausgewählt und drehte sich hier in dem von mir hergerichteten Nest aus Heu, Charpie und Cocosfasern eine tiefe „Kute" zurecht, ohne daß man von einem eigentlichen Nestbau sprechen konnte. Nur ab und zu nahm es einen Halm in den Schnabel und rückte ihn ein bischen zurecht. Das Männchen verhielt sich völlig teilnahmslos.

Immerhin hatte ich ein bischen Hoffnung. Vielleicht erfüllte das Männchen seine Gattenpflichten in den frühesten Morgenstunden. Wieder vergingen ein paar Tage. Meine Neugier war nicht mehr zu zähmen, ich kontrollierte in Abwesenheit des Weibchens das Nest und — welche Freude, zwei getupfte Eier lagen friedlich auf dem Grunde des Nestes.

Vorschriftsmäßig sollten nach 13 Tagen die Jungen erscheinen, da ich annahm, daß das Weibchen noch weiter legen würde, rechnete ich schon 15 Tage, und sah schon in Gedanken ein halbes Dutzend junge Schamadrosseln in der Voliere fliegen

Ich will den freundlichen Leser mit weiterem Erzählen meiner Mißerfolge nicht länger aufhalten. Kurz und gut, es kam nach 15 Tagen nichts, es kam nach 20 Tagen nichts, es kam überhaupt nichts.

Drei Wochen brütete das Weibchen fest und unermüdlich, dann entfernte ich die unbefruchteten Eier.

---

und von den Kirgisen, die sich mit Vorliebe ihrer bedienen, das Nachstehende über Abtragung und Verwendung erfahren" (Brehm, Tierleben Bd. 1 S. 361). — „Ebenso wie im Ural trägt man auch in Persien und Indien Sperber ab und benützt sie mit gutem Erfolg" (Brehm, Tierleben Bd. 1 S. 408). — Auch der Habicht wird in Indien und Turkistan zur Beizjagd verwendet. N.

Nach weiteren acht Tagen lag das erste Ei der nächsten Brut in dem kaum eine Wenigkeit aufgearbeiteten Neste, nach weiteren fünf Tagen lagen vier Eier im Nest, zwei Tage später war das Weibchen verschwunden.

Wohl eine Stunde suchte ich in der von Pflanzen völlig durchwucherten Voliere nach dem Tierchen, endlich fand ich es. Tot. Unter Farnen und Tradiskantien lag es, nur noch Haut und Knochen, während das Männchen über dem Grabe schmetternde Lieder sang.

Das anstrengende Legegeschäft hatte das anscheinend zur Zucht noch viel zu junge Tier dahingerafft. Die andern beiden Paare machten überhaupt keine Anstalten zur Brut. Schallend und unermüdlich schmetterten die Hähne ihre herrlichen Lieder durch den Garten, in punkto Liebe versagten sie völlig.

Mitte August löste ich dann die „Zuchten" auf. Trotzdem hatten mir meine Schamas Stunden ungetrübter Freude geschenkt. Die herrlichen Vögel kamen in den Volieren erst voll zur Geltung. Wenn ich den Boden tüchtig mit dem Gartenschlauch spritzte, und alles Matsch und Morast war, dann sprangen die Tiere in den tiefsten „Dreck", suchten Würmer, badeten, und standen knietief im Wasser.

Das Gefieder nahm einen prächtigen tiefen Glanz an, keine Feder fehlte, die langen Schwanzfedern schossen förmlich hervor, kurz, das Tier war mit den üblichen Stubenhockern gar nicht zu vergleichen.

Ein rheinischer Liebhaber, welcher später ein Männchen von mir erhielt, schrieb mir, daß er solchen prächtigen Vogel noch nicht gesehen hatte.

Der Grund am Mißlingen meiner Schamazuchten lag m. E. einzig und allein an der großen Jugend der Vögel.

Dr. Otto schreibt ein vier- bis sechsjähriges Alter der Weibchen vor, wenn man Zuchterfolge haben will, doch glaube ich, daß auch mit zwei- bis dreijährigen Tieren schon erfolgreich zu züchten ist. (Fortsetzung folgt.)

Meine Kanarien und Kanarienbastardzucht 1924.

Von Linda Hirsch, Aubstadt.

(Fortsetzung und Schluß.) (Nachdruck verboten.)

Mitte Februar begannen nun schon einige Kanarienweibchen zu legen und Anfang März waren schon Junge in den Nestern. Ich fütterte folgendermaßen: jede Futtersorte ist in einer Feldpostschachtel, um nicht fortwährend über die Säcke zu gehen. Gegen Abend läuten hier die Glocken, jetzt um 6 Uhr, damit der Bauer heim geht, sein Vieh zu füttern, dann füttere ich auch mein „Vieh", d. h. meine Vögel. Auf einem Tablett vereinige ich alle Wassernäpfchen, zugleich nehme ich die Futterschalen (Blumenuntersätze) heraus und fülle nach, aus jeder Schachtel einen Teelöffel voll pro Kopf. Alle Samstag werden die Futternäpfe heiß ausgewaschen und das Futter weggeschüttet, was noch drin war. Die Wassernäpfe (kleine Likörgläser aus dickem Glas) werden täglich mit warmen Wasser ausgewaschen, frisch mit stubenwarmen Wasser gefüllt, aufs Tablett gestellt und dann zugleich mit dem Futternapf wieder in die Käfige verteilt. So fressen sich die Vögel vor der Nacht noch satt und haben auch schon in aller Frühe ihr Futter im Käfig, ohne daß ich besonders früh aus den Federn kriechen muß. So um 9 Uhr oder auch etwas später, wenn mein Zimmer in Ordnung ist, wird Eifutter zurecht gemacht. Hierzu hat jedes sein Steingutschälchen. Ich hacke, nachdem ich es abgeschält habe, ein oder zwei Eier, je nach der Zahl der Jungen, ganz fein, Weißes und Gelbes auf einem Brettchen, so daß beide Teile gut ineinander gemischt sind, dann gebe ich geriebenes oder nur zerkrümeltes Eierbrot dazu



Heller Stieglitz×Kanarienvogel.

und hacke und mische alles gut durcheinander, so daß eine flaumige Masse entsteht, nicht zu feucht und nicht zu trocken. Dieses verteile ich nun in die Näpfchen, und zwar je nach dem Alter der Jungen ein Quantum, bei eben ausgekrochenen genügt für drei, vier oder auch fünf ein Teelöffel voll, mit dem Wachstum aber wird mehr gefüttert und bei acht Tage alten gebe ich pro Kopf schon einen Teelöffel voll. Dieses reicht für den ganzen Tag. Neben Körnerfutter, Spitzsamen, Hanf, Rübsen, den ich aber jetzt weglasse, Stieglitzmischfutter, füttere ich auch gemahlenen Weizen. Dieses Futter haben mir Königshöfer Züchter sehr empfohlen, sie behaupteten ganz bedeutend bessere Resultate erzielt zu haben und ich kann es hiermit bestätigen. Im Sommer vorigen Jahres fing ich damit an, da das Kanarienfutter außerordentlich teuer war. Weizen erhielt ich von liebenswürdigen Bauern oder ich tauschte diesen gegen Blumen, die ich auch eifrig züchte. Der Weizen wird auf einer Kaffeemühle, die ich vor dem Ge-

brauch rein ausschüttelte, gemahlen; ins Kästchen wird ein weißes Blättchen Papier gelegt. Seit diesem Jahr siebe ich das Gemahlene durch ein Haarsieb auf einen reinen Bogen Papier, so fällt das Mehl und auch etwas Kleie durch. Dieses sammele ich zum Backen des Eierbrotes, den Weizenschrot verfüttere ich und er wird sehr gerne gefressen. Es bleibt nichts übrig. Namentlich die Jungen, wenn sie allein zu fressen anfangen, laben sich an diesem Futter, welches sie mit ihren noch zarten Schnäbelchen besser zerbeißen können. Auf für die Heckweibchen ist Weizenschrot gut. Ich glaube dieses Futter und auch das gutzubereitete Eifutter bewirkt, daß die Weibchen durchschnittlich fünf bis sechs, ja sogar acht Eier legen, die zweite und nachfolgenden Hecken weisen nie unter fünf Eiern auf. Erbrütet werden natürlich meist nicht alle Eier. Manche Weibchen machen eine Ausnahme und ich will schon jetzt bemerken, daß mein scheckiges Kanarienweibchen sechs ja sogar sieben Junge auf einmal herausbrachte und auffütterte. Ich habe bis jetzt von ihr 20 Junge. Während ich dieses schreibe, sitzt dieses Weibchen noch auf fünf Eiern und daneben das Streifchen-Kanarienweibchen auf vier Eiern, beide machen die sechste Brut. Letzteres hat 14 Junge hoch gebracht und ein reingelbes Kanarienweibchen fünfzehn Junge. Letzteres brütet nicht mehr. Aber mein Kanarienweibchen beim alten Stieglitz brütet nun auf vier Eiern und hat mir neun Junge gebracht, aber leider keine gelbweiß gescheckten, jedoch einige mit weißer Kehle und weißen Flecken. Mit den Jungen verfahre ich folgendermaßen: sind sie acht Tage alt, so bette ich sie um in ein mit frischen sauberen Neststoffen gefülltes Nest, und zwar gebe ich zuerst in die Korb- oder selbstverfertigten Strohnester Holzwolle, kugele es mit der Faust aus, darauf kommen zerzupfte Sackfäden und obenauf Leinencharpie, kugele alles aus und lege die Jungen vorsichtig hinein und hänge den Nesthalter wieder an. Nach weiteren acht Tagen erhalten sie wieder ein neues Nest. Auf diese Weise verhindere ich, daß sie nicht, oder doch nur in geringem Grade vom Ungeziefer geplagt werden und sich schön befiedern. Alle zwei bis drei Wochen werden die Käfige gründlich gereinigt und mit heißem Sodawasser werden Käfigboden, Leisten, Schubladen und Stangen gewaschen. In die trockene Schublade werden zwei Bogen Zeitungspapier glatt gelegt und darauf feingesiebter Sand. Dann schabe ich Sepia darauf und zerdrücke Eierschalen von rohen Hühnereiern. Außerdem hänge ich in jedem Gitter ein ganzes Stück Sepia, denn an Kalk darf es während der Hecke und auch in der Mauser nie mangeln. Und dennoch, trotz sorgfältiger Pflege, geht es ohne Verluste nie ab. Vor einigen Tagen habe ich an einem Tage drei Tote gehabt und vorgestern wieder eines. Es ist immer dasselbe Krankheitsbild: geschwollener Leib, abgemagerte Brust, dabei Freßsucht, aufgeplustertes Gefieder, viel Schlaf. Sie werden immer magerer, bis sie tot im Käfig liegen. Was ich nicht alles schon versucht habe: Haferschleim, Rotwein mit warmem Wasser, Glaubersalz, seit neuerer Zeit Lindenblütenhonig in warmem Wasser aufgelöst. Einen habe ich dadurch, so glaube ich wenigstens, gerettet, denn er trank sehr viel davon, und wurde wieder gesund, aber vier andere, denen ich dasselbe gab, sind doch eingegangen. Es gibt einfach kein Mittel dagegen. „Wider dem Tod ist kein Kraut gewachsen", auch bei Vögeln nicht. Eierbrot stelle ich folgendermaßen her. Sechs ganze Eier werden in die Backschüssel zerschlagen, dazu gebe ich $^1/_2$ Pfund feinen Zucker, dieses wird gut zerrührt, solange bis es Blasen wirft, dazu von dem Kleiemehl 1 Pfund und wieder gut gerührt, bis der Teig sich von der Schüssel beim Rühren ablöst. Dazu gebe ich ein Backpulver. Auf ein großes, rundes mit Fett beschmiertes Blech wird die Masse in die Mitte des Bleches geschüttet oder herausgelöffelt und hier nach allen Seiten hin mit einem breiten Messer ausgestrichen, so daß das Blech bis zum Rand gleichmäßig mit einer dünnen Teigschicht bedeckt ist. In etwa zehn Minuten goldgelb gebacken, wird der Kuchen in viereckige Stücke geschnitten. Die Nestjungen erhalten diesen Kuchen oder Brot unters Ei gemischt. Sobald sie aber alles fressen, erhalten sie nur diesen Kuchen zerkrümelt, $^1/_2$ Teelöffel pro Kopf. Auch jetzt in der Mauser gebe ich es blank. So habe ich doppelten Nutzen von dem Weizen und diesem ist es sicher zuzuschreiben, daß ich heuer soviel Junge gezüchtet habe. Bis jetzt sind es 60 Stück. Wollte nun Schluß mit der Hecke machen, bringe es aber nicht übers Herz, dem Weibchen die Eier zu nehmen. Ich denke, wenn die Mauser kommt, hören sie schon von selber auf. Es würde zu weit führen, den Verlauf der Hecke detailliert zu schildern, nur soviel sei gesagt, daß ich mit den Bastarden absolut keinen Erfolg hatte. Auch mein junger Stieglitz hat keine Nachzucht. War das Kanarienweibchen oder dann das Stieglitz Kanarienweibchen daran Schuld, ich weiß es nicht. Ich will es nochmal mit ihm probieren, vielleicht ists nächstes Jahr besser. Die Stieglitzkanarienweibchen bauten immer, brüteten immer auf winzigen unbefruchteten Eiern. Gab ich ihnen Kanarienjunge zum Aufziehen aus Nestern, wo zuviel waren, so fütterten sie nicht, sind also bei mir keine guten Pflegemütter, wie Ruß (siehe „Der Kanarienvogel") behauptete. Trotzdem bin ich mit dem Ergebnis meiner Züchtungen zufrieden, die vier Kanarienhecken (in einem starb das Kanarienweibchen und ich ließ die Hecke auf) haben mir mehr als genug Junge gebracht. Jetzt wird fleißig studiert. Aus zwei der 1,50 m langen Käfige habe ich die Schiebetüren entfernt und die ganze Vogelschar dahineingegeben. Die Käfige statte ich mit vielverzweigten Ästen und einigen Springhölzern aus. Die ganze Schar ist sehr munter, fliegt umher und zwitschert darauf los, schon um 5 Uhr morgens wird um die Wette gesungen. Sonst gab ich jeden Kanarienhahn einzeln in ein kleines Harzer Heckbauerchen, jetzt tue ich es nicht mehr. Auch der Kanarienvogel will Bewegungsfreiheit haben und wird so ein viel besserer Sänger. Auch wie manche Züchter machen, die Eier aus den Nestern nehmen bis alle gelegt sind, tue ich nicht mehr. Die Jungen kamen nie zu gleicher Zeit heraus. Aber das mache ich, wenn drei oder vier Junge in einem Nest sind und es sind noch Eier im Nest, die dann unter die Jungen zu liegen kommen, so nehme ich die Eier heraus, mache vorsichtig mit Tinte ein Ringelchen herum und verteile

sie in Nester, wo noch Weibchen brüten, die nicht so viel Eier haben. Sind lebensfähige Junge darinnen, so sind sie am nächsten Tag ausgekrochen und ich gebe sie zu den andern ins Nest. Sind sie am übernächsten Tag noch nicht heraus, so entferne ich das Ei wieder. Es ist dies nun zwar eine Störung der brütenden Kanarienweibchen, aber ich habe sie so gezähmt, daß sie nicht mal das Nest verlassen, wenn ich diese Prozedur vornehme.

Kleine Mitteilungen.

Etwas über Safranfinken-Art. Vergangenen Winter sah ich bei Herrn Mayer im XIII. Wiener Bezirk eine Partie Safranfinken. Unter dieser war ein gar selten schönes Exemplar, wie ich noch keines gesehen habe. Ich erwarb für wenig Geld dieses und ein kräftiges Weibchen dazu und wies ihnen ein Drosselbauer als Aufenthaltsort an, das sie allein bewohnten. Im Anfang nahmen die Tiere nur Hirse, später auch etwas Glanz, und dabei blieb es. Hanf-, Neger- und andere Samen wurden verschmäht. Zumeist saßen sie getrennt am Käfigboden und gaben durch fünf Monate keinen Laut von sich. Mitte Mai ließ ich sie in einen Kastenkäfig 100×30×40 cm groß übersiedeln und hängte an demselben zwei Berlepschsche Nistkästchen an, und streute Agave-, Bastfasern und anderes Nistmaterial am Boden ein. Am andern Tage waren die Vögel, insbesondere der Hahn, wie ausgewechselt und blieb es auch bis zu seinem Tode. Seine intensiv rotleuchtende Kopfplatte stellte er ammerartig auf und ließ unaufhörlich seinen gerade nicht entzückenden Lockruf ertönen. Nach weiteren Tagen ließ er auch fleißig sein Lied vernehmen. Die über den Winter fast apathisch gewesenen Vögel entwickelten eine Lebhaftigkeit, als ob sie Quecksilber im Leibe hätten. Eines Tages beobachtete ich, wie das Männchen mit gesträubten Flügeln und aufgestelltem Schwanze unter beständigen Lockrufen mit Nistmaterial im Schnabel zum Nistkasten flog. Nach zwei Tagen hob ich behutsam den Nistkasten ab und entdeckte ein kunstvoll geformtes Nest. Meine Freude über diese schöne Entwicklung war groß, und mit gespannter Aufmerksamkeit verfolgte ich das weitere Treiben dieses überaus feurigen Vogels. Nach Beendigung des Nestbaues jagte er wie besessen das Weibchen zum Nistkasten hinaus und gab ihr, nachdem sie sein Gebaben nicht verstehen wollte, ein paar Püffe. Das ging gesteigert eine Woche ohne Unterbrechung fort. Selbst in der Nacht ließ das Männchen seinen Lockruf hören. Eine Begattung hatte ich nicht wahrgenommen. Die Brunst des Männchens steigerte sich von Tag zu Tag und legte seinen aufgestellten Schopf nicht mehr um. Dies währte etwa drei Wochen lang. Eines Morgens kam ich wie gewöhnlich in die Vogelkammer und sah zu meinem Schrecken das Männchen mit einem Fuße am oberen Sprungholze und mit dem Kopf nach unten tot hängen. Die Kopfhaut war skalpiert, beide Augen herausgerissen, und auch sonst war es noch arg zugerichtet. Aber auch das Weibchen war, wenn auch nicht so schlimm, aber immerhin auch bös mitgenommen. Seitdem das Männchen tot ist, geht das Weibchen tagsüber oft in den Nistkasten und benützt ihn des Nachts als Schlafstelle. Es muß also zwischen den Vögeln einen Kampf auf Leben und Tod gegeben haben, bei welchem der Stärkere den Kürzeren zog. Die Ursache konnte ich nicht ergründen. Ich meinte jedoch, daß das Weibchen entweder ein Zwitter oder ein einsommeriges Männchen ist. Dagegen spricht aber sein weiblicher Habitus und die kurze Legeröhre. Nachdem in Deutschland diese Gattung von Vögeln in Käfigen und Volieren gehalten und wahrscheinlich auch schon gezüchtet werden, würde ich mit Vergnügen Aufschluß darüber vernehmen, ob man ebenfalls solche Wahrnehmungen gemacht hat. Auch wäre es mir erwünscht zu erfahren, ob man den rotgelben Safranfink schon mit Kanarien bastardierte, ihr Kleid und Gestalt wäre wie geschaffen dazu.

Rudolf Müller, Wien (Mitglied der A. Z.).

Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber Sitz Leipzig.

1. Vorsitzender Joh. Birk, Leipzig-Mockau, Beuthstr. 29; Geschäftsstelle: Rudolf Petters, Leipzig-Probstheida, Preußenstr. 31; Kassierer Werner Geßler, Leipzig, Dresdner Str. 2; Tauschvermittlung — T.-V. —: Richard Vorwerk, Leipzig-Lößnig, Merveldstr. 39.

Unsere Mitglieder dürfte folgender Antrag der Vereinigung der Vogelliebhaber Landesverband Preußen vom 12. Juli 1924 interessieren:

In den neuen postalischen Bestimmungen werden die Portosätze zur Beförderung von lebenden Vögeln in einer solchen Höhe gefordert, daß ein Verfand in Zukunft mit Rücksicht auf die niedrigen Preise derselben vollkommen ausgeschlossen ist. Werden z. B. 1 Pärchen Prachtfinken zum Preise von 3,50 M. einem Liebhaber durch die Post zugesandt, so beträgt das Porto etwa 5 M. Der Liebhaber würde also mit allen Nebenspesen etwa 10 M. zu zahlen haben. Unter diesen Umständen muß die Liebhaberei sich eine ungewollte Einschränkung auferlegen, die doch höchst bedauerlich erscheint.

Wir bitten höflichst, bei dem Postministerium vorstellig werden und erwirken zu wollen, daß eine Herabsetzung der Portosätze für lebende Vögel unnachsichtlich erfolgt und nur in einer solchen Höhe gefordert werden, wie sie mit dem im Werte zu befördernden Vogel in Einklang zu bringen sind.

Die Feststellungen, die der Reichsverband zur Veranlassung des Erforderlichen vorgenommen hat, müssen die angeführten Gründe bestätigen. Die Portosätze und Vorschriften für den Versand lebender Vögel sind folgende:

Eine einfache Sendung lebender Vögel bis 5 kg kostet zurzeit I. Zone —,80 M., II. und III. Zone 1,60 M.; mit Eilgutbestellung in allen Zonen —,50 M. mehr.

Eine dringende Sendung lebender Vögel bis 5 kg kostet zurzeit I. Zone 2,40 M., II. und III. Zone 4,80 M.; mit Eilgutbestellung in allen Zonen —,50 M. mehr.

Sendungen mit lebenden Vögeln gelten als Sperrgut.

Der Reichsverband hat sich dem wohlberechtigten Wunsche auf Herabsetzung der Beförderungssätze nicht verschließen können und ist an das Reichspostministerium mit dem Antrag herangetreten, beim weiteren Abbau der Portosätze auch die für die Beförderung lebender Tiere, insbesondere Vögel, zu ermäßigen. Über das Ergebnis soll noch berichtet werden.

Wir wollen bei dieser Gelegenheit nicht unterlassen, hierdurch auch die Aufmerksamkeit der Händler und deren Organisationen auf diesen Punkt hinzuweisen mit der ergebensten Bitte, auch ihrerseits die Sache zu unterstützen.

An der Herabsetzung der erwähnten Portosätze haben nicht nur allein die Händler, die Liebhaber einheimischer Vögel, sondern auch die Exotenliebhaber und deren Vereine das größte Interesse. Auch diesen Liebhabern bieten wir ein Hand-in-Hand-Arbeiten an und erklären uns zur Auskunftserteilung gern bereit.

J. A.: Rudolf Petters, 1. Schriftführer.

Vom Vogelmarkt.

Von seltener auf den Vogelmarkt kommenden Vögeln werden angeboten:

R. Diwersy, Merzig (Saar), A. Z.-Mtgl. 183: Blaub. Blattvogel.

E. W. Lenger, Berlin N 58, Schönhauser Allee 70a: Gelbnackenamazonen, Bergpapageien, Weißhaubenkakadu, Grünhäher, Glockenvögel, Karmingimpel, Schuppenköpfchen, Sprosser.

Lichtenstaedt, Berlin-Johannisthal, Nieberstr. 10: Tarantiner, mex. Sperlingspapageien, kl. Kubafinken, gr. Kubafinken, schwarzk. Goulds, Spitzschwänze.

Dr. Pusching, Klagenfurt, Römerbad (Österreich): Beo (E. intermedius).

Bernd Regge, stud. rer. pol., Lötzen (Ostpr.), A. Z.-Mtgl. 264: 2,1 Girlitzbastarde, 1,0 Zeisigbastard, 1,2 Grünlingbastarde.

P. Rükert, Berlin O 112, Simon-Dach-Str. 7: Sprosser.

O. Sprewitz, Torgau, Schloßstr. 12: Steinrötel.

Strauß, Breslau 3, Bergstr. 31: Pirol, Nachtigall, Sperbergrasmücke.

Trillhof, Jena, Markt 8: 1 Fituslaubvogel (Phylloscopus trichilus), 1,1 Zaunkönige.

(Fortsetzung auf der 2. Umschlagseite.

Jahrgang 53 — 30. Oktober 1924 — Heft 37

DIE GEFIEDERTE WELT.

ZEITSCHRIFT FÜR VOGELLIEBHABER

Begründet von Dr. Karl Ruß

Herausgegeben von Karl Neunzig in Berlin-Hermsdorf

Inhalt:

Webervögel und Widafinken. Von A. Krabbe. (Fortsetzung.)
Jagdfalken. Von Franz Fuchs.
Exoten. Von S. Lichtenstaedt. (Fortsetzung.)
Meine Kanarien und Kanarienbastardzucht 1924. Von Linda Hirsch, Aubstadt. (Schluß.)
Kleine Mitteilungen - Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber, Sitz Leipzig - Vom Vogelmarkt - Bevorstehende Vogelschauen - Aus den Verbänden - Aus den Vereinen.

Abonnement monatlich (4 Nummern) 1.50 Gm. — Einzelpreis des Heftes 50 Gpf.
vermittelt das nächste Postamt bzw. der zuständige Briefbote. / Postversand ab Burg Bez. Magdeburg.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung / Magdeburg / Postschließfach 148

Bevorstehende Vogelschauen.

Ausstellung für Vogelschutz und Vogelpflege verbunden mit einer Vogelschau.

Heidelberg am 1. und 2. November 1924.

Die Ausstellung ist im Zoologischen Institut der Universität, in der Nähe des Bahnhofes, hinter dem Postamt. Dort ist eine Auskunftsstelle errichtet, wo alle eintreffenden Gäste nähere Auskunft über Quartier, Mittagessen usw. erhalten.

Am 1. November, abends 7 Uhr: Zusammenkunft im „Schwarzen Schiff", wo auch das Abendessen eingenommen werden kann. Anschließend Vortrag von Prof. Dr. Fehringer über Vogelpflege mit freier Aussprache.

Am 2. November, vormittags 10½ Uhr, im Kammerlichtspieltheater, Hauptstr. 88: Vortrag des Herrn Dr. Frhr. von Berlepsch über wissenschaftlichen und natürlichen Vogelschutz mit besonderer Berücksichtigung der Land- und Forstwirtschaft mit Lichtbildern.
Darauf läuft ein Film: Mellum, das Vogelparadies der Nordsee.

Nachmittags 3½ Uhr im „Schwarzen Schiff": Aussprache unter Vorsitz des Herrn Joh. Birk, Leipzig, erster Vorsitzender des Reichsverbandes der Deutschen Vogelliebhaber.

Auf Wunsch steht Prof. Fehringer auch am Montag, den 3. November, den Teilnehmern zur Verfügung. Näheres bei der Ausstellung.

Berlin. Vogelschau des Landesverbandes Preußen von Mittwoch, den 19. Nov. bis Sonntag, den 23. Nov. 1924 in den Sophiensälen, Berlin C, Sophienstr. 17/18.

Landesverband Preußen: Vogelschau Berlin. Zu der vom 19.—23. November d. J. in Berlin stattfindenden Vogelschau machen wir alle evtl. auswärtigen Aussteller aufmerksam, daß eine Platzgebühr nicht erhoben wird. Wohl aber wird zur Bedingung gemacht, daß evtl. Aussteller, welche bisher dem Landesverbande nicht angeschlossen sind, sich bei Meldung als Aussteller auch gleichzeitig als Mitglied des Landesverbandes anmelden müssen, mit gleichzeitiger Zahlung des Jahresbeitrages von 3 M.
Ausstellungsobjekte sind Vögel, Käfige, Vogelfutter, Gerätschaften und Literatur, also alles, was mit unserer Vogelliebhaberei und -pflege Beziehung hat.
Bezüglich unseres Ausstellungskataloges mit seinem anhängenden Inseratenteil geben wir bekannt, daß die ganze Inseratenseite 20 M., die halbe 10 M., die viertel Seite 5 M. kostet. Meldeschluß für Aussteller und Katalog-inserenten ist der 5. November. Anmeldungen sind zu richten an den Vorsitzenden des Landesverbandes Herrn Franz Rynke, Berlin O 34, Königsberger Str. 17.
J. A.: Paul Rükert.

Karlsruhe, Verein von Vogelfreunden. Gegr. 1888. Vogelschau u. Kanarienprämiierung am 6. u. 7. Dez. 1924.

Dresdener Verein für Vogelschutz und -pflege. Ausstellung 20.—22. Dezember 1924.

Aus den Verbänden.

Verband deutscher Farben-, Gestalt-, Bastardkanarien- und Exotenzüchter und des Bayerischen Vogelliebhabervereins (e. V.) Sitz München, Ortsgruppe Augsburg. Jeden Samstag gemütliche Zusammenkunft beim Vogelwirt Joseph Leininger, Gasthof, Frohnhof—Peutingerstr. Jeden 1. Samstag im Monat Monatsversammlung ebendort. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. Als amtliches Vereinsorgan ist die „Ges. Welt" anerkannt worden.
J. A.: H. Schwaiger, 1. Vors., Augsburg, Schöpplerstr. 9/II.

Aus den Vereinen.

Die Vorbereitungen zur Drucklegung des neuen Jahrbuches sind im Gange, die Farbentafeln dazu treffen in Kürze ein. Ich bitte Beiträge in Form von Zuchtberichten in den Jahrbüchern bisher nicht beschriebener Arten umgehend anzumelden und bis spätestens 20. November einzusenden. Ebenso sind scharfe Volierenaufnahmen o. ä. zwecks Reproduktion erwünscht. Im Falle, daß solche in entsprechender Ausführung nicht eingehen, können laut Beschluß des Ausschusses zwei neue Abbildungen angefertigt werden. Firmen, die eine Seite oder Teile davon mit Inseraten zu belegen wünschen, werden freundlichst um Anweisung gebeten; Wünsche werden weitgehendst berücksichtigt.
A. Krabbe.

„Aegintha", Verein der Vogelfreunde zu Berlin. Unsere Sitzungen finden an jedem 1. und 3. Donnerstag im Monat, abends 8 Uhr, im Vortragssaal des Aquariums statt. Fast in jeder Sitzung belehrende Vorträge und Besprechungen unter gütiger Mitwirkung unseres verehrten Ehrenmitgliedes Herrn Dr. Heinroth. Gäste gern willkommen.
J. A.: O. Vorbrodt, 1. Schriftf., O 112, Scharnweberstr. 18.

Vereinigung der Liebhaber einheimischer Vögel zu Berlin. Sitzung jeden 2. Donnerstag nach dem 1. und 15. des Monats im Vereinslokal zum „Alexandriner", Alexandrinenstraße 37a. Gäste stets willkommen.
J. A.: P. Böhme, Schriftf., O 17, Rüdersdorfer Str. 69.

Alte Vereinigung der Vogelliebhaber zu Dresden. Versammlung jeden Freitag, abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Blasewitzer Hof". Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. J. A.: Matth. Meys, Schriftführer.

Verein Vogelschutz u. -pflege zu Dresden. Versammlung jeden Donnerstag, abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Schillers Restaurant", Ecke Stifts- und Ehrlichstr. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. Bernhard Kühn, Vors.

Verein für Vogelschutz und -pflege zu Dresden. Gegr. 1906. (Vormals Vereinigung der Vogelliebhaber zu Dresden.) Vom 20.—22. Dezember d. J. veranstaltet genannter Verein in dem Saale des „Italienischen Dörfchens", Dresden, Schloßplatz, die zweite Vogelschau. Dieselbe wird das Gebotene der ersten in den „Annensälen" 1923, welche dem Verein, vor allem in finanzieller Hinsicht, guten Erfolg brachte, um vieles übersteigen. Alle Vogelliebhaber sind herzlich willkommen. J. A.: Bernhard Kühn, Vors.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei zu Hamburg. Sitzung jeden 1. u. 3. Dienstag im Monat in Hüttmanns Hotel, Poolstr. 22, abends 8¼ Uhr. Nächste Sitzung Dienstag, den 1. November 1924. Gäste sowie auch Exotenliebhaber stets willkommen. J. A.: Arnold Weber, 1. Vors.

Verein von Vogelfreunden Karlsruhe. Gegr. 1888. Monatsversammlung jeden 1. Mittwoch im Monat. Lokal „Goldener Adler". Die diesjährige Vogelausstellung, verbunden mit Kanarienprämiierung, findet am 6. u. 7. Dez. statt. Außer Medaillen werden wertvolle Ehrenpreise vergeben. Zur Ausstellung werden nur Mitglieder unseres Vereins zugelassen. Bang, 1. Vorstand. Boppel, 1. Schriftf.

Verein der Vogelliebhaber Königsberg (Pr.). Sitzung jeden Freitag nach dem 1. u. 15. d. M., abends 8 Uhr im Vereinslokal „Kaiser-Kaffee", Kaiserstr., Ecke Schnürlingsstr. Gäste sind willkommen. J. A.: Ernst Reinholdt, 1. Vors.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig. Vereinssitzungen jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat im Vereinslokal „Bauers Brauereirestaurant", Täubchenweg. Nächste Sitzung Donnerstag, den 6. November. Gäste stets willkommen. J. A.: Johann Birk, 1. Vors.

Verein der Vogelfreunde Leipzig-Plagwitz. Vereinslokal: „Gosenschlößchen", Leipzig-Plagwitz. Sitzungen an jedem 1. und 3. Montag des Monats, abends 8 Uhr. Vogelfreunde sind stets willkommen.
K. Scholtissek, 1. Vors., L.-Plagwitz, Lauchstädter Str. 30.

Verein der Vogelliebhaber zu Mannheim. Versammlung aller 14 Tage Samstag abend 8 Uhr im Vereinslokal „Restauration z. gold. Falken", S. 1. 17. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. J. Daubmann, 2. Schriftf.

(Fortsetzung auf der 3. Umschlagseite.)

Bayrischer Vogelliebhaberverein, Sitz München (E. V.). Jeden Samstag gesellige Zusammenkunft im Pschorrbräuhaus, Bayerstr. Jeden letzten Samstag im Monat Monatsversammlung im Vereinslokal ebendort. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. Rud. Engel, 1. Schriftführer.

Bayrischer Vogelliebhaberverein, Sitz München (E. V.) Durch die Verbrüderung mit dem 1. Floridsdorfer Waldvogel-Verein „Die Edelfinken" in Wien sind wir auch in der Lage, Vereins- und Ausstellungsberichte usw. von dort in der „Gef. Welt" abzudrucken, und glaube sicher anzunehmen, damit den Vogelliebhabern zu dienen, noch dazu, da ja die schöne Donaustadt mit ihren 32 Waldvogelvereinen eine Hochburg der deutschen Vogelliebhaberei darstellt. Wie ja schon einmal erwähnt, sind die Wiener nur auf Gesangsausstellungen eingestellt und somit das uns geläufige Wort Vogelschau mit einem gewissen Arteureichtum dort nicht üblich ist. Es werden wohl auch gewisse Raritäten gezeigt, um das Ganze etwas runder abzustimmen. Ich lasse den uns eingesandten Bericht im Wortlaut folgen: Der gefertigte Obmann des 1. Floridsdorfer Waldvogel-Vereins „Die Edelfinken" beehrt sich hiermit dem lieben Bruderverein in München einen kurzen Bericht über seine am 27. April 1924 stattgefundene Vogelschau zu übermitteln. Genannte Ausstellung, welche, wie immer, im Vereinsheim, Herrn Bergmayers Gasthause, stattfand und mit einer Preisverteilung verbunden war, hatte einen sehr guten Besuch und war seitens der Aussteller auch reichlich beschickt. Es wurden ausgestellt 85 Vögel, hiervon 22 Gelbspötter, 28 Schwarzplattl (Mönchsgrasmücken), 25 Buchfinken und 10 Spezialitäten. Von den gestifteten Vereinspreisen erhielten: für Schwarzplattl: den 1. Preis mit Vereinsdiplom der Obmann des Vereins Herr Salinger, den 2. Preis Herr Karl Weiß, den 3. Preis Herr Johann Bartl, Obmann-Stellvertreter; für Gelbspötter: den 1. Preis mit Verbandsdiplom Herr Franz Jauda, den 2. Preis Herr Wobelka, den 3. Preis Herr Hejlik; für Finken: den 1. Preis Herr Johann Bartl, den 2. Preis Herr Wobelka, den 3. Preis Herr Tepala; für ausgestellte Spezialitäten: das Verbandsdiplom für 1 Kollektion (2 Zaunkönige, 1 Alpenlerche, 1 Nachtigall und eine Abnormität, Albino eines Bergfinken) Herr Johann Janouschek. Ehrenpreise erhielten: Herr Neumann für 1 Blaukehlchen, Herr Bergmayer für eine weiße Feldlerche, Herr Medlein für einen singenden Graupötter. Als Preisrichter fungierten die Herren Pfreigner und Berger. Die Ausstellung fand allseitigen Beifall und lieferte durch eine abgehaltene Tambola ein ansehnliches Reinerträgnis. Karl Salinger, Obmann.

„Ornis", Freie Bezugs-Vereinigung der Waldvogelliebhaber Deutschlands. Gegründet 1912. Auf vielseitigen Wunsch der alten Mitglieder wollen sich die Waldvogelliebhaber wieder in der „Ornis" zusammenschließen. Als amtliches Organ ist die „Gef. Welt" ausersehen worden, und werden die Artikel, die früher in den „Ornis-Blättern" erschienen, in obiger Zeitschrift gebracht werden. Aus diesem Grunde bittet die Geschäftsführung um eifrige Mitarbeit, damit unserer Waldvogelpflege wieder der Platz eingeräumt wird, der ihr gebührt. Anmeldungen sind unter Beifügung von 2 M. an den Geschäftsführer zu richten; Mitglieder erhalten auf Mischfutterbestellungen 5 % Rabatt. Mit treudeutschem Gruß Martin Sperling, Halle/S., Südstr. 49.

Zoolog. Verein zu Zwickau i. S. Versammlung jeden Freitag nach dem 1. und 15. jeden Monats, abends 8 Uhr, im Restaurant „Zur Bleibe", Katharinenkirchhof. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen.
J. A.: Paul Schmidt, 1. Vors., Zwickau i. S., Bosenstr. 44.

Von folgenden **Farbentafeln** der **„Gefiederten Welt"** sind noch einige Exemplare vorrätig, welche wir, solange der geringe Vorrat reicht, zum Preise von **1 G.-M. für die Tafel** zuzügl. **20 G.-Pf.** Porto u. Verpackung **für jede Sendung** bei vorheriger Einsendung des Betrages auf unser Postscheckkonto **Magdeburg 3148** abgeben.

1898 Tafel III: Schwarzspecht. (Schwarzdrucktafel.)
1899 Tafel IV: Nest des Gartenrotschwänzchens mit Weibchen, Jungem und Ei. (Schwarzdruck.)
1900 Tafel I: Madagaskar-, Napoleons-, dottergelber, Samt-, Blutschnabelweber.
1900 Tafel II: Kl. Alexander-, Bunt-, Wellensittich, Rosenpapagei, kl. Gelbhaubenkakadu.
1900 Tafel III: Sonnenvogel, blauer Hüttensänger, Rosenstar, Schamadrossel, weißohriger Bülbül.
1900 Tafel IV: Paradieswitwe. Mozambikzeisig, Grauer Kardinal, Safranfink, Papstfink.
1901 Tafel III: Kleinspecht, Kleiber, Wendehals.
1902 Tafel I Kohl-, Schwanz-, Hauben-, Tannenmeise.
1902 Tafel II: Goldammer, Baumpieper, Feldlerche.
1902 Tafel IV: Diamant-, weißbäckige Gürtel-, Masken-, Gürtelamandine.
1903 Tafel I: Hausrotschwanz, Sprosser, Nachtigall, Rotkehlchen.
1903 Tafel II: Bluthänfling, Grünling, Kernbeißer, Buchfink.
1903 Tafel III: Mistel-, Wacholder-, Wein-, Singdrossel.
1903 Tafel IV: Zwergstrandläufer, Wachtel, weißflüglige Seeschwalbe, Sandregenpfeifer.
1904 Tafel I: Zaun-, Garten-, Dorn-, Mönchgrasmücke.
1904 Tafel II: Schneefink, Steindrossel, Alpenbraunelle, Steinsperling.
1904 Tafel III: Binden-, Kiefern-, Fichtenkreuzschnabel.
1904 Tafel IV: Bartmeise, Rohrammer, weiße Bachstelze, Sumpfrohrsänger.
1905 Tafel I: Schwarzbürzel-, Spitzschwanzbronzemännchen, weißes, gelbbuntes, braunbuntes jap. Mövchen.
1905 Tafel II: Grau-, Orange-, Erz- und Schmuckpfäffchen.
1905 Tafel IV: Schwarzkehl-, Dreifarben-, Weißkopf- u. Schwarzkopfnonne.
1906 Tafel II: Lein-, Erlenzeisig, Berghänfling, Stieglitz.
1906 Tafel III: Stein-, braunkehliger und schwarzkehliger Wiesenschmätzer.
1907 Tafel II: Weißsterniges, rotsterniges, Wolffsches Blaukehlchen, Blaukehlchen ♀.
1907 Tafel III: Kleines, Zwerg-, Glanz-, Riesen-, rotrückiges und Gitterflügel-Elsterchen.
1907 Tafel IV: Karmin- und Hakengimpel, Gimpel.
1908 Tafel II: Braunrückengold- ♂ ♀, Schwarzkopf- und Goldsperling ♂ ♀.
1908 Tafel IV: Pünktchenastrild, Amarant ♂ ♀, dunkelroter Astrild, Tigerfink ♂ ♀.
1909 Tafel I: Orangegesichtiger Unzertrennlicher, Rosenpapagei, Rußköpfchen, Tarantinischer Unzertrennlicher, Grauköpfchen.
1909 Tafel II: Klarinetten- u. Mennigvogel, braunkehliger Blauschnäpper.
1909 Tafel III: Schwarzbäckchen-, Elfen-, Bunt- und Granatastrild, gemalter Astrild.
1909 Tafel IV: Orange-, Rotkopf-, Blutschnabel-, Napoleons- und Madagaskarweber.
1910 Tafel I: Grauer, Trauer-, Halsband-, Zwergfliegenschnäpper.
1910 Tafel IV: Zipp-, Garten-, Zaun-, Kappenammer.
1911 Tafel I: Rotrücken-, Raub-, Schwarzstirn-, Rotkopfwürger.
1911 Tafel II: Zeresastrild, Malabarfasänchen, Muskatfink, Silberschnäbelchen.
1911 Tafel III: Gartensänger, Fitislaub-, Weidenlaub- u. Waldlaubvogel.
1911 Tafel IV: Goldköpfiges ♂ ♀, feuerköpfiges Goldhähnchen, Zaunkönig.
1912 Tafel II: Wieners, Aurora-, Tropfen-, Wachtel- und Rebhuhnastrild.
1912 Tafel III: Magellan-, Kapuzen-, mexikanischer, Yarells und Trauerzeisig.
1912 Tafel IV: Dorn-, Sonnen- Binsen- und Gitterflügelastrild, Zebrafink.
1913 Tafel II: Violettblauer u. Rotbauchorganist, Purpur-, Dreifarben- und schwarzblaue Tangare.
1913 Tafel III: Paradies-, Dominikaner-, Königs-, Fischers, Rotscheitel- und Gelbrückenwidafink.
1913 Tafel IV: Goldschulter-, Fein-, Sing-, Browns Singsittich.
1914 Tafel I: Schwarzkopf-, Rosenbrust- u. mexik. Gelbkernbeißer, dunkelblauer Bischof, roter Kardinal.
1914 Tafel III: Diuka-, Grau-, Kron- u. Morgenammerfink, Graukardinal.
1914 Tafel IV: Pikui-, Kap-, Diamant-, Tamborin- u. Friedenstäubchen, chinesische Zwergwachtel.
1915 Tafel I: Sammetköpfchen, Sperber-, Orpheus- und Bartgrasmücke.
1915 Tafel III: Diamantfink-, Masken-, Weißwangen- und Spitzschwanzamandine, Gürtelgrasfink.
1915 Tafel IV: Star, Pirol, Rosenstar.
1920 Tafel I: Nandy-, Jendaja-, Guajakil- und Goldstirnsittich.
1920 Tafel II: Schuppenköpfchen, Schnurrbärtchen, dottergelber, Zwergmasken- und Textorweber.
1920 Tafel III: Tui-, Ziegen-, Mönch-, Tuipara- u. Katharinasittich.
1920 Tafel IV: Reisfink, weißer Reisfink.
1921 Tafel I: Gelber Wellensittich und Wellensittich.
1921 Tafel II: Kleiner Gelbhaubenkakadu.
1921 Tafel III: Kleiner Alexandersittich.
1921 Tafel IV: Domingo-, Cuba- und Rotbugamazone.

Da die Nachfrage nach Farbentafeln sehr groß ist, bitten wir sofort zu bestellen.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg / Postschließfach 148

Anzeigenteil

Die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 20 G.-Pf. berechnet. Aufnahme erfolgt gegen Voreinsendung des Betrages in Reichsgeld per Brief od. auf unseren Zahlstellen: Postscheckkonto: Magdeburg 3148, Wien 156 687, Bern III 4326, Prag: Creditanstalt d. Deutschen unter Angabe des Zweckes.

Käfige u. Gerätschaften

Vogel-Mistelleim
zum Fangen schädlicher Vögel, Ia klebend bei jeder Witterung, garantiert gebrauchsfähig, Dose 1,50 ℳ fr. von **A. Freitag Nchf.**, Frankenberg i. S. 6. Wiederverkäufer hohen Rabatt. [855

Vogel-Fangkäfige 2.50 und 4.50 ℳ, Schlagnetze f. kl. schädl. Vögel 1.90 ℳ, f. größ. 2.10 u. 2.40 ℳ. **Katalog gratis.** **J. Tannen**, Gronau 58 (Westf.). [856

Das Wichtel.
Allen Vogelliebhabern empfehle ich das Wichtel; interessanter Fang von Vögeln aller Art. Elchelhäher, Habichte, Eulen gehen sehr gerne auf das Wichtel. Anleitung gratis gegen Einsendung von 1,50 Mark franko. [857
Johann Fischer, Waldsassen,
Mitterteicherstr. 54. Ornis-Mtgl. 332.

Gegen Milben
Ia frisches Insektenpulver direkter Import [858
Spritzdose 50 Pfennig, Pfund 3,50 ℳ.
Milbentinktur, Flasche 1 ℳ.
Drogenhaus Hoffschildt
Breslau I, Ohlauer Straße 23.
Gegr. 1876. A. Z.-Mtgl.

Futtermittel

Vogelfutter [859
für Kanarien, Waldvögel, Exoten, Papageien, Weichfresser. Anerkannt bewährteste Mischungen auf Grund langjähriger Erfahrung. Liste 13 über Vogelfutter umsonst.
W. Göpel, Leipzig,
Tröndlinring 1. Telephon 14958.
Bei Anfragen bitte auf die „Gefiederte Welt" Bezug zu nehmen.

Prima echte Harzer
Kanarien-Edelroller
vielseit. Tag- u. Lichtschläger aus meiner bekannten Feinzucht, ℳ 12, Ia Zuchtpärchen ℳ 15. Porto, Verpack. ℳ 4.
Feiner Harzer
Gebirgssommerrübsen,
nußsüße milde sauber gereinigte Kennerware 3,50 M. und Porto.
Rich. Heydenreich,
Bad Suderode 7 B, Harz.
Staatsmedaille, viele gold. Medaillen, seit 860] vielen Jahren an der Spitze.

Mehlwürmer
geg. Einsend. v. 2.— Rentenmark 1/4 Pfd. franko versend. **D. Waschinski & Co.**, Biesenthal I (Mark). [861

[862] **Mehlwürmer,** reine Ware, gegen Eins. von 1.75 ℳ 1/4 Pfd. franko. **Th. Witte**, Niederndodeleben b. Magd.

Mehlwürmer Pfd. 7 ℳ, 3/7 = 2 ℳ franco. Voreins.
863] **Jeltner, Breslau**, Weinstr. 12.

Inserate
für das am 6. Nov. 1924 zur Ausgabe gelangende Heft 38 der Ges. Welt erbitten bis 1. Nov. 1924 früh.

Vögel

Mandrill
(halbgroß, zahm)
Stück 225 Mark.

Wollaffe, zahm	Stck.	250 ℳ
Hutaffen, kleine u. große, zahm	„	75 ℳ
Resusaffen, zahm	„	70 ℳ
Resusaffen, kleine u. große, nicht ganz zahm	„	60 ℳ
Meerkatzen, zahme	„	70 ℳ
Graupapageien prima	„	120 ℳ
Blaustirnamazonen, Riesenauswahl	Stck.	40—55 ℳ
Rotstirnamazonen, zahm	Stck.	35 ℳ
Weißkopfamazonen	„	35 ℳ
Veilchenpapageien	„	60 ℳ
Tarant. Unzertrennliche	Paar	40 ℳ
Blaubürzlige Sperlingspapageien	„	18 ℳ
Kaktussittiche	„	13 ℳ
Blaustirnsittiche	Stck.	20 ℳ
Schamadrossel, prima	„	80 ℳ
Amerik. Spottdrossel, garantiert Männchen	„	45 ℳ
Prachtglanzstare	„	30 ℳ
Büffelweber (im Gesang)	„	15 ℳ
Rotgehäubte Kardinäle	Paar	25 ℳ
Gilbweber, in Pracht	„	15 ℳ
Tahaweber, in Pracht	„	15 ℳ
Papstfinken, gut befiedert	„	30 ℳ
Indigofinken	„	30 ℳ
Jap. Mövchen	„	15 ℳ
Graunelsänger, Männch.	Stck.	6 ℳ
Spitzschwanzamandinen	Paar	45 ℳ
Maskenfinken	„	45 ℳ
Grüne u. gelbe Wellensittiche	„	15 ℳ
Stieglitzhähne	Stck.	3 ℳ
Bluthänflinge	„	3 ℳ
Buchfinkenhähne	„	2 ℳ
Zeisighähne	„	3 ℳ
Rotkehlchen	„	2 ℳ
Graudrosseln	„	8 ℳ
Rotrückige Würger	„	5 ℳ

Versand gegen Nachnahme oder Voreinsendung des Betrages. Porto und Verpackung zum Selbstkostenpreis.
Tierhandlung
Max Kleinert
Berlin NO. 18, Strausberger Str. 13,
Fernruf Alexander 3313. [864

Gut singende, schön befiederte
Waldvögel
gebe sofort ab
Stieglitze 3 M., Hänflinge 2 M., Zeisige 1.80 M., Buchfinken 1.50 M., Bergfinken 1.20 M., Grünlinge 1.50 M., blutrote Dompfaffen 5 M., blaue 2 M., Pärchen 6 M., Schwarzplättchen 6 M., Rotkehlchen 4 M., Wald- od. Schwarzamseln 8 M. das Stück, Garantie f. leb. Ankunft. Versand erfolgt p. Nachnahme zuzüglich Porto und Verpackung.
Franz Bechstedt, Vogelexport,
Wildenspring (Thüringer Wald) bei
865] Großbreitenbach.

Waldvögel
2 Schwarzplatten, prima Überschl., Frühjahrswildfänge, gute Gebirgsvögel, à 7.50 M. **1 Fitislaubvogel** (Phylloscopus trichilus) 5 M. **1,1 Zaunkönige** 8 M. **2 gute Rotkehlchen** à 3 M. verkauft [866
Trillhof, Jena, Markt 8.

Suche reinweiße Kanarienweibchen
oder
gelbe Kanarienhaubenweibchen.
Angebot mit Preis.
Konrad Meier,
Hörstmar i. Lippe. [867

Verkaufe wegen Aufgabe schöne glatte Tiere

Chin. Nachtigall,
868] im Schlag, 10 M.
1 Schwarzamsel,
anfangend zu singen, 10 M. Unter der Hälfte des Neupreises.
Ferner prima Käfige,
meistens wie neu aussehend, einer mit schrägem Dach, 40/cm lang, 24 cm breit, 40 cm hoch, 10 M.
Einen Spezialkäfig für Schama od. Nachtigallen
Zimmerschmuckstück, 15 M.
Einen Käfig
62 cm lang, 29 cm breit, 39 cm hoch.
Suche Papageienkäfig.
Egon Kebekus, Photograph,
Schwerte, Markt 6.

Gebe ab:
4,0 Stieglitz×Kanarien, schön befiedert, tadellos im Gesang, Stück 15 ℳ. 0,2 ebensolche Stück 3 ℳ.
Suche 0,2 Zebrafinken.
Apotheker Pistor, Oberaula,
Bez. Cassel. [869] A. Z.-Mtgl.

6,0 grüne Kanarien (Wildabstam.) à 8 ℳ, 5 jg. **Wellensittiche** 22 ℳ, 4,0 jg. zahme **Perlstare**, gelehr., à 4 ℳ, **Amsel, Ia**, 3,50 ℳ, 5,0 **Mandarin-Enten**, à 40 ℳ. [870
Schlößl. Allersberg bei Nürnberg.

2 reinweiße Dohlen
Stück 50 Mark,
1 Rauhfußkauz
(Strix dasypus) 35 Mark,
3 diesjährige singende Blaudrosseln
Stück 50 Mark hat zu verkaufen
Johann Rohracher, Lienz, Tirol,
(Deutschösterreich). [871

Wer tauscht mit
1,0 chin. Nachtigall, evtl. mit Käfig
872] 54×40 cm,
1,1 Sperlingspapageien, Ia,
1,1 gr. Wellensittiche, Ia Zuchtpaar, gegen sprechende Blaustirnamazonen oder andere größere Papageien oder auch andere Exoten. Zuschriften an
Guido Zeeh, Buchhalter,
Röhla im Erzgebirge.

Verk. „Ges. Welt" Jahrg. 1916 bis 1923 einschl., auch einz. [873
A. G. v. Zitzewitz, Berlin W 50, Kurfürstendamm 243. A. Z.-Mtgl. 308.

Abgebe in eingewöhnten Exemplaren:
5 grüne und gelbe Wellensittiche, junge à 7 M., 1,1 kl. Flammenweber in Farbe zu 8 M., 1,2 Blutschnabelweber in Farbe zu 7 M., 1,1 Kanarie 1924 6.— M., 1,0 Berghänfling 2 M., 1,0 Bergfink 1 M., 0,1 Paradieswida 2 M., 1,0 Amsel 1923 5 M., 4 graue Weber à 1.50 M., 1,0 Birkenzeisig 1 M., 1,0 Büffelweber in Farbe 12.— M., 0,1 Dompfaff 2.— Mark. [874
Eug. Müller, Küllstedt (Eichsfeld).

Tausche
2 männl. Wellensittiche (4 Mon. alt), in Vogelstube gezüchtet, gegen 1 od. **2 Weibch. jap. Mövchen**, zuchtf.
Wilh. Brunner, Karlsruhe,
Nokkstraße 9 I. [875

Vorsänger und **pa. Zuchtmateria**
rein durchgezücht. Hohl- und Schockel Stamm, 2 Staatsmedaillen, gebe preis wert ab. Am liebsten selbst kommen. [87
Paul Holzky, Cöthen IV

Gebe ab: **1,0 Girlitzkanarie** zuchterprobt, 12 M **1,0 Girlitz, 1,0 Hänfling**, z. Bast Zuchterprobt, à 3 M., **0,1 gelbe Ka narie**, Landrasse 2 M.
Suche: **Isabell-** oder **Fuchsk narien-Hahn 1924.**
Julius Wohlfarth, [8
Eberstadt bei Winsberg, Wttbg.

4 Paar Turteltauben,
gesunde, schöne Paare à 10 M. Ve tausche auch gegen **Kanarien** u **Wellensittiche.** [8
Ernst Mehl, Spenglermeister,
Garmisch (Bayern).

Zuchtpaar winterh. gelbe Welle sittiche 18 M., **junge dito.** je Pa 15 M., **1,0 blaufedr. Wellensitti** Zucht 24, 10 M., **0,2 dito.** je 15 M **1,0 Nußweber, aethiop. Blu schnabelweber**, je 3,50 M., **1, Oryx-, 2,0 Heuglins Weber** 9 M., **0,1 Napoleonsw.** gratis.
879] **A. Krabbe,**
Anklam, Demminer Straße 10.

Wellensittiche,
2 gute **gelbe** Zuchtpaare à 15 M **junge grüne,** kräftige Tiere aus Freivolieren, à 5 M., evtl. Tausch.
Mertes, Mainz, Wallaustraße
A. Z.-Mtgl. 339.

Tausche und verkauf
aus meiner Voliere:
♂♀ **Graunastrilde**
♂— „
♂— **Orangeweber** } tadell
♂♀ **Blutschnabelweber** } Tier
♀— **Graunelsänger**
ferner Bastelwerkzeug, Haustelepl Feilen, Hobel usw. gegen Ia **einhe Weichfresser** (Sprosser bevorz Zahle eventl. zu und erbitte Angel Beiderseitig Garantie guter Ank
Karl Puhl, M.-Gladbach,
Eickenerstraße 185.

Tausche
gegen **Papagei** oder **Sittiche** (Wellensittiche) Dr. Karl Ruß, Die heimischen Stubenvögel, geb., Dr. Ruß, Die Webervögel und Widafi geb., Dr. Karl Ruß, Der Wellensi gebunden. Alle Bücher fast neu.
Schmitt, Weinsheim bei W

Offeriere in einwandfre gesunden Exemplaren:
Graupapageien, Ia im Ge fingerzahm, viel sprechend.
Gelbnackenamazonen, finger schön im Gefieder, anfang. zu spr
Bahia-Blaustirnamazonen, Ia im Gefieder,
Kanarienvögel, Stieglitze, Ze Rothänflinge, Buchfinken, kehlchen, Feld- u. Heidele sowie alle Arten **Vogelfutter** i besten Qualitäten.
Zoologische Handl
G. Behnke,
Berlin O 34, Petersburger S

Gebe noch ab:
2,0 Rotkehlchen Ia . . .
1,0 Feldlerche . . . . .
1,0 Heidelerche . . . . .
Suche
Spötter, auch **Nachtigalle Sprosser.**
Pfarrer Schwabe,
Großenbehringen b. Go

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Berlin-Hermsdorf; für den Anzeigenteil: Rolf Kretschmann, Magdeburg, Postschließfach 1
Verlag der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck: August Hopfer, Burg Bz. Magdeb.

Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Jahrg. 53 | Den 6. November 1924 | Heft 38

(Druckort: Burg, Bezirk Magdeburg.)

Webervögel und Widafinken.

Von A. Krabbe.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Im heurigen Jahr machte das Paar vier Bruten mit dem sonderbaren Ergebnis, daß die Jungen, soweit sie geschlüpft waren, nicht aufgezogen wurden und stets verhungerten, wenn die Kiele durchbrachen. Ein einziges Junges, welches bis zum Ausfliegen kam, war teilweise gelähmt und flugunfähig und ging nach etlichen Tagen ein. Worin der diesjährige Mißerfolg seine Begründung hat, kann ich nicht sagen, vermute aber, daß der Anteil an Mehlwürmern und Ameisenpuppen für die Aufzucht der Jungen nicht ausreichte, da von allen Seiten Mehlwurmliebhaber angeschwirrt kamen. Ich werde im nächsten Jahre entsprechende Vorsorge treffen und keine frischen Ameisenpuppen, die im entscheidenden Moment zudem noch ausbleiben oder nicht ausreichen, sondern aufgebrühte mit Ei und Eierbrot und Mehlwürmer in größeren Mengen füttern und hoffe so wieder auf Erfolg. Als Unikum kann ich noch anführen, daß das vierte Nest in ein Harzer Bauer hineingewebt war. Wie von Heuglin richtig beobachtet, baut der dottergelbe Weber mehr Nester als das Weibchen zur Fortpflanzung gebraucht; er vermutet, daß dies aus Schaffensfreude und Spieltrieb geschieht. Niemals sah ich das Webermännchen in einem dieser Nester übernachten, wenngleich ich nicht behaupten kann, daß es bei einbrechender Dunkelheit nicht doch noch hineinkriecht. Wohl mag dies der Vogel in der Freiheit tun, um sich so vor Nachtraubtieren zu schützen. Mir schien es stets so, als ob das Männchen, das diesmal im Anfang zwei Nester webte, dem Weibchen die Auswahl überließ. Das dritte Nest wurde während der Brutzeit begonnen und diente dem Weibchen zur zweiten Brut usw., Störungen oder ungünstiger Platz können die Aufgabe des begonnenen und die Herstellung eines neuen Nestes bedingen.

Daß der dottergelbe Weber nächst dem Zwergmaskenweber der empfehlenswerteste aller Edelweber ist, habe ich anfänglich bereits angedeutet. Er wird hin und wieder angeboten und ist dann zum Preise von 6—10 Mark für das Paar zu haben, in Pracht entsprechend teurer. Übrigens werden viele Weber als dottergelbe angeboten, ganz besonders im grauen Gefieder, die erst später nach der Verfärbung genau bestimmt werden können. Dies ist erst im dritten Lebensjahr möglich und man kann unter Umständen zwei Jahre warten, wenn man einjährige Vögel erhält. Abgebildet ist ein Männchen im Prachtkleid auf Tafel XXX im neuen Neunzig.

Im Frühjahr vorigen Jahres kaufte ich bei Fockelmann ein Paar als Textorweber bezeichnete Vögel, die mit einem südafrikanischen Transport angekommen sein sollten. Daß Männchen und Weibchen zwei verschiedenen Arten angehörten, ersah man auf den ersten Blick. Alle größeren Gelbweber bekommen bei dem Importeur den Namen Textor- oder zur Abwechslung auch die Allerweltsbezeichnung Maskenweber und werden nun damit auf die Händler, resp. Liebhaber losgelassen. Der Importeur kann sich bei einer großen Kiste darin herumschwirrender Weber, teils verfärbt, teils grau, große und kleine, Männchen und Weibchen, alles in sinnverwirrender Flucht durcheinandergewürfelt, wirklich nicht die tagelange Mühe machen, einige hundert kleine Käfige zu füllen, um die Insassen an Hand von Bälgen aus einem Museum oder mit Hilfe eines Gelehrten genau zu bestimmen. Vielmehr liegt sein Interesse darin, den ganzen Schwung möglichst geschlossen bei erster Gelegenheit weiterzugeben. Der Händler sortiert so gut er kann und der Liebhaber nimmt gläubig, was sein Lieferant ihm unter dem bestellten Namen zuschickt. Wie viel Seltenheiten mögen wohl so nicht erkannt werden und der Wissenschaft und Liebhaberei verloren gehen. Ich stelle bei jedem Neuankömmling erst die Behauptung auf, daß dieser Vogel nicht der bestellte ist, bis ich mich dann nach genauer Information aus der Literatur überzeugt habe, daß meine Behauptung unbegründet resp. begründet ist. — Nach dieser kleinen Abschweifung zu dem vorerwähnten Textorweber zurück. Das Männchen — für einen Textor zu kurz und gedrungen, färbte im Laufe des Sommers unvollkommen ein — Akklimatisation — und ließ so eine genaue Bestimmung nicht zu. Immerhin glaubte ich nicht fehl zu gehen, einen Schwarzstirnweber — S. velata in ihm zu sehen und trug diese Bezeichnung in mein Bestandsregister ein. Im Januar erhielt ich von Fockelmann aus einem südafrikanischen Transport zusammen mit Gelbbauch-

ammern ein Paar große Maskenweber, von dem das Weibchen einging und der Schriftleitung zur Bestimmung zugesandt wurde mit der Bemerkung, daß es sich m. E. um einen Gelbrückenweber handelt, welcher Art, könnte ich nicht feststellen. Die Auskunft lautete: Gelbscheitelweber — Hyphantornis spilonotus — der Gattung Schwarzkopfweber. Für den eingegangenen Vogel erhielt ich anstandslos Ersatz und bestellte damit einige weitere dieser Seltenheiten für alle Fälle. Sämtliche Vögel hatten helle Schnäbel mit dunkler First. Die Männchen färbten ins graue Kleid über, die Schnäbelfärbung blieb. — Im Juni färbte der vermeintliche Schwarzstirnweber ein und bald darauf die Gelbscheitelweber, und nun wurde ich erst gewahr, daß der von mir als Schwarzstirnweber angesprochene ebenfalls ein Gelbscheitelweber war. Ich besaß jetzt also 4,2 dieser Weber. Heft 31 der „Ges. Welt" brachte eine neue Überraschung, und jetzt bin ich nach dieser langen Einleitung, die dem Leser die Schwierigkeit in der Bestimmung von Webervögeln deutlich vor Augen führen soll, in der Lage, einen Bericht über das Gefangenleben von

Heuglins Weber — S. heuglini *(Rchb.)*

zu geben. Beschreibung bitte ich Seite 243, Abbildung Seite 77 dieses Jahrganges nachzulesen. Wenn Herr Neunzig der Ansicht ist, daß es noch junge Vögel waren, so ist dies dahin zu verstehen, daß sie als bereits verfärbte Tiere mindestens drei Jahre alt gewesen sind, vorausgesetzt, daß die Einfärbung auch bei dieser Art erst im dritten Jahre stattfindet. Ob der erste Vogel aus einem südafrikanischen Transport stammt, steht nicht fest; bei den übrigen möchte ich es behaupten, zumal sich in demselben Transport Gelbbauchammern*) befanden. Es bliebe zu erwägen, ob nicht in nordwärts gelegenen Häfen Zugänge zum Transport gekommen sind, worunter sich diese Weber befanden. Darüber könnte aber nur der Transportleiter Auskunft geben. Weiter wird die Vermutung ausgesprochen, daß die Geschlechter gleich gefärbt sind, daß also auch das Weibchen ein Prachtkleid anlegt. Dies erscheint mir sehr unwahrscheinlich. Im grauen Gefieder sind Männchen und Weibchen gleichgefärbt. Ins Prachtkleid eingefärbt sind nur die Männchen, deren Schnäbel bei allen vieren schwarz wurden, während die Weibchen helle Schnäbel mit dunkler First behalten haben. Ob mit der Abfärbung die Schnäbel der Männchen wieder heller werden, bleibt abzuwarten. Daß die beiden Weibchen wirklich solche sind, ersehe ich deutlich aus dem Liebeswerben und den Begattungsversuchen des Gilbwebers. Dies als Beitrag für die Klärung noch offener Fragen.

So still die Heuglins Weber im Winterkleid sind, so ungestüm werden die Männchen zur Brutzeit. Den ganzen Tag toben sie flügelschlagend, singend und unter Kapriolen in der Voliere umher, oftmals auch andere verfolgend, insbesondere den Gilbweber, der anscheinend ihre Eifersucht erregt. Die beiden Weibchen kümmern sich um das Liebeswerben der Männchen nicht im geringsten, sondern leben still und abgeschieden vor sich hin. Ich werde im nächsten Jahr nur 1,1 in die Voliere einwerfen, um dem Paar die nötige Ruhe zum Brutversuch zu verschaffen. Ich hoffe dann weiter berichten zu können.

E. Schwarzkopfweber — Hyphantornis *Gr.*

Dies ist eine in der Liebhaberei berüchtigte Gattung mit 7 Arten, wovon 4 eingeführt worden sind, nämlich Gelbscheitelweber, großer Maskenweber, Textor- und Larvenweber. Der

Textorweber — H. cucullatus *(St. Müller)*

ist so allbekannt, daß ich mir eine nähere Beschreibung ersparen kann. Ich erwarb diesen schönen Weber stattlicher Größe — 160—170 mm — bei der Firma A. Fockelmann in Hamburg und warf ihn nach etlichen Tagen in die große Voliere ein. Hier gebärdete er sich sofort ganz anders als im Käfig, balzte, balgte sich mit dem Larvenweber und anderen und vollführte zeitweise mit seinem schrillen Geschrei solchen Lärm, daß er selbst einem durch Tierlaute wirklich nicht verwöhnten Exotenliebhaber auf die Nerven fallen konnte. Der Vogel war aber besser als sein Ruf und hat sich nichts zu Schulden kommen lassen. Schließlich mußte ich ihn doch in eine andere Voliere einwerfen, weil er zu dreist und gefräßig beim Mehlwurmempfang war und gierig das Vielfache dessen verschlang, was ihm zugedacht war. Wegen seiner Unruhe und seiner in kleinerer Voliere gegen Prachtfinken u. ä. bekannten Bösartigkeit kann ich ihn zur Mitkäfigung nur unter besonderen Umständen empfehlen. Für schwach besetzte Außenvolieren ist er der gegebene Bewohner, da er winterhart und ausdauernd, dabei schön in der Färbung und unterhaltend durch unermüdlichen, fast komisch anmutenden Nestbau ist.

(Fortsetzung folgt.)

*) Die Verbreitung des Gelbbauchammers erstreckt sich über Westafrika (Senegalgebiet), Nordost-, Ost- und Südafrika. N.

Über Vogelpflege.

Von Adolf Günther, Lommatzsch.

(Nachdruck verboten.)

Veranlaßt werden meine Ausführungen durch Frage 14. Was die Milbenvertilgung anlangt, so kann ich, da ich nie Ungeziefer in meinen Käfigen gehabt habe — in einer mehr als 40jährigen ununterbrochenen Vogelhaltung — nur darauf hinweisen, was wohl fast in jedem guten Buch über Vogelhaltung darüber zu lesen ist. Auch in der „Ges. Welt" ist meines Wissens oft darüber berichtet worden. Es wird kein anderes Mittel geben, als die Käfige gründlich zu reinigen, d. h. sie und alles, was dazu gehört, auszubrühen und das Gefieder der Vögel nachhaltig mit gutem Insektenpulver zu durchblasen. Bei meinen Hühnern hat sich immer wieder persisches bewährt. Da die Vermilbung der Käfige des Fragestellers ganz außerordentlich stark sein muß — die Ausdrücke nervös, rasend, Verzweiflung zwingen zu dieser Annahme — so könnte er ja einmal Formalin anwenden. Seine Wirkung lernte ich kennen, als mir für unser Museum viele vom Holzwurm befallene Stücke eingeliefert wurden. Damals riet mir ein Fachmann, alles Wurmstichige in einen Raum zu bringen, in einen Eimer mit etwas Wasser Formalin zu schütten und dann ein glühendes Stück

Eisen (Plättstahl) hineinzulegen. Die dadurch entstehenden Dämpfe würden alles Lebende töten. So war es auch. Das Zimmer mußte natürlich verschlossen gehalten werden. Ich habe Formalin noch wiederholt in meinem Hühnerstall angewendet gegen die rote Milbe, einen furchtbaren Feind, namentlich der Jungtiere. Einmal schrubbte ich alle Holzteile des Stalles mit Formalin, das mit Wasser verdünnt war. Das war auch für mich selbst kein Spaß. Immer wieder mußte ich die Arbeit unterbrechen und frische Luft schöpfen, sonst wäre ich erstickt. Die Wirkung war großartig. Die Blutsauger waren erledigt. Meine 20 Hühner aber, die in der folgenden Nacht im Stall geschlafen hatten — vom Nachmittag an hatte ich beide Türen wieder geöffnet — legten vom Mai oder Juni an bis Ende Januar des nächsten Jahres kein einziges Ei mehr. Während des Krieges! Das war schließlich wirklich beinahe zum Verzweifeln. Ich mußte aber froh sein, daß die Tiere nicht verendet waren. Vermutlich war ihr Legeapparat vergiftet oder gelähmt worden. Kurz und gut: Formalin wirkt! Der Fragesteller setze also seine leeren Käfige einmal Formalindämpfen aus. Zählebiger als Holzwurm und rote Milbe sind seine Vogelmilben sicher auch nicht.

Meine Käfige sind also bisher immer ungezieferrein gewesen. Ich beuge vor, was bekanntlich leichter ist als heilen. Und so will ich auch darüber einiges schreiben. Zunächst gilt für mich als Vogelpfleger der Satz: Selber ist der Mann! Ich füttere selbst, ich reinige selbst. Ja, ich möchte behaupten, daß der, dem diese Arbeiten nicht ein ähnliches Behagen bereiten, wie z. B. das Lesen von Vogelliteratur, gar kein richtiger Vogelliebhaber ist. Nur die selbstvorgenommene Verpflegung bietet Gewähr für ihre Güte. Wenn ich während meiner Ferienreisen meine Vögel anderen Leuten überlassen mußte, dann gabs gewiß fast jedesmal unangenehme Überraschungen. Also noch einmal: Selber ist der Mann! Ich höre den Einwurf: Bei meiner Vogelzahl und meinen vielen beruflichen und anderen Geschäften kann ich das gar nicht. Dann, mein lieber Leser, hast du eben zuviel Vögel. Auch ich kenne solchen Zustand. Nicht bloß ich selbst bürde mir viel Arbeit auf, ich habe mir außerdem von anderen und für andere viel zu viel aufbürden lassen. Dann kommen Zeiten, in denen Arbeit und Liebhaberei zur drückenden Last werden. Abbauen! muß es dann heißen und gehts mit der Arbeit nicht, so muß eben die Liebhaberei dran glauben. In solcher Zeit habe ich oft genug Vögel verschenkt. Mich befriedigt es eben nicht, ihre Pflege anderen zu überlassen.

Meine Baumvoliere mit geschütztem Nest für Prachtfinken (s. S. 300).

Und nun zu den vorbeugenden Maßnahmen. Sie sind sehr einfach. Reinlichkeit ist das halbe Leben! Die Schublade eines Käfigs mit nur einem Körnerfresser reinigt man wöchentlich mindestens einmal, zweimal ist besser. Wo mehr Vögel zusammen hausen, muß natürlich öfter gereinigt werden. Ich gebe stets frischen Sand. Verunreinigten Sand zu sieben und wieder zu verwenden, ist nicht ratsam. Man überlege, daß soundso viele Körnchen immer und immer wieder in den Käfig zurückkommen und mit ihnen schließlich auch das Ungeziefer. Wer sich Sand selbst verschaffen kann, tue es. Er weiß, was er hat. Ich verwende immer Bach- oder Flußsand. Meinen Erdsängern (Nachtigall, Drosseln, Rotkehlchen u. a.) gebe ich fast täglich frische Erde. Die Schublade wird also täglich, bestimmt aber alle zwei Tage, gereinigt. Daß das nicht jeder in dieser Weise ausführen kann, weiß ich. Mancher aber könnte es und tuts nicht. Zu meiner Vogelliebhaberei paßt eben ausgezeichnet eine andere, die für Obst- und Gartenbau und täglich gibt es da Arbeit mit Spaten und Hacke, wobei immer Leckerbissen für die Vögel ans Tageslicht kommen. Immer liegt, wie ich schon vor vielen Jahren geschrieben habe, bei solcher Arbeit neben mir eine Schublade, in die fast alles Zappelige, was gelb, grün, braun, grau, weiß aussieht, gelegt wird. Im Winter belege ich die Schubladen für solche Vögel mit Papier, das ich in der Regel einen Tag um den andern erneuere. Die Schublade des Lerchenkäfigs wird wöchentlich mindestens einmal mit frischem Rasenstück und etwas Flußsand gefüllt. Grasmückenarten erhalten jahraus, jahrein Papiereinlage. Sobald ein Vogel, ganz gleich welcher Art, mit der Mauser fertig ist, wird er umquartiert und sein Käfig einschließlich Sprunghölzern gründlich gereinigt. Bei dieser Arbeit hilft meine Frau. Von Zeit zu Zeit wird diese Reinigung wiederholt. Das ungefähr ist meine vorbeugende Arbeit, und dazu muß Zeit werden. Sie macht sich auch bezahlt. Dadurch wird nicht bloß die Entstehung oder Ansiedlung von Milben verhindert, sondern es dient auch zur Gesunderhaltung der Vögel und ich selbst habe auch etwas davon. Schon das Sammeln von

Leckerbissen für sie stimmt mich froh, und dann weide ich mich regelmäßig einige Minuten an dem schönen Bilde, das die angenehm überraschten Vögel bieten. Ein harmloser Egoismus! Wem solche oder ähnliche Verpflegung seiner Vögel nicht Bedürfnis, nicht angenehme Arbeit ist, den halte ich für keinen richtigen Vogelliebhaber.

Prachtfinkenzucht in der Lorivoliere.

Von Max Beyer, Bln.-Niederschönhausen.

(Nachdruck verboten.)

Wiederholt hatte ich versucht, meinen Gebirgsloris, die schon einige Jahre, Sommer und Winter, in einer Gartenvoliere hausten, Käfiggenossen zu geben. Immer aber scheiterte dies an der Bissigkeit der beiden Pinselzüngler, die keine Zwangsmieter duldeten. In bunter Reihenfolge hatte ich Rosella, Singsittiche u. a. eingesetzt, um sie schleunigst wieder herauszufangen, weil sie sonst von den Loris übel zugerichtet wurden. Selbst den flinken Wellensittich mußte ich wieder entfernen, da er unausgesetzt verfolgt und nicht am Futtertisch geduldet wurde. Natürlich kann man auch Loris mit anderen Vögeln zusammenhalten, es kommt eben ganz auf den verfügbaren Raum und auf die Vögel an. Auch die Zeit des Einsetzens spielt eine große Rolle. So sah ich im Zool. Garten in Kopenhagen ein Paar Gebirgsloris mit einem anderen Pärchen größerer Sittiche, ich glaube, es waren Bulla-Bulla, friedlich zusammen. In der Voliere waren auch Nistkasten vorhanden, die doch immer ein Streitobjekt sind. Im Hamburger Zoo waren die Loris sogar mit einer bunten Schar größerer Sittiche im Flugkäfig untergebracht. Allerdings war hier keine Nistgelegenheit gegeben. Ein einziger Kasten da hineingehängt, und der Teufel wäre los gewesen.

Nun versuchte ich es mit Prachtfinken, was auch, zum Teil wenigstens, gut gelang. Als Nest hing ich an die Rückwand der Voliere ein Harzer Bauer. Um es vor dem Zernagen durch die Papageien zu schützen, fertigte ich mir ein Lattengestell in Würfelform von etwa 40 cm Länge in allen Teilen, und bespannte das Gestell mit weitmaschigem Draht, den die Prachtfinken leicht durchschlüpfen konnten, der den Loris aber das Eindringen verhinderte. Eine Seite wurde nicht bespannt, und das Gestell dann mit der offenen Seite über das Nest gestülpt und auf zwei in der Rückwand der Voliere eingeschlagenen Nägeln aufgelegt, und zwar so, daß das Nest in der Mitte, wie in einem kleinen Käfig hing. Dieser Schutz hat sich gut bewährt, die Vögel können ungestört ihrem Brutgeschäft nachgehen. Zur Kontrolle ist das Gestell leicht abzuheben.

Die ersten Prachtfinken, die ich einsetzte, waren reinweiße japanische Möwchen, da diese gerade in meinem Besitz waren. Weiße Möwchen sind sonst für größere Flugräume nicht recht geeignet, sie erblinden leicht. Die Loris beachteten die beiden weißen Vögelchen, die unbeholfen in der Voliere herumflatterten, gar nicht. Bald bauten die Möwchen in dem Harzer Bauer ihr Nest und brüteten. Nach einigen Wochen flogen drei junge weiße Möwchen aus, in die weite, ach so böse Welt. Für zwei von ihnen war es der erste und letzte Flug. Als hätten die Loris nur darauf gewartet, stürzten beide wie die Raubvögel auf je ein Junges los, um es mit einem Biß über den Kopf zu töten. Das dritte konnte ich noch durch schnelles Herausfangen retten, es wanderte nun mit den Eltern in einen Käfig.

Was mag die Loris veranlaßt haben, die jungen Möwchen zu töten, während sie die alten Tiere, die auch keine Flugkünstler waren, unbehelligt ließen? Wer kann eine Vogelseele ergründen?

Tät-tät, rief es nach einiger Zeit in der Voliere. Ein Paar Zebrafinken hatte seinen Einzug gehalten. Wie es sich für ein richtiges Zebrafinkenpaar gehört, fingen sie gleich in dem geschützten Nest an zu bauen. Die beiden verstanden ihr Fach, das sah ich sofort. Aus Moos und Grasrispen wurde ein festes Nest angefertigt und mit dem bunten Kleingefieder der mausernden Loris weich gepolstert. Vor der Einflugröhre hingen die kleinen Blütenbüschel der Grasrispen wie Lambrequins.

Eines Tages, ich weilte am schönen Nordseestrande, erhielt ich eine Karte, die mir das Ausfliegen von vier jungen Zebrafinken meldete. Am nächsten Tage wieder eine Karte: nein, es wären fünf. Kann man es mir verdenken, daß ich auf die dritte Nachricht wartete, die das halbe Dutzend komplett machte? Aber es blieb bei den Fünfen. Welcher Züchter kennt nicht das reizende Bild, wenn die jungen Zebras, noch schwarzschnäblig, die Alten umbetteln. Mit neidischen Augen beobachteten die Loris, denen bisher Kindersegen versagt war, das glückliche Familienleben, und da — setzte einer mit gewaltigem Sprunge mitten in die kleine Gesellschaft hinein. Hui, spritzten die auseinander, um sich schnell an anderer Stelle zu sammeln, und Tollpatschlori schaute ihnen verblüfft nach. Noch einige Male versuchte er den Sprung, dann ließ er, das Vergebliche seines Bemühens einsehend, davon ab. Die kleine Bande war doch flinker. Als die alten Zebras wieder eine Brut begannen, fing ich die Jungen, es waren fünf Weibchen, heraus. Die zweite Brut brachte vier Junge, alles Männchen. Bei den ersten reichte ich frische Ameisenpuppen, die zweiten wurden mit halbreifen, kleinen Grasrispen gut aufgezogen. So endete die Prachtfinkenzucht in der Lorivoliere doch noch mit einem guten Erfolge.

Über das Leben und Treiben meiner Gebirgslori selbst ein andermal.

Neueinführungen und Seltenheiten.

Von Karl Neunzig.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Eine der 16 Vertreterinnen der Gattung Baumwachtel — Colinus ist die zurzeit im Handel befindliche

mexikanische Baumwachtel — Colinus pectoralis *J. Gd.*,

eine nahe Verwandte der bekannteren virginischen Wachtel, von der sie in der wachtelartigen Färbung und Zeichnung der Oberseite nur wenig abweicht. Bei den meisten vollentwickelten Männchen ist der Oberkopf schwarz. Die schwarzen Zeichnungen im

weißen Gefieder der Kopfseiten und des Halses weichen kaum von denen der virginischen Wachtel ab. Die Unterseite ist wesentlich anders gefärbt. Die Oberbrust ist tief schwarz; die meisten dieser schwarzen Federn haben ein schmales weißes Querband auf der unteren Federhälfte. Die übrige Unterseite ist hellrötlich kastanienbraun: die Körperlänge ist etwa 200 mm. Das Weibchen unterscheidet sich von dem der virginischen Wachtel durch etwas schärfere dunklere und mehr braune Zeichnung. Ihre Verbreitung erstreckt sich über das östliche Mexiko. In ihrem Benehmen ähneln sie anderen Wachteln. Es sind harmlose, wenig argwöhnische Vögel, welche ihre Anwesenheit selbst beim Futtersuchen durch das fortwährende Hörenlassen ihrer Rufe ihren schlimmsten Feinden, neben den Menschen, den Füchsen, Raubvögeln und Klapperschlangen, verraten und ihnen zur Beute fallen. Heftige Regengüsse vernichten so manche ihrer Bruten. Das Gelege besteht durchschnittlich aus 15 Eiern. Es werden in der Regel zwei, zuweilen auch drei Bruten gemacht. Sie nähren sich von Bucheckern, Getreide- und anderen Samen, Blattknospen und aromatischen Kräutern. Gelegentlich nehmen sie auch Beeren und allerlei Insekten, wie Käfer, Grashüpfer und Ameisen.

Mexikanische Baumwachtel (s. S. 300).

Diese schöne Wachtelart, welche für uns eine Neueinführung ist, war vor vielen Jahren schon einmal in Deutschland, und zwar in dem Tierpark der Pfaueninsel bei Potsdam, aus dessen Beständen, sie im Jahre 1842 nach Berlin überführt wurden und die Grundlage für den Berliner Zoolog. Garten geschaffen wurde. Ein in der Vogelsammlung des Zoolog. Museums in Berlin befindliches ausgestopftes Stück dieser Art trägt auf der Etikette als Herkunftsort die Angabe „Pfaueninsel".

Noch einige Worte über das Freileben der

Massenawachtel — Cyrtonix montezumae *(Vig.)*,

jener Bewohnerin rauher Gebirgslagen, welche in Höhen von 4000—9000 Fuß beobachtet wurde. Hier oben zwischen Felsen und wüstem Gelände ist sie nur Sommervogel, der, wenn der Winter naht, ungefähr im Oktober, tiefer liegendes Gelände aufsucht. Andere leben an den Abhängen der Berge zwischen Felsschluchten und Gießbächen, deren Wasser versiegt sind, wo immergrüne Eichen, Fichten und Espen wachsen und noch mancherlei anderes Gebüsch. In anderen Gegenden ihres weiten Verbreitungsgebietes, Mexiko, Arizona und Südtexas, begrenzt ihre vertikale Verbreitung die Fichtenzone. Ihre Anpassungsfähigkeit an die Art des Geländes und die dadurch bedingte Veränderung ihres Daseins zeigt sie uns auch als Bewohnerin kultivierten Landes. Man fand sie auf Getreidefeldern nahe bei menschlichen Niederlassungen eifrig scharrend nach ausgefallenen Getreidekörnern und auf den lose aufgeschichteten Steinmauern, welche nach Landessitte die Felder umgeben, ruhend. Im allgemeinen aber hat die Massenawachtel eine Vorliebe für trockene, wüste, unfruchtbare Plätze, die von Menschen kaum betreten werden. Den Menschen fürchten sie nicht, weil sie ihn nicht kennen. Sie ist deshalb wenig argwöhnisch und wird für dumm gehalten. Man nennt sie deshalb „Fool Quail", die „närrische Wachtel". Da sie wenig argwöhnisch ist, fällt sie auch öfter Raubtieren anheim als andere Wachteln. Sie versteht es nicht recht, sich geschickt zu verbergen. Sie „drückt" sich, wenn eine Gefahr naht, wohl wie andere Wachteln, aber sie liegt so fest, daß man nahe an sie herankommen kann, ohne daß sie auffliegt. Einige Beobachter berichten, daß man sie mit den Händen greifen könne. Diese Harmlosigkeit scheint aber bei denen, welche sich in bewohnten Gebieten aufhalten, doch einer größeren Vorsicht gewichen zu sein. So wurden Junge führende beobachtet, wie sie auf einem Wege unter den überhängenden Zweigen der Hecken, welche den Weg begrenzten, gut geschützt einhertrippelten, bis sie staubbedeckt offenes ödes Gelände erreicht hatten, und als sich dann der Beobachter ihnen näherte, flogen sie in schnellem Fluge nach den verschiedensten Richtungen auseinander, wie das ja auch andere Hühnerarten tun.

Ihr Flug geht immer nur über kurze Strecken, ist sehr schnell, und während des Fluges hört man tiefe, schnell wiederholte, gluckende Laute wie „schuck—schuck—schuck". Der Ruf wird mit „dsiuch—schiur" wiedergegeben.

Erschreckt lassen sie Laute hören, die eine merkwürdige Kombination von Pfeifen und gluckenden Tönen zu sein scheinen und in Silben kaum wiederzugeben sind.

Obgleich die Massenawachtel ein sehr großes Gebiet bewohnt, ist ihre Verbreitung anscheinend doch auf bestimmte Örtlichkeiten beschränkt, die ihnen eine ganz bestimmte Nahrung bieten, und zwar die Wurzel eines kurzen, harten Grases, die aus etwa erbsengroßen, weißglänzenden Knollen besteht. Diese Wurzeln gräbt die Wachtel mit ihren kräftigen Scharrfüßen aus dem Boden. Sie macht dabei Löcher von etwa zwei Zoll Tiefe. Im Magen erlegter wurden Samen vom Feigenkaktus und auch Stücke dieser Kaktusart gefunden, daneben einige wenige Spuren von Insekten und kleine Steinchen. Im Herbst und Winter bilden Bucheckern, der Same des Bergahorns, der Zeder und eine Sandbeerenart (Arbutus) ihre Nahrung.

Nest und Eier der Massenawachtel waren lange Zeit unbekannt. Sie wurden trotz eifrigen Suchens nicht gefunden. Es wird gut versteckt gebaut. Man fand die flache Nestmulde, im Durchmesser etwa 12,5 cm und 5 cm tief, im Schutz eines Baumes, eines Strauches oder unter einem überhängenden niederen Ast im dichten Grase und durch überhängende Grasblätter gegen Sicht geschützt. Die Nestmulde ist mit feinem Gras ausgelegt, und häufig führt ein röhrenartiger Gang durch das dichte um das Nest stehende Gras. Das Gelege besteht aus 8—12 weißen Eiern. Die Schale ist sehr feinkörnig (30,5—32 × 23—25 mm). Das Nest wurde im Juli gefunden. Während der Brutzeit scheinen sie paarweise zu leben, später in Völkern von 8 bis 12 Vögeln.

Bisher haben sich die eingeführten Massenawachteln als unter allen Verhältnissen friedliche und verträgliche Vögel gezeigt, selbst mit anderen Wachtelarten kam es nicht zu Kämpfen. Sie werden sehr schnell zahm, scharren allerdings sehr kräftig im Bodenbelag und werfen dabei Futter- und Wassergefäße um. Diesem Übelstand kann durch gute Befestigung der Gefäße oder durch Verwendung schwerer Tongefäße leicht vorgebeugt werden. Es dürfte auch nicht schwer sein, diese schöne Wachtel in der Gefangenschaft zu züchten, besonders wenn man sie in einem Außenflugraum hält und ihnen Nistplätze bietet, die denen entsprechen, welche der freilebende Vogel liebt. (Fortsetzung folgt.)

Exoten.

Von S. Lichtenstaedt.

(Nachdruck verboten.)

3. Aus meiner Vogelstube.

Sperlingspapageien.

In meiner etwa 120 cm langen und 140 cm hohen Voliere tummeln sich fünf Pärchen Sperlingspapageien und entzücken durch ihre Zierlichkeit und Anmut jeden Besucher.

Eigenartigerweise erfreuen sich speziell die gemeinen Sperlingspapageien bei den meisten Liebhabern nicht der Beliebtheit, wie sie es tatsächlich verdienen.

Diese Mißachtung hat aber zum Teil seine Gründe. Vor allen Dingen sind die frisch eingeführten Vögel äußerst scheu und wild, und nehmen durch ihr unsinniges Toben dem Liebhaber, wenigstens im Anfange, alle Freude an ihnen.

Ferner sind sie, frisch eingeführt, ziemlich hinfällig, und gehen in den ersten Wochen ihres Hierseins ohne jede erkennbare Ursache ein.

Beide Gründe sind aber nach meinen Erfahrungen nicht stichhaltig, um ihre Anschaffung nicht zu empfehlen.

Die kleinen Papageien kommen leider in den meisten Fällen bei uns mit stark beschnittenen Flügeln an, ein Unfug, dem wir leider machtlos gegenüber-

Gebirgslori (s. S. 300).

stehen. Sie sind deshalb in den ersten Monaten ziemlich unbeholfen und hilflos, besonders wenn man ihnen keine geeigneten Aufenthaltsräume gibt. Setzt man die Tierchen gleich in große Volieren oder gar in die Vogelstube, so kann man sicher sein, sie bald zu verlieren.

Sie sind überaus ängstlich, kommen nur, wenn sie sich völlig sicher fühlen, zum Futter, flattern bei der geringsten Störung wie unsinnig umher und verletzen sich, da sie an den beschnittenen Flügeln keinen genügenden Halt haben, oft schwer.

Außerdem aber bringen sehr viele Tiere spitze Brüste mit herüber. Ich habe wohl zwei Dutzend frisch importierter Sperlingspapageien untersucht und über die Hälfte spitzbrüstig gefunden.

Nur selten sind solche Tiere haltbar. Wir haben hier die bei vielen Exoten in Erscheinung tretende Tatsache, daß sie unterwegs stark abmagern, und infolgedessen der Körper des Tieres schwächlich und selbst bei bester Verpflegung hier nicht mehr lebensfähig bleibt. Es brauchen nicht einmal Seuchen oder unschuldigere Krankheiten an der Abmagerung schuld zu sein, die weite Reise, die veränderte und wohl auch ungenügende Verpflegung unterwegs lassen das Tier abmagern. Ist die Abmagerung soweit vorgeschritten, daß die Organe des Tieres zu sehr geschwächt sind, so tritt mehr oder weniger schnell der Verfall ein, trotz bester Pflege.

Der Liebhaber muß daraus die Lehre ziehen, keine spitzbrüstigen Vögel zu kaufen, selbst wenn diese noch so gesund und munter erscheinen.

Selbstverständlich kann auch solch ein Tier einmal leben bleiben, je schneller aber die Pflege wechselt, d. h. je mehr Wohlleben solch einem Vogel mit einem Male geboten wird, um so schneller geht er ein. Der geschwächte Organismus kann die gute Kost nicht mehr vertragen.

Wer vollbrüstige Sperlingspapageien kaufen kann, kann den Kauf getrost wagen, selbst wenn den Tierchen die Flügel beschnitten sind. Zur Eingewöhnung setze man sie in einen kleinen etwa 50—60 cm langen Käfig, stecke diesen dicht mit Ruten zum Klettern aus, und hänge die Tiere hoch im Zimmer auf. Bei der Fütterung hantiere man ruhig und langsam, um die Tiere nicht zu erschrecken, und man wird schon nach kurzer Zeit die Erfahrung machen, daß die Tiere das Umhertoben völlig lassen.

Meine Sperlingspapageien fressen ausschließlich Spitz und Mais. Letzterer wird nachts in Venecinwasser erweicht. Sonnenblumen erhalten sie ab und zu eine Wenigkeit, und auch diese werden gierig gefressen. Frische dünne Weidenruten erhalten sie täglich, auch süßen Apfel, doch machen sie sich aus Obst sehr wenig. Hafer nehmen sie auch, doch nur in kleinen Portionen. Hanf dürfen Sperlingspapageien nie erhalten, auch Sonnenblumen nur sehr wenig, da ihnen alle ölhaltigen Sämereien nicht zuträglich sind.

In den Nistkasten wird fleißig aus- und eingeschlüpft, doch nur wenn sie sich ganz unbeobachtet fühlen.

Nachts suchen sie nicht regelmäßig die Kästen auf, zwei bis drei Papageien fand ich stets draußen, manchmal auch die ganze Gesellschaft.

Drei meiner Pärchen sind gemeine Sperlingspapageien, zwei mexikanische, welche in letzter Zeit in ziemlicher Anzahl, so von Odenwald, Fulda, eingeführt worden sind.

Die Mexikaner sind eine Wenigkeit größer als die gemeinen Sperlingspapageien, auch etwas dickköpfiger. Der Bürzel des Männchens ist statt ultramarinblau leuchtend hellblau. Die Mexikaner sind lange nicht so scheu als ihre gemeinen Vettern, und sollen auch leichter zur Brut schreiten. Herr Balser, Fulda, teilt mir mit, daß seine Mexikaner bereits auf Eiern sitzen.

Das Familienleben der Sperlingspapageien ist ein entzückend inniges. Die Mexikaner halten sich von ihren Genossen streng getrennt, wie überhaupt jedes Pärchen zusammenhält, und mit anderen nichts zu tun haben will. Die Mexikaner sind erst in neuerer Zeit eingeführt worden, so sind sie im neuen „Neunzig" noch nicht erwähnt.

Hoffentlich kann ich an dieser Stelle bald von Zuchterfolgen mit meinen Sperlingspapageien berichten. Leider fehlt der schönste, der grünbürzelige Sperlingspapagei augenblicklich auf dem Vogelmarkt.

(Schluß folgt.)

Strauchammerfink.

Kleine Mitteilungen.

Auslandsbericht. Im Januarheft der französischen Zeitschrift „L'Oiseau" von der Société d'Acclimatation de France herausgegeben, beschreibt H. S. Stokes die zum ersten Mal in Europa gelungene Zucht der Ptilopus coronulatus, der Gemahlten Fruchttaube (Neunzig, S. 801). Das Zuchtpaar wurde mit verschiedenen Weichfressern, Schamas, Mainastaren, in einer geheizten Voliere gehalten. Es bezog einen mit Stroh gefüllten Nistkasten dicht unter dem Dachgebälk der Voliere. Männchen und Weibchen wechselten in der Brut ab. Die Brutdauer betrug 18 Tage. Elf Tage später saß das Junge auf dem Rand des Nistkastens. Der Vorsicht halber war ein kleines Netz unterhalb des Kastens ausgespannt, um ein Verletzen des Tierchens beim evtl. Herabfallen zu verhüten. Aber schon am nächsten Tage flog das Junge aus. Die Alten waren äußerst besorgt um ihren Sprößling. Bereits nach 14 Tagen trug dieser das Federkleid der Alten. Es ist empfehlenswert, den Täubchen das fertige Strohnest zu bieten, da sie kein Nistmaterial eintragen. Ein anderes Pärchen im Londoner Zoo legte

das Ei einfach ins Gras, wo es bald verschwand. Gefüttert wurden die Tiere mit Äpfeln, Bananen, Aprikosen und getrockneten Trauben. Während der Aufzucht erhielten sie Biskuit in Nestles Milch aufgeweicht, was eifrig verfüttert wurde.

In derselben Zeitschrift bespricht H. Darviot seine Erfahrungen bezüglich des Bodenbelages für Weichfutterfresser. Er hat die verschiedensten Mittel versucht, mit Sand, mit Sägemehl, mit Lohe, Torf und einfachem Löschpapier. Alle diese Mittel haben ihre Nachteile. Der Sand bleibt feucht, riecht nach einem Tag; Sägemehl ist geeigneter, aber alles darin verstreute Futter wird vom Vogel nicht mehr angenommen; die Lohe hat einen ihr eigentümlichen Geruch, der unangenehm wirkt. Das Löschblatt hat den Nachteil, daß nicht alle Feuchtigkeit verdunstet und daher die Unterseite am Käfigboden festklebt. Um diese Unannehmlichkeiten zu vermeiden, belegt D. den Käfigboden mit einem dünnen engmaschigen Rost entsprechend der Käfiggröße und auf diesen kommt ein Löschblatt zu liegen, das täglich gewechselt wird. D. hält dies für das einfachste und sauberste Verfahren.

Im Juliheft der Avicultural Society in London, in The Avicultural Magazine bespricht A. G. Butler von den fremdländischen Finken: Phrygilus gayii, P. fruticeti (s. Abb. S. 303) und alaudinus, weiterhin Diuca diuca und die verschiedenen Cyanospiza. F. D. Welch schildert in fesselnder Weise das Leben und Treiben der Kahnschnäbel in der Voliere des Zoo (Canchroma zeledoni). Sehr interessant ist der erstmalige Zuchtbericht von Alfred Ezra über den Spreo superbus (s. Abb. S. 75). Der Autor erwarb vier dieser Vögel von Chapman in London. Das Geschlecht derselben war nicht mit Sicherheit festzustellen. Alle vier Vögel beteiligten sich in großer geschützter Voliere am Nestbau. Jedoch wurde schon nach einigen Tagen einer der Beteiligten von den übrigen auf das Heftigste befehdet, so daß er herausgefangen werden mußte. Unter den drei anderen herrschte der schönste Friede und sie betrieben eifrig den Nestbau weiter. Nach kurzer Zeit waren Eier vorhanden, die alle ausgebrütet wurden. Ein Junges starb im Nest, die beiden andern entwickelten sich prächtig und verließen nach 24tägiger Brutdauer das Nest. Welches von den drei Alten das Elternpaar war, konnte Ezra nicht feststellen. Er glaubt, wie schon erwähnt, der Erste zu sein, der diese wundervollen Vögel gezüchtet hat.

Dr. Luig, Brüssel.

Sprechsaal.

(Steht den Abonnenten kostenlos zur Verfügung.)

Antworten.

Auf Frage 14: Die chemische Fabrik von Merck, Darmstadt, stellt seit neuerer Zeit ein für Warmblütler ungiftiges Kupferpräparat unter dem Namen „Cuprex" her, mit dem ich bei der Bekämpfung der Vogelmilbe vorzügliche Resultate erzielt habe. Ich bestrich innerhalb von acht Tagen die Käfige der befallenen Tiere zweimal mit „Cuprex". Der Erfolg war durchschlagend. Die Tiere selbst (Heidelerche und aufgezogener Dompfaff) zu bepinseln, getraute ich mich nicht; denn besonders die Heidelerche, ein prächtiger Sänger von meinem alten, zuverlässigen Lieferanten, dem Vogelhändler Hiltmann in Berlin, ist mir sehr ans Herz gewachsen. „Cuprex" hat einen großen Vorzug, nämlich den, daß es die bestrichenen Teile tagelang mit einem feinen, feuchten Überzug bedeckt und wirksam bleibt. Leider hat es aber einen recht unangenehmen Geruch, der aber bald verschwindet. Genannte Vögel wurden von dem Geruch, nachdem die Käfige einige Stunden im Freien gestanden hatten, nicht sichtlich belästigt. Der Kampf gegen die Vogelmilbe ist nicht leicht; aber es ist die unabweisbare Pflicht eines jeden Vogelliebhabers, dafür zu sorgen, daß dem Geschöpf, das er der Freiheit entzieht, die Gefangenschaft nicht zur Qual wird. A. Knoll, Studienrat.

Auf Frage 14: Ein sehr gutes und sicher wirkendes Mittel zur Vertilgung von Milben ist meinen Erfahrungen nach Salmiakgeist. Bemerkt sei gleich, daß diese Flüssigkeit natürlich nur zur Säuberung der Käfige benutzt werden kann, keinesfalls zur Milbenvertilgung an den Vögeln. Das Mittel hat dabei den Vorteil, daß es überall erhältlich ist und keine großen Ausgaben erfordert.

Man verfährt folgendermaßen: Die Vögel werden aus dem Käfig entfernt und der Käfig zur Reinigung in einen anderen Raum gebracht, da Salmiakgeist leicht verdunstet und einen außerordentlich scharfen Geruch hat, der den Tierchen schädlich werden müßte. An allen Käfigstellen, wo sich Milben zeigen, wird nun mit einem Läppchen oder Pinsel Salmiakgeist aufgetragen, und zwar derart, daß die betreffenden Stellen ordentlich naß werden. Nach wenigen Sekunden sind die Milben vertilgt. Große Milbenansammlungen finden sich dort, wo der Käfigdeckel aufliegt. Hier säubere man besonders gründlich. Die entsprechenden Flächen reinigt man nach dem ersten Auftragen des Salmiakwassers von den getöteten Milbenansammlungen, trägt dann noch einmal das Mittel auf und schraubt dann wieder den Käfigdeckel fest.

Die Prozedur ist stets von Erfolg. Man sehe aber trotzdem nach mehreren Tagen nochmals nach, und falls sich dann noch kleine Milbenansammlungen zeigen sollten, verfährt man wieder in gleicher Weise. Nach diesem erneuten Bestreichen dürften Milben endgültig verschwunden sein.

Die Sitzstangen oder nur deren Enden taucht man kurzerhand in das Salmiakwasser.

Die Vögel selbst befreie ich von Milben dadurch, daß ich sie in Seifenwasser bade.

Nachdem dann der Käfigsand erneuert ist, kommen die Tierchen trocken in den gereinigten Käfig zurück.

Ernst Merz, Chemnitz, Ornis 309.

Vom Vogelmarkt.

Von seltener auf den Vogelmarkt kommenden Vögeln werden angeboten:

Zoologische Handlung G. Behnke, Berlin O 34, Petersburger Str. 29: Graupapageien, Gelbnackenamazonen, Bahia-Blaustirnamazonen.

Tierhandlung Max Kleinert, Berlin NO 18, Strausberger Str. 13. (Fernruf Alexander 3313): Graupapageien, Rotstirn-, Weißkopfamazonen, Veilchenpapageien, tarant. Unzertrennliche, blaubürzlige Sperlingspapageien, Kaktus-, Blaustirnsittiche, Schamadrossel, amerik. Spottdrossel, Prachtglanzstare, Büffelweber, Gilb-, Tahaweber, Papst-, Indigofinken, Spitzschwanzamandinen, Maskenfinken.

A. Krabbe, Anklam, Demminer Str. 10: Zuchtp. winterharte gelbe Wellensittiche, 1,0 blaufedr. Wellensittich, 0,2 dito, 1,0 Rußweber, aethiop. Blutschnabelweber, 1,0 Oryx-, 2,0 Heuglins Weber, 0,1 Napoleonsweber.

Ernst Mehl, Spenglermeister, Garmisch (Bayern): 4 Paar Turteltauben.

Mertes, Mainz, Wallaustr. 62, A. Z.-Mtgl. 339: Gelbe Wellensittiche.

Eug. Müller, Küllstedt (Eichsfeld): 1,1 kl. Flammenweber in Farbe, 1,2 Blutschnabelweber, 1,0 Berghänfling, 1,0 Büffelweber.

Apotheker Pistor, Oberaula, Bez. Cassel, A. Z.-Mtgl.; 4,2 Stieglitz × Kanarien.

Karl Puhl, M.-Gladbach, Eickenerstr. 185: 0,1 Orangeweber, 1,1 Blutschnabelweber.

Johann Rohracher, Lienz, Tirol (Deutschösterreich): Reinweiße Dohlen, Rauhfußkauz, Blaudrosseln.

Schlöß. Allersberg b. Nürnberg: 5,0 Mandarinenten.

Trillhof, Jena, Markt 8: 2 Schwarzplatten, prima Überschl., 1 Fitislaubvogel, 1,1 Zaunkönige.

Julius Wohlfarth, Eberstadt bei Winsberg, Wttbg.: 1,0 Girlitzkanarie.



Herrn A. C., Triest. Wenden Sie sich an die „Vogelwarte Rossitten" (Kurische Nehrung) oder an die „Vogelwarte Helgoland".

Herrn A. M., Mainz: Beiträge dankend erhalten.

Herrn G. G., M.-Gladbach; Frau R., Osnabrück, ist brieflich Bescheid zugegangen.

Herrn A. P., Düsseldorf-Gerresheim. Der Oryxweber ist einer Lungenentzündung erlegen.

(Fortsetzung auf der 3. Umschlagseite.

Bevorstehende Vogelschauen.

Berlin. Vogelschau des Landesverbandes Preußen von Mittwoch, den 19. Nov. bis Sonntag, den 23. Nov. 1924 in den Sophiensälen, Berlin C, Sophienstr. 17/18.

Landesverband Preußen: Vogelschau Berlin. Zu der vom 19.—23. November d. J. in Berlin stattfindenden Vogelschau machen wir alle evtl. auswärtigen Aussteller aufmerksam, daß eine Platzgebühr nicht erhoben wird. Wohl aber wird zur Bedingung gemacht, daß evtl. Aussteller, welche bisher dem Landesverbande nicht angeschlossen sind, sich bei Meldung als Aussteller auch gleichzeitig als Mitglied des Landesverbandes anmelden müssen, mit gleichzeitiger Zahlung des Jahresbeitrages von 3 M.

Ausstellungsobjekte sind Vögel, Käfige, Vogelfutter, Gerätschaften und Literatur, also alles, was mit unserer Vogelliebhaberei und -pflege Beziehung hat.

Bezüglich unseres Ausstellungskataloges mit seinem anhängenden Inseratenteil geben wir bekannt, daß die ganze Inseratenseite 20 M., die halbe 10 M., die viertel Seite 5 M. kostet. Meldeschluß für Aussteller und Katalog-inserenten ist der 5. November. Anmeldungen sind zu richten an den Vorsitzenden des Landesverbandes Herrn Franz Nynke, Berlin O 34, Königsberger Str. 17.

J. A.: Paul Rükert.

Karlsruhe, Verein von Vogelfreunden. Gegr. 1888. Vogelschau u. Kanarienprämiierung am 6. u. 7. Dez. 1924.

Dresden, Verein für Vogelschutz und -pflege. Ausstellung 20.—22. Dezember 1924.

Aus den Verbänden.

Verband deutscher Farben-, Gestalt-, Bastardkanarien- und Exotenzüchter und des Bayerischen Vogelliebhabervereins (e. V.) Sitz München, Ortsgruppe Augsburg. Jeden Samstag gemütliche Zusammenkunft beim Vogelwirt Joseph Leininger, Gasthof, Frohnhof—Peutingerstr. Jeden 1. Samstag im Monat Monatsversammlung ebendort. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. Als amtliches Vereinsorgan ist die „Gef. Welt" anerkannt worden.
J. A.: H. Schwaiger, 1. Vors., Augsburg, Schöpplerstr. 9/II.

Aus den Vereinen.



Das Programm zur Jahresversammlung in Berlin am Bußtag, dem 19. November lautet: Vormittags 9 Uhr gemeinsamer Besuch der Vogelschau des Landesverbandes Preußen in den Sophiensälen, Sophienstr. 17/18. (Stadtbahnhof Börse): Treffpunkt im Ausstellungslokal. Nachmittags 2 Uhr gemeinsame Besichtigung des Zoolog. Gartens unter fachkundiger Führung des Herrn Dr. Heck. Versammlung bis spätestens 2½ Uhr im Kleinvogelhaus. Daran anschließend evtl. ein Lichtbildervortrag im Aquarium, worüber eine gedruckte Einladung genauere Auskunft gibt. Abends 7⅛ Uhr Sitzung im Patzenhofer, Friedrichstr. 71, reserviertes Zimmer. (Untergrundbahnstation Friedrichstraße.) — Durch Mitglieder eingeführte Gäste sind willkommen.

Die bisher eingegangenen Bestellungen auf Drucksachen, wie Briefbogen, Umschläge, Karten, genügen noch nicht zum billigen Bezug. Ich bitte demzufolge um weitere Anforderungen. A. Krabbe.

„Aegintha", Verein der Vogelfreunde zu Berlin. Unsere Sitzungen finden an jedem 1. und 3. Donnerstag im Monat, abends 8 Uhr, im Vortragssaal des Aquariums statt. Fast in jeder Sitzung belehrende Vorträge und Besprechungen unter gütiger Mitwirkung unseres verehrten Ehrenmitgliedes Herrn Dr. Heinroth. Gäste gern willkommen.
J. A.: O. Vorbrodt, 1. Schriftf., O 112, Scharnweberstr. 18.

Vereinigung der Liebhaber einheimischer Vögel zu Berlin. Sitzung jeden 2. Donnerstag nach dem 1. und 15. des Monats im Vereinslokal zum „Alexandriner", Alexandrinenstraße 37a. Gäste stets willkommen.
J. A.: P. Böhme, Schriftf., O 17, Rüdersdorfer Str. 69.

Alte Vereinigung der Vogelliebhaber zu Dresden. Versammlung jeden Freitag, abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Blasewitzer Hof". Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. — Am 19. Nov. 1924 (Bußtag), abends 8 Uhr, findet im „Herzog Albrecht" (Albrechtstr.) ein öffentlicher Vortrag statt. Herr Dr. C. Floericke, wissenschaftlicher Leiter der süddeutschen Vogelwarte (Stuttgart) spricht über „Wanderjahre eines Naturforschers". J. A.: Matth. Meys, Schriftf.

Verein Vogelschutz u. -pflege zu Dresden. Versammlung jeden Donnerstag, abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Schillers Restaurant", Ecke Stifts- und Ehrlichstr. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. Bernhard Kühn, Vors.

Verein für Vogelschutz und -pflege zu Dresden. Gegr. 1906. (Vormals Vereinigung der Vogelliebhaber zu Dresden.) Vom 20.—22. Dezember d. J. veranstaltet genannter Verein in dem Saale des „Italienischen Dörfchens", Dresden, Schloßplatz, die zweite Vogelschau. Dieselbe wird das Gebotene der ersten in den „Annensälen" 1923, welche dem Verein, vor allem in finanzieller Hinsicht, guten Erfolg brachte, um vieles übersteigen. Alle Vogelliebhaber sind herzlich willkommen. J. A.: Bernhard Kühn, Vors.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei zu Hamburg. Sitzung jeden 1. u. 3. Dienstag im Monat in Hüttmanns Hotel, Poolstr. 22, abends 8¼ Uhr. Nächste Sitzung Dienstag, den 18. November 1924. Gäste sowie auch Exotenliebhaber stets willkommen. J. A.: Arnold Weber, 1. Vors.

Verein von Vogelfreunden Karlsruhe. Gegr. 1888. Monatsversammlung jeden 1. Mittwoch im Monat. Lokal „Goldener Adler". Die diesjährige Vogelausstellung, verbunden mit Kanarienprämiierung, findet am 6. u. 7. Dez. statt. Außer Medaillen werden wertvolle Ehrenpreise vergeben. Zur Ausstellung werden nur Mitglieder unseres Vereins zugelassen. Bang, 1. Vorstand. Boppel, 1. Schriftf.

Verein der Vogelliebhaber Königsberg (Pr.). Sitzung jeden Freitag nach dem 1. u. 15. d. M., abends 8 Uhr im Vereinslokal „Kaiser-Kaffee", Kaiserstr., Ecke Schnürlingsstr. Gäste sind willkommen. J. A.: Ernst Reinholdt, 1. Vors.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig. Vereinssitzungen jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat im Vereinslokal „Bauers Brauereirestaurant", Täubchenweg. Nächste Sitzung Donnerstag, den 6. November. Gäste stets willkommen. J. A.: Johann Birk, 1. Vors.

Verein der Vogelfreunde Leipzig-Plagwitz. Vereinslokal: „Gosenschlößchen", Leipzig-Plagwitz. Sitzungen an jedem 1. und 3. Montag des Monats, abends 8 Uhr. Vogelfreunde sind stets willkommen.
K. Scholtissek, 1. Vors., L.-Plagwitz, Lauchstädter Str. 30.

Verein der Vogelliebhaber zu Mannheim. Versammlung aller 14 Tage Samstag abend 8 Uhr im Vereinslokal „Restauration z. gold. Falken", S. 1. 17. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. J. Daubmann, 2. Schriftf.

Bayrischer Vogelliebhaberverein, Sitz München (E. V.). Jeden Samstag gesellige Zusammenkunft im Pschorrbräuhaus, Bayerstr. Jeden letzten Samstag im Monat Monatsversammlung im Vereinslokal ebendort. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. Rud. Engel, 1. Schriftführer.

„Ornis", Freie Bezugs-Vereinigung der Waldvogelliebhaber Deutschlands. Gegründet 1912. Auf vielseitigen Wunsch der alten Mitglieder wollen sich die Waldvogelliebhaber wieder in der „Ornis" zusammenschließen. Als amtliches Organ ist die „Gef. Welt" ausersehen worden, und werden die Artikel, die früher in den „Ornis-Blättern" erschienen, in obiger Zeitschrift gebracht werden. Aus diesem Grunde bittet die Geschäftsführung um eifrige Mitarbeit, damit unserer Waldvogelpflege wieder der Platz eingeräumt wird, der ihr gebührt. Anmeldungen sind unter Beifügung von 2 M. an den Geschäftsführer zu richten; Mitglieder erhalten auf Mischfutterbestellungen 5% Rabatt. Mit treudeutschem Gruß Martin Sperling, Halle/S., Südstr. 49.

Zoolog. Verein zu Zwickau i. S. Versammlung jeden Freitag nach dem 1. und 15. jeden Monats, abends 8 Uhr, im Restaurant „Zur Bleibe", Katharinenkirchhof. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen.
J. A.: Paul Schmidt, 1. Vors., Zwickau i. S., Bosenstr. 44.

Anzeigenteil

Die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 20 G.-Pf. berechnet. Aufnahme erfolgt gegen Voreinsendung des Betrages in Reichsgel . Brief od. auf unseren Zahlstellen: Postscheckkonto: Magdeburg 3148, Wien 156 687, Bern III 4326, Prag: Creditanstalt d. Deutschen unter Angabe des Zwe

Käfige u. Gerätschaften

Vogel-Mistelleim
zum Fangen schädlicher Vögel,
Ia klebend bei jeder Witterung, garantiert gebrauchsfähig, Dose 1,50 ℳ fr. von
A. Freitag Nchf., Frankenberg i. S. 6.
Wiederverkäufer hohen Rabatt. [885

Echten laubgrünen [886
Mistelleim
tadellose Klebkraft, p. Kilo 6 ℳ, Proben 2 ℳ gegen Voreins. spesenfrei empfiehlt
Anton Rösler, Warnsdorf i. Böh.

Vogel-Fangkäfige 2.50 und 4.50 ℳ, Schlagnetze f. kl. schädl. Vögel 1.00 ℳ, f. größ. 2.10 u. 2.40 ℳ. Katalog gratis.
J. Tannen, Gronau 58 (Westf.). [887

Futtermittel

Ornis-Haus Halle-Saale
Gegründet 1912
Spezialität:
Individuelle Weichfresserpflege nach Angaben des Herrn Apotheker Adalbert Jena-Biberach-Riß. (Alleiniges Herstellungsrecht.)
Reform-Normal I, Volierenm.,
Reform-Normal II, f. Rotkehlchen, Schwarzplatten usw.,
Reform-Normal III, f. Nachtigall., Sprosser usw.,
Reform-Normal IV, f. Gelbspött., Goldhähnchen usw.,
Reform-Normal V, f. Schama usw.,
Körnerfutter Ia für jede Vogelart. [888
Inhaber langjähriger Fachmann, siehe „Ornis-Buch" (90 S.) Mk. 1
Preisliste auf Wunsch!

Mehlwürmer Pfd. 7 ℳ, 2/7 = 2 ℳ franco. Voreins.
889] **Jeltner, Breslau**, Weinstr. 12.

[890 **Mehlwürmer**, reine Ware, gegen Eins. von 1.75 ℳ 1/4 Pfd. franko.
Th. Witte, Niederndodeleben b. Magd.

Mehlwürmer
geg. Einsend. v. 2.—Rentenmark 1/4 Pfd. franko versend. **D. Waschinski & Co.**, Biesenthal I (Mark). [891

Ital. Silberhirse, prima, 10 Pfd. 5 ℳ,
Kolbenhirse, in 14 Tagen eintreffend.
Distelsamen, prima, Pfund 45 Pfg.,
Ameiseneier, gut gereinigt, Pfd. 6 ℳ,
Moselweißwurm, Pfund 4 ℳ
sowie alle anderen Vogelfutterarten.
Vogelexporthaus Joh. Götz
892] **Neu-Ulm** (Bayern).

Vogelfutter [893
für Kanarien, Waldvögel, Exoten, Papageien, Weichfresser. Anerkannt bewährteste Mischungen auf Grund langjähriger Erfahrung. Liste 13 über Vogelfutter umsonst.
W. Göpel, Leipzig,
Tröndlinring 1. Telephon 14 958.
Bei Anfragen bitte auf die „Gefiederte Welt" Bezug zu nehmen.

Kanarienfutter!
Ia süßer Sommerrübsen, aus eigener Ernte, Zentner 24 ℳ einschl. Sack frei Station Eschede, gibt zentnerweise ab [894
Hofbesitzer W. Brese, Marwede, Post Eschede, Lüneburger Heide.

Prima echte Harzer
Kanarien-Edelroller
vielseit. Tag- u. Lichtschläger aus meiner bekannten Feinzucht, ℳ 12, Ia Zuchtpärchen ℳ 15. Porto, Verpack. ℳ 4.
Feiner Harzer
Gebirgssommerrübsen,
nußsüße milde sauber gereinigte Kennerware 3,50 M. und Porto.
Rich. Heydenreich,
Bad Suderode 7 B, Harz.
Staatsmedaille, viele gold. Medaillen, seit 895] vielen Jahren an der Spitze.

Ameiseneier

Prima deutsche	Pfund 6 u. 8 ℳ
Prima finnische . .	Pfund 5 ℳ
Muska (Zecke) . . .	Pfund 6 ℳ
Weißwurm	Pfund 6 ℳ

ff. Weichfutter Nr.	I	II	III
Pfund ℳ 2	1.40	0.80	
ff. gemisch. **Körnerfutter** Pfd. 0.60 ℳ			
Getr. Daphnien . . . Liter 2 ℳ			
Mehlwürmer, 1/4 Pfund franko 2 ℳ			

bei Voreinsendung.
Meine Weichfutterspezialitäten sind seit vielen Jahren außerordentlich geschätzt, so daß viele Liebhabervereine des In- u. Auslandes ständige Abnehmer sind.
W. Hiltmann
899] Zoologische Handlung
Berlin S 14, Dresdener Straße 24.

Wie die Anzeigen in der „Gefiederten Welt"
wirken:
Bitte die Anzeige: „Waldvögel" nicht noch einmal zu bringen, da alles verkauft ist. Hätte 30 mal soviel haben müssen.
Hochachtungsvoll
L. F. in J.

Vögel

Suche
zur Blutauffrischung
Kanarienweibchen
diesjährige Zucht
Gute Gestaltsvögel, keine Roller.
Angebote erbittet
L. Röbbelen, Hildesheim,
895 a] **Teichstraße 11.**

Suche
2 Grauedelsänger Weibch.
zu kaufen, auch einzeln. [896
E. Petrich, Plauen (Sachsen), Jößnitzer Straße 145.

Gut singende, schön befiederte
Waldvögel
gebe sofort ab
Stieglitze 3 M., Hänflinge 2 M., Zeisige 1.80 M., Buchfinken 1.50 M., Bergfinken 1.20 M., Grünlinge 1.50 M., blutrote Dompfaffen 5 M., blaue 2 M., Pärchen 6 M., Schwarzplättchen 6 M., Rotkehlchen 4 M., Wald- od. Schwarzamseln 8 M. das Stück, Garantie f. leb. Ankunft. Versand erfolgt p. Nachnahme zuzüglich Porto und Verpackung.
Franz Bechstedt, Vogelexport, **Wildenspring** (Thüringer Wald) bei 897] Großbreitenbach.

Rothänflinge à Mk. 3
R. Thiele, Zittau i. Sachs.,
898] Äußere Weberstr. 7 II.

Taruntinische Unzertrennliche, Zuchtpaar 30 ℳ,
Feuerflügelsittiche Paar 38 ℳ,
Tobisittiche Paar 34 ℳ,
Müllers Edelpapagei (Tanygnathus mülleri) Stück 45 ℳ.
Liste über sonstige Vögel gratis. [900
Vogelexporthaus Joh. Götz
Neu-Ulm (Bayern).

Aus Liebhaberhand gebe ab: **1 sprechenden Bartsittich, blaublüt. u. gelbe Wellensittiche, Tarant. Unzertrennliche, mex. Blaubürzel, Papst- u. Indigofinken, Kanarienbastarde, div.**
901] **ausl. u. einh. Vögel.**
Suche: Weiße Kanarien und Schwarzbrustzeisig.
C. Balser, Fulda, Zickengarten.

1 Paar schöne, gezähmte
große Bussarde
(Mäuse-), Flügelspanne 1,20 m, zu verkaufen. Angebote erbeten an
Max Töpfer, Bautzen,
902] Wilthener Straße 13 II.

Steirische Alpenstieglitze	à 2.50 ℳ
Erlenzeisige	à 1.50 ℳ
Rote Hänflinge . . .	à 2.— ℳ
Rote Kreuzschnabel . .	à 2.— ℳ
Rote Dompfaffen . . .	à 3.— ℳ
Girlitze	à 1.50 ℳ
Schwarzplatten	à 6.— ℳ
Gartengrasmücken . .	à 6.— ℳ

Weibchen halbe Preise. Versand per Nachnahme. Garantie lebend. Ankunft. Bei Voreinsendung freie Verpackung. Porto Dringend Expreß 4 ℳ. [903
B. Wieser, Steyr, Oberösterreich.

Wegen Platzmangel!
1,1 Gouldamandinen, ♂ rotköpf., ♀ schwarzköpf. 45 ℳ, [904
1,1 Maskengrasamandinen 45 ℳ,
Beide Paare 90 ℳ franko.
A. Schiebe, Zschopau i. S.
Marienstraße 17. A. Z.-Mtgl. 282.
Tausche auch seltene Elsterchen.

Zitronenfinken (Spinus citrinella) Männch. 5 ℳ, Paar 8 ℳ,
Feld- u. Heidelerchen Männch. 3 ℳ,
Rothänflinge Männchen 3 ℳ,
Stieglitze Männch. 3 ℳ und sonstige 905] Arten empfiehlt
Vogelexporthaus Joh. Götz
Neu-Ulm (Bayern).

Vorsänger und pa. Zuchtmater
rein durchgezücht. Hohl- und Schoc
Stamm, 2 Staatsmedaillen, gebe pr
wert ab. Am liebsten selbst kommen. [
Paul Holzky, Cöthen I

Offertere in tadellosen, gut e gewöhnten Exemplaren:

Pirol,	Frühjahrsfang 15
Schwarzdrossel,	„ 10—15
Singdrossel,	„ 10—20
Sing-, Wein- u. Schwarzdrossel, Herbstfang . . .	à 8
Schwarzplatten, pr. steir. .	30
„	Frühjahrsfänge 15
„	Herbstfänge . 8
Gartengrasmücken . .	8—10
Dorn- u. Müllergrasmücken	à 6
Gartenrötel u. Wiesenpieper	à 5
Hausrotschwanz u. Alpenlerche	à 8
Heckenbraunelle	3—5
Rotkehlchen	2—5
Blaukehlchen	15
Gelbspötter	10
Kreuzschnäbel	3—4
Buchfinken	2—5
Stieglitze	2—4
Erlenzeisige	2—3
Rothänflinge	3—4

Prima Vogelfutt
907] **W. Hiltmann,**
Berlin S 14, Dresdener Straße

Grüne Wellensittiche
größerer Posten, zum Teil ganz aus färbt, von blutsfr. Eltern, aus F voliere, pro Paar 14 ℳ, gebe ab. P u. Verpackung Selbstkosten. [
R. Huth, Perleberg, Westprig

Zitronfinken
(Fringilla citrinella)
selten, Männch. St. 10 ℳ, Weibch. St.
Tadellose Exemplare. [
Beck, Tierimport, Stuttga

Gesuch
Gef. Welt Jahrg. 19
K. Schuller, Wien V
910] Fillgraderg 15/5.

Vereinszeiche
Ia Emaille, **Festzeichen, Fahnnägel, Stempel usw., Fahnen Tischbanner, Fahnenschleifen Bänder**, nur Kunsthandsticherei. Garantie. — **Kunstvolle Diplo** fertigt als Spezialität schnell und bil
911] **Emil Schulze,**
Weißer Hirsch (Sach
Alter Hirsch 1, I.
Gegründet 1. Oktober 1881

Beschwerden weg Nichtzustellung der „G fiederten Welt" sind be zuständigen Postamt zubringen.

Inserate
für das am 13. Nov. 1924 zur A gabe gelangende Heft 39 der Welt erbitten bis 8. Nov. 1924 f

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Berlin-Hermsdorf; für den Anzeigenteil: Rolf Kretschmann, Magdeburg, Postschließfach 148.
Verlag der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck: August Hopfer, Burg Bz. Mgdbg.

Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Jahrg. 53 | Den 13. November 1924 | Heft 39

(Druckort: Burg, Bezirk Magdeburg.)

Webervögel und Widafinken.

Von A. Krabbe.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Larvenweber — H. abyssinicus *(Gm.)*.

Dieser prächtige Weber ist in Heft 30 beschrieben und abgebildet. Wenn ich die Abbildung mit meinem Exemplar vergleiche, so möchte ich annehmen, daß dem Künstler ein jüngeres Männchen als Vorlage gedient hat. Bei meinem Vogel ist der scharfe Einschnitt hinter dem Auge nur aus nächster Nähe sichtbar, weil die tiefbraune Umsäumung des Kopfes von weitem einen verwaschenen Übergang zu der goldgelben Körperfarbe bildet und den Einschnitt so verschwinden läßt.

Einen Zuchtbericht habe ich in Nummer 8 der „Wochenschrift" veröffentlicht, woraus ich einen Auszug wiedergebe: „... Indessen wurde das Hängenest am Fenster von den Mitbewohnern zerstört und zum Teil zur anderweitigen Verwendung beim Nestbau abgetragen, weil der rastlose Baukünstler ein zweites Nest in der Form einer nach unten gerichteten Retorte herzustellen begann, welches im Hintergrund der Voliere in der Gabelung einer Weide angelegt wurde unter Benutzung kleiner Äste, die mit eingewebt wurden, um dem Nest beim Einschlupfloch eine größere Festigkeit zu geben. War die von unten heraufführende kurze Einschlupfröhre am ersten Nest dem Fenster, also dem Licht zugekehrt, so änderte der Vogel hier seine Bauweise, indem er den Eingang nach dem dunkleren Teil der Voliere, also dem Innern der Vogelstube zu verlegte. Das Gewebe war wieder wie beim ersten Mal locker und fast durchsichtig, erwies sich aber bei Berührung als außerordentlich fest, woran die eingewebten Ästchen und die mit verwendeten Agavefasern keinen geringen Anteil hatten. ... Das Männchen benahm sich während der Brut mustergültig, vertrieb alle Vögel aus der Nähe des Nestes, ohne dabei angriffslustig zu sein, und sang dem Weibchen zu dessen Unterhaltung vor. ... Daß die Weber ihre Weibchen und diese die Jungen niemals aus dem Kropfe füttern, erwähne ich bei dieser Gelegenheit, um zu zeigen, daß die Vögel zur Brutzeit mehr Kerbtier- als Körnerfresser sind und daß sie infolgedessen lebende Kerfe und Weichfutter zur Aufzucht der Jungen benötigen." — Diese sowie die folgenden drei Bruten gingen zugrunde, weil das Weibchen m. E. nach — eine andere Begründung kann ich nicht finden — die ziemlich erwachsenen Jungen nicht mehr fütterte und diese, teils verhungert, teils noch lebend, aus dem Nest warf. Das Nest wurde darnach noch etliche Male mit Futter im Schnabel aufgesucht, um darauf dem Liebeswerben des Männchen Gehör zu schenken. Es ist nicht ausgeschlossen, daß das Männchen der Übeltäter war, doch habe ich eine solche Beobachtung nicht machen können. Ich hoffe im nächsten Jahr doch noch über einen vollen Erfolg berichten zu können.

Für den Larvenweber gilt das vom Textor Gesagte, doch scheint er friedlicher zu sein, denn niemals verfolgte er andere Vögel und begnügte sich damit, sie aus der Nähe seines Nestes zu vertreiben. Ein abschließendes Urteil ist anhand nur eines Paares nicht möglich. Bei zunehmender Ausfuhr aus Abessinien wird dieser Weber hoffentlich mehr angeboten werden — womöglich unter der Bezeichnung Textorweber — und sollte von Besitzern genügend großer Flugräume nicht übersehen werden. Mein Exemplar ist größer als der Textorweber, dessen Schönheit er noch übertrifft (Abb. S. 237).

F. Gattung Schwarzflügelweber — Melanopteryx *Rch.*

Acht Arten, davon zwei eingeführt, der rotbraune und der Fuchsweber; vorherrschend ist Schwarz im Gefieder, namentlich an Flügel und Schwanz, mit Ausnahme des

rotbraunen Webers — M. rubiginosus *(Rüpp.)* der wie folgt gefärbt ist:

♂ Kopf, Kehle schwarz; übriges Gefieder, obere und untere Schwanzfedern kastanienbraun, nach hinten heller; Schulterfedern mit schwarzem Längsfleck auf den Außenfahnen; kleine Deckfedern graubräunlich, andere und Schwingen, Schwanzfedern schwarzbraun, alle mit bräunlichweißen Säumen; Unterflügeldecken weiß bis bräunlichweiß; Schnabel schwarz; Auge orangegelb; Füße dunkelhornbraun; Länge 150—170 mm. ♀ oberseits hellbraun, zuweilen graubraun; Kopf, Rücken mit schwarzbraunen Schaftstrichen; Augenbrauenstreif bräunlichweiß; Kehle weiß; übrige Unterseite gelbbraun bis rotbraun; Mitte des Unterkörpers weiß; Flügel, Schwanz wie Männchen; Auge gelbbräunlich; Schnabel hornbraun; Füße hornbraun. Verbreitung Ostafrika von Abessinien bis zum Pangani. Eine treffende Abbildung s. S. 31.

Ich besitze ein richtiges Paar aus dem letzten abessinischen Transport der Firma Ruhe. Da ich die Vögel erst wenige Wochen in der Voliere habe, so kann ich nur wenig darüber berichten. Das Weibchen ist sehr ruhig, während das Männchen nach Art der andern Weber flügelzitternd balzt und in kreischenden und knarrenden Tönen singt. In einem dichten Busch errichtete es sofort ein stehendes Nest aus Blättern und Stengeln von Kolbenhirse und hält sich zumeist in dessen Nähe auf. Die balzende Kopfstellung des Larven- und anderer Weber habe ich bei ihm noch nicht beobachten können. Bisher hat er sich als verträglich erwiesen.

G. Gattung Bartstrichsperlinge — Sporopipes *Cab.*

Eine ebenfalls nur durch zwei Arten, Schuppenköpfchen und Schnurrbärtchen, vertretene Gattung, beide vor dem Kriege eingeführt und zu den selteneren Erscheinungen auf dem Vogelmarkt gezählt.

Durch die großen südafrikanischen Einfuhren ist das Schnurrbärtchen — Sp. squamifrons *(A. Sm.)*, allenthalben bekannt und auch verschiedentlich — speziell von Herrn Buschendorf, früher Großkochberg — gezüchtet worden. Der Preis schwankte je nach Größe des Transportes und betrug bei der letzten südafrikanischen Sendung 25 M. das Paar.

Das Männchen meines Paares stammt aus dem Besitz des vorerwähnten Liebhabers, das Weibchen erwarb ich zusammen mit einem angeblichen Männchen, welches im Winter einging, von Fockelmann. Des weiteren besitze ich ein einzelnes Männchen aus der Vogelstube des Herrn Schütze, Eystrup. Es sind in der Vogelstube ruhige schlichte Vögelchen, diese Schnurrbärtchen, die in Gesellschaft mit Prachtfinken und dergleichen gehalten werden können, zumal sie ihrer geringen Größe wegen, 100—110 mm, Schaden ohnehin nicht anrichten können, es sei denn durch Störungen anderer Bruten durch das während der eigenen Brutzeit nicht immer ganz friedliche Männchen. Im dichten Gesträuch errichtete mein Pärchen ein stehendes rundes Nest aus Agavafasern, die es sich sorgfältig in der ganzen Voliere von alten Webernestern zusammensuchte. Leider verunglückte das Weibchen, indem es sich in einer Schlinge am Nest verstrickte und erst mit der Schere befreit werden mußte. Da es infolge des angeschwollenen Flügels flugunfähig war, so unterblieb die beabsichtigte Brut und das Männchen hatte umsonst seine niedlichen Balzspiele aufgeführt. Das Weibchen hat inzwischen seine Flugfähigkeit wieder erlangt und wird im nächsten Jahr wohl das löbliche Vorhaben zur Ausführung bringen. Solange das Schnurrbärtchen zu den selteneren Exoten gehört, wird es sich lebhafter Nachfrage von seiten der Liebhaber erfreuen; sollte es ein dauernder Gast in den Käfigen der Händler werden, so dürfte es bald auf der Stufe des Grauastrilds oder Silberschnäbelchens stehen, weil es sich weder durch besonders anmutiges Betragen noch Schönheit oder gar Gesang zum begehrten Käfigvogel stempelt. Dem Benehmen nach könnte man die Schnurrbärtchen für Sperlinge halten, zumal beide Geschlechter gleich grau gefärbt sind, also ein besonderes Brutkleid vom Männchen nicht angelegt wird, und ihrer sperlingsartigen Stimme wegen. Dasselbe drängt sich dem Beschauer bei der Gattung

H. Sperlingsweber — Plocepasser *A. Sm.*

auf, die sieben Arten zählt, wovon drei, Mahali, schwarzschnäbliger Mahali- und Augenbrauensperlingsweber, bereits eingeführt worden sind. Den Mahaliweber sah ich im Mai 1923 bei Fockelmann in Großborstel, zusammen mit andern seltenen südafrikanischen Vögeln. Ein von mir an die Schriftleitung zur Bestimmung gesandter Mahaliweber aus Abessinien, der an schwerem Darmkatarrh eingegangen war, wurde als der

Schwarzschnäblige Mahaliweber — P. melanorhynchus *(Rüpp.)*

festgestellt. Ich vermute, daß dieser Vogel auf dem Transport nur mit Körnerfutter ernährt wurde, während er in der Heimat wohl mehr Kerbtier- als Körnerfresser ist. Denselben Weber sah ich in mehreren Paaren im Berliner zoologischen Garten, bezeichnet mit Augenbrauensperlingsweber. Ein Paar hatte auf einer der schwebenden Sitzkronen einen Reisighaufen errichtet, was mich auf den Gedanken brachte, einen sicher sehr interessant verlaufenen Zuchtversuch zu unternehmen. Da die Leitung des Gartens nicht abgeneigt zu sein scheint, mir ein Pärchen dieser, wenn auch unscheinbaren, so doch bisher sehr selten eingeführten Weber zu überlassen, so hoffe ich im nächsten Jahre weiter darüber berichten zu können. Eine Abbildung des Mahalivebers ist beigegeben (s. S. 251), woraus die Farbenverteilung, weiß, schwarz und braun, für beide Geschlechter zu erkennen ist. Die Länge beträgt etwa 160 mm. Fischer schreibt über den schwarzschnäbligen Mahaliweber wie folgt: „Ein sehr gemeiner Vogel im Gebiet von Nguruman, in kleinen Gesellschaften bis zu 20 Stück, die den ganzen Tag in Bewegung sind, und ähnlich den Ploceus-Arten schreien, nur lauter und krächzender, vielfach auf dem Erdboden im Grase sich herumtreibend. Die Nester befanden sich in kleinen Kolonien an den Zweigen von Akazienbäumen hängend, aus Grasblütenstengeln den echten Webervogelnestern ähnlich kunstvoll zusammengefügt, weniger gewoben, doch ist die Öffnung nach unten gerichtet. Sie sind dadurch sehr charakteristisch, daß sie, wie auch die Nester von Nigrita, zwei Eingangsöffnungen haben, über welchen die Halme dachartig vorstehen. Die eine Öffnung wird kurz vor dem Eierlegen zugestopft und nach dem Ausfliegen der Jungen wieder geöffnet. Sie scheinen oft Nester zum Zeitvertreib oder als Schlafnester anzulegen, denn obwohl ich eine große Anzahl von Nestern, bei denen Vögel ein- und ausflogen, untersuchte, fand ich doch nirgends Eier."

(Fortsetzung folgt.)

Von meinen Vögeln.

Von Fritz Braun.

(Nachdruck verboten.)

Na nu, was ist denn mit dem Rothänfling los? Er sitzt ja so dicht an die Sprosse geschmiegt und läßt den linken Fuß hinter der Sprosse hinunterhängen!

Da gilt's, ihn aus dem Flugkäfig herauszufangen. Erst mal ruhig Blut! Vorsichtig entferne ich die Sitzstangen und fasse dann den seitlich an den Drähten hängenden Vogel. Der Lauf ist dicht unter dem Fußgelenk geknickt. Vermutlich ist der Vogel in dem Besen von Mildereisern, den ich in den Käfig gesteckt habe, hängen geblieben und hat solange geflattert, bis das Unglück da war. So erntet man oft genug Unsegen, wenn man seinen Pfleglingen etwas Gutes tun wollte. Doch den Pfleger, der alles bedenkt, möchte ich mal sehen; in den mehr als vierzig Jahren, die ich und die Vögel schon zusammenleben, ist er mir noch nicht über den Weg gelaufen.

Doch, vor allem, was nun? — Zu schienen geht der Lauf kaum, die schadhafte Stelle ist gar zu dicht an dem Gelenk. In dem Flugkäfig darf der Hänfling auch nicht bleiben. Nachdenklich mustere ich die Käfige, in denen nur ein Vogel steckt. Soll ich etwa den Dompfaff im Flugbauer unterbringen? Morgen früh hat er sich dann sicherlich die Schwingen eines Flügels ausgeschlagen, denn die Leinfinken sind Nachtwandler und werden ihn — ich wette zehn gegen eins — zum Toben veranlassen. Oder sollte jener Berghänfling die Wohnung räumen? Der singt in seinem Einzelbauer so fleißig und herzensfroh, daß ich diesem Zustande kein Ende bereiten möchte. Vielleicht der Goldammer da? Der steckt schon drei Jahre in seinem Bauer und würde durch den Umzug nur gefährdet. Muß der Stieglitz dranglauben? Ach, der sieht jetzt so blitzsauber aus und glich doch vor der Mauser einem Gassenjungen von Murillo. Nein, das geht auch nicht! Oder der uralte Grauedelsänger? Gott bewahre, sonst erlebe ich noch die Tragikomödie, daß der fünfzehn Jahre alte Herr an geschlechtlicher Überreizung und brünstiger Wut zugrunde geht. Dies Zeisigweibchen aber, ein Frischfang, hat eben erst seinen Magen- und Darmkatarrh verloren; kommt es in das Flugbauer, so geht die Geschichte sicher von neuem los. Und der Karmingimpel ist auch noch ein Neuling; der verkommt mir in dem großen Bauer.

„Fritz, schaffe doch bloß die vielen kleinen Käfige ab! Du hast ja eine entsetzliche Arbeit mit dem Reinemachen," sagt meine liebe Frau immer wieder und ich erwidere darauf ebenso regelmäßig: „Ja, ja, gewiß Lenchen, die zahllosen Käfige müssen fort!" Und ich meine das ganz aufrichtig, aber, wie man sieht, hat die Sache in jedem Einzelfall diesen oder jenen Haken.

Endlich kam ich zu einem Entschluß. Ich hole mir einen Versandkäfig, entferne drin die Sitzstangen, bestreue den Boden fingerdick mit trockenem Sand und gebe soviel Futter hinein, daß ich mich um den Käfig drei, vier Tage nicht zu kümmern brauche. Dann stelle ich den Behälter mit der Gitterseite an das Fenster. So mag er bis zum Ende der Woche stehn. Hoffentlich setzt sich der Vogel ruhig hin und preßt den Fuß an das Bauchgefieder. Bluten tut er nicht, so daß ich ein Ankleben des Fußes an dem Bauchgefieder nicht zu befürchten habe. Hoffentlich, wenn ich Sonnabend nachsehe, weiß ich, woran ich bin; quacksalbere ich viel, so wird ein Mißerfolg nur wahrscheinlicher.

Vogelhändler auf Madagaskar.

Und der Vogel tut mir so leid, wie ich ihn in der Hand halte und in seine ruhigen, braunen Augen blicke. Er ist längst verfärbt; aber ich habe nun einmal auch für die Gefangenentracht der Rothänflinge etwas übrig. Sind diese Vögel aalglatt vermausert, so sehen sie so vornehm und unauffällig aus wie eine junge Gräfin im Reisekleid.

Auch bei dem Vogelliebhaber kommt ein Unglück selten allein. Der kleine Amaranth, der mutterseelenallein diesen großen Flugkäfig bewohnt, ist seit vier Wochen Wittwer. Man soll eben frischeingeführten Vögeln dieser Art nur dann Brutgelegenheit bieten, wenn sie in hoher, gleichmäßiger Wärme gehalten werden. Eines schönen Abends fand ich das sonst so quicke Weibchen dicht und plusterig an dem Boden hocken. Der greifenden Hand wich es keinen Schritt breit aus. Vorsichtig führte ich einen ölbenetzten Stecknadelknopf in die Legeröhre und betupfte auch den ganzen Unterleib mit Olivenöl. Dann setzte ich den Vogel wieder auf den Käfigboden, wo das Männchen ihn in höchster Erregung umhüpfte. Morgen, sagte ich mir, ist das Weibchen tot. Aber nein, am andern Tag war der Vogel sein Ei losgeworden und schoß wieder so munter hin und her wie nur je zuvor. Vier Tage darauf kam ich schon zu spät und fand nur eine Leiche.

Es ist unglaublich, an was für Singsängen ich alter Vogelnarr mitunter Gefallen finde. Der selige Rausch und Kullmann hätten darüber arg den Kopf geschüttelt; aber behauptet man schon, dem manches nachsehen zu müssen, der einen Vogel hat, wie viel

mehr Nachsicht gebührt dem Manne, der ihrer ein halbes Hundert verpflegt.

Immer wieder freute ich mich an diesen schönen warmen, sonnigen Herbsttagen einer seltsamen Musika. Auf meiner Veranda hängt ein Flugbauer mit Exoten, die ich mir jüngst zusammenkaufte. Ein Reisvogel sitzt in dem Käfig, ein Atlasfink, ein Weißkehlpfäffchen und ein prächtig ausgefärbter Orangeweber. Dazu deren Weibchen. Als nun die Herbstsonne so voll und grell in die Veranda hineinflutete, gerade zu der Zeit, da in der Heimat dieser Tierchen der Liebeslenz hereinbricht, wurden sie so sangeslustig, wie ich das bei diesen Arten nicht oft erlebt habe. Unaufhörlich läutete der Reisfink, fortwährend zirpte und schrillte der Weber, unverzagt knatterte der Atlasfink sein Liebeslied, das von so hellen Pfeiftönen unterbrochen wird — noch in der vierten Auflage der „Fremdländischen Stubenvögel" stand, er sänge nicht; der Atlasfink ist offenbar erst recht spät in Aufnahme gekommen — und am tollsten trieb es das Pfäffchen. Das flog so flink hin und her, her und hin wie ein liebestoller Mozambikzeisig und sprudelte immer wieder sein klangarmes und doch so gemütlich klingendes Liedchen in den hellen Sonnenschein hinaus. Und ich saß viertelstundenlang wie gebannt und lauschte dem seltsamen Tongemälde, das dem Geschmack eines verwöhnten Liebhabers so wenig entspräche, und das doch so trefflich zu dem klarblauen Himmel und der goldenen Sonne dieser Herbsttage stimmte.

Nun ist auch die rote Pracht meiner vorjährigen Leinfinken dahin; in zartem Gelb, das hier und da einen leisen, leisen Stich ins Orangefarbene hat, prangen die mollig breiten Brüste der stattlichen Männchen, die nicht umsonst so aufrichtige Verehrer einer vielseitig besetzten Tafel sind. Ich aber denke immer wieder meiner verblichenen Birkenzeisigbastarde, deren sattes Orangegelb an Brust und Stirn die Farbe dieser vermauserten Leinfinken so stolz überstrahlte. Immer wieder zergrübele ich mir den Kopf, wie das wohl kommen mochte. War es väterliches Erbteil oder von der Kanarienmutter her übernommen? Wer wüßte eine bündige Antwort auf diese Frage?

Während ich noch darüber nachgrüble, stimmt mein Star seinen von allen möglichen Musikern zusammengestohlenen Singsang an. Heute gibt er wieder und wieder das zarte, silberfädige Lied meines Goldammers zum besten. Beinahe hätte ich den Ammer nicht mehr. Er frißt nur Kanariensamen, und als der neulich ausgegangen war, dachte ich, Hirse werde es wohl auch tun. Am nächsten Morgen hatte der Boden seines Käfigs aber grünliche Flecken, Spuren eines Hungerkatarrhs, wie er sich einstellt, wenn den Organen keine Nahrung mehr zugeführt wird. Leicht ducknackig saß der Goldammer auf seiner Stange; die Hirse war unberührt.

Merkwürdige Tatsache, diese Verschiedenheit, mit der stellvertretende Reize wirken. Hier versucht eine Wachtel ein Amselweibchen, dort ein Kakadu gar seinen Futternapf zu treten, da schmettert ein Grauedelsänger ein Feldsperlingsmännchen mit seinen schallendsten Brunstliedern an, und daneben verhungert ein Goldammer, weil er nicht ausgerechnet Kanariensaat, sondern Hirse erhält. Blitzartig erhalten solche Erfahrungen den Begriff Futtersuche. Gewiß suchen die Vögel Futter, aber eben nur in der Weise, die gerade für ihre Art bezeichnend ist. Ob Futterarten, die sie noch nicht sahen, vielleicht eßbar sind, das prüfen nur die wenigsten. So verhungerte bei mir im Weltkriege ein Pfäffchen, weil man ihm während meiner Abwesenheit nicht die alleinseligmachende Hirse gab, sondern ein Samengemisch, in dem doch Sämereien genug enthalten waren, mit denen der Vogel sein Leben hätte fristen können. Als ich neulich meinem Dompfaff in dem gewohnten Napfe sein übliches Mischfutter etwa 2 cm hoch mit den leeren Hülsen der Sonnenblumenkerne bedeckte, suchte er nicht etwa nach dem darunter liegenden Futter, sondern hungerte eben.

Bei dem Händler trieb es mein Goldammer übrigens genau so. Als ich den frisch gefangenen Vogel zuerst sah, saß er plusterig da. Wie ich mit dem Händler über den wahrscheinlichen Grund seiner Krankheit sprach, bemerkte ich, daß von dem Mischfutter noch die paar in ihm enthaltenen Glanzkörner enthülst waren. Nun riet ich dem Händler, sogleich eine Handvoll Spitzsamen zu verabfolgen, und als wir sahen, wie eifrig er sich darüber hermachte, wußten wir schon, woran wir waren. Bereits am übernächsten Tage war der Ammer so schlank und frisch, daß ich ihn getrost erwerben durfte.

Nur ein kluger Erlenzeisig machte einst eine Ausnahme von dieser Regel. Als ich einst in meiner Marienburger Zeit verreiste, überließ ich die Vögel wohl oder übel dem Hausmädchen, die auf den seltsamen Einfall kam, die Körnerfresser eines Flugkäfigs nur mit Weichfutter (Waschinskys Leckerbissen) zu versorgen. Sie hatte erst beim Reinigen der Käfige alle Näpfe herausgenommen und wußte dann nicht mehr, wo sie hingehörten. Wie ich nach vierzehn Tagen nach Hause kam, waren natürlich alle Insassen jenes Flugkäfigs hinüber; nur ein Erlenzeisig saß zwar dick und unlustig, aber doch noch lebendig auf der Sitzstange. Er allein hatte das Weichfutter angenommen.

Mittlerweile bescherte der Herbst unserem Vogelfänger auch schon neue Beute. Neulich trug ich mir ein Pärchen Zeisige heim, Jungvögel aus diesem Jahr. Und wieder machte der alte Vogelwirt eine rechte Anfängerdummheit, indem er die erst vor zwei Tagen gefangenen Zeisige in einen Flugkäfig hineinwarf, der von drei vorjährigen, zahmen Zeisigen und vier Feldsperlingen bewohnt wurde. Der Verstand sagte: Die Neulinge gehören in den Einzelkäfig. Die Bequemlichkeit begütigte: Ach was, harte Zeisige, es wird schon gehen. Am andern Morgen hatte das Männchen bereits den Magen- und Darmkatarrh der Frischfänge, und wenn ich es auch eiligst herausfing: es mußte dahin! Wieder ein Beweis dafür, daß man besser tut, sich an erprobte Regeln zu halten als zu probieren. Das Sprichwort: „Probieren geht über Studieren" hat sicher ein Jung-Blut erfunden; die Erfahrung spricht anders.

Gott sei Dank ist wenigstens die Zeit der Mauser ohne Verluste vorübergegangen und scheint die liebe Sonne ins Vogelzimmer, so singen Stieglitze und Hänflinge, Starmatz und Genossen, als wollten sie dem Herbst seine Ansprüche, des Lenzes problema-

tischer Bruder zu sein, nach Kräften erweisen helfen. Und doch trennen uns nur noch wenige Wochen von dem ersten Schnee, streifen Schneeammern und Alpenlerchen sicher schon auf den Halden der Kassubei, am Strande der Ostsee umher. O wenn sie doch auch wieder einmal den Weg in meine Käfige finden.

Neueinführungen und Seltenheiten.

Von Karl Neunzig.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Für die Zufuhr fremdländischer Vögel aus Indien scheinen immer noch nicht die lebhaften Handelsverbindungen, welche vor dem Kriege bestanden, wieder hergestellt zu sein. Außer Schamadrosseln, einigen Blattvögeln, Reis- und Tigerfinken, ist aus jenen vogelreichen Gegenden kaum etwas auf den Vogelmarkt gelangt. Noch immer vermissen wir die vielgestaltigen Heherlinge, die indischen Drosseln und vor allem die farbenprächtigen Fliegenschnäpper, an denen jene Länder so reich sind. Von den Schnäppern ist bisher nur eine Art, wohl zufällig mit anderen Vögeln, nach Europa gebracht worden, der

Rotkehlfliegenschnäpper — Siphia strophiata *Hdgs.*,

den Lengner, Berlin, auf den Markt brachte. Es handelt sich um einen kleinen reizenden Schnäpper, der in Größe und Gestalt fast ganz unserm kleinen Zwergfliegenschnäpper ähnelt, auch in der Färbung des Schwanzes. In der übrigen Gefiederfärbung weicht er von ihm ab.

Beide Arten, sowohl der Zwergfliegenschnäpper wie der das Erstemal eingeführte Rotkehlfliegenschnäpper gehören zur Gattung Rotkehlschnäpper — Siphia *Hdgs.*, die sich von der Gattung Muscicapa *Briss.* durch den Färbungscharakter unterscheidet. Die vier Arten, welche der Gattung Siphia angehören, haben rotbraune Kehle oder wenigstens einen rotbraunen Kehlfleck, die Schwanzfedern sind an der Wurzel weiß. Vertreter der Gattung leben in Europa, dem gemäßigten Asien bis Japan und im Himalayagebiet.

Jerdon (Birds of India vol. I) berichtet über den Rotkehlfliegenschnäpper, den Orange — throated Flycatcher, daß er im östlichen Himalayagebiet in Höhen von 6000—8000 Fuß und darüber lebe. In der Umgebung des Wohnortes Jerdons, Darjeeling, sei er eine gewöhnliche Erscheinung. Er habe ihn dort häufig auf einem trockenen Zweig oder auf einem Stein an der Landstraße sitzen sehen. Häufig komme er auf den Erdboden, um ein Insekt aufzunehmen, gelegentlich fange er solche aber auch im Fluge und verzehre sie auf seinem bevorzugten Sitzplatz. Jerdon hebt hervor, daß besonders beim fliegenden Vogel die weiße Färbung der Schwanzfedern einzeln in die Erscheinung trete.

Gefiederbeschreibung: ♂ oberseits olivbraun, aschgrau überhaucht; ein schmales weißes Band von der Stirn bis über das Auge; Zügel, Wangen, Kinn, Kehle schwarz, an Brust und Bauch in ein dunkles Aschgrau, nach hinten in Weiß übergehend; auf der Kehle ein rotbrauner Kehlfleck; Unterschwanzdecken weiß; Flanke olivbraun; Flügeldecken, innere Schwingen olivbraun, übrige graubraun mit olivbraunen Säumen; Schwanzfedern schwarz, außer den beiden mittleren an der Wurzelhälfte weiß, welche Farbe nach außen hin an Ausdehnung zunimmt; Auge schwarzbraun; Schnabel schwarz, Füße dunkelhornbraun; Lg. 130, Fl. 70 mm.

♀ dem ♂ ähnlich, oberseits ohne den aschgrauen Hauch des Gefieders; das beim ♂ schwarze Körpergefieder aschgrau; das weiße Band am Kopf sehr schmal, zum Teil verborgen.

Die Verbreitung des Rotkehlfliegenschnäppers erstreckt sich über das Himalayagebiet von Kaschmir



Rotkehlfliegenschnäpper.

bis Bhutan, südlich durch Hinterindien bis Birma, bis ins westliche China.

In der Gefangenschaft wird sich der schöne Vogel kaum wesentlich vor unserm Zwergfliegenschnäpper unterscheiden. Er bedarf als sehr lebhafter und beweglicher Vogel eines geräumigen Käfigs und eines Futtergemisches, wie es zarteren Insektenfressern gereicht wird.

(Fortsetzung folgt.)

Exoten.

Von S. Lichtenstaedt.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Tarantinische Unzertrennliche.

Der entzückendste, reizendste Papagei, welchen wir in letzter Zeit für unsere Käfige bekommen haben, sind die Tarantiner. Sie schreien nicht, zwitschern im Gegenteil melodiös, ähnlich den Wellensittichen, toben nicht im Käfig umher, lernen ihren Herrn und Gebieter bald kennen, zeigen nicht die geringste Scheu vor ihm, und werden, besonders die Männchen, in kurzer Zeit sogar zahm und zutraulich. Sie scheinen

dazu berufen zu sein, uns die fehlenden Rußköpfchen voll und ganz zu ersetzen.

Ich glaube auch nicht, daß ihre Zucht allzuschwer ist. Nur ihre Seltenheit ließ uns wenig von ihrer Zucht wissen. In letzter Zeit sind aber große Transporte herübergekommen, so sah ich in Berliner Handlungen zeitweise 15—20 Paare fliegen.

Vor mehreren Monaten machte ich leider mit den Tarantinern traurige Erfahrungen. Ich erhielt einen Transport von 7 Vögeln, welche in kurzer Zeit eingingen. Es war materiell und ideell ein schwerer Verlust für mich, traurig und schmerzlich, die entzückenden Vögel dahinwelken zu sehen, ohne daß Hilfe möglich war.

Nur schwer entschloß ich mich, eine Anzahl Tarantiner neu zu erwerben; heute würde ich die Tiere nicht mehr missen wollen.

Die Tarantiner Zwergpapageien sind muntere, lebhafte, intelligente Vögel, welche jeden Vogelfreund

Störche im Winteraufenthalt.
Abbildung aus dem Werk: Bengt Berg, Mit den Zugvögeln nach Afrika (s. Text auf S. 312).

entzücken müssen. In einem etwa ein Meter langen Käfig leben zwei Pärchen friedlich zusammen. In den nächsten Tagen werden sie allerdings paarweise getrennt, da ich eine Zucht sonst nicht für gut möglich halte. Nachts suchen alle vier Vögel einen Nistkasten auf, ein Umstand, welcher die Zucht in einem verhältnismäßig kleinen Käfig unmöglich machen würde.

Mache ich abends im Vogelzimmer Licht, so erscheint sofort ein Köpfchen eines Tarantiners am Flugloch, und bald sind alle vier draußen. Drehe ich das Licht ab, so stürzen alle vier Hals über Kopf auf die Öffnung und sind im Nu verschwunden. Trete ich an den Käfig, so verschwinden die Weibchen sofort im Kasten, während die Männchen von mir nicht die geringste Notiz nehmen.

Ich kann im Käfig herumhantieren, so viel ich will, ruhig bleiben diese sitzen, lassen sich sogar die „Füßchen kraulen", ohne zu flüchten.

Entzückend ist auch bei diesen Papageien das Familienleben. Innig krault das Männchen dem Weibchen das Köpfchen, füttert es aus dem Kropfe, spielt und jagt mit ihm im Käfig umher, ohne sich durch meine Anwesenheit im geringsten stören zu lassen.

Fast täglich finden bei den Vögeln Begattungen statt, ohne daß das Weibchen an eine Brut oder an das Eierlegen zu denken scheint. Ganz drollig sieht eine solche Begattung aus. Nicht impulsiv und plötzlich wie beim Wellensittich, sondern ruhig und gemächlich. Schritt für Schritt begibt sich das Männchen zum Weibchen, gelassen, ohne jede Erregung klettert es diesem auf den Rücken, alles in größter Ruhe und Bedächtigkeit. Dann klettert es wieder genau so ruhig herab, vom Weibchen noch mit ein paar harmlosen Bissen bedacht.

Laut „Neunzig" soll der Tarantiner Hirse und Spitz fressen. Bei mir rührten beides die Vögel nicht an. Sie fressen bei mir eingeweichten Mais, Sonnenblumen, Apfel, Weidenzweige und etwas Hafer. Mais, welcher ebenfalls nachts in Venecinwasser erweicht wurde, fressen sie am liebsten, dann Sonnenblumenkerne und Obst. Von Sonnenblumen will ich sie so schnell wie möglich entwöhnen, da ich diese, besonders in größeren Mengen nicht für zuträglich halte.

Frische Weiden oder andere Ruten scheinen ihnen Bedürfnis zu sein. Ich empfehle jedem Liebhaber, welcher kleine Papageien züchtet, sich eine kleine Blechdüte anfertigen zu lassen, diese, mit Wasser gefüllt, in den Käfig zu hängen, und in dieselbe die frischen Zweige zu stecken.

Die Geschlechter sind bekanntlich beim Tarantiner leicht zu unterscheiden. Die rote Kopfzeichnung des Männchens läßt dieses leicht vom Weibchen erkennen.

Die Ansicht, daß auch Weibchen mit roten Kopfflecken existieren sollen, halte ich nicht für richtig.

Die Unzertrennlichen bauen bekanntlich zur Eiablage ein Nest. Ob dieses auch bei dem Tarantiner der Fall ist, kann ich nicht sagen, denn ich habe die Tiere bisher noch nicht gezüchtet. Herr

Rambausek erwähnt einen Nestbau in seinem Artikel über die Zucht der Tarantiner in der „Gef. Welt" nicht. Sind schon von anderen Liebhabern diesbezügliche Erfahrungen gemacht worden?

Jedenfalls haben wir in diesen Papageien empfehlenswerte Zimmergenossen. Auch ihr plauderndes Gezwitscher ist angenehm und ähnelt dem des Wellensittichs. Bei der Begattung läßt das Männchen eigentümliche schnatternde Töne hören, so daß ich beim Hören dieser Töne schon genau weiß, daß sich da oben eine Liebesszene abspielt.

Jedenfalls sind die Tarantiner in ihrem Benehmen weit interessanter als die Sperlingspapageien. Sie haben in ihrem ganzen Treiben etwas vom Wellensittich, wenn sie auch nicht so munter und wohl auch nicht so leicht züchtbar sind wie dieser.

(Schluß folgt.)

Kraniche.
Abbildung aus dem Werk: Bengt Berg, Mit den Zugvögeln nach Afrika (s. S. 312).

Sprechsaal.

(Steht den Abonnenten kostenlos zur Verfügung.)

Antworten.

Auf Frage 14: „Dem Wunsche des Herrn R. M. und Herrn Dr. v. Boxberger nach weiterer Diskussion über die Milbenplage entsprechend, gestatte ich mir folgendes anzuführen:

Ich bin seit langen Jahren Vogelliebhaber und -züchter und habe als solcher auch reichlich Bekanntschaft mit der Milbenplage gemacht. Mir erging es wie Herrn R. M. (Nr. 30, Sprechsaal), mich brachten die Milben halb zur Verzweiflung. Ich kämpfte mit allen Mitteln dagegen; ich wusch Käfige, Sitzstangen und Futtergeräte in Lysoform, Kreolin, Spiritus, ich pinselte täglich alle Sitzstangen und Ritzen der Käfige mit Anisöl (soll den Milben die Atmungsöffnungen verstopfen); vergeblich! Ich trug Käfige und Zubehör in einen dicht verschlossenen Raum zusammen und verbrannte ganze Pfannen voll Schwefel darin; vergeblich! Ich überbrühte alles mit kochendem Wasser; daraufhin kamen die Quälgeister aus ihren Schlupfwinkeln hervor und krochen im heißen Wasser herum; ich bemerke ausdrücklich, daß das Wasser brodelte; offenbar kühlt es bei Berührung mit den Käfigen usw. so rasch und soweit aus, daß es den Milben nichts mehr anhaben kann. Ich verwandte Insektenpulver wie Herr Dr. v. Boxberger, und zwar gutes, hatte aber auch da keinen dauernden Erfolg. Dutzende von Jungvögeln gingen mir an Entkräftung zur Zeit der Federbildung im Neste zugrunde, noch mehr Eier verließen mir selbst die besten Weibchen. Ich versuchte es im Freiflug (5×5 m): dieselbe Erscheinung. Ich war mir seit langem klar über die Mißerfolge all meiner Bekämpfungsmethoden, hoffte aber immer noch auf Gelingen. Hätte ich all meine Vögelein in Wasser kochen, in Lysoform legen oder tagelang in Schwefeldampf halten können, so wäre ich wohl die Milbenplage losgeworden. Da dies schlechterdings unmöglich ist, so blieb mir nur ein Ausweg: Ich verkaufte alle Kanarien und gab allen Waldvögeln die Freiheit. Und nun kam eine gründliche Kur: Alle Käfige, soweit es die Größe erlaubte, wurden ausgekocht, ebenso Futtergefäße, Sitzstangen usw. Die großen Flugkäfige und das Zimmer, in dem alle Vögel gehalten wurden, tünchte ich mit einer kräftigen Lösung von frisch gelöschtem, noch warmem Kalk, auch den Zimmerboden (nicht gerade zur Freude meiner Frau); keine Ritze wurde übersehen. Seit dieser Zeit kann ich trotz eifrigstens Fahndens keine Milbe mehr entdecken, obwohl ich zurzeit wieder 40 Stück Exoten, Waldvögel und Kanarien pflege.

Ich bin nach meinen Erfahrungen zu der Überzeugung gekommen, daß ohne Entfernung der von Milben befallenen Vögel eine vollständige Befreiung von Milben sehr schwer möglich ist. Ich bezweifle nicht, daß dies Herrn Dr. von Boxberger mit Insektenpulver gelungen ist. Aber ich bezweifle sehr, ob es in jedem Fall gelingt. Die Wirkung des Insektenpulvers beruht meines Wissens auf Verstopfung der Atemöffnungen der Insekten. Das beste Insektenpulver ist also das feinst gemahlene. Nun aber setzt wohl manche Milbe ihre Eier auch auf den Vogelkörper und das Gefieder ab und bis zum Ausschlüpfen des Milbeneies hat der Vogel höchstwahrscheinlich durch Baden und Schütteln des Gefieders das Insektenpulver längst wieder entfernt und die jungen Milben haben nun die Möglichkeit, sich weiterhin zu vermehren. Nur sehr häufiges Einstäuben der Vögel mit Insektenpulver könnte bei der raschen Entwicklung der Milben dem vorbeugen, da in diesem Fall auch die frisch geschlüpften Milben rasch eingehen müßten.

Für sehr wichtig halte ich es endlich, wie schon angedeutet, daß nicht bloß Käfige usw. gründlich desinfiziert werden, sondern vor allem auch das ganze Zimmer, in dem die Käfige mit den Vögeln hängen; denn die Milben wandern bekanntlich umher, auch in weitere Umgebung der Käfige.

Klaus Spranger, Breitenhausen, Ndbay."

Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber Sitz Leipzig.

1. Vorsitzender Joh. Birk, Leipzig-Mockau, Beuthstr. 29; Geschäftsstelle: Rudolf Petters, Leipzig-Probstheida,

Preußenstr. 31; Kassierer Werner Geßler, Leipzig Dresdner Str. 2; Tauschvermittlung — T.-V. —: Richard Vorwerk, Leipzig-Lößnig, Merveldstr. 39.

Der Vorstand sieht sich veranlaßt, die dem Reichsverbande angehörenden Vereine und Einzelmitglieder erneut auf die bestehende Tauschvermittlung, die „T.-V.", hinzuweisen. Wie in dieser Zeitschrift bereits u. a. bekanntgegeben, hat die „T.-V." am 15. August 1924 ihre Tätigkeit aufgenommen. Leider ist bisher von dieser Einrichtung nur in ganz geringem Maße Gebrauch gemacht worden, so daß die wenigen eingegangenen Tauschgesuche und -angebote nicht in der erhofften Art und Weise erledigt bzw. vermittelt werden konnten. Warum bisher die völlig kostenlose Vermittlung der „T.-V." in nur ganz vereinzelten Fällen in Anspruch genommen wurde, ist nicht recht ersichtlich, anscheinend ist doch das Wesen und der Zweck der „T.-V." noch nicht von allen Mitgliedern erkannt und erfaßt worden. Glaubte doch der Vorstand bei Errichtung der „T.-V." den Mitgliedern des Reichsverbandes Gelegenheit zu geben, die an den jeweiligen Örtlichkeiten verhältnismäßig leicht zu beschaffenden Vogelarten gegen am gleichen Orte fehlende einzutauschen, u. zw. direkt von Liebhaber zu Liebhaber. Nicht zuletzt wollte aber auch der Vorstand einen Weg damit finden und bieten, durch Anbahnung persönlicher Bekanntschaften und Beziehungen unter den Mitgliedern, wie insbesondere auch unter den angeschlossenen Vereinen das Gefuhl der Zusammengehörigten zu wecken und zu befestigen. Recht erwünscht wäre es dem Vorstand, wenn unsere Vereine wie auch unsere Einzelmitglieder zu dem Gedanken einer Tauschvermittlung im allgemeinen, wie auch zu den veröffentlichten Richtlinien im besonderen Stellung nehmen wurden. Der Vorstand ist nach wie vor auf die Mitarbeit aller angewiesen und ist für jede Anregung dankbar! Alle die „T.-V." betreffenden Zuschriften, wie auch alle Tauschgesuche und -angebote sind an den 2. Schriftführer des Reichsverbandes, Herrn Richard Vorwerk, Leipzig-Lößnig, Merveldstr. 39 erbeten.

J. A.: Richard Vorwerk.



Bücher- und Schriftenschau.

Bengt Berg, **Mit den Zugvögeln nach Afrika.** Mit 130 Abbildungen. Dietrich Reimer/Ernst Vohsen/Verlag in Berlin 1924. Preis 9 M.

In den Kinos der Großstädte lief im Frühjahr dieses Jahres ein Film, der für jeden Betrachter eine Überraschung war, der jedem Naturfreund helle Freude bereitete. Der Schwede Bengt Berg sah einst in seiner Heimat ein Kranichheer über seinen Kopf dahinrauschen. Wie er Zeuge war des Dahinsegelns der unübersehbaren Scharen, erwachte in ihm die Sehnsucht, den Vögeln zu folgen, wenn sie im Herbst nach dem Süden ziehen. Vom Eismeer bis zu den Pyramiden und darüber hinaus begleitete Bengt Berg die Zugvögel. In Ägypten grüßen ihn die heimatlichen Wildenten. Im Schatten der Pyramiden fliegen, waten und ruhen Kiebitze, Strandläufer, Bachstelzen, Regenpfeifer und viele andere heimische Vogelarten. In sorgfältig ausgesuchtem Versteck ist er tage- und wochenlang unsichtbarer Zuschauer des Lebens und Treibens dieser Völkerschar. Zu Tausenden erheben sich die Kraniche mit andern Vögeln von den Schlammbänken des Nils in die Luft. Immer neue Vogelheere fallen der Kamera zur Beute. Adler und Geier, der Marabu, der heilige Ibis, der Reiher, der Storch, Sumpfvögel aller Art beleben die Landschaft und werden im Bilde festgehalten. Wenn die Bilder des Films vor den Augen des Beschauers dahingleiten, hastig, zu hastig, wenn den herrlichen Wunderbauten der Pharaonen die Wolken aufliegender Vogelscharen, dem Raubvögelmahl am gefallenen Großwild das reizvolle Ufertreten des Blaukehlchen und des Flußregenpfeifers folgt, wenn das Schilfdickicht der Uferläufe alle Geheimnisse tierischen Lebens in geradezu herrlichen Ansichten offenbart, dann wünscht, ja sehnt man sich danach, solche entzückenden Bilder eingehend betrachten und studieren zu können. Das wird nun bald möglich sein. Im November veröffentlicht Bengt Berg seine Forscherfahrten, die ihn von Lappland bis zum weißen Nile führten, in deutscher Sprache. Es ist erstaunlich, wie anschaulich, wie humorvoll, voller Liebe zum Tier, voller Kenntnis der Vogelseele der Schwede zu schildern versteht. Dazu gibt es eine reiche Auswahl der schönsten Filmaufnahmen in guten Wiedergaben. Wir Vogelfreunde müssen dem Forscher für diese Gabe von Herzen dankbar sein.

Alfred Troschütz.

Vom Vogelmarkt.

Von seltener auf den Vogelmarkt kommenden Vögeln werden angeboten:

C. Balser, Fulda, Zickengarten; 1 sprechender Bartsittich, blaublüt. Wellensittiche, tarant. Unzertrennliche, mex. Blaubürzel, Papst- und Indigofinken, Kanarienbastarde.

Beck, Tierimport, Stuttgart: Zitronenfinken (Fringilla citrinella).

Vogelexporthaus Joh. Götz, Neu-Ulm (Bayern): Tarant. Unzertrennliche, Feuerflügelsittiche, Toviisittiche, Müllers Edelpapagei (Tanygnathus mülleri), Zitronenfinken (Spinus citrinella).

W. Hiltmann, Berlin S 14, Dresdener Str. 24: Pirol, Weindrossel, Dorn- und Müllergrasmücken, Gartenrötel, Wiesenpieper, Hausrotschwanz, Alpenlerche, Heckenbraunelle, Blaukehlchen.

A. Schiebe, Zschopau i. S., Marienstr. 17 (A.Z.-Mtgl. 282) 1,1 Gouldamandinen, Mchn. rotköpf., Wbch. schwarzköpfig, 1,1 Maskengrasamandinen.

Max Töpfer, Bautzen, Wilthener Str. 13 II: 1 Paar Bussarde.

Herrn F. L., Oberkirch 1. „Vogelkleie" oder „Vogelgrieß", der in früherer Zeit vielfach zur Zubereitung von Weichfuttergemischen verwendet wurde, wird auf folgende Weise hergestellt: Vollkörniger, gut getrockneter Winterweizen wird in der Mühle gemahlen und dann der feinmehlhaltige Grieß mit einer gleichen Menge von feiner Weizenkleie gemischt. 2. Es handelt sich um den gemeinen Star, der in einem frostfreien ungeheizten Zimmer überwintert werden kann; an wärmeren Tagen kann ihm Badewasser gereicht werden. 3. Der unter den Rabenkrähenflügen beobachtete „roströte" Rabe könnte nur eine Rabenkrähe mit anormal gefärbtem Gefieder gewesen sein (Erythrismus).

Herrn Dr. Sch., Karlstadt a. M.; Herrn A. Sch., Leipzig; Herrn A. K., Anklam; A. Z. 41, Wien; Herrn R. Th., Altona; Herrn H. G., Koblenz: Beiträge dankend erhalten.

Herrn G. B., Nassau. 1. Ein Käfig für 1,1 Grakardinal muß etwa 75 × 35 ⊥ 50 cm groß sein. 2. Dieselbe Käfiggröße würde sich auch für 1,1 Fichtenkreuzschnabel eignen. 3. Für die Beherbergung der genannten Finkenvögel dürfte er auf keinen Fall kleiner sein. 4. Rübsen, Hafer, Spitzsamen, Mohn, Hirse zu gleichen Teilen. 2 und zu Hanf, einige Sonnenblumenkerne, Kiefern-, Erlen- Distelsamen.

Fräulein F. S., Frankfurt a. M. Es gibt keine sicheren Unterscheidungsmerkmale für die Geschlechter der Spitzschwanzamandinen. Das Weibchen ist gewöhnlich etwas kleiner. Die haarartig ausgezogenen Schwanzfederspitzen sollen meist länger sein, und der schwarze Kehlfleck soll geringere Ausdehnung haben.

Herrn F.-P., Oberaula. Im allgemeinen ist es nicht zu empfehlen, zwei Wachtelpaare, im vorliegenden Falle die mexikan. Baumwachtel und unsere Wachtel, in einem Raum zusammenzuhalten. Sollen Züchtungserfolge erzielt werden, so würde das Zusammenhalten der beiden Arten sicherlich zu Mißerfolgen führen.

(Fortsetzung auf der 2. Umschlagseite.)

hrgang 53 13. November 1924 Heft 39

DIE GEFIEDERTE WELT.

ZEITSCHRIFT FÜR VOGELLIEBHABER

Begründet von Dr. Karl Ruß

Herausgegeben von Karl Neunzig in Berlin-Hermsdorf

Inhalt:

Webervögel und Widafinken. Von A. Krabbe. (Fortsetzung.)
Von meinen Vögeln. Von Fritz Braun.
Neueinführungen und Seltenheiten. Von Karl Neunzig. (Fortsetzung.)
Eroten. Von S. Lichtenstaedt. (Fortsetzung.)
Sprechsaal - Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber, Sitz Leipzig - Bücher- und Schriftenschau - Vom Vogelmarkt - Redaktionsbriefkasten - Bevorstehende Vogelschauen - Aus den Verbänden - Aus den Vereinen.

Abonnement monatlich (4 Nummern) 1.50 Gm. — Einzelpreis des Heftes 50 Gpf.
vermittelt das nächste Postamt bzw. der zuständige Briefbote. / Postversand ab Burg Bez. Magdeburg.

reutz'sche Verlagsbuchhandlung / Magdeburg / Postschließfach 148

Bevorstehende Vogelschauen.

Berlin. Vogelschau des Landesverbandes Preußen von Mittwoch, den 19. Nov. bis Sonntag, den 23. Nov. 1924 in den Sophiensälen, Berlin C, Sophienstr. 17/18.

Landesverband Preußen: Vogelschau Berlin. Zu der vom 19.—23. November d. J. in Berlin stattfindenden Vogelschau machen wir alle evtl. auswärtigen Aussteller aufmerksam, daß eine Platzgebühr nicht erhoben wird. Wohl aber wird zur Bedingung gemacht, daß evtl. Aussteller, welche bisher dem Landesverbande nicht angeschlossen sind, sich bei Meldung als Aussteller auch gleichzeitig als Mitglied des Landesverbandes anmelden müssen, mit gleichzeitiger Zahlung des Jahresbeitrages von 3 M.

Ausstellungsobjekte sind Vögel, Käfige, Vogelfutter, Gerätschaften und Literatur, also alles, was mit unserer Vogelliebhaberei und -pflege Beziehung hat.

Bezüglich unseres Ausstellungskataloges mit seinem anhängenden Inseratenteil geben wir bekannt, daß die ganze Inseratenseite 20 M., die halbe 10 M., die viertel Seite 5 M. kostet. Meldeschluß für Aussteller und Katalog-inserenten ist der 5. November. Anmeldungen sind zu richten an den Vorsitzenden des Landesverbandes Herrn Franz Nyuke, Berlin O 34, Königsberger Str. 17.

J. A.: Paul Rükert.

Karlsruhe, Verein von Vogelfreunden. Gegr. 1888. Vogelschau u. Kanarienprämiierung am 6. u. 7. Dez. 1924.

Bayrischer Vogelliebhaberverein, Sitz München (E. V.) Ausstellung vom 6. bis 11. Dezember 1924, im „Hirschbräukeller", Zollstraße, München.

Dresden, Verein für Vogelschutz und -pflege. Ausstellung 20.—22. Dezember 1924.

Aus den Verbänden.

Verband deutscher Farben-, Gestalt-, Bastardkanarien- und Exotenzüchter und des Bayerischen Vogelliebhabervereins (e. V.) Sitz München, Ortsgruppe Augsburg. Jeden Samstag gemütliche Zusammenkunft beim Vogelwirt Joseph Leininger, Gasthof, Frohnhof—Pentingerstr. Jeden 1. Samstag im Monat Monatsversammlung ebendort. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. Als amtliches Vereinsorgan ist die „Gef. Welt" anerkannt worden.
J. A.: H. Schwaiger, 1. Vors., Augsburg, Schöpplerstr. 9/II.

Vereinigung der Vogelliebhaber Landesverband Sachsen und Groß-Thüringen, Sitz Leipzig. 1. Vorsitzender: Hermann Höhne, Leipzig-Volkmarsdorf, Eisenbahnstraße 84 II. 1. Schriftführer: Max Hunger, Leipzig-Gohlis, Polizeigebäude, Zimmer 196. Kassierer: Ludwig Böttcher, Leipzig, Inselstraße 7. Nachdem gegen den Beschluß des Vorstandes des Landesverbandes, die Beiträge von 1 M. auf 0,50 M. herabzusetzen, bis zum 15. 10. 24 kein Widerspruch erhoben worden ist, ist der neue Beitrag in Kraft getreten und sind in Zukunft nur noch 0,50 M. pro Mitglied an den Landesverband abzuführen. Zuviel gezahlte Beiträge werden entsprechend verrechnet. Ferner bitten wir noch zu leistende Zahlungen im Interesse einer gesunden finanziellen Gestaltung des Landesverbandes baldigst abführen zu wollen. Auch kleine Beiträge sind willkommen. Weiter werden die dem Landesverband angeschlossenen Vereine gebeten, die genauen Mitgliederlisten, enthaltend Name, Wohnort, Straße und Hausnummer jedes Mitgliedes, baldigst einsenden zu wollen. Die in Bälde erscheinenden Satzungen des Reichsverbandes sowie die Führung einer gewissenhaften Statistik über die Mitgliederbewegung im Landesverband erfordern diese Maßnahmen.

Max Hunger, Schriftf.

Verband deutscher Farben-, Gestalts-, Bastardkanarien- und Exotenzüchter (E. V.), Sitz München. Die September-Versammlung erledigte die gestellte Tagesordnung in gewohnt harmonischer Weise, obwohl der Besuch ein sehr schwacher war. Bevor in die Tagesordnung eingegangen wurde, verständigte der Vorsitzende die Mitglieder von dem Besuche des auswärtigen Mitgliedes Herrn Max Petzold, Dortmund, der bei Herrn Heinemann quartierte und auch von dort Zuchtmaterial erhielt. Wir lernten in Herrn Petzold einen überaus eifrigen Züchterkollegen kennen und hoffen, daß er an Hand seines hier bezogenen Materials eifrig für unsere schöne Sache im Rheinland werben wird. Als wichtigster Punkt wurden die schlechten Kassenverhältnisse erörtert und die an den Verbandskassierer Hrn. Pfaller zurückgegangenen Post-Nachnahmen einer Durchsicht unterzogen. Die Lasche der Beitragsleistung seitens der Mitglieder wirkt natürlich lähmend auf den ganzen Verwaltungsapparat, und ist dadurch auch ein regerer Verkehr mit den auswärtigen Mitgliedern ausgeschlossen. Hoffen wir über die schlechten wirtschaftlichen Verhältnisse balde hinwegzukommen und erwarten wir ein baldiges Aufleben auch in der Vereinstätigkeit. Einer Einladung der Augsburger Ortsgruppe des Deutschen Verbandes nachkommend, beteiligen wir uns bei der dortigen Weihnachtsfeier verbunden mit einer Vogelschau. Die Vorarbeiten hierzu werden baldigst eingeleitet, und erwarten wir von unseren Mitgliedern eine reichhaltige Beschickung der geplanten Ausstellung. Aus Mitgliederkreisen wurde verlautbart, die Augsburger Kollegen soviel wie möglich zu unterstützen, eine Ansicht, die wir ja alle vertreten. Ein Brief des Mitgliedes Petzold, Dortmund, brachte einen leisen Vorwurf — nie etwas von uns in die „Gef. Welt" zu lesen — ein Vorwurf um so mehr, da tatsächlich in dieser Hinsicht gesündigt wurde. Es wurde beschlossen, die Sitzungs- bzw. Versammlungsberichte allmonatlich in der „Gef. Welt" einzurücken, und hoffen dadurch unserer Pflicht Genüge zu leisten. In Punkt Ausstellung konnte nichts unternommen werden, da seitens der Weltbundesleitung eine offizielle Einladung an uns noch nicht ergangen ist.

Leop. Keidel, 1. Vors.

Aus den Vereinen.

Angemeldet sind die Herren Gutsbesitzer Schröter, Arnsfelde, Kreis Deutsch-Krone (Grenzmark); Alfred König, Untertürkheim bei Stuttgart, Cannstatter Str. 14; Hermann van den Bruck, Wesel, Fischmarkt 1. — Das Programm zur diesjährigen Hauptversammlung in Berlin am Bußtag, dem 19. November, lautet: Vormittags 9 Uhr Besuch der Vogelschau des Landesverbandes Preußen in den „Sophiensälen", Berlin C, Sophienstraße 17/18 (Stadtbahnhof-Börse). Treffpunkt im Ausstellungslokal. Nachmittags 2 Uhr: Gemeinsame Besichtigung des Zoolog. Gartens unter fachkundiger Führung des Herrn Dr. Heck. Versammlung bis spätestens 2½ Uhr im Kleinvogelhaus Abends 7½ Uhr Sitzung im Patzenhofer, Friedrichstr. 71, reserviertes Zimmer. (Untergrundbahn Friedrichstraße.) — Durch Mitglieder eingeführte Gäste sind willkommen. A. Krabbe, Anklam, Demminer Str. 10.

„Aegintha", Verein der Vogelfreunde zu Berlin. Unsere Sitzungen finden an jedem 1. und 3. Donnerstag im Monat, abends 8 Uhr, im Vortragssaal des Aquariums statt. Fast in jeder Sitzung belehrende Vorträge und Besprechungen unter gütiger Mitwirkung unseres verehrten Ehrenmitgliedes Herrn Dr. Heinroth. Gäste gern willkommen.
J. A.: O. Vorbrodt, 1. Schriftf., O 112, Scharnweberstr. 18.

Vereinigung der Liebhaber einheimischer Vögel zu Berlin. Sitzung jeden 2. Donnerstag nach dem 1. und 15. des Monats im Vereinslokal zum „Alexandriner", Alexandrinenstraße 37a. Gäste stets willkommen.
J. A.: P. Böhme, Schriftf., O 17, Rüdersdorfer Str. 69.

Alte Vereinigung der Vogelliebhaber zu Dresden. Versammlung jeden Freitag, abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Blasewitzer Hof". Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. J. A.: Matth. Meys, Schriftf.

Verein Vogelschutz u. -pflege zu Dresden. Versammlung jeden Donnerstag, abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Schillers Restaurant", Ecke Stifts- und Ehrlichstr. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. Bernhard Kühn, Vors.

Verein für Vogelschutz und -pflege zu Dresden. Gegr. 1906. (Vormals Vereinigung der Vogelliebhaber zu Dresden.) Vom 20.—22. Dezember d. J. veranstaltet genannter Verein in dem Saale des „Italienischen Dörfchens", Dresden, Schloßplatz, die zweite Vogelschau. Dieselbe wird das Gebotene der ersten in den „Annensälen" 1923, welche dem Verein, vor allem in finanzieller Hinsicht, guten Erfolg brachte, um vieles übersteigen. Alle Vogelliebhaber sind herzlich willkommen. J. A.: Bernhard Kühn, Vors.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei zu Hamburg. Sitzung jeden 1. u. 3. Dienstag im Monat in Hüttmanns Hotel, Poolstr. 22, abends 8¼ Uhr. Nächste Sitzung Dienstag, den 18. November 1924. Gäste sowie auch Exotenliebhaber stets willkommen. J. A.: Arnold Weber, 1. Vors.

(Fortsetzung auf der 3. Umschlagseite.)

Verein für Vogelschutz und -pflege Jena. Die am 1. November 1924 abgehaltene Versammlung war von 11 Mitgliedern und 3 Gästen besucht. 1. Der bisherige Schriftführer, Herr Borggreve, ist aus dem Verein ausgeschieden, zu seinem Nachfolger wird der Unterzeichnete gewählt, der die Wahl annimmt und dabei bemerkt, daß er über jede Versammlung einen kurzen Bericht veröffentlichen wird. 2. Vorgeführt wird der fingerzahme, sprechende Wellensittich des Unterzeichneten. 3. Herr Dr. Sack hält einen Vortrag über den Urvogel Archaeopterix. Der Vortrag wird durch einen Gipsabguß und gute Abbildung illustriert. 4. Zur Teilnahme an der Berliner Ausstellung am 19. November wird aufgefordert. Der unterzeichnete Schriftführer wird die Ausstellung besuchen und Bericht erstatten. Die Vereinsabende finden regelmäßig aller 14 Tage (Sonnabends) um 8 Uhr in der Wohnung des 1. Vorsitzenden, Herrn Jahn, Feodorastraße 7, statt. Jena besuchende Vogelfreunde treffen jeden Sonntag vormittag den Schriftführer, Feodorastraße 13 wohnhaft, an und sind zur Besichtigung von dessen Vogelstube herzlichst eingeladen. Adolf Voigt, Schriftf.

Verein von Vogelfreunden Karlsruhe. Gegr. 1888. Monatsversammlung jeden 1. Mittwoch im Monat. Lokal „Goldener Adler". Die diesjährige Vogelausstellung, verbunden mit Kanarienprämiierung, findet am 6. u. 7. Dez. statt. Außer Medaillen werden wertvolle Ehrenpreise vergeben. Zur Ausstellung werden nur Mitglieder unseres Vereins zugelassen. Bang, 1. Vorstand. Boppel, 1. Schriftf.

Verein der Vogelliebhaber Königsberg (Pr.). Sitzung jeden Freitag nach dem 1. u. 15. d. M., abends 8 Uhr im Vereinslokal „Kaiser-Kaffee", Kaiserstr., Ecke Schnürlingsstr. Gäste sind willkommen. J. A.: Ernst Reinholdt, 1. Vors.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig. Vereinssitzungen jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat im Vereinslokal „Bauers Brauereirestaurant", Täubchenweg. Nächste Sitzung Donnerstag, den 20. Novbr. Gäste stets willkommen. J. A.: Johann Birk, 1. Vors.

Verein der Vogelfreunde Leipzig-Plagwitz. Vereinslokal: „Gosenschlößchen", Leipzig-Plagwitz. Sitzungen an jedem 1. und 3. Montag des Monats, abends 8 Uhr. Vogelfreunde sind stets willkommen.
K. Scholtissek, 1. Vors., L.-Plagwitz, Lauchstädter Str. 30.

Verein der Vogelliebhaber zu Mannheim. Versammlung aller 14 Tage Samstag abend 8 Uhr im Vereinslokal „Restauration z. gold. Falken", S. 1. 17. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. J. Daubmann, 2. Schriftf.

Bayrischer Vogelliebhaberverein, Sitz München (E.V.). Jeden Samstag gesellige Zusammenkunft im Pschorrbräuhaus, Bayerstr. Jeden letzten Samstag im Monat Monatsversammlung im Vereinslokal ebendort. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. Rud. Engel, 1. Schriftführer.

„Ornis", Freie Bezugs-Vereinigung der Waldvogelliebhaber Deutschlands. Gegründet 1912. Auf vielseitigen Wunsch der alten Mitglieder wollen sich die Waldvogelliebhaber wieder in der „Ornis" zusammenschließen. Als amtliches Organ ist die „Gef. Welt" ausersehen worden, und werden die Artikel die früher in den „Ornis-Blättern" erschienen, in obiger Zeitschrift gebracht werden. Aus diesem Grunde bittet die Geschäftsführung um eifrige Mitarbeit, damit unserer Waldvogelpflege wieder der Platz eingeräumt wird, der ihr gebührt. Anmeldungen sind unter Beifügung von 2 M. an den Geschäftsführer zu richten; Mitglieder erhalten auf Mischfutterbestellungen 5% Rabatt. Mit treudeutschem Gruß Martin Sperling, Halle/S., Südstr. 49.

Verein für Vogelzucht, -schutz und -liebhaberei Torgau. Am 1. November 1924 fand im Lokal Stadt Magdeburg die Gründung des Vereins für Vogelzucht, -schutz und -liebhaberei statt. Kunstmaler Oskar Sprewitz nahm die Gründung vor und hielt einen zweckentsprechenden Vortrag. Es schlossen sich von 10 Erschienenen 8 sofort dem neuen Verein an, während zwei Kanarienzüchter gegen die Haltung von Waldvögeln opponierten und natürlich dem Verein fern bleiben wollen. Wir sind indessen überzeugt, daß die nächste Versammlung die doppelte Mitgliederzahl aufweisen wird.

Zoolog. Verein zu Zwickau i. S. Versammlung jeden Freitag nach dem 1. und 15. jeden Monats, abends 8 Uhr, im Restaurant „Zur Bleibe", Katharinenkirchhof. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen.
J. A.: Paul Schmidt, 1. Vors., Zwickau i. S., Bosenstr. 44.

Anzeigenteil

Die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 20 G.-Pf. berechnet. Aufnahme erfolgt gegen Voreinsendung des Betrages in Reichsgeld per Brief od. auf unseren Zahlstellen: Postscheckkonto: Magdeburg 3148, Wien 156 687, Bern III 4326, Prag: Creditanstalt d. Deutschen unter Angabe des Zweckes

Käfige u. Gerätschaften

Weichfresser-Käfige
a. 65 cm lang, fast neu, à 12 ℳ od. Tausch gegen guten [912
großen Papageienkäfig.
Lichtenstaedt, Berlin-Johannisthal.

Verkaufe:

Voliere 100×75×110 cm, 1 Nachtgall, 2 Gelbsp., 1 Gartengrasmücke, Rotkehlchen, 2 weißst. Blaukehlchen, da- 1 8 prakt. Käfige Wiener Art. Vögel nd Ia Männchen. Nur zusammen.
Paul Voßberg, Hamburg,
Müggenkampstraße 30. [913

Schlagnetze für Sperlinge, Amseln sw. 2.50 ℳ, für Tauben, Rebhühner sw. 4.50 ℳ. Nachn., bei Voreinsendung es Betrag. franko. [914] Fangnetzfabrik
t. E. A. Müller, Schlotheim Th. 3

Echten laubgrünen [915
Mistelleim
adellose Klebkraft, p. Kilo 6 ℳ, Proben ℳ gegen Voreins. spesenfrei empfiehlt
Anton Rösler, Warnsdorf i. Böh.

Vogel-Mistelleim

zum Fangen schädlicher Vögel, Ia klebend bei jeder Witterung, garantiert gebrauchsfähig, Dose 1,50 ℳ fr. von **A. Freitag Nchf., Frankenberg i. S. 6.** Wiederverkäufer hohen Rabatt. [916

Vogelliebhaber

sucht Stellung als Autobegleiter oder -pfleger bei selbstfahrendem Herrn zwecks späterer Ausbildung als Chauffeur. Off. erb. unt. **A. B. 100** an die Geschäftsstelle der „Gefiederten Welt". [918

Wer
in der „Gefiederten Welt" inseriert,
hat Erfolg!

Futtermittel

Vogelfutter [917
für **Kanarien, Waldvögel, Exoten, Papageien, Weichfresser.** Anerkannt bewährteste Mischungen auf Grund langjähriger Erfahrung. Liste 13 über Vogelfutter umsonst.
W. Göpel, Leipzig,
Tröndlinring 1. Telephon 14 958.
Bei Anfragen bitte auf die „Gefiederte Welt" Bezug zu nehmen.

Prima echte Harzer
Kanarien-Edelroller
vielseit. Tag- u. Lichtschläger aus meiner bekannten Feinzucht, ℳ 12, Ia Zuchtpärchen ℳ 15. Porto, Verpack. ℳ 4.
Feiner Harzer
Gebirgssommerrübsen,
nußsüße milde sauber gereinigte Kennerware 3,50 M. und Porto.
Rich. Heydenreich,
Bad Suderode 7 B, Harz.
Staatsmedaille, viele gold. Medaillen, seit 919] vielen Jahren an der Spitze.

Mehlwürmer

geg. Einsend. v. 2.—Rentenmark 1/4 Pfd. franko versend. **D. Waschinski & Co.,** Bieseuthal I (Mark). [920

Mehlwürmer Pfd. 6 ℳ, 6 Pfd. 36 ℳ frc. Nachn.
921] **Jeitner, Breslau,** Weinstr. 12.

[922] **Mehlwürmer,** reine Ware,
gegen Eins. von 1.75 ℳ 1/4 Pfd. franko.
Th Witte, Niederndodeleben b. Magd.

Verkaufe:

Eiersammlung

bestehend aus 60 heimischen Vogelarten, zusammen 200 Stück. Vertreten sind Eier von verschiedenen Falken, Krähe, Ziegenmelker, Eisvogel, Kuckuck, Pirol, Wiedehopf, Meisen usw. [923
Hoose, Grottkau, Schlesien.

Das Wichtel.

Auf Wanderungen kann man das Wichtel mitnehmen ohne zu fangen; man locke sich Vögel herbei: eine Freude ist es, dieselben zu beobachten. Gegen Einsendung von 1.50 ℳ franko. [924
Johann Fischer, Waldsassen,
Mitterteicherstr. 54. Ornis-Mtgl. 332.

Vögel

Großabnehmer für Waldvögel gesucht. [925
Angebote unter C. B. F. an die Geschäftsstelle der Ges. Welt erb.

1 Alexandersittich,
sehr zahm, mit Käfig 30 M, diverse bessere **einheimische Weichfresser mit Käfig** tauscht gegen Exoten, bevorzugt Weber. A. Z.-Mtgl. [926
Julius Sauer, Leipzig, Gewandg. 5.

Vorsänger und **pa. Zuchtmaterial** rein durchgezücht. Hohl- und Schockel-Stamm, 2 Staatsmedaillen, gebe preiswert ab. Am liebsten selbst kommen. [927
Paul Holzky, Cöthen IV

Gebe ab: [928
5 Zuchtpaare japanische Mövchen (braunbunt, gelbbunt) à Paar 15 M.
F. Reck, Sulingen in Hannover.

3 japan. Mövchen,
1 Paar Grauastrilde,
1 Paar Blauastrilde [929
geg. **Paar Zebrafinken od. Kubafinken** zu tauschen od. zu verkauf. 20 M.
Kunert, Offenbach/M., Senefeld. 77.

Junge Wellensittiche,
gr. kräftige Tiere aus Gartenvoliere v. imp. Zuchtp. pro Stück 8 M, ferner: **1,0 Flammenweber, 1,0 Oryxweber,** im Verf. begriffen, pro St. 12 M Versand inkl. Porto u. Verp. unter Garantie gesund. u. lebend. Ankunft. [930
Joh. Clauß, Grimma i. Sa.

Gebe ab:
1 Zuchtv. gelber Wellensittich 15 M
2 Männch. grüner „ à 6 M
6 Stck. gelbe Wellensittiche (6 Monate alt) à 5 M
Suche:
1 zuchtfähiges Weibchen grüner Wellensittich.
Edwin Pangritz, Zittau i. Sa., 931] Neustadt 9.

Gebe ab:
1,0 Platte . . . . . 10 M
1,0 Nachtigall . . . . . 15 M
1,0 Sperbergrasmücke . . 12 M
1,0 Blaukehlchen . . . . 10 M
1 u. 2 Jahre gekäfigt, unbestoßen. Rückporto. Am liebsten abholen. [932
Jenkel, Berlin-Halensee
Katharinenstr. 4, Gartenhaus.

Gebe ab:
1,1 Girlitz×Kanarien, Brut 1922,
1,1 Dominikaner-Kardinäle, völlig akklimatisiert. [933
Suche:
0,1 Zebrafink, 0,1 gr. oder gelben Wellensittich, 1,0 Isabellkanarie.
Tierarzt Wilckens,
Vogel (Taunus). A. Z.-Mtgl. 203.

Weißer Storch
wegen Umzug zu verkaufen.
Hans ist kerngesund, selten zahm, dies Jahr großgezogen, für Preis 70 M. Selbstabholer bevorzugt. [934
Vick, Hamburg, Grindelberg 3 a.

Exotische Ziervögel

Papageien u. Affen, einheimische Waldvögel sowie prima Kanarienvögel erhalten Sie stets in nur besten Exemplaren bei der bekanntesten und reellen Tierhandlung

E. W. Lenger, Berlin N 58

Schönhauser Allee 70 a.

Auf der diesjährigen II. Vogelschau in Berlin vom 19. bis 23. November 20 Meter großer Stand mit nur den auserlesensten Pfleglingen der Ornithologie. [935

Kanarien
hochfeine, tiefe tourenreiche
Harzer Edelroller
flotte Tag- und Lichtsänger.
Hähne Stück 15, 18 und 22 M,
Weibchen Stück 3 M.
Garant. für gesunde Ankunft, 6 Tage zur Probe, reelle Bedienung.
Vers. Nachn., Porto u. Verpack. 3.50 M.
P. Herold, Erfurt,
936] Schmidtstedter Ufer 24.

Zitronfinken
(Fringilla citrinella)
selten, Männch. St. 10 M, Weibch. St. 5 M
Tadellose Exemplare. [941
Beck, Tierimport, Stuttgart

Wellensittiche,
gr. diesj., eigene Zucht aus Importen, Stück 6 bis 7.50 M. [942
Fritz Lehmann, Wolmirstedt
(Bez. Magdeburg).

Bei Anfragen und Bestellungen bitten wir, sich auf die „Gef. Welt" zu berufen

0,2 grüne oder gelbe Wellensittiche,
garantiert Weibchen, gesucht
oder gebe dafür 1,2 Mille Fleur (Zwerghühner) oder 0,1 rote Truthenne, 1923.
Hermann Diez, Gut Mogger,
Kreis Sonneberg i. Thür. [937
Ornis-Mitgl. 335.

Verkaufe oder tausche gegen Exoten
ein gutes Zuchtp. grüne Wellensittiche, ein Zuchtp. gelbe, je P. 18 M und ein **Pärchen mex. Karmingimpel** 10 M. [938
Friedr. See, Frankfurt a. M.,
Bahnhofsplatz 8.

Steinkauz (Wichtel)
fingerzahm, für den Fang sehr geeignet, verkauft für 20 M.
v. d. Höh, Köln a. Rh,
Ulrichgasse 19. [939

Für Kenner!
Sprosser, 2jährig, hochfein, nordischer Durchzugsvogel, gesanglich abgehört, herrliche Touren, tadellos im Gefieder, gesunde Füße. [940
Frdr. Gust. Müller, Berlin SW61
Blücherstraße 61.

Wer tauscht mit
1,0 chin. Nachtigall, evtl. mit Käfig 943] 54 × 40 cm,
1,1 Sperlingspapageien, Ia, 1,1 gr. Wellensittiche, Ia Zuchtpaar, gegen sprechende Blaustirnamazonen oder andere größere Papageien oder auch andere Exoten. Zuschriften an
Guido Zech, Buchhalter,
Pöhla im Erzgebirge.

Verkaufe 3 ff. Rotkehlchen
à 6 M.
Garantie für gesunde u. lebende Ankunft. Keine Händlerware.
944] Verpackung 0.50 M.
Schulze, Zerbst (Anh.), Alte Brücke 34.

Steyrische Gebirgsschwarzplatten Stück von 10 M. an.
Gartengrasmücken St. von 12 M. an.
Rotkehlchen, lauter Wipfelsänger, Stück von 5 M. an.
Gartenrotschwanz St. von 4 M. an empfiehlt in altbekannter Güte
Frdr. Gust. Müller, Berlin SW61
Blücherstraße 61. [945
Porto und Verpackung 6 M.

Suche zu kaufen
2 Stück Zaunkönige im Gesang.
Oskar Sprewitz, Torgau,
Schloßstraße 12. [946

Tod aller Milben und Brut durch **„Milbal"** Garantie auf Erfolg!
Erstklassige Erfindung der chem. Industrie. Wirksam u. sparsam. Ausbrühen der Käfige fällt weg. 1/4 Liter ergibt 5 Liter und kann mehrmals Verwendung finden. 1/4 Liter 2.60 M. bei Voreinsendung des Betrages franko, bei Nachnahmegebühr extra versendet **A. Köhler, Cöthen-Kl., Anhalt** [947
Vertreter gesucht. Postscheckkonto: Magdeburg Nr. 9028.

Seltene Gelegenheit!
Blaudrosseln und **Steinrötel** abzugeben. Offerten gefl. nur mit Ausl. Rückporto unter **A. W.** an die Geschäftsstelle der „Gef. Welt". [948

1a Kanarienhecktweibchen, reingelbe à 4 M, gelbgescheckte u. grüngelbe à 3 M, 1,1 Stieglitz, zur Bastardz. geeig., 6 M, haltb. Prachtfinkenstrohnester, Kugelform, enges Schlupfloch, Dtzd. 6 M. [949
Linda Hirsch, Aubstadt (Unterfrk.)
A. Z.-Mtgl. 233, Ornis 318.

Fremdländische Stubenvögel, 5. Aufl. und **Einheimische Stubenvögel,** 6. Aufl., von Karl Neunzig, für 2/3 des Neupreises zu verkaufen (gebund., Ledereinband). [950
Alfred Klaus, Seifhennersdorf 179.

Vertausche
gespr. Sumpfhuhn u. kl. Bekassine, Ia präp., geg. lebende **Körnerfresser** oder **kl. Sittiche** u. a. [951
B. Happe, Senden, Westfalen.

33 Jahrgänge Zoolog. Garten, 22 gebunden, **15 Jahrg. Cabanis' Journal** à Jahrgang 2 M od. tausche auf feine Rassetauben Show Homer od. franz. Bagdetten, sowie **12 Bände geb. Naumann,** Mitteleuropäische Vögel, gegen Gebot. [952
Adolf Spitz, Elzach, Baden.

Vereinszeichen
Ia Emaille, **Festzeichen, Fahnennägel, Stempel usw., Fahnen u. Tischbanner, Fahnenschleifen u. Bänder,** nur Kunsthandstickerei. — Garantie. — **Kunstvolle Diplome** fertigt als Spezialität schnell und billig 953] **Emil Schulze,**
Weißer Hirsch (Sachs.)
Alter Hirsch 1, I.
Gegründet 1. Oktober 1881.

Beschwerden wegen Nichtzustellung der „Gefiederten Welt" sind beim zuständigen Postamt anzubringen.

Inserate
für das am **20. Nov. 1924** zur Ausgabe gelangende Heft 40 der Ges. Welt erbitten bis **15. Nov. 1924** früh.

Der heutigen Nummer liegt ein Prospekt der Firma Georg Schade Buchhandlung in Bad Salzuflen (Lippe) über Vögel der Heimat von Gustav Wolff bei, den wir unseren geehrten Lesern zur gefälligen Beachtung empfehlen.

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Berlin-Hermsdorf; für den Anzeigenteil: Rolf Kretschmann, Magdeburg, Postschließfach 148.
Verlag der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck: August Hopfer, Burg Bz. Mgdbg.

Goldkappentrupial — Icterus chrysocephalus (L.) Orangetrupial — Icterus jamacaii (Gm.)

Gartentrupial — Icterus spurius (L.)

Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Jahrg. 53 | Den 20. November 1924 | Heft 40

(Druckort: Burg, Bezirk Magdeburg.)

Webervögel und Widafinken.

Von A. Krabbe.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

I. Gattung Weißkopfviehweber — Dinemellia *Rchb.*

zwei Arten, beide eingeführt, nämlich Böhms Viehweber und

Weißkopfviehweber — Dinemellia dinemelli *(Rüpp.)*,

der folgende Färbung aufweist:

Kopf, Hals weiß; Rücken braun; Schulterfedern braun, weiß gesäumt; Ober- und Unterschwanzdecken feuerrot; Unterseite weiß; Schenkel schwarzbraun; Fleck am Flügelbug feuerrot; Flügeldecken braun, kleine und Handdecken dunkler, große außen weiß gesäumt; Schwingen dunkelbraun, Handschwingen außen weiß gesäumt; Armschwingen am Grunde weiß; Unterflügeldecken schwarzbraun; Schwanz schwarzbraun; Spitzensaum heller; Schnabel, Füße schwarzbraun; Auge braun; Länge 200 mm; Verbreitung Ostafrika, vom Somaliland und Schoa bis Usagara.

Die Nester stehen nach Philipp auf den äußersten Zweigen hoher Mimosen und sind, ähnlich denen des Büffelwebers, Klumpen dornigen Reisigs mit Eingang von unten her. Die Nisthöhle wird mit feinem Grase ausgelegt.

Ein Paar dieser stattlichen, so gar nicht an Weber erinnernden Vögel erhielt ich jüngst mit der letzten, bereits oben erwähnten Sendung von Ruhe. Das Weibchen ist von dem Männchen bei genauer Beobachtung an dem kleineren Kopf, der allgemein etwas geringeren Größe und dem kleineren weißen Flügelspiegel erkennbar; außerdem läßt es den bisher nur vom Männchen gebrachten Lockruf, der wie gliück, gliück klingt, nicht hören, bringt jedoch geängstige kurze Töne hervor. Ihr Benehmen erinnert so sehr an Stare, daß man sich an die Vögel erst gewöhnen und sich mit dem Gedanken vertraut machen muß, daß es eben keine Stare, sondern Weber sind. Mehlwürmer lieben sie sehr und erhalten neben diesen auch gequellte Ameisenpuppen, da sie mehr Kerbtier- als Körnerfresser sind. Hirse nahmen meine Viehweber bisher nicht, sondern nur Spitzsamen. Das Weibchen kränkelt, scheint sich aber langsam zu erholen, wenngleich es zeitweise am Tage mit untergestecktem Kopf ruht. Um die Käfiggenossen kümmern sie sich absolut nicht. Wären sie nicht so friedlich, so könnten sie mit ihrem starken Schnabel furchtbare Verheerungen anrichten. Aufgefallen ist mir ihre Dreistigkeit sowohl im Käfig als auch in der Voliere, denn nie toben sie bei meinen Hantierungen und nehmen auch in nächster Nähe ihres Pflegers die begehrten Mehlwürmer in Empfang. Ein starkes Badebedürfnis ist vorhanden, nach dessen Befriedigung sie es lieben, in der Sonne ihr Gefieder zu trocknen. Ich kann nach meinen bisherigen Erfahrungen den Weißkopfviehweber trotz seiner Größe wegen der Friedfertigkeit, des hübschen Gefieders und seiner Zutraulichkeit für größere Räumlichkeiten — im Käfig wirken diese Vögel nicht und erscheinen klobig —, warm empfehlen. Leider gibt es wenig Liebhaber dieser Vögel, ganz zu Unrecht, denn ein Zuchtversuch würde hochinteressant, der Mehlwurmverbrauch allerdings enorm sein. Abbildung s. S. 79. — Noch einen Viehweber kann ich erwähnen, nämlich den zur I. Gattung Viehweber — Textor *Tem.* gehörigen

Büffelweber — T. albirostris *(Vieill.)*,

auch Alektoweber genannt. Reichenow unterscheidet vier Büffelweber, nämlich den Büffelweber aus Nordostafrika (T. albirostris), den Somalibüffelweber aus Ostafrika (T. a. intermedius), den Senegalbüffelweber aus Nordwestafrika (T. a. senegalensis) und den südafrikanischen Buffelweber (T. niger). Die Färbung des ersten ist bei beiden Geschlechtern schwarz; die Wurzel der Körperfedern ist weiß und wird an den Körperseiten zuweilen sichtbar; mittlere Handschwingen schmal weiß außengesäumt; Innenfahne der Handschwingen zuweilen an der Wurzel weiß; Auge dunkelbraun; Schnabel rötlichweiß, Spitze schwärzlich; Füße hornbraun oder gelbbraun; Länge 220—240 mm. Eine Abbildung des südafrikanischen Büffelwebers, die der des oben genannten entspricht, ist beigegeben, Der Schnabel ist aber länger und erscheint infolgedessen schlanker und dünner. Fischer traf Nistkolonien dieses Webers Anfang März in der mit einzelnen Gruppen von Akazien bestandenen Ebene zwischen dem Paregebirge und dem Panganiflusse. Die Ansiedlungen waren 6—12 Paare stark. Unter lautem krächzenden Geschrei, das an das der Stare erinnerte, arbeiteten und spielten die Vögel bei den

Nestern. Diese sind an der Spitze oder auch in den Seitenzweigen der Akazienbäume angebracht und bestehen in einem wirren Haufen von dornigen Zweigen und trockenen Reisern, so daß die verschiedenen Nester oft zu einem großen Klumpen verbunden sind. Zu jedem Nest führt ein seitlicher Eingang. Das Innere besteht aus locker zusammengefügten Blütenstengeln von Gräsern.

Wenn man bedenkt, daß die Brutzeit im Frühjahr liegt, so kann das in meinen Besitz gelangte Exemplar nicht mehr im Brutkleid gewesen sein und infolgedessen einen aufgetriebenen Schnabel — das noch umstrittene typische Kennzeichen der Männchen zur Brutzeit — nicht gehabt haben, angenommen, daß der Vogel überhaupt ein Männchen war, was ich während der kurzen Zeit seiner Beobachtung — ein Liebhaber in Küllstedt wurde der Empfänger — nicht feststellen konnte. Sämtliche Büffelweber, die ich im Berliner Zoo sah, hatten ebenfalls keinen aufgetriebenen Schnabel und mehr Weiß im Gefieder. Es sind sehr schlanke, scheue Vögel, durchaus friedlich, mit starkem Bedürfnis nach Insektennahrung. Für die Haltung kommen der Größe des Vogels entsprechend nur große Räumlichkeiten in Frage; für den Käfig sind sie ungeeignet. Besondere Vorzüge dürften sie nicht aufzuweisen haben und ich befürchte, daß die jetzt mehrfach zum Stückpreis von 18 Mark und billiger angebotenen Büffelweber keine Liebhaber finden, trotz der Seltenheit, die sie immerhin darstellen. Zu den „Stuben"vögeln sind sie eben nur bedingt zu rechnen.

Hiermit schließe ich den ersten Teil meiner Arbeit. Ich besitze wohl noch einige weitere Weber, die in diesem Jahre noch nicht verfärbten und infolgedessen auch nicht bestimmt werden können. In der Weiterführung meiner Aufzeichnungen im nächsten Jahre hoffe ich in der Lage zu sein, auch hierüber zu berichten.

Die Widafinken, die wie eingangs erwähnt, mitsamt den Feuer- und Blutschnabelwebern den Webefinken — Spermestinae nahestehen, lassen sich in zwei scharf getrennte Gruppen zerlegen. Die eine Gruppe umfaßt die Gattungen Witwe — Vidua, Paradieswitwe — Steganura, Bandschwanzwitwe — Linura und Spatelschwanzwitwe — Tetraenura. Diese Widafinken unterscheiden sich von allen übrigen, die die zweite Gruppe bilden, dadurch, daß zur Brutzeit nicht der ganze Schwanz, sondern nur die mittelsten Schwanzfedern erneuert und als verlängerte Schmuckfedern getragen werden, während hingegen bei der zweiten Gruppe der Schwanz in einer Totalmauser abgestoßen und bei der Einfärbung ins Prachtgefieder durch einen verlängerten erneuert wird resp. durch einen normallangen bei der Ausfärbung. Normalen Verlauf der Mauser vorausgesetzt, erscheinen die Widafinken der ersten Gruppe niemals schwanzlos, was bei der zweiten des öfteren vorkommt, wenn sämtliche Federn gleichmäßig nachwachsen und die alten gleichzeitig herausstoßen. Die zweite Gruppe steht dem Benehmen und der Färbung nach den Feuerwebern nahe. Für die Prachtfinkenpfleger, die in der Exotenliebhaberei wohl das Hauptkontingent stellen, eignen sich besonders die vier Gattungen der ersten Gruppe. Ich führe deswegen diese zuerst an. Als Verbindungsglied kann ich die

K. Gattung Stahlfink — Hypochera *Bp.*

nicht übergehen, die nach Reichenow fünf Arten umfaßt, nämlich den Atlasfink, den Stahlfink, den blauen, purpurfarbenen und schwarzen Stahlfink aus den verschiedenen Gegenden Afrikas. Der gewöhnlichste ist der

Atlasfink — H. chalybeata *(St. Müll.)*,

der allen Liebhabern als einer der gemeinsten Käfigvögel hinlänglich bekannt ist. Seine Heimat ist Nordwestafrika, von wo er in Mengen mit den sogenannten Senegalfinken herüberkommt. Der hübsche Vogel mit blaugrünem Stahlglanz findet leider nicht die Beachtung, die die Schönheit seines Gefieders verdient. Im Käfig soll er einige unangenehme Eigenschaften haben, die störend wirken. In dieser Hinsicht kann ich nichts berichten, denn in der Voliere benimmt er sich so friedlich wie nur irgend einer. Unverfärbt ist er nicht so ruhig wie die Weber, sondern munter und in Bewegung. Die Verfärbung geht schnell und ohne Stocken vor sich. Auffallend ist der Gesang, der durchaus angenehm klingt, jedoch von lauten schäckernden Tönen durchmischt wird, die nur zu oft von den Mitbewohnern als Warnruf aufgefaßt werden und diese so zum Abfliegen vom Futtertisch oder den Nestern veranlassen. Aus diesem Grunde habe ich den Atlasfink schon oft verwünscht. Allmählich aber gewöhnen sich die übrigen Vögel auch hieran und achten meist nicht mehr auf ihn. Mein Exemplar liebt die Gesellschaft anderer nicht und hält sich allein. Die andern Gattungen des Stahlfinken gelangen selten auf den Vogelmarkt, und wenn sie einmal kommen, so werden sie auch wahrscheinlich nicht immer erkannt. In England werden zurzeit Stahlfinken aus Südafrika, jedenfalls H. amauropteryx (*Sharpe*) angeboten. Die abessinischen Transporte des nächsten Jahres werden vielleicht den blauen Stahlfink — H. ultramarina (*Gm.*) bringen, worauf ich die Liebhaber aufmerksam machen möchte. (Fortsetzung folgt.)

Heidelberg.

Von K. Neunzig.

(Nachdruck verboten.)

Wohl nie ist in Deutschland bisher eine „Ausstellung für Vogelschutz und Vogelpflege verbunden mit einer Vogelschau" zustande gekommen wie die, welche am 1. und 2. November in Heidelberg stattfand.

Wir sind daran gewöhnt, daß Vogelausstellungen von Verbänden oder Vereinen veranstaltet werden, deren große Mitgliederzahl das Gelingen der Veranstaltung gewährleistet. Auf diesen Ausstellungen wurde eine große Menge von Vögeln aus allen Breiten der Erde zur Schau gestellt, Angehörige der verschiedensten Gattungen und Arten, deren munteres Treiben, deren Gefiederpracht die Beschauer fesselte und deren Interesse in Anspruch nahm. Große Mengen von Käfigen der verschiedensten Formen wurden von Käfigherstellern und Händlern zur Schau gestellt, Futtermittel in großer Mannigfaltigkeit und allerlei mehr oder minder brauchbare Hilfsmittel und Gebrauchsgegenstände für Vogelpflege und Vogelschutz.

Durch Hinweise in den Tageszeitungen und buntfarbige Plakate an den öffentlichen Anschlagsäulen wird zum Besuch der Ausstellung eingeladen.

Ganz anders in dem schönen Heidelberg. Hier hatte ein einzelner, ein Mann der Wissenschaft und eifriger Vogelpfleger, Professor Dr. Otto Fehringer, in aller Seelenruhe, ohne viel Aufregung und ohne jeden größeren Apparat eine Ausstellung zustande gebracht, die so recht den Wünschen und Erwartungen begeisterter Vogelliebhaber entsprach.

Groß war die Zahl der Besucher aus den Kreisen der Bewohnerschaft Heidelbergs, besonders zahlreich war die Jugend vertreten. Der Besuch der Ausstellung stand jedem ohne Entgelt frei. Aber auch aus den nicht allzufernen Orten Badens, Hessens, Bayerns, aus der Pfalz und aus Preußen waren Vogelliebhaber herbeigeeilt, um zu schauen und an den mit der Ausstellung verbundenen Vorträgen, Aussprachen und Zusammenkünften teilzunehmen. Da traf man alte Bekannte aus Frankfurt a. M., aus

Südafrikanischer Büffelweber.

Worms und Speyer, Mannheim und Kaiserslautern usw. Aber auch von weither war so mancher gekommen.

Der Reichsverband der Vogelliebhaber war durch seinen unermüdlichen Vorsitzenden Birk und zwei weitere Vorstandsmitglieder vertreten. Freiherr Dr. Hans v. Berlepsch, wie immer bereit für die Sache des Vogelschutzes zu wirken, hatte auf Wunsch Fehringers einen Vortrag über „Wissenschaftlichen und natürlichen Vogelschutz mit besonderer Berücksichtigung der Land- und Forstwirtschaft" übernommen, welcher unter Vorführung von Lichtbildern am Sonntag, dem 2. November, vormittags im Kammerlichtspieltheater stattfand. Aber nicht nur als Vogelschützer nahm v. Berlepsch an der Tagung teil, sondern auch als Pfleger gefangener Vögel beteiligte er sich lebhaft an den abendlichen Zusammenkünften, an welchen eingehende Aussprachen über Vogelpflege, Käfige, Sitzstangen, Ernährung usw. stattfanden.

Für die Unterbringung und Versorgung der auswärtigen Gäste hatte Fehringer in musterhafter Weise Vorsorge getroffen, unterstützt von der überaus freundlichen Gastfreundschaft einiger Heidelberger Familien, nicht zuletzt seiner eigenen.

Nun zur Ausstellung selbst. Für die Ausstellung stand ein größerer Arbeitsraum des Zoologischen Instituts der Universität zur Verfügung, der sich sowohl seiner Lage nach wie durch seine Helligkeit für die Zwecke der Ausstellung vorzüglich eignete.

Beim Betreten des Raumes sah man auf Tischen längs einer Fensterwand die umfangreiche und reichhaltige Literatur über Vogelpflege, Vogelschutz und mancherlei ornithologische Werke ausgebreitet. An den Wänden hingen in Pastellfarbe ausgeführte Vogelbilder des Malers Aichele aus Pforzheim.

Daran schloß sich die Ausstellung v. Berlepschscher Nisthöhlen in den verschiedenen Größen und Formen. Längsdurchschnitte von Nisthöhlen zeigten ihren inneren Bau. Richtiges und falsches Aufhängen der Nisthöhlen wurde im Garten des Zoologischen Instituts veranschaulicht. Futtersteine, Futterhölzer waren ausgestellt. Apparate für die Winterfütterung, wie „Futterkrippe" und „Futterkasten", waren an den Wänden in vorgeschriebener Art, der „Fensterkasten" war an einem Fenster angebracht, die „Meisenglocke" an einem Baum des Institutsgartens. Hier fand auch ein „Hessisches Futterhaus" Aufstellung.

Die gegenüberliegende Wand zierte eine Reihe sachgemäß und geschmackvoll eingerichteter Aquarien, daneben eine Ausstellung von Futtermitteln für Samen- und Weichfutterfresser, das sog. „Heidelberger Vogelfutter" der Fa. A. Böcher u. Co., auf das ich später noch zurückkomme.

Auf einem besonderen Tisch waren ältere Käfigtypen aufgestellt, welche besonders zum Vergleich mit dem nach Fehringers Angaben gebauten neuen „Heidelberger Käfig" dienen sollten. Da sah man den aus Blech hergestellten, einst sehr beliebten Loreyschen Käfig, den alten mit seitlichen Erkern versehenen Frankfurter Insektenfresserkäfig, einen Nachtigallenkäfig von Rausch (Innenfütterung), den soliden Drosselkäfig von Paul Schindler mit gewölbter Decke, Käfige der Fa. Kühn und Muschter in Leipzig und die zierlichen Münchener Käfige sowohl mit Außen- wie mit Innenfütterung.

Die ausgestellten Vögel, sämtlich dem reichen Vogelbestand Prof. Fehringers entnommen, waren in

den neuen Heidelberger Käfigen, welche sich nur der Größe des zu beherbergenden Vogels entsprechend durch ihre Maße unterscheiden, untergebracht. Sie standen in leichten aus Eichenholz gefertigten Gestellen verschiedener Form, so wie sie im Hause Prof. Fehringers Aufstellung finden. Als einziger Aussteller von Vögeln konnte Herr Prof. Fehringer seine Absichten und Neigungen bei Auswahl der Ausstellungsobjekte voll zur Geltung bringen. Als Pfleger heimischer Vögel wollte er diese einmal in größerer Anzahl in hervorragenden gut befiederten nach jeder Richtung hin tadellosen Stücken den Beschauern vorführen, soweit es die Jahreszeit gestattete. Vögel, denen der Transport und die Unterbringung in der Ausstellung nachteilig sein konnte, blieben zu Hause.

So sahen wir denn 2 prächtige Gartenrotschwänze, ein junges und ein altes Männchen, je einen zwei- und einen dreijährigen Hausrotschwanz, ein schönes Rotkehlchen. Wiesenschmätzer waren in 4 Stücken vertreten, und zwar zwei braunkehlige und zwei schwarzkehlige, bei letzteren ein junges und ein älteres Männchen. Von den Grasmücken sah man mehrere Schwarzplättchen, darunter hervorragende Schläger, drei Gartengrasmücken, deren Gesang gleichfalls rühmenswert sein soll, eine Dorngrasmücke und eine sehr stattliche Sperbergrasmücke. Zwei Heckenbraunellen zeigten auch im Käfig die gewohnte Geschäftigkeit. Besonders hervorzuheben war die Kollektion der Würger und Drosseln. Unter den ersteren fiel ein sehr schönes Männchen des Raubwürgers auf, das außerordentlich zahm war. Rotkopf- und Rotrückenwürger waren in je zwei Exemplaren vertreten, bis auf einen Rotrückenwürger diesjährige Vögel. Von unsern Drosseln, welche zum Teil in mehreren Exemplaren vertreten waren, fehlte nur die Misteldrossel. Die Aufmerksamkeit der Beschauer erregte von allem ein in jeder Beziehung tadelloses Steinrötel, welches jetzt 10 Jahre im Besitz Fehringers ist. Sein Lebensalter wird auf 14—15 Jahre zu bemessen sein, denn schon beim Erwerb des Vogels zeigte die Hornbedeckung der Füße, daß es sich um einen mehrjährigen Vogel handelte. Distelfinken, Zeisige, Girlitz und Hänfling, ein Girlitzbastard, Gimpel und einige Karmingimpel vertraten die Körnerfresser. Ferner waren vorhanden Lerchen und Wachtel, und etwas im Verborgenen blühte ein schön ausgefärbter alter Pirol. Er war so unvorsichtig, sich noch kurz vor der Ausstellung das Schwanzgefieder etwas in Unordnung zu bringen. Seine Farbenpracht sollte aber doch zur Geltung kommen. Der Defekt wurde vom großen Publikum nicht bemerkt. (Schluß folgt.)

Der rotrückige Würger (Lanius collurio), seine Pflege, Sommer- und Winterernährung.

Von Karl Finck, Neukölln.

(Nachdruck verboten.)

In der Gefangenschaft findet man diesen schönen Vogel verhältnismäßig selten, einmal gilt er als besonders hinfällig, und dann wird sein Gesang sehr verschieden beurteilt. Während manche Liebhaber das Nachahmungstalent des Würgers ungemein hoch einschätzen, bezeichnen andere den Vortrag als minderwertig, kaum beachtenswert. Die Wahrheit liegt auch hier in der Mitte; es gibt nämlich alte Männchen, welche mit erstaunlicher Meisterschaft teilweise die Lieder anderer Vögel imitieren und alle Wiedergaben schön verweben. Das Geklirre der Stümper ist allerdings bedeutungslos. Sehr oft sind es junge Tiere, deren gesangliche Ausbildung noch nicht auf voller Höhe steht; sie lernen jedoch nach meiner Erfahrung im Käfig häufig Erstaunliches, wenn sie nacheinander verschiedene Sängerfürsten hören.

Übrigens spielt beim Würger der Herkunftsort eine erhebliche Rolle. Einzelne Gebiete beherbergen außerordentlich gute Sänger. Derartige Landstriche weisen keineswegs immer ein reichhaltiges Vogelleben auf, aber stets kommen zahlreiche Artgenossen vor.

Größerer Wettbewerb in der Paarungszeit fördert ohne Zweifel die Entwicklung des Mischgesanges. Dagegen scheint die Einwirkung zu vielseitiger Stimmen im gewissen Sinne verwirrend zu wirken, wenigstens eignet sich der Würger in der Gefangenschaft nur neue Imitationen klar an, sobald einzelne Vogellieder längere Zeit auf ihn einwirken.

Mein bester Würger, ein prachtvoll gefärbtes Exemplar, stammte aus einer sandigen Ackergegend, wo mannshohe Kiefern kleine Bestände bildeten; er begann bereits am dritten Tag nach dem Fange zu studieren und sein buntes Allerlei löste immer wieder meine Bewunderung aus. Regelmäßig fing dieser Künstler mit dem Liede der Feldlerche an, zuerst leise, wie verträumt, nachher voll selbstvergessener Seligkeit, dazwischen mischte er die leierartigen Weisen der Goldammer und das Schnurren des Rotschwänzchen. Dann ertönte helles Meisengetriller, das Schilpen mehrerer Feldsperlinge und die abgestuften Lockrufe eines Hänflingschwarmes. Sehr deutlich ahmte mein Liebling den Warnungsschrei des Eichelhähers nach, darauf folgte in der Regel das erregte Schackern einiger Elstern oder das Lärmen der abstreichenden Amsel. Silberklar kamen aus seiner Kehle die lieben süßen Melodien unseres Rotkehlchen. Aber auch Strophen aus den Liedern der Dorn- und Zaungrasmücke, des Sprachmeisters usw. fehlten nicht, ebenso hörte man oft deutlich kurzen Buchfinkenschlag und das harte Knarren des Rephuhnes. Selbstverständlich wurde die Reihenfolge beinahe ständig gewechselt. Abends, bei beginnender Dämmerung, vernahm ich stets den Gesang der Heidelerche, ungemein zart, voll herziger Innigkeit, nur die rauhen Lockrufe am Ende wirkten etwas störend.

Mich begrüßte der liebe Kerl stets mit eigenartigen Freudentönen und lebhaften Flügelschlägen. Allmählich wurde der Vogel ungemein zahm, flog zeitweise frei umher, saß am liebsten auf meinem Schreibtisch, wo er unermüdlich seine Kunst zum besten gab. Niemals bemerkte ich Bösartigkeiten, selbst dann nicht, wenn die aufgepäppelte Sumpfmeise ihm die fettesten Mehlwürmer wegnahm.

Damit das Können des talentvollen Spötters voll zur Geltung kam, hing der Käfig in einem besonderen Raum. Obwohl die Temperatur in den Winternächten oft auf 6° R sank, mauserte der Würger regelmäßig im Januar/Februar glatt durch,

fang bis August, selbst nachts, sobald die Stube erleuchtet wurde.

In der Gefangenschaft verlangt der Dorndreher eine sorgsame, gleichbleibende Pflege. Lebende Insekten bilden im Sommer bis in den Spätherbst hinein das geeignetste Futter. Bei einer naturgemäßen Ernährung — der Begriff ist allerdings dehnbar — zeigt selbst dieser Zärtling ziemliche Ausdauer.

Jede Lebensäußerung verursacht Stoffverluste, welche durch Nahrungsaufnahmen ausgeglichen werden sollen. Nun benötigt ein gefangener Vogel, da die Anstrengungen des schweren Daseinskampfes ausgeschaltet sind, im allgemeinen weniger Futter als in der Freiheit.

Genaue rezeptartige Hinweise sind ganz unmöglich, weil das Temperament des betreffenden Individuums, ferner die Größe des Käfigs, Wärme und Belichtung der Stube und noch andere Umstände den Stoffumsatz ungemein beeinflussen.

Afrikanische Kronenkraniche.
Abbildung aus dem Werk: Bengt Berg, Mit den Zugvögeln nach Afrika (s. S. 312).

Außerdem ist das Nahrungsbedürfnis zeitweise sehr verschieden, was namentlich in der Zugzeit zutrifft. Das Futterquantum soll immer der jeweiligen Körperbeschaffenheit angepaßt sein. Diese Maßnahme ist ebenso wichtig wie eine natürliche Ernährung. Häufig kommt es vor, das ein Vogel frühzeitig eingeht, nur weil infolge zu üppiger Verpflegung sich allmählich ohne Wissen des Besitzers eine ausgeprägte Fettsucht entwickelte.

Mäßige Überernährung kann man leicht ausgleichen, dagegen macht die Behandlung der ausgesprochenen Verfettung, wo bereits lebenswichtige Organe entartet sind, Schwierigkeiten und recht häufig verursachen Herzschwäche oder stürmische Darmkrankheiten einen frühen Tod.

Die Fettsucht beeinflußt ferner außerdem ungünstig den Federwechsel. Allem Anschein nach ist diese Krankheit mit einem anormalen Stoffwechsel verbunden.

Der Würger verzehrt im Freien hauptsächlich allerlei Käfer, Schmetterlinge, glatte Raupen, Hummeln, Bremsen, Wespen, Blumen- oder sonstige Fliegenarten, bevorzugt besonders Heuschrecken und die Feldgrille.

Gelegentlich greift er auch junge Mäuse und kleine Eidechsen auf. Nesträubereien scheinen dagegen kaum vorzukommen, wenigstens ist mir kein einziger Fall bekannt.

Die Nahrung wird bereits im Kropf extrahiert. Fast alle unverdaulichen Reste werden zusammengeballt als sogenanntes Gewölle ausgespien, daher sind bei einer normalen Verdauung die Exkremente mehr flüssig weich, niemals kompakt. Der Magen ist verhältnismäßig klein.

Mehlige Bestandteile erweichen wohl, passieren jedoch, wie die Jodprobe zeigt, unausgenützt die Verdauungsorgane, gehen leicht in Gärung über und verursachen dann Erweiterungen und Entzündungen der Därme. Aus diesem Grunde bleiben derartige Zusätze, ebenso geschabte Mohrrübe, am besten weg.

Unser Würger ist vorwiegend Insektenfresser. Vegetabilische Stoffe darf man bloß in ganz geringen Quantitäten dem Futter beisetzen, sie sollen gewissermaßen den Darminhalt der Kerfe ersetzen.

Wildfänge bekommen nach dem Eingewöhnen hauptsächlich frische Ameisenpuppen, außerdem verschiedene Insekten, namentlich Käfer und Schmetterlinge. Auch grüne unbehaarte Raupen sind empfehlenswert. Sorgsam ist darauf zu achten, daß die Nahrung immer genügend unverdauliches Material zur Gewöllbildung enthält, sonst erschlafft die Tätigkeit des Kropfes und der Ernährungsprozeß gerät in Unordnung. Roß-, Mai-, Juni-, Dung- (Aphodius fossor) und Getreidekäfer (Anisoplia fruticola) leben überall. Letztes Käferchen, ferner verschiedene Widder wie auch die Saatschnellkäferarten (Agriotes lineatus *L.*, A. sputator *L.*, A. striatus *Pz.*) bevölkern während der Roggenblüte die Ähren, von wo man sie mühelos in ein höheres Glas streichen kann, das mit einem größeren, genügend weitrohrigen Trichter abgedeckt ist.

Übrigens verschmäht der Würger nicht einmal die Buckelwanze (Tingis affinis), den Spitzling

(Aelia acuminata), die gestreifte Schön- die ungeflügelte Feuer- und sonstige Pflanzenwanzen, dagegen rührt er den gekörnelten Laufkäfer (Carabus cancellatus *Kl.*), den Banditen- oder Puppenräuber (Calosoma sycophanta *L.*), überhaupt die ganze Gruppe fast nie an. Auch die Schlupfwespen, Brakoniden und Evaniiden, werden nach meinen Beobachtungen von den Vögeln verschont.

In manchen Jahren treten die Schmetterlinge der Nonne (Liparis monacha), des Kiefernspinners (Gastropacha pini) und der Kiefereule (Trachea piniperda) massenhaft auf. Von den beiden zuerst angeführten Arten sitzen die Weibchen tagsüber träge an den Stämmen umher; ihre Erbeutung macht wenig Umstände und sie bilden im getrockneten Zustande ein vorzügliches Winterfutter. Dagegen erfordert das Abfangen der beweglichen Falter mit einem Netze größere Gewandtheit. Auch die Herausnahme benötigt Zeit. Viel einfacher ist das Abstippen der ruhenden Schmetterlinge mittels Leimspindel. Dazu eignet sich jeder trockene Grashalm, dessen eines Ende hakenförmig umgebogen wird. Die Bugstelle bestreicht man dünn mit Fliegenleim (eingedicktes Leinöl.) Der Anstrich muß selbstverständlich nach Bedarf erneuert werden, er soll stets mäßig sein, damit keine Verunreinigung der Falter entsteht. Noch vorzüglicher paßt als Spindel eine Gänsefeder, deren Schaft bis zur Spitze freigelegt wird, so daß eine kleine Fahne bleibt. Auf diese einfache Weise kann man an sonnigen Sommertagen ohne Anstrengung in wenigen Stunden eine große Anzahl Weißlinge, Taapfauenaugen, verschiedene Eulen, Nachtschmetterlinge und sonstige Schmetterlinge gewinnen. Die erbeuteten Tiere werden sofort durch kräftiges Eindrücken des Brustkorbes getötet. Stärkere Schmutzflecken sind zu entfernen. (Fortsetzung folgt.)

Kraniche fliegen zu Felde.
Abbildung aus dem Werk: Bengt Berg, Mit den Zugvögeln nach Afrika (s. S. 312).

Exoten.

Von S. Lichtenstaedt.

(Schluß.) (Nachdruck verboten.)

Meine Prachtfinkenvoliere.

Von meinen Prachtfinken ist dem freundlichen Leser recht wenig zu berichten. Zebrafinken, Möwchen, Spitzschwanzamandinen, Goulds und kleine Kubafinken lebten, ausgenommen harmlose Zänkereien, friedlich und zufrieden zusammen. Die Goulds mußte ich jedoch in den letzten Tagen entfernen, da das Männchen ein bösartiger Zänker war.

Er raufte seine Mitbewohner derartig, daß die Federn förmlich flogen, nur von den Spitzschwänzen erhielt er stets eine tüchtige Abfuhr.

Entzückende Kerle sind die kleinen Kubas. Sie haben sich in einer zum Verhältnis ihrer Größe riesigen Versandkiste ein unordentliches Nest gebaut, ohne aber ernstlich an ein Brutgeschäft zu denken.

Zebrafinken legten bereits zweimal, ohne zu brüten.

In Einzelkäfigen sitzen vier Paar Möwchen auf Eiern.

Meine große Papageiensammlung hatte zwei neue Mitglieder bekommen. Eine Blaustirn- und eine Doppelgelbkopfamazone. Erstere kaufte ich ihres fabelhaften Sprachtalentes halber, letztere als einen hervorragenden Sänger.

Leider war der Doppelgelbkopf neben seinen gesanglichen Fähigkeiten ein arger Schreier, und mußte aus diesem Grunde das Haus bald verlassen.

Die Blaustirn hat sich bis zum heutigen Tage zu einem außergewöhnlichen Vogel entwickelt, welche schon über hundert Worte spricht und eine Anzahl Lieder mit Klavierbegleitung singt. Unter anderm auch das entzückende Lied von der Titine:

„Ich suche dich, Titine, ich werd' dich ewig suchen,
Denn du bist die Rosine in meines Lebens Kuchen."

Venecin, ein neues Heilwasser.

In den letzten Monaten tauchte ein neues Heilwasser für Tiere und Menschen, speziell auch für unsere Stubenvögel auf.

Ich stehe im großen und ganzen derartigen Heilmitteln für unsere Lieblinge ziemlich skeptisch gegenüber. Ich habe z. B. mit homöopathischen Mitteln recht wenig, und mit anderen auch nicht viel mehr Erfolge erzielt. Da das Venecinwasser mir aber von verschiedenen Seiten empfohlen wurde, habe ich damit Versuche angestellt. Von der Fabrik (Forstchemische Werke, Joachimsthal, Uckermark) wurde mir ein größeres Quantum von dem Wasser liebenswürdigerweise zur Verfügung gestellt. In den von mir angewandten Fällen hatte es eine vorzügliche, teilweise sogar überraschende Wirkung.

Ein schwerkrankes Gouldsweibchen (Darmkatarrh) genas in kurzer Zeit, bei halbkahlen Zebrafinken erneuerte sich das Gefieder überraschend schnell, bei einem mir befreundeten Vogelhändler genasen eine Anzahl roter Kardinäle, welche in traurigem Zustande hier ankamen, nach dem Genuß des Wassers, und befiederten sich in kurzer Zeit ebenfalls.

Bei frisch ankommenden, schwächlichen Vögeln, welche zu Darmkrankheiten neigen, soll nach einwand freien Beobachtungen das Wasser äußerst günstig wirken. Gegen Legenot soll es ebenfalls vorzügliche Dienste tun. Ich selbst kann selbstverständlich ein abschließendes Urteil noch nicht fällen, da ich zum Glück wenig Versuchsobjekte besitze. Jedenfalls aber glaube ich beobachtet zu haben, daß das Gefieder der Vögel nach einer Venecinkur ein glänzenderes, volleres Aussehen erhielt.

Jedenfalls erhalten meine Tiere wöchentlich mehrmals Venecin zum baden und trinken, und ich möchte an dieser Stelle zu weiteren Versuchen mit dem Wasser anregen. Leider ist der Preis für dasselbe noch ein zu hoher, 1,50 Mark die Dreiviertelliterflasche. Für meine Vögel würde ein täglicher Verbrauch von 2—3 Flaschen in Frage kommen, eine Ausgabe, welche den „Vogeletat" bedeutend übersteigt. Man muß das Wasser natürlich in kleinen Gefäßen reichen, und im Käfig so stellen, daß eine Beschmutzung der Gefäße und des Wassers ausgeschlossen ist.

Wir haben natürlich in diesem Wasser selbst bei günstigster Beurteilung nur ein Heilmittel, nicht etwa ein Allheilmittel, denn wirklich schwere, hoffnungslose Krankheiten werden wohl auch durch das Venecin kaum geheilt werden. Jedenfalls scheint es als Kraftigungsmittel, besonders für frisch eingeführte Exoten gute Dienste zu leisten.

Hoffentlich kann ich dem freundlichen Leser in nächsten Artikeln von Zuchterfolgen berichten.

Marabu eine Schlange verzehrend.

Abbildung aus dem Werk: Bengt Berg, Mit den Zugvögeln nach Afrika (s. S. 312).

Kleine Mitteilungen.

Der **Bluthänfling** ist trotz vieler Feinde bei uns ein noch recht häufiger Vogel. Nach meinen langjährigen Beobachtungen in hiesiger Gegend ist der rotrückige Würger sein ärgster Feind neben dem Eichelhäher. Die jungen Hänflinge werden zahlreich eine Beute des Würgers. Schon wenn das Hänflingsweibchen noch brütet, sucht der Würger die Nähe des Nestes und beobachtet es. Zuweilen nimmt er auch schon die Eier. Meist wartet er, bis die Jungen geschlüpft sind, um eins nach dem andern zu holen. Wo Würger und Eichelhäher nisten, ist es mit der Kleinvogelwelt hier schlecht bestellt. Im Gesang nimmt der Bluthänfling unter unsern Körnerfressern die erste Stelle ein. Aus diesem Grunde und wegen seiner bei richtiger Pflege langen Lebensdauer im Käfig ist er ein so beliebter Stubenvogel. Ich besaß einen Bluthänfling über 18 Jahre. Er lebt im Käfig also wohl mindestens noch einmal solange wie in der Freiheit. Seine Verpflegung ist leicht. Rübsamen, etwas Mohn, Hanf und Spitzsamen genügen vollkommen. Ab und zu gebe ich ein Stückchen Apfel, im Sommer Kreuzkraut, Vogelmiere und ein zartes Salatblättchen. Im Herbst nimmt er gern halbreife Melde und Wegerichrispen. Frisches Trinkwasser darf nie fehlen. Je größer der Käfig, desto besser und desto ruhiger benimmt

er sich. Die Käfige hänge ich in Augenhöhe. Empfindlich ist er gegen Luftzug. An schlimmen Füßen, wie kürzlich ein Pfleger dieses Vogels schrieb, litt in meiner 30jährigen Liebhaberzeit noch kein Vogel, weder Körner- noch Insektenfresser. Ich führe das auf die Art der Sitzstangen zurück, die ich verwende. Ich verwende dazu nur das weiche Lindenholz und besonders gern die frischen jungen Ausschläge unten am Stamm der Linden. Die frische saftige Rinde dieser Zweige scheint geradezu wohltuend auf die Füße der Vögel zu wirken. Diese Sitzstangen werden möglichst oft erneuert. Daß alles sehr sauber gehalten werden muß, ist selbstverständlich für jeden Tierfreund, der Freude an seinen Pfleglingen haben will. Als Bodenbelag für den Hänflingskäfig gebe ich guten weißen Sand, dem ich eine Messerspitze Kochsalz beimische. Der Hänfling liebt es, etwas Kochsalz aufzunehmen. Aus diesem Grunde fehlt im Hänflingskäfig auch nie ein Stückchen Sepiaschale, die er gern beknabbert. Ein weiterer Vorzug des Blythänflings ist seine Eignung zur Mischlingszucht mit Kanarienweibchen. Diese Mischlinge sind harte Vögel und sehr gute Sänger. K. Krüger in E. bei Potsdam.

Vom Vogelmarkt.

Von seltener auf den Vogelmarkt kommenden Vögeln werden angeboten:

Beck, Stuttgart: Zitronenfinken (Fringilla citrinella).
Joh. Clauß, Grimma i. Sa.: 1,0 Flammenweber, 1,0 Oryxweber.
B. Happe, Senden, Westfalen: Gespr. Sumpfhuhn und kl. Bekassine.
v. d. Höh, Köln a. Rh., Ulrichgasse 19: Steinkauz (Wichtel).
Jenkel, Berlin-Halensee, Katharinenstr. 4, Gartenhaus: 1,0 Sperbergrasmücke, 1,0 Blaukehlchen.
Frdr. Gust. Müller, Berlin SW 61, Blücherstr. 61: Sprosser.
Julius Sauer, Leipzig, Gewandg. 5: 1 Alexandersittich.
Friedr. See, Frankfurt a. M., Bahnhofsplatz 8: Pärchen mex. Karmingimpel.
Vick, Hamburg, Grindelberg 3a: Weißer Storch.
Tierarzt Wilckens, Bogel (Taunus) (A. Z.-Mgl. 203): 1,1 Girlitz×Kanarien, 1,1 Dominikanerkardinäle.
A. W. an die Geschäftsstelle der „Gef. Welt"; Blaudrosseln und Steinrötel.



Herrn P. S., Weinsheim. Tirika- und Goldstirnsittich bedürfen eines Nistkastens von etwa 30 cm lichter Höhe, 17—25 cm lichter Weite, Flugloch etwa 5—8 cm Durchmesser. Ersterer hält sich gern an hellen Stellen der Vogelstube auf. Der Goldstirnsittich nagt ziemlich kräftig und kann in der Vogelstube vieles zerstören. Zur Aufzucht werden die bisher gereichten Samen auch aufgequollen gereicht, ferner gekochter Hafer, frische Ameisenpuppen, Eierbrot trocken oder erweicht, Milchsemmel, Gemisch von trockenen Ameisenpuppen, gequollenem Weißwurm, Eierbrot, geriebener Möhre, alles zu gleichen Teilen, wenn möglich halbreifen Samen von Getreide. Über Verträglichkeit mit Wellensittichen ist schwierig etwas zu sagen. Im allgemeinen können beide Arten gewandten, kleinen Vögeln wenig anhaben, aber gelegentlich zerbeißen sie diesen Vögeln doch einmal die Beine. Am besten ist es, jedes Paar allein in einem möglichst großen Behälter zu züchten.

Herrn K. F., Neukölln; Frl. L. H., Aubstadt; Herrn E. Sp, Oldenburg; Herrn E. K., Berlin; Herrn S. L., Berlin; Herrn Dr. L., Brüssel; Herrn A. J., Cöthen Beiträge dankend erhalten.

Herrn R. S., Weißenborn. Das Futter ist nicht von besonderer Güte. Es fehlt der wertvollste Bestandteil, den ein Ia Futtermitel enthalten soll, Ameisenpuppen und Weißwurm. Es enthielt reichlich Gebäck, Garnelenschrot und Karottengrieß. Einen scharfen Geruch konnte ich nicht wahrnehmen. Die im Futter befindlichen aus Futterbestandteilen bestehenden röhrenartigen Gebilde sind Kokons des Brotkäfers — Tenebrioides mauritanicus (*L.*), der im Mehl, mehlartigen Produkten, im Getreide, in Apothekerwaren und auch im Freien unter der Rinde der Bäume und im rotfaulen Holz vorkommt. Die in den Gehäusen steckenden Larven sind die wertvollsten Bestandteile des Futters, deren Beifügung allerdings von dem Hersteller nicht beabsichtigt war.

Herrn W. L., Pforzheim. Die Absicht, die Schamadrossel mit feingemahlenen, nur mit Möhrensaft durchfeuchteten Futterstoffen zu ernähren, wird voraussichtlich zu dem gewünschten Ergebnis führen. Statt des Möhrensaftes könnte ab und zu geschabter süßer Apfel verwendet werden. Beigaben von geschabtem, magerem, rohem Fleisch werden gute Dienste tun, vielleicht auch Darbietung von abgekochter guter Kuhmilch, die nicht gereicht werden darf, wenn das Futter mit Apfel zubereitet ist. Unter den gegebenen Umständen sollten nur frisch gehäutete Mehlwürmer gereicht werden. Die neugebildeten Federn dürfen nicht zerschlissen sein. Zurzeit läßt sich dagegen nichts anderes tun, als durch gute, d. h. richtige Ernährung dafür zu sorgen, daß der Organismus des Vogels imstande ist, in der Mauer des nächsten Jahres oder bei Verlust einer der zerschlissenen Federn normales Gefieder hervorzubringen.

Herrn B. H., Senden i. Westf. Der Weißkopfvieh-weber ist wohl ein schöner Vogel. Er eignet sich seiner Größe wegen aber nur für größere Flugräume. Sie erinnern in ihrem Gebaren an Stare, laufen und hüpfen viel am Boden umher, sind dreist und vertraut. Ihr dreisilbiger flötender Ruf erinnert an den der Regenpfeifer, ist laut und durchdringend. Seine Bewegungen sind, abgesehen von seinem Flug, ziemlich schwerfällig. In größeren Flugräumen, in denen er, soweit bekannt, nur gehalten wurde, zeigte er sich als harmlos. Um die Mitbewohner des Aufenthaltsraumes kümmerte er sich nicht. Das große Nest wird aus Grashalmen, Blättern und dergl. auf den äußersten Zweigen dorniger Bäume (Akazien, Mimosen) erbaut und der Zugang zu ihm mit dornigen Ästen verbaut. Der Käfig 150×55⊥80 cm wäre zur Beherbergung eines Paares ausreichend. Daß sie darin zum Nestbau schreiten, wäre möglich. — Die Behauptung, daß man abrichtungsfähige junge Gimpel schon im Nest bzw. an der Art des Nestbaues, in welchem sie erbrütet sind, erkennen könne, daß junge Gimpel aus Nestern, welche in der Hauptsache aus feinen Wurzeln, ohne Verwendung von Moos und Flechten, für die Abrichtung geeigneter seien, die andern für diesen Zweck aber wertlos, ist durch nichts begründet. Die Beobachtung, daß die kleinen Exemplare bei Vögeln, welche in der Größe variieren, bessere Sänger bzw. intelligenter seien als die größeren Nestgeschwister, ist eine verbreitete Ansicht. So sollen die kleinsten Starmännchen leichter lernen, die kleinsten Singdrosseln und Lerchen besser singen als größere.

Herrn F. B., Gera. Der Vogel war ein Männchen. Er ist einem Schlaganfall erlegen. Anscheinend ist der überlebende Vogel gleichfalls ein Männchen.

Herrn K. P., M.-Gladbach. Es ist nicht ratsam, die genannten insektenfressenden Vögel in dem Flugraum zu belassen. Der Gesang setzt unter den jetzigen Verhältnissen später ein, vielleicht auch gar nicht, und es gibt dann, sobald der Geschlechtstrieb rege wird, arge Raufereien. Außerdem wird es auch jetzt schon nicht möglich sein, den Frühjahrsmauserern Sumpfrohrsänger und Gartensänger die nötigen kräftigen Futtermengen zukommen zu lassen. Die anderen Mitinsassen des Flugraumes fressen gerne das Wertvollste fort. Außerdem wird es nötig sein, durch Beleuchten des Aufenthaltsraums die Zeit zur Nahrungsaufnahme zu verlängern. Es ist besser, diese Vögel in Einzelkäfigen zu halten, bis wieder die Gesangsperiode ihr Ende erreicht hat. Die Käfige könnten in demselben Raum verbleiben.

Herrn G. V., Schlawe. Der Gimpel kann mit dem Kanarienweibchen in den Käfig von angegebener Größe untergebracht werden. Es ist aber weder dem Gimpel noch dem Kanarienweibchen zuträglich, wenn sie viel Hanf verzehren. Die Hanfgabe muß in jedem Fall sehr eingeschränkt werden. Alles, was der Gimpel sonst an Futter erhält, können die Kanarienweibchen ohne Nachteil auch fressen.

Bevorstehende Vogelschauen.

Vogelschau des Landesverbandes Preußen.

Auf die vom 19.—23. November d. J. zu Berlin, Sophienstraße 17/18, stattfindende 2. große Vogelschau machen wir Vogelliebhaber und Interessenten nochmals aufmerksam. Wir glauben auf Grund der eingegangenen Schaumeldungen versichern zu können, daß diese Vogelschau an Reichhaltigkeit und Vielseitigkeit nichts zu wünschen übriglassen wird.

Bezüglich unserer Mitteilung betr. Stiftungen für die Vogelschau ist zu berichtigen, daß nicht Herr W. Lenger, sondern der „Verband der Vogelhändler und verwandter Berufsgenossen" E. V. 30 Mark gestiftet hat.

J. A.: P. Rükert.

Bayrischer Vogelliebhaber-Verein E.-V. Sitz München. Der Bayrische Vogelliebhaber-Verein hält vom 6.—11. Dezember im „Hirschbräukeller", München, Zollstraße, eine Vogelschau ab, in Verbindung mit der Weltbundesgruppe Oberbayern E. V. und dem Verband deutscher Farben-, Gestalts-, Bastardkanarien- und Exotenzüchter E. V. Der Zweck der Ausstellung dürfte ja allgemein sein, soll doch das Münchner Publikum für unsere heimische Avifauna interessiert und auch der Käfighaltung das übliche Vorurteil genommen werden. Es sind auch die Münchner Mittel- und Volksschulen aufgefordert, die Ausstellung an Wochentagen unter Führung der Lehrkräfte zu besuchen, um schon in den Kindern den Sinn für unsre heimische Vogelwelt zu wecken. Der Katalog, der mit einem farbigen Umschlagbild von dem Künstlermitglied A. Viegelmann geschmückt ist, dürfte durch seine Aufmachung und seinen Inhalt dauernden Wert behalten und ist Inferenten noch Gelegenheit geboten, sich durch Aufgabe eines Inferates einen Platz zu sichern. Günstige Umstände erlauben uns, außerordentlich günstige Inseratenpreise anzusetzen, und berechnen wir für die ganze Seite 8 M., für die halbe Seite 4 M. und die viertel Seite 2 M. Meldeschluß für den Inseratenteil am 20. November. Auffchluß in allen Fragen erteilt: Leopold Keidel, München, Schraudolfstraße 44 III.

Verband deutscher Farben-, Gestalt-, Bastardkanarien- und Exotenzüchter, E.-V. Sitz München. Der Verband hält vom 6.—11. Dezember in München eine Ausstellung mit Prämiierung ab, und zwar mit dem Bayrischen Vogelliebhaber-Verein E.-V. und der Weltbundesgruppe Oberbayern E. V. Wir lassen an alle auswärtigen Mitglieder hierzu Einladung ergehen und bitten eventl. Aussteller, sich zwecks Überfendung des Programms mit Herrn Max Pfaller, München, Auenstraße 78 I, in Verbindung zu setzen.

Die Verbandsleitung.

Karlsruhe, Verein von Vogelfreunden. Gegr. 1888. Vogelschau u. Kanarienprämiierung am 6. u. 7. Dez. 1924.

Dresden, Verein für Vogelschutz und -pflege. Ausstellung 20.—22. Dezember 1924.

Aus den Verbänden.

Verband deutscher Farben-, Gestalt-, Bastardkanarien- und Exotenzüchter und des Bayerischen Vogelliebhabervereins (e. V.) Sitz München, Ortsgruppe Augsburg. Jeden Samstag gemütliche Zusammenkunft beim Vogelwirt Joseph Leininger, Gasthof, Frohnhof—Peutingerstr. Jeden 1. Samstag im Monat Monatsversammlung ebendort. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. Als amtliches Vereinsorgan ist die „Gef. Welt" anerkannt worden.

J.A.: H. Schwaiger, 1. Vors., Augsburg, Schöpplerstr. 9/II.

Aus den Vereinen.

Angemeldet ist Frau Martha Schirmer, Beuthen, O./Schl., Solgerstr. 17. — Aufgenommen sind die Mtgl. Nr 59 n Herr Gutsbesitzer Schröter, Arnsfelde, Kreis Deutsch-Krone (Grenzmark); Mtgl. Nr. 62 n Herr Alfred König, Untertürkheim bei Stuttgart, Cannstatter Str. 14; Mtgl. Nr. 66 n Herr Hermann van den Bruck, Wesel, Fischmarkt 1.

A. Krabbe.

„Aegintha", Verein der Vogelfreunde zu Berlin. Sitzung jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat, abends 8 Uhr, im Vortragssaal des Aquariums. Fast in jeder Sitzung belehrende Vorträge und Besprechungen unter gütiger Mitwirkung unseres verehrten Ehrenmitgliedes Herrn Dr. Heinroth. Gäste gern willkommen.
J. A.: O. Vorbrodt, 1. Schriftf., O 112, Scharnweberstr. 18.

Vereinigung der Liebhaber einheimischer Vögel zu Berlin. Sitzung jeden 2. Donnerstag nach dem 1. und 15. des Monats im Vereinslokal zum „Alexandriner", Alexandrinenstraße 37 a. Gäste stets willkommen.
J. A.: P. Böhme, Schriftf., O 17, Rüdersdorfer Str. 69.

Alte Vereinigung der Vogelliebhaber zu Dresden. Versammlung jeden Freitag, abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Blasewitzer Hof". Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. J. A.: Matth. Meys, Schriftf.

Verein Vogelschutz u. -pflege zu Dresden. Versammlung jeden Donnerstag, abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Schillers Restaurant", Ecke Stifts- und Ehrlichstr. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. Bernhard Kühn, Vors.

Verein für Vogelschutz und -pflege zu Dresden. Gegr. 1906. (Vormals Vereinigung der Vogelliebhaber zu Dresden.) Vom 20.—22. Dezember d. J. veranstaltet genannter Verein in dem Saale des „Italienischen Dörfchens", Dresden, Schloßplatz, die zweite Vogelschau. Dieselbe wird das Gebotene der ersten in den „Annensälen" 1923, welche dem Verein, vor allem in finanzieller Hinsicht, guten Erfolg brachte, um vieles übersteigen. Alle Vogelliebhaber sind herzlich willkommen. J. A.: Bernhard Kühn, Vors.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei zu Hamburg. Sitzung jeden 1. u. 3. Dienstag im Monat in Hüttmanns Hotel, Poolstr. 22, abends 8¼ Uhr. Nächste Sitzung Dienstag, den 2. Dezember 1924. Gäste sowie auch Exotenliebhaber stets willkommen. J. A.: Arnold Weber, 1. Vors.

Verein für Vogelschutz und -pflege Jena. Die Vereinsabende finden regelmäßig aller 14 Tage (Sonnabends) um 8 Uhr in der Wohnung des 1. Vorsitzenden, Herrn Jahn, Feodorastraße 7, statt. Jena besuchende Vogelfreunde treffen jeden Sonntag vormittag den Schriftführer, Feodorastraße 13 wohnhaft, an und sind zur Besichtigung von dessen Vogelstube herzlichst eingeladen. Adolf Voigt, Schriftf.

Verein von Vogelfreunden Karlsruhe. Gegr. 1888. Monatsversammlung jeden 1. Mittwoch im Monat. Lokal „Goldener Adler". Die diesjährige Vogelausstellnng, verbunden mit Kanarienprämiierung, findet am 6. u. 7. Dez. statt. Außer Medaillen werden wertvolle Ehrenpreise vergeben. Zur Ausstellung werden nur Mitglieder unseres Vereins zugelassen. Bang, 1. Vorstand. Boppel, 1. Schriftf.

Verein der Vogelliebhaber Königsberg (Pr.). Sitzung jeden Freitag nach dem 1. u. 15. d. M., abends 8 Uhr im Vereinslokal „Kaiser-Kaffee", Kaiserstr., Ecke Schnürlingsstr. Gäste sind willkommen. J. A.: Ernst Reinholdt, 1. Vors.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig. Vereinssitzungen jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat im Vereinslokal „Bauers Brauereirestaurant", Täubchenweg. Nächste Sitzung Donnerstag, den 20. Novbr. Gäste stets willkommen. J. A.: Johann Birk, 1. Vors.

Verein der Vogelfreunde Leipzig-Plagwitz. Vereinslokal: „Gosenschlößchen", Leipzig-Plagwitz. Sitzungen an jedem 1. und 3. Montag des Monats, abends 8 Uhr. Vogelfreunde sind stets willkommen.
K. Scholtissek, 1. Vors., L.-Plagwitz, Lauchstädter Str. 30.

Verein der Vogelliebhaber zu Mannheim. Versammlung aller 14 Tage Samstag abend 8 Uhr im Vereinslokal „Restauration z. gold. Falken", S. 1. 17. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. J. Daubmann, 2. Schriftf.

Bayrischer Vogelliebhaberverein, Sitz München (E.V.). Jeden Samstag gesellige Zusammenkunft im Pschorrbräuhaus, Bayerstr. Jeden letzten Samstag im Monat Monatsversammlung im Vereinslokal ebendort. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. Rud. Engel, 1. Schriftführer.

Zoolog. Verein zu Zwickau i. S. Versammlung jeden Freitag nach dem 1. und 15. jeden Monats, abends 8 Uhr, im Restaurant „Zur Bleibe", Katharinenkirchhof. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen.
J. A.: Paul Schmidt, 1. Vors., Zwickau i. S., Bosenstr. 44.

„Ornis", Freie Bezugs-Vereinigung der Waldvogelliebhaber Deutschlands. Gegründet 1912. Auf vielseitigen Wunsch der alten Mitglieder wollen sich die Waldvogelliebhaber wieder in der „Ornis" zusammenschließen. Als amtliches Organ ist die „Gef. Welt" ausersehen worden, und werden die Artikel, die früher in den „Ornis-Blättern" erschienen, in obiger Zeitschrift gebracht werden. Aus diesem Grunde bittet die Geschäftsführung um eifrige Mitarbeit, damit unserer Waldvogelpflege wieder der Platz eingeräumt wird, der ihr gebührt. Anmeldungen sind unter Beifugung von 2 M. an den Geschäftsführer zu richten; Mitglieder erhalten auf Mischfutterbestellungen 5% Rabatt. Mit treudeutschem Gruß Martin Sperling, Halle/S., Südstr. 49.

Empfehlenswerte Bücher:

Für Freunde der heimischen Vogelwelt.

Die deutsche Vogelwelt nach ihrem Standort. Ein Beitrag zur Zoogeographie Deutschlands und zugleich ein Exkursionsbuch zum Kennenlernen der Vögel. Von Werner Hagen. Mit 74 Abbildungen und 4 Schwarzdrucktafeln. Kart. 8.— M.

Die einheimischen Stubenvögel, ihre Naturgeschichte und Zucht. Von Karl Neunzig (zugleich 6. Auflage des Dr. Karl Rußschen Handbuchs für Vogelliebhaber Band II). Mit 22 Farbentafeln und 188 Textabbildungen. Geh. 14.—, geb. 17.— M.

Die gefiederten Sängerfürsten des europäischen Festlandes, ihre Naturgeschichte, sachgemäße Käfigung, Behandlung und Pflege als Stubenvögel. Von Mathias Rausch. 2. Auflage. Mit 3 Farbendrucktafeln und 16 Textabbildungen. Kart. 3.— M.

Die Hauptregeln der Sprosserpflege. Scherzreime von Oskar M. Kisch. Mit 2 Abbildungen. 1.— M.

Der Dompfaff, seine Naturgeschichte, Pflege, Abrichtung und Zucht. Auf Grund 54jähriger Erfahrung von F. Schlag. 8.—10. Auflage. Mit 2 Schwarzdrucktafeln. Kart. 1.— M.

Die deutschen Sumpf- und Strandvögel. Von Dr. Curt Floericke. Mit 44 Abb. auf 15 Tafeln in Schwarzdruck. Kart. 4.50 M.

Die deutschen Schwimm- und Wasservögel. Von Dr. Curt Floericke. Mit ca. 45 Abb. auf 15 Tafeln in Schwarzdruck. Kart. 4.50 M.

Die mitteleuropäischen Vögel. Von Dr. E. Bade. Band I. Singvögel. Mit 1 Farbentafel, 4 Schwarzdrucktafeln, 31 Tafeln in Photographiedruck u. 144 Textabbild. von Nestern, Eiern u. Vogelteilen. Geb. in Ganzleinen 5.— M.

Allerlei sprechendes gefiedertes Volk. (Raben- und Krähenvögel, Staruögel usw.) Ein Hand- und Lehrbuch von Dr. Karl Ruß. Mit 5 Vollbildern in Schwarzdruck. Kart. 3.— M.

Gefiederte Hausfreunde I. Von Karl Neunzig. Kurze Unterweisung üb. d. Pflege heimischer Stubenvögel. Kart. 1.— M.

Die Fänge der Raubvögel Mitteleuropas. Von Prof. Dr. Carl R. Hennicke. Mit 33 lithogr. Tafeln. Kart. 5.— M.

Für Liebhaber fremdländischer Vögel.

Die fremdländischen Stubenvögel, ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht. Von Karl Neunzig. (Zugleich 5. Auflage des Dr. Karl Rußschen Handbuchs für Vogelliebhaber Band I.) Mit 42 Farbentafeln und 400 Textabb. Geh. 30.—, geb. 35.— M.

Die fremdländischen Weichfutterfresser (Insekten- od. Kerbtierfresser, auch Wurmvögel genannt, Frucht- od. Beerenfresser u. Fleischfresser). Mit Anhang: Tauben- und Hühnervögel. Von Dr. Karl Ruß. (Die fremdländischen Stubenvögel Bd. II.) Mit 10 Farbentafeln. Geh. 30.— M.

Gefiederte Hausfreunde II. Von Karl Neunzig. Kurze Unterweisung über die Pflege fremdländischer Stubenvögel. Mit 51 Abbildungen. Kart. 1.— M.

Dr. Karl Ruß, Die fremdländischen Stubenvögel, ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.
Bd. I—IV. Geh. 150.— M., in Halbleder geb. 175.— M.
Bd. I. Körnerfresser ist einzeln nicht käuflich.
Bd. II. Weichfresser. Geh. 30.— M. Bd. III. Papageien. Geh. 30.— M.
Bd. IV. Lehrbuch d. Stubenvogelpflege. Geh. 40.— M.

Webervögel und Widafinken, ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht. Von Dr. Karl Ruß. Kart. 3.— M.

Bilder aus der Vogelstube. Schilderungen aus dem Leben fremdl. u. einheim. Stubenvögel. Von Dr. Karl Ruß. Kart. 3.— M.

Für Papageien-Pfleger.

Die Papageien, ihre Naturgeschichte, Pflege, Züchtung und Abrichtung. Von Dr. Karl Ruß. (Die fremdländ. Stubenvögel Bd. III.) Mit 10 Farbentafeln. Geh. 30.— M.

Der Wellensittich, seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht. Von Dr. Karl Ruß. Sechste, von Karl Neunzig gänzlich umgearbeitete und vermehrte Auflage. Mit 1 Farbendrucktafel und 31 Textabbildungen. Kart. 2.50 M.

Sprechende Papageien. Ein Hand- u. Lehrbuch von Dr. Karl Ruß. 3. verb. Aufl. Mit 2 Farben- u. 32 Schwarzdrucktaf. Kart. 4.50 M.

Der Graupapagei, seine Naturgeschichte, Pflege, Abrichtung und Züchtung. Von Dr. Karl Ruß. 2. von Karl Neunzig bearbeitete Auflage. Mit einem buntfarbigen Aquarelldruck, 16 Textabbildungen und 1 Verbreitungskarte. Kart. 2.50 M.

Der Graupapagei in der Freiheit und in der Gefangenschaft. Von Dr. Carl R. Hennicke. Mit 1 Buntbild. Geh. 1.50 M.

Die Amazonen-Papageien, ihre Naturgeschichte, Pflege, Abrichtung und Züchtung. Von Dr. Carl Ruß. 2. von Karl Neunzig bearbeitete und vermehrte Auflage. Mit 1 buntfarbigen Aquarelldruck und 21 Textabbildungen. Kart. 2.50 M.

Behandlung und Heilung der Krankheiten von grauen und grünen Papageien. Von O. Majewski. Geh. 1.— M.

Für Kanarienzüchter.

Der Kanarienvogel, seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht. Von Dr. Karl Ruß. 14. Aufl. mit 3 Farbentaf. u. zahlreich. Textbild Bearb. u. herausgeg. von Karl Neunzig. Kart. 2.50 M.

Die Bastardkanarienvogelzucht. Von Walter Barth. Mit 20 Abbildungen und 1 Tontafel. 1.50 M.

Die Farben- und Gestaltskanarien nebst Beschreibung aller verschied. Kanarienrassen, deren Entstehung, Form- u. Farbenveränderung, Bastardzucht und Farbenfütterung von A. Aschenbrenner. Mit vielen stichhaltigen Abbildungen. 1.75 M.

Der Kanariengesang. Allgemeinverständliche sowie musikalische und phonetische Darstellung von W. Kluhs. 1.— M.

Für Vogelschutz.

Handbuch des Vogelschutzes. Von Prof. Dr. C. Hennicke. Mit 9 Doppeltontaf., 1 Karte u. mehr als 200 Textabbild. Geh. 8.— M., geb. 10.— M.

Für Geflügelzüchter.

Der Brutapparat in der Geflügelzucht. Darstellung der Herkunft, Bauart, Nutzanwendung und Herstellung des Brutapparates. Von Max Schwarzlose. Mit 10 Abb. im Text. 1.— M.

Für Sammler.

Der Präparator und Konservator. Eine praktische Anleitung zum Erlernen des Ausstopfens, Konservierens und Skelettierens von Vögeln und Säugetieren. Für Naturfreunde herausgegeben von Rob. Voegler. 4. verb. und erweiterte Auflage. Mit 38 Abbildungen im Text. 2.— M.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg

Postschließfach 148

Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Jahrg. 53 | Den 27. November 1924 | Heft 41

(Druckort: Burg, Bezirk Magdeburg.)

Webervögel und Widafinken.

Von A. Krabbe.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Findet man beim Händler einmal Atlasfinken mit korallrotem Schnabel, so kann man gewärtig sein, einen sehr seltenen Vertreter der

L. Gattung Witwe — Vidua *Cuv.*,

die aus zwei Arten besteht, vor sich zu haben, nämlich die

Glanzwitwe — V. hypocherina (*Verr.*),

auch langschwänziger Atlasfink geheißen. Die Färbung dieses in Ostafrika vom südlichen Abessinien bis Ugogo beheimateten zierlichen Vogels ist schwarz mit stahlblauem Glanz; jederseits des Bürzels ein von den Flügeln verdecktes Büschel seidenweicher weißer Federn; Unterflügeldecken weiß; innerste Schwingen stahlgrün glänzend; übrige Flügelfedern schwarzbraun, Schwingen mit weißem Innensaum, frisch gemausert auch mit schmalem, weißem Außensaum; lange mittlere Schwanzfedern schwarz, metallisch glänzend; die andern schwarzbraun mit weißem Endsaum; Auge braun; Schnabel rot; Füße braun. Länge 260 mm, wovon bis zu 200 mm auf den Schwanz entfallen, der in kurzen Federn 40—45 mm lang ist. Das Weibchen ist oberseits schwarzbraun, Seiten hellbraun; unterseits weiß; am Kopf längs gebändert; Schnabel und Füße hellbraun. Das Männchen unterscheidet sich im grauen Gefieder vom Weibchen und von allen Stahlfinken stets durch den roten Schnabel. Fischer sah Flüge von 10—30 Stück häufig mit Braunkopfamaranten die alten Lagerplätze der Karawanen aufsuchend, wo Getreide gestampft worden war.

In den ersten Jahren nach dem Kriege gelangte ein Wiener Liebhaber in den Besitz von Glanzwitwen, die von der Firma Ruhe erworben und dort anscheinend nicht erkannt waren. Der Käufer hatte die Vögel selbst ausgesucht und wahrscheinlich an dem roten Schnabel sogleich erkannt. Seitdem sind meines Wissens keine eingeführt, denn ich habe darüber von meinen Freunden und mir befreundeten Liebhabern, die mir mehr als einmal zum Erwerb seltener Vögel verholfen haben, nie wieder etwas gehört, als bis ich mich selber in den Besitz einer solchen setzte, allerdings um sie bald wieder zu verlieren. Im Juni weilte ich in Hamburg, gerade zu der Zeit, als der letzte Südafrikatransport bei Fockelmann eintraf. Ich ließ mir von den wenigen Königswidas zwei halb verfärbte Männchen herausfangen, von denen das eine meine Aufmerksamkeit erregte. Gemeinsam mit einem Herrn vom Fach stellte ich fest, daß der betreffende Vogel keine Königs-, sondern eine Glanzwitwe war. Meine Freude war groß. Leider litt das Tierchen an einer Darmentzündung, von der es nicht wieder genaß, und nach knapp 14 Tagen konnte ich den Kadaver an die Schriftleitung einsenden, die meine Bestimmung bestätigte. Selten habe ich mich um den Tod eines Vogels so gegrämt wie um diesen. Nun frage ich aber, wie kann der Vogel in einer südafrikanischen Sendung zusammen mit Königswitwen in einer Kiste von Lorenzo Marques kommen, wenn die Heimat Ostafrika südlich bis Ugogo ist? Das Vorkommen der Glanzwitwe muß also weit südlicher liegen, als bisher festgestellt, oder diese Vögel schwärmen nach der Brutzeit sehr weit nach Süden. Außerdem hatte mein Exemplar nicht braune, sondern korallrote Füße, genau wie die Königswitwe.

Die zweite Art dieser Gattung ist die

Dominikanerwitwe — V. serena (*L.*),

die allbekannt ist. Die Verbreitung erstreckt sich über ganz Afrika südlich der Sahara. Weniger dürften die Leser, die nicht über die einschlägige Literatur verfügen, über das Freileben wissen, weswegen ich einen Auszug aus dem interessanten Bericht des Afrikareisenden Stark wiedergebe. „Während des Herbstes und Winters leben die Dominikanerwitwen in großen Scharen beisammen, häufig vermischt mit andern kleinen Webefinken. Im Sommer sondern sie sich in kleinere Gruppen, die aus je einem Männchen und 10—40 oder sogar 50 Weibchen bestehen. In ihren Bewegungen ist diese Witwe viel lebhafter als andere Verwandte und der Hahn ist ungeachtet des langen Schwanzes ein ausgezeichneter Flieger. Während der Brutzeit erhebt sich der Hahn oft bis fast über Gesichtshöhe in die Luft und stürzt dann plötzlich mit großer Heftigkeit herab. Auch hat er die eigentümliche Gewohnheit, über seinem Weibchen, wenn dieses auf der Erde Nahrung sucht, rüttelnd

zu schweben und dabei auf und nieder zu tanzen, wie das bei uns die Mücken an warmen Abenden tun. Die Nahrung besteht vorzugsweise in Grassamen, aber auch in Insekten. Der Lockruf ist ein scharfes Zirpen. Im Frühjahr läßt das Männchen, auf der Spitze eines Busches oder auf einer Staude sitzend, einen sanften, trillernden Gesang hören. In Natal brüten die Dominikanerwitwen während der nassen Jahreszeit vom November bis Ende Februar oder Anfang März. Das etwas locker aus feinem Grase gewebte Nest wird zwischen den Stengeln eines Grasbüschels wenige Zoll über dem Erdboden aufgehängt; die Enden der Grashalme werden über dem Neste zusammengebunden, so daß sie dieses ganz verdecken."

Laut Bericht in Heft 4 des „Journal für Ornithologie" hielt Herr Oskar Neumann anläßlich Besichtigung der Neueingänge im Zoolog. Garten zu Berlin einen Vortrag, in dem er u. a. ausführte, daß nach den neueren Forschungen von Augustin Roberts und van Someren dieser Vogel Brutparasit ist, also nach Art unseres Kuckucks die Eier in anderer Vögel Nester legt und von diesen erbrüten und die Jungen aufziehen läßt, und zwar bei kleinen Astrilden und bei der Gattung Coliuspasser (Plattschweifwidafinken). Die ungenauen Angaben früherer Forscher über den angeblichen Nestbau dürften auf Irrtümern beruhen. Es wundert mich höchlichst, daß sich hierüber noch kein in Afrika ansässiger oder zeitweise wohnender Vogelkundige ausgelassen hat; Ornithologen in Kapstadt müßten sich darüber doch wohl äußern können.

Das Vorhandensein eines schwarzen Kinnfleckes wurde zur Absonderung einer besonderen Form benutzt, erythrorhynchas bezeichnet. Auf das Vorkommen in West- und Südafrika beschränkt sich der Kinnfleck nicht; es gibt Vögel mit kleinerem oder größerem Kehlfleck oder — die Regel — meist ohne solchen. Der langjährige Vogelliebhaber berichtet im Jahrgang 1911 Seite 68, daß seine Exemplare den schwarzen Kehlfleck stets in derselben Ausdehnung wieder erhielten und glaubt an die Veränderlichkeit desselben nicht. Damit ist aber nicht gesagt, daß der Kehlfleck bei verschiedenen Exemplaren in konstanter Form nicht mehr oder weniger ausgedehnt sein kann. Auffallend ist, daß er beide Formen im grauen Kleid mit Sicherheit voneinander unterscheiden konnte, wie er besonders betont. Das letztere berichtet auch M. Feo in Jahrgang 1910 Seite 145 und besagt, daß beide Formen in Kapstadt nebeneinander vorkommen. Man kann also nicht von west- oder südafrikanischen Dominikanern, sondern nur von Dominikanerwitwen mit und ohne schwarzen Kehlfleck sprechen. Eine besondere Bedeutung liegt darin aber für die Liebhaberei nicht.

Ich besitze zwei Männchen, beide ohne Kehlfleck, trotzdem ich eine davon als „südafritanische" zu höherem Preise kaufte. Beide gleichen sich wie ein Ei dem andern in Färbung und Benehmen. Im vorigen Jahr begann die eine die Einfärbung ins Hochzeitskleid am 22. Juli und war am 25. August in voller Pracht. Die Umfärbung dauerte also 34 Tage einschließlich Wachsen der langen Schwanzfedern. Wenn die Gefiederfärbung beendet ist — was sehr schnell vonstatten geht — beginnen die Schwanzfedern gewöhnlich erst zu wachsen. Die Ausfärbung begann im Dezember und war im Januar beendet. In diesem Jahre färbten beide Männchen zugleich ein, und zwar früher als der eine Vogel im vorigen Jahr. Ende September verlor einer bereits die langen Schmuckfedern. Diese vier langen Federn, die an die Stelle der vier mittleren Schwanzfedern des Winterkleides getreten sind, bilden für den bolzenartig dahinschießenden Vogel eine auffallend schöne Zierde. Das Benehmen zur Brutzeit ist höchst anziehend; soeben haben sie noch laut singend, auf einem Fuße ruhend, am Fenster gesessen, jetzt schießen sie zum Futtertisch, mit gebreiteten Flügeln und erhobenem Schweif die nächsten Futtersuchenden vertreibend, schon gehts weiter zum Vorbau, dort wird mit kurzer Unterbrechung minutenlang über den beschnittenen Ästen des Baumes gerüttelt, wie sie es in der Freiheit über ihren Weibchen tun; nun wieder zum Boden, wo an einem Stein nach vorherigem Überfliegen und Stehen in der Luft ein Begattungsakt markiert wird; unbefriedigt davon nehmen sie ihren Rundflug wieder auf, einer den andern treibend, bis sie ermüdet friedlich nebeneinander am Fenster sitzen, um ausgeruht das anmutige Spiel von neuem zu beginnen. Man hat mich wiederholt gewarnt, die Dominikanerwida in der Voliere zu belassen, da es Tote und Verwundete durch die brunsterregten Männchen geben würde. Ich habe die Mahner verlacht. In großen Räumen können die Insassen sich ausweichen; nur notorische Beißer, die einen bestimmten Vogel jagen, ermüden und dann übel zurichten, können gefährlich werden. Zu diesen rechne ich die Dominikaner nicht. Ich glaube, daß es sich bei solchen raufluftigen Exemplaren um individuelle Veranlagung handelt und nur unter diesem Gesichtswinkel kann ich verstehen, daß bei einem bekannten Düsseldorfer Liebhaber eine Dominikanerwitwe zum Mörder wurde. Ein Männchen, das in der Freiheit 30 Weibchen zu befruchten hat, ist natürlich geschlechtlich mehr erregt als andere. Der langjährige Vogelliebhaber berichtete, daß auch seine Dominikaner stets friedlich waren und oft im Kreise gesessen haben und ihre Gesangsweise erschallen ließen. Für größere Räumlichkeiten empfehle ich diese niedliche Witwe sehr; für den Gesellschaftskäfig halte ich sie nicht besonders geeignet, doch kommt es auf einen Versuch an. Raufereien am Futternapf darf man keine übertriebene Bedeutung beimessen, dagegen muß man scharf aufpassen, wenn man Verfolgungen bemerkt. Im letzteren Falle fange man den Verfolger schleunigst heraus, bevor ein Unglück geschieht, und verurteile ihn einige Wochen zur Einzelhaft.

Bei der Gattung Vidua etwas über den Namen „Widafink" oder „Witwe". Wida ist ein Landstrich in Afrika, nach der diese Vögel als Widafinken bezeichnet wurden. Linné hat die Bezeichnung in das lateinische vidua umgewandelt, das ins Deutsche übersetzt eben Witwe heißt. So ist auf merkwürdige Art die Namengebung erfolgt. Eine andere Erklärung kann man immerhin darin finden, wenn man den wallenden Schweif mit einem Witwenschleier vergleicht. Diese Erklärung möchte einigen Lesern unbekannt sein, weswegen ich sie angeführt habe.

(Fortsetzung folgt.)

Heidelberg.

Von K. Neunzig.

(Schluß.) (Nachdruck verboten.)

Die größte Aufmerksamkeit erregte der nach Fehringers Angaben auf Grund seiner langen Vogelpflegerpraxis hergestellte „Heidelberger Vogelkäfig" der Fa. A. Böhm & Co. in Heidelberg-Kirchheim.

Der „Heidelberger Käfig" soll alle Vorzüge der bisher bekannten Käfigformen in sich vereinigen, deren Nachteile aber beseitigen. Vor allem soll bei möglichst ausgiebiger Bewegungsfreiheit vermieden werden, daß Futter und Getränk durch den Vogel beschmutzt werden können, was bei den zur Zeit gebräuchlichsten Käfigen mit Innenfütterung, selbst bei richtiger Entfernung der unteren Sitzstangen von den Futtergefäßen, dann häufig vorkommt, wenn der Käfiginsasse an das Gitter der Schmalseiten des Käfigs springt und sich senkrecht über dem Futter- bzw. dem Wassergefäß befindet.



Käfiggestell mit Heidelberger Käfigen.

Zur möglichsten Vermeidung dieses Übelstandes schien es angebracht, wieder zu den bei manchen älteren Käfigtypen gebräuchliche Futtererkern längs der Schmalseiten des Käfigs, also zur Außenfütterung zurückzukehren, aber doch nicht in der früher üblichen Form. Fehringer schuf bei dem Heidelberger Käfig eine Kombination zwischen Außen- und Innenfütterung (s. Abb. S. 327). Gegen die Verwendung der Futtererkern wurde häufig ins Feld geführt die Tatsachen, daß die Vögel, besonders noch nicht fest eingewöhnte, bei dieser Vorrichtung das Futter nicht „vor dem Schnabel" hätten und daß sie ungern das in dem Erker nicht im vollen Licht befindliche Futter annähmen. Dieser Einwand ist nicht von der Hand zu weisen, wenn man an die alten Futtererker denkt. Aber in der neueren Zeit, und das ist auch bei dem Heidelberger Käfig der Fall, ist durch Herstellung einer Mattglasscheibe als Bedachung des Erkers dafür gesorgt, daß genügend Licht in den Erker eindringt und den vor dem Futtertrog sitzende Vogel das Futter nicht beschattet.

Ein weiterer Nachteil der bisher im Gebrauch befindlichen Käfige mit Außenfütterung war der Umstand, daß beim Herausziehen der Futtertröge Futterteile, welche vom Käfiginsasse herausgeschleudert waren, herunterfielen und das Zimmer beschmutzten oder sich in den Futtererkern so anhäuften, daß es ohne vorherige Reinigung des Erkers unmöglich war, den neugefüllten Futtertrog wieder einzuschieben.

Beide Übelstände beseitigt der Bau dieser Käfige. Der Käfigsockel mit den aus Holzleisten und festem Zinkblechboden hergestellten Schublade ist nach beiden Seiten so verlängert, wie das die Abb. S. 327 zeigt, daß sich die Futtererker gewissermaßen innerhalb des Käfigs befinden. Sie haben keinen festen Boden. Die Futtertröge laufen auf einer schmalen Leiste und werden vorn durch eine stärkere, oben gerundete Leiste, welche auch als Sitzstange dient, festgehalten. Herausgeworfene Futterteile fallen so stets auf den Käfigboden. Eine Beschmutzung des Zimmers ist ausgeschlossen.

Der Käfig ist aus gutem öldurchdrängtem Eichenholz hergestellt und hat feste Rückenwand. Nur an dieser befindet sich eine Staubleiste, die an der anderen Seite des Käfigs unnötig sind. Aber auch diese wird in Zukunft fortfallen und damit eine unerwünschte Ablagerungsstätte für die Entleerungen der Vögel.

Fehringer hält mit Ausnahme der Käfige für Wachteln und Lerchen eine weiche Decke für überflüssig. Nach seinen langjährigen Erfahrungen hat er niemals bemerkt, daß die feste Decke irgendwelche Gefahren für die Vögel mit sich bringe. Die für seinen Bedarf hergestellten Käfige haben daher diese Decken aus dünnem Eichenholz. Nicht allzuviel Vogelpfleger werden mit dieser Ansicht einverstanden sein. Auf Wunsch werden die Heidelberger Käfige auch mit weicher Decke hergestellt.

Für die Anbringung der Sprunghölzer sind keine besonderen Vorrichtungen. Elastische Sitzstangen werden von Fehringer verworfen, weil sie nicht elastisch sind, sondern beim Aufspringen des Vogels in ziemlich hart vibrierender Bewegung geraten, sicherlich keine Annehmlichkeit für den Vogelfuß.

Das Gitterwerk der Käfige ist aus starkem Eisendraht hergestellt, der durch brünnieren, eine dunkle

Farbe erhält, glanzlos und vor Rost geschützt ist. Einen Anstrich haben die Käfige nicht, die ausgestellten Käfige waren fest gefugt und sauber gearbeitet. Ihre Maße übertreffen die sonst üblichen. Sie werden in folgenden drei Größen hergestellt:

Größe	lang	tief	hoch	für
I	50/38	25	31	Finken u. klein. Weichfresser
II	66/54	30	35	Grasmücken u. Erdsänger
III	84/70	35	45	Drosseln

Bei dem zur Zeit herrschenden Mangel an wirklich gutem „Universalfutter" ist es zu begrüßen, daß gleichfalls nach Fehringers Anweisung von oben genannter Firma drei recht brauchbare Futtermischungen auf den Markt bringt. Wie wenige unter diesen Futtermischungen sind so beschaffen, daß man wie z. B. bei dem Sperlingschen Universalfutter alle Bestandteile bequem und mit bloßem Auge erkennen kann. Diese Eigenschaft besitzt auch das „Heidelberger Vogelfutter". Die Zusammensetzung ist ohne weiteres zu erkennen. Die Bestandteile sind einwandfrei und von sehr guter Qualität. Es kann eher die Besorgnis bestehen, daß das Futter zu gut ist, zu nahrhaft und daher unter Beimengung weniger nährkräftige Stoffe zu verwenden ist. Jedenfalls gehört das „Heidelberger Futter" zu den besten Futtermischungen für Weichfutterfresser, welche bisher überhaupt auf den Markt kamen. Eine Mischung ist für Erdsänger und zarte Insektenfresser bestimmt, die zweite für Grasmücken, die dritte für Drosseln und anspruchslosen Insektenfressern. Die Zubereitung geschieht in üblicher Weise mit Möhre, Apfel usw. unter den üblichen Beigaben.

Die ausgestellten Proben von Samenmischungen für Körnerfresser sind verständig zusammengestellt und die Samen von bester Beschaffenheit. Von den übrigen Veranstaltungen gelegentlich der Ausstellung ist hervorzuheben: Die Zusammenkunft, welche am Sonnabend, den 1. November, im „Schwarzen Schiff" stattfand. Hier wurde bei altem und neuem Wein alle die Fragen eifrig erörtert, welche die Vogelpflege besonders interessieren, besonders die Frage der Fütterung unserer Weichfutterfresser, Beschaffenheit der Käfige, der Sitzstangen usw. Großes Interesse erregten die Mitteilungen des Herrn Schwarz aus Leipzig, der gerade die zartesten unter unsern Pfleglingen bei ganz eigenartiger Fütterung lange Jahre in bester Gesundheit erhält. Herr Schwarz hat versprochen, den Lesern der „Ges. Welt" seine Methode in eingehender Weise darzulegen.

Gut vorbereitet und durchgeführt war die Veranstaltung am Sonntag Vormittag im Lichtspieltheater. Es würde zuweit führen, den Vortrag des Freiherrn Dr. v. Berlepsch, welcher durch Lichtbilder erläutert wurde, hier widerzugeben, über „Wissenschaftlichen und natürlichen Vogelschutz". Ihm folgte die interessante Vorführung des „Mellumfilms". Die abendliche Sitzung des Sonntags fand unter dem Vorsitz des Herrn J. Birk-Leipzig des Vorsitzenden des „Reichsverbandes der Vogelliebhaber" statt. Es galt von allen zu erreichen, daß die Vogelliebhaber Südwestdeutschlands sich wie in den anderen Teilen der Deutschen Republik in einem Landesverband organisieren und damit Mitglieder des Reichsverbandes werden. Den unausgesetzten Bemühungen Birks war es gelungen, dieses Ziel zu erreichen. Damit wurde der Schlußstein dem bisherigen Aufbau der Organisation der Vogelliebhaber Deutschlands eingefügt. Mögen sich alle dieser Organisation anschließen.

Der rotrückige Würger (Lanius collurio), seine Pflege, Sommer- und Winterernährung.

Von Karl Finck, Neukölln.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Auch Schwebe-, Schlamm- und Blumenfliegen, die mit Vorliebe Blüten aufsuchen, gewinne ich nach dieser Methode, ebenso Hummeln, Wespen, Bremsen, Ameisenbär, Libellen, Trauer- und Kohlmücken usw. Übung führt zur Meisterschaft, so fing ich z. B. einmal innerhalb 25 Minuten von einem Korb, der mit faulenden Früchten angefüllt war, 200 Wespen weg. Der Würger entfernt von solchen Kerfen sorgsam den Giftstachel.

Wo frischer Kuhdung lagert, stellt sich sofort die gelbe Dungfliege ein, sie wird ebenfalls begierig verzehrt.

Die angeklebten Fliegen und sonstige Insekten werden in ein höheres Glas abgestreift, dessen Deckel mit einem dreieckförmigen Einschnitt versehen ist.

Für kleine Insekten genügt als Klebemittel eingedickte Zuckerlösung, Sirup, Honig, Dextrin oder arabischer Gummi. Um das schnelle Eintrocknen dieser wasserlöslichen, daher abwaschbaren Mischungen zu verhindern, wird etwas Glyzerin oder Chlorkalzium ($CaCl^2$) zugesetzt.

Die Stubenfliege fängt man wieder leicht mit einem gut geformten Fangglase (Fliegenglas). Zur Füllung dient reines Wasser. Auch die bedeutend größere Schmeißfliege (Musca vomitoria) und die graue Fleischfliege (Sarcophaga carnaria) gehen in das Fangglas, wenn unter der Einflugöffnung ein durchlöchertes, mit faulendem Fischfleische gefülltes Schächtelchen liegt. Der Fäulnisgeruch lockt die Fliegen von weit her.

Im Spätsommer bevölkert die Stechfliege (Stomoseys calcitrans) unsere Viehställe. Abends sitzen diese Fliegen meistens dicht gedrängt an den Balken, von wo sie sich mechanisch mit Försters Bohms Massen-Fliegenfänger absaugen lassen.

Vielleicht könnte man mit ähnlich gebauten Apparaten die über den Gewässern spielenden Mückenschwärme gewinnen.

Wo Laubheuschrecken (Locustina), die italienische Heuschrecke (Caloptenus italicus), das große braune Heupferdchen oder der grüne Grasspringer massenhaft auftreten, macht die Ernährung des Würgers im Spätsommer kaum Schwierigkeiten.

Auf abgemähten Wiesen und Kleeschlägen ist der Fang verhältnismäßig leicht. Getrocknet geben sie für die kalte Jahreszeit eine gehaltvolle Kraftnahrung.

Junge, noch unvollkommen ausgebildete Hüpfer (Jugendform der Heuschrecken) gehen gut in zweck-

mäßig verfertigte Fallen. Die Sache ist durchaus nicht schwierig. Wo die Tierchen sich zahlreich bemerkbar machen, was meistens auf dürftigen Grasflächen der Fall ist, versenkt man einfach einen alten Eimer und deckt diesen mit einer trichterförmig gebogenen Blechmanschette ab. Dann wird aus Brettern ein mehrere Meter langer Laufgang hergestellt, der zuerst ziemlich weit sein muß, sich aber nach der Senkfalle immer mehr verengen soll. Die Springer folgen dem Paß. Derartige Fangweisen, natürlich im großzügigen Maßstabe, sind in Argentinien üblich.

Begierig verspeist der Würger Engerlinge, ferner alle glatten unbehaarten Raupen, wie z. B. die des Frostspanners (Hibernia defoliaria), der Gemüse-, Wintersaat-, Kohl-, Gänsefuß- und sonstiger Eulenarten (Nachtschmetterlinge).

Auch die Scheinraupen der Rübenblattwespe (Athalia spinarum), der Kiefern-Kaminhornwespe (Lophyrus pini), der Birken-Knopfhornwespe (Cimbex betulae) und der Stachelbeerblattwespe (Nematus ventricosus), es gibt drei Spielarten, können verfüttert werden. Letztere Afterraupe frißt häufig ganze Stachelbeeranlagen kahl, erscheint in zwei manchmal sogar in drei Generationen, und wird nach meinen Erfahrungen von den meisten Insektenfressern eifrig abgesucht. Am frühen Morgen lassen sich die noch klammen Räupchen unschwer abschütteln.

September und Oktober weben verschiedene Spinnen zwischen dem Strauchwerk ihre Netze. Nicht selten vermag man in kurzer Zeit 40—80 Stück in ein Fangglas zu klopfen.

Sehr spät ist noch die Kellerassel (Porcellio) anzutreffen, namentlich an feuchten Stellen, unter Steinen, faulendem Holz, Brunnentrögen, besonders auch in Kellereien, wo Hackfrüchte gelagert werden. Beinahe immer findet man gleichzeitig verschiedene Tausendfüßler, sehr oft z. B. den braunen Steinkriecher (Lithobius forficatus), die platte Randassel (Polydesmus complanatus), den gemeinen Vielfuß (Julus terrestris), ebenso den Ohrwurm (Forficula gigantea). Auch diese Insekten bilden ein wertvolles Futter, nur muß die Verfütterung sofort erfolgen, weil die Tiere rasch absterben, während die echten Asseln in feuchter Erde lange aushalten. Letztere kommen sogar während der Wintermonate in der Gärtnerei vor, wo sie besonders in Glashäusern zwischen und unter den Pflanztischen, in den Vermehrungen und Mieten leben. Die Gewinnung ist wenig umständlich; es werden einfach etliche morsche Holzbrettchen, halbierte ausgehöhlte Kartoffeln und Rüben oder nasse Lappen ausgelegt, worunter sich die Kerfe bald sammeln. Jeder Gärtnerlehrling wird für Geld und gute Worte Asseln verschaffen.

Zarte Wurmvögel sollten im Sommer immer nebenbei geeignete Insekten bekommen. Rausch und andere Vogelwirte verdammen zwar solche Zugaben; irgendwelche Nachteile vermochte ich jedoch niemals festzustellen, sondern ich habe vielmehr regelmäßig gefunden, daß empfindliche Vögel überraschend schnell durchmausern, wenn sie möglichst lange ihre natürliche Nahrung erhielten, welche sich eben durch keine andere vollständig ersetzen läßt. Allerdings dürfen lebende Insekten nur zu den Futterzeiten gereicht werden, sonst gewöhnen sich die Leckermäuler das lästige Betteln an und unterbrechen fortwährend den Gesang.

Der gefangene Würger bleibt im ersten Sommer, wenn er fleißig singt und der Käfig halbwegs seinen Eigenarten entspricht, bei einer Fütterung mit frischen Ameisenpuppen und zusagenden Kerfen fast stets normal genährt.

Nun behaupten freilich manche Liebhaber, daß alte Hähne im ersten Jahre bloß leise studieren und erst in der zweiten oder dritten Gesangsperiode ihr volles Können zeigen: Derartige Mißerfolge sind mir unbekannt, obwohl ich zahlreiche Würger käfigte, nur ein Exemplar trotzte vier Wochen. Allerdings ist meine Eingewöhnungsweise eigenartig.

Der Käfig wird zunächst vollständig verdunkelt und der Wildfang alle zwei Stunden mit Mehlwürmern oder sonstigen geeigneten Insekten gestopft. Größte Vorsicht muß aber dabei beachtet werden, sonst gibt es blutige Finger. Am 3. oder 4. Tage

Heidelberger Käfig.

ist der Vogel eingekäfigt, nimmt ohne Scheu das angebotene Futter an und singt unaufhörlich fleißig.

Auch andere Insektenfresser gewöhnte ich versuchsweise nach dieser Methode ein und erzielte regelmäßig vorzügliche Resultate.

Manche Würger toben während der Zugperiode unbändig, zerstoßen sich schnell das Gefieder und sehen dann erbärmlich aus. Für solche Wildlinge paßt ein 65—75 cm langer, nicht zu hoher Kistenkäfig mit lockerer weicher Decke am besten. Die drei Sitzstangen werden horizontal angebracht, wovon die mittlere, wenn sich Fallsucht zeigt, entfernt wird, um vermehrte Anstrengungen herbeizuführen. Eine zu große Käfighöhe ist nach meiner Ansicht unpraktisch, weil der Vogel beim Umhertollen zuviel Kräfte zu entfalten vermag; er soll aber hoch aufgerichtet sitzen können, wie es seine Art ist.

Sobald der Käfig ungünstig hängen muß, daß volle Belichtung ausgeschlossen ist, hat die Querwand, welche nach dem Fenster liegt, aus Drahtstäben zu bestehen. Abends wird ein Brettchen eingeschoben. Auch jede Beschädigung an dem Vordergitter läßt sich in den unruhigen Nächten beinahe sicher vermeiden, wenn man einen leichten, mit Leinewand überspannten Rahmen dahinterschiebt und außerdem noch die Näpfe entfernt. Selbstverständlich muß jede Breitseite des Käfigs einen entsprechend langen Schlitz aufweisen.

In solcher Tobzelle kann sich nachts auch der wildeste Stürmling nicht zerstoßen. Meine Würger sahen immer glatt aus, im August, wenn die frischen Puppen knapp werden, beginnt der Übergang zur Winterfütterung. Allmählich bilden trockene Ameiseneier, zeitweise mäßig mit weichem Obst angefeuchtet, die Hauptnahrung, nebenbei gibt es solange als durchführbar lebende Insekten, die man bei gutem Fang bis zur Sättigung reichen kann.

Der umsichtige Pfleger hat bereits im Laufe des Sommers allerlei Käfer, Schmetterlinge und andere Kerfe in genügenden Mengen abgetrocknet, damit in der kalten Jahreszeit eine abwechslungsreiche Ernährung keine Schwierigkeiten bereitet.

Getrocknete Insekten sind jedoch bedeutend eiweiß- und fettreicher als frische, sie nehmen nur mehr ungenügend Wasser auf, auch dann, wenn vor dem Darren ein Dämpfen stattfand.

Die bedeutenden Unterschiede zeigt nachstehende Tabelle:

In 100 Teilen	Verdauliche Nährstoffe		
	Eiweiß	Fett	stickstofffreie Extraktstoffe
Maikäfer, frisch	13	3,1	—
„ getrocknet	39	9,3	—
„ getrocknet und wiedererweicht	26	6,2	—

Dominikanerwida.

Die vermehrte Eiweiß- bzw. Fettzuführung verursacht leicht Uberernährung, zumal zarte Insektenfresser in den lichtarmen Wintermonaten viel trübsinnig umhersitzen und verhältnismäßig wenig Bewegung machen. (Schluß folgt.)

Schreien und Sprechen.

Von Emil Kaforke, Berlin.

(Nachdruck verboten.)

Laut verkündet die Uhr vom nahen Turm die ersehnte Stunde. Durch des Schulhauses weitgeöffnetes Tor stürmen die frohsinnigen Kinder, sie springen und schreien der Freiheit entgegen. Sie schreien unvorbereitet, von einem inneren Drange getrieben; sie schreien, weil sie müssen, weil in der Schulstube das jugendliche Gemüt bedrückendes Gefühl mit einem Schlage geschwunden. Und dies Lärmen und Toben belästigt nicht nur nicht, sondern erfreut des Menschen Herz. —

Im Urwald, nach einer kalten Tropennacht, finden die ersten Sonnenstrahlen Eingang im Blätterdach. Neu belebt ordnet und schüttelt sein Federkleid das eben erwachte Papageienvolk, um sich plötzlich unter großem Geschrei in den freien Äther zu erheben. Das Geschrei ist ein Jubel, ein Gruß dem neuen Tag. Und begeistert schwärmen die Forscher von dem herrlichen Erlebnis. —

Das Schreien von Kindern und Papageien gilt als impulsiver, instinktiver Ausdruck von Freud oder Schmerz, der sich in dieser Form mit zunehmender Erweiterung des Verstandes vermindert. Demzufolge müssen mir unsere Zöglinge erziehen, eine Aufgabe, die schwer, aber möglich. Unter hundert zahmen Krummschnäbeln sind fünfzig unerzogen, fündundvierzig verzogen und vielleicht fünf wirklich erzogen. Daher darf es nicht wundernehmen, wenn an sich hochtalentierte Vögel, mit Enthusiasmus gekauft, nach kurzer Frist wieder abgegeben werden. Ein unverwüstlicher Schreier kann dem gutmütigsten Pfleger das Leben verleiden. Indes können wir jeden jungen, gesunden Papagei, welcher Familie er auch angehören mag, als einen der Bildung zugänglichen, fleißigen Schüler betrachten, der bei fortschreitender Entwicklung das Ohr seines Lehrers durch schrille, rauhe Urwaldtöne nur selten behelligt.

Wie man sachgemäße Erziehung und schnell fördernden Unterricht einleitet und durchführt, sagen klar und deutlich die Werke von Ruß-Neunzig.

Der schier unbändige Schreier verwandelt sich in einen angenehmen Sprecher. Diese überraschende Metamorphose vollzieht sich in hervorragendem Maße bei dem Graupapagei und den sogenannten Amazonenpapageien. Oft bin ich schon gefragt worden, welche Papageien am besten und leichtesten sprechen lernen. Nun, nach meiner Ansicht müssen unter günstigen Verhältnissen, bei richtiger Lehrmethode und genügender Ausdauer alle Papageien sprechen lernen. Was der Wellensittich vermag, können auch Schönsittich, Rosenköpfchen und Blaukrönchen, Schmucklori und Kea. Nur die Begabung des einzelnen Individuums spielt eine Rolle; gute Aussprache ist von gutem Vorsprechen abhängig.

Bezüglich des leichten Lernens sind Graupapagei, große gelbköpfige, gelbnackige, gemeine Rotbug-, Müller- und Surinamamazone so ziemlich gleichwertig. Den menschlichen Tonfall beherrscht bewundernswert der Graupapagei; nur er vermag die Laute seines Besitzers täuschend ähnlich wiederzugeben. Unübertroffen in der gesamten Papageiensippe sind dagegen die Amazonen im Liedersingen. So kenne ich ganz erstaunliche Leistungen von der eben erwähnten gemeinen Rotbugamazone. Viel und sehr gut sprechen lernt der große Alexandersittich, der, allein gehalten, bei sorgfältiger Behandlung, sein Mark und Bein durchdringendes Schreien nur noch bei außergewöhnlicher Veranlassung kurz hören läßt; ein schöner, leider verhältnismäßig selten gepflegter Vogel von eminenter Fassungsgabe.

Alle übrigen Krummschnäbel, auch der in fast allen Werken gerühmte kleine Alexandersittich, verfügen nach meiner Kenntnis über ein bescheidenes Sprechrepertoir.

Überaus traulich, mit klarer Kinderstimme spricht der Molukkenkakadu, der vorzüglichste seiner Stammesgenossen. Ihm folgen Triton-, großer und kleiner Gelbhaubenkakadu. Recht deutliche Sprecher waren bei mir trotz ihrer natürlichen knarrenden Stimme Rothaubenkakadu und Mönchsittich. Man glaubt gar nicht, welcher Bildung der letztere fähig ist, mit wie großer Aufmerksamkeit gerade dieser Vogel dem Unterricht folgt. Als herrliche, sprachbegabte Papageien dürfen wir Neuguinea-Edelpapagei — Männchen und Weibchen — und Schwarzkappen-Breitschwanzlori ansprechen. Ein allerliebster Sprecher, der unmittelbar hinter dem Molukken rangiert und nicht erwähnt worden, ist der Brillenkakadu. Recht drollig plaudert der beliebte Mohrenkopf. Nun folgt eine Radaugesellschaft, die aber nach meiner Erfahrung zärtlich sanft sein kann und ganz nett zu sprechen imstande ist, das sind die großen Araras. Wer das Wesen dieser stattlichen Südamerikaner nur in Tierbuden und zoologischen Gärten studiert hat, wird über mein Urteil vielleicht spöttisch den Kopf schütteln. Indes dürfte jeder, dem es gegeben, einen jungen Vogel ganz individuell zu erziehen, seine helle Freude für die aufgewandte Mühe ernten. Lebhaft in Erinnerung ist mir ein Hyazintharara, der klar und deutlich sprach und höchst selten laut wurde. Das prachtvolle Tier saß frei, ohne jede Fußfessel, auf einem aus Knüppeln gefertigten Ständer, den er ohne Aufforderung nicht verließ, gleichgültig, ob im Zimmer oder im Garten. Hoffentlich läßt sich auch mein roter Gelbflügelarara zu einem Musterknaben heranbilden. Meerblauer und Soldatenarara, roter Grünflügel- und blauer Gelbbrustarara, sie alle können liebe Hausgenossen sein und ihren Lärm früher einstellen als die kleinen Araras, der Blumenau- und kleine Alexander-, Elfenbein-, Jendaya- und Felsensittich, die ebenfalls sprechen lernen.

Für Geschrei sehr empfindlichen Papageienfreunden empfehle ich Rosella- und Pennantsittich, die beide Worte und Melodien absolut verständlich wiedergeben.

Von meinen zahmen Papageien erwarte ich, daß sie dann und wann mal schreien, sich in ihrer Muttersprache äußern. Durch ihre Naturlaute fühle ich mich in den von Zeit zu Zeit ersehnten Urwald versetzt. Wenn die gefiederten Lieblinge am frühen Morgen erwachen, erst leise plaudern, dann lauter und lauter werden, ja, dann teile ich mit ihnen die Lust am Leben! —

Kleine Mitteilungen.

Auslandsbericht. Im Januar 1924 der Zeitschrift L'Oiseau berichtet Prinz Joachim Murat, daß er im Juni vergangenen Jahres einem Paar Rotkardinäle in seinem Garten die Freiheit gab. Dieselben bauten im Nachbarsgarten ein Nest und kamen am 15. August mit 2 Jungen

Gelbnackenamazone.

wieder zur Futterstelle zurück. Eins von diesen verschwand später. Das Elternpaar wurde im Herbst wieder eingefangen, während das Junge den Winter in der Freiheit sehr gut überstand. Es wurde sehr häufig in Gesellschaft von Sperlingsscharen beobachtet.

Das Oktoberheft der Avicultural Society ist besonders reichhaltig und schön ausgestattet. Es bringt unter anderem von Hubert Astley die Beschreibung und farbige Abbildung eines Bastards von Polytelis barrabandi (Schildsittich, Neunzig S. 736) und P. alexandrae (Blaukappensittich, S. 737). Obgleich ein Männchen Alexandrae im selben Raum vorhanden, bändelte seine Gattin mit dem Barrabandsittich an, und die Folge waren 2 Bastarde, von denen einer im Nest starb, während der andere groß gezogen wurde. Letzterer zeigte im ersten Lebensjahr nur eine allgemeine Grünfärbung; die mehr dem Grün des Vaters als dem der Mutter entsprach. Erst im zweiten Jahr fand die prächtige Umfärbung statt, wie das Bild im Heft sie wiedergibt. Beim Vergleich der Elterntiere mit dem Jungen zeigt sich nun folgende auffallende Erscheinung: Der Blaukappensittich, also das Weibchen, hat eine zart blaue Stirn, die Kehle rosa, und im übrigen grüngraues Gefieder, jedoch keinerlei rot. Der männliche Barrabandsittich hat hellgelbe Stirn, Wangen und Kehle, rot ist nur ein schmaler

Streifen quer über den oberen Brustteil. Im Gegensatz hierzu sind bei dem Bastard Stirn, Kehle, Brust und Bauch scharlachrot, das übrige Gefieder grün mit gelben großen Flügeldecken. Der Autor fragt, woher die scharlachrote ausgedehnte Färbung stamme, die bei keinem der Eltern vorhanden ist. Leider starb der Barrabandsittich bald darauf, so daß eine weitere Zucht, die recht interessante Vergleiche ergeben hätte, nicht mehr zustande kam. Im selben Heft beschreibt J. Appleby den Bau seiner neuen Gartenvolieren und gibt dazu lehrreiche Zeichnungen und vorzügliche photographische Aufnahmen, alles großzügig und daher nur sehr begüterten Liebhabern möglich. Weiterhin findet man in derselben Ausgabe den erstmaligen Zuchtbericht der Chamaepelia minuta (Zwergtäubchen, Neunzig S. 823) von Herb. Bright; dann von W. Shore-Baily die erste Aufzucht des Turdus olivaceus (Oliven-Kapdrossel S. 36) und der Penthebriopsis macrura Gelbrückenwitwe S. 398). Beide Schilderungen durch schöne Aufnahmen illustriert. Endlich noch einen Bericht von Seth-Smith über die gelungene Zucht des Sulphur-Crested Cockatoo (Cacatua sulphurea, Neunzig?. Die Jungen sind 8 Wochen alt und noch im Nest; Autor nimmt an, daß sie voraussichtlich erst in 6 Wochen ausfliegen werden. Über den weiteren interessanten Inhalt des Heftes werde ich später berichten. Dr. Luig.

Von meinen zwei Paar **Tarantinern** sitzt ein Weibchen seit etwa acht Tagen auf drei Eiern Ein Nestbau fand nicht statt, trotzdem Weiden- und andere Ruten genügend gegeben wurden Zu meinem Schrecken bemerkte ich, daß das Weibchen sich alle Federn des Halses und vorderen Brust ausgerupft und aus diesen ein kleines „Nest" gebaut hatte. Außerdem waren als Eiunterlage noch kleine, im Kasten losgelöste Späne verwandt. Sollte das Rupfen eine Angewohnheit des Vogels sein, oder soll es sich hier um einen Ersatz von iraendwelchem fehlenden Nistmateral handeln? Das Männchen füttert das Weibchen nicht, sondern bekümmert sich, entgegen einer Wellensittichbrut, überhaupt nicht um dieses. Zur Nachtruhe benutzt das Männchen fast stets einen anderen Kasten, während es vor der Eiablage stets im gleichen Kasten wie das Weibchen nächtigte. Das Weibchen brütet sehr fleißig und läßt sich durch Kontrolle des Kastens nicht im geringsten stören. Eine Begattung habe ich wohl ein dutzendmal beobachtet, und fand diese ganz ungeniert in meiner Anwesenheit statt. (Siehe meinen diesbezüglichen Artikel „Exoten".) Über den genauen Verlauf der Brut werde ich später berichten.

S. Lichtenstaedt.

Sprechsaal.

(Steht den Abonnenten kostenlos zur Verfügung.)

Antworten.

Zu der am 23. Oktober im Sprechsaal erschienenen Notiz möchte ich bemerken, daß alle an mich ergangenen Anfragen, gleichviel ob mit oder auch ohne Rückporto, prompteste Erledigung gefunden haben. Es ist mir wiederholt vorgekommen, daß ich, vornehmlich aus Österreich und den Balkanländern, mehrfach gleichlautende Anfragen erhielt, so daß meine Beantwortungen den Adressaten also nicht erreicht haben können. Hoffentlich erfahren die Postsendungen nach den genannten Ländern bald eine sorgfältigere Behandlung. Aug. Schellenberger, Leipzig.

Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber (E. V.) Sitz Leipzig.

1. Vorsitzender Joh. Birk, Leipzig-Mockau, Beuthstr. 29; Geschäftsstelle: Rudolf Petters, Leipzig-Probstheida, Preußenstr. 31; Kassierer Werner Geßler, Leipzig Dresdner Str. 2; Tauschvermittlung — T.-V. —: Richard Vorwerk, Leipzig-Lößnig, Merveldstr. 39.

Unter Bezug auf unsere Veröffentlichung in Nr. 37 dieser Zeitschrift betr. die Herabsetzung der Postbeförderungsgebühren für lebende Tiere, insbesondere Vögel, ist uns nachfolgendes Schreiben des Reichspostministeriums zugegangen, das unseren geehrten Mitgliedern hiermit zur Kenntnis gebracht wird.

„Eine Ermäßigung der Gebühren für Pakete mit lebenden Tieren ist leider nicht angängig. Soweit es sich um dringende Sendungen handelt, sind die Gebühren erst vor kurzem den mit der Behandlung dieser Sendungen verbundenen Leistungen der Post angepaßt worden. Dabei ist zu berücksichtigen, daß Pakete mit lebenden Tieren meist schwierig zu behandeln und unterzubringen sind und daher den Postbetrieb in besonderem Maße belasten. Es ist deshalb zur Erhaltung der Wirtschaftlichkeit des Päckereigeschäfts unbedingt notwendig, an den jetzt bestehenden Gebühren festzuhalten."

Wir geben weiter davon Kenntnis, daß uns der Verein für Vogelschutz und -liebhaberei zu Hamburg durch dessen 1. Vorsitzenden, Herrn Weber, in liebenswürdiger Weise nicht nur eine Schreibmaschine, sondern auch andere sehr notwendige Bürobedarfsartikel zur Verfügung gestellt hat.

Durch dieses außerordentliche Entgegenkommen ist es uns ermöglicht, den Schriftverkehr, der ungeahnt einen beträchtlichen Umfang angenommen hat, in geordneter Weise zu bewältigen und nicht zuletzt auch beträchtliche Ausgaben, die durch den niedrig gehaltenen Mitgliedsbeitrag nicht gedeckt werden könnten, zu ersparen.

Dem Hamburger Verein mit seinem rührigen 1. Vorsitzengen im Namen der angeschlossenen Mitglieder der beste Dank. J. A.: Rudolf Petters, 1. Schriftführer.

Vom Vogelmarkt.

Von seltener auf den Vogelmarkt kommenden Vögeln werden angeboten:

G. Behnke, Berlin O 34, Petersburger Str. 29: Gelbnackenamazone, Bahia-Blaustirnamazone, Sprosser, Zebratäubchen, Steinkauz, Dohlen.

Carl Blüm, Mainz a. Rh., Bebelring 46 (A.Z.-Mtgl. 328): 1,1 Tarantiner Bergpapageien.

Guido Findeis, Wien I., Wollzeile 25: Weiße Dohlen.

Fritz Müller, Grohn-Vegesack, Auf dem Berge 87: 1,1 grünbr. Sperlingspapageien, 1,0 Kanarienflügelsittich, 1,0 Kubawachtel.

Bernd Regge, Lötzen (Ostpr.): 1,1 Silberschnäbel, 1,1 Schnurrbärtchen.

Paul Sommer, Leipzig, Elisenstr. 82 (A. Z.-Mtgl. 236): Weißkehlpfäffchen, Bronzeamandine. 2,2 Bastarde (Muskatfink × jap. Mövchen), 1,0 Kronfink.



Herrn H. D., Gut Moppen: Einzelne Männchen oder Weibchen sind in einem Züchtungskäfig immer störend und müssen, wenn Züchtungserfolge mit paarweise gehaltenen Vögeln erzielt werden sollten, entfernt werden. Auch die Kreuzschnäbel müßten anderweitig untergebracht werden. Von Wellensittichen, Bandfinken, Mövchen können Züchtungserfolge erwartet werden. Von Prachtfinken, welche eher als andere zur Brut schreiten, könnten noch hinzukommen Silberschnäbelchen, Malabarfasänchen, Zebrafinken, weiße Reisvögel. Elsterchen, Spitzschwanzamandinen, Gouldamandinen sind, wenn sie zur Brut schreiten, zu angriffslustig. Die Abb. eines Nestkastens lag dem Brief nicht bei.

Herrn W. B., Heilbronn: Beiträge dankend erhalten.

Herrn E. B, Altona: Ist briefl. Bescheid zugegangen.

Herrn F. P., Oberaula. Bei den Wachteln handelt es sich nicht um die Massenawachtel, welche auf S. 239 abgebildet ist, sondern, soweit es möglich ist den Vogel nach der Beschreibung und nach den gesandten Federn zu bestimmen, um die „Mexikanische Baumwachtel" — Colinus pectoralis *J. Gd.*, aus Ostmexiko. Es würde sich in diesem Falle um eine bisher noch nicht eingeführte Art handeln.

Herrn E. M, Küllstedt. Der Erlenzeisig war stark abgemagert, der Unterleib aufgetrieben. Er ist an einer mit Abzehrung verbundenen Ernährungsstörung eingegangen.

(Fortsetzung auf der 2. Umschlagseite.)

Jahrgang 53 27. November 1924 Heft 41

DIE GEFIEDERTE WELT.

ZEITSCHRIFT FÜR VOGELLIEBHABER

Begründet von Dr. Karl Ruß

Herausgegeben von Karl Neunzig in Berlin-Hermsdorf

Inhalt:

Webervögel und Widafinken. Von A. Krabbe. (Fortsetzung.)

Heidelberg. Von K. Neunzig. (Schluß.)

Der rotrückige Würger (Lanius collurio), seine Pflege, Sommer- und Winterernährung. Von Karl Finck, Neukölln.

Schreien und Sprechen. Von Emil Kaforke, Berlin.

Kleine Mitteilungen - Sprechsaal - Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber (E. V.) Sitz Leipzig - Vom Vogelmarkt - Redaktionsbriefkasten - Bevorstehende Vogelschauen - Aus den Verbänden - Aus den Vereinen.

Abonnement monatlich (4 Nummern) 1.50 Gm. — Einzelpreis des Heftes 50 Gpf.
vermittelt das nächste Postamt bzw. der zuständige Briefbote. / Postversand ab Burg Bez. Magdeburg.

eutz'sche Verlagsbuchhandlung / Magdeburg / Postschließfach 148

Bevorstehende Vogelschauen.

Bayrischer Vogelliebhaber-Verein E.-V. Sitz München. Der Bayrische Vogelliebhaber-Verein hält vom 6.—11. Dezember im „Hirschbräukeller", München, Zollstraße, eine Vogelschau ab, in Verbindung mit der Weltbundesgruppe Oberbayern E. V. und dem Verband deutscher Farben-, Gestalts-, Bastardkanarien- und Exotenzüchter E. V. Der Zweck der Ausstellung dürfte ja allgemein sein, soll doch das Münchner Publikum für unsere heimische Avifauna interessiert und auch der Käfighaltung das übliche Vorurteil genommen werden. Es sind auch die Münchner Mittel- und Volksschulen aufgefordert, die Ausstellung an Wochentagen unter Führung der Lehrkräfte zu besuchen, um schon in den Kindern den Sinn für unsre heimische Vogelwelt zu wecken. Aufschluß in allen Fragen erteilt: Leopold Keidel, München, Schraudolfstraße 44 III.

Verband deutscher Farben-, Gestalt-, Bastardkanarien- und Exotenzüchter, E.-V. Sitz München. Der Verband hält vom 6.—11. Dezember in München eine Ausstellung mit Prämiierung ab, und zwar mit dem Bayrischen Vogelliebhaber-Verein E.-V. und der Weltbundesgruppe Oberbayern E. V. Wir lassen an alle auswärtigen Mitglieder hierzu Einladung ergehen und bitten eventl. Aussteller, sich zwecks Übersendung des Programms mit Herrn Max Pfaller, München, Auenstraße 78 I, in Verbindung zu setzen.
Die Verbandsleitung.

Karlsruhe, Verein von Vogelfreunden. Gegr. 1888. Vogelschau u. Kanarienprämiierung am 6. u. 7. Dez. 1924.

Dresden, Verein für Vogelschutz und -pflege. Ausstellung 20.—22. Dezember 1924.

Aus den Verbänden.

Verband deutscher Farben-, Gestalt-, Bastardkanarien- und Exotenzüchter und des Bayerischen Vogelliebhabervereins (e. V.) Sitz München, Ortsgruppe Augsburg. Jeden Samstag gemütliche Zusammenkunft beim Vogelwirt Joseph Leininger, Gasthof, Frohnhof—Peutingerstr. Jeden 1. Samstag im Monat Monatsversammlung ebendort. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. Als amtliches Vereinsorgan ist die „Gef. Welt" anerkannt worden.
J.A.: H. Schwaiger, 1. Vors., Augsburg, Schöpplerstr. 9/I.

Aus den Vereinen.

„Aegintha", Verein der Vogelfreunde zu Berlin. Sitzung jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat, abends 8 Uhr, im Vortragssaal des Aquariums. Fast in jeder Sitzung belehrende Vorträge und Besprechungen unter gütiger Mitwirkung unseres verehrten Ehrenmitgliedes Herrn Dr. Heinroth. Gäste gern willkommen.
J. A.: O. Vorbrodt, 1. Schriftf., O 112, Scharnweberstr. 18.

Vereinigung der Liebhaber einheimischer Vögel zu Berlin. Sitzung jeden 2. Donnerstag nach dem 1. und 15. des Monats im Vereinslokal zum „Alexandriner", Alexandrinenstraße 37a. Gäste stets willkommen.
J. A.: P. Böhme, Schriftf., O 17, Rüdersdorfer Str. 69.

Verein für Vogelkunde, -schutz u. -liebhaberei Cassel. Sitzung jeden 2. Montag im Monat im „Deutschen Haus", Frankfurter Str. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen.
J. V.: Emil Ivo, Schriftführer.

Alte Vereinigung der Vogelliebhaber zu Dresden. Versammlung jeden Freitag, abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Blasewitzer Hof". Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. J. A.: Matth. Meys, Schriftf.

Verein Vogelschutz u. -pflege zu Dresden. Versammlung jeden Donnerstag, abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Schillers Restaurant", Ecke Stifts- und Ehrlichstr. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. Bernhard Kühn, Vors.

Verein für Vogelschutz und -pflege zu Dresden. Gegr. 1906. (Vormals Vereinigung der Vogelliebhaber zu Dresden.) Vom 20.—22. Dezember d. J. veranstaltet genannter Verein in dem Saale des „Italienischen Dörfchens", Dresden, Schloßplatz, die zweite Vogelschau. Dieselbe wird das Gebotene der ersten in den „Annenfälen" 1923, welche dem Verein, vor allem in finanzieller Hinsicht, guten Erfolg brachte, um vieles übersteigen. Alle Vogelliebhaber sind herzlich willkommen. J. A.: Bernhard Kühn, Vors.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei zu Hamburg. Sitzung jeden 1. u. 3. Dienstag im Monat in Hüttmanns Hotel, Poolstr. 22, abends 8¼ Uhr. Nächste Sitzung Dienstag, den 2. Dezember 1924. Gäste sowie auch Exotenliebhaber stets willkommen. J. A.: Arnold Weber, 1. Vors.

Verein für Vogelschutz und -pflege Jena. Die Vereinsabende finden regelmäßig aller 14 Tage (Sonnabends) um 8 Uhr in der Wohnung des 1. Vorsitzenden, Herrn Jahn, Feodorastraße 7, statt. Jena besuchende Vogelfreunde treffen jeden Sonntag vormittag den Schriftführer, Feodorastraße 13 wohnhaft, an und sind zur Besichtigung von dessen Vogelstube herzlichst eingeladen. — Monatsversammlung am 15. November 1924. Anwesend 10 Mitglieder und Gäste. 1. Vorgeführt wird ein großer automatischer Sparfutterapparat, von Herrn Voigt jr. selbst konstruiert. 2. Der Artikel von Herrn Beumée (Groningen), über die Zucht der Singdrossel wird vorgelesen und eifrig besprochen. 3. Der Aufforderung des Landesverbandes Sachsen und Großthüringen, die Adressen der Vereinsmitglieder mitzuteilen und die Beiträge abzuführen, wird in Kürze entsprochen werden. 4. Herr Voigt sen. hält einen längeren Vortrag über seine Vogelstube sowie die diesjährigen äußerst glücklichen Zuchterfolge mit Exoten. Farbentafeln illustrieren den Vortrag. Am Bußtagvormittag wollen die Mitglieder die Vogelstube besichtigen. 5 Herr Voigt trägt einen Artikel über den roten Kardinal vor. Eine Aussprache schließt sich an. 6. Herr Bischoff gibt aus dem zweckmäßigen Meyer von Löns eine Kostprobe, die einen würdigen Abschluß des Abends bildet. A. Voigt, Jena (Ost), Feodorastr. 13.

Verein von Vogelfreunden Karlsruhe. Gegr. 1888. Monatsversammlung jeden 1. Mittwoch im Monat. Lokal „Goldener Adler". Die diesjährige Vogelausstellung, verbunden mit Kanarienprämiierung, findet am 6. u. 7. Dez. statt. Außer Medaillen werden wertvolle Ehrenpreise vergeben. Zur Ausstellung werden nur Mitglieder unseres Vereins zugelassen. Bang, 1. Vorstand. Boppel, 1. Schriftf.

Verein der Vogelliebhaber Königsberg (Pr.). Sitzung jeden Freitag nach dem 1. u. 15. d. M., abends 8 Uhr im Vereinslokal „Kaiser-Kaffee", Kaiserstr., Ecke Schnürlingsstr. Gäste sind willkommen. J. A.: Ernst Reinholdt, 1. Vors.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig. Vereinssitzungen jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat im Vereinslokal „Bauers Brauereirestaurant", Täubchenweg. Nächste Sitzung Donnerstag, den 4. Dezember Gäste stets willkommen. J. A.: Johann Birk, 1. Vors.

Verein der Vogelfreunde Leipzig-Plagwitz. Vereinslokal: „Gosenschlößchen", Leipzig-Plagwitz. Sitzungen an jedem 1. und 3. Montag des Monats, abends 8 Uhr. Vogelfreunde sind stets willkommen.
K. Scholtissek, 1. Vors., L.-Plagwitz, Lauchstädter Str. 30.

Verein der Vogelliebhaber zu Mannheim. Versammlung aller 14 Tage Samstag abend 8 Uhr im Vereinslokal „Restauration z. gold. Falken", S. 1. 17. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. J. Daubmann, 2. Schriftf.

Bayrischer Vogelliebhaberverein, Sitz München (E.V.). Jeden Samstag gesellige Zusammenkunft im Pschorrbräuhaus, Bayerstr. Jeden letzten Samstag im Monat Monatsversammlung im Vereinslokal ebendort. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. Rud. Engel, 1. Schriftführer.

„Ornis", Freie Bezugs-Vereinigung der Waldvogelliebhaber Deutschlands. Gegründet 1912. Auf vielseitigen Wunsch der alten Mitglieder wollen sich die Waldvogelliebhaber wieder in der „Ornis" zusammenschließen. Als amtliches Organ ist die „Gef. Welt" ausersehen worden, und werden die Artikel, die früher in den „Ornis-Blättern" erschienen, in obiger Zeitschrift gebracht werden. Aus diesem Grunde bittet die Geschäftsführung um eifrige Mitarbeit, damit unserer Waldvogelpflege wieder der Platz eingeräumt wird, der ihr gebührt. Anmeldungen sind unter Beifügung von 2 M. an den Geschäftsführer zu richten; Mitglieder erhalten auf Mischfutterbestellungen 5% Rabatt. Mit treudeutschem Gruß Martin Sperling, Halle/S., Südstr. 49.

Zoolog. Verein zu Zwickau i. S. Versammlung jeden Freitag nach dem 1. und 15. jeden Monats, abends 8 Uhr, im Restaurant „Zur Bleibe", Katharinenkirchhof. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen.
J. A.: Paul Schmidt, 1. Vors., Zwickau i. S., Bosenstr. 44.



Johann Andreas Naumann
geb. 1747 — gest. 1826

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg

Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Jahrg. 53 | Den 4. Dezember 1924 | Heft 42

(Druckort: Burg, Bezirk Magdeburg.)

Johann Andreas Naumann.

Die Familie der Naumanns, die dem deutschen Volke zwei so bedeutende Männer geschenkt hat, wie es Johann Andreas Naumann, „der alte Naumann" und dessen Sohn Johann Friedrich Naumann waren, entstammt einem alten Bauerngeschlecht. Der älteste nachweisbare Ahne, Hans Naumann, kaufte noch während des Dreißigjährigen Krieges im Jahre 1636 „ein verwüstetes und verlassenes Ackergut samt einem schönen anmutigen Busche" bei dem kleinen Dorfe Ziebigk im Anhaltischen unweit Cöthen. Durch unermüdlichen Fleiß brachte dieses wackere Geschlecht aus den Wirrungen und Verwüstungen des schrecklichen Krieges dieses Gut hoch und vererbte es von Vater zu Sohn. Es waren tüchtige Leute, diese Naumänner, Vollbauern, dabei aber alle Jäger, Vogelfänger und Vogelkenner.

In diesem Ziebigk ist Johann Andreas Naumann am 13. April 1744 geboren, dort ist er hochbetagt am 15. Mai 1826 gestorben. Aber wie viel Arbeit und Mühe, welch rastloses Streben und Forschen liegt zwischen diesen beiden Jahreszahlen!

Zunächst war der alte Naumann mit Leib und Seele Bauer, der Erhalter und Verwalter des väterlichen Gutes. Aber er begnügte sich nicht damit, den Pflug über die väterliche Scholle zu führen, das Korn zu säen, zu dreschen und es zu verkaufen; er hatte einen lebhaften, von den Vorfahren ererbten Sinn, die ihn umgebende Natur zu beobachten, mit allem, was in ihr kreucht und fleugt. Nichts entging seinem scharfen Auge. Seine volle Liebe aber gehörte den anmutigsten aller Lebewesen. Er selbst schreibt: „Die Liebe zu den schönen Luftbewohnern schien bei mir so stark eingewurzelt zu sein, daß es mir unmöglich war, die Vögel mit gleichgültigen Augen anzusehen, und in meinen Jünglingsjahren wurde dieselbe völlig zur Leidenschaft. Als Kind begleitete ich meinen Vater stets beim Vogelfange und fragte fleißig nach den Namen und Eigenschaften der Vögel, die uns vorkamen." Diese Liebe zur Vogelwelt wuchs mit dem Knaben und Jüngling; sie ward der Inhalt der freien Stunden des Mannes, die unverminderte abgeklärte Lust des Greises. Eine verständnisvolle Gehilfin fand Johann Andreas Naumann in seiner Lebensgefährtin Marie Sophie Christiane, geb. Lißmann, welche die Geschäfte des Gutes für ihn besorgte, wenn er am Vogelherde saß „mitten im Busche, von allem Weltgetümmel entfernt". Dort überdachte und schrieb er sich auf, was er beobachtet hatte. Eine Frucht dieser besinnlichen und doch so geschäftigen Mußestunden waren zwei Bücher, die Zeugnis geben von seinem Tun und seinem eigenartigen Denken; das eine benennt sich: „Der Vogelsteller oder die Kunst allerley Arten von Vögeln sowohl ohne als auch auf dem Vogelheerde bequem und in Menge zu fangen nebst den dahin gehörigen Kupfern und einer Naturgeschichte der bekannten und neuentdeckten Vögel" (1789), das andere: „Der Philosophische Bauer, oder Anleitung, die Natur durch Beobachtung und Versuche zu erforschen" (1791).

Sechs Kinder entsproßten dem ehelichen Bunde. Das älteste von ihnen war Johann Friedrich, der hernach berühmt gewordene große Vogelforscher. „Der älteste von meinen drei Söhnen", schreibt unser Johann Andreas Naumann, „zeigte große Lust und Fähigkeit zum Zeichnen und Malen, ich ließ ihm Unterricht geben, und wenn ich einen seltenen Vogel gefangen oder geschossen hatte, malte er denselben ab. Wir fingen endlich an, eine Sammlung von allen Vögeln, die unsere Gegend durchfliegen, zu unserem Vergnügen zu machen, da mir einige gute Freunde den Rat gaben, dieselben in Kupfer stechen zu lassen und davon eine Naturbeschreibung herauszugeben." Damit wurde der Grundstein gelegt zu dem 13 Bände starken Werke, dessen erster Band im Jahre 1797 noch von Johann Andreas Naumann herausgegeben wurde. Die folgenden Bände ließ der große Sohn des alten Naumann unter der Bezeichnung erscheinen: „J. A. Naumanns Naturgeschichte der Vögel Deutschlands. Herausgegeben von dessen Sohn J. F. Naumann". Es wurde dies ein Werk, um das uns die ganze wissenschaftliche Welt beneidet! W. Bacmeister.

Webervögel und Widafinken.

Von A. Krabbe.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

M. Gattung Paradieswitwe — Steganura *Rehb.*

Es gibt drei und mehr Arten von Paradieswitwen, die sich als Örtlichkeitsrassen auffallend von-

einander unterscheiden, ganz im Gegensatz zu der über den ganzen Kontinent verbreiteten Dominikanerwitwe. Die bekannteste ist die aus Westafrika zu uns kommende Senegalparadieswitwe — St. aucupum (*Neum.*), seltener die ostafrikanische — St. paradisea (*L.*), dagegen gelangte in diesem Jahr die schönste der drei Formen, die südafrikanische oder Gelbnackenparadieswitwe — St. verreauxi (*Cass.*) in die Hände der Liebhaber. Ich bin eigentlich verwundert, noch keine ostafrikanische Paradieswitwe aus Abessinien gesehen zu haben, will damit aber nicht sagen, daß nicht doch welche mitgekommen sein können. Reichenow behandelt alle drei Formen als eine einzige Art und schreibt u. a.: „Hinterkopf und Nackenband gelblichweiß bis rotbraun"; die Länge gibt er mit 350—400 mm, davon den Schwanz mit 200 bis 310 mm an. Hierüber hat der langjährige Vogelliebhaber im Jahrgang 1911 Seite 92—93 ausführlich geschrieben und bitte ich Interessenten die beachtenswerten Ausführungen dort nachzulesen. Da hiernach und nach den Erfahrungen der neueren Zeit die drei Formen nicht zu einer zusammengeworfen werden können, so wäre es angebracht, wenn der dritte Band von Reichenow „Die Vögel Afrikas" an der diesbezüglichen Stelle eine Berichtigung erfahren würde. — Stark schildert die

Paradieswitwe — St. aucupum (*Neum.*)

sehr interessant. „Im Frühjahr und Sommer sitzt das Männchen gern auf einer hervorragenden Buschspitze, auf die es nach kurzem wellenförmigen Fluge stets wieder zurückkehrt. Gelegentlich schwebt es einige Sekunden lang über dem Grase, in dem eines seiner braunen Weibchen verborgen ist, denn er hat viele, von 10—50 oder mehr. In kurzen Pausen stößt es einen flötenartigen Ruf aus und hin und wieder läßt es einige Strophen seines angenehmen Gesanges hören. Während der Ruhe hängen die langen Schwanzfedern herab, aber im Fluge werden sie wagerecht getragen. Der Wechsel des Gefieders vom Sommer- zum Winterkleide wird in etwa sechs Wochen beendet." — Die Paradieswitwen sind mit die schönsten aller Widafinken und werden stets sehr begehrt, um so mehr sie zu allen Zeiten für wenige Mark erhältlich sind. Ich kann diese anziehenden, im Prachtkleid herrlichen Vögel jedem Liebhaber warm empfehlen, denn sie bilden einen hervorragenden Schmuck für Käfig und Vogelstube. Der langen wallenden Schwanzfedern wegen halte man sie nicht in kleinen Käfigen, um das Abstoßen und Beschmutzen zu verhüten. Meinen Erfahrungen nach sind die Paradieswitwen gegen Kälte empfindlicher, als man es bei dieser Vogelgruppe sonst gewohnt ist. Zwei Männchen, die ich kalt überwinterte, litten sehr an den Füßen, kamen in diesem Frühjahr nicht in die Mauser; das eine ging ein, während das andere noch heute kränkelt und infolgedessen erst im September sich bemühte, das Prachtkleid anzulegen. Der Vogel wird zweifellos im Winter an stockender Mauser, bedingt durch Säfteverderbnis, eingehen. Ich muß allerdings noch anführen, daß während der strengsten Wintertage in der Vogelstube eine Temperatur von drei Grad Kälte, in einer Nacht sogar von fünf Grad Kälte herrschte, wogegen der Ofen der großen Räumlichkeit wegen einfach versagte. Im vorigen Jahr begann das Männchen, welches ich 1921 erwarb und das im Winter so schwer gelitten hatte, daß es einging, Ende Juli mit der Einfärbung zum Hochzeitskleid, welches bis zum Januar getragen wurde. Den zweiten Vogel kaufte ich als südafrikanischen zusammen mit der sogen. südafrikanischen Dominikanerwitwe. Ich bezweifle stark, daß beide Vögel aus Südafrika stammen. — Ein richtiges Pärchen

Gelbnackenparadieswitwe — St. verreauxi (*Cass.*)

erhielt ich im herrlichsten Prachtgefieder von einem mir befreundeten Liebhaber aus Eystrup, der es kurz zuvor wegen seiner auffallenden Schönheit von Fockelmann mitgebracht hatte. Diese Form ist mit der vorigen gar nicht zu verwechseln, der bedeutenderen Größe und des scharf abgegrenzten gelben Nackenbandes wegen. Aber auch im grauen Gefieder sind die Geschlechter beider Formen sofort zu unterscheiden. Abweichend ist ferner der mit Kraftentfaltung vorgetragene, nicht unschöne Gesang, der von dem langjährigen Vogelliebhaber mit Recht als der schönste aller Webergesänge bezeichnet wurde. An meinem Exemplar, das im April ausfärbte und am 15. Juni bereits wieder mit der Einfärbung ins Prachtkleid begann, konnte ich sehr interessante Balzstellungen beobachten. Auf dem Boden hin- und hertretend, vollführte es vor dem Weibchen merkwürdige Sprünge, wobei der Schweif hochgestellt wird. Die Bewegungen hierbei waren ganz eigenartig, ruckweise, wie in Verzückung geraten. Blitzschnell ausgeführte Begattungsversuche beim Weibchen blieben erfolglos; manchmal versuchte es sich gleich den Dominikanern an Steinen oder Zweigen. Sonst kümmern sich die Gatten wenig umeinander und man kann ohne weiteres die interesselosen Weibchen fortlassen und die schönen Männchen allein einsetzen. Wer über genügend großen Käfig oder gar Vogelstube und Voliere verfügt, der möchte nicht versäumen, diesen schönen Widafink anzuschaffen. — Die

N. Königswitwe — Tetraenura regia (*L.*)

bildet die einzige Art der Gattung Spatelschwanzwitwe — Tetraenura *Rchb.* Wenn sie auch heute nicht mehr zu den allerseltensten Erscheinungen gehört, wie in der Vorkriegszeit, so dürfte sie doch nicht jedermann bekannt sein, weswegen ich eine Gefiederbeschreibung folgen lasse. Das Männchen ist im Prachtgefieder oberseits schwarz; Nackenband, Kopfseiten, Unterkörper rostgelbbraun, an den Seiten des Bürzels verdeckter Fleck weißer seidenartiger Federn; Unterschwanzdecken, Schenkel Flügeldecken, innere Schwingen schwarz, übrige schwarzbraun, außen schmal fahlbraun, innen weiß gesäumt; Unterflügeldecken weiß; mittelste Schwanzfedern schwarz, seitliche schwarzbraun, innen mit weißem Spitzenfleck; Auge dunkelbraun; Schnabel, Füße rot; Länge 250—310, verl. Schwanzfedern 180—230 mm. Weibchen wie das der Dominikanerwitwe, an den stets roten Füßen von jenem zu unterscheiden. Verbreitung: Südafrika, nördlich bis zum Zambesi und Benguella. Eine Abbildung ist beigegeben. — Wenn Reichenow schreibt, daß nach Sharpe das Weibchen dem von St. paradisea

ähnelt, so kann man hier nur einen Schreibfehler oder Irrtum von Sharpe annehmen, denn mit der Paradieswitwe ist es gewiß nicht zu vergleichen. „Gleich allen andern Witwen, so schreibt Stark, lebt auch diese polygamisch. Im Frühling sieht man das Männchen in Begleitung von 10—20 Weibchen. Dann sind die Männchen sehr kampflustig, jagen beständig einander, wobei der lange Schwanz ihrem Fluge keineswegs hinderlich ist, wie bei der Paradieswitwe, daher die Bewegungen viel lebhafter sind. Der Lockruf ist ein scharfes Zirpen, aber das Männchen läßt in der Erregung auch einen kurzen und ziemlich leisen Gesang hören."

Ich besitze heute noch 2,1 dieser reizenden kleinen Widafinken. Das schönste Männchen, welches ich mit einem andern zurzeit in Pracht befindlichen im Mai vorigen Jahres erwarb, wurde mir im Frühjahr mit

Königswidafink.

noch zwei andern Opfern von einem Singsittichmännchen zerbissen. Diese beiden Männchen befanden sich beim Händler in der Ausfärbung und hatten die langen Ähren bereits verloren Am 25. Juli begann bei dem einen bereits wieder die Verfärbung, die sich zuerst am Schnabel und auf der Oberseite zeigte. Am 25. August ist er vollständig eingefärbt, also innerhalb 31 Tagen. Das andere Männchen begann die Einfärbung erst am 10. August, indem die Spitzen der Spatelfedern sichtbar wurden, worauf erst die Ausdehnung der Farbe vor sich ging und zwar ebenfalls zuerst am Schnabelgrunde. Die erste Einfärbung war mir deswegen besonders interessant, weil ich nirgends eine Notiz über den Vorgang finden konnte und neugierig darauf war, wie die langen Federn mit der Fahne entstehen, ob erst die Fahne und dann der Schaft oder ob erst der Schaft und daraus die Fahne erwächst. Der Vorgang ist folgender: Zeigt sich am Oberkörper bei meinen Exemplaren zuerst am Kopf die schwarze Färbung, so bemerkt man auch schon die hervorragenden vier mittleren Schwanzfedern mit der anfänglich sehr schmalen Federfahne, die sich mit Nachwachsen der Stiele bei zunehmender Länge verbreitert. Das Wachstum der Schwanzfedern nimmt längere Zeit in Anspruch als die Umfärbung des Gefieders und wird erst dann abgeschlossen, wenn die Umfärbung längst beendet ist. Sehr schön farbig dargestellt ist ein ausgefärbtes Männchen auf Tafel 14 des neuen Neunzig. Der Austritt der Schmuckfedern ist nicht richtig angegeben, denn die Kiele der Federn laufen in der Mitte zusammen, während sie auf dem Bild über die ganze Breite gleichmäßig verteilt sind. — Ungemein lebhaft, wie der langjährige Vogelliebhaber berichtet, sind meine Königswitwen eigentlich nicht; in der Lebhaftigkeit können sie sich mit den Dominikanern nicht messen. Der leider vom Singsittich umgebrachte Vogel war viel lebhafter als dieser und führte elegante Balzflüge aus. Nie sah ich sie je unfriedlich oder zänkisch, es sei denn am Futternapf, in dem sie der Länge nach sitzen und scharren, daß die Körner nur so spritzen. Den Gesang kann ich im gleichen Sinne mit dem langjährigen Vogelliebhaber als laut bezeichnen, im Gegensatz zu Stark in seinem obigen Bericht. Er ähnelt dem der Dominikanerwitwe, ist aber wohllautender und mit Flötentönen und Trillern durchsetzt. Sonne lieben sie sehr und suchen sie auf, wo sie ihnen erreichbar ist. Von diesen reizenden, wahrhaft exotisch schönen kleinen Widafinken könnte ich eine ganze Voliere voll haben, ohne den Überfluß zu empfinden. Niemand wird die Erwerbung einer Königswitwe bereuen. Die hübsche Färbung, der ungemein zierliche Federschmuck, das sanfte und liebliche Wesen machen sie zu empfehlenswerten Volierenbewohnern.

Über das Gegenstück der Vorgenannten, der Fischers-Witwe — Linura fischeri (*Rchw.*) — kann ich nur berichten, daß es mir trotz eifriger Bemühung bis heute nicht gelungen ist, auch nur ein einziges Exemplar zu sehen, vielweniger zu erhalten. Im Bilde kann sie wenigstens gezeigt werden. Ostafrika, insbesondere das Becken nördlich dem Kilimandjaro, beherbergt viele herrliche und leidenschaftlich begehrte Vögel, die uns bisher unerreichbar blieben. Möchten sich doch auch hier einmal die Importeure ein dankbares Bezugsgebiet erschließen, das, mit Vernunft und Maß ausgebeutet, der Liebhaberei neue Arten und dem Handel klingenden Lohn zuführen würde.

(Fortsetzung folgt.)

Der rotrückige Würger (Lanius collurio), seine Pflege, Sommer- und Winterernährung.

Von Karl Finck, Neukölln.

(Schluß.) (Nachdruck verboten.)

Der sorgsame Liebhaber versucht immer wieder die Tiere wenigstens Stunden aus dem Stumpfsinn zu wecken. Ein kurzer Zimmerflug wirkt in dieser Hinsicht oft Wunder.

Vor allen Dingen ist der Ernährungszustand regelmäßig zu kontrollieren, was durchaus keine Schwierigkeiten bereitet. Man nimmt den Vogel einfach in die Hand, dreht ihn auf den Rücken und pustet vorsichtig die Federn auf. Ist die Brust voll, der Unterleib und die Halsgrube mit einer gelben Fettschicht überzogen, dann ist sicher eine Überernährung vorhanden, während sich Abmagerung durch das scharf hervortretende Brustbein kenntzeichnet.

Sobald sich Fettanhäufung bemerkbar macht, wird täglich dreimal gefüttert und die einzelnen Portionen so abgemessen, daß der Vogel in den Zwischenzeiten immer 1—1½ Stunden ohne Nahrung bleibt. Selbstverständlich muß der Liebhaber die Morgenfütterung reichlicher gestalten, sobald er tagsüber nicht zu Hause ist, allein auch dann soll das Futter wenigstens in der späten Nachmittagszeit verzehrt sein. Länger als zwei Stunden darf jedoch das Fasten niemals währen. Besonders eiweiß- und fettreiche Beigaben werden natürlich ausgeschaltet.

Die Hauptnährstoffe sollen außerdem in einem richtigen Verhältnis zueinander stehen. Gleich wichtig sind die sogenannten Nährsalze. Fehlt ein einziger notwendiger Mineralstoff, oder ist er in unzulänglichen Mengen vorhanden, dann machen sich immer früher oder später krankhafte Zustände bemerkbar, namentlich verläuft häufig der Federwechsel annormal.

Die chemische Zusammensetzung der verfügbaren Futtermittel zeigt nun bedeutende Abweichungen.

In 1000 Teilen	Kali	Natron	Kalk	Magnesia	Phosphorsäure	Kieselsäure
Maikäfer, lebend	5	0,8	0,4	1,4	5,6	0,2
Rindfleisch	3,9	1,0	0,25	0,3	4,1	0,5
Hühnerei ohne Schale	1,6	2,2	1,0	0,2	3,5	0,1
Weinbeerensaft	4,3	0,1	1,0	0,3	1,4	0,2
Birne	1,7	0,4	0,3	0,32	0,4	0,1

Der Einfluß unverdaulicher Insektenreste auf den Verdauungsprozeß wurde schont erwähnt.

Eine möglichst vielseitige Abwechslung ist empfehlenswert. Bei einiger Umsicht lassen sich unschwer die verschiedensten Kombinationen zusammenstellen. Trockene Ameisenpuppen werden z. B. mit Weintraubensaft angefeuchtet, dann wird etwas Schmetterlingsschrot hinzugemischt, damit eine lockere, flockige Masse entsteht. Als Zugabe gibt es 6—8 Mehlwürmer, einige erweichte Heuspringer und etwas Rindfleisch. Am anderen Tag vermengt man zweckmäßig die Puppen mit feingewiegtem Hühnerei, das zwar weniger Proteïn, aber dafür mehr Nährsalze aufweist. Außerdem erhält der Würger mehrere kleine Regenwürmer, Asseln, einige Küchenschaben (Periplaneta orientalis) oder Russen (Blatta germanica). Die Kerfen dürfen jedoch aus keinen Räumlichkeiten stammen, wo Gift gelegt wurde.

Das Fleisch der Schnirkelschnecken (Helicidae), etwas mit Maikäferschrot bestreut, wird ohne weiteres angenommen. Landschnecken, einschließlich der großen Weinbergschnecke, lassen sich in einem kalten Raum unschwer überwintern. Vor dem Gebrauch werden die Tiere abgebrüht und die Gehäuse entfernt. Sehr begehrte Leckerbissen sind auch die Käfer des Mehlwurmes. Erwachsene Würmer, warm gestellt, verpuppen sich bald.

Sogar tote, in der Hecke abgestorbene Käfer, mit Obstsäften angefeuchtet oder geschrotet, geben ein brauchbares Futter; sie haben besonders für solche Würgerbesitzer einen Wert, die während der Sommerzeit zu wenig resp. gar keine Insekten abtrockneten.

Manche Würger verzehren begierig kleine Fische. Vor übermäßigen Fleischgaben möchte ich jedoch warnen, ebenso ist die Verwendung des Garnelenschrotes nicht empfehlenswert.

Bleibt der Ernährungszustand halbwegs normal, sind keine Erweiterungen der Därme vorhanden und enthält das Futter ausreichend alle notwendigen an- und organischen Verbindungen, so wird mit ziemlicher Sicherheit Januar/Februar die Mauser beginnen. Die Federn werden auch schnell und straff erscheinen. Während des Gefiederwechsels, wo wie in der ganzen Gesangsperiode entsprechendes Produktionsfutter gereicht werden muß, darf man den Vogel nicht anfassen. Ein umsichtiger Liebhaber kennt bis dahin schon die Natur seines Pfleglinges und wird im allgemeinen richtig füttern. Im Notfalle läßt sich mit einer Briefwage das Gewicht leicht feststellen

Bei Beachtung der angegebenen Hinweise zeigt sogar der Würger erstaunliche Festigkeit.

Der zuerst erwähnte Vogel befand sich sieben Jahre in meinem Besitz; er starb im zweiten Kriegswinter, als mir die Ameisenpuppen ausgingen. Geeigneter Ersatz fehlte, zumal ich in dem vorangegangenen Sommer infolge Krankheit nicht ausreichend Insekten abtrocknen konnte. Der rotrückige Würger genießt keinen gesetzlichen Schutz; er ist als angeblicher Massenmörder vollständig frei. Diese nach meiner Ansicht willkürliche Annahme wird mir stets unverständlich bleiben.

Unzählige Male habe ich den Dorndreher im Freien beobachtet, aber auch in keinem Falle ließ sich eine systematische Nesträuberei feststellen. Dagegen fand ich oft, daß andere kleine Vogelarten unbehelligt in seinem Reviere nisteten, einmal sah ich sogar, wie ein Zaunkönigpärchen in unmittelbarer Nähe des auf einem erhöhten Zweige sitzenden Würgers seine fünf Jungen atzte, die der verrufene Räuber nicht im geringsten beachtete. Bittere Not möge zur Ausnahme führen. Wahrscheinlich sind die Charaktere verschieden. Nackte, hinausgefallene Nestlinge dürften ohne weiteres aufgenommen werden.

Der rotrückige Würger trifft erst im Mai ein und verläßt uns wieder frühzeitig.

Sehr häufig kommt der Dorndreher in den Auwäldern der Donau vor, wenigstens war es früher der Fall. Jene Striche zeigten damals noch ein urwäldliches Gepräge.

Manche Erlbrüche konnte man kaum durchdringen, so dicht wucherten mannshohe Gräser, Schilf, Brennesseln, Disteln und Kletten, dazwischen schoben sich noch Weißdorn, Wildrose oder die Brombeere bildete dichte Verhaue, Wilder Hopfen, Winde, Wald- und Zaunrebe verwebten ganze Partien zu festen Gebilden.

Tote Flußarme trennten die Bestände, verstreut lagen außerdem noch zahlreiche, von Weiden umrahmte Tümpel, meistens vollständig von Rohr, Wasserrosen und anderen Sumpfpflanzen überzogen. Die faulenden Vegetationsreste verbreiteten üble Gerüche. Myriaden, Mücken, Schnecken, allerlei Käfer, Schmetterlinge usw. flogen und surrten umher. Große Vielseitigkeit zeigte auch die Vogelwelt.

In den niedrigen Kulturen sprudelten und orgelten im Frühling die verschiedenen Grasmücken, schwätzte der Sprachmeister, sangen Rotkehlchen und Fitisvögel, schmetterte der Zaunkönig sein Hochzeitsliedchen, kicherten Meisen, leierte die Goldammer und wie sonst das Sängervolk noch heißt.

Oben, in den hochgewölbten Baumkronen flöteten Pirole und jubelten Graudrosseln. Über das Steingerölle liefen gelbe Bachstelzen, strichen Strandläufer



Fischers Widafink.

und Regenpfeifer. Überall rief der Wiederhopf. Hoch, in der blauen Luft zogen schwarze Milane und verschiedene Falken ihre Kreise. Vielfach befand sich in den Rüstern Horst an Horst, während in hohlen Silberpappeln Käuzchen, Schleier- und Waldeule nisteten. Oft stieß ich auf ausgedehnte Reiher-, Krähen- und Dohlenkolonien. Auffallend zahlreich war in manchen Jahren die Blauracke Streckenweise stoben beinahe auf Schritt und Tritt Fasanen ab, flogen Wiesen,- rostbraune Rohr- und helle Kornweihen hoch. Dumpf gurrten Wildtauben. Dann wieder polterte Rotwild davon, oder ein Sprung Rehe eilte in weiten Fluchten weg.

Am Rande der Brüche, im dichten Gestrüpp brüteten in diesem Vogelparadies Dorn-, Müller-, Sperber- und Gartengrasmücke, Schwarzplättchen, Zaunkönig, Sprachmeister, Würger und sonstige Vogelarten vertraut nebeneinander, während eine Etage höher häufig Turteltauben, Buchfinken und Meisen ihre Nester hatten.

Bereits Mitte Mai waren hier die meisten Gelege des Dorndrehers mit 5—6 Eierchen belegt, deren Grundfarbe bekanntlich erhebliche Unterschiede aufweist. Später beobachtete ich oft halbe Sonntage durch ein scharfes Glas, die Fütterung der Jungen. Stets aber bestand das Atzfutter aus Insekten. Einige Männchen klemmten Heuschrecken, Schmetterlinge oder Käfer, die in unglaublichen Mengen auftraten, zwischen Astgabeln ein. Dagegen traf ich sogenannte Würgergalgen nur dreimal an.

Wiederholt päppelt ich früher junge Würger auf. Die Kerle blieben aber erbärmliche Stümper und fielen durch die ewige Bettelei lästig. Wildfänge nehmen viel eher neue Imitationen auf. Selbst in reinen Ackergegenden sofern Hecken, bewachsene Gräben und Wege nicht fehlen, ist unser Würger oftmals häufig.

Auf einem großen Gute übernahm ein junger Forstmann den Feldschutz, der im Dünkel seiner Schulweisheit zu meinem Schrecke den Dorndreher innerhalb einiger Wochen beinahe vollständig ausrottete.

Auch ein Liebhaber erzählte mir einmal, daß er während eines Ausfluges 12 Gelege zerstörte.

Solche oberflächliche Menschen sind eigentlich zu beneiden. Der gewissenhafte Beobachter forscht unabläßig, vergleicht immer wieder und wagt kaum ein bestimmtes Urteil abzugeben.

Überhaupt läßt sich der Nutzen und Schaden einer Vogelart niemals nach bestimmten Grundsätzen abwägen, weil die jeweiligen Verhältnisse eine bedeutende Rolle spielen; ich würde z. B. in einem Bezirk, wo der Feldsperling in Massen auftritt, nicht einmal den Sperber abschießen.

Vor dem Kriege sah man im Mai und Juni in mancher Vogelhandlung den armen Würger dutzendweise ausgeboten. Vielfach bekamen die bedauernswerten Geschöpfe bloß Weichfutter und einige Mehlwürmer.

Nach meiner Ansicht darf nur ein erfahrener, sorgsamer Liebhaber solchen empfindlichen Vogel käfigen. Vielleicht trägt diese Abhandlung zur Aufklärung bei.

Fütterung ausländischer Körnerfresser.

Von Adolf Voigt, Jena.

(Nachdruck verboten.)

Recht oft ist in letzter Zeit über die Verpflegung einheimischer Insektenfresser geschrieben worden. Neben alterfahrenen Praktikern nahmen Wissenschaftler das Wort, besonders die Vitaminforschungsergebnisse kamen zur Sprache und fordern zum Nachdenken

heraus. Wir alten Leser der „Gef. Welt" denken oft Jahrzehnte zurück, denken vor allem an die Artikel des verstorbenen Dr. Otto. Meinungsaustausch von Praktikern wird immer die Wissenschaft fördern und um diesen anzuregen, gestatte ich mir, meine Erfahrungen in der Verpflegung der Prachtfinken und ausländischen Finken sowie kleinerer Papageien mitzuteilen.

Erst kürzlich erschien in einer großen Geflügelzeitung ein Artikel über „Exoten". Der Verfasser betont besonders: Als Hauptfutter dient weiße Hirse und Glanz. Das ist richtig — aber schwer durchzuführen. Weiße Hirse ist ein selten angebotener Artikel und bekommt man wirklich mal ein kleines Quantum, so ist die Qualität nicht besonders gut — kleine Körner, gelbliche Farbe und viel Schmutz. Und der Preis erst! 100—120 % teurer als vor dem Kriege! Wer nur 1—2 Paare zu versorgen hat, kann auch 45 Pf. für ein Pfund Hirse anlegen, selbst wenn er mit Glücksgütern nicht so besonders gesegnet ist. Wer aber mit jeder Mark rechnen muß — (und die schlechtesten Vogelpfleger sind das deshalb noch lange nicht!) und 70—80 Ausländer hält, dem stehen die Haare zu Berge bei solchen Preisen und er sucht nach „Ersatz".

Als wir — mein erwachsener Sohn und ich — vor zwei Jahren die einige Jahre unterbrochene Vogelhaltung wieder aufnahmen und unsere Käfige und Volieren mit Ausländern zu besetzen beschlossen, da war die Sorge um Futter die erste und wurde auch zuerst mit Hilfe unseres holländischen Freundes gelöst. Aber die Vogelschar vermehrte sich durch Bruterfolge und Neuerwerbungen, und wir mußten daran denken, im Inlande zu kaufen. Bunthirse gab es ja, und da Wellensittiche und blaubürzlige Sperlingspapageien keine anspruchsvollen Vögel sind und auch gequellten Hafer sehr gern fressen, bereitete deren Verpflegung keine Schwierigkeiten. Die Prachtfinken jedoch wollten nicht so recht heran an die Bunthirse, und da nur die Amandinen Glanzsaat fraßen, war es um die Verpflegung der Astrilde schlecht bestellt. So wurde denn großkörnige gelbe Hirse in prachtvolle Qualität aus Holland bezogen und diese nahmen alle Vögel fast ebenso gern als die daneben gereichte weiße Hirse. Auch Mohn wird von allen unsern Prachtfinken — besonders aber von den Astrildarten — sehr gern gefressen. Wir kaufen recht großkörnigen Blaumohn und reichen ihn in allen Käfigen und Volieren. Negersaat gibt es ab und zu mal zur Abwechslung und als besondere Delikatesse, in Pausen von drei bis vier Wochen, sie wird wohl von keinem Körnerfresser verschmäht. Rübsen frißt kein Vogel, der im Freiflug gehalten wird und neben dem Rübsen Mohn und Glanz zur Verfügung hat.

Lange Zeit fehlte weiße Hirse auf dem Markte und die jetzt, im November 1924, bezogene, ist kleinkörnig, unsauber, minderwertig. Wir bleiben also in der Hauptsache bei der großkörnigen, gelben Hirse.

Alle Astrilde, Amandinen, Kubafinken und Graugirlitze erhalten als Hauptfutter gelbe Hirse, die Vögel in den Volieren solche im gequellten Zustande. Auch zur Aufzucht der Jungen benutzen sie diese. Wir quellen sie mit wenig Wasser so lange, daß eben die Keime durchzubrechen beginnen, werfen die nasse Hirse in Sandgefäße, ohne sie abzutrocknen, denn viel vom entwickelten Zucker geht durch das Trocknen verloren und mit wahrer Leidenschaft stürzt sich die ganze Gesellschaft auf dies Futter. Auch die flügge werdenden Jungen fressen die so angekeimte Hirse als erstes Futter, das sie aufnehmen.

In selbstgebauten großen automatischen Sparfutterapparaten wird trockene, gelbe Hirse, weiße Hirse und Glanz gereicht. Letzteren fressen alle Amandinen (Spitzschwänze, Gould, Zebrafink u. a.) sehr gern. Auch Wellensittiche und Sperlingspapageien nehmen ihn, für meine Kanarien bildet er die Hauptnahrung auch während der Brutzeit. Von den Astrilden wird er kaum berührt.

Rotrückenwürger.

Der Mohn ist schon seit sieben Jahren neben Grünkraut fast die einzige Nahrung, die unser alter Zeisig zu sich nimmt. Neben ihm fressen die Kanarien gern Mohn, auch zur Nistzeit. Alle Astrilden, ebenso die Kubafinken nehmen ihn sehr gern, die Wellensittiche, Sperlingspapageien und Amandinen begehren ihn weniger. Auch zur Aufzucht der Jungen darf er bei unseren Astrilden und Kubafinken nie fehlen. So lange es frische Ameisenpuppen gibt, erhalten alle Prachtfinken und Finken diese. An die großen Geschlechtsameisenpuppen gehen sie ungern. Sobald es im Garten kleine Rasenameisen gibt, werden die Nester, die ich beim Hacken finde, durch übergestülpte Blumentöpfe geschützt und von Zeit zu Zeit ausgebeutet. Mit Erde und lebenden Ameisen zusammen kommt die ganze Bescheerung in einen flachen Napf (Blumenuntersetzer), dieser selbst wieder in einen mit etwas Wasser versehenen großen, flachen Untersetzer. Auf diese Weise können die Ameisen ihre Puppen nicht forttragen, durch das Wasser gehen sie nicht. Die winzig kleinen Puppen

der Rasenameisen sind viel begehrter als die der Waldameisen. Daneben wird ein wenig Eierbrot mit hartgekochtem Ei (Gelbes und Weißes fein gehackt) gereicht, Mehlwürmer reichen wir im Sommer nicht. Ende August beginnt die Gewöhnung an gebrühte Ameisenpuppen mit Ei gemischt, zunächst werden noch frische reichlich dazwischen gemischt — von Tag zu Tag weniger. Mit recht bedenklichen Gesichtern standen wir dabei, als im Oktober Tigerfinken und Spitzschwanzamandinen Junge in den Nestern hatten —, werden sie füttern? Es gelang, mit einigen zerschnittenen Mehlwürmern, Eigemisch und der angekeimten Hirse wurden diese Jungen großgebracht.

Daß man bei der Fütterung mit Grünkraut und halbreifen Sämereien vorsichtig sein muß, beweist die Kubafinkenzucht. Die kleinen „Quecksilbervögel" nahmen bei der ersten Brut weder frische Ameisenpuppen noch gequellte Hirse, nur Grassamen wurde gefressen, da er reichlich halbreif gereicht wurde. Dabei gediehen die Jungen schlecht und gingen bis auf eins ein, nachdem sie schon das Nest vorzeitig verlassen hatten. Bei der zweiten Brut waren wir



An der Wand befestigte Sitzgelegenheit für Raubvögel mit darunter befindlichem Sandkasten.

vorsichtiger, gaben nur mittags Grasrispen, die nach 1 Std. wieder entfernt wurden und alle drei Junge kommen gut auf. Den Wellensittichen und allen Jungvögeln reichen wir Grünkraut und halbreife Gräser in großer Menge.

Sehr gern nehmen Kubafinken, Spitzschwanzamandinen, Gouldamandinen und andere auch flüssiges Eiweiß. Ich schlage ein ganz frisches Ei auf, nehme die Hälfte der Schale, fülle sie dreiviertel voll Eiweiß und stelle sie in ein kleines flaches Näpfchen, so daß der Rand nicht über 1—2 mm herausragt. Die Eierschale bleibt feucht und wird gern gefressen, das Eiweiß wird gern getrunken. Im Sommer darf es nur $^1/_2$ Tag stehen bleiben, sonst verdirbt es. Ich weiß nicht, woran es liegt, jedenfalls haben unsere Weibchen noch nie an Legenot gelitten; in den langen Jahren, seit ich Züchter bin, habe ich nur 2 Fälle von Legebeschwerden gesehen. Ich besaß im Jahre 1910 ein Wellensittich-♀ und 1914 ein Zebrafinkweibchen, beide haben aber doch noch ohne Operation die Eier gelegt, nachdem sie warm eingepackt worden waren und beide Male hatten diese Eier Schale. Seitdem ist kein Fall wieder vorgekommen, trotzdem im vorigen Jahre z. B. ein kaum 5 Monate altes Wellensittich-♀ im Dezember in eiskalter Kammer legte und erfolgreich brütete.

Als Futter zu erwähnen wäre schließlich noch der Hafer. Für Wellensittiche gibt es kein billigeres und bekömmlicheres Futter als Hafer. Wir kaufen ungeschälten, guten Gelbhafer, quellen ihn 24 Std. in Wasser und reichen ihn naß in flachen Schalen. Im Winter wird er trocken gegeben, da die Wellensittichkammer nicht frostfrei ist und der nasse Hafer fest zusammenfrieren würde. Die Kanarien fressen ihn ebensogern wie die Wellensittiche und auch die Reisvögel gehen gern daran.

Wie aus vorstehendem hervorgeht, ist unsere Fütterung gar nicht kompliziert und vor allem nicht teuer. Und daß sie genügt, hat uns der Erfolg, den wir mit vielen Zuchtpaaren hatten, bewiesen. Sind doch 57 Jungvögel im Laufe des Jahres 1924, in unseren Käfigen und Vogelstuben groß geworden. Für den Winter steht Tradeskantia in etwa 20 Töpfen zur Verfügung. Die Vermehrung dieser Pflanze ist leicht, jeder Steckling schlägt Wurzel, wenn er in lockere Erde gesteckt und feucht gehalten wird. Auch im Balkon- und Blumenkasten kann sie jeder Vogelliebhaber vermehren. Daß im Garten bei uns manches Unkraut geduldet wird, das den Vögeln als Futter dient: Vogelmiere, Kreuzkraut, Grassamen versteht sich von selbst, daß sieht ja manchmal nicht garade schön aus, aber der Zweck heiligt die Mittel, und unsere Vögel danken es uns.

Jena, 10. November 1924.

Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber (E. V.) Sitz Leipzig.

1. Vorsitzender Joh. Birk, Leipzig-Mockau, Beuthstr. 29; Geschäftsstelle: Rudolf Petters, Leipzig-Probstheida, Preußenstr. 31; Kassierer Werner Geßler, Leipzig Dresdner Str. 2; Tauschvermittlung — T.-V. —: Richard Vorwerk, Leipzig-Lößnig, Merveldstr. 39.

An unsere Mitglieder!

Unterm 27. Oktober 1924 ist der Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber mit dem Sitze in Leipzig ins Vereinsregister eingetragen worden. Nachstehend geben wir allen uns angeschlossenen Mitgliedern die endgültigen Satzungen zur Kenntnis, die, wenn sie im Druck vorliegen, jedem Mitgliede zugestellt werden sollen.

§ 1. Namen und Zweck des Vereins.

Der Verein führt den Namen
Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber.

Er hat seinen Sitz in Leipzig und soll ins Vereinsregister eingetragen werden.

Er bezweckt von sich aus oder in Verbindung mit bereits bestehenden Organisationen

1. Vertretung der Interessen der Vogelliebhaber bei den gesetzgebenden Körperschaften und Behörden,
2. Stellungnahme zu jeglichen Angriffen von seiten der Gegner der Vogelliebhaberei,
3. Eintreten für den Natur- und Vogelschutzgedanken durch Ausübung eines praktischen Natur- und Vogelschutzes,
4 Förderung der Vogelkunde und der -liebhaberei,
5. Bekämpfung unlauterer Machenschaften im Vogelhandel im Verein mit dem Verbande der Vogelhändler Deutschlands.

§ 2. Organisation.

Der Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber ist die Organisation, in der sich

a) die Liebhaber durch ihre Mitgliedschaft zu einem bestehenden Landesverbande als Vereinsangehörige oder Einzelpersonen und
b) Vereine und Einzelpersonen in Ländern ohne Landesverband zur Erreichung des Zweckes in § 1 zusammengeschlossen haben.

Das Geschäftsjahr läuft vom 1. April des jeweiligen bis zum 31. März des nächsten Jahres.

Die an den Reichsverband abzuführenden Beiträge werden von der Generalversammlung festgesetzt.

Die Beiträge sind von den Vereinen nach dem Mitgliederbestande des 1. April d. J. und Einzelmitgliedern für das Geschäftsjahr zu entrichten. Die Entrichtung erfolgt durch die Landesverbände. In Ermangelung der letzteren durch die Vereine und Einzelmitglieder selbst.

§ 3. Mitgliedschaft.

Mitglieder können werden

a) Landesverbände,

b) Vereine und Einzelpersonen, die den gleichen Zweck unter § 1 zu erreichen suchen und keinem Landesverbande angeschlossen sind oder angeschlossen zu sein wünschen,

c) Personen, die mangels eines Landesverbandes nicht angeschlossen sein können.

Die Mitgliedschaft können Personen beiderlei Geschlechts des gesamten deutschen Sprachgebietes erwerben. Sie müssen ihren Beitritt und ihre Zugehörigkeit durch schriftliche Willensäußerung erklären.

Vogelhändler können die Mitgliedschaft durch Anschluß ihrer Organisation an den Reichsverband erwerben. Als Einzelmitglieder kann keine Aufnahme erfolgen.

Ausgeschlossen sind Kanarienzüchtervereine.

Über die Aufnahme entscheidet der geschäftsführende Vorstand. Die Ablehnung des Aufnahmeantrages wird in der Regel unter Grundangabe erfolgen.

Die Mitgliedschaft erlischt:

a) durch Willenserklärung,

b) durch Auflösung eines Landesverbandes, wenn die dadurch erlöschende Mitgliedschaft nicht erneuert bezw. fortgesetzt wird

am Ende des Geschäftsjahres.

Ausschluß kann erfolgen:

a) durch Nichtzahlung der Beiträge,

b) durch Begünstigung von Bestrebungen gegen den in § 1 erwähnten Zweck.

Durch Ausschluß erlischt die Mitgliedschaft ebenfalls mit dem Ende des Geschäftsjahres.

Die Mitgliedschaft berechtigt:

1. zur Teilnahme an den Versammlungen des Reichsverbandes, an den Abstimmungen, zur Stellung von Anträgen,
2. zur Benutzung aller von dem Reichsverband getroffenen Einrichtungen,
3. zur Inanspruchnahme des Reichsverbandes in allen zum Zwecke des Reichsverbandes gehörenden Angelegenheiten

§ 4. Vorstand.

Der Vorstand besteht aus dem Gesamt- und geschäftsführenden Vorstand.

Der geschäftsführende Vorstand besteht aus dem 1. und 2. Vorsitzenden, 1. und 2. Schriftführer und einem Kassierer.

Die Vertretung des Reichsverbandes geschieht nach innen und außen durch den 1. Vorsitzenden, im Behinderungsfalle durch den 1. Schriftführer. Er bildet den Vorstand im Sinne von § 26 BGB. und ist an die Beschlüsse des Gesamtvorstandes gebunden.

Der Sitz des geschäftsführenden Vorstandes muß an einem Orte sein.

Der Gesamtvorstand besteht aus dem geschäftsführenden Vorstande und aus 8 von der Generalversammlung zu wählenden Personen.

Der Gesamtvorstand und zwei Kassenprüfer werden von der Generalversammlung auf zwei Jahre gewählt.

§ 5. Generalversammlung.

Die Generalversammlung wird durch den geschäftsführenden Vorstand einberufen. Die Einladung erfolgt im Verbandsorgan, spätestens acht Wochen vor der Versammlung. Sie findet an einem von der Generalversammlung zu bestimmenden Orte statt.

Anträge sind spätestens vier Wochen vor der Generalversammlung an den geschäftsführenden Vorstand einzureichen. Dringlichkeitsanträge können vor Beginn der Versammlung eingereicht werden und sind zur Beratung und Beschlußfassung zu bringen, sofern die Dringlichkeit von der Generalversammlung anerkannt wird.

Zur Generalversammlung haben die Landesverbände und Vereine, soweit sie keinem Landesverbande angehören können, das Recht Delegierte abzuordnen. Auf je 5 Vereinsmitglieder entfällt ein Delegierter mit einer Stimme. Durch Bevollmächtigung kann die Stimmenzahl auch auf einen Delegierten vereinigt werden.

Auf der Generalversammlung werden die geschäftlichen Angelegenheiten, — Geschäftsbericht, Kassenbericht, Besprechung der gestellten Anträge, Beschlußfassung usw. -- erledigt.

Die Generalversammlung hat den Gesamtvorstand zu wählen, sie findet aller zwei Jahre statt.

Über jede Versammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das vom Versammlungsleiter und Protokollführer zu unterzeichnen ist.

§ 6. Auflösung des Reichsverbandes.

Die Auflösung des Reichsverbandes kann nur auf einer Generalversammlung erfolgen.

Zur Auflösung sind mindestens die Stimmen von dreiviertel der dem Reichsverband angeschlossenen Mitglieder erforderlich.

Etwa vorhandenes Vermögen ist Vogelschutzzwecken zuzuführen.

Berlin, am 27. April 1924.

Ohne Inanspruchnahme von Reichsverbandsmitteln nahm der 1. Vorsitzende des Reichsverbandes, Herr Birk, an der in Heidelberg veranstalteten Ausstellung teil. Bei dieser Gelegenheit ist es ihm geglückt, anwesende Vogelliebhaber aus Südwestdeutschland für einen Landesverband Südwestdeutschland zu gewinnen. Dieser Landesverband umfaßt Württemberg, Baden, Hessen und die Pfalz. Die abgehaltene Gründungsversammlung wählte Herrn Professor Dr. Otto Fehringer in Heidelberg, Blumenstraße 26, zum 1. Vorsitzenden.

Ohne näheren vorzugreifen, geben wir hiervon unseren Mitgliedern hocherfreut Kenntnis und wünschen dem neuen Landesverband ein gutes Gedeihen und eine kräftige Entwicklung zu Nutz und Frommen unserer herrlichen Liebhaberei. J. A.: Petters, 1. Schriftführer.

Vom Vogelmarkt.

Von seltener auf den Vogelmarkt kommenden Vögeln werden angeboten:

Beck, Tierimport, Stuttgart: Steinsperlinge, Zitronzeisig.

Otto Bergmeister, Auf der Höhe-Solingen: 1,0 Katzendrossel, 1,0 Singsittich.

Julius Sauer, Leipzig, Neumarkt 16: Rotstirnamazone, Surinamamazone.

E. Schöndube, Berlin, Elisabethkirchstr. 1: Goldhähnchen, Wiesenpieper, großer Würger, Weindrossel, flavistischer Zeisig, Zebratauben, Malabarfasänchen, roter Kardinal.



Hrn. J. L., Stolk (Schleswig). 1. Zu dem genannten Futter sind noch zu reichen frische Ameisenpuppen, ein Insektenfresserfutter, gehacktes hartgekochtes Ei, Grünkraut, Zweige von Obstbäumen, Linden, Weiden, Birken mit schwellenden Blattknospen, auch allerlei kleine Kerfe. 2. Es ist wohl anzunehmen, daß an der schlechten Befruchtung der Eier das Männchen Wellensittich schuld hat. Am besten wird ein zweites Paar beschafft, dessen Männchen mit dem alten Weibchen verpaart wird und umgekehrt. 3. Ich nehme an, daß die Prachtfinken nur während der wärmeren Jahreszeit in der Voliere bleiben. Es kämen dann in Betracht Silberschnäbelchen, weiße Reisfinken, Elsterchen, welche häufig recht angriffslustig sind, Zebrafinken. Die verschiedenen Gürtelgrasfinken sind meist nicht friedlich genug, um mit vielen anderen zusammengehalten werden zu können. Ob sich die Tarantinischen Unzertrennlichen mit Wellensittichen vertragen, muß abgewartet werden.

(Fortsetzung auf der 2. Umschlagseite.)

rgang 53 4. Dezember 1924 Heft 42

DIE GEFIEDERTE WELT.

ZEITSCHRIFT FÜR VOGELLIEBHABER

Begründet von Dr. Karl Ruß

Herausgegeben von Karl Neunzig in Berlin-Hermsdorf

Inhalt:

Johann Andreas Naumann.

Webervögel und Widafinken. Von A. Krabbe. (Fortsetzung.)

Der rotrückige Würger (Lanius collurio), seine Pflege, Sommer- und Winterernährung. Von Karl Finck, Neukölln. (Schluß.)

Fütterung ausländischer Körnerfresser. Von Adolf Voigt, Jena.

Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber (E. V.) Sitz Leipzig. - Vom Vogelmarkt - Redaktionsbriefkasten - Bevorstehende Vogelschauen - Aus den Verbänden - Aus den Vereinen.

Abonnement monatlich (4 Nummern) 1.50 Gm. — Einzelpreis des Heftes 50 Gpf.
vermittelt das nächste Postamt bzw. der zuständige Briefbote. / Postversand ab Burg Bez. Magdeburg.

eutz'sche Verlagsbuchhandlung / Magdeburg / Postschließfach 148

Bevorstehende Vogelschauen.

Verein für Vogelschutz und -pflege zu Dresden. Gegr. 1906. (Vormals Vereinigung der Vogelliebhaber zu Dresden.) Vom 20.—22. Dezember d. J. veranstaltet genannter Verein in dem Saale des „Italienischen Dörfchens", Dresden, Schloßplatz, die zweite Vogelschau. Dieselbe wird das Gebotene der ersten in den „Annenfälen" 1923, welche dem Verein, vor allem in finanzieller Hinsicht, guten Erfolg brachte, um vieles übersteigen. Alle Vogelliebhaber sind herzlich willkommen. J. A.: Bernhard Kühn, Vors.

Bayrischer Vogelliebhaber-Verein E.-V. Sitz München. Der Bayrische Vogelliebhaber-Verein hält vom 6.—11. Dezember im „Hirschbräukeller", München, Zollstraße, eine Vogelschau ab, in Verbindung mit der Weltbundesgruppe Oberbayern E. V. und dem Verband deutscher Farben-, Gestalts-, Bastardkanarien- und Exotenzüchter E. V. Der Zweck der Ausstellung dürfte ja allgemein sein, soll doch das Münchner Publikum für unsere heimische Avifauna interessiert und auch der Käfighaltung das übliche Vorurteil genommen werden. Es sind auch die Münchner Mittel- und Volksschulen aufgefordert, die Ausstellung an Wochentagen unter Führung der Lehrkräfte zu besuchen, um schon in den Kindern den Sinn für unsre heimische Vogelwelt zu wecken. Aufschluß in allen Fragen erteilt: Leopold Keidel, München, Schraudolfstraße 44 III.

Verband deutscher Farben-, Gestalt-, Bastardkanarien- und Exotenzüchter, E.-V. Sitz München. Der Verband hält vom 6.—11. Dezember in München eine Ausstellung mit Prämiierung ab, und zwar mit dem Bayrischen Vogelliebhaber-Verein E.-V. und der Weltbundesgruppe Oberbayern E. V. Wir lassen an alle auswärtigen Mitglieder hierzu Einladung ergehen und bitten eventl. Aussteller, sich zwecks Übersendung des Programms mit Herrn Max Pfaller, München, Auenstraße 78 I, in Verbindung zu setzen.
Die Verbandsleitung.

Karlsruhe, Verein von Vogelfreunden. Gegr. 1888. Vogelschau u. Kanarienprämiierung am 6. u. 7. Dez. 1924.

Aus den Verbänden.

Verband deutscher Farben-, Gestalt-, Bastardkanarien- und Exotenzüchter und des Bayerischen Vogelliebhaber-vereins (e. V.) Sitz München, Ortsgruppe Augsburg. Jeden Samstag gemütliche Zusammenkunft beim Vogelwirt Joseph Leininger, Gasthof, Frohnhof—Peutingerstr. Jeden 1. Samstag im Monat Monatsversammlung ebendort. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. Als amtliches Vereinsorgan ist die „Gef. Welt" anerkannt worden.
J.A.: H. Schwaiger, 1. Vors., Augsburg, Schöpplerstr. 9/I.

Aus den Vereinen.

„Aegintha", Verein der Vogelfreunde zu Berlin. Sitzung jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat, abends 8 Uhr, im Vortragssaal des Aquariums. Fast in jeder Sitzung belehrende Vorträge und Besprechungen unter gütiger Mitwirkung unseres verehrten Ehrenmitgliedes Herrn Dr. Heinroth. Gäste gern willkommen.
J.A.: O. Vorbrodt, 1. Schriftf., O 112, Scharnweberstr. 18.

Vereinigung der Liebhaber einheimischer Vögel zu Berlin. Sitzung jeden 2. Donnerstag nach dem 1. und 15. des Monats im Vereinslokal zum „Alexandriner", Alexandrinenstraße 37 a. Gäste stets willkommen.
J. A.: P. Böhme, Schriftf., O 17, Rüdersdorfer Str. 69.

Verein für Vogelkunde, -schutz u. -liebhaberei Cassel. Sitzung jeden 2. Montag im Monat im „Deutschen Haus", Frankfurter Str. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen.
J. V.: Emil Ivo, Schriftführer.

Alte Vereinigung der Vogelliebhaber zu Dresden. Versammlung jeden Freitag, abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Blasewitzer Hof". Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. J. A.: Matth. Meys, Schriftf.

Verein Vogelschutz u. -pflege zu Dresden. Versammlung jeden Donnerstag, abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Schillers Restaurant", Ecke Stifts- und Ehrlichstr. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. Bernhard Kühn, Vors.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei zu Hamburg. Sitzung jeden 1. u. 3. Dienstag im Monat in Hüttmanns Hotel, Poolstr. 22, abends 8¼ Uhr. Nächste Sitzung Dienstag, den 15. Dezember 1924. Gäste sowie auch Exotenliebhaber stets willkommen. J. A.: Arnold Weber, 1. Vors.

Verein für Vogelschutz und -pflege Jena. Die Vereinsabende finden regelmäßig aller 14 Tage (Sonnabends) um 8 Uhr in der Wohnung des 1. Vorsitzenden, Herrn Jahn, Feodorastraße 7, statt. Jena besuchende Vogelfreunde treffen jeden Sonntag vormittag den Schriftführer, Feodorastraße 13 wohnhaft, an und sind zur Besichtigung von dessen Vogelstube herzlichst eingeladen. A. Voigt, Jena (Ost), Feodorastr. 13.

Verein von Vogelfreunden Karlsruhe. Gegr. 1888. Monatsversammlung jeden 1. Mittwoch im Monat. Lokal „Goldener Adler". Die diesjährige Vogelausstellung, verbunden mit Kanarienprämiierung, findet am 6. u. 7. Dez. statt. Außer Medaillen werden wertvolle Ehrenpreise vergeben. Zur Ausstellung werden nur Mitglieder unseres Vereins zugelassen. Bang, 1. Vorstand. Boppel, 1. Schriftf.

Verein der Vogelliebhaber Königsberg (Pr.). Sitzung jeden Freitag nach dem 1. u. 15. d. M., abends 8 Uhr im Vereinslokal „Kaiser-Kaffee", Kaiserstr., Ecke Schnürlingsstr. Gäste sind willkommen. J. A.: Ernst Reinholdt, 1. Vors.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig. Vereinssitzungen jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat im Vereinslokal „Bauers Brauereirestaurant", Täubchenweg. Nächste Sitzung Donnerstag, den 4. Dezember Gäste stets willkommen. J. A.: Johann Birk, 1. Vors.

Verein der Vogelfreunde Leipzig-Plagwitz. Vereinslokal: „Gosenschlößchen", Leipzig-Plagwitz. Sitzungen an jedem 1. und 3. Montag des Monats, abends 8 Uhr. Vogelfreunde sind stets willkommen.
K. Scholtissek, 1. Vors., L.-Plagwitz, Lauchstädter Str. 30.

Verein der Vogelliebhaber zu Mannheim. Versammlung aller 14 Tage Samstag abend 8 Uhr im Vereinslokal „Restauration z. gold. Falken", S. 1. 17. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. J. Daubmann, 2. Schriftf.

Bayrischer Vogelliebhaberverein, Sitz München (E.V.). Jeden Samstag gesellige Zusammenkunft im Pschorrbräuhaus, Bayerstr. Jeden letzten Samstag im Monat Monatsversammlung im Vereinslokal ebendort. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. Rud. Engel, 1. Schriftführer.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -pflege zu Oschatz und Umgebung. Gegründet 1. Mai 1923. Vereinsabende aller vier Wochen, in der ersten Woche des Monats verbunden mit Vortrag, in der dritten Woche jeden Monats nur gesellige Zusammenkunft. Vereinslokal „Sächsischer Hof". Gäste stets willkommen. Studienrat Professor Jahn 1. Vorsitzender; Werkmeister Mann, 2. Vorsitzender; kaufm Angestellter Reinhardt, Schriftführer.

„Ornis", Freie Bezugs-Vereinigung der Waldvogelliebhaber Deutschlands. Gegründet 1912. Auf vielseitigen Wunsch der alten Mitglieder wollen sich die Waldvogelliebhaber wieder in der „Ornis" zusammenschließen. Als amtliches Organ ist die „Gef. Welt" ausersehen worden, und werden die Artikel, die früher in den „Ornis-Blättern" erschienen, in obiger Zeitschrift gebracht werden. Aus diesem Grunde bittet die Geschäftsführung um eifrige Mitarbeit, damit unserer Waldvogelpflege wieder der Platz eingeräumt wird, der ihr gebührt. Anmeldungen sind unter Beifügung von 2 M. an den Geschäftsführer zu richten; Mitglieder erhalten auf Mischfutterbestellungen 5% Rabatt. Mit treudeutschem Gruß Martin Sperling, Halle/S., Südstr. 49.

Vereinigung einheimischer Sänger Mittelthüringen. Unsere zweite Versammlung findet am 10. Dezember, abends 8 Uhr, in Erfurt statt, Parkhotel. Freunde unserer schönen Sache herzlich willkommen. Pfarrer Schwabe, Großenbehringen.

Zoolog. Verein zu Zwickau i. S. Versammlung jeden Freitag nach dem 1. und 15. jeden Monats, abends 8 Uhr, im Restaurant „Zur Bleibe", Katharinenkirchhof. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen.
J. A.: Paul Schmidt, 1. Vors. Zwickau i. S., Bosenstr. 44.

(Fortsetzung auf der 3. Umschlagseite.)

Ein Bericht unserer Versammlung vom 19. November in Berlin ist den Mitgliedern bei Erscheinen dieser Bekanntmachung bereits zugegangen. Sollte derselbe inzwischen nicht eingetroffen sein, so bitte ich sofort Nachricht zu geben. Ganz besondere Aufmerksamkeit verdient die beigelegte Bestandsangabenliste, die bis zum 15. Dezember ausgefüllt zurückgesandt sein muß. — Unsere Vereinigung ist nach dem Muster der deutschen ornithologischen Gesellschaft aufgezogen worden und hat zum Präsidenten gewählt Herrn Horst Wagner, Bruchmühle, Kreis Niederbarnim, Lindenstr. 32, zum Schatzmeister Herrn Eduard Schütze, Eystrup a./Weser nnd zum Geschäftsführer den Unterzeichneten. Aufnahmegesuche sind unter Beifügung von Rückporto an den Präsidenten, Zahlungen an den Schatzmeister auf dessen Postscheckkonto Hannover 56714, laufende Vereinsangelegenheiten an den Geschäftsführer zu richten. — Aufgenommen ist Mitglied Nr. 67n Frau Martha Schirmer, Beuthen, Oberschl., Solgerstr. 17. A. Krabbe.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig. Die nach dem Vergnügungskalender auf den 13. Dezember festgesetzte Christbescherung findet nicht an diesem Tage, sondern am Sonntag, dem 14. Dezember, nachmittags 4 Uhr im Vereinslokal, „Bauers Brauereirestaurant, Täubchenweg, statt. Gäste durch Einführung herzlich willkommen.

Der Vorstand J. A.: J. Birk, 1. Vorsitzender

Anzeigenteil

Die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 20 G.-Pf. berechnet. Aufnahme erfolgt gegen Voreinsendung des Betrages in Reichsgeld per Brief od. auf unseren Zahlstellen: Postscheckkonto: Magdeburg 3148, Wien 156 687, Bern III 4326, Prag: Creditanstalt d. Deutschen unter Angabe des Zweckes

Käfige u. Gerätschaften

Schlagnetze für Sperlinge, Amseln usw. 2.50 ℳ, für Tauben, Rebhühner usw. 4.50 ℳ. Nachn., bei Voreinsendung des Betrag. franko. [1018] Fangnetzfabrik **K. E. A. Müller, Schlotheim Th. 3**

Futtermittel

Ameiseneier

Prima deutsche . . .	Pfund 8 ℳ
Prima finnische . .	Pfund 6 ℳ
Muska (Zecke) . . .	Pfund 6 ℳ
Weißwurm	Pfund 6 ℳ

ff. Weichfutter Nr.	I	II	III
Pfund ℳ	2	1.40	0.80

ff. gemisch. **Körnerfutter** Pfd. 0.60 ℳ
Getr. Daphnien . . . Liter 2 ℳ
Mehlwürmer, 1/4 Pfund franko 2 ℳ bei Voreinsendung.
Meine Weichfutterspezialitäten sind seit vielen Jahren außerordentlich geschätzt, so daß viele Liebhabervereine des In- u. Auslandes ständige Abnehmer sind.

W. Hiltmann
1019] Zoologische Handlung
Berlin S 14, Dresdener Straße 24.

Mehlwürmer
geg. Einsend. v. 2.— Rentenmark 1/4 Pfd. franko versend. **D. Waschinski & Co.,** Biesenthal I (Mark). [1020

Mehlwürmer Pfd. 6 ℳ, 6 Pfd. 36 ℳ frc. Nachn.
1021] **Jeltner, Breslau,** Weinstr. 12.

Ornis-Haus
Halle-Saale
Gegründet 1912
Spezialität:
Individuelle Weichfresserpflege nach Angaben des Herrn Apotheker Adalbert Jena-Biberach-Riß. (Alleiniges Herstellungsrecht.)
Reform-Normal I, Volierenm.,
Reform-Normal II, f. Rotkehlchen, Schwarzplatten usw.,
Reform-Normal III, f. Nachtigall., Sprosser usw.,
Reform-Normal IV, f. Gelbspött., Goldhähnchen usw.,
Reform-Normal V, f. Schama usw.,
Körnerfutter Ia für jede Vogelart. [1022
Inhaber langjähriger Fachmann, siehe „Ornis-Buch" (90 S.) Mk. 1
Preisliste auf Wunsch!

Bei Anfragen und Bestellungen bitten wir, sich auf die „Gef. Welt" zu berufen

1023] **Mehlwürmer,** reine Ware, gegen Einf. von 1.75 ℳ 1/4 Pfd. franko.
Th. Witte, Niederndodeleben b. Magd.

Vogelfutter [1024
für Kanarien, Waldvögel, Exoten, Papageien, Weichfresser. Anerkannt bewährteste Mischungen auf Grund langjähriger Erfahrung. Liste 13 über Vogelfutter umsonst.
W. Göpel, Leipzig,
Tröndlinring 1. Telephon 14 958.
Bei Anfragen bitte auf die „Gefiederte Welt" Bezug zu nehmen.

Prima echte Harzer
Kanarien-Edelroller
vielseit. Tag- u. Lichtschläger aus meiner bekannten Feinzucht, ℳ 15, Ia Zuchtpärchen ℳ 18. Porto, Verpack. ℳ 4.

Feiner Harzer
Gebirgssommerrübsen,
nußsüße milde sauber gereinigte Kennerware 3,50 M. und Porto.
Rich. Heydenreich,
Bad Suderode 7 B, Harz.
Staatsmedaille, viele gold. Medaillen, seit 1025] vielen Jahren an der Spitze.

Für Vogelschutz.

Handbuch des Vogelschutzes. Von Prof. Dr. C. Hennicke. Mit 9 Doppeltontaf., 1 Karte u. mehr als 200 Textabbild. Geh. 8.— M., geb. 10.— M.

Für Geflügelzüchter.

Der Brutapparat in der Geflügelzucht. Darstellung der Herkunft, Bauart, Nutzanwendung und Herstellung des Brutapparates. Von Max Schwarzlose. Mit 10 Abb. im Text. 1.— M.

Für Sammler.

Der Präparator und Konservator. Eine praktische Anleitung zum Erlernen des Ausstopfens, Konservierens und Skelettierens von Vögeln und Säugetieren. Für Naturfreunde herausgegeben von Rob. Boegler. 4. verb. und erweiterte Auflage. Mit 38 Abbildungen im Text. 2.— M.

Für Hundefreunde.

Gebrauchs- und Luxushunde. Von Emil Ilgner. 2. Auflage mit 87 Abbildungen im Text. Kart. 3.— M.
Der kurzhaarige deutsche Vorstehhund. Von Camillo Morgan. Mit 13 Abb. berühmter kurzhaariger deutscher Vorstehhunde. 2.— M.
Der Dachshund, seine Zucht, Pflege und Erziehung. Von Pelikan v. Plauenwald. 2. völlig neu bearbeitete Auflage von E. v. Otto. Erscheint Mitte 1924.
Der Foxterrier, seine Zucht, Pflege und Erziehung für Jagd und Stube, von Emil Ilgner. M 2.50

Zu beziehen durch:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlg., Magdeburg
Postschließfach 148.

Bestes Universalfutter
eigener Erzeugung für Sprosser u. feinste Sänger mit Insektenschrot, garantiert das Beste. Pfund franko 1.50 ℳ. — Bestellungen auf **Sprosser** schon jetzt erbeten. [1026
Pichler, Wien, Karolinengasse 25.

Gegen Milben
Ia frisches Insektenpulver direkter Import [1027
Spritzdose 50 Pfennig, Pfund 3,50 ℳ.
Milbentinktur, Flasche 1 ℳ.
Drogenhaus Hoffschildt
Breslau I, Ohlauer Straße 23.
Gegr. 1876. A. Z.-Mtgl.

Für Kanarienzüchter!

Soeben erschienen:

Die Farben- und Gestaltskanarien
nebst Beschreibung aller verschied. Kanarienrassen, deren Entstehung, Form- u. Farbenveränderung, Bastardzucht u. Farbenfütterung v. A. Aschenbrenner. Mit vielen stichhaltigen Abb. Kart. 1.75 M.

Der Kanariengesang.
Allgemeinverständliche sowie musikalische und phonetische Darstellung von W. Kluhs. 1.00 M.

Wichtig zur Zucht:

Der Kanarienvogel,
seine Naturgeschichte, Pflege u. Zucht von Dr. Karl Ruß. 14. Auflage. Mit 2 Farbentafeln und zahlreichen Textabbildungen. Bearbeitet von Karl Neunzig. Kart. 2.50 M.

Die Bastardkanarienvogelzucht.
Von Walter Barth. Mit 20 Abbildungen und 1 Tondrucktafel. 1.50 M

Zu beziehen durch:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg.
Postschließfach 148.

Vögel

Waldvögel

aus dem schlesischen Hochgebirge in schönen futterfesten Exemplaren versendet an Händler und Private zu billigsten Tagespreisen. Garant. für lebende Ankunft.

H. Prätzlich,
Waldenburg in Schles.
1028] Telefon 1143.

Hochfeine Harzer Edelroller

mit tiefen hervorrag. Hohlrollen, Hohlschockel, Hohlklingel, Knorre, Gluck und tief. Pfeif., à 15, 20 u. 25 *M*, Weibchen à 3 *M*, versendet gegen Nachm. bei 6 Tagen Probezeit. Garantie für lebende Ankunft. [1029

H. Voigt,
Kanarienzücht.,
Nordhausen am Harz.

Kanarien

hochfeine, tiefe tourenreiche
Harzer Edelroller
flotte Tag- und Lichtsänger.
Hähne Stück 15, 18 und 22 *M*,
Weibchen Stück 3 *M*.
Garani. für gesunde Ankunft, 6 Tage zur Probe, reelle Bedienung.
Vers. Nachn., Porto u. Verpack. 3.50 *M*.

P. Herold, Erfurt,
1030] Schmidtstedter Ufer 24.

Vorsänger und **pa. Zuchtmaterial** rein durchgezücht. Hohl- und Schockel-Stamm, 2 Staatsmedaillen, gebe preiswert ab. Am liebsten selbst kommen. [1031

Paul Holzky, Cöthen IV.

Wunderschön hellroter Arara,
ganz zahm, 300 *M*
Junge sprechend. Graupapageien
von 125 bis 250 *M*
Junge sprechend. Amazonen
von 60 bis 100 *M*
Herrliche Soldatenstare
Paar 50 *M*
Wunderschön. rote Edelpapageien
100 *M*
Wunderschöne
doppelgelbkopf Amazone 150 *M*
Große Gelbhaubenkakadus
Stück 75 *M*
Große Kubafinken Paar 20 *M*
Kleine „ „ 30 *M*
Jap. Möwchen Paar 15 *M*
Graue Reisfinken Paar 6 *M*
Hochrote Tigerfinken 5 *M*,
Paar 20 *M*
Malabafinken, Schmetterlingsfinken, Feuerweber, Atlasfinken
Paar je 7 *M* in Pracht, außer Pracht 4 *M*
Schwarzkopfnonnen Paar 6 *M*
Silberschnabel, Amaranten
Paar 5 *M*
Grüne Wellensittiche Paar 14 *M*
Gelbe „ „ 15 *M*
Safranfinken Paar 12 *M*
Rote Kardinale Stück 35 *M*
Helenafasänchen Paar 10 *M* usw.
Preisliste gegen Rückporto bietet an

Frank's [1032
Zoologische Handlung,
München,
Gabelsberger Straße 9.

Steinsperlinge

Stck. 10 *M*, **Zitronzeisig** Stck. 10 *M* und andere Vögel. Anfr. Marke. [1033

Beck, Tierimport, **Stuttgart.**

Grüne Wellensittiche

größeren Posten, aus Freivoliere und von blutsfremden Eltern pro Stück 7 *M* abzugeben. Porto u. Verpack. Selbstkosten.
1034] **R. Huth, Perleberg.**

Zu verkaufen:

1,0 vielseitige erstklassige Schama, 1,0 Indigo-, 1,0 Papstfink, beide dreiviertel Prachtgefieder, 1,0 Weißscheitel-Pfäffchen, 1 ganz junge große Gelbnacken-Amazone, aalglatt, zahm u. sprechend 90 *M*, ferner „Fremdl. Stubenvögel" in farbenprächtiger Ausgabe 10 *M*. Off. unt. H. B. an d. Exp. d. Ges. Welt. [1035

Tausche

2 jähr. Singdrossel (Wildfang) gegen 2 Stieglitze und 1 Rothänfling. Bitte Versandkäfig einsenden. [1036
P. Leske, Großdubrau b. Bautzen.

Girlitze,

diesjährige Männchen, zu kaufen gesucht. [1041
Bernh. Stössel, Glauchau (Sachs.)
Mauerstr. 18 II.

Gebe folgende gefanglich erprobte Vögel ab: [1042
Sprosser, prima, 60 *M*, Nachtigall, prima, 20 *M*, Sperbergrasmücke, hervorragender Vogel, 15 *M*, Blaukehlchen 10 *M*, Sumpfrohrsänger 12 *M*, Gartenrotschwanz 5 *M*, ganz prima Dawiddrossel mit Wechselschlag, 25 *M*. Tausche gegen Schama, Spottdrossel od. anderen guten Ausländer.
O. Neupert, Breslau X,
Kospothstr. 21.

Verkaufe erprobtes Zuchtpaar
jap. Möwchen f. 15 Mk.
Frau E. Birkner, Crimmitschau,
Annenstr. 38. A. Z.-Mtgl. 60. [1043

Gebe ab auch im Tausch:
Hänfling-Kanarie,
vorzüglicher Sänger, tadellos. **Suche: Gartengrasmücke, Grauedelsäng., Rotkehlchen,** zahm und laut. [1044
Völker, Stettin, Schnellstr. 7.

Molukken-Kakadus

(fingerzahm)

Stück 250 Mark.

Große weiße Gelbhauben Kakadus	Stck.	60 *M*
Kleine weiße Gelbhauben Kakadus	„	60 *M*
Rote Araras	„	200 *M*
Graupapageien	„	120 *M*
Blaustirnamazonen	„	55 *M*
Schwarzohrpapageien	„	60 *M*
Dunkopfpapageien	„	60 *M*
Tarant. Unzertrennliche Zuchtpaare	Paar	40 *M*
Sperlingspapageien	„	18 *M*
Wellensittiche, grün u. gelb	„	15 *M*
Orangehäubte Kardinäle	„	18 *M*
Gilbweber	„	12 *M*
Indigofinken, gut befiedert	„	80 *M*
Kleine Kubafinken	„	35 *M*
Zebrafinken	„	18 *M*
Jap. Möwchen	„	15 *M*
Zebratäubchen	„	10 *M*
Braunstärlinge	„	5 *M*
Rotschnabel Toko	Stck.	75 *M*
Goldstirnblattvögel	„	60 *M*
Dreifarbige Prachtglanzstare	„	40 *M*
Langschwanz Glanzstare	„	30 *M*
Tyran	„	50 *M*
Albino-Drosseln	„	30 *M*
Singdrosseln	„	12 *M*
Schwarzplättchen im Gesang	„	20 *M*
Weiße Kanarien (Nachtigallen-Schläger)	„	100 *M*
Weißblüttge Nachtigallen-Schläger	„	60 *M*
Harzer Roller	„	15 *M*
Nesusaffen	„	60 *M*
Meerkatzen, zahm	„	65 *M*
Weißkopfkapuziner	„	150 *M*
Wollaffen, ganz zahm	„	250 *M*

empfiehlt

Tierhandlung
Max Kleinert
Berlin NO 18, Strausberger Str. 13,
Fernruf Alexander 3313. [1048

Flörike's Vogelbuch mit 50 Farbt. v. Neunzig, 1922, neu! Orglb., nur 10 *M*, **Haacke-Kuhnert,** Tierleben Europas mit 37 Farbt. u. vielen Ill. v. Kuhnert, Orglb., nur 10 *M*, **Vogt-Specht,** Die Säugetiere in Wort u. Bild, illust. von Specht, Orglb., statt 48 *M* nur 20 *M*, **Friedrich,** Geflügelbuch m. 216 farb. Abb., Orglb., nur 8 *M*, verkauft gegen Nachnahme. [1049
E. Drawert, Charlottenburg,
Pestalozzistr. 64.

Wegen Überhäufung mit Bestellungen und Anfragen bitten wir die verehrte Kundschaft etwas Geduld und Nachsicht zu üben. Es werden alle Eingänge baldmöglichst erledigt. [1050
Heidelberger Vogelfutter- und Käfig-Fabrik
A. Böcher & Co,
Heidelberg-Kirchheim.

Kanarien

sehr gute Harzer Edelroller, Tag- und Lichtsänger, Hähne 15, 20 und 22 *M*, Weibchen Stück 3 *M*.
Kaufe 0,1 Pekingente. [1037
Syré, Lehrer, **Viernau** i. Thür.

Gutsprechender Papagei gesucht.

W. Kunze, Annaburg
Bezirk Halle. [1038

Verkaufe oder tausche

1 Paar gr. Wellensittiche, zur Zucht geeignet, gegen gute chin. Nachtigall oder gute Davidzippe. Pr. Sprosser oder pr. Nachtigall g. ev. zu. [1039
Gust. Jacob, Böhlitz-Ehrenberg,
Leipziger Straße 64 p. l.

Fünf la Seidenschwänze

1 Jahr gekäfigt, an Weichfutter fest eingewöhnt, für das Meistgebot zu verkaufen.
Reinholdt, Königsberg i. Pr.,
Insel Venedig 1.
Anfragen nur gegen Rückporto. [1040

Schneeweiße und isabellfarbige Gesangs-Farbenkanarien

empfiehlt **H. Bibrack, Aschersleben** am Harz.
1045]

1a Kanarienhecklweibchen, reingelbe à 4 *M*, gelbgescheckte u. grüngelbe à 3 *M*, 1,1 Stieglitz, zur Bastardz. geeig., 6 *M*, haltb. Prachtfinkenstrohnester, Kugelform, enges Schlupfloch, Dtzd. 5 *M*. [1046
Linda Hirsch, Aubstadt (Unterfrk.)
A. Z.-Mtgl. 233, Ornis 318.

Sofort abzugeben:

8—10 junge Wellensittiche, grün, in tadelloser Verfassung, je 6 *M*, 7 junge Wellensittiche, grün, etwas mangelhaft befiedert, je 5 *M*, 16 Stück zusammen 90 *M*, einschl. Porto (Expreß). Verpackung einsenden. [1047
Dr. Stoltze, Böblingen,
Waldburgstraße 36.

Suche für meinen Bruder,

Bankbeamter, Mitte 20er Jahre, Stellung gleich welcher Art. Er ist erfahren in jeder Art Buchführung und Büroarbeit, zuverlässig, von liebenswürdigem Wesen, großer Tierliebhaber und erfahrener Vogelpfleger. Würde gern in größ. zool. Import- u. Exportgeschäft Stellung nehmen. Gefl. Angebote an Apotheker
F. Pistor, Oberaula, Bez. Cassel

Beschwerden wegen Nichtzustellung der „Gefiederten Welt" sind beim zuständigen Postamt anzubringen.

Wer
in der „Gefiederten Welt" inseriert,
hat Erfolg!

In der Zeit vom
2. Oktober bis 28. Februar
ist der An- und Verkauf wie das Feilbieten von **in Europa einheimischen Vögeln — mit Ausnahme der Meisen, Kleiber, Baumläufer und Spechte** — zulässig, es können daher in dieser Zeit derartige Inserate in der „Gefiederten Welt" zum Abdruck gelangen! Der Insertionspreis für die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum beträgt 0.20 Gm. Aufträge erbeten an
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg
Postschließfach 148

Inserate

für das am 11. Dez. 1924 zur Ausgabe gelangende Heft 43 der Gefiederten Welt erbitten bis 6. Dez. 1924 früh

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Berlin-Hermsdorf; für den Anzeigenteil: Rolf Kretschmann, Magdeburg, Postschließfach 148.
Verlag der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck: August Hopfer, Burg Bz. Magdeb.

Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Jahrg. 53 | Den 11. Dezember 1924 | Heft 43

(Druckort: Burg, Bezirk Magdeburg.)

Webervögel und Widafinken.

Von A. Krabbe.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Ich komme jetzt zu der zweiten Gruppe der Widafinken, die sich im Benehmen gewaltig von der vorbesprochenen unterscheidet. Jene neigen mehr den Prachtfinken zu, nehmen nicht oder nur ausnahmsweise, jedenfalls niemals leidenschaftlich, Mehlwürmer und zeigen keine besonders auffallende Intelligenz. Diese stehen den Feuerwebern nahe, sind nach Mehlwürmern und Weichfutter sehr begierig und stehen geistig auf höherer Stufe, sind größer, einige sogar sehr groß, und eignen sich demzufolge ihres zur Brutzeit gleich den Feuerwebern stürmischen Wesens mehr für größere Räume als für Käfig und Gesellschaftsvoliere. Die größte Art gehört der

O. Gattung Hahnschweifwidafink — Diatropura *Oberh.*

an, von deren zwei Arten der

Hahnschweifwidafink — D. progne *Bodd.*

mit fast jedem südafrikanischen Transport zu uns kommt. Dieser stattliche Vogel, der im Schmuck seiner wallenden Schwanzfedern eine Länge von 500—550 mm erreicht, wovon 300—450 mm auf die Schwanzfedern entfallen, lebt im südöstlichen Kapland bis Transvaal, im Westen in Mossamedes bis Benguella. Das Männchen ist im Hochzeitskleid tiefschwarz; die kleinen Flügeldecken sind scharlachrot, die mittleren gelblichweiß; übrige Flügelfedern schwarz mit blaßbräunlichen Außensäumen; Schwanzfedern schwarz, in gewissem Licht dunkel quergestreift; Augen braun; Schnabel bleifarben; Füße schwarzbraun. Das Weibchen ist hellbraun, oberseits mit mehr oder weniger schwarzen Schaftstrichen; unterseits hell isabellfarben; kleine Deckfedern orangerot gesäumt. Das Männchen ist abgebildet. — Nach Bowker lebt der Vogel auf offenen Grasflächen und baut sein Nest im hohen Grase niedrig über dem Boden. Die Spitzen der Grashalme werden über dem Neste zusammengezogen wie das Gerippe einer Negerhütte. Das Verhältnis der Männchen zu den Weibchen ist wie 1 zu 10 oder 15. Layard berichtet, daß zur Brutzeit, wenn die Männchen ihr volles Prachtkleid und die langen Schwanzfedern bekommen haben, ihr Flug so schwerfällig ist, daß die Kaffernkinder beständig den Vögeln nachlaufen. Diese sind nicht imstande, gegen den Wind zu fliegen, und bei regnerischem Wetter sind sie kaum aus den dichten Büschen herauszutreiben, in die sie sich im Bewußtsein ihrer Hilflosigkeit verkriechen. Die Kaffernkinder stecken Leimruten in den Hirse- und Kornfeldern auf und fangen die Männchen zahlreich, die mit ihren Schwänzen an den Leimruten hängen bleiben.

Ein Liebhaber äußerte sich einst brieflich, daß der Hahnschweifwidafink wohl ein sehr hübscher, aber auch ein langweiliger Vogel sei. Bei Haltung im Käfig, in den ein derartiger Vogel nicht hingehört, mag die Meinung gerechtfertigt sein, für die Haltung in genügend großer Räumlichkeit, in der diese sich naturgemäß benehmen können, trifft eine derartige Beurteilung ganz und gar nicht zu. Ich behaupte im Gegenteil, daß der Hahnschweifwidafink der interessanteste und im Benehmen auffallendste aller vor- und nachstehend behandelten Widafinken ist. Der erste Vogel, den ich im Mai 1923 bei Fockelmann kaufte, war alt, was an Ständern und Krallen deutlich ersichtlich war, und im Prachtgefieder, jedoch, wie üblich nach dem Transport, ohne die langen Schwanzfedern. Der Vogel färbte teilweise aus und im Juli wieder ein. Das Prachtgefieder behielt er den Winter hindurch, so daß ich gezwungen war, die langen Schwanzfedern zu kappen, als sich — anscheinend durch stockende Mauser bedingt — Krämpfe einstellten, die den Vogel vollkommen hilflos machten, auch die langen Zehennägel schnitt ich zurück. Im Frühjahr erholte er sich unerwarteterweise. Allmählich setzte die Mauser ein, die ihn aber nicht von den langen, beim Laufen nachschleppenden Schwungfedern befreite. Im Laufe des Sommers färbte der Vogel wieder ein und hat sogar einen Schweif erhalten, der allerdings die normale Länge nicht erreichte. Trotz alledem glaube ich nicht, daß dieser Vogel den Winter, zumal in kalter, höchstens temperierter Vogelstube überlebt, sondern an stockender Mauser und Körperschwäche eingeht. Daß das Tier überhaupt noch lebt, ist der außerordentlichen Zähigkeit dieser Gattung zu verdanken. Das Gegenteil davon ist ein junges Männchen, das ich im Juni dieses Jahres bei Fockelmann aus lauter verfärbten

herausſuchte. Junge Männchen im grauen Gefieder ſind an dem orangeroten Fleck am Flügelbug, d. h. an den orangeroten kleinen Flügeldecken zu erkennen; auch ſind ſie zumeiſt größer als die Weibchen. Dieſes Männchen war von Anfang an munter und beweglich. Bereits unverfärbt balzte es und führte ſeine ſonderbaren Tänze auf. Am 26. Juli begann die Einfärbung, die am 1. September, alſo nach 36 Tagen, als beendet angeſehen werden konnte. Die ſchwarze Färbung am Bauch iſt von einigen unregelmäßig verteilten grauen Federn unterbrochen, was die Schönheit des Gefieders beeinträchtigt. Die orangeroten kleinen Deckfedern ſind feuerrot eingefärbt. Wie ich eingangs ſchon erwähnte, iſt das Benehmen dieſes Widafinken ſehr intereſſant, und ich ſchildere es kurz zwecks Vergleich anderer Pfleger dieſer Vögel. Es iſt Mittagszeit; der Widafink ruht hoch unter der Decke in einer Birke, deren dünne Zweige für die große Kralle recht ungeeignet erſcheinen; ich trete näher, der Vogel fliegt mit andern dort Ruhenden ab, kehrt aber um, als er den Mehlwurmtopf in meiner Hand ſieht. Ich öffne die Volierentür und werfe eine Handvoll hinein, was ſofort allgemeine Bewegung auslöſt. Mit ungeahnter Schnelligkeit iſt auch der ſchwerfällig erſcheinende Hahnſchweifwida da, ergreift einen Mehlwurm, ſpringt damit zurück, verzehrt ihn und wartet auf weitere. Das nächſte Mal erwiſcht er mehrere. Der Topf geht an ſeinen Platz zurück, der Widafink fliegt in den vom Weſtwind getroffenen Vorbau, um dort den Wetterhahn zu ſpielen, denn des beſchwerenden Schweifes wegen muß er ſtets gegen den Wind ſitzen oder fliegen. Die Sache wird ihm zu ungemütlich und er kommt zurück, fliegt auf einen hervorſtehenden Aſt, breitet die Flügel aus, richtet den Körper ſteil hoch, wobei der Schweif ſenkrecht abwärts gehalten wird, ſträubt die Nackenfedern und ſingt, ſingt, daß ſich der Kehlſack bläht, aber — wir hören trotz der Kraftanſtrengung im Lärm der Vogelſtube nichts, als höchſtens zum Schluß ein leiſes Ziſchen. Der Lockruf dagegen iſt laut und wohlklingend, ungefähr wie tui, tui. In Feuer gekommen, fällt er auf den Boden ein und vollführt hier eigenartige Balzſprünge oder Balzflüge, indem er mit langausholenden Flügelſchlägen, deren drei für die ganze Länge der Voliere reichen, hin- und herfliegt, hierbei den Schweif herunterdrückend und den Hals abwärts gebogen, nun an die Geſtalt des Schleierſchwanzfiſches erinnernd. Werden hierbei noch die Ständer zum Abſtoßen gebraucht, ſo läßt ſich das Flugbild auch mit einem vom Boden abkommenden Storch vergleichen, den Schweif dabei natürlich nicht in Betracht gezogen. Endlich hat er alſo ein verehrungswürdiges Objekt gefunden, die Rotſchulterwitwe oder ſonſt einen ahnungsloſen Vogel, und vor dieſem richtete er ſich hoch, breitet die Flügel aus und tänzelt ziſchend davor auf und ab oder trippelt beim Abfliegen des Verſtändnisloſen auch wohl hinterher, was urkomiſch ausſieht. Bei den Wellenſittichen gerät er an den Unrechten, denn mit ärgerlichem Quarren wird er vertrieben. Seit kurzem jagt er ſpieleriſch, aber mit einer Gewandtheit, die die Berichte der Reiſenden bei ihm nicht vermuten laſſen, den Larvenweber. Nie aber wurde der Vogel bisher andern läſtig oder gar bösartig. Das Anbalzen anderer Vögel geſchieht auch auf der Sitzſtange oder im Gezweig, wobei der Körper hin- und hergewiegt wird. Dieſe intereſſanten Bewegungen kann man zu jeder Tageszeit beobachten. — Beſitzern größerer Volieren ſei der Hahnſchweifwidafink warm empfohlen; das auffallende Federkleid, die ſchlanke Figur mit dem kleinen Kopf, die langen Ständer, das Benehmen, kurz, alles an dem Vogel iſt intereſſant. In Käfigen ſollte man derartige Vögel nicht halten und auch nicht in einer Prachtfinkenvoliere, wegen der durch die Balztänze verurſachten Störung.

(Fortſetzung folgt.)

Liebhabersorgen.

Von J. Birk, Leipzig.

(Nachdruck verboten.)

„Sorgen verſchiebe man auf morgen", wohl dem Sterblichen, der nach dieſem Motto zu leben verſteht, ſeine Tage werden mehr Sonnenſchein als Regen aufweiſen, ſeine Tage fliehen ſchneller, weil ihn nichts bedrückt, was ihn an die Härte des Lebens von Tag zu Tag erinnert. Ob aber das Leben eines Sorgloſen ſo inhaltsreich ſich geſtaltet wie das desjenigen, dem die Pflichten des Alltags, die Schwere des Verantwortungsgefühles ſeines Handelns Sorgen machen, iſt nicht ſchwer zu beantworten. Aufgaben muß uns das Leben ſtellen, die zu erfüllen wir unſer ganzes Wiſſen und Können in die Wagſchale werfen müſſen, der Erfolg gibt uns erſt die Gewißheit, daß wir würdig und befähigt waren, die, und ſei es auch die ſchwerſte Aufgabe des Lebens, zu meiſtern. Wie oft hat man im täglichen Leben die Gelegenheit zu beachten, wie viele Menſchen ſich Dingen mit einer Oberflächlichkeit, einer Gewiſſenloſigkeit und einer Sorgloſigkeit zuwenden, die niemals Freude an der Sache aufkommen laſſen, ſondern von Mißerfolgen begleitet, nachdem die Reize des Neuen verflogen ſind, zu Unluſt, Intereſſenloſigkeit und endlich zur Abwendung von der erſt ſo intereſſant erſcheinenden Sache führen müſſen.

Wie verhält es ſich diesbezüglich bei der Ausübung der Stubenvogelliebhaberei? Haben wir dabei nicht genug Eintagsfliegen, die nach den erſten Mißerfolgen die Flügel hängen laſſen und ſchnellſtens ihrem vermeintlichen Ideal den Rücken zukehren. Ja, täten ſie dies nur alle, die da denken, bei der Stubenvogelliebhaberei handelt es ſich um einen Sport, der nur ausgeübt werden braucht, um in kurzer Zeit als Meiſter auf dieſem Gebiete dazuſtehen, es würde dadurch manchem Vogel das Leben gerettet. Die Begeiſterung für die Stubenvogelhaltung entflammt nur zu leicht, wenn ſich für jemand die Gelegenheit bietet, den Geſangserfolg bei einem wirklich wahren Vogelliebhaber zu hören, dann beginnt der Anfang der Liebhaberei, aber meiſtens von der falſchen Seite, nicht von vorne von Stufe zu Stufe, ſondern von hinten und das Ende iſt ſchon wieder da, ehe überhaupt von einem wirklichen Anfang die Rede ſein konnte. In ſolchen Fällen iſt es für den Laien auf dem Gebiete der Vogelpflege zu verzeihen, wenn er auf den vorher erwähnten Fehler verfällt. Es fehlt ihm eben an der Aufklärung über die Richtlinien,

die er einzuhalten hat, und da gibt es leider noch viele Liebhaber, die zum Beginn einer falschen Liebhaberlaufbahn noch vielfach die Hand bieten, indem sie dem von der Erstlingskrankheit befallenen Inter-

Hahnschweifwidafink
(s. S. 339).

essenten für unsere Liebhaberei nicht nur ohne Rat lassen, sondern auch noch dem unwissenden Neuling die Opfer seiner beginnenden Versuche besorgen. Welcher Liebhaber wäre nicht von dieser Erstlingskrankheit befallen gewesen. Hat er den ersten Vogel im Käfig, geht es ihm nicht schnell genug, soviel wie möglich alles zu besitzen, und es tritt der Fall ein, daß die vorhandenen Kenntnisse kaum für eine Vogelart ausreichen, und trotzdem werden bereits ein halbes oder gar ein ganzes Dutzend Vogelarten gehalten. Zum Aufbau eines solchen Liebhaberkartenhauses, das beim ersten stürmischen Mißerfolg bereits ins Wanken kommt und bei anhaltenden Mißerfolgen kläglich in sich zusammenstürzt, reiche ein wahrer Vogelliebhaber niemals seine Hand, sondern trete als warnender Praktiker auf. Er ist dies dem Ansehen und der Rechtfertigung der Stubenvogelliebhaberei schuldig, ganz abgesehen davon, daß die Liebe zu seinen gefiederten Schützlingen der verlangenden Hand des Unwissenden ein Halt gebieten müsse, denn erst die Kenntnis, dann der Vogel zur Verwertung dieser Kenntnis sei die Losung beim schrittweisen Vorgehen in der Ausübung der Stubenvogelliebhaberei.

Wer als Vogelliebhaber sich diesen richtigen Weg wählt, mit dem wird auch der Erfolg nicht geizen, hingegen die Sorgen werden andere und reichlichere sein als die des mit Unkenntnis arbeitenden „Auchliebhabers", denn letzterer kann sich über diese oder jene Notwendigkeit in der Praxis keine Sorgen machen, weil er sie nicht kennt. Er lernt sie erst kennen, nachdem er so und soviel Lehrgeld und so und soviel Vögel dies mit dem Leben bezahlt haben. Sorgen muß ein wahrer Vogelliebhaber sein eigen nennen, denn wo Rechte, sind auch Pflichten, wo Pflichten, ist auch Verantwortung, und wo Verantwortung, da sind auch Sorgen, um der Verantwortung nach bestem Wissen und Können gerecht zu werden. Liebhaber, hast du denn deine Vögel auch wirklich lieb, wenn du keine Sorgen kennst, und ohne sie auch keine Verantwortung und keine Pflichten, und hast du dieses alles nicht, so hast du auch keine Rechte zur Betätigung auf dem Gebiete der Stubenvogelhaltung und gehörst folglich auch nicht zu den wahren Liebhabern, die mit einem liebevollen Herz und mit Verstand für die Bedürfnisse ihrer Pflegebefohlenen zu sorgen verpflichtet sind.

Die Stubenvogelliebhaberei verursacht dem Liebhaber gar manche Sorgen, und gelingt es ihm, dieselben stets mit der notwendigen Sachkenntnis aus dem Wege zu räumen, so wird die Freude um so größer sein, je schwieriger der Weg zum Ziele war. Wenn wir alle die im Lebenslauf eines Liebhabers zutage tretenden Hindernisse als Sorgen bezeichnen wollen, so wäre die Reihe derselben eine ganz ansehnliche, denn welcher Liebhaber rastet, bevor er das in Erfüllung gehen sieht, was ihm als ein Ideal vorgeschwebt hat.

Der eine Liebhaber besitzt nicht die nötige Menge Käfige, der andere nicht genügend Vögel für die leeren Käfige, ein anderer wird sich über einen passenden Platz im Zimmer nicht einig, ein weiterer

kann Vögel und Käfige wohl beschaffen, aber es ist kein leerer Platz mehr da wegen bereits vorhandener Überfüllung der Wände mit besetzten Käfigen. Des weiteren gibt es sehr viele Liebhaber, bei denen vorstehend aufgeführte Mißhelligkeiten nicht vorhanden sind, wohl aber durch Futtersorgen in der vollkommenen Entfaltung ihrer Liebhaberei beeinträchtigt werden. Wenn ich alle die vielen Zuschriften aus Liebhaberkreisen an mich als Maßstab für die Sorgen der betreffenden Liebhaber anlegen will, so ist es in erster Linie die Beschaffung von einwandfreien Sängern, in zweiter Linie die von ebensolchem Futter und erst in dritter Linie das Bedürfnis nach praktischen Käfigen, sowie nach rationellen Futtermethoden, was dem Liebhaber sorgenvolle Stunden bereitet. Wenn man eine unserer Fachzeitschriften in die Hand nimmt und nach den darin enthaltenen Angeboten von Vögeln urteilen würde, so könnte man nicht von Sorgen in dieser Hinsicht reden, aber leider sind die Tatsachen auf dem Vogelmarkt doch etwas anders, denn die Nachfrage nach gesanglich guten Vögeln überwiegt gewaltig das diesbezügliche Angebot. Leider ist auch heute noch die verwerfliche Methode im Vogelhandel, daß in den Fachzeitschriften Angebote von Vögeln gemacht werden, die entweder überhaupt nicht lieferbar oder zur Zeit des Angebotes noch nicht in den Händen des Inserenten sind. Hat ein Händler oder Liebhaber ein Inserat erlassen, hinter dem auch eine Lieferungsmöglichkeit sowie auch eine reelle Bedienung steht, so kann damit nur ein geringer Prozentsatz der Bewerber befriedigt werden. Die übrigen erhalten zum so und sovielten Male immer wieder Absagen, und ist es gar ein Verkäufer von der Sorte, deren es leider noch welche gibt, die es nicht einmal für ihre selbstverständliche Pflicht halten, das beigelegte Rückporto zur Benachrichtigung des Bestellers zu verwenden, sondern dieses auch noch unrechtmäßigerweise zurückbehalten, so weis der kauflustige Liebhaber wirklich nicht, ob er verraten oder betrogen ist. Nach den mir bekannt gewordenen Fällen ist es sogar noch sehr häufig, daß Händler und Liebhaber trotz beigelegtem Rückportos nichts über ihr gemachtes Angebot, sondern überhaupt nichts mehr von sich hören lassen. Diese recht üble Unsitte muß endgültig ausgerottet werden, soll das Vertrauen zwischen Verkäufer und Käufer in Zukunft nicht noch mehr schwinden. Zur Ehre des Standes unserer berufsmäßigen und organisierten Vogelhändler muß auch gesagt werden, daß wir zum Glück auch noch sehr viele reelle Firmen haben, die den Wünschen der Liebhaber aufs äußerste entgegenzukommen suchen und sich durch ihr reelles Geschäftsgebaren auch einen Kundenkreis zu sichern wissen. Vielfach hat man diese Händler mit einem verwerflichen Geschäftsgebaren in den Kreisen der sogenannten wilden Händler, die gleichzeitig meistens auch Fänger sind, zu suchen. Leider sind die Vogelliebhaber meist machtlos gegen derartige Betrüger, die durch ihre auf Übervorteilung eingestellte Praxis die Gesamtheit der Vogelhändler in Mißkredit bringen, denn es lohnt nicht wegen der meistens geringen Beträge ein an Kosten reiches, langwieriges Gerichtsverfahren einzuleiten. Dieses wissen die zu derartigen betrügerischen Geschäften veranlagten Verkäufer nur zu genau und versuchen es immer und immer wieder, und finden auch ihre Opfer immer und immer wieder. Jedem kauf- oder tauschlustigen Liebhaber ist nur zu raten, bei Anbahnung von Geschäftsbeziehungen sehr vorsichtig und zurückhaltend zu sein, niemals, und sei das Angebot noch so verlockend, lasse er sich zur Vorhereinsendung des Geldes verleiten, wenn ihm der inserierende Verkäufer nicht als reell bekannt ist, oder es sich nicht um eine eingeführte, als reell bereits bekannte Firma handelt. Wieviel Sorgen, Zeit und Geld würden sich viele Liebhaber ersparen, wenn sie nicht so sorglos wären beim Kauf von Vögeln. Denn wenn ein Kauf Vertrauenssache ist, so ist es der Vogelkauf oder -tausch. Wieviel solche unter der Flagge des Liebhabers segelnde Vogelverkäufer gibt es, die es mit der Ehrlichkeit nicht genau nehmen. Darüber können die Vogelliebhaber ein Liedchen singen. Wiederum gibt es aber Liebhaber, die, falls die Bestellung nicht in allen Teilen ihren hochgestellten Wünschen entspricht, gleich über Betrug, Unreellität usw. zetern, und geht man der Sache dann auf den Grund, so sind es vielfach nur Dinge, an denen der Verkäufer unschuldig ist, speziell was die Güte des Gesanges anbetrifft.

(Fortsetzung folgt.)

Vogelschau der Vereinigung der Vogelliebhaber, Landesverband Preußen.

Von K. Neunzig.

(Nachdruck verboten.)

Zweierlei hätte ich, um Unerfreuliches vorwegzunehmen, auf der Vogelschau des Landesverbandes Preußen gern vermißt. Einmal die scheußlichen gleißenden und blinkenden, aus Messing und Nickel hergestellten Käfige der verschiedensten Formen mit geschliffenen, bemalten, glitzernden und farbigen Scheiben und allerlei z. T. recht geschmacklosen Verzierungen und Schnörkeln. Sie wirken wie eine Spekulation auf die Unerfahrenheit und Unkenntnis etwaiger Käufer.

Kein Vogelhändler setzt seine Vögel in derartige Scheußlichkeiten. Er weiß genau, daß der Vogel die Zierde des Käfigs ist, daß der Käfig für den Vogel da ist und nicht umgekehrt. Da er das weis, sollte er derartige Käfige auch nicht feilhalten, weil — wie gewöhnlich zur Entschuldigung gesagt wird — „sie verlangt werden". Er sollte solch unsinnigem Verlangen seine Erfahrung, sein Wissen und seine Tierfreundlichkeit entgegensetzen und den, der derartige Käfige zu kaufen beabsichtigt, eines Besseren belehren.

In solchen Fällen muß auch beim Vogelhändler der Kaufmann zurücktreten und, er darf nur seinen Liebhaberverstand und sein Liebhaberherz sprechen lassen. Hier gilt es für ihn ein Stück Erziehungsarbeit zu leisten.

Das Zweite, was ich gern vermißt hätte, waren schlecht befiederte oder gar schwanzlose Vögel in den Käfigen der Liebhaber. Es mag unangenehm sein, aus einer vollständigen Reihe von Grasmücken oder Rohrsängern, die man gern zur Schau stellen wollte, ein und das andere Stück herauszunehmen und zu

Hause zu lassen, weil es schlecht befiedert ist. Aber trotzdem müssen Vögel, welche sich nicht in dem Zustand befinden, der für eine Ausstellung nötig ist, dieser fernbleiben. Dem Vogelpfleger sind sie kein erfreulicher Anblick, beim unkundigen Beschauer können sie falsche Vorstellungen vom Äußern der Vögel erwecken, und den Gegnern unserer Liebhaberei liefern sie Material zu ihrer Bekämpfung.

Die Aufnahmekommission der Ausstellung muß derartig mangelhaft befiederte Vögel unerbittlich zurückweisen. Das liegt im Interesse der Sache.

Für die Ausstellung stand ein großer, schöner, hell erleuchteter Saal zur Verfügung. Die ungemein zahlreichen Ausstellungsobjekte waren übersichtlich und geschmackvoll aufgestellt. Die langjährige und oft erprobte Erfahrung des Ausstellungsleiters, des Herrn Gottschlag, hat sich wiederum bewährt und selbst schwierige Situationen, die bei derartigen Veranstaltungen nicht ausbleiben, meisterte Herr Gottschlag mit Ruhe und Umsicht in den ihm eigenen zuvorkommenden und liebenswürdigen Formen.

Gut in die Wege geleitet war auch die Propaganda für die Ausstellung. Man hatte von der sehr kostspieligen, früher üblichen Art der Benutzung der Anschlagsäulen ganz abgesehen, dafür aber die Tageszeitungen in Anspruch genommen, die dann auch, z. T. in recht umfangreichen Besprechungen, die Aufmerksamkeit ihrer Leser auf die Ausstellung lenkten und zu ihrem Besuch anregten. Der Besuch der Ausstellung war ein recht guter, und besonders am letzten Tage, dem Totensonntag, so stark, daß die Einlaß Begehrenden in langer Reihe anstanden, fast so, wie dereinst in den Zeiten der Not vor den Läden der Lebensmittelverkäufer.

Molukkenkakadu.

Die Zahl der ausstellenden Liebhaber war nicht groß. Unter ihnen wurde die etwa 50 Vögel umfassende Zusammenstellung des Herrn Max Dähnick, Aegintha-Berlin, mit Ausnahme einer Schamadrossel, sämtliche heimische Vögel, mit dem 1. Preis ausgezeichnet. In einem großen Flugkäfig befanden sich etwa 17 heimische Körnerfresser in 11 Arten, darunter auch ein Berghänfling (s. Abb. S. 344). Sehr hübsch und ansprechend ausgestattet war ein mit Kleibern bevölkerter Käfig und einige Käfige mit Goldhähnchen, Zaunkönigen und Baumläufern. Von anderen Insektenfressern sind zu nennen Sprosser, Nachtigall, Blaukehlchen, 5 Arten Grasmücken, ein schönes Männchen Zwergfliegenschnäpper, Trauerfliegenschnäpper und unter den Lerchen eine Alpenlerche.

Die in etwa 12 Käfigen untergebrachten Weichfresser und einige einen Flugkäfig belebenden Finkenvögel des Heren Paul Böhme, „Vereinigung der Liebhaber einheimischer Vögel zu Berlin", trugen den 2. Preis davon. Die Sammlung enthielt unter anderen Sprosser, Nachtigall, Blaukehlchen und Gartensänger. Sehr hübsch ausgestattet waren die Gesellschaftskäfige des Herrn Karl Weiher, Berlin. Sie wurden mit dem 3. Preis bedacht. Der eine war von Meisen, ein zweiter von Goldhähnchen und Zaunkönig bevölkert. Besonders hervorzuheben war der dritte für Blaukehlchen möglichst naturgemäß eingerichtete Käfig. Der natürliche Bodenbelag mit einer flachen Wasserpfütze schien den Blaukehlchen sehr zu behagen, nicht minder das Rohrhalmdickicht an der Schmalseite des geräumigen Käfigs. Der 4. Preis war Herrn R. Kirchner, Berlin-Steglitz, zugesprochen für eine hübsche Kollektion Kanarienbastarde. Es waren solche von Stieglitz, Grünling und Leinzeisig ausgestellt, daneben Sprosser, Zaunkönig und einige Grasmücken. Ein Sprosser × Nachtigall schien ein Sprosser zu sein, bei welchem die Muschelzeichnung nur wenig ausgedehnt war. Daß derartige Mischlinge vorkommen können, ist nicht von der Hand zu weisen. Vermutlich ist der Vogel ein „Zweischaller". Einige Grasmücken des Herrn Peter, Berlin, wurden des 5. Preises für würdig befunden. Unter den von Vogelliebhabern ausgestellten Vögeln sind noch hervorzuheben ein sehr schöner, schlanker Bluthänfling des Herrn Krüger, Berlin, ein Grauammer des Herrn Merz, die in schönen, geräumigen Käfigen untergebrachten Prachtfinken, Kubafinken und Soldatenstare des Herrn Nyuke, der auch einen schönen Molukkenkakadu (s. Abb. S. 343) und eine Schamadrossel zur Schau stellte, und die Vögel des Nadlermeisters Paul Schindler. Unter diesen erregten die besondere Aufmerksamkeit der Besucher zwei Zeisige und ein Stieglitz, von denen jeder in einem hübsch und sauber lackierten weißen Käfig untergebracht war. Man hatte unter Benutzung des diesen Vögeln eigenen Spieltriebes sie so abgerichtet, daß sie das auf einer schrägen Fläche auf Rädern laufende Futternäpfchen vermittels eines Fadens zum Fressen heranzogen. In ähnlicher Weise zogen sie ein mit Wasser gefülltes Eimerchen durch eine Öffnung im Käfigboden herauf, um zu trinken.

Das Hauptgewicht der Veranstaltung lag auch diesmal in der Ausstellung der Händler, wie das ja auch bei den großen Ausstellungen der Vorkriegszeit der Fall war. Allerdings hat sich auch darin vieles geändert. Unerreicht war damals das, was Christiane Hagenbeck zur Schau stellte und andere Großfirmen des Vogelhandels. Ohne diese war das Zustandekommen einer großen Ausstellung in Berlin fast unmöglich. Jetzt sehen wir eine ganze Reihe Berliner Vogelhändler auf der Ausstellung, die, was ausländische Vögel anbelangt, über außerordentlich reiche Bestände auch an selteneren Vögeln verfügen, ich nenne nur die Firmen Kleinert, Lenger und Tzornack.

Und was die Unterbringung, die Käfige der Vögel, in denen sie ausgestellt sind, anbetrifft, so muß ohne Einschränkung anerkannt werden, daß sie mustergültig ist. Man sieht, daß die Händler aus den Kreisen der Vogelliebhaber hervorgegangen sind und Vogelliebhaber geblieben sind. In allen meist in lichten Farben gehaltenen Käfigen herrscht größte Sauberkeit, und die Insassen der Käfige sind ohne Tadel. Das über die drei genannten Gesagte, welche hauptsächlich fremdländische Vögel zur Schau stellten, Tzornack brachte allerdings auch eine schöne Sammlung heimischer Vögel, gilt in demselben Grade von den Ausstellern aus dem Kreise der Vogelhändler, welche sich hauptsächlich mit heimischen Vögeln befassen, wie Arold, Behnke, Nowotey, Leonhard Schmidt, Schönbube, Sterling, Taft und Wenig. Zweifellos stellt gerade die Eingewöhnung, Haltung und Pflege der

Berghänfling.

heimischen Weichfresser, die auf der Ausstellung der Händler in großer Zahl vorhanden waren, große Anforderungen an das Verständnis und die Tüchtigkeit des Pflegers. Und gerade nach dieser Richtung verdient dieser Teil der Ausstellung der Berliner Vogelhändler höchstes Lob und uneingeschränkte Anerkennung.

(Fortsetzung folgt.)

Die Nachtigall.

Von Robert Thiele.

(Nachdruck verboten.)

Der Mai war gekommen, die jungen Blattknospen sproßten im saftigsten jungen Grün. Der Frühling war da. Alt und jung erfreuten sich dieser herrlichsten Jahreszeit. Die Nachtigall sang.

Im silbernen Mondlicht gleitet ruhig ohne Wellenschlag die Saale dahin. Man hört das Brausen des Wassers am Saalewehr bei Kösen, das sich gar ungebärdig im Strudel kräuselt und aufbäumt. Dahinter auf steilem Fels die Ruinen der Rudelsburg, ein im fahlen Mondlicht bezauberndes Bild. Süßer Fliederduft durchströmt die laue Abendluft und im Gebüsch fliegen Glühwürmchen.

Vom Ufer herüber klingen alte Volkslieder, welche die Schönheit der Saale besingen, an meinen einsamen Platz, an dem ich all der Eindrücke voll mich in Betrachtungen niedergelassen habe. Da klingt an mein Ohr ein himmlisches Jauchzen, dann wehmütiges Klagen und Schluchzen. Die Nachtigall singt! Sie ist aus der Ferne zurückgekehrt in die traute Heimat.

Hier verlebte ich meine Jugend, hier wurde ich schon im jugendlichen Alter unter Leitung meines Vaters Vogelliebhaber und -beobachter. Wenn ich an den langen Winterabenden meinem Vater aus ornithologischen Schriften vorlas, erklang aus den Käfigen an der Wand das abwechslungsvolle Lied des Steinrötels, die Blaudrossel ließ sich hören und Nachtigall, Rotkehlchen und Mönchgrasmücke sangen ihre Lieder. Im Sommer aber ging es hinaus zu den Rohrsängern an der Saale, zu den rotrückigen Würgern und zu dem Dorado der Nachtigallen im Dechantsgrund und Bürgergarten bei dem nachtigallenreichen Naumburg, meiner Heimatstadt.

Den gleichen Reichtum an Nachtigallen wies das Saaletal auf bis Kösen und Jena. Heute mag's anders dort aussehen. Vielleicht berichtet ein Leser der „Ges. Welt" einmal darüber, ob der Nachtigallenbestand jener Gegenden noch immer ein reicher ist.

Hier oben in Norddeutschland im weiten Mündungsgebiet der Elbe entbehren wir den Gesang unserer Nachtigall keineswegs, und er erklingt an den Ufern des gewaltigen Stromes nicht minder reizvoll. Wenn in einer Maiennacht auf dem weiten Flußbett unzählige Lichter der vorbeifahrenden Schiffe und Boote tanzen und rote und grüne Signallichter und die laut und gewaltig tönenden Signale eines vorüberfahrenden Ozeandampfers verklungen sind, dann setzt plötzlich das Lied der Nachtigall ein, bald jauchzend, bald klagend, unbekümmert um den Verkehr

auf den weiten Wasserflächen und an den Ufern. Sie hat sich längst an dies alles gewöhnt und läßt sich in ihrem Gesangsvortrag durch nichts stören.

Hier in Hamburgs weiter Umgebung gibt's hervorragende Sänger unter den Nachtigallen, aber auch Stümper, die es anderswo auch gibt. Ich will hier eines ganz hervorragenden Sängers Erwähnung tun, das Ziel und die Sehnsucht so manches Hamburger Liebhabers. Aber alles war vergeblich. Sie ist ein gewitzigter Bursche und geht nicht auf den Leim oder in die Falle. Mag sie glücklich ins Winterquartier gelangt sein und uns im nächsten Frühjahr wieder durch ihr herrliches Lied erfreuen.

Es gibt wohl keinen Vogel, der so leicht zu fangen ist wie die Nachtigall. Ihre Neugierde wird ihr zum Verhängnis. Sie kann kaum die Zeit erwarten, um zu sehen, was mit dem am Erdboden befestigten, mit einem Mehlwurm geköderten Bügelschlagnetz eigentlich los ist. Sie beobachtet ganz genau, wie es aufgestellt wird. Ihre Neugierde bezahlt sie meist mit dem Verlust der Freiheit.

Ich kann es nicht billigen, wenn derartige Vögel aus Gärten oder Anlagen fortgefangen werden, besonders in Gegenden, wo sie schon nicht mehr zu den alltäglichen Erscheinungen gehören. Laßt sie in Ruhe, damit sie auch weiterhin Ohr und Herz jener Menschen ergötzen, die ihrem Liede so gerne lauschen. Es sind nicht allzuviele. Denn in der Schule lernen die Kinder gar wenig von den Vögeln, und wie viele Menschen gibt es überhaupt, welche die Nachtigall und ihr Lied kennen? Ist mir's doch vorgekommen, daß ein Herr in Blankenese, als in einem Garten eine Nachtigall schlug, die Umstehenden auf den schönen „Drosselgesang" aufmerksam machte und meiner Bemerkung, daß es keine Drossel sei, sondern eine Nachtigall, nicht recht Glauben schenken wollte.

In Hamburgs und Altonas Umgebung, in den Parks und gärtnerischen Anlagen ist die Nachtigall schon recht selten geworden. Aber in den die Marschen Holsteins begrenzenden Knicks findet man sie noch häufig. Die Knicks sagen ihr gut zu, und ich habe in einem Knick zuweilen drei Nachtigallen gefunden. Leider werden auch die Knicks stark abgeholzt und damit wird auch der Nachtigallenbestand der Knicks stark vermindert. Damit uns dieser herrliche Sänger erhalten bleibt, sollte man ihre Nistplätze vor allen Dingen schonen und für neue Nistplätze sorgen.

Wer eine Nachtigall im Frühjahr eingewöhnen will, bringe sie in einen verhüllten Käfig und entferne die Hülle erst, wenn die Gesangszeit beendet ist. Man gewöhnt sie mit Mehlwürmern ein und dann an frische Ameisenpuppen, die man mit zerschnittenen, vorher getöteten Mehlwürmern vermengt. Nach Annahme dieses Futters geht man allmählich zu einer ausschließlichen Fütterung mit frischen Ameisenpuppen über. Gewöhnlich singt sie spätestens am 5. oder 6. Tag der Käfigung. Vielfach wird über Fußkrankheiten der Nachtigall geklagt. Größte Sauberkeit des Käfigs und geeignete Sitzstangen werden dieses Leiden verhüten. Ich bediene mich der mit weichem Stoff umnähten Sitzstangen und habe bei meinen Nachtigallen über Fußkrankheiten nicht zu klagen.

Weißhaubenkakadu.

Farbenwellensittichzucht, eine Fußringfrage.

Von Rich. Schwarzkopf, Ingelfingen, Wttbg. A. Z. 216.

(Nachdruck verboten.)

Die folgenden Ausführungen sollen eine Bitte an alle einschlägigen Liebhaber, Praktiker und Wissenschaftler sein, ihre Meinung und Erfahrung in der „Ges. Welt" kundzutun zu Nutz und Frommen aller Beteiligten.

Sollen wir in der Farbenzucht von Wellensittichen nicht ganz auf den Zufall angewiesen sein und sollen nicht mit aller Wahrscheinlichkeit etwaige Zufallsprodukte doch für die Weiterzucht verloren sein, so muß diese Zucht mit einer größeren Anzahl Tiere versucht werden, deren Verwandtschaftsverhältnis und Blutstrom genau bekannt sind, so daß auftretende selbst kleine Farbveränderungen durch entsprechende Zuführung geeignet erachteten Blutstromes unterstützt werden können. Hierzu ist nun die dauernde einwandfreie Kennzeichnung des Nachwuchses unbedingt nötig, wie natürlich auch die Führung genauen Abstammungsnachweises. Für diese kleinen Vögel wie die in Frage stehenden Wellensittiche ist mir eine andere dauernde Kennzeichnung nicht bekannt, als diejenige mit Fußringen. Zelluloidspiralringe konnte ich meinen Sittichen, selbst unter Nichtachten von Blut, nicht beibringen, außerdem können darauf Zahlen, die für größere Zucht unentbehrlich sind, nicht angebracht werden. Geschlossene Fußringe, wie sie in der Hühnerzucht verwendet und die in einem bestimmten Jugendalter überzogen werden, konnte ich selbst noch mit Flaum bedeckten Nestjungen nicht anbringen, da der Zehenwurzelballen dieser Jungen schon dicker ist, als der Fußknochen der erwachsenen Wellensittiche. — Bleibt der Rossittener Fußring. — Es besteht keine Schwierigkeit, diesen

mit Zahlen versehen, 5 mm breit und 2,5 mm weit eine Woche vor Verlassen der Nisthöhle anzulegen. Aber oh weh! Selbst diese Jungen, von Alten gar nicht zu reden, können diesen weichen Aluminiumring mit ihren starken Schnäbeln spielend so zusammendrücken, daß Fußverletzungen und infolgedessen Verluste unausbleiblich sind. Und Verluste aus solcher Ursache sind dem Züchter bei solch hochgeschätztem Zuchtmaterial unerträglich. Wer weiß Rat? Weiß ihn niemand, so müssen wir ja den rosafarbenen Wellensittich den Franzosen oder dem Zufall überlassen!

Die obigen Ausführungen des Herrn Schwarzkopf, Ingelfingen, sind von großem Interesse und werden sicherlich einen Meinungsaustausch anregen. Daß bei Farbenzucht eine sorgfältige und damit zwangsläufige Zuchtwahl stattfinden muß, liegt klar auf der Hand. Brennend ist hier die Frage der Beringung, die auch ich bisher nicht lösen konnte.

Bei mir handelt es sich speziell um Unzertrennliche, in diesem Falle Rußköpfchen. Wer kann praktische Ringe empfehlen? Im Interesse der Sache dürfte es durchaus angebracht sein, zum Allgemeinnutzen die volle Adresse eines Lieferanten wirklich praktischer Ringe an dieser Stelle anzugeben. Geschlossene Aluminiumringe von 4 mm Durchmesser und entsprechender Stärke schnitt ich auf und bog sie mittes einer extra dazu gefertigten Zange um den Fuß mit dem Erfolg, daß bis zum andern Morgen der eine Vogel den Ring nach Öffnung abgestreift, der andere um den Fuß zusammengedruckt hatte, so daß es nur unter größter Gefahr möglich war, denselben zu entfernen. Kleinere Ringe wurden glatt auseinander gebogen und so entfernt. Ringe mit Verschluß können die Eier im Nest beschädigen; geschlossene Spiralen aus Zelluloid können beim Aufdrehen Quetschungen hervorrufen. Nestberingung kommt bei dieser Gattung nicht in Frage. Ein immerhin brauchbarer Notbehelf — aber auch nur solcher — ist die Methode des Herrn Muller, Küllstedt, der Drahtkrampen um den Fuß zusammenbiegt, die vorher mit eingeritzten Zeichen versehen sind. A. Krabbe.

Sprechsaal.

(Steht den Abonnenten kostenlos zur Verfügung.)

Frage 16: „Gibt es in Elberfeld einen Vogelliebhaberverein", evtl. wo tagt er? K. Murrberger.

Von einem Leser der „Gef. Welt" geht mir folgendes Schreiben zu: „Im Redaktionsbriefkasten der Nr. 39 teilen Sie einem Fräulein F. S. mit, daß es für die Geschlechter der Spitzschwanzamadinen keine Unterscheidungsmerkmale gibt. Es trifft dies aber nicht zu. Ich bin heute glücklicher Besitzer eines Zuchtpaares sowie 3 acht Wochen alter Jungen. Ich kann die Geschlechter sehr gut unterscheiden: der Kehlfleck des Männchens ist merklich größer als beim Weibchen, namentlich viel breiter! Auch die Jungen können wir schon heute hieran unterscheiden. Teilen Sie es bitte der Anfragerin der Ordnung halber mit." Die Fragestellerin wird sicherlich das Vorstehende lesen. Sie wird aber auch die von mir erteilte Auskunft im Redaktionsbriefkasten des Heftes 39 gelesen und erfahren haben, daß ich von „sicheren", d. h. in jedem Fall zutreffenden Unterscheidungsmerkmalen der Geschlechter dieser Art spreche und daß ich auch neben anderen zuweilen zutreffenden Kennzeichen des Weibchens die geringere Ausdehnung des schwarzen Kehlfleckes bei diesem als ein Kennzeichen des Weibchens angegeben habe. Die Tatsache war mir, wie auch der Einsender obigen Schreibens ersehen konnte, wohlbekannt. Ich weiß auch, daß die Vogelhändler bei dem Kauf eines Paares einen Vogel mit recht großem schwarzem Kehlfleck und einen mit möglichst kleinem herausgreifen. In vielen Fällen treffen sie damit das Richtige. Aber in recht zahlreichen Fällen ist das nicht der Fall und der Käufer ist im Besitz von zwei Vögeln des gleichen Geschlechtes. Die Ausdehnung des schwarzen Kehlfleckes ist deshalb kein „sicheres" Kennzeichen des Geschlechtes. Die Schwierigkeit, die Geschlechter dieser Art zu erkennen, erwähnen auch in früheren Zuchtberichten die bekannten Herren Dr. Leweck, Apotheker Nagel und Leutnant Hauth. Letzterer sagt in „Ges. Welt" 1899 S. 290, daß er die 4 erworbenen Spitzschwanzamandinen vorläufig beisammen ließ, um desto sicherer die richtigen Paare herauszufinden, weil . . . bis auf das Singen der Männchen kein äußeres Merkmal sie zuverlässlich unterscheidet." Neunzig.

An die Leser!

Celler Entenfang betr. Wer unter den Lesern ist in der Lage, in dieser Zeitschrift Literatur aus älterer und neuerer Zeit über den Celler Entenfang anzugeben? Ist er heute noch wie früher im vollen Betriebe, welche Ergebnisse mag er liefern, auf welchen Privilegien beruht gegebenenfalls der Betrieb? Die Beantwortung dieser und ähnlicher Fragen ist erwünscht. Besten Dank im voraus!
Quantz, Göttingen.

Vom Vogelmarkt.

Von seltener auf den Vogelmarkt kommenden Vögeln werden angeboten:

Beck, Tierimport, Stuttgart: Zitronenzeisig.

Frank's Zoologische Handlung, München, Gabelsberger Str. 9: Hellroter Arara, Soldatenstare, rote Edelpapageien, Doppelgelbkopfamazone, große Gelbhaubenkakadus, große Kubafinken, kleine Kubafinken, Tigerfinken, Malabarfinken, Safranfinken, rote Kardinäle, Helenafasänchen.

B. H. an die Exp. der „Ges. Welt": Indigo-, 1,0 Papstfink, 1,0 Weißscheitelpfäffchen.

Max Kleinert, Berlin NO, Stargarderstr. 13: Molukkenkakadus, Gelbhaubenkakadus, rote Araras, Schwarzohrpapageien, Dunenkopfpapageien, taraut. Unzertrennliche, Gilbweber, Indigofinken, kleine Kubafinken, Zebratäubchen, Brannstärlinge, Rotschnabeltoko, Goldstirnblattvögel, dreifarb. Prachtglanzstare, Langschwanzglanzstare, Tyran, Albinodrosseln, weiße Kanarien.

Reinholdt, Königsberg i. Pr., Insel Venedig 1: Seidenschwänze.



Herrn G., Lommatzsch. Das Universalfutter, von dem eine Probe eingesandt wurde, ist völlig wertlos. Es enthielt einen Teil undefinierbare Bestandteile, anscheinend feingemahlenes Gebäck, Fleischmehl oder dergleichen, sodann wenig Weißwurm und viel Ameisenpuppen, die aber mit geringen Ausnahmen „blau" und damit für die Ernährung insektenfressender Vögel ganz wertlos sind. Es ist bedauerlich, daß eine Firma, welche derartige Futtermittel verkauft, diese in der Ges. Welt anpreist, aber es ist unmöglich, alles was im Anzeigenteil angeboten wird, vor der Veröffentlichung der Anzeige zu prüfen.

Herrn St., Glogau. Ist brieflich Bescheid zugegangen.

Herrn F. W., Dresden. Der Pitpit ist entweder ein junger Vogel oder ein Weibchen. Pitpit legen kein besonderes Herbstkleid an wie die Cyanerpes-Arten. Sie mausern nur einmal im Jahr.

Herrn A. A., Hamburg I; Herrn A. A, Stockholm: Herrn K. H., Erfurt: Beiträge dankend erhalten.

Herrn F. R., Hörde. Besten Dank für die Mitteilung.

(Fortsetzung auf der 2. Umschlagseite).

Jahrgang 53 — 11. Dezember 1924 — Heft 43

DIE GEFIEDERTE WELT.

ZEITSCHRIFT FÜR VOGELLIEBHABER

Begründet von Dr. Karl Ruß

Herausgegeben von Karl Neunzig in Berlin-Hermsdorf

Inhalt:

Webervögel und Widafinken. Von A. Krabbe. (Fortsetzung.)

Liebhabersorgen. Von J. Birk, Leipzig.

Vogelschau der Vereinigung der Vogelliebhaber, Landesverband Preußen. Von K. Neunzig.

Die Nachtigall. Von Robert Thiele.

Farbenwellensittichzucht, eine Fußringfrage. Von Richard Schwarzkopf, Ingelfingen, Württemberg. A. Z. 216.

Sprechsaal - Vom Vogelmarkt - Bevorstehende Vogelschauen - Aus den Verbänden - Aus den Vereinen.

Abonnement monatlich (4 Nummern) 1.50 Gm. — Einzelpreis des Heftes 50 Gpf.
vermittelt das nächste Postamt bzw. der zuständige Briefbote. / Postversand ab Burg Bez. Magdeburg.

reutz'sche Verlagsbuchhandlung / Magdeburg / Postschließfach 148

Bevorstehende Vogelschauen.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei zu Hamburg, Raboisen 56.

Obiger Verein veranstaltet am 14. und 15. Dezember zusammen mit dem Verband der Kanarienzüchter-Vereine Groß-Hamburg in Bans Gesellschaftshaus, Besenbinderhof 10, eine Vogelschau und ladet hierzu herzlichst sämtliche Liebhaber und Naturfreunde ein.

Verein für Vogelschutz und -pflege zu Dresden. Gegr. 1906. (Vormals Vereinigung der Vogelliebhaber zu Dresden.) Vom 20.—22. Dezember d. J. veranstaltet genannter Verein in dem Saale des „Italienischen Dörfchens", Dresden, Schloßplatz, die zweite Vogelschau. Dieselbe wird das Gebotene der ersten in den „Annensälen" 1923, welche dem Verein, vor allem in finanzieller Hinsicht, guten Erfolg brachte, um vieles übersteigen. Alle Vogelliebhaber sind herzlich willkommen. J. A.: Bernhard Kühn, Vors.

Aus den Verbänden.

Verband deutscher Farben-, Gestalt-, Bastardkanarien- und Exotenzüchter und des Bayerischen Vogelliebhabervereins (e. V.) Sitz München, Ortsgruppe Augsburg. Jeden Samstag gemütliche Zusammenkunft beim Vogelwirt Joseph Leininger, Gasthof, Frohnhof—Peutingerstr. Jeden 1. Samstag im Monat Monatsversammlung ebendort. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. Als amtliches Vereinsorgan ist die „Gef. Welt" anerkannt worden.
J.A.: H. Schwaiger, 1. Vors., Augsburg, Schöpplerstr. 9/I.

Aus den Vereinen.

„Aegintha", Verein der Vogelfreunde zu Berlin. Sitzung jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat, abends 8 Uhr, im Vortragssaal des Aquariums. Fast in jeder Sitzung belehrende Vorträge und Besprechungen unter gütiger Mitwirkung unseres verehrten Ehrenmitgliedes Herrn Dr. Heinroth. Gäste gern willkommen.
J. A.: O. Vorbrodt, 1. Schriftf., O 112, Scharnweberstr. 18.

Vereinigung der Liebhaber einheimischer Vögel zu Berlin. Sitzung jeden 2. Donnerstag nach dem 1. und 15. des Monats im Vereinslokal zum „Alexandriner", Alexandrinenstraße 37a. Gäste stets willkommen.
J. A.: P. Böhme, Schriftf., O 17, Rüdersdorfer Str. 69.

Verein für Vogelkunde, -schutz u. -liebhaberei Cassel. Sitzung jeden 2. Montag im Monat im „Deutschen Haus", Frankfurter Str. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen.
J. V.: Emil Ivo, Schriftführer.

Alte Vereinigung der Vogelliebhaber zu Dresden. Versammlung jeden Freitag, abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Blasewitzer Hof". Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. J. A.: Matth. Meys, Schriftf.

Verein Vogelschutz u. -pflege zu Dresden. Versammlung jeden Donnerstag, abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Schillers Restaurant", Ecke Stifts- und Ehrlichstr. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. Bernhard Kühn, Vors.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei zu Hamburg. Sitzung jeden 1. u. 3. Dienstag im Monat in Hüttmanns Hotel, Poolstr. 22, abends 8¼ Uhr. Nächste Sitzung Dienstag, den 15. Dezember 1924. Gäste sowie auch Exotenliebhaber stets willkommen. J. A.: Arnold Weber, 1. Vors.

Der Verein der Liebhaber von Zier- und Singvögel, Hörde, gegründet 1920, beging vom 15. November bis einschließlich 19. November seine diesjährige Ausstellung im Vereinslokale H. Ungewitter, Bruchstr. (Burghoff). Ausgestellt waren 97 Vögel aller Gattungen. Die Mitglieder des Vereins, 40 an der Zahl, hatten sich die größte Mühe gegeben im Käfigmaterial sowie in der Pflege der Tiere, was am besten zu erkennen war bei der Prämiierung, wozu der Verein die Herren Rektor Weymann, Dortmund, Dr. Künemann, Hörde, und Hellmann, Hörde, gewählt hatte. Was nun die Ausstellung anbetrifft, so wurde selbige vom 1. Vorsitzenden Reyer, Samstag nachmittag 5 Uhr im Beisein sämtlicher Mitglieder und schon erschienenen Besuchern feierlichst eröffnet mit dem Wunsche, daß die Ausstellung gut besucht werden möchte, und daß sich die Besucher der Ausstellung sowie unsere Gegner davon überzeugen möchten, daß es den Liebhabern darauf ankommt, unsere Lieblinge aufs beste zu hegen und pflegen, und jeder somit bestrebt sei, den Tieren nach Möglichkeit die Natur zu ersetzen. Was nun den Besuch der Ausstellung anbetrifft, so war dieser in Anbetracht der schlechten wirtschaftlichen Verhältnisse ein mittelmäßiger, so daß der Verein mit einem kleinen Überschuß rechnen kann. Alles in allem, die Ausstellung war eine sehr schöne und vielseitige, sowohl in Ausschmückung wie in Tieren. Besonders fiel den Besuchern der dem Mitgliede Behnke gehörige Paradieswida auf, welcher sich in seiner ganzen Pracht zeigte. Dann die schönen Feldlerchen, die Schwarzplättchen, Gartengrasmücken, Dorngrasmücken, Hänflinge, Distelfinken, Zeisige, Buchfinken, Girlitze, Dompfaffen, Graudrosseln, Schwarzdrosseln, Rotkehlchen, Braunellen, Papageien, Fische, Aquarien und die schönen Blumenarrangements, wofür den Frauen des Vereins der beste Dank gebührt. Die Ausstellung schloß am Mittwoch (Bußtag) Kollege Reyer abends 10 Uhr mit Dankesworten an die Besucher sowie an sämtliche Mitglieder mit ihren Frauen mit dem Wunsche, noch einige gemütliche Stunden zusammen zu bleiben, und daß der Verein wachse, blühe und gedeihe.
Fritz Reyer, 1. Vors., Hörde, Neuer Klarenberg 38.

Verein für Vogelschutz und -pflege Jena. Die Vereinsabende finden regelmäßig aller 14 Tage (Sonnabends) um 8 Uhr in der Wohnung des 1. Vorsitzenden, Herrn Jahn, Feodorastraße 7, statt. Jena besuchende Vogelfreunde treffen jeden Sonntag vormittag den Schriftführer, Feodorastraße 13 wohnhaft, an und sind zur Besichtigung von dessen Vogelstube herzlichst eingeladen. — Versammlung am 29. November 1924. 1. Die Festsetzung der Beiträge für 1925 wurde verschoben. 2. Für Sonntag wurde eine Besichtigung des von Herrn R. gekäfigten Uhus verabredet. 3. Der Naturwissenschaftliche Verein Erfurt hatte zu einem Vortragsabend Herrn Dr. Weigold gewonnen, der über den Vogelzug und seine Erforschung sprach. Der Vorsitzende unseres Vereins wohnte dem Vortrag bei und berichtete ausführlich über das Gehörte.
A. Voigt, Jena (Ost), Feodorastraße.

Verein von Vogelfreunden Karlsruhe. Gegr. 1888. Monatsversammlung jeden 1. Mittwoch im Monat. Lokal „Goldener Adler".
Bang, 1. Vorstand. Boppel, 1. Schriftf.

Verein der Vogelliebhaber Königsberg (Pr.). Sitzung jeden Freitag nach dem 1. u. 15. d. M., abends 8 Uhr im Vereinslokal „Kaiser-Kaffee", Kaiserstr., Ecke Schnürlingsstr. Gäste sind willkommen. J. A.: Ernst Reinholdt, 1. Vors.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig. Vereinssitzungen jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat im Vereinslokal „Bauers Brauereirestaurant", Täubchenweg. Nächste Sitzung Donnerstag, den 18. Dezember Gäste stets willkommen. — Die nach dem Vergnügungskalender auf den 13. Dezember festgesetzte Christbescherung findet nicht an diesem Tage, sondern am Sonntag, dem 14. Dezember, nachmittags 4 Uhr im Vereinslokal, „Bauers Brauereirestaurant", Täubchenweg, statt. Gäste durch Einführung herzlich willkommen.
Der Vorstand. J. A.: J. Birk, 1. Vorsitzender.

Verein der Vogelfreunde Leipzig-Plagwitz. Vereinslokal: „Gosenschlößchen", Leipzig-Plagwitz. Sitzungen an jedem 1. und 3. Montag des Monats, abends 8 Uhr. Vogelfreunde sind stets willkommen.
K. Scholtissek, 1. Vors., L.-Plagwitz, Lauchstädter Str. 30.

„Ornis", Freie Bezugs-Vereinigung der Waldvogelliebhaber Deutschlands. Gegründet 1912. Auf vielseitigen Wunsch der alten Mitglieder wollen sich die Waldvogelliebhaber wieder in der „Ornis" zusammenschließen. Als amtliches Organ ist die „Gef. Welt" ausersehen worden, und werden die Artikel, die früher in den „Ornis-Blättern" erschienen, in obiger Zeitschrift gebracht werden. Aus diesem Grunde bittet die Geschäftsführung um eifrige Mitarbeit, damit unserer Waldvogelpflege wieder der Platz eingeräumt wird, der ihr gebührt. Anmeldungen sind unter Beifügung von 2 M. an den Geschäftsführer zu richten; Mitglieder erhalten auf Mischfutterbestellungen 5% Rabatt. Mit treudeutschem Gruß Martin Sperling, Halle/S., Südstr. 49.

(Fortsetzung auf der 3. Umschlagseite.)

Verein der Vogelliebhaber zu Mannheim. Versammlung aller 14 Tage Samstag abend 8 Uhr im Vereinslokal „Restauration z. gold. Falken", S. 1. 17. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. J. Daubmann, 2. Schriftf.

Bayrischer Vogelliebhaberverein, Sitz München (E.V.). Jeden Samstag gesellige Zusammenkunft im Pschorrbräuhaus, Bayerstr. Jeden letzten Samstag im Monat Monatsversammlung im Vereinslokal ebendort. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. Rud. Engel, 1. Schriftführer.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -pflege zu Oschatz und Umgebung. Gegründet 1. Mai 1923. Vereinsabende aller vier Wochen, in der ersten Woche des Monats verbunden mit Vortrag, in der dritten Woche jeden Monats nur gesellige Zusammenkunft. Vereinslokal „Sächsischer Hof". Gäste stets willkommen. Studienrat Professor Jahn 1. Vorsitzender; Werkmeister Mann 2. Vorsitzender; kaufm. Angestellter Reinhardt Schriftführer.

Zoolog. Verein zu Zwickau i. S. Versammlung jeden Freitag nach dem 1. und 15. jeden Monats, abends 8 Uhr, im Restaurant „Zur Bleibe", Katharinenkirchhof. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen.
J. A.: Paul Schmidt, 1. Vors., Zwickau i. S., Bosenstr. 44.

Anzeigenteil

Die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 20 G.-Pf. berechnet. Aufnahme erfolgt gegen Voreinsendung des Betrages in Reichsgeld per Brief od. auf unseren Zahlstellen: Postscheckkonto: Magdeburg 3148, Wien 156 687, Bern III 4326, Prag: Creditanstalt d. Deutschen unter Angabe des Zweckes

Käfige u. Gerätschaften

Schlagnetze für Sperlinge, Amseln usw. 2.50 *M*, für Tauben, Rebhühner usw. 4.50 *M*. Nachn., bei Voreinsendung des Betrag. franko. [1052] Fangnetzfabrik **K. E. A. Müller, Schlotheim Th. 3**

Flugbauer, 130×132×65, zerlegb., Hartholz, verz. Stäbe, auch f. kleine Exoten passend, 14 selbstschließ. Türen, m. all. Zubehör u. eisern. Rahm. f. 60 *M* bar zu verk. [1053 **R. Bracklow,** Halle, Merseburger Str. 20

Zu Volieren passend

Maschendrahtgitter, 1 cm Maschenweite, auf Holzrahmen befestigt, 4 Teile, 1 m lang, 1 m breit, 4 Teile 1,30 m lang, 1 m breit, 2 Teile 1,30 m lang, 1,05 m breit, zusammen mit Verpackung 25 *M*. 1054] **Johann Fischer, Waldsassen** Ornis-Mtgl. 332. Mitterteicherstr. 54.

Futtermittel

Schindlers Universalfutter

für Insektenfressende Vögel, von vorzüglicher Qualität und Mischung. Kilo M. 3.— und M. 4.—. Bei Voreinsendung des Betrages portofrei. Postscheck. Leipzig 82627.
Jul. Schindler, Zwickau i. S.,
1055] Wilhelmstr. 41.

Mehlwürmer

geg. Einsend. v. 2.—Rentenmark 1/4 Pfd. franko versend. **D. Waschinski & Co.,** Biesenthal I (Mark). [1056

Mehlwürmer Pfd. 5 *M*, 6 Pfd. 30 *M* frc. Nachn. 1057] **Jeitner, Breslau,** Weinstr. 12.

1058] **Mehlwürmer,** reine Ware, gegen Eins. von 1.75 *M* 1/4 Pfd. franko. **Th. Witte,** Niederndodeleben b. Magd.

Vogelfutter [1059

für Kanarien, Waldvögel, Exoten, Papageien, Weichfresser. Anerkannt bewährteste Mischungen auf Grund langjähriger Erfahrung. Liste 13 über Vogelfutter umsonst.

W. Göpel, Leipzig,
Tröndlinring 1. Telephon 14958.
Bei Anfragen bitte auf die „Gefiederte Welt" Bezug zu nehmen.

Hanfsaat, jede Menge, gibt ab
Deutsche Hanfbau A.-G., Berlin,
1060] **Dorotheenstrasse 77/78.**

Wer
in der „Gefiederten Welt" inseriert,
hat Erfolg!

Für Freunde der heimischen Vogelwelt.

Die deutsche Vogelwelt nach ihrem Standort. Ein Beitrag zur Zoogeographie Deutschlands und zugleich ein Exkursionsbuch zum Kennenlernen der Vögel. Von Werner Hagen. Mit 74 Abbildungen und 4 Schwarzdrucktafeln. Kart. 3.— M.

Die einheimischen Stubenvögel, ihre Naturgeschichte und Zucht. Von Karl Neunzig (zugleich 6. Auflage des Dr. Karl Rußschen Handbuchs für Vogelliebhaber Band II). Mit 22 Farbentafeln und 188 Textabbildungen. Geh. 14.—, geb. 17.— M.

Die gefiederten Sängerfürsten des europäischen Festlandes, ihre Naturgeschichte, sachgemäße Käfigung, Behandlung und Pflege als Stubenvögel. Von Mathias Rausch. 2. Auflage. Mit 3 Farbendrucktafeln und 16 Textabbildungen. Kart. 3.— M.

Die Hauptregeln der Sprosserpflege. Scherzreime von Oskar M. Risch. Mit 2 Abbildungen. 1.— M.

Der Dompfaff, seine Naturgeschichte, Pflege, Abrichtung und Zucht. Auf Grund 54jähriger Erfahrung von F. Schlag. 8.—10. Auflage. Mit 2 Schwarzdrucktafeln. Kart. 1.— M.

Die deutschen Sumpf- und Strandvögel. Von Dr. Curt Floericke. Mit 44 Abb. auf 15 Tafeln in Schwarzdruck. Kart. 4.50 M.

Die deutschen Schwimm- und Wasservögel. Von Dr. Curt Floericke. Mit ca. 45 Abb. auf 15 Tafeln in Schwarzdruck. Kart. 4.50 M.

Die mitteleuropäischen Vögel. Von Dr. E. Bade. Band I. Singvögel. Mit 1 Farbentafel, 4 Schwarzdrucktafeln, 81 Tafeln in Photographiedruck u. 144 Textabbild. von Nestern, Eiern u. Vogelteilen. Geb. in Ganzleinen 5.— M.

Allerlei sprechendes gefiedertes Volk. (Raben- und Krähenvögel, Starvögel usw.) Ein Hand- und Lehrbuch von Dr. Karl Ruß. Mit 5 Vollbildern in Schwarzdruck. Kart. 3.— M.

Gefiederte Hausfreunde I. Von Karl Neunzig. Kurze Unterweisung üb. d. Pflege heimischer Stubenvögel. Kart. 1.— M.

Die Fänge der Raubvögel Mitteleuropas. Von Prof. Dr. Carl R. Hennicke. Mit 33 lithogr. Tafeln. Kart. 5.— M.

Zu beziehen durch:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlg., Magdeburg
Postschließfach 148.

Vögel

Vorsänger und **pa. Zuchtmaterial** rein durchgezücht. Hohl- und Schockel-Stamm, 2 Staatsmedaillen, gebe preiswert ab. Am liebsten selbst kommen. [1061
Paul Holzky, Cöthen IV.

Kanarien
hochfeine, tiefe tourenreiche
Harzer Edelroller
flotte Tag- und Lichtsänger.
Hähne Stück 15, 18 und 22 *M*,
Weibchen Stück 3 *M*.
Garant. für gesunde Ankunft, 6 Tage zur Probe, reelle Bedienung.
Vers. Nachn., Porto u. Verpack. 3.50 *M*.
P. Herold, Erfurt,
1062] Schmidtstedter Ufer 24.

Hochfeine Harzer Edelroller

mit tiefen hervorrag. Hohlrollen, Hohlschockel, Hohlklingel, Knorre, Gluck und tief. Pfeif., à 15, 20 u. 25 *M*, Weibchen à 3 *M*, versendet gegen Nachm. bei 6 Tagen Probezeit. Garantie für lebende Ankunft. [1063
H. Voigt,
Kanarienzücht.,
Nordhausen am Harz.

Schneeweiße und isabellfarbige Gesangs-Farbenkanarien
empfiehlt **H. Bibrack, Aschersleben**
1064] am Harz.

Kanarien
sehr gute Harzer Edelroller, Tag- und Lichtsänger, Hähne 15, 20 und 22 *M*, Weibchen Stück 3 *M*.
Kaufe 0,1 Pekingente. [1065
Syré, Lehrer, **Biernau** i. Thür.

Beschwerden wegen Nichtzustellung der „Gefiederten Welt" sind beim zuständigen Postamt anzubringen.

Molukken-Kakadus
(fingerzahm)
Stück 250 Mark.

Große weiße Gelbhauben Kakadus	Stck.	60 ℳ
Kleine weiße Gelbhauben Kakadus	„	60 ℳ
Rote Araras	„	200 ℳ
Graupapageien	„	120 ℳ
Blaustirnamazonen	„	55 ℳ
Schwarzohrpapageien	„	60 ℳ
Dunkopfpapageien	„	60 ℳ
Tarant. Unzertrennliche Zuchtpaare	Paar	40 ℳ
Sperlingspapageien	„	18 ℳ
Wellensittiche, grün u. gelb	„	15 ℳ
Graugehäubte Kardinäle	„	18 ℳ
Gilbweber	„	12 ℳ
Indigofinken, gut befiedert	„	30 ℳ
Kleine Kubafinken	„	35 ℳ
Zebrafinken	„	18 ℳ
Jap. Mövchen	„	15 ℳ
Zebrataubchen	„	10 ℳ
Braunstärlinge	„	5 ℳ
Rotschnabel Toko	Stck.	75 ℳ
Goldstirnblattvögel	„	60 ℳ
Dreifarbige Prachtglanzstare	„	40 ℳ
Langschwanz Glanzstare	„	30 ℳ
Tyran	„	50 ℳ
Albino-Drosseln	„	30 ℳ
Singdrosseln	„	12 ℳ
Schwarzplättchen im Gesang	„	20 ℳ
Weiße Kanarien (Nachtigallen-Schläger)	„	100 ℳ
Weißblütige Nachtigallen-Schläger	„	60 ℳ
Harzer Roller	„	15 ℳ
Resusaffen	„	60 ℳ
Meerkatzen, zahm	„	65 ℳ
Weißkopfkapuziner	„	150 ℳ
Wollaffen, ganz zahm	„	250 ℳ

empfiehlt

Tierhandlung
Max Kleinert
Berlin NO 18, Strausberger Str. 13,
Fernruf Alexander 3313. [1066

Empfehle in tadellosen Exemplaren und länger gekäfigte Vögel: [1067

Rotgehäupte Kardinäle Stck. 9 ℳ, bei 3 Stck. à 8 ℳ, **Jap. Mövchen** à Paar 14 ℳ, bei 3 Paar à 13 ℳ, **gelbe Wellensittiche** à Paar 15 ℳ, **Zebrafinken** à Paar 15 ℳ, **Kalanderlerchen,** Männchen à 30 ℳ, **Toviosittiche** à Paar 25 ℳ (zahm), **Blumenausittiche** à Paar 25 ℳ (ganz zahm), **Kanarienflügelsittiche** à P. 35 ℳ (ganz zahm), **kleiner Gelbhaubenkakadu** 60 ℳ (ganz zahm), **zahmer Seidenschwanz** 8 ℳ, **Kernbeißer** 6 ℳ, **junge Doppelgelbkopfamazone** à 70 ℳ, ganz zahm u. etwas sprechend, offeriert

Paul Tzornack, Berlin,
Prenzlauer Allee 189.

Tausche oder verkaufe!
2,2 Isabellkanarien, reine Zucht (1924), gegen weiße oder weißblütige Kanarien.
E. Marschallek, Lübeck,
1068] Lützowstr. 21.

Gebe ab
2 Jahr gekäfigtes gutes
Schwarzplättchen
gegen Zuchtpaar Zebrafink, ebenso besetzte Mehlwurmkiste gegen futterfesten 1,0 Rothänfling. [1069
Schmidt, Wittenberg (Bz. Halle), A. Z.-Mtgl. Grünstraße 28.

---

2 Ia **lautsing., zahme Rotkehlch.** à 6 ℳ, 1 **Davidzippe,** ff. Säng., 10 ℳ, 1 dto. **Schwarzamsel** 8 ℳ, 1 **Gartengrasmücke,** ff. Säng., 10 ℳ, 2 ff. sing. **Braunellen** mit blauer Brust à 6 ℳ, 1 **Zuchtp. gelbe Zeisige** 6 ℳ, 1 **Grauedelsänger,** Ia Säng., 10 ℳ [1070
A. Engelken, Delmenhorst.

---

1 Mosambikzeisig [1071
1 Grauedelsänger
eingewöhnte, singende Männchen, gebe ab für 20 ℳ franko, tausche evtl. gegen fleißig singenden Kanarienhahn mit zwei Weibchen, Sonnenvogel od. and. Sänger.
P. Diwersy, Merzig a. d. Saar.
A. Z.-Mtgl. 183.

Junger
Doppelgelbkopf Papagei
Prachtvoll im Gefieder, kerngesund und ohne Fehler.
Preis 75 Mark
Egon Rebekus, Photograph,
1072] **Schwerte,** Markt 6.

Empfehle:
Schwarzblättchen, Frühjahrsvögel, Stück 10—12 M.
Feldlerchen Stück 4 M.
Rotkehlchen Stück 3 M.
Mehlwürmer
Pfund 6 M., 1/4 Pfund 2 M. franko
Selbstgetrocknete Ameiseneier
¼ Pfund 6 M.
Nehme auch evtl. **Sonnenvögel** in Zahlung.
L. C. Reith, Wiesbaden,
1073] Helenenstraße 24.

Molukken-Kakadus
Stück 210 Mark.

Blaustirnamazonen, zahm, jung 50 bis 60 ℳ, sprechende 80—120 ℳ		
Mönchsittiche	Stck.	12 ℳ
Blaustirnsittiche	„	22 ℳ
Grüne Wellensittiche	Paar	18 ℳ
Safranfinken	„	12 ℳ
Blauflügel-Sperlings-Papageien	„	25 ℳ
Papstfinken, Männchen	Stck.	22 ℳ
Schwefelgelbe Tyrannen	„	20 ℳ
Mexikan. Grünheher	„	35 ℳ
„ **Feldspötter**	„	10 ℳ
Rote Tigerfinken	Paar	6 ℳ
Graue Kardinäle	Stck.	12 ℳ
Dominikan. Kardinäle	„	10 ℳ
Große Gelbhaubenkakadus		70 ℳ
Meerkatzen u. Javaneraffen		60 ℳ
Kapuzineraffen, fingerzahm, schwarze Stück 160 ℳ		
Mamosettäffchen	Stck.	40 ℳ

Lebende Ankunft garantiert. [1075
Gustav Müller,
Zoologische Großhandlung
Hamburg
Langenfelderdamm 27.

Offeriere in gut eingewöhnten Exemplaren:

Schamadrossel	80 ℳ
Schwarzdrossel	10 „
Singdrossel	10—20 „
Rotgelb. Kardinal	15 „
Rotkehlchen	3—8 „
Heckenbraunelle	5 „
Gartenrotschwanz	5 „
Hausrotschwanz	8 „
Kreuzschnäbel	3—5 „
Buchfinken	3—6 „
Rothänflinge	4—5 „
Stieglitze	4—5 „
Erlenzeisige Paar	5 „
Dompfaffen Paar	10 „

W. Hiltmann, [1082
Berlin S. 14, Dresdener Str. 24.

Kaufe ständig:
Zier- u. Singvögel aller Gattung.
z. Wiederverkauf und bitte um gefl. Angebote mit Preis.
Josef Perner, Strasburg, Uckerm.
1083] Schulstraße 15.

---

200 gr. Wellensittiche,
junge und alte Vögel, aus meinen Freivolieren je Stück 6 ℳ ab hier per Nachnahme abzugeben. Ferner **1,1 Mönchsittiche** 15 ℳ. Versandkästen einsend.
Fabrikdirektor Anmüller,
Delitzsch, Bez. Halle. [1084

Meine Ia Singdrossel,
1 Jahr gekäfigt, jetzt laut singend, gebe ab für 15 ℳ. — Volle Garantie. [1085
J. Decker, Oschersleben.

Gutsprechender zahmer
Graupapagei
zu kaufen gesucht. Off. mit
Preis und Sprachverzeichnis an
Adolf Bollig, Köln, Peterstr. 2. [108

Harzer-Edelkanarien
von 12 ℳ an, Weibchen 3 ℳ. **Flug- u. Deckkäfige, Nist- u. Versandkästen** billig. [108
Adolf Janson, Barbis a. H.

Kanarienhähne
schöne fl. Sänger à 10 ℳ, m. Haub 12 ℳ, Weibchen 2 ℳ, 1,0 Grünhänflin 3 ℳ, 1,1 Bastard Grünhäufling × Kanarie 10 ℳ, 0,1 Hänfling × Kanari 2 ℳ, 1,0 kalifornische Schopfwachtel 30 ℳ 1,0 Zwerg-Wyandotten, weiß, 6 ℳ Alles gesunde Tiere verkauft [108
W. Reim, Altstadt, Waldenburg 97, Sc

Suche zu kaufen:
Gute Kalanderlerche.
Karl Ohliß, Frankfurt a. M.,
Prüfling 36. [108

Niedl. Äffchen
ganz zahm und drollig. [108
Verkauf für 65 Mark.
C. Willer, Altona, Kirchen
straße

Gebe ab: „Gefiederte Welt
Jahrg. 1908—23, z
sammen 45 ℳ einschl. Porto. [10
M. Schreiber, Berlin-Friedenau
Odenwaldstraße 26 III.

Inserate
für das am 18. Dez. 1924 zur Ausgabe gelangende Heft 44 der Ge Welt erbitten bis 13. Dez. 1924 frü

Bei Anfragen und Bestellungen bitten wir, sich auf die „Gef. Welt" zu berufen

---

Blaustirnamazonen, junge, sehr gelehrige	Stück	45.— bis 50.—
Gelbnackenamazonen, jung anfangend mit Sprechen	Stück	75.—
Mohrenkopfpapageien, junge, sprachgelehrige	Stück	40.—
Bergpapageien, A. taranta	Paar	40.—
Guajakilsittiche	„	125.—
Tovisittiche	„	36.—
Kanarienflügelsittiche	„	38.—
Grüne Wellensittiche	„	16.—
„ „ ausgefärbte Zuchtpaare	„	20.—
Gelbe Wellensittiche	„	20.—
Oliogrüne Wellensittiche	„	70.—
Satingrüne Wellensittiche	„	70.—
Junge blaue Wellensittiche	„	50.—
Ältere blaue Wellensittiche	„	185.—
Weißhaubenkakadu, ganz taubenzahm u. sprechend	Stück	120.—
Schamadrosseln, Ia i. Gesang	„	100.—
Rotbauchdrosseln do.	„	20.—
Braundrosseln do.	„	18.—
Grauschwanzdrosseln do.	„	12.—
Weißkehldrosseln do.	„	15.—
Goldstirnblattvögel do.	„	60.—
Klarinettenvögel, laut i. Schlag	„	85.—
Krontangare	„	20.—
Graue Kardinäle	Stück 10.— Paar	18.—
Karmingimpel (Mexiko) Kopf etwas kahl	Stück	5.—
Weiße Reisfinken	Paar	75.—
Weinrote Haubenfinken	„	30.—
Gay's Ammerfinken	„	28.—
Zebrafinken	„	18.—
Tigerfinken	„	5.—
Safranfinken	„	8.—
Atlasfinken Paar 4.—, i. Pracht	„	6.—
Bandfinken	„	5.—
Silberschnäbelchen	„	4.20
Amaranthen	„	4.50
Grauastrilden	„	4.—
Grauedelsänger	„	6.—
Schuppenköpfchen	„	15.—
Blutschnabelweber in Pracht	„	10.—
Orangeweber	„	12.—
Dottergelbweber	„	12.—
Textorweber	„	14.—
Tahaweber	„	15.—
Bastarde, Hänfling × Kanarie	Stck.	20.—
Kanarienhähne, nur beste Ia Sänger	„	20.—
Drillaffe, ganz zahm	„	180.—
Javaaffen	„	80.—
Kapuzineraffen	„	90.—
Marmosettäffchen	„	40.—

Versand per Nachnahme oder Voreinsendung. Porto und Verpackung 3.50, dringend 6.50. [1074
E. W. Lenger, Berlin N 58,
Schönhauser Allee 70a.

Prima Graudrosseln, echt bay. Amseln, Buchfinken, Hänflinge, Zeisige, Girlitze, Distelfinken, Dompfaffen, Lerchen,
seit 4 bis 7 Wochen gekäfigt.
Zwerghunde aller Arten,
Angora-Kaninchen usw.
Liste gegen Rückporto.
Vogelheim Emmy Voß
1076] **Köln a. Rh.,** Merlostr. 23.

Suche in Tausch:
Zebrafink i. Pracht, 0,4 **Jap. Mövchen** und **Dompfaff** usw.
Gebe ab:
1 P. sch. **Blumenausittiche** 40 M., 1,2 **Lachs.** 18 M., ff. **Kan.-Hähne** 25 u. 30 M., ff. **Perlstar** 15 M., Guckkasten mit 95 ff. Lichtbildern 75 M., Postkarten-Album mit ca. 245 ff. Ansichtskart. 12 M.
W. Quicker, Dessau (Anhalt),
1077) Askanischestr. 19.

Grüne Wellensittiche
größeren Posten, aus Freivoliere und von blutsfremden Eltern pro Stück 7 ℳ abzugeben. Porto u. Verpack. Selbstkosten.
1078] **R. Huth, Perleberg.**

Verkaufe:
1,0 **roter Kardinal** (Prachttier) 35 ℳ
2,0 **rote Hänflinge** à 5 ℳ [1079
Tausche auf amerk. Spottdrossel oder Blaudrossel.
Paul Gehme, Freiberg, Sachsen.

Prachtvolle
Weihnachtsgeschenke sind schön singende **Kanarienvögel,** welche ich zum Preise von 15—30 ℳ abgebe, Weibchen von 3—5 ℳ. Bei Bestellungen bitte Farbe angeben, ob gelb, grün oder bunt Dazu wundervolle Käfige vom einfachsten bis elegantesten. [1080
W. Hiltmann,
Berlin S 14, Dresdener Str. 24.

Bessere Prachtfinken
gebe in Tausch gegen nur prima **Anzugstoffe** oder sonstiges. Verkaufe auch. Angebote erbeten unter „**Reell**" an d. Geschäftsst. d. Gef. Welt. [1081

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Berlin-Hermsdorf; für den Anzeigenteil: Rolf Kretschmann, Magdeburg, Postschließfach 148.
Verlag der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck: August Hopfer, Burg Bz. Magdbg.

Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Jahrg. 53 | Den 18. Dezember 1924 | Heft 44

(Druckort: Burg, Bezirk Magdeburg.)

Webervögel und Widafinken.

Von A. Krabbe.

(Fortsetzung und Schluß.) (Nachdruck verboten.)

P. Gattung Plattschweifwidafink — Coliuspasser *Rüpp.*

Diese Gattung umfaßt 15 Arten, hauptsächlich schwarz gefärbte Widafinken, von denen 6 bereits eingeführt sind, der einfarbige, Schild-, Rotscheitel-, weißgezeichnete Widafink, Widafink mit zimmetrotem Schulterfleck, Gelbschulter und

Gelbrückenwidafink — C. macroura (*Gm.*),

der sammetschwarz gefärbt ist, mit gelbem Vorderrücken und gelben Flügeldecken. Das Auge ist braun, der Schnabel schwarz, die Füße braungrau. Die Länge beträgt 180—210 mm, wovon 90—120 mm auf den Schwanz entfallen. Die Heimat ist Westafrika von Senegambien bis Angola, ostwärts bis ins Innere Ost- und Nordostafrikas. Reichenow berichtet über ihn: „Ein häufiger Vogel der Steppe. Treibt sich einzeln oder paarweise im hohen Grase und auf Büschen umher, setzt sich gern auf hervorragende Zweige und erhebt sich von hier aus spielend in die Luft, wobei der Körper ganz senkrecht gehalten und die Nackenfedern gesträubt werden. Das Nest ist aus etwas sprödem, trockenem Gras gebaut, kugelförmig mit seitlich oberem Schlupfloche, das von hervorstehenden Halmen der oberen Nestwandung dachartig überdeckt wird. Das Weibchen baut noch am Neste, wenn das Gelege, das aus 2—3 Eiern besteht, bereits vollzählig ist. Während das Weibchen brütet, sitzt das Männchen auf einer Warte in der Nähe mit gesträubten Nackenfedern und stürzt sich auf jeden Vogel, der sich dem Nestort nähert. Wo die Vögel häufig sind, findet man die Nester in geringerer Entfernung von einander, jedes Männchen aber bewacht eifersüchtig sein kleines Gebiet. An der Goldküste fand ich im August, in Kamerun im November Eier."

Ich erhielt 1922 von einem bekannten Liebhaber in Coburg ein schönes Männchen im Prachtgefieder und war von der vornehmen Schönheit des Vogels entzückt. Von dem Sammetschwarz des Körpers hebt sich der breite hochgelbe Sattel ästhetisch schön ab. Es ist ein älteres Männchen, meiner Schätzung nach mindestens 6 Jahre alt. Auf Tafel 14 im neuen Neunzig ist der Vogel farbig abgebildet; das tiefe Sammetschwarz und der hochgelbe Rücken ist nicht scharf ausgeprägt, weil sich der Vogel im Hintergrund des Bildes aufhält. Im vorigen Jahr war das Männchen bereits am 20. April eingefärbt; in diesem Jahre begann die Mauser am 5. Juni und war am 18. Juli beendet, dauerte also 42 Tage. Einige graue Federn am Bauch sind von der Umfärbung nicht erfaßt worden. Im vorigen Jahre hat dieser Widafink sich insofern unverträglich gezeigt, als er die Paradieswitwen zeitweilig jagte, was er in diesem Jahre ganz unterlassen hat. Besonders erwähnenswert ist, daß er leidenschaftlich gern badet, ganz gleich, ob in oder außer Pracht. Er ist stets der erste am Badegefäß und hört nicht eher auf zu planschen, bis er pudelnaß ist. Der Schwanz breitet sich auf dem Wasser fächerförmig aus. Die Balzstellung ist urkomisch. Mit gespreizten Schwanzfedern, hoch aufgerichtetem Körper und gesträubten Nackenfedern bringt er mit sichtbarer Anstrengung seinen gurgelnden Gesang hervor, der in lauten melodischen Rufen endet, die wie tüi, tüi klingen. Derartige Brunstäußerungen werden auch wohl mit Begattungsversuchen an jungen Vögeln abgeschlossen, was übrigens einige Weber auch zu tun pflegen. Es ist bedauerlich, daß von den seltenen Widas keine oder nur zufällig einmal Weibchen eingeführt werden. Ich zweifle nicht, daß Zuchtversuche öfter von Erfolg begleitet sein würden, als man anzunehmen geneigt ist.

Weißgezeichneter Widafink — C. albonotatus (*Cass.*)

Der erste Weißflügel-, auch Spiegelwidafink genannt, der mit dem südafrikanischen Transport im Mai 1923 mitkam, war mir von Herrn Fockelmann in freundlicher Weise reserviert worden. Es war ein schönes Männchen in Pracht, das im Gesang in der Voliere durch sein heftiges Wesen auffiel. Nach der Mauser war er einer der ruhigsten Volierenbewohner. Am 10. August 1923 begann die Einfärbung ins Hochzeitskleid und seitdem ist der Vogel bis heute in Pracht. Auch jetzt, im Oktober 1924, ist von einer Mauser noch nichts zu merken und ich bin neugierig, ob das Federkleid, welches genau so glatt

und schön ist, wie im Anfang, den Winter durch getragen wird. Anfang Oktober war der Vogel 13 Monate im Hochzeitskleid. Den sehr leisen Gesang höre ich selten; überhaupt ist dieses Männchen im Gegensatz zu der Beschreibnng im Neunzig sehr still und versteckt*). Besonders schön ist es im Fluge, wenn die breiten weißen Flügelbinden den Eindruck erwecken, als wären die Flügel durchsichtig.

Das Männchen ist sammetschwarz; die kleinen Flügeldecken sind gelb; einige vordere große Flügeldecken, Wurzel der Schwingen, Unterflügeldecken weiß, andere Flügeldecken zuweilen Schwingen mit schmalem fahlbraunen Außenrand; Auge braun; Schnabel bränn-lich schwarzgrau; Füße bleigrau bis schwarz; Länge 160 bis 175 mm, Schwanz 80 mm. Das Weibchen ist fahlbraun gefärbt, mit schwarzen Schaftstrichen; kleine Flügeldecken gelb. Das Männchen behält die gelbweiße Färbung der Flügel auch im grauen Kleid. Siehe Abb. S. 349. — In Südwestafrika gibt es eine nahestehende, sehr seltene Form, den langschwänzigen weißgezeichneten Widafinken — C. asymetrura (*Rchw.*), die meines Wissens noch nicht eingeführt worden ist. Die

Q. Gattung Stummelschwanzwidafink — Urobrachya *Bp.*

zählt acht Arten, wovon bereits drei eingeführt worden sind, Rotschulter-, Kurzschwanz- und Orangeschulterwidafink. Von diesen ist der

Rotschulterwidafink — U. axillaris (*A. Sm.*)

1898 von Apotheker Nagel in Pritzwalk gezüchtet worden. Als ich bei meinem letzten Besuch in Hamburg mit einigen Freunden die Vogelläden durchsuchte, sah ich bei einem Händler im Fenster einen Rotschulterwidafink im grauen Gefieder, lebhaft singend. Es war ein älteres Tier mit stark entwickelten Krallen und auffallend langen Ständern. Ich kaufte natürlich den Vogel, und zwar als „Mosambikweber". Wieviel Seltenheiten mögen wohl unerkannt aus diesen kleinen Vogelläden der Hafenstädte ins Publikum wandern?

Das Männchen ist sammetschwarz; kleine Flügeldecken scharlachrot, bei jüngeren orangegelb; mittlere Unterflügeldecken, Achselfedern zimmetbraun; übrige Flügelfedern schwarzbraun; große Deckfedern mit zimmetbraunen, die inneren und letzte Schwinge mit hellbräunlichen Säumen; Handdecken zuweilen am Grunde zimmetbraun; Schwanz schwarz; Auge dunkelbraun; Schnabel bleigrau, am Grunde dunkler; Füße schwarz; Länge 158—190 mm, Schwanz 70—80 mm. Im Ruhekleid sandfarben, schwarz gestrichelt; Kehle, Bauchmitte weißlich; die roten kleinen Flügeldecken mit schwarzem Mittelfleck. Weibchen dem Männchen im Ruhekleid ähnlich, kleiner; Schnabel fahlrötlichbraun. Die Heimat ist Südostafrika. Ich lasse einen Auszug aus der Schilderung von Stark aus dem Freileben dieses Widafinken folgen: „Im Flachlande von Natal sind diese Witwen auf Grasflächen, insbesondere solchen, die Schilfmoore und Sümpfe umgeben, wo das Gras hoch aufschießt, sehr gemein. Wie alle Mitglieder der Gattung sind sie polygamisch, und im Frühjahr sieht man die hübschen Männchen in ihrem sammetschwarzen Kleide mit roten oder orangefarbenen Epauletten eigentümlich hüpfenden Fluges über Schilf und Gras hinfliegen, jedes gefolgt und in allen Bewegungen begleitet von 10 oder 12 Weibchen, den unscheinbaren braunen Vögeln, die sich immer in einem dichten Knäuel zusammen einige Fuß hinter ihrem Herrn und Meister halten. Zum Beginn des November sondern sich die Weibchen und fangen an, ihre Nester zu bauen. Diese stehen nicht nahe beieinander, obwohl innerhalb eines bestimmten Bezirks, den das Männchen als sein unbeschränktes Eigentum betrachtet und aus dem es alle andern Männchen seiner Art wie auch die viel größeren und stärkeren Diatropura progne (Hahnschweifwidafinken) vertreibt. Jedes Weibchen hat sein eigenes Nest. Das Nest wird gewöhnlich in einem Grasbüschel, kaum einen Fuß über dem Boden erbaut, ist oval mit seitlich oberem Eingange, etwa 12 cm hoch, 8 cm im Querdurchmesser und aus feinem Grase in einer Art offenen Netzwerkes gewebt, so daß man durch die Seiten hindurch sehen kann, ohne Auspolsterung. Die Seiten des Nestes sind an die umgebenden Grashalme angewebt und die Enden dieser über dem Neste nach Art eines Baldachins zusammengebunden, so daß sie es von oben ganz verdecken. Im Dezember findet man drei blaue, dunkel olivenbräunlich gefleckte Eier von 20 × 15 mm im Neste. Im Winter rotten sich Alte und Junge zu Scharen zusammen, die sich aber nicht weit von ihren Nistplätzen zu entfernen scheinen."

„Am 27. Juni begann mein Männchen mit der Einfärbung, war also bereits an unsere Jahreszeit gewöhnt, und war am 9. August in voller Pracht, also innerhalb 42 Tagen. Die roten Schulterfedern treten selten in Erscheinung, sondern sind meist verdeckt; nur im Fluge werden sie deutlich und sehr schön sichtbar. Der Schwanz ist so kurz, daß man einen Widafinken nicht vor sich zu haben glaubt. Der Gesang besteht aus leisem Schnurren und Zischen und wird mit gesträubten Halsfedern und rückwärts gebogenem Kopf bei jeder Gelegenheit, selbst am Futternapf, vorgetragen. Mehlwürmer liebt er sehr und ist auch immer da, wenn etwas zu holen ist. Das Benehmen ist ruhig und friedlich. An Schönheit und Eleganz steht der Rotschulterwidafink als Vertreter der Stummelschwänze den übrigen nach. Zum Zusammenhalten mit andern Vögeln ist er seines ruhigen Wesens geeignet.

Hiermit ist für dieses Jahr die Behandlung meines Themas erschöpft und ich schließe meine Aufzeichnungen. Das Meiste darin ist bekannt, einiges vielleicht neu, doch hoffe ich, Anfängern unserer Liebhaberei so manchen Wink und Liebhaberfreunden einige interessante Beobachtungen unterhaltend mitgeteilt zu haben. Diejenigen der werten Leser aber, die mangels Interesse an der exotischen Vogelwelt, insbesondere der hier behandelten, meinen Ausführungen nicht gefolgt, bitte ich um Entschuldigung, daß ich einen erheblichen Teil unserer Zeitschrift für mich und mein Steckenpferd in Anspruch genommen habe. Alles, was ich an langen Abenden geschrieben habe, soll zur Kenntnis einer uns fast geheimnisvoll anmutenden Vogelart beitragen und Verständnis und Liebe dazu erwecken.

*) „Wenn auch nicht so stürmisch wie manche Verwandte" (Fremdl. Stubenvögel v. K. Neunzig S. 398). N.

Ein Weihnachtserlebnis.

Von Karl Finck, Neukölln.

(Nachdruck verboten.)

Der heilige Abend mit seinen Überraschungen und verklärten Stimmungen verlief ohne Mißton. Am ersten Feiertag sollte ich in der ziemlich entfernten Schneidemühle mit dem Inhaber verschiedene Abrechnungen vornehmen.

Der Auftrag erfreute mich ungemein, da ich mehrere Stunden allein im Walde zubringen und wahrscheinlich auch die Wasseramsel beobachten konnte.

Als ich erwachte, flimmerten am Himmel noch einzelne Sterne. Schnell wurden die notwendigsten Tagesarbeiten erledigt. Kurz nach Eintritt der Dämmerung verstaute ich die Belege in meinen Rucksack, riemte den Hühnerhund an und hinaus ging es in die schweigende Winterlandschaft.

Vor einigen Tagen hatten wir ein heftiges Schneetreiben. Die kleinen Häuschen im Dorfe duckten sich förmlich unter der schweren Last, selbst Zäune und Pfähle trugen weiße Häubchen. Vor den Ställen begannen die Sperlinge über die schlechten Zeiten zu schimpfen, eilfertig trippelten mehrere Haubenlerchen umher, und Schwärme Grünfinken mit Goldammern gemischt, suchten emsig Futter. Auf den hohen Pappeln saßen Nebelkrähen, quarrten und krächzten.

Zuerst ging es mühsam durch hohen Schnee, dann kam ein stark befahrener Weg, der sich allmählich zu den Bergwäldern hochschraubte.

Einsam war es, wie in einem verwunschenen Märchenlande, keine Menschenstimme störte den Frieden, nur zeitweise zitterte weiches, leises Meisengeflüster.

Ein bläulicher Frostnebel wogte über den Beständen. Glühendrot stieg die Sonnenscheibe hoch. Wundervoll flirrten nun die schneebedeckten Hänge, der Fichtenwald färbte sich rosa und das Dürrlaub der Buchenkulturen flammte in Purpur und Gold.

Unten im Tale lag mein Dörfchen, der Gutshof, tief verschneite Gärten, Wiesen und Felder, von einem erlenumsäumten Bächlein durchzogen, dessen teilweise vereister Lauf silbrig blitzte. Sonst nichts als Wälder und Wälder in ihrem schimmernden Winterkleide. In blendender Lohe erhoben sich dahinter die Zinnen, Schroffen und Häupter der Alpenwelt. Über den dunklen Schwarzkieferhalden tanzten goldene Sonnenflecken. Alle Farbenschattierungen waren vertreten, da dämmerte es lazurblau, dort überzogen rote, hauchartig verteilte Töne weite Flächen und verliefen, wenn einzelne Wolkenfetzen die Sonne verfinsterten, schnell in satte dunkle Tinten, Lichtreflexe und Stimmungen wechselten ständig.

Mit trunkenen Blicken betrachtete ich das herrliche Landschaftsgemälde, welches auch der begnadeste und phantasievollste Künstler in der Formgestaltung und Farbenzusammenstellung sicherlich nicht zarter und prunkvoller schaffen konnte.

Bald nahm mich ein schlagreifer Fichtenbestand auf, woran Kulturen grenzten. Der Schneedruck hatte in den wüchsigen, dicht geschlossenen Pflanzungen schon erheblichen Schaden angerichtet. Zahlreiche Wildfährten führten nach den Schonungen. Der Hund legte sich immer wieder keuchend in den Riemen.

Auf einmal öffnete sich ein weites, windgeschütztes, sonniges Waldtal. Hier pulsierte reges Leben. Drollige Haubenmeischen turnten von Ast zu Ast, irgendwo zwitscherten unermüdlich Zeisige, und im Brombeergeranke schmetterte der Zaunkönig ganz lenzfroh sein trotziges Liedchen. Aber am Rande der Schläge, wo die Wipfel der Fichten und Föhren

Weißgezeichneter Widafink.

im Sonnenschein warmes Grünn zeigten, kletterten geschäftig Kreuzschnäbel umher. Singend stiegen die erregten Männchen in die Höhe, schwebten wieder zurück und feierten zwischen Eis und Schnee ihre Hochzeitsfeste.

Das Tal verengte sich nun. Ein leicht gewölbter Abhang hatte schönen Buchenbestand. Dieser Laubbaum gedieh hier in der geschützten Lage auf dem kalkhaltigen Lehmboden vorzüglich. Im Holze sah es böse aus. Überall war der Schnee aufgescharrt, und richtig trottete in nicht zu weiter Entfernung gemächlich ein starkes Rudel Rotwild ab. Mit größter Anstrengung vermochte ich den vor Erregung bebenden Hund zurückzuhalten. Wiederum führte der Steg bergauf. Dichte Fichtenschläge dehnten sich aus.

Nur ab und zu unterbrach ein glänzender Sonnenstrahl das geheimnisvolle Dunkel. Weiter oben wurden die Bestände spärlich, dürftige Lärchen folgten, und verstreut lagen Felsblöcke umher. Endlich war der Kamm erreicht.

Nun ging es abwärts. Nicht lange, so rückten wieder Berge zusammen, und es entstand ein schluchtartiges, schmales Tal. Rechts ragten steile Wände

hoch, links rauschte in der Tiefe ein wilder Gebirgsbach, welcher etliche Kilometer entfernt von gewaltigen Höhen sturzartig herabtoste. Baumstämme und Geröll, die der wilde Geselle mit sich führte, hinderten häufig seinen Lauf und ließen seine Fluten aufspritzen.

Stellenweise konnte man den Weg kaum passieren, dann führte ein hinübergelegtes Brett nach dem anderen Ufer.

Schweißbedeckt erreichte ich nach vielen Beschwerden die Stauanlagen, wo sich starke zusammengeschlossene Eisbildungen zeigten. Zunächst ruhte ich mich etwas aus und teilte mit meinem treuen Gefährten das Frühstück.

Nach Angaben des Forstwärters sollten in diesem Gebiete drei bis vier Wasseramseln ihren Winterstandplatz haben. Obwohl ich mit größter Vorsicht weiterpirschte, dabei mit dem Glase ständig das Gelände absuchte, ließ sich nirgends ein solcher Vogel erblicken. Erst im Rande des offenen Wassers hinter der Schleuse lief eine Wasseramsel umher, tauchte blitzschnell unter, verschwand manchmal ganz oder schwamm stoßweise mit der Strömung und gebrauchte geschickt die Flügel als Ruder.

Anscheinend wurde das geteilte Revier streng eingehalten, wenigstens kämpften an der Biegung des Bachlaufes wütend zwei Exemplare. Der Sieger flog auf einen Stein, putzte seine zerzauste weiße Brust und Kehle, wippte fortwährend mit dem keck aufgerichteten Schwänzchen und plauderte unaufhörlich.

Besondere gesangliche Leistungen waren es freilich nicht; es hörte sich jedoch an, als ob mir das Vögelchen in der frosterstarrten Wildnis ein Märlein von Schnee und glitzerndem Eis, von der harten Not und von seinem sprudelnden Bächlein erzählte, dann aber auch schon vom holden Lenz träumte, wenn der Gebirgswald erwachte, an den Hängen Anemonen blühen und sich die Rotbuchen mit goldgrünlichen Blättchen schmücken werden.

(Schluß folgt.)

Liebhabersorgen.

Von J. Birk, Leipzig.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Kann denn jeder Händler, jeder Liebhaber wirklich die Gesangsleistung einer oder der anderen Vogelart in allen ihren Teilen richtig beurteilen? Vielfach nicht, denn sind die Richtlinien zur Beurteilung der Vollkommenheit eines Vogelgesanges im Prinzip auch allgemein in den Kreisen der erfahrenen Liebhaber bekannt, so läßt sich, wie ein Sprichwort sagt, bekanntlich nicht über den Geschmack streiten. Viele Liebhaber stellen ihre Anforderungen an einen guten Vogelgesang meistens zu hoch, sie suchen, sie kaufen, sie verkaufen, sie tauschen, und ihre Liebhaberlaufbahn ist, anstatt ein unerschöpflicher Born der Freude und inneren Befriedigung, ein fortwährendes Enttäuschtsein und ein ständiger Wechsel des Bestandes. Ein halbwegs annehmbarer Sänger wird durch einen vermeintlich besseren ersetzt, wieder keine Befriedigung, und so geht es weiter. Es sind dies laufende Sorgen der betreffenden Liebhaber; ja, ich habe Liebhaber gekannt, bei denen es fast ein krankhafter Zustand war, dieser Drang nach ständig Neuem. Allen Liebhabern ist bekannt, daß die meisten Frischfänge in ihrer ersten Käfiggesangsperiode nicht ganz befriedigen, indem sie nicht ihr ganzes Können dem Ohr des Lauschers offenbaren, der Tourenreichtum des einem guten Sänger innewohnenden Gesanges kommt meistens erst voll im zweiten Käfigjahre zum Vortrag, darum muß Geduld die erste Bedingung eines Vogelliebhabers sein. Hat er die nicht, so ladet er zu seinen berechtigten Sorgen als Liebhaber noch viele unnötige Sorgen hinzu. Man soll Liebhaber sein, das heißt, man soll nicht in ein ständiges Hasten, Jagen und Suchen nach nur erstklassigen Sängern, die es ja bekanntlich nicht so häufig gibt, verfallen. Das Resultat ist neue Bestellungen von frischgefangenen Vögeln, neues Warten auf Gesang, neue Enttäuschung über denselben, neuer Wechsel, neue Sorgen, und so geht es weiter, bis endlich nach vielen Sorgen, Ärger und Geldverlusten einmal das Glück hold ist und einen Vogel bringt, der dem Geschmack des anscheinend verwöhnten Liebhabers gerecht wird, aber in Wirklichkeit von einer Gesangshöchstleistung noch weit entfernt ist. Es soll wohl das Bestreben eines jeden Vogelliebhabers sein, gute Sänger, das heißt wenigstens solche ohne schlechte Gesangsstrophen, in seinem Bestande zu haben, aber er soll in seinen gefiederten Lieblingen nicht nur lebende Gesangsmaschinen sehen, die im Vergleich zur Natur mit einer doppelt langen Gesangsdauer im Käfig immer noch nicht befriedigen, sondern er soll sich für die Mühen und Sorgen, die für den Liebhaber unausbleiblich sind, in ihrem munteren zutraulichen Wesen, ihrem schlanken Gefieder, ihrer sorgfältigen Pflege, überhaupt in ihrem Seelenleben während der gesangslosen Zeit zu entschädigen suchen. Hat sich der Liebhaber mit dem Ideal der Vogelliebhaberei vertraut gemacht und gefunden, seine Pfleglinge nicht nur als Sänger, sondern als ein lebendiges sangesfrohes Stückchen Natur zu betrachten, den Vogel nicht nur in seiner Art, sondern auch als Individuum schätzen und lieben zu lernen, so wird seine Liebhaberei zur edlen Sache, sie wird ein erlebenswerter Inhalt seines Lebens, ein Sorgenbrecher, der Glück und Zufriedenheit in Herz und Heim trägt. Vergessen sind bei der Beschäftigung mit unseren Lieblingen die Alltagssorgen des Brotverdienens, man empfindet hierbei die vielerlei Sorgen, die uns eine gewissenhafte Vogelhaltung aufbürdet, als eine befriedigende Abwechslung im Einerlei des Lebens.

Da die Beschaffung von gesanglich guten Frühjahrswildfängen für viele Liebhaber mit vielen Schwierigkeiten verbunden ist, so tut der Liebhaber gut, nicht in den krankhaften Zustand zu verfallen, immer wieder etwas Neues in den Käfigen zu haben, denn er kommt bei dieser Methode nicht aus der Sorge heraus, wo er und ob er mit gesanglich einwandfreien Vögeln beliefert wird. Habe ich einen Sänger, der mir zusagt, so steht auch fest, daß er in meinem dauernden Bestand bleibt, und ich erspare mir viele Sorgen, Ärger und Enttäuschungen. Meine Hauptsorge bei einer eventuellen Auffüllung meines Bestandes ist stets, hast du in dem Neuankömmling einen ruhigen Vogel, der sich das ganze Jahr gut im Gefieder hält, denn ich sehe einem Vogel eher etwas im Gesange nach und drücke über einen kleinen Fehler ein Auge zu, wenn er sich ständig gut im Gefieder

hält. Es ist wirklich eine Weide für das Liebhaberauge, im Gefieder einwandfreie Käfiginsassen zu haben. Recht hat natürlich derjenige Liebhaber, der sich mit den Worten: „Mit dem Schwanze singt ja der Vogel nicht!“ über seine schwanzlosen Stubengenossen tröstet, aber dies kann nur ein ganz extremer Gesangsliebhaber sagen; derjenige Liebhaber, dem seine gefiederten Lieblinge ein Stückchen Natur sind und sich an diesem Stückchen Natur an seiner Natürlichkeit ergötzen will, kann nicht sorglos Vögel mit zerstoßenem Schwanz und Gefieder in seinem Bestand dulden. Eine Ausnahme kann ich nur gelten lassen, wenn es sich bei einem, sich ständig schlecht im Gefieder haltenden Vogel, um einen ganz selten guten Sänger handelt. Man muß sich wirklich manchmal wundern, wenn man im Bestande eines sonst gewissenhaften Liebhabers die meisten Vögel ohne Schwänze findet, ich kenne dies in meiner Liebhaberei sehr wenig. Am meisten Sorgen machen mir darüber die Gartengrasmücken, ebenso auch die Sperbergrasmücken, rotrückige Würger halten sich sehr schlecht im Gefieder. Es kann sein, daß es auch ein Glücksumstand mit sein kann, derartige, sich im Gefieder gut haltende Vögel zu erhalten, doch trägt an einem verstoßenen Gefieder die individuelle Veranlagung des Vogels, überhaupt sein ganzes Temperament sehr viel Schuld. Denn es gibt Vögel, und deren sind es leider nicht die wenigsten, die, solange sie gekäfigt werden, kaum sind sie durch die Mauser und die Frühjahrs- oder Herbstzugzeit ist vorüber, so präsentieren sie sich wieder als schwanzlose, keinem Vogel mehr ähnliche Jammergestalten. Nicht unerwähnt soll bleiben, daß ein sachgemäßer Käfig mit einer praktischen Anordnung der Sitzstangen bei manchem Vogel mildernd wirkt auf seine Toberei, niemals lasse man sich aber dazu verleiten, kurz vor oder während der Zugzeit dem Vogel einen anderen Käfig, eine andere Anordnung der Sitzstangen oder einen anderen Standort des Käfigs zu geben, denn dies alles wirkt auf den Vogel beunruhigend, nimmt ihm seine sonstige, durch Gewohnheit gefestigte Sicherheit im Sprunge, überhaupt in seinen Bewegungen. Ferner vermeide man während der Zugzeit dem Vogel hitziges Futter, vor allem Mehlwürmer, zu reichen; erfordert letzteres die unter Normal stehende Körperbeschaffenheit des Vogels, so ist eine Mehlwurmgabe nötig, weil die ständige, unruhige Beweglichkeit des Vogels einen starken Kräfteverbrauch erfordert. Anders verhält es sich zum Frühjahrszug, denn zu dieser Zugzeit tritt der Zugtrieb beim Käfigvogel nicht so auffallend in Erscheinung, der Zugtrieb wird abgeschwächt durch den Gesang, denn zu dieser Zeit muß jeder normale und gesunde Käfigvogel im Gesang sein. Mildernd auf den Zugtrieb wirkt auch das Geschlossenhalten der Fenster, denn frische Luft regt den Vogel noch mehr auf, ebenso vermeide man ein Zwielicht in der Vogelstube durch Mondschein oder Straßenlaternen vor dem Fenster; entweder verdunkle man den Käfig durch Verhängen mit einem Tuche oder das Zimmer durch Schließen der Jalousien oder Läden. Aber leider helfen diese Mittel nicht bei jedem Vogel mildernd, am besten wäre es für die ziehenden Käfigvögel, wenn man die Vogelstube erleuchten würde, werden sie auch weiter ziehen, so vermeiden sie aber doch die rasende, für das glatte Gefieder so gefährliche Toberei. Die Zugzeit, während der jeder Liebhaber in ständiger Sorge ist um das Gefieder seiner Lieblinge, gehört mit zu den unangenehmsten Erscheinungen in der Liebhaberei und hat manchen Liebhaber, der sich am Abend noch stolz am glatten Gefieder seiner Lieblinge erfreute, am Morgen die größte Enttäuschung gebracht. Wer sich diese lästigste aller Liebhabersorgen soviel als möglich ersparen will, gebe keinen Vogel aus seinem Bestande fort, der ständig während des ganzen Jahres im natürlichen Gefieder glänzt, denn die Ganzhaltung des Gefieders ist, abgesehen von sonstigen mitwirkenden Übelständen, speziell eine individuelle Veranlagung des betreffenden Vogels. Welcher Liebhaber hat nicht schon die Erfahrung gemacht, daß manchmal ein wie rasend Tobender früh noch im unversehrten Gefieder ist, während bei einem anderen, der kaum merklich tobt, in einer Nacht das Gefieder zerschlissen und

Nest mit Rotrückenwürgern.

verstoßen ist. Wenn natürlich manche Liebhaber ganz besonders schlau sein wollen und, um ihren Vogel mit verstoßenem Schwanzgefieder wieder zur Natürlichkeit und Vogelähnlichkeit zu verhelfen, sie einfach die abgestoßenen Federn kurzerhand ziehen, um dadurch einem neuen Schwanze Platz zu machen, haben die Rechnung ohne den Vogel gemacht, denn wenn das erste gesunde und kräftige, durch die natürliche Mauser hervorgerufene Schwanzgefieder in seiner Stabilität nicht stand hält, wie kann dann ein, auf unnatürliche Weise hervorgerufener, in seiner Widerstandskraft einer Treibhauspflanze gleichender Schwanz von längerer Dauer sein, meistens geht das auf diese Weise gewonnene Schwanzgefieder denselben Weg wie das vorhergegangene. Nicht nur aus diesem Grunde, sondern auch noch aus einem anderen ist das Federziehen zu verwerfen, denn der zur Neubildung der Federn nötige Säfteverbrauch bringt eine Verschiebung im Vogelorganismus hervor und hat deshalb Einfluß auf den Gesangsausbruch, oder, wenn schon vorhanden, auf den fleißigen Vortrag desselben. Ja selbst für das Wohlbefinden, für die Gesundheit des Vogels kann eine derartige Federzieherei kritisch werden, wenn es sich bei einer solchen Verschönerungsprozedur um schwächliche, im Körperzustand unter Normal stehende Vögel handelt; darum ist es besser, man findet sich mit der Tatsache eines verstoßenen Gefieders ab und nimmt den unästhetischen Anblick eines derartigen Vogels mit auf das Konto der Liebhabersorgen.



Käfig mit Futter- und Wassergefäß ziehenden Zeisig.

Wenn ich nun zu der Hauptsorge der Liebhaber, der Milbenplage, übergehe, so tue ich das unter der Voraussetzung, daß, wenn ich zu dem darüber schon soviel Geschriebenen und in Liebhaberkreisen Debattierten auch meine Erfahrungen hinzusetze, diese Liebhabersorge nicht aus der Welt geschafft wird, sondern daß die Kurzhaltung dieser blutsaugenden Schmarotzer solange ein fortwährender Kampf sein wird, solange Vögel im Käfig gehalten werden. Anführen muß ich natürlich auch, daß ich während meiner langjährigen Liebhaberlaufbahn auch mit Liebhabern bekannt geworden bin, die erstaunt waren, daß es überhaupt eine Milbenplage der Käfigvögel gibt, denn sie hätten in ihrer Liebhaberpraxis noch keine Milbe gefunden, ihre Vögel wären immer milbenfrei gewesen, sie kannten Milben nur vom Hörensagen oder aus den Käfigen anderer Liebhaber usw. Mag man noch so leichtgläubig sein, derartige Versicherungen wird man wohl niemals für ernst nehmen, denn Milben kennt jeder Vogelliebhaber. Es handelt sich dabei natürlich darum, ob er sie aufkommen läßt oder mit allen Mitteln bekämpft. Schmarotzer hat jeder Vogel in der Natur, er ist auch von der Natur bis zu einem gewissen Maße durch Witterungseinflüsse, Freiheit usw. vor deren Überhandnehmen geschützt; anders beim Stubenvogel, der durch eine unnatürliche Lebensweise und schlechte Zimmerluft nach und nach degeneriert und infolge seiner Gebundenheit an einen engbegrenzten Aufenthaltsort, wie ihn der Käfig darstellt, ein wehrloses Opfer dieser Blutsauger wird, deren rapide Vermehrung außerdem noch durch die Zimmertemperatur eine außerordentliche Begünstigung erhält. Jedem Liebhaber ist es ja auch bekannt, daß Weichfresser unter der Milbenplage fast kaum oder doch nur in verschwindendem Maße zu leiden haben, und ich sehe es lange noch nicht als eine Plage an, wenn ab und zu einige Milben sich einstellen und dem Vogel etwas Blut entnehmen. Nur bekämpfen müssen wir sie, diese Blutsauger, die in ganz kurzer Zeit, wenn ihrer Vermehrung nicht Einhalt getan und für ihre Vernichtung gesorgt wird, den Vogel vom Leben zum Tode befördern. Wer in seiner Liebhaberei diese Schmarotzer so überhand nehmen läßt aus Bequemlichkeit, ist überhaupt kein Liebhaber, sondern ein Kerker- und Foltermeister seiner Vögel. Zu entschuldigen wäre nur eine vorhandene Unkenntnis dieser drohend aufsteigenden Gefahr, was leider fast bei den meisten Anfängern in der Liebhaberei der Fall ist, wer sie aber kennt, diese Blutsauger, und sorgt nicht für eine ständige Bekämpfung und Kurzhaltung derselben, begeht einen unverzeihlichen Verstoß gegen seine Pflichten als Liebhaber, und ist nicht wert, Vögel als Stubengenossen zu halten. Wer Gesellschaftskäfige mit einheimischen Körnerfressern sein eigen nannte, oder wer ein eifriger Verehrer und Anhänger der Lerchenliebhaberei ist, der kann ein Wörtchen mitreden, was für eine Sorge des Liebhabers die Milbenbekämpfung ist. Jeder, der ein wirklicher Liebhaber und nicht nur ein einseitiger, oberflächlicher Vogelhalter ist, wird nichts unversucht lassen, um diese Schmarotzerbrut aus seiner Vogelstube zu verbannen. (Schluß folgt.)

Vogelschau der Vereinigung der Vogelliebhaber, Landesverband Preußen.

Von K. Neunzig.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Da in der Ausstellung der Händler kein Preisbewerb stattfand, werde ich die einzelnen Firmen in der Reihenfolge des Ausstellungsführers besprechen, die mir allerdings eine ganz willkürliche zu sein

scheint. Ich möchte hier einige Bemerkungen über den „Ausstellungsführer" einschalten, und zwar über das Beisetzen der wissenschaftlichen Namen, die doch recht überflüssig sind bei Vögeln, die jeder kennt. Was hat es für einen Sinn, bei jedem der vielen Rotkehlchen mit Erithacus rubecula, bei jeder Amsel mit Turdus merula zu prunken. Besser bleiben sie auch bei den Fremdländischen fort, schon um an den Klippen, welche bei diesen nicht ganz geläufigen Namen drohen, nicht zu scheitern. Die Gefahr ist groß, und man hat sie nicht abzuwenden vermocht.

Hermann Arold hatte außer einigen schönen Kanariennischlingen, unter denen ein Stieglitz × Kanarienvogel sehr stark die Stieglitzfärbung und -zeichnung zeigte, eine zahme Dohle, heimische Körnerfresser und einige Weichfresser, alle in gutem Gefieder, ausgestellt. Arold ist auch Hersteller von Käfigen, in denen er einen Teil seiner Vögel zeigte. Die Käfige sind ähnlich den Wiener Käfigen gebaut, aber aus naturlackiertem Erlenholz von ansprechendem Äußeren. Die Futternäpfe sind z. T. die bekannten Ornisnäpfe, z. T. sind sie aus Zinkblech gefertigt. In einigen Käfigen für Erdsänger sind die Futternäpfe in gleicher Höhe mit dem Käfigboden einschiebbar, dasselbe ist bei den Lerchenkäfigen der Fall. Hier ist die Verunreinigung der Futter- und Wassernäpfe durch ein Schutzgitter vor den Näpfen verhindert. Bei anderen Käfigen, besonders bei denen für Körnerfresser, war derselbe Zweck durch ein über den Futtergefäßen angebrachtes Schutzdach erreicht.

Rosakakadu.

Eine schöne, auch an Seltenheiten reiche Sammlung hatte Kleinert, Berlin, ausgestellt. Unter den deutschen Vögeln ist eine Albinoamsel und eine auch in der Ausstellung schlagende Nachtigall hervorzuheben. Zahlreich waren die Arten von Papageien. Zwei rote Aras, einige zahme Molukkenkakadus waren auf Ständern ausgestellt. Von Amazonen waren neben den Blaustirnamazonen, Gelbnacken-, eine auffallend schöne Doppelgelbkopfamazone, die kleine Weißkopfamazone und eine Amazone mit schmalem rotem Stirnband und Zügel und lilafarbenen Oberkopf ausgestellt, welche im Ausstellungsführer als Rotstirnamazone — Amazona bodini erscheint. Diese Bestimmung ist falsch. Eine genaue Bestimmung war leider nicht möglich, da der Vogel sehr bald verkauft und von der Ausstellung verschwunden war. Anscheinend handelt es sich um A. lilacina (*Less.*). Graupapageien, kleine Gelbhaubenkakadus, Sperlings- und die jetzt nicht mehr seltenen schönen Bergpapageien fehlten nicht. Von Langflügelpapageien war der Schwarzohrpapagei — Pionias menstruus (*L.*) und der sehr seltene Dunenkopf — P. sordidus (*L.*) aus Venezuela vorhanden. Die zur Zeit im Handel befindlichen seltenen oder höher im Preis stehenden Webefinken, weißköpfige Büffel-, Taha- und Gilbweber, Indigo-, kleine Kubafinken, graue und rote Kardinäle vertraten die Körnerfresser. Von Staren waren Klunker-, Dreifarbenglanzstar, langschwänzige Glanzstare, die schon im laufenden Jahrgang besprochen sind, von Stärlingen der große Soldaten- und der Brillenhordenstärling vorhanden. Purpur- und meerblaue Tangare, Goldstirnblattvögel vertraten die Fruchtfresser. Schamadrosseln ließen ihre lauten Rufe hören, die aber übertönt wurden durch die Stimme eines schönen Weißhaubenheherlings, wohl des ersten Heherlings, der nach dem Kriege wieder zu uns gelangte. Katzendrosseln, indische Blaurake, schwefelgelber Tyrann, indische Wanderelster und drei recht interessante Rotschnabeltokos aus Ostafrika vervollständigten die schöne Ausstellung der Firma Kleinert.

Die umfangreichste und auch durch zahlreiche Seltenheiten hervorragend war die Ausstellung der Firma Lenger, Berlin. Um eine große in der Art einer Vogelstube, mit Weberfinken, kleinen Webern und ausländischen Finkenvögeln, darunter Schuppenköpfchen, Tahaweber, weiße Reisfinken, Magellanzeisige, kleine Kubafinken und mexikanische Karmingimpel bevölkerte Voliere gruppierten sich die zahlreichen kleineren und größeren Käfige. Unter diesen fesselten am meisten die mit den Farbenspielarten des Wellensittichs bevölkerten, die wohl das erstemal in dieser Reichhaltigkeit und Verschiedenheit gezeigt wurden.

Ein großer Flug grüner und gelber Wellensittiche, in den üblichen verschiedenen Abtönungen, befand sich neben den paarweise untergebrachten neueren Farbenspielarten des kleinen Australiers. Da waren eine ganze Reihe blauer Wellensittiche, darunter ein Paar ältere intensiv blaugefärbte, einige Paare satingrüner und der prächtigen olivgrünen Varietät. Von anderen Sittichen dieses Ausstellers sind hervorzuheben 2 Paare Guajakilsittiche, Tovi- und Kanarienflügelsittiche, beide Arten von bekannter Zahmheit, ein schöner gelbbrüstiger Blauara. Unter den Kurzschwänzen neben mehreren Graupapageien, junge und alte Rotbauchamazonen, ein Mohrenkopf, Bergpapageien und ein sehr zahmer und schöner Weißhaubenkakadu (Abb. S. 345). Von Prachtfinken, Webern und kleinen ausländischen Finken war vorhanden, was z. Zt. allgemein käuflich war. Darüber hinaus

weiße Reisfinken, wohl die ersten der Nachkriegszeit, Schuppenköpfchen, Magellanzeisige u. dergl. mehr. Ein Paar der selten brasilianischen roten Kronfinken, die lange auf dem Vogelmarkt fehlenden Krontangaren, die schon früher besprochene Abttangare und die das erstemal nach Deutschland gelangte Prachttangare bleiben späterer Besprechung vorbehalten. Als Seltenheit ist auch ein Zuckervogel (Pitpit) noch im grünen Kleid oder ein Weibchen hervorzuheben.

Sehr bewundert wurden die weißen Kanarienvögel desselben Ausstellers, von denen 2 mit dunklen Hauben, einer mit Schwalbenzeichnung, besonders schöne Vögel, auffielen.

Neben Schama- und Elsterdrossel, unter ersteren auch ein Weibchen, sind vier südamerikanische Drosseln als Seltenheiten anzusprechen, die Grauschwanzdrossel — T. amaurochalina, Köhleramsel — T. flavipes, Weißkehldrossel — T. albicollis und Braundrossel — T. famigates. Über diese wird gleichfalls noch eingehender zu berichten sein. Ein eifrig singender Klarinettenvogel, der kleine Rotkehlfliegenschnäpper (s. S. 309) und ein Goldstirnblattvogel sind noch hervorzuheben. Zwei mexikanische Grünheher, einige heimische Sänger (Sprosser, Nachtigall usw.) sowie einige Kanarienmischlinge vervollständigen die reichhaltige Sammlung dieses Ausstellers.

(Schluß folgt.)

Vom Vogelmarkt.

Von seltener auf den Vogelmarkt kommenden Vögeln werden angeboten:

Aumüller, Fabrikdirektor, Delitzsch, Bez. Halle: 1,1 Mönchsittiche.

W. Hiltmann, Berlin S. 14, Dresdener Str. 24: Schamadrossel, Heckenbraunelle, Gartenrotschwanz, Hausrotschwanz.

Egon Kebekus, Schwerte, Markt 6: Doppelgelbkopf.

Max Kleinert, Berlin NO. 18, Strausberger Str. 13: Molukken-Kakadus, Kakadus, rote Araras, Schwarzohrpapageien, Dunkopfpapageien, tarant. Unzertrennliche, Gilbweber, kleine Kubafinken, Zebratäubchen, Braunstärlinge, Rotschnabel Toko, Goldstirnblattvögel, dreifarbige Prachtglanzstare, Langschwanz Glanzstare, Tyran, Albino-Drosseln, weiße Kanarien.

E. W. Lenger, Berlin N. 58, Schönhauser Allee 70a: Gelbnackenamazonen, Mohrenkopfpapageien, Bergpapageien (A. taranta), Guajakil-, Tovi-, Kanarienflügelsittiche, olivgrüne Wellensittiche, saftgrüne Wellensittiche, junge blaue Wellensittiche, ältere blaue Wellensittiche, Weißhaubenkakadu, Schamadrosseln, Rotbauchdrosseln, Braundrosseln, Grauschwanzdrosseln, Weißkehldrosseln. Goldstirnblattvögel, Klarinettenvögel (laut im Schlag), Krontangare, Karmingimpel (Mexiko), weiße Reisfinken, weinrote Haubenfinken, Gay's Ammerfinken, Schuppenköpfchen, Dottergelbweber, Textorweber, Tahaweber, Hänfling × Kanarie.

E. Marschalleck, Lübeck, Lützowstr. 21: 2,2 Isabellkanarien.

Gustav Müller, Zoologische Großhandlung, Hamburg, Langenfelder Damm 27: Molukken-Kakadus, Mönchsittiche, Blaustirnsittiche, schwefelgelbe Tyrannen, mexikanische Grünheher, mexikanische Feldspötter, rote Tigerfinken, Dominikan. Kardinäle.

M. Reim, Altstadt, Waldenburg 97, Sa.: 1,1 Bastard-Grünhänfling × Kanarie, 0,1 Hänfling × Kanarie, 1,0 kalifornische Schopfwachtel.

Paul Tzornack, Berlin, Prenzlauer Allee 189: Kalanderlerchen, Tovisittiche, Blumenausittiche, Kanarienflügelsittiche, Seidenschwanz, Kernbeißer, junge Doppelgelbkopfamazone.



Herrn E. H., Klodnitz. Die Sperbergrasmücke zeigt schon äußerlich, daß sie ungebener fett war. Ihr Benehmen im Käfig war das eines an Fettsucht leidenden Vogels. Das nach oben Stoßen mit dem Schnabel war ein Zeichen, daß der Vogel an Atemnot litt. Die schlaganfallähnlichen Zustände waren die Folge der bestehenden Fettsucht. An der Brust und besonders am Bauch waren diese Fettpolster vorhanden, die Eingeweide waren in Fett eingebettet, so daß sie ihre Aufgaben nicht mehr erfüllen konnten. Die Folge war das Eingehen dieses Vogels. Um derartiges zu vermeiden, muß der Futterzustand des Vogels beobachtet und je nach Befund nahrhaftes oder weniger nahrhaftes Futter in kleinen oder größeren Gaben gereicht werden.

Herrn A. A., Hamburg I, Herrn A. A., Stockholm, Herrn K. H., Erfurt, Herrn v. L., Herrn M., Leipzig. Beiträge dankend erhalten.

Herrn F. K., Hörde. Besten Dank für die Mitteilung.

Herrn F. H. P., Parkesburg. Mischlingszüchtung kann sowohl in Volieren im Freien, wie in Einzelkäfigen betrieben werden. In letzteren hält man die Vögel paarweise, in den Volieren die Finkenmännchen und eine entsprechende Anzahl von Kanarienweibchen, besonders solche, welche sich als gute Brüterinnen und zuverlässige Mütter erwiesen haben. Die zur Mischlingszucht verwendeten Vögel dürfen Artangehörige des anderen Geschlechts weder sehen noch hören. Um Zerstörung der Nester und der Brut durch die Männchen, besonders der Stieglitze, zu vermeiden, kann man diese Männchen entfernen, sobald die Weibchen fest brüten. Stieglitze haben auf den Innenfahnen der mittleren Schwanzfedern, kurz vor der Spitze, einen weißlichen Fleck, Spiegel genannt. Sind diese Flecke auf sechs Schwanzfedern vorhanden, so nennt man den Vogel einen Sechsspiegler, sind sie auf acht vorhanden, so hat man einen Achtspiegler vor sich. Wellensittiche können durch ihren kräftigen Schnabel anderen Mitbewohnern der Voliere gefährlich werden. Sie lassen sich durch die anderen im Brüten und in der Aufzucht der Jungen nicht stören, wenn unter den anderen nicht gerade sehr angriffslustige Höhlenbrüter vorhanden sind.

Herrn J. G., Neu-Ulm, Herrn J. P., München. Ist brieflich Bescheid zugegangen.

Herrn K. K., Tetschen/Elbe. Der Kanarienvogel ist einem Herzschlag erlegen.

Herrn H. D., Breslau. Der Grauastrild ist einer Darmentzündung erlegen. Die genannten Samen können sämtlich gereicht werden. Jedoch können die kleinen feinschnäbligen Prachtfinken, wozu auch die Grauastrilde gehören, die hartschaligen Hirsearten und häufig auch Spitzsamen nicht enthülsen.

Herrn E. V., Altona/Elbe. Ob das Salz irgendeine Wirkung hat, ist fraglich, da nicht mit Sicherheit feststeht, ob es wirklich dem Organismus zugeführt oder mit dem Kot wieder ausgeschieden wird. Hanf enthält mehr mineralische Nährstoffe als Leinsamen, dagegen weniger Fett als letzterer, wäre demnach dem Leinsamen vorzuziehen. Trotzdem kann letzterer auch ab und zu gereicht werden. Ich glaube aber nicht, daß gerade durch diese Beigabe mehr erreicht wird als durch Hanf. Abgekochtes Wasser wäre nur zu reichen, wenn das Wasser der dortigen Wasserleitung nicht einwandfrei ist, sonst ist nichtabgekochtes Wasser vorzuziehen. Zuträglich ist abgekochte frische Kuhmilch als Getränk, die aber nicht verabreicht werden darf, wenn der Vogel Obst gefressen hat oder Obst erhält. Von Obst kann alles gereicht werden, was unverdorben ist, besonders Weinbeere, Apfel, Apfelsine. Zum Benagen würden besser statt Holz, ich nehme an, daß es sich um trockenes Holz handelt, frische Zweige von Obstbäumen, Birken, Linden, Nadelholzbäumen gereicht, von Kernfrüchten vor allem Walnuß. Wird der Vogel nach obigen Angaben ernährt, wobei das bisher gereichte Futter beibehalten werden kann und in guter frischer Luft bei größter Bewegungsmöglichkeit gehalten, so wird auch allmählich wieder normale Erneuerung des Gefieders eintreten. (Fortsetzung auf der 2. Umschlagseite).

Jahrgang 53 — 18. Dezember 1924 — Heft 44

DIE GEFIEDERTE WELT.

ZEITSCHRIFT FÜR VOGELLIEBHABER

Begründet von Dr. Karl Ruß

Herausgegeben von Karl Neunzig in Berlin-Hermsdorf

Inhalt:

Webervögel und Widafinken. Von A. Krabbe. (Fortsetzung u. Schluß.)
Ein Weihnachtserlebnis. Von Karl Finck, Neukölln.
Liebhabersorgen. Von J. Birk, Leipzig. (Fortsetzung.)
Vogelschau der Vereinigung der Vogelliebhaber, Landesverband Preußen. Von K. Neunzig. (Fortsetzung.)
Vom Vogelmarkt - Redaktionsbriefkasten - Bevorstehende Vogelschauen - Aus den Verbänden - Aus den Vereinen.

Abonnement monatlich (4 Nummern) 1.50 Gm. — Einzelpreis des Heftes 50 Gpf.
vermittelt das nächste Postamt bzw. der zuständige Briefbote. / Postversand ab Burg Bez. Magdeburg.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung / Magdeburg / Postschließfach 148

Bevorstehende Vogelschauen.

Verein für Vogelschutz und -pflege zu Dresden. Gegr. 1906. (Vormals Vereinigung der Vogelliebhaber zu Dresden.) Vom 20.—22. Dezember d. J. veranstaltet genannter Verein in dem Saale des „Italienischen Dörfchens", Dresden, Schloßplatz, die zweite Vogelschau. Dieselbe wird das Gebotene der ersten in den „Annensälen" 1923, welche dem Verein, vor allem in finanzieller Hinsicht, guten Erfolg brachte, um vieles übersteigen. Alle Vogelliebhaber sind herzlich willkommen.
J. A.: Bernhard Kühn, Vors.

Aus den Verbänden.

Vereinigung der Vogelliebhaber Landesverband Sachsen und Groß-Thüringen. Anläßlich der Dresdener Vogelschau, deren Besuch wir allen Liebhabern, denen an diesem Tage Dresden erreichbar ist, angelegentlichst empfehlen, wird der Vorsitzende des Landesverbandes die wertvolle Gelegenheit wahrnehmen, die anwesenden Mitglieder und Freunde unserer Vereinigung besonders zu begrüßen. Eine zwanglose Sitzung, deren Ort und Zeit dort zu erfahren ist, soll uns zusammenführen und das Band der Liebhaber festigen helfen. T. Hunger, Schriftführer.

Vereinigung der Vogelliebhaber Landesverband Preußen. Alle Vereine und Liebhaber, die unserem Verbande bereits angeschlossen sind, bitten wir an dieser Stelle nochmals, die restlichen Mitgliedsbeiträge unserem Kassierer Herrn Erich Merz, Berlin-Friedenau, Wilhelm-Hanff-Str. 141I, umgehend einzusenden. Vereine und Liebhaber, tretet unserem Verbande bei und unterstützt unsere gute Sache. J. A.: Erich Merz.

Verband deutscher Farben-, Gestalt-, Bastardkanarien- und Exotenzüchter und des Bayerischen Vogelliebhabervereins (e. V.) Sitz München, Ortsgruppe Augsburg. Jeden Samstag gemütliche Zusammenkunft beim Vogelwirt Joseph Leininger, Gasthof, Frohnhof—Peutingerstr. Jeden 1. Samstag im Monat Monatsversammlung ebendort. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. Als amtliches Vereinsorgan ist die „Gef. Welt" anerkannt worden.
J. A.: H. Schwaiger, 1. Vors., Augsburg, Schöpplerstr. 9/I.

Aus den Vereinen.

Angemeldet ist Herr J. Nater, Bukarest (Rumän.), Str. Biserica Ehei Nr. 9.

Infolge der mit der Zusammenstellung des Jahrbuches verbundenen Arbeiten ist es mir leider nicht möglich, alle Zuschriften sofort und so ausführlich zu beantworten, wie ich es gerne möchte, weswegen ich um Nachsicht bitte. A. Krabbe.

„Aegintha", Verein der Vogelfreunde zu Berlin. Sitzung jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat, abends 8 Uhr, im Vortragssaal des Aquariums. Fast in jeder Sitzung belehrende Vorträge und Besprechungen unter gütiger Mitwirkung unseres verehrten Ehrenmitgliedes Herrn Dr. Heinroth. Gäste gern willkommen.
J. A.: O. Vorbrodt, 1. Schriftf., O 112, Scharnweberstr. 18.

Vereinigung der Liebhaber einheimischer Vögel zu Berlin. Sitzung jeden 2. Donnerstag nach dem 1. und 15. des Monats im Vereinslokal zum „Alexandriner", Alexandrinenstraße 37a. Gäste stets willkommen.
J. A.: P. Böhme, Schriftf., O 17, Rüdersdorfer Str. 69.

Verein für Vogelkunde, -schutz u. -liebhaberei Cassel. Sitzung jeden 2. Montag im Monat im „Deutschen Haus" Frankfurter Str. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen.
J. V.: Emil Ivo, Schriftführer.

Alte Vereinigung der Vogelliebhaber zu Dresden. Versammlung jeden Freitag, abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Blasewitzer Hof". Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. J. A.: Matth. Meys, Schriftf.

Verein Vogelschutz u. -pflege zu Dresden. Versammlung jeden Donnerstag, abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Schillers Restaurant", Ecke Stifts- und Ehrlichstr. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. Bernhard Kühn, Vors.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei zu Hamburg. Sitzung jeden 1. u. 3. Dienstag im Monat in Hüttmanns Hotel, Poolstr. 22, abends 8¼ Uhr. Nächste Sitzung Dienstag, den 3. Januar 1925. Gäste sowie auch Exotenliebhaber stets willkommen. J. A.: Arnold Weber, 1. Vors.

Verein für Vogelschutz und -pflege Jena. Die Vereinsabende finden regelmäßig aller 14 Tage (Sonnabends) um 8 Uhr in der Wohnung des 1. Vorsitzenden, Herrn Jahn, Feodorastraße 7, statt. Jena besuchende Vogelfreunde treffen jeden Sonntag vormittag den Schriftführer, Feodorastraße 13 wohnhaft, an und sind zur Besichtigung von dessen Vogelstube herzlichst eingeladen.
A. Voigt, Jena (Ost), Feodorastraße.

Verein von Vogelfreunden Karlsruhe. Gegr. 1888. Monatsversammlung jeden 1. Mittwoch im Monat. Lokal „Goldener Adler".
Bang, 1. Vorstand. Boppel, 1. Schriftf.

Verein der Vogelliebhaber Königsberg (Pr.). Sitzung jeden Freitag nach dem 1. u. 15. d. M., abends 8 Uhr im Vereinslokal „Kaiser-Kaffee", Kaiserstr., Ecke Schnürlingsstr. Gäste sind willkommen. J. A.: Ernst Reinholdt, 1. Vors.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig. Vereinssitzungen jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat im Vereinslokal „Bauers Brauereirestaurant", Täubchenweg. Nächste Sitzung Donnerstag, den 18. Dezember Gäste stets willkommen.
Der Vorstand. J. A.: J. Birk, 1. Vorsitzender.

Verein der Vogelfreunde Leipzig-Plagwitz. Vereinslokal: „Gosenschlößchen", Leipzig-Plagwitz. Sitzungen an jedem 1. und 3. Montag des Monats, abends 8 Uhr. Vogelfreunde sind stets willkommen.
K. Scholtissek, 1. Vors., L.-Plagwitz, Lauchstädter Str. 30.



„Ornis", Freie Bezugs-Vereinigung der Waldvogelliebhaber Deutschlands. Gegründet 1912. Auf vielseitigen Wunsch der alten Mitglieder wollen sich die Waldvogelliebhaber wieder in der „Ornis" zusammenschließen. Als amtliches Organ ist die „Gef. Welt" ausersehen worden, und werden die Artikel, die früher in den „Ornis-Blättern" erschienen, in obiger Zeitschrift gebracht werden. Aus diesem Grunde bittet die Geschäftsführung um eifrige Mitarbeit, damit unserer Waldvogelpflege wieder der Platz eingeräumt wird, der ihr gebührt. Anmeldungen sind unter Beifügung von 2 M. an den Geschäftsführer zu richten; Mitglieder erhalten auf Mischfutterbestellungen 5% Rabatt. Mit treudeutschem Gruß Martin Sperling, Halle/S., Südstr. 49.

Verein der Vogelliebhaber zu Mannheim. Versammlung aller 14 Tage Samstag abend 8 Uhr im Vereinslokal „Restauration z. gold. Falken", S. 1. 17. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. J. Daubmann, 2. Schriftf.

Bayrischer Vogelliebhaberverein, Sitz München (E.V.). Jeden Samstag gesellige Zusammenkunft im Pschorrbräuhaus, Bayerstr. Jeden letzten Samstag im Monat Monatsversammlung im Vereinslokal ebendort. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. Rud. Engel, 1. Schriftführer.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -pflege zu Oschatz und Umgebung. Gegründet 1. Mai 1923. Vereinsabende aller vier Wochen, in der ersten Woche des Monats verbunden mit Vortrag, in der dritten Woche jeden Monats nur gesellige Zusammenkunft. Vereinslokal „Sächsischer Hof". Gäste stets willkommen. Studienrat Professor Jahn 1. Vorsitzender; Werkmeister Mann 2. Vorsitzender; kaufm. Angestellter Reinhardt Schriftführer.

Zoolog. Verein zu Zwickau i. S. Versammlung jeden Freitag nach dem 1. und 15. jeden Monats, abends 8 Uhr, im Restaurant „Zur Bleibe", Katharinenkirchhof. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen.
J. A.: Paul Schmidt, 1. Vors., Zwickau i. S., Bosenstr. 44.

Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Jahrg. 53 | Den 25. Dezember 1924 | Heft 45

(Druckort: Burg, Bezirk Magdeburg.)

Ein Weihnachtserlebnis.

Von Karl Finck, Neukölln.

(Schluß.) (Nachdruck verboten.)

Warm schien die Mittagssonne, auf den schneebeladenen Nadelholzbeständen lag ein wundersames, überirdisches Geflimmer, und über die Schneeflächen liefen bläuliche Lichtwellen. Geheimnisvoll rauschten die sturmerprobten Wetterfichten ihre uralte Melodie.

In meinem Herzen erwachte echte Weihnachtsstimmung, und ich feierte das Fest einsam im Walde nach meinem Geschmack.

Das Leben und Treiben der Wasseramsel war mir schon lange bekannt.

Im Tale blühten bereits die Frühkirschen, dufteten Veilchen, Goldlack und Hyazinthen. Aber in den Bergen hielt der Winter noch strenges Regiment. Schließlich zog der Frühling auch waldaufwärts. Schnell schmolzen die Schneemassen und aus jeder Felsspalte sprudelte der Segen. Die Lärchen schimmerten bald grünlich, überall nickten Schneeglöckchen, am Bache hingen die Erlen voll Kätzchen und unzählige Wildbienen umsummten die blühenden Salweiden.

Auf einem Reviergang fielen mir die Balzspiele der Gebirgsbachstelze auf, dabei bemerkte ich zufällig, daß in einer Bachbucht eifrig eine Wasseramsel zwischen Erlenwurzelgeflecht Nistmaterial eintrug. Das Männchen sang nun verhältnismäßig laut und vertrieb den immer wieder erscheinenden Rivalen.

Einige Wochen später beobachtete ich an einem frühen Sonntagsmorgen mehrere Stunden hindurch in guter Deckung das fütternde Pärchen. Fortwährend tauchten beide Vögel unter, oft bis auf den Grund. Wahrscheinlich bestand das Atzfutter vorwiegend aus Wasserinsekten.

Meine Beobachtungen teilte ich niemand mit, da der Pächter des Forellenwassers den Wasserstar und Eisvogel arg verfolgte.

Die Brut kam zu meiner Freude auch hoch. Die Jungen trieben sich den ganzen Sommer in der Nähe eines üppig bewachsenen Waldtümpels umher, wo sie, wie ich durch mein scharfes Glas sehen konnte, gewandt Libellen, die Kaulquappen des Taufrosches (Rana temporaria), Schwimmkäfer, Wasserläufer, Ruderwanzen und andere Insekten erbeuteten.

Die Wälder verklärten sich herbstlich, das Schwalbenvölkchen nahm Abschied und wehmutsvoll sangen überall Rotkehlchen. Das letzte Laub wirbelte von den Bäumen, dicke Nebel brauten oder brausende Stürme fegten über Berg und Tal. Jedoch die Wasseramsel blieb ihrem Standort treu, behielt Sonnenschein im Herzen, plauderte mit dem rauschenden Bächlein um die Wette und wollte von dem Winter nichts wissen. Erst als die Uferränder immer mehr vereisten, in den Bergen starkes Schneetreiben einsetzte, trennte sie sich singend von der lieben Heimat und wanderte nach dem geschützten Tale.

Die Wasseramsel, auch Wasserstar genannt, liebt schnellfließende Bergwässer, taucht geschickt unter, läuft am Grunde entlang, macht Jagd auf allerlei Wasserkerfe, verschmäht nicht einmal die schädliche Larve des großen Gelbrandkäfers, verspeist leider auch kleine Fische und Fischlaich.

In den Alpen und in manchen Mittelgebirgen ist der Wasserstar stellenweise wohlbekannt, kommt jedoch nirgends häufig vor, da selbst die Geschlechter außerhalb der Brutperiode gesondert leben und jedes Exemplar ein bestimmtes Gebiet allein beherrscht.

Das Nestchen befindet sich meistens in einer Höhlung, zwischen Steinen, im Geflecht bloßgelegter Baumwurzeln, und wird mit vier, fünf und sechs weißen Eierchen belegt.

Das ungemein emsig brütende Weibchen fliegt nur bei großer Gefahr weg. Die Elternliebe erlischt aber, sobald das Jungvolk halbwegs selbständig geworden ist. Auch das Paar trennt sich schnell. Der Einsiedlertrieb ist bei diesem Vogel überaus entwickelt.

Größeren Schaden verursacht die Wasseramsel jedoch nur da, wenn in ihrem Gebiete ruhige seichte Stellen vorkommen, wo sich mit Vorliebe die Fischbrut aufhält. Übrigens wird ihre Schädlichkeit, wie es auch bei dem Eisvogel der Fall ist, nach meinen Erfahrungen häufig sehr übertrieben.

Gedankenlos werden beide Vogelarten abgeschossen, dagegen läßt man die Larve des großen Gelbrandkäfers und die Wasserratte (Arvicola amphibius) unbehelligt, trotzdem dieses Gesindel viel junge Fische und Fischrogen vernichtet, weil eben die Bekämpfung erhebliche Schwierigkeiten bereitet.

Die Wasseramsel gehört zu den gesanglustigsten Vögeln, sie singt den ganzen Tag, Sommer und Winter.

Obwohl der Vogel stellenweise der Forellenzucht schädlich werden kann, so sollte man ihn doch und auch den Eisvogel, wenn es irgend angängig ist, schonen, da sie ungemein zur Belebung der Landschaft beitragen.

Bei starkem Frost sucht die Wasseramsel Mühlenausläufe, geschützte Teiche und sonstige offene, nicht zu tiefe Gewässer auf. Oft leidet das fröhliche Sonnenkind bitterste Not, verliert aber nie den Mut und plaudert sogar in der härtesten Zeit.

Leider ist der Wasserstar kaum für die Gefangenschaft geeignet. Alte Vögel toben unbändig, vergessen in der Aufregung ihr Gefieder einzufetten, durchnässen sich, wenn ihnen ein größeres Wassergefäß zur Verfügung steht, vollständig und trauern bald. Bessere Erfolge zeitigt die sogenannte trockene Eingewöhnung, wobei nur Trinkwasser gereicht wird.

Aufgepäppelte Nestlinge werden dagegen sehr zahm. Ein bekannter Forstwirt hielt in einer Gartenvoliere eine aufgezogene Wasseramsel und zwei Eisvögel. Die Verpflegung war jedoch derart umständlich und teuer, daß der Mann mit schwerem Herzen den Tieren wieder die Freiheit schenkte.

Ziemlich verspätet erreichte ich die Mühle. Der Müller schlug beide Hände zusammen, als er von meiner gefährlichen und beschwerlichen Exkursion hörte.

Die Rechnerei beanspruchte nur kurze Zeit, und ich verbrachte mehrere Stunden in Gesellschaft feinsinniger Menschen.

Heiter zog ich heimwärts, diesmal aber auf der bequemen Landstraße.

Und die hohe, weite Bergwelt glühte im Scheine der untergehenden Sonne.

Liebhabersorgen.

Von J. Birk, Leipzig.

(Schluß.) (Nachdruck verboten.)

Die Vögel sind in der Freiheit, ebenso wie in der Gefangenschaft von Schmarotzern befallen, die sich teils von dem Blute, teils von den Federn ernähren, so die Lausfliegen speziell auf Schwalben und Seglern, ferner die gemeine Hundszecke, auch Holzbock genannt, die sich mit Vorliebe an jungen Vögeln im Neste festsetzen, am häufigsten habe ich sie am Kopfe der Vögel vorgefunden, manchmal bis zu fünf Stück an einem Vogel. Auch Frischfänge habe ich schon erhalten, die ebenfalls am Kopfe mit Holzböcken behaftet waren. Nüchtern ist die Zecke bis 2 mm groß, während sie mit Blut vollgesogen bis zur Größe einer Erbse anschwellen kann. Zecken lassen sich beim Vogel sehr leicht mittels einer Pinzette entfernen, man verhindere aber ein gewaltsames Abreißen des Kopfes, welches sehr leicht geschieht, indem sie nicht loslassen, wenn sie sich angesaugt haben. Um sie zum Loslassen zu bewegen, soll man sie mit Benzin oder Öl betupfen, denn wenn der Kopf abreißt und stecken bleibt, entstehen für den Vogel schmerzhafte Entzündungen. Welcher Naturforscher, der im Walde durch dick und dünn kriecht, hätte nicht schon selbst diese Blutsauger an seiner eigenen Haut zu sitzen bekommen. Diese Schmarotzer sind nur am freilebenden Vogel, ebenso wie die Lausfliegen, zu finden. Man untersuche zwecks Feststellung von Zecken die Frischfänge; mancher wird es für eine Geschwulst am Kopfe, besonders in den Schnabelwinkeln halten, in Wirklichkeit sind es aber Zecken, die sich in die Haut gebohrt und vollgesogen haben. Entfernt man einen derartigen Schmarotzer, so bleibt ein ganz ansehnliches Loch in der Haut, das sich bald wieder schließt. Zum Glück finden wir diesen Schmarotzer nur auf freilebenden Vögeln, die dieselben als Frischfang mit in den Käfig bringen. Ein weiterer Schmarotzer unserer freilebenden und gefangenen Vögel ist der Federling, auch Federlaus genannt, die eine Länge von 1 mm haben, blaßbraun sind und am Hinterleib braune, weißpunktierte Seitenflecke haben. Diese lästigen Schmarotzer sind die ärgsten Zerstörer des Vogelgefieders, sie verzehren mit Vorliebe die Strahlen der Federfahne und verursachen ein krankhaft aussehendes Gefieder. Befallen werden von ihnen alle Vogelarten, am häufigsten aber sollen sie bei Finken und Ammern vorkommen. Der lästigste Parasit am Vogel ist und bleibt aber die Vogelmilbe, die, wenn der Pfleger kein sehendes Auge für sie und ihre Schlupfwinkel hat, in ganz kurzer Zeit den Liebhaber zur Verzweiflung bringen kann, besonders wenn er sie aus Unkenntnis oder Lauheit überhand nehmen läßt in seinen Käfigen. In ganz kurzer Zeit wird der von ihnen befallene Vogel merklich matter, nachdem er, wenn bereits im Gesange, denselben eingestellt hat. Er verliert sein glattes anliegendes Gefieder. Wird auch diese gewaltige Veränderung im Benehmen und Gefieder des Vogels vom Pfleger noch nicht bemerkt, so zerstören die Milben nach und nach das Gefieder, indem sie an den Stellen, wo sie am liebsten sitzen, kahle Stellen verursachen, bis endlich eines Tages, der bis zur Herausgabe der letzten Blutstropfen gequälte Vogel, von seiner Marter durch den Tod erlöst wird. Dies ist nur die Schilderung, wie diese bis zu 1 mm großen Blutsauger wüsten und vernichten können, die vollgesaugt wie rote Pünktchen aussehen. Bei einem Vogelliebhaber mit Pflicht- und Verantwortungsgefühl kommen wohl auch Milben an seinen Vögeln vor, aber niemals darf er sie aufkommen lassen, diese Seuche, die schon manchem Vogelpfleger die Lust und schon vielen Käfigvögeln das Leben genommen haben. Da gilt es vor allem, praktische Käfige zu haben, ohne Ritzen und Fugen, um diesen Schmarotzern und ihrer Brut keine Schlupfwinkel zu bieten, denn leichter, ja, viel leichter ist es, etwa aufkommende Milben, die sich sofort durch die, wie weiße kleine Kalkspritzer aussehenden Kotpünktchen verraten, im Keime zu ersticken, als total vermilbte Vögel, Käfige und Zimmerwände wieder vollständig milbenfrei zu bekommen. Bei den Weichfressern tritt die Milbenplage selten oder fast nie zutage, hingegen wer Kanarienvögel, Finkenvögel und Lerchen oder Wachteln mit in seinem Vogelbestand eingereiht hat, wird, da diese Arten ganz besonders von Milben geplagt werden, gar bald finden, daß auch seine Weichfresser ein begehrtes Objekt dieser Blutsauger sind. Vermilbte Vögel singen nicht, sitzen am Tage apathisch da, weil sie müde und abgespannt sind durch die fehlende Nachtruhe und den Blutverlust. Meistens

zeigt es sich auch sofort, wenn ein Vogel von Milben geplagt wird, durch sein fortwährendes Herumsuchen und Nesteln im Gefieder, besonders wenn man abends die Vogelstube plötzlich erleuchtet. Dieser fortwährende Kampf zur Vernichtung und Fernhaltung der Milben aus seinem Vogelbestande ist wohl die größte Sorge, die der Liebhaber kennt. Wer sie noch nicht kennt, diese Quälgeister von Pfleger und Pfleglingen, der braucht nur eine Voliere mit Finken und Ammern zu bevölkern und dabei nicht ständig auf die Milbenjagd zu gehen, da wird er sein blaues Wunder erleben, denn es ist ungeheuer, wie schnell und in welchen Mengen sich die Milben vermehren. Man soll also ständig Ausschau nach auftretenden Milben halten. Zeigt sich am Käfig der weißliche Kot der Milben oder gar eine wie grauer flaumiger Staub aussehende Schicht, so ist es höchste Zeit, den Kampf aufzunehmen. Will man ganz sicher gehen und sich von dem Vorhandensein der Milben überzeugen, so braucht man nur mit dem Finger über die verdächtige Stelle zu fahren, es wird sich ein widerlicher Geruch bemerkbar machen. Wie bekämpft man aber am erfolgreichsten Milben? Nun, wenn jemand nichts unversucht gelassen hat, so war ich es, aber auch vieles habe ich wieder als nicht radikal genug beiseite gelassen. Ausschwefeln des Käfigs in einer fest verschlossenen Kiste ist gut, tötet wohl die Milben, aber nicht deren Brut, ausbrühen der Käfige ist wohl das beste und radikalste, aber nur bei Heckkäfigen, Nistkästen und Einsatzbauern durchführbar, niemals aber bei einem mit solidem Farben- oder Firnißanstrich versehenen lackierten Käfig, wie wir sie in unserem Bestand haben. Was nützt es, wenn ich auf der einen Seite wohl die Milben, aber auch gleichzeitig die Schönheit meines Käfigs vernichtet habe. Also weiter, Benzin, Spiritus, alles nichts, tötet wohl, aber verfliegt zu schnell mit halbem Erfolge, Lysol, Lysoform*) hinterläßt einen länger anhaltenden widerlichen Geruch im Zimmer, Öl ist ebenfalls nichts, nun bleibt mir nur noch Petroleum, und das habe ich heute noch in Bereitschaft, wenn sich bei meinen Lerchen und Finken eine Milbe sehen läßt. Petroleum ist ein wirkliches Radikalmittel, vernichtet Milben und deren Brut und hinterläßt keinen zu nachhaltigen Geruch, ebenso schadet es keinem Käfiganstrich. Selbstverständlich muß alles, Sitzstangen, alle Ritzen und Fugen im Käfig und an der Wand damit bearbeitet werden, gleichzeitig muß aber auch der Käfiginsasse einer durchgreifenden Prozedur unterzogen werden, am besten ist es, wenn das Gefieder von hinten mittels einer Spritze mit gutem persischem Insektenpulver bestäubt wird, aber so, daß dem Vogel nichts davon in Augen und Schnabel kommt. Um dieses zu verhindern nimmt man am besten ein Blatt Papier in runder Form in der Größe einer Kaffeeuntertasse, macht in der Mitte ein kleines Loch, so daß der Kopf des Vogels hindurchgeht. Durch diesen Schutzkranz am Halse des Vogels kann kein Insektenpulver in Augen und Nasenlöcher des Vogels gelangen. Habe ich einen kräftig ernährten Vogel vor mir, so tut ein sachgemäß verabreichtes lauwarmes Seifenwasserbad ebenfalls sehr gute Dienste, um den Vogel von Milben zu reinigen. Will man eine Radikalsäuberungskur der Vögel und Käfige vornehmen, so tut man dies niemals am Abend, sondern stets am Tage, wenn die Milben in ihren Schlupfwinkeln und nicht auf Wanderung und am Vogel sind;

Wasserschmätzer.

denn steckt man bis zur Reinigung des Käfigs den Vogel in einen anderen Käfig, so wird auch dieser vermilbt. Niemals verwende man den in einem vermilbten Käfig befindlichen Sand aufs neue, ohne ihn gesiebt und außerordentlicher Hitze im Ofen ausgesetzt zu haben; denn im Sande sind Milben und deren Brut vorhanden. In einem mit Petroleum ausgepinselten Käfig kann der Vogel nach seiner erfolgten Reinigung sofort ohne Nachteile wieder eingesetzt werden. Wer sich durch diese Hauptsorge des Vogelpflegers nicht der Verzweiflung nahe bringen lassen will, sei auf dem Posten und er wird seine Vögel für die Dauer von den lästigen Quälgeistern verschont halten. Aber leider wird durch Nachlässigkeit gar manchen Vogelhalters sehr viel gesündigt, indem er seine Vögel, anstatt sie zu hegen und zu pflegen, hilflos dem enorm anwachsenden Heer der

*) Das ist bei Lysoform nicht der Fall. N.

blutgierigen Quälgeister preisgibt. Wer Freude und einen Herzensgenuß an einer Schar gefiederter, sangesfroher Stubengenossen haben will, muß mit der Parole: „Tod und Vernichtung ihren Schmarotzern!" seiner Liebhaberei leben.

Verursacht die Eingewöhnung der Frischfänge von Weichfressern mit Mehlwürmern und frischen Ameisenpuppen dem Kundigen wenig Sorgen, so ist dies um so mehr der Fall bei der Eingewöhnung von Körnerfressern. Bei diesen gibt es, wenn nicht sachgemäß verfahren, die meisten Verluste, die ich wiederum nur auf den plötzlichen Wechsel des Futters zurückführe. Am fühlbarsten gestalten sich die Verluste bei jungen Herbstwildfängen, die bis zu ihrer Gefangennahme sich in der Hauptsache von weichen, halbreifen Sämereien ernährt haben. Und nun der plötzliche Umschwung zum hartschaligen Körnerfutter. Diese harten Sämereien verursachen den jungen Vögeln Schwierigkeiten beim Bearbeiten mit dem Schnabel, sie sind nicht in der Lage, die nötige Nahrungsmenge zu sich zu nehmen, und die Folge davon ist eine Schwächung der Verdauungsorgane, Verfall der Körperkräfte, und das Ende sind Todeskandidaten. Sehr zweckdienlich ist es daher, jungen Hänflingen und Stieglitzen bei der Eingewöhnung halbreife Sämereien mitzureichen, ebenso auch das Körnerfutter vor dessen Darbietung in Wasser zu erweichen und hernach zwischen einem Tuche trocken zu reiben. Selbstverständlich kann nebenbei auch in einem gesonderten Näpfchen hartes Körnerfutter mitgereicht werden, um die Vögel mit daran zu gewöhnen. Vor allem ist es auch ebenso nötig wie bei der Weichfressereingewöhnung, auch den frisch gefangenen Körnerfressern ständige Ruhe zu gewähren, denn je mehr sie durch im Zimmer anwesende Personen geängstigt werden, um so weniger nehmen sie sich Zeit zum Fressen und werden matt durch ungenügende Nahrungsaufnahme. Die Eingewöhnung von Frischfängen eingehend behandelt, bedeutet als Sorge des Liebhabers ein Kapitel für sich, was hier zu weit gehen dürfte.

Wer als Vogelliebhaber richtig kennen lernen will, was die gefiederten Lieblinge für Sorgen bereiten können, befasse sich mit Aufzucht und dem Päppeln von Nestjungen. Aber so sorgen- und mühevoll diese Geduldsarbeit ist, so viel Freude bringt sie auch dem die Elternstelle vertretenden Pfleger. Nur wer viel Zeit am Tage besitzt, oder zur regelmäßigen Fütterung der stets hungrigen Schreihälse eine gleichgesinnte Gattin als Assistentin zur Seite hat, kann es wagen, an die Aufpäppelung von Nestlingen zu denken. Man muß es durchgemacht haben mit verschiedenartigen Nestjungen, dann kann man ein Lied singen von sorgenvollem Leid, aber auch von unbeschreiblicher Freude als Pflegevater solch hilfloser Geschöpfe. Will man darüber reden, so erfordert dies eine ausführliche Arbeit für sich, für die hoffentlich auch bald Zeit werden soll.

Um den Liebhabersorgen die Krone aufzusetzen, muß die Überwinterung, speziell unserer zarten Weichfresser und Wintermauserer, in diese Arbeit mit hineingezogen werden, denn der volle Erfolg bei der Pflege der zarten Weichfresser entsteht durch eine wohlgelungene Überwinterung mit glatter Mauser und einsetzendem Gesang. Erst dann zeigt es sich, wie ein Liebhaber als Vogelwirt einzuschätzen ist. Nicht an seinen Worten, sondern an seinen Taten erkennt man den umsichtigen, mit Kenntnissen arbeitenden Liebhaber; spricht man auch von Sorgen der Überwinterung, so stellt nach meinem Empfinden die Überwinterung selbst den alten Praktiker immer wieder vor ein neues Examen; und hat er von neuem bestanden, so stellt dies wohl einen beruhigenden, zufriedenen Moment dar im Jahreskreislauf des Liebhabers. Wenn ich einen Liebhaber besuche und mich an seiner Vogelschar weide, schätze ich ihn wohl nur nach vorhandenem edlem Material ein, aber erst nachdem ich die Käfiglebensdauer seiner edlen Sachen erfahren habe, denn nicht die große Anzahl der Vögel seines Bestandes, nicht noch so schön glatt im Gefieder prangende Frischfänge, können mir eine große Achtung vor seinem Pflegertalent abringen — nein — nur eine öftere Überwinterung seiner Pfleglinge stellt ihn mir in die Reihe des praktischen und erfahrenen Vogelwirtes.

Die Beschaffung von einwandfreiem Futter bereitet vielen Vogelliebhabern, besonders denen in kleineren Orten ohne eine fachmännisch geführte Vogelfutterhandlung, sehr viel Sorgen. Für den Großstadtvogelliebhaber ist wohl auch die Kriegszeit mit ihrer Futternot noch in schrecklicher Erinnerung. Doch, wie heute die Verhältnisse liegen, braucht er sich um seinen Bedarf an wirklich erstklassigem Futter nicht mehr zu sorgen, anders hingegen der auf dem flachen Lande wohnende Liebhaber. Dieser tut am besten, um der berechtigten Sorge, wie wird die nächste Futtersendung ausfallen, auf längere Zeit enthoben zu sein, wenn er sich gleich, soweit es seine Verhältnisse gestatten, einen, längere Zeit ausreichenden Vorrat zulegt. Zum Glück gibt es jetzt wieder sehr brauchbare Universalfutter wie das Heidelberger, sowie das Hallesche von Sperling usw., und der Liebhaber ist, in regelmäßiger Geschäftsverbindung mit diesen Herstellerfirmen, den Futtersorgen enthoben. Wer die Zeit dazu hat und mehr Einfluß auf die qualitive, sowie quantitive Futterzusammensetzung und -verabreichung haben will, tut natürlich am besten, er kauft sich die Bestandteile zu einer einwandfreien Selbstzusammenstellung seines Weichfutters, wie getrocknete Ameisenpuppen, Weißwurm, Fleischgarnelen, gemahlenen Zwieback oder weiße Semmel, Hanf und frischen Quark oder Weißkäse gleichfalls in größeren Vorrat, letzteren selbstverständlich nur immer frisch und er wird dabei gut und billig fahren. Über eine sachgemäße individuelle Fütterung hier zu reden, würde zu weit gegriffen sein im Rahmen dieser Arbeit, doch soll diesem wichtigsten Thema der Vogelliebhaberei in nächster Zeit ebenfalls eine gründliche Besprechung gewidmet werden.

Die Krankheiten unserer Stubenvögel sind ebenfalls nicht die wenigsten, und deren Heilung verursacht dem Pfleger ebenfalls sorgenvolle Stunden. Zum Glück habe ich in meiner Praxis noch nicht viel mit Krankheiten zu kämpfen gehabt, doch zieht man sie alle in Betracht die vorkommen, so liegt klar auf der Hand, daß sich der Liebhaber diesem Kapitel mit Eifer widmen muß. Die Heilung der meisten Vogelkrankheiten ist eine sehr schwierige, wenigstens bei vielen, solange bis man die richtige Diagnose aufgestellt hat. Ist dies der Fall und

wird die Krankheit gleich in ihrem Anfangsstadium bemerkt, so verspricht eine sachgemäße Behandlung einigermaßen Erfolg, vorausgesetzt, daß es sich nicht um unheilbare Leiden handelt. Leider sind verschiedene Krankheiten so tückisch, daß sie erst erkannt werden, wenn bereits eine Heilung ausgeschlossen ist. Wenn ich offen sein will, muß ich sagen, daß ich von einer Kur bei schweren Erkrankungen, wie Lungentuberlose, Diphtheritis, Lungenentzündung mit gleichzeitiger Darmentzündung, Typhus, sowie Leber- und Milzkrankheiten gar nichts halte, denn eine Heilung ist ausgeschlossen, man versucht nur dem Todgeweihten Linderung zu verschaffen. Am besten ist es für den leidenden Vogel, er wird durch einen schnellen Tod allen weiteren Qualen enthoben. Da derlei Krankheiten sehr leicht übertragbar sind auf noch gesunde zu schützen, vermeide man jegliche Zugluft, besonders sei man mit der Verabreichung von zu kaltem Trink- und Badewasser sehr vorsichtig, besonders kurz vor Beginn der Nachtruhe. Hat sich wirklich ein Vogel noch vor dem Dunkelwerden vollends durchnäßt, so ist es unbedingt nötig, den Käfig noch so lange zu beleuchten, bis sich der Vogel durch Bewegung und Putzen des Gefieders wieder vollends getrocknet hat. Auch bei Krankheiten der Stubenvögel gilt das wahre Wort: „Verhindern ist leichter als heilen", und wie schon gesagt, bildet in meiner Liebhaberpraxis das Kapitel Krankheiten keine allzu sorgenvolle Begleiterscheinung. Sterben müssen wir alle einmal, so auch die Stubenvögel, und da jeder Tod seine Ursache haben muß, so kann es den Liebhaber weiter nicht befremden, wenn nach der Käfigung von einer Reihe

Vogelschau der Vereinigung der Vogelliebhaber Landesverband Preußen,
die mit dem 1. Preis ausgezeichneten Vögel des Herrn Max Dähnick (s. S. 343)

Vögel, so ist eine Isolierung des Patienten sowie eine Desinfektion des Käfigs unbedingt nötig, dies soll auch bei den meisten Krankheiten der Fall sein, da von den meisten eingegangenen Vögeln nur durch die Sektion von einem Arzt die einwandfreie Todesursache festgestellt werden kann. Wiederum gibt es auch eine Anzahl leichterer Erkrankungen, wie Verstopfung, Durchfall, Verdauungsstörungen, Katarrh durch Erkältung, Schnupfen, sofern er nicht chronisch ist, Abzehrung sowie Fettsucht zur richtigen Zeit erkannt, Geschwüre, Wunden, Brüche, Fußkrankheiten usw., die Erfolg auf Heilung versprechen. Die meisten Krankheiten sind die Folge von Erkältung sowie Verdauungsstörungen, darum richte der Pfleger sein Hauptaugenmerk auf eine sachgemäße Fütterung in leicht verdaulicher Form. Der beste Thermometer zur Prüfung der richtigen Fütterung und Verdauung ist die Entleerung eines Vogels, sie sagt dem Pfleger, wie er sein Futter in dieser oder jener Richtung beeinflussen muß. Um den Vogel vor Erkältungen

von Jahren der Tod diesen oder jenen Vogel hinwegrafft und dadurch in den Bestand langjährig gekäfigter Vögel eine Lücke reißt. Leider muß ich auf dem Standpunkt stehen bleiben, daß in der Beförderung von gekäfigten Vögeln auf den Weg alles Sterblichen sehr viel Schuld auf dem Gewissen oberflächlich arbeitender Vogelliebhaber lastet; Wissen und Können halten vielfach mit der verantwortungsvollen Käfigung weichlicherer Vögel meistens nicht gleichen Schritt. Hat ein Vogelliebhaber erst das nötige Verantwortungs- und Pflichtgefühl gegenüber dem ein Stückchen Natur versinnbildlichenden Vogel, so geht er vor der Anschaffung eines Vogels erst mit sich ins Gewissen, ob er das Zeug als Pfleger hat, um auch diese Art in der Käfigung zu meistern. Tut er dies, so wird er sich manche sorgenvolle Stunde in seiner Liebhaberpraxis ersparen, und wird mit große Verluste bringenden Krankheiten weniger zu kämpfen haben. Alles Wissenswerte über die Krankheiten unserer Stubenvögel und deren Heilung hier zu erwähnen,

ist nicht der Zweck dieser Arbeit, es soll nur ein Aufmerksammachen sein auf die Sorgen des Vogelliebhabers. Wer sich aber über die Krankheiten unserer Stubenvögel und deren Heilung eingehend unterrichten will, dem sei die vorhandene Fachliteratur empfohlen. Vor allem behandelt dieses Thema sehr eingehend und gewissenhaft das bekannte Liebhaberwerk: „Einheimische Stubenvögel", von Karl Neunzig.

Wenn ich nun heute unter dem Thema: „Liebhabersorgen" die eventuell sich bemerkbar machenden Widerwärtigkeiten in der Vogelpflege kurz beleuchtet habe, so ist der Zweck dieser Zeilen nicht der, das letzte erschöpfende Wort darüber zu sprechen, sondern der Sinn dieser, aus dem Herzen eines Liebhabers kommenden Plauderei sei der, neben den Freuden der Vogelhaltung auch auf den Ernst derselben hinzuweisen, das Pflicht- und Verantwortungsgefühl zu wecken, welches sich aus der Inanspruchnahme des Rechtes der Vogelhaltung von selbst ergeben muß.

Vogelliebhaber, prüft nach dem Lesen dieser wohlgemeinten Zeilen eure Liebhabervergangenheit, ob ihr, wenn die Sorgen an euch herantreten, auch alles nach bestem Wissen und Können getan habt, um das Los der unter eurer Verantwortung gefangen gehaltenen Vögel stets so zu gestalten, daß euer Gewissen von Schuld frei sein kann. Wer Vögel richtig pflegen will, wer als ein wirklich wahrer Vogelliebhaber gelten will, hat noch lange nicht seine Pflicht getan, wenn er kein Opfer zur Beschaffung von gutem Futter scheut, nein, er muß auch das Wissen und Können sich anzueignen versuchen, durch Lesen von Fachliteratur, Fachzeitschriften, oder, wenn möglich, durch Zugehörigkeit zu einem Liebhaberverein. Hat er diesen nicht am Orte, so muß er, um ein vollwertiges Glied im Zusammengehörigkeitsgefühl der deutschen Vogelliebhaber zu werden, organisiert sein in dem für ihn zuständigen Landesverband oder wenn nicht möglich, letzten Endes Mitglied werden in der Zentralorganisation, dem Reichsverband der deutschen Vogelliebhaber.

Darum, gleichgesinnter Anhänger unserer schönen edlen Sache, betrachte und bezeichne diese tief im deutschen Volksgemüt schlummernde, über alles erhabene Liebhaberei nicht mit dem kalten, unsere Liebhaberei entehrenden Wort: „Sport", sondern beherzige und freue dich, daß du auch einer derjenigen, leider wenigen bist, die im Buche der Natur zu lesen verstehen, und die die Stimmen derselben durch den Chor der gefiederten Sänger zu hören als Freude und inneres Bedürfnis empfinden.

Wer meine Worte nicht als Moralpredigt hinnimmt, sondern als gutgemeinte Worte im Interesse unserer gefiederten Lieblinge, hat den Zweck derselben erfaßt. Es war nur die dringend notwendige Ausschüttung eines übervollen Liebhaberherzens.

Von der Vogelschau der Vereinigung der Vogelliebhaber Landesverband Preußen.

Vogelschau der Vereinigung der Vogelliebhaber, Landesverband Preußen.

Von K. Neunzig.

(Schluß.) (Nachdruck verboten.)

In ansprechenden und zweckmäßigen Käfigen waren die einheimischen Sänger, welche Heinrich Taft zur Schau stellte, untergebracht, während unsere Körnerfresser, Wellensittiche, Prachtfinken, kleine Weber, Widafinken und die häufigen, eingeführten kleinen ausländischen Girlitze in geräumigen Käfigen sich ausgiebig bewegen konnten.

Von guter Sachkunde zeugend war die Unterbringung und das Äußere der Vögel, welche Fritz Sterling-Berlin zur Ausstellung gebracht hatte. Die außen grün, im Innern weiß gestrichenen guten Insektenfresserkäfige brachten ihre Insassen voll zur Geltung. Unter den Weichfressern wurde die Identität eines „Nachtigallrohrsängers" stark bestritten. Unter den auf der Ausstellung herrschenden Verhältnissen, der starke Andrang usw., war es auch nicht angängig, eine genaue Bestimmung des Vogels vor-

zunehmen. Neben den Hauptvertretern unserer „Sängerfürsten" war ein braunkehliger Wiesenschmätzer, Dorngrasmücke, Rotrückenwürger, Gartenrotschwanz, Misteldrossel vorhanden, sodann ein Eichelhäher und ein Steinkauz, ferner die heimischen Finkenvögel.

Die Firma Wenig-Berlin hatte in sauberen Käfigen einige Sänger und einen Eichelhäher, in verschiedenen Gesellschaftskäfigen heimische und ausländische Körnerfresser und Wellensittiche ausgestellt. Auch der einzige auf der Ausstellung vorhandene Nymphensittich war von Wenig ausgestellt.

B. Kapstein (in Firma G. Behnke) hat eine schöne Kollektion heimischer und fremdländischer Sänger in weißen Käfigen ausgestellt, von denen eine Schamadrossel, ein Sonnenvogel, wiederum als „chinesische Nachtigall" firmiert, Sprosser, Nachtigall, Garten- und Sumpfrohrsänger, verschiedene Grasmücken, Heckenbraunelle, Baumpieper, Feld- und Heidelerche hervorzuheben sind. Von Ausländern dieses Ausstellers wären noch zu nennen Zebratäubchen, eine schöne Gelbnacken- und eine Bahiaamazone.

Ernst Schöndube-Berlin hatte als Spezialist für die kleinsten heimischen Vögel einen Gesellschaftskäfig mit Goldhähnchen und Zaunkönig ausgestellt, in welchem sich diese Zwerge unter unseren Vögeln munter tummelten. Daneben sah man einen Raubwürger, die deutschen Grasmücken mit Ausnahme der Sperbergrasmücke, Blaukehlchen, Wiesen- und Baumpieper und eine Alpenlerche. Unter den von Schöndube ausgestellten Finken befand sich ein Kirschkernbeißer. Als Seltenheiten zeigte derselbe Aussteller einen auf S. 268 der Gef. W. geschilderten Orangehaubenkakadu und einen Glockenvogel.

Nowotny stellte neben Finkenvögeln und einer Schamadrossel einen schönen Amselalbino aus.

In guten holzfarbenen Käfigen waren nicht gerade Seltenheiten, aber durchgehends recht gute Vögel von Bernhard Schmidt-Neukölln zur Schau gestellt. Unter den heimischen befanden sich Zaun- und Dorngrasmücke, unter den fremdländern Dominikanerkardinäle.

Recht umfangreich und reich an Arten war das, was Paul Tzornack-Berlin darbot. In der Reihe der in sachgemäßen Käfigen untergebrachten heimischen Sänger sahen wir neben Mönch- und Sperbergrasmücke auch die Orpheusgrasmücke, unter den Lerchen die Kalanderlerche. Sonst wären noch in dieser Gruppe zu nennen das zurzeit schwer erreichbare Steinrötel, Rotrückenwürger, Blaukehlchen und Seidenschwanz. Deutsche Wachteln waren in größerer Anzahl vorhanden, aus der Gruppe der Rabenvögel eine Elster. Unsere Finkenvögel bevölkerten einen großen Gesellschaftskäfig, ein anderer Käfig dieser Art zeigte die augenblicklich auf dem Vogelmarkt vorhandenen kleineren ausländischen Körnerfresser, von denen der Zwergmaskenweber, Maskenamandinen, Bronzemännchen, und der mexikanische Karmingimpel besonders zu erwähnen sind. Glanzstare verschiedener Arten und ein roter Kardinal, sowie einige schöne Gestaltskanarien zogen die Aufmerksamkeit der Besucher auf sich. Reich an Zahl und Art war auch, was Tzornack an Papageien gebracht hatte. Da sah man von den Schmalschnäblern Gras-, Tovi- und Kanarienflügelsittiche, daneben den dickschnäbligen Mönchsittich, Sperlingspapageien, Wellensittiche und die schönen tarantinischen Bergpapageien. Unter den größeren Papageien fielen neben Gelbkopf-, Gelbnacken-, eine Blaubartamazone und ein Käfig mit drei schönen Weißbauchpapageien auf.

In der „Abteilung für Vogelzucht und -pflege", die gleichfalls sehr reichhaltig war, sah man allerlei Nistvorrichtungen, Futtermittel, Käfige und allerlei Gegenstände, deren der Vogelpfleger bedarf. Die Käfigherstellung ist wieder auf voller Höhe. Unser „alter", immer noch rüstige und jugendfrische Paul

Pitpit.

Schindler, stellte seine lange entbehrten „Idealkäfige" wieder her, Adolf Manecke zeigte die in den Kreisen der Liebhaber sehr geschätzten Flug- und Papageienkäfige. Ein sehr schön ausgeführter Flugkäfig gab dem Hersteller Gelegenheit, einige neue Vorrichtungen anzubringen, unter denen besonders die Anbringung von Rollen unter der großen Käfigschublade von praktischem Werte ist. Das teilweise Überziehen der Falltüren der Voliere mit Gummischlauch, um das Geräusch beim Herabfallen der Türen zu verhindern, dürfte, wenigstens mit Rücksicht auf die gesunden Nerven der Insassen der Voliere, kaum nötig sein. Über einige andere Neuheiten zu sprechen, wird sich später Gelegenheit bieten. Die „Heidelberger Käfige" und „das Heidelberger Vogelfutter" erregten das lebhafte Interesse der Besucher. Die Abteilung „Literatur" war von der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung, Magdeburg, reich beschickt. Die bis jetzt vorhandenen Vogelliebhaberzeitschriften lagen in zahlreichen Probeheften aus, die willige Abnehmer fanden. Gut beschickt war auch die Abteilung „Vogelschutz". Neben

...ngöhlen sah man ...nachbare Vorrichtungen zur ...darunter auch solche, welche den ...gt leicht gefährlich werden können, weil ...s Futter in ihnen gar zu leicht verdirbt. Auch in dieser Abteilung war die Literatur gut vertreten. Eine Gruppe von Haar- und Federwild, Feinde unserer Singvögel, und eine Sammlung von Nestern der märkischen Ornis hatte der rührige Herr Paul Böhme ausgestellt. —

Die ganze Veranstaltung muß als außerordentlich gelungen bezeichnet werden. Bei dem regen Interesse der außerordentlich großen Besucherzahl wird sie reiche Früchte tragen.

Kleine Mitteilungen.

Ausstellung des Vereins von Vogelfreunden, Karlsruhe. Am Samstag, dem 6. und Sonntag, dem 7. Dezember, hielt der Verein von Vogelfreunden im Friedrichshof seine diesjährige Ausstellung ab, die einen glänzenden Besuch aufwies. Der Saal war durch geschickte Hand in einen förmlichen Palmen- und Lorbeerhain verwandelt, in dem die sauberen Käfige und größeren Volieren mit ihren geflügelten Insassen eine geschmackvolle Aufstellung fanden. Neben unserem gelben Hausfreund, dem Kanarienvogel, war fast die gesamte deutsche Kleinvogelwelt vertreten und in besonders großer Zahl die Ornis der fremden Weltteile vom großen Ararapapagei bis zum kleinsten Prachtfinken, die in allen Farben leuchteten. Rasch war der Glückshafen vergriffen und ebenso schnellen Absatz fanden die Verkaufsvögel. Auch der hiesige Stadtgarten ließ sich die Gelegenheit nicht entgehen, die schönsten und seltensten Schaustücke dieser gefiederten Edelsteine zur Schau für die Besucher des Tiergartens anzuwerben. Zum Schluß sei noch des prächtigen Bildes gedacht, das die Samenhandlungen Frohmüller (Klasterer) und Weiß (Stoll) boten, durch die ebenso reichhaltige wie geschmackvoll arrangierte Ausstellung aller Arten von Vogelfutter, Käfigen und sonstigen Utensilien zur Pflege und zum Schutz der Vögel im Freien und im Zimmer. Die zum Teil sehr kostbaren Ehrenpreise und Medaillen waren von den Ausstellern vollauf verdient.

Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber (E. V.) Sitz Leipzig.

1. Vorsitzender Joh. Birk, Leipzig-Mockau, Beuthstr. 29; Geschäftsstelle: Rudolf Petters, Leipzig-Probstheida, Preußenstr. 31; Kassierer Werner Geßler, Leipzig, Dresdner Str. 2; Tauschvermittlung — T.-V. —: Richard Vorwerk, Leipzig-Lößnig, Merveldstr. 39.

An unsere Vereine und Einzelmitglieder.

In sehr spärlicher Weise gehen die Verbandsbeiträge ein und beeinträchtigen die Geschäftsführung des Verbandes ganz ungemein. Ist es den Vereinsvorsitzenden nicht möglich, die 30 Pfg. Verbandsbeitrag pro Mitglied und Jahr aufzutreiben? Oder fehlt es am nötigen Verständnis für das Wesen und den Nutzen eines Verbandes? Das ist doch unmöglich, wenn der Wert der 30 Pfg. an der erfolgreichen Verbandsarbeit gemessen wird.

Der Reichsverband ist noch jung, er braucht unbedingt die dem Einzelnen auferlegten 30 Pfg. Beitrag. Die schönen Erfolge wären sicher noch erfreulicher als sie an sich schon sind, wenn wenigstens jeder Verein und jedes Einzelmitglied seinen geringen Beitrag geleistet und der Verband damit arbeiten könnte. So fehlt es nicht nur an vielem, sondern an allem. Der Verband hat bisher fast ausschließlich nur mit der außerordentlich einsichtsvollen Unterstützung einzelner Vereine gearbeitet. Das kann aber doch keinesfalls so weitergehen. Jeder Verein, jedes Einzelmitglied möchten wir darauf hinweisen, daß es erste sittliche Pflicht ist, seine zu ihm stehende Organisation zu unterstützen, wo und wie es nur geht. Solange das aber nicht anders wird, müssen wir, so bedauerlich und unangenehm das ist, an alle diejenigen, die ihren Verband hochhalten und gehalten haben, die Bitte richten, uns weiterzuhelfen, damit das gute Vorwärtskommen nicht aufgehalten wird.

Einen Verband einzurichten und in geordneter Weise zu führen, das wollen sich alle klar sein, kostet Geld. In dieser Erkenntnis baten wir die Gesamtheit unserer Mitglieder um Unterstützung, die außerhalb der Beitragsleistung und im Ermessen jedes einzelnen liegt. Und wie leicht könnte uns geholfen werden. Wenn jedes Mitglied außer seinem Beitrag nur 10 Pfg. extra spendete, ergebe das eine Summe von 200 Mk. und unsere Sorgen hätten wir los.

Ist das in den Vereinen und bei den Einzelmitgliedern nicht durchführbar? Bei gutem Willen gewiß. Lassen Sie sich nicht betteln und verschließen Sie sich den bitteren Tatsachen nicht.

Wer schnell gibt, gibt doppelt.

J. A.: Petters, 1. Schriftführer.

Vom Vogelmarkt.

Von seltener auf dem Vogelmarkt kommenden Vögeln werden angeboten:

W. Barth, Göttingen, Zindelstr. 6: Girlitzbastard × Kanarie.

Jos. Beck, Stuttgart: Dottergelbweber, Taxtorweber, Tigerfinken, Safranfinken, Stieglitz × Zeisig-Bastarde, Braunstärling, Steinsperlinge, Zitron-Zeisig, Rabenkrähe.

Alfred Fichtner, Leipzig-Oetzsch: 1,1 Braut-Enten, 1,1 Mandarinen-Enten.

A. Petermann, Glauchau (Sachsen), Theaterstraße 53: Stieglitz-Kanarien.

Ernst Scheide, Osnabrück, Spindelstraße 18b: Fingerzahmer Steinkauz.

E. Stümcke, Vegesack (Br.), A.-Z.-Mitglied 258: 2,0 Kampfläufer (Totanus pugnax).



Herrn G. B., Münster a. St. Die Züchtung von Wellensittich ist wiederholt in freien Volieren auch in recht kalten Wintern gelungen. Die neueren Erfahrungen sind dieser Art der Züchtung weniger günstig. Man hat schlechte Erfahrungen damit gemacht. Wiederholt litten die Weibchen an Legenot, in andern Fällen ließen sie die Jungen erfrieren usw. Ich kann demnach nicht zu einem derartigen Versuch raten und empfehle mehr, die Züchtung in einem geschützten Raum vorzunehmen.

Herrn J. F., Ornismitgl. 332, Herrn H. H., A.-Z. 332, Herrn S. L., Berlin, Herrn A. V., Jena, Herrn Fr. M., Bamberg, Herrn A., Hamburg, Herrn Dr. W., Bad Salzbrunn, Herrn Dr. L., Hamburg. Beiträge dankend erhalten.

Herrn G. K., Berlin. Der Sonnenvogel ist infolge einer schweren Darmentzündung eingegangen. Wodurch diese entstanden und ob sie heilbar gewesen wäre, ist nicht mit Bestimmtheit zu sagen.

Herrn J. H., Fulda, ist brieflich Bescheid zugegangen.

Herrn E. St., Quelle. Der Hersteller des fraglichen Futters war mir nicht bekannt. Um den Hersteller des Futters, das Sie im Gebrauch haben, handelt es sich nicht. Dieses Futter ist einwandfrei. Vermutlich ist das Schwarzplättchen zu fett. Wenn das der Fall ist, so lassen Sie Rosinen und Feigen im Futter fort und füttern möglichst knapp. Apfel kann reichlich gegeben werden. Es ist natürlich nicht möglich, auf die kurzen Angaben hin, zu sagen, warum der Vogel nicht singt und was geschehen muß, damit er in Gesang kommt. Aber es ist wahrscheinlich, daß sein Fettzustand kein normaler ist.

Herrn B., Fulda. Der Magellanzeisig litt an Darmentzündung in Verbindung mit Abzehrung. An der Stirn, da wo der Schnabel ansetzt, befand sich eine hirsekorngroße Balggeschwulst. Die Augenlider waren entzündlich geschwollen. Falls der Vogel erst einige Tage im Besitz des Fragestellers war, als er einging, ist es wohl unzweifelhaft, daß er schon beim Vorbesitzer krank war.

(Fortsetzung auf der 2. Umschlagseite.)

Jahrgang 53 — 25. Dezember 1924 — Heft 45

DIE GEFIEDERTE WELT.

ZEITSCHRIFT FÜR VOGELLIEBHABER

Begründet von Dr. Karl Ruß

Herausgegeben von Karl Neunzig in Berlin-Hermsdorf

Inhalt:

Ein Weihnachtserlebnis. Von Karl Finck, Neukölln. (Schluß.)
Liebhabersorgen. Von J. Birk, Leipzig. (Schluß.)
Vogelschau der Vereinigung der Vogelliebhaber, Landesverband Preußen. Von K. Neunzig. (Fortsetzung.)
Kleine Mitteilungen - Reichsverband der deutschen Vogelliebhaber (e. V.) Sitz Leipzig - Vom Vogelmarkt - Redaktionsbriefkasten - Aus den Verbänden - Aus den Vereinen.

Abonnement monatlich (4 Nummern) 1.50 Gm. — Einzelpreis des Heftes 50 Gpf.
vermittelt das nächste Postamt bzw. der zuständige Briefbote. / Postversand ab Burg Bez. Magdeburg.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung / Magdeburg / Postschließfach 148

Aus den Verbänden.

Vereinigung der Vogelliebhaber Landesverband Preußen. Alle Vereine und Liebhaber, die unserem Verbande bereits angeschlossen sind, bitten wir an dieser Stelle nochmals, die restlichen Mitgliedsbeiträge unserem Kassierer Herrn Erich Merz, Berlin-Friedenau, Wilhelm-Hanff-Str. 14II, umgehend einzusenden. Vereine und Liebhaber, tretet unserem Verbande bei und unterstützt unsere gute Sache. J. A.: Erich Merz.

Verband deutscher Farben-, Gestalt-, Bastardkanarien- und Exotenzüchter und des Bayerischen Vogelliebhabervereins (e. V.) Sitz München, Ortsgruppe Augsburg. Jeden Samstag gemütliche Zusammenkunft beim Vogelwirt Joseph Leininger, Gasthof, Frohnhof—Peutingerstr. Jeden 1. Samstag im Monat Monatsversammlung ebendort. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. Als amtliches Vereinsorgan ist die „Gef. Welt" anerkannt worden. J.A.: H. Schwaiger, 1. Vors., Augsburg, Schöpplerstr. 9/I.

Aus den Vereinen.

„Aegintha", Verein der Vogelfreunde zu Berlin. Sitzung jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat, abends 8 Uhr, im Vortragssaal des Aquariums. Fast in jeder Sitzung belehrende Vorträge und Besprechungen unter gütiger Mitwirkung unseres verehrten Ehrenmitgliedes Herrn Dr. Heinroth. Gäste gern willkommen. J. A.: O. Vorbrodt, 1. Schriftf., O 112, Scharnweberstr. 18.

Vereinigung der Liebhaber einheimischer Vögel zu Berlin. Sitzung jeden 2. Donnerstag nach dem 1. und 15. des Monats im Vereinslokal zum „Alexandriner", Alexandrinenstraße 37a. Gäste stets willkommen. J. A.: P. Böhme, Schriftf., O 17, Rüdersdorfer Str. 69.

Verein für Vogelkunde, -schutz u. -liebhaberei Cassel. Sitzung jeden 2. Montag im Monat im „Deutschen Haus", Frankfurter Str. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. J. V.: Emil Ivo, Schriftführer.

Alte Vereinigung der Vogelliebhaber zu Dresden. Versammlung jeden Freitag, abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Blasewitzer Hof". Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. J. A.: Matth. Meys, Schriftf.

Alte Vereinigung der Vogelliebhaber zu Dresden. Am Bußtag, dem 19. November, fand im „Herzog Albrecht" der von Dr. Floericke gemeldete Vortrag statt. „Wanderjahre eines Naturforschers" lautete das Thema. Der Vortragende schilderte seine Reise durch Österreich-Ungarn, die Balkanstaaten, Rußland über den Kaukasus nach dem Persischen Meer. Er erzählt von dem großen Fischreichtum im Kaspischen Meer, von den dort lebenden Vögeln, die in solchen Mengen vorkommen, daß stellenweise kein Wasser zu sehen wäre. Von der Gefräßigkeit des Pelikans berichtet er, daß ein Vogel dieser Art täglich 3—4 kg Fische verzehre, daß aber trotzdem der Fischreichtum der dortigen Gewässer nicht abnehme. Ferner sprach er von schädlichen und nützlichen Vögeln. Der schädlichste sei der Hühnerhabicht, der nützlichste die Schwalbe, daß aber im Haushalt der Natur das Nützliche mit dem Schädlichen sich ausgleiche. Weiter folgen wir im Geiste dem Vortragenden über das Kaspische Meer in die Wüste. Die Wüste ist einförmig, aber von hohem Wert. Die Tierwelt sei sehr interessant. Der Vortragende schilderte nebenbei die Sitten und Gebräuche der Wüstenbewohner. Der Schilderung spannender Erlebnisse lauschten die Zuhörer. Immer weiter westlich, folgen wir dem Vortragenden nach Arabien und Marokko. Auch von hier werden Land, Leute und die Tierwelt geschildert. Der Araber sei ein großer Tierfreund. Es gebe hier Unsummen von Störchen. Auf jedem Haus seien zwei bis drei Nester. Die Vögel seien sehr zahm und laufen auf den Marktplätzen unter den Leuten einher. Nach mehrjähriger Abwesenheit kommt Vortragender wieder über Italien und Steiermark in sein liebes deutsches Reich. Kein Florenz, kein Venedig hat ihn gehalten, so groß war die Sehnsucht nach deutschem Wald und Boden. Wenn er auch auf seiner Reise viel Schönes und Interessantes gesehen und erlebt habe, so sei das alles nicht zu vergleichen mit den Reizen der deutschen Heimat, des deutschen Waldes mit seinem herrlichen Vogelgesang. Ferner erwähnte Dr. Fl. noch eine Reise in die Dobrutscha. Seltene, schöne Vogelarten seien hier anzutreffen. Vortragender schildert die Sturzflüge des Kuttengeiers. Hier befinden sich große Felder von beinstarkem Rohr in Mannshöhe, auf welchen sich zahlreiches Raubwild und viele Vögel aufhielten. Reiher und Pelikan sind hier zahlreich vorhanden. Zum Schluß erwähnt Vortragender noch den 24 Tausend Morgen großen Naturschutzpark in der Lüneburger Heide, einen anderen in Süddeutschland, ein dritter in Schlesien sei in Vorbereitung. Er bittet die Anwesenden, dem Naturschutzparkverein beizutreten. Die Anwesenden dankten Herrn Dr. Floericke durch lebhaften Beifall für seinen lehrreichen Vortrag. J. A.: Horst Frohberg.

Verein Vogelschutz u. -pflege zu Dresden. Versammlung jeden Donnerstag, abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Schillers Restaurant", Ecke Stifts- und Ehrlichstr. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. Bernhard Kühn, Vors.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei zu Hamburg. Sitzung jeden 1. u. 3. Dienstag im Monat in Hüttmanns Hotel, Poolstr. 22, abends 8¼ Uhr. Nächste Sitzung Dienstag, den 3. Januar 1925. Gäste sowie auch Exotenliebhaber stets willkommen. J. A.: Arnold Weber, 1. Vors.

Verein für Vogelschutz und -pflege Jena. Die Vereinsabende finden regelmäßig aller 14 Tage (Sonnabends) um 8 Uhr in der Wohnung des 1. Vorsitzenden, Herrn Jahn, Feodorastraße 7, statt. Jena besuchende Vogelfreunde treffen jeden Sonntag vormittag den Schriftführer, Feodorastraße 13 wohnhaft, an und sind zur Besichtigung von dessen Vogelstube herzlichst eingeladen. — Die Versammlung am 13. Dezember war von 14 Mitgliedern besucht. Der Vereinsbeitrag wurde auf 1 Mark vierteljährlich festgesetzt. Über den Artikel des Bundes für Vogelschutz in Koburg entspann sich eine lange Debatte. Es soll dieser Ansicht in einem Artikel in der Tagespresse entgegengetreten werden. Der Schriftführer berichtete über die Berliner Vogelschau, die er besichtigt hat. Für die vom Verein aufgestellten Futterhäuschen soll aus der Vereinskasse Hanf beschafft werden. Die nächste Versammlung findet in vier Wochen statt, es soll dazu auch schriftlich eingeladen werden. A. Voigt, Schriftführer.

Verein von Vogelfreunden Karlsruhe. Gegr. 1888. Monatsversammlung jeden 1. Mittwoch im Monat. Lokal „Goldener Adler". Bang, 1. Vorstand. Boppel, 1. Schriftf.

Verein der Vogelliebhaber Königsberg (Pr.). Sitzung jeden Freitag nach dem 1. u. 15. d. M., abends 8 Uhr im Vereinslokal „Kaiser-Kaffee", Kaiserstr., Ecke Schnürlingsstr. Gäste sind willkommen. J. A.: Ernst Reinholdt, 1. Vors.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig. Vereinssitzungen jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat im Vereinslokal „Bauers Brauereirestaurant", Täubchenweg. Nächste Sitzung Donnerstag, den 8. Juni 1925 Gäste stets willkommen. Der Vorstand. J. A.: J. Birk, 1. Vorsitzender.

Verein der Vogelfreunde Leipzig-Plagwitz. Vereinslokal: „Gosenschlößchen", Leipzig-Plagwitz. Sitzungen an jedem 1. und 3. Montag des Monats, abends 8 Uhr. Vogelfreunde sind stets willkommen. K. Scholtissek, 1. Vors., L.-Plagwitz, Lauchstädter Str. 30.

„Ornis", Freie Bezugs-Vereinigung der Waldvogelliebhaber Deutschlands. Gegründet 1912. Auf vielseitigen Wunsch der alten Mitglieder wollen sich die Waldvogelliebhaber wieder in der „Ornis" zusammenschließen. Als amtliches Organ ist die „Gef. Welt" ausersehen worden, und werden die Artikel, die früher in den „Ornis-Blättern" erschienen, in obiger Zeitschrift gebracht werden. Aus diesem Grunde bittet die Geschäftsführung um eifrige Mitarbeit, damit unserer Waldvogelpflege wieder der Platz eingeräumt wird, der ihr gebührt. Anmeldungen sind unter Beifügung von 2 M. an den Geschäftsführer zu richten; Mitglieder erhalten auf Mischfutterbestellungen 5% Rabatt. Mit treudeutschem Gruß Martin Sperling, Halle/S., Südstr. 49.

(Fortsetzung auf der 3. Umschlagseite)

Graupapagei

Für zahle 40000 ℳ, Amazonen 15000 ℳ, Wellensittiche 1500 ℳ per Stück, wenn fehlerlos, franko Stuttgart, ohne Anfrage sofort per Nachnahme senden. — Ferner zahle für Kanarienhähne 6000 ℳ, -weibchen 500 ℳ, Stieglitze, Zeisige, Dompfaffen, alle Arten exotische Vögel und Sittichar ten. Anfrage gegen Marke.

Beck, Tierimport, Stuttgart. [22

Für Liebhaber.

Sammlung Ia. ausgestopfter einheimischer Waldvögel, annähernd 50 Stück, große und kleine, in einem schönen Holzkasten 127×64×32, eine Etage, vorn Glas, zum Aufhängen geeignet, gegen Höchstgebot zu verkaufen. Angebote unter C. D. 200 an die Geschäftsstelle der „Gefiederten Welt". [23

1 ♀ kleiner

Kubafink

1 ♀ braunbuntes

Mövchen

suche ich dringend im Tausch zu erwerben und gebe für beide Vögel 1♂ prachtvollen Elfenastrild franko geg. franko. Sende nicht zuerst. Referenz: Creutzscher Verlage Dringende Angebote erbeten unter **„Reeller Tausch"** an die Geschäftsstelle der „Gefiederten Welt". [24

Suche zu kaufen:
Erlen- u. Birkenzeisige ♂,♀, Stieglitze ♂,♀, Bluthänflinge ♂,♀, Grünfinken ♂,♀, Dompfaffen ♂,♀, Buchfinken ♂,♀, Schwarzplättchen, Rotkehlchen, Nachtigallen, Garten- und Zaungrasmücken. [25
Siegfried Hill. Rostock, Werftstr. 45.

Kaufe: Fed. Sprungstangen u. Futtergefäße mit mehreren Abteilungen. [26
Siegfried Hill, Rostock, Werftstr. 45.

2 Paar Wellensittiche,

blutsfremd, zu tauschen gegen **größeren Papagei.**

Angeb. erbeten unt. „Papagei" an die „Gefiederte Welt". [27

Kaufe

sofort ein blutfremdes **Zuchtpaar Wellensittiche.** [28

Angebote an **Jos. Diederich, Esch a. Alzette,** Oterstr. 47 (Luxemburg).

Wellensittiche gesucht!

Liebhaber sucht 2—3 Paar grüne tadellos befiederte Tiere, vollkommen ausgewachsen. [29

Höchster Preis wird gezahlt.
Ed. Albrecht, Duisburg, Hansastraße **26, part.**

Papageien
und Käfige

dazu nur I a Tiere mit guten Eigenschaften, suche im **Tausch** gegen seltene ornitholog. Literatur Angebote mit genauen Beschreibungen erbittet

Rolf Kretschmann
i. Fa.: Creutz'sche Verlagsbuchhandlung
Magdeburg
30] Postschließfach 148.

Zeisig, Stieglitze, Dompfaffen

(Männchen), gesunde schöne Vögel, bezahle per Stück 500 Mark. Angebote mit Stückzahl. [31

Beck, Tierimport, Stuttgart.

Kaufe allerlei Papageien,

Wellensittiche, Tauben, Fasanen, Parkgeflügel, Harzer u. Kanarien-Hähne u. -Weibchen, exotische Vögel, kleinere Säugetiere, Reptilien, Amphibien und Zierfische samt Mehlwürmer und Futter.

H. Verner-Lassen, Kopenhagen (Dänemark)
Kongensvg. 14, II. [32

Liebhaber sucht für eigenen Bedarf:

1,1 Dompfaffen,	0,1 Zitronenzeisige,
1,0 Zeisig,	1,1 Heckenbraunellen,
0,1 Girlitze,	1,1 Leinzeisige,
1,0 Bluthänfling,	1,1 Bachstelzen,

1,1 Schwarzköpfchen

und bittet um Angebot. [33

Max Kriegeskorte,
Stuttgart-Hedelfingen.

Wir kaufen laufend zu konkurrenzlos höchsten Preisen:

Kanarienhähne und -weibchen

sowie alle Arten **Sing-** und **Ziervögel,** speziell **Seltenheiten,** als **Sumpf-** und **Wasserläufer, Blaukehlchen, Sprosser, Steinrötel, Blaudrosseln, Bienenfresser, Schwarzplatten, Stieglitze, Zeisige, Exoten aller Art, Papageien.** [34

Kühn & Muschter, Borna b. Leipzig,
Käfigfabrik und Vogelhandel en gros und en detail
Import. **Export.**
Anfragen Rückporto beifügen.

Wellensittiche,

[35

junge, gesunde Ware, bezahle pro Stück 2500.— Mk.
Bitte um Angabe der Stückzahl ohne Rückporto.
Beck, Tierimport, Stuttgart.

Lebender Steinkauz

zu kaufen gesucht. [36
Severin Niegemann, Köln-Sülz, Aegidiusstraße 52.

Nachtigall, Frühjahrsfang 22, tadellos vermausert, schon wieder halblaut, gegen Meistgebot zu verkaufen oder auch zu vertauschen.
Frohn, Horst-Emscher. [37

Suche 1,2 Kanarien, beste Hohlroller, oder 1,1 Wellensittiche, blutsfremd. Gebe dafür „Brockhaus, Kleines Konversationslexikon", 5. Aufl., 2 Bde, je ca. 1000 Seiten stark, noch wie neu. Wert ca. 20000 ℳ. Zahle evtl. zu. **E. Weigelt,** [38
Weigmannsdorf b. Lichtenberg i. Erzgeb.

Tausche

1,2 weiße Zwergwyandotten (Stamm Rust) gegen leicht züchtbare Prachtfinken oder 1,1 gar. zuchtf. Wellensittichpaar. [39
F. Reck, Sulingen i. Hannover.

Liebhaber sucht zu höchstem Preis zu kaufen erstkl. Zuchtp. v. Zebrafinken, jap. Mövchen u. and. leicht brüt. Exoten. Zahle 7000 ℳ pro Paar u. mehr je nach Art, müssen ab. gar. gute Zuchtpaare sein.
Bernd Regge, Lötzen (Ostpr.). [40

Gegen Gebot abzugeben

oder Tausch auf Jagdwaffen:
Marschall, Zoologie der Vögel, geb., Bade, Mitteleuropäische Vögel, geh., Flöricke, Der Vogelliebhaber, geb., Tümler, Vogelleben, geb., Flöricke, Säugetiere fremder Länder, geh., Schmid, Liebe und Ehe im Tierreich, geh., Neunzig, Gefiederte Hausfreunde, geh., Schlag, Der Dompfaff, geh., Flöricke, Papageienbuch, geh., Reichenow, Die Kennzeichen der Vögel Deutschlands, geh., Schmidt, Deutschlands Raubvögel, geb., Sokolowsky, Genossenschaftsleben der Säugetiere, geb., Sokolowsky, Gesammelte Aufsätze zool. Inhalts, geh., Ellis, Im Spinnenland, geh., Israel, Plaudereien und Vortrage ü. Vertreter aus der heimatlichen Tierwelt, geh., Dombrowsky, Der Jäger und Forstmann als Sammler und Präparator, geb., Herrmann, Nutzen und Schaden d. Vögel, geb. Sämtliche Bücher sind wie neu und gut erhalten. Bei Anfragen Rückporto beifügen. [41
Curt Nürnberger, zool. Präparator, Mühlhausen i. Thür., Obermarkt 9.

Verkaufe gegen Gebot folgende Seltenheiten:

Handbuch der Naturgeschichte aller Vögel Deutschlands von Christian Ludwig Brehm, 2 Bände, mit 47 ganz treu und sorgfältig nach der Natur gezeichneten farbigen Kupfertafeln, gebunden, Ilmenau 1831 (nicht unter 10000 ℳ); **Gefangene Vögel,** von A. E. Brehm, Erster Teil, Zweiter Band: Weichfresser, brosch. (nicht unt. 1500 ℳ); **Gefiederte Welt,** Jahrg. 1897, gebunden (nicht unter 3000 ℳ); **1 Sammlung ausgestopfte Vögel** in feinem Wandschrank mit Verzierung, 95 cm breit, 75 cm hoch, 23 cm tief, fourn. bestes Holz, mottensicher, mit Glasscheibe in der Tür (85×60 cm), herrlicher Zimmerschmuck, gute, v. erstkl. Ornithologen u. Präparator gefertigte Stopfpräparate; **Inhalt der Sammlung:** 1 Pennantsittich, 2 Rosella, 1 Bartmeise, 1 Rotflügelsittich, 1 Königssittich, 1 Orangeweber, 1 Reisvogel, 1 Paradieswitwe (Männchen in Pracht), 2 Senegalvögel, 1 Dompfaff, 1 gelber Wellensittich, 1 Rebhuhn, 1 grauer Kardinal, 1 Nachtigall, 1 Star, 1 Rosakakadu, 1 Zwergwachtel, 1 Schopftaube, 1 Paar Schopfwachteln, 1 Eisvogel, 1 Graudrossel, 1 gr. Wellensittich, alt, 1 desgl. jung, 1 dtsch. Wachtel, 1 Bachstelze, 1 Pirol, 1 Grauköpfchen, 1 chin. Nachtigall, 1 Nönnchen — außen wie innen fachgemäß ausgestattet, zum Aufhängen — (nicht unter 150000 ℳ). — Porto und Verpackung immer zu Käufers Lasten.
Ernst Schmidt, Leipzig-Sellerh., Wurzener Str. 195. [42

Suche zu kaufen zu höchstem Preise

(zahle in belgischen Franken. Voreinsendung des Betrages bei der Geschäftsstelle der „Gefiederten Welt"):

verschiedene ♂ und ♀ **Schneeammer, Spornammer, Zwergammer, Zipp- oder Bartammer, Zaun- oder Zirlammer, Grauammer, Schneefink, Linden-, Fichten- und Kiefernkreuzschnabel, Hakengimpel, Karmingimpel** (Carpodacus erythrinus), **Großer Gimpel, Girlitz, Berghänfling** (Acanthis flavirostris), **Zitronenzeisig, Kirschkernbeißer, Rosenstar, Ringdrossel, Stein- und Blaudrossel und Seidenschwanz.**

Genaue Angebote mit Preisangabe an [43

J. Van Baeten, 21, Rue Basse Ville, Courtrai (Belgien).

Bitte!

In eigenem Interesse wollen die pp. Einsender beachten, daß

a) **alle für die Redaktion** der „Gefiederten Welt" bestimmten **Zuschriften** (Sprechsaal-Anfragen und -Antworten, Vereinsnachrichten usw.) und **Sendungen** (tote Vögel, Manuskripte) nur an **Herrn Karl Neunzig, Hermsdorf bei Berlin,** Neue Bismarckstr.,

b) **alle Bestellungen** auf **Abonnements, Inserate** und dergl. Geschäftliches nur an die **Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg,** Postschließfach 148,

zu richten sind.

In der Zeit vom

2. Oktober bis 28. Februar

ist der An- und Verkauf wie das Feilbieten von **in Europa einheimischen Vögeln — mit Ausnahme der Meisen, Kleiber, Baumläufer und Spechte** — zulässig, es können daher in dieser Zeit derartige Inserate in der „Gefiederten Welt" zum Abdruck gelangen! Der Insertionspreis für die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum beträgt vom 1. Januar 1923 an **10** Mark. Aufträge erbeten an

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg.
Postschließfach 148.

Klatt, Bastard v. Stieglitz u. Kanarienvogel. Selt. Schrift! Tausche g. Rübsen, Mohn o. Glanz. Angeb. u. „Klatt" an die Geschäftsstelle der „Gef. Welt". [44

Tausche Die fremdl. Stubenvögel von Karl Neunzig, geb., fast neu, geg. 4 Paar japanische Mövchen oder andere Prachtfinken. [45
Alfred Klaus, Seifhennersdorf 179.

Gebe ab

1,0 Rotkehlchen, Ia Sänger, für 1000 ℳ, 2,0 Schwarzköpfe, Ia, à Stück 2000 ℳ, junge Lachtauben à Stück 600 ℳ. In Tausch nehme Ia Sprosser, Steinrötel, Sperbergrasmücke. Ins Ausland 2000 ℳ mehr. [46
Pfarrer **Schwabe**, Großenbehringen b. Gotha.

Inserate

für das am 18. Januar 1923 zur Ausgabe gelangende Heft 2 der Gefiederten Welt erbitten bis 12. Januar 1923 früh.

Der Insertionspreis beträgt für die viergespaltene Nonpareillezeile od. deren Raum 10 M.

Ornithologische Monatsschrift

Jahrg. 1907, geb. oder ungeb., 47] zu kaufen gesucht.
Erich Bothfeld, Berlin N., Wildenowstr. 2, v. 4.

Verkaufe Naumann Bd. I, II, III, IV u. V. Tausche auch gegen gebr. Fahrrad. Ferner gebe ich ab Liebe, Ornithol. Schriften, Bechstein, Stubenvögel, Brehm, Gef. Vögel Bd. II. Tausche evtl. gegen ♂ Zuchtkanarien. **Karl Edel,**
Würzburg, Augustinerstr. 13. [48

Empfehlenswerte Bücher

Preis und Lieferbarkeit freibleibend!

Für Aquarienfreunde.

Praxis der Aquarienkunde. Aus der Praxis für die Praxis. Von Dr. E. Bade. 4. u. 5. Auflage. Mit 1 Farbentafel, 12 Schwarzdrucktafeln und 203 Textabbildungen. Kart. 2880.— M.

Katechismus für Aquarienliebhaber. Fragen und Antworten über die Einrichtung, Besetzung und Pflege des Süßwasser-Aquariums sowie über Krankheiten und Züchtung der Fische. Von Wilh. Geyer. 6. von Hans Geyer besorgte Auflage. Vergriffen! Neue Auflage in Vorbereitung!

Zimmer- und Freiland-Aquarienpflanzen. Von Mönkemeyer. Mit 26 Abbildungen. Kart. 864.— M.

Der Schleierschwanz und der Teleskopschleierschwanz, ihre Zucht, Pflege und die Beurteilung ihres Wertes. Von Dr. E. Bade. Mit 5 Schwarzdrucktafeln und 19 Textabbildungen. Geh. 720.— M.

Die künstliche Fischzucht. Von Dr. E. Bade. Mit 2 Schwarzdrucktafeln und 16 Textabbildungen. Geh. 720.— M.

Das Seewasser-Aquarium, seine Einrichtung, seine Bewohner und seine Pflege. Mit einem Anhange: Das Brackwasser-Aquarium. Von Dr. E. Bade. Mit 1 Farbentafel, 14 Schwarzdrucktafeln u. 104 Textabbildungen. Kart. 2880.—, geb. 4320.— M.

Für Terrarienfreunde.

Deutschlands Amphibien und Reptilien. Eine Beschreibung und Schilderung sämtlicher in Deutschland und den angrenzenden Gebieten vorkommenden Lurche u. Kriechtiere. Von Bruno Dürigen. Mit 12 Farbentafeln und 47 Textabbildungen. Gebunden 14400.— M.

Praxis der Terrarienkunde. Terrarium und Terra-Aquarium. Von Dr. E. Bade. Vergriffen! Neue Auflage in Vorbereitung!

Katechismus für Terrarienliebhaber. Fragen und Antworten über Einrichtung, Besetzung und Pflege des Terrariums. Von Hans Geyer. Vergriffen! Neue Auflage in Vorbereitung!

Das Terrarium, seine Einrichtung, Bepflanzung und Bevölkerung. Von Hermann Lachmann. Mit 5 Vollbildern und 87 Textabbildungen. Geheftet 2160.— M.

Für Hundefreunde.

Gebrauchs- und Luxushunde. Von Emil Ilgner. 2. Aufl. mit 87 Abbildungen im Text. Kart. 2160.— M.

Für Entomologen.

Bau's Schmetterlingsbuch. Zum Selbstbestimmen aller in Deutschland, Österreich, Ungarn und der Schweiz vorkommenden Groß- sowie der vorzugsweise gesammelten Klein-Schmetterlinge. Mit 67 Textabbildungen. Kartoniert 2880.— M.

Bau's Käferbuch. Zum Selbstbestimmen der in Deutschland, Österreich-Ungarn und der Schweiz vorkommenden Koleopteren. Mit 144 Textabbildungen. Kartoniert 2880.— M.

Der Käfer- und Schmetterlingssammler. Anleitung zur Herstellung und Handhabung der beim Fange, der Zucht und dem Präparieren von Käfern, Schmetterlingen und Raupen als geeignet bewährten Geräte, sowie zur Anlage und Erhaltung von Insektensammlungen. Von Karl Wingelmüller. Mit 32 Abbild. Geh. 1080.—, gebd. 1620.— M.

Schädlinge und Nützlinge der Kleintierwelt. Ein Lehrbuch für jedermann von Prof. Dr. L. Glaser. Mit 85 Textabbildungen. Kart. 2160.— M.

Für Kaninchenzüchter.

Wirtschaftskaninchen, ihre Pflege und Züchtung. Von Karl Neunzig. Mit 26 Abbildungen im Text. 432.— M.

Sport- und Schlacht-Kaninchenzucht. Ein Handbuch zur Beurteilung, Pflege und Zucht aller Rassen von P. Waser. 2. Auflage. Mit 40 Abbildungen im Text. 1440.—, gebunden 2160.— M.

Kaninchen-Rassen. Illustriertes Handbuch zur Beurteilung der Kaninchenrassen, deren Behandlung, Zucht, Verwertung und Krankheiten. Von Tiermaler J. Bungartz. 2. Aufl. mit 1 Farbentafel und 22 Textabbildungen. Geheftet 1440.—, gebunden 2160.— M.

Farbige Kaninchenbilder. Naturwahre Aquarelldrucke von 18 verschiedenen Kaninchenrassen von J. Bungartz. 1440.— M.

Für Auslandslieferungen: Nach dem hochvalutigen Ausland 200% Zuschlag. Nach dem mittelvalutigen Ausland 120% Zuschlag.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg

Postscheckkonto: Magdeburg 3148 Postschließfach 148

Graupapagei

Für zahle 40 000 ℳ, Amazonen 15000 ℳ, Wellensittiche 1500 ℳ per Stück, wenn fehlerlos, franko Stuttgart, ohne Anfrage sofort per Nachnahme senden. — Ferner zahle für Kanarienhähne 6000 ℳ, -weibchen 500 ℳ, Stieglitze, Zeisige, Dompfaffen, alle Arten exotische Vögel und Sitticharten. Anfrage gegen Marke.

Beck, Tierimport, Stuttgart. [70

Suche Jungtiere

2,0 u. 0,2 **Wellensittiche, zahle pro Stück 3—4000 M.,** ferner **suche 1,1 Dompfaffen, zahle 3000 M.,** 0,2 Kanarien, gesund u. kräftig entwickelt, zahle pro Stück 900 ℳ Preisangeb. an

E. Richter,
Bernstadt i. Sa., Croggasse.
71] A. Z. Mitgl. 235.

Kaufe ein zuchtfähiges

Nymphensittich-Weibchen,

tausche event. gegen 1,0 desgl. oder Wellensittiche. [72
E. Stümcke, Vegesack (Bremen).

Ia Sprosser evtl. auch Ia Nachtigall

sofort zu kaufen gesucht. Preisangeb. an
J. Stiefel, Stuttgart,
73] Leonberger Str. 86.

Suche

1,1 Jap. Möwchen zu kaufen. Gebe auf Wunsch Exotenfutter in Tausch. Habe auch für andere Exoten Interesse, speziell Seltenheiten. [74
Werte Angebote erbeten an die Ges. Welt unter **„Kaufgesuch"**

Suche zu kaufen:

1 Rotkehlchen ♂, **1 Schwarzplättchen** ♂, prima Sänger. Angeb.
75] mit Preis an
Rechtsvertreter Walter Klepzig,
Leipzig-Anger-Crottendorf,
Herbartstraße 3.

Suche zu kaufen in garant. erstkl. Zuchtpaaren u. zahle p. Paar für

Jap. Möwchen M. 10000
Zebrafinken „ 11000
Wellensittiche „ 12000

u. andere leichtbrütende Exoten zu noch
76] höheren Preisen.
Bernd Regge, Lötzen (Ostpr.).

0,1 Gürtelgrasfink

zu kaufen oder gegen andere bessere Exoten zu tauschen gesucht, ev. auch 1,1.
77] **Otto Lindwig,**
Halle a. d. S., Merseburger Str. 20.

Papageien und Käfige

dazu, sowie

zahme Dohle

nur Ia Tiere mit guten Eigenschaften, suche im Tausch gegen seltene ornitholog. Literatur. Angebote erbittet

Rolf Kretschmann
i. Fa.: Creutz'sche Verlagsbuchhandlung
Magdeburg
78] Postschließfach 148.

Wellensittiche,

[79
junge, gesunde Ware, bezahle pro Stück 2500.— Mk.
Bitte um Angabe der Stückzahl ohne Rückporto.
Beck, Tierimport, Stuttgart.

Suche zu kaufen zu höchstem Preise

(zahle in belgischen Franken. Voreinsendung des Betrages bei der Geschäftsstelle der „Gefiederten Welt"):

verschiedene ♂ und ♀ **Schneeammer, Spornammer, Zwergammer, Zipp- oder Bartammer, Zaun- oder Zirlammer, Grauammer, Schneefink, Linden-, Fichten- und Kiefernkreuzschnabel, Hakengimpel, Karmingimpel** (Carpodacus erythrinus), **Großer Gimpel, Girlitz, Berghänfling** (Acanthis flavirostris), **Zitronenzeisig, Kirschkernbeißer, Rosenstar, Ringdrossel, Stein- und Blaudrossel und Seidenschwanz.**

Genaue Angebote mit Preisangabe an [80
J. Van Baeten, 21, Rue Basse Ville, Courtrai (Belgien).

Papageien Kanarienhähne Bastarde

kauft höchstzahlend und tauscht auch auf Exoten

Willy Odenwald, Fulda.

Eigner Export und Import. [81

Wir kaufen laufend zu konkurrenzlos höchsten Preisen:

Kanarienhähne und -weibchen

sowie alle Arten **Sing-** und **Ziervögel,** speziell **Seltenheiten,** als **Sumpf-** und **Wasserläufer, Blaukehlchen, Sprosser, Steinrötel, Blaudrosseln, Bienenfresser, Schwarzplatten, Stieglitze, Zeisige, Exoten aller Art, Papageien.** [82

Kühn & Muschter, Borna b. Leipzig,

Käfigfabrik und Vogelhandel en gros und en detail

Import. **Export.**

Anfragen Rückporto beifügen.

Achtung! Vogelliebhaber!

Verkaufe: 1,1 Buchfink 1000 ℳ, 1,1 Grünfink 1000 ℳ, 1,1 Zeisig 2000 ℳ. Sämtliche Paare haben im letzten Frühjahr in freier Zimmervoliere mit Erfolg gebrütet. Ferner verkaufe: 2,0 Schwarzamseln, 1922er Wildfang, à 800 ℳ, 0,1 Heckenbraunelle 500 ℳ (4 Eier gelegt), 1,0 Distelfink 1500 ℳ, 1,1 prima Farbensittiche (rot-grün-blau) fürs Meistgebot, jedoch nicht unter 100 000 ℳ. Selbige sind aus Deutsch-Südwestafrika importiert. Sämtliche Vögel sind kerngesund und Ia im Gefieder. Bei Anfragen erbitte Rückporto. [83
M. Strotmann, Godesberg/Rh.,
Burgstraße 52.

Suchen Sie Wellensittiche!

dann wenden Sie sich gefl. an die anerkannten Züchter der „A.-Z.". Jahrbuch II 1922 ℳ 200.—; III 1923 ℳ 800.— franko. Inhalt: Zuchtberichte, Illust., sämtliche Verzeichnisse. Postscheckkonto Berlin 80731. [84
A. Krabbe, Anklam,
Demminer Str. 10.

Verkaufe

1 Schwarzplatte, 1 Singdrossel, 1 Buchfink, 1 Stieglitz, 2 Bluthänflinge, 2 gr. Mehl- u. 1 Laubwurmkiste, Bauer, Futter usw., nehme in Tausch Aquarium 75×33 cm. Luftkessel.

W. Krüger, Berlin N113
85] **Bornholmer Str. 74, II.**

Wellensittiche

1922er Zucht, aus Freivoliere, kerngesund und winterhart, gebe noch ca. 8 Männchen ab. Rückporto erbeten. Evtl. Tausch gegen Weibchen oder andere
86] Sittiche.
L. Rösch, Lauffen a. Neckar, Württemb.

Ia gr. Wellensittiche

1 od. 2 Zuchtp., nur gar. gute, kräftige Zuchtp. kommen in Frage, sucht zu kaufen oder 1 Paar zu tauschen gegen Lehrbuch der Stubenvogelpflege, Abrichtung u. Zucht, Orig.-Halbled., 1000 S. stark,
87] von Dr. K. Ruß.
H. Kamm, Godesberg, Friedrichstr. 37.

Zuchtpaar gr. Wellensittiche

gegen Höchstgebot abzugeben.
Art. Schiebe, Liegnitz i. Schles.,
88] Luisenstr. 24 III.

Gebe ab:

1,1 Amarant, 1,0 Goldbrüstel, 1,0 Tigerfink, 0,1 Amarant, 1,0 Grauastrilde. 2,0 Wald- und Garten-Stieglitz, 1,0 Bärtelzeisig, elegant geb. Einheimische Stubenvögel von Dr. Ruß und gute In- und Auslandsbriefmarken-Sammlung. **Nehme in Tausch and. Exoten** wie Zebrafinken, kl. Elsterchen, jap. Möwchen.
W. Lassner, Liegnitz,
89] Kaiserstr. 8 IV.

Vertausche

einige prachtvolle Schwarzplatten gegen nur gute **Garten-, Dorngrasmücke, Bluthänflinge.**
90] **G. Zeiß, Bayreuth III.**

Verkaufe.

Schwarzplättchen u. Singdrossel, Schwanz beflogen à 2000 ℳ. [91
H. Krause, Stettin, Hochstraße 6.

Tausche

1 Mandoline gegen **1 ♂ Schwarzplättchen u. 1 ♂ Gartengrasmücke** oder auch **1 Zuchtp. Wellensittiche.**
Rudolf Kaiser, Neunkirchen (Saar),
92] Jägerstraße 10.

Prima Singlerchen

Stück 600 ℳ, hat abzugeben

Severin Niegemann,

93] **Köln-Sülz,** Aegidiusstr. 52.

Suche: 1 Mch. Zebrafink, 1 Mch. kl. Elsterchen.

Adolf Steinhagen, [94

Lübeck, Brandenbaumer Landstr. 161.

1,1 Trupiale abzugeben

(Seltenheit), tausche auch and. Exoten gegen Höchstgebot. Gef. Offerten erbet. an die Gef. Welt unt. **„Trupial".** [95

Wegen Platzmangels verkaufe

Ia ausgestopfte Vögel und Tiere wie: 1 Uhu, 1,10 m Flügelsp., 8000 ℳ, 1 Auerhahn 8000 ℳ, 1 Schleiereule 1500 ℳ, 1 Schwarzspecht 800 ℳ, 2 Grünspechte 1500 ℳ, 1 Nebelkrähe 700 ℳ, 1 Paar Knäckenten, Ia Sockel, 4000 ℳ, 1 Bleßhuhn 1500 ℳ, 1 Rohrhuhn 1500 ℳ, 1 Lerche 400 ℳ, 1 Sperber 1000 ℳ, 1 verwild. Katze 4000 ℳ, 1 Edelmarder 3000 ℳ, 1 Eichhörnchen 600 ℳ, 2 Bussarde, ganz neu, à 3000 ℳ, 1 Hühnerhabicht, ganz neu, 2500 ℳ, 1 mechanischen Uhu, mit Wachstuchtragkorb zur Ausübung der Hüttenjagd, kompl. 10 000 ℳ. Bei geschlossener Abnahme 45 000 ℳ. Tausche auch gegen Wellensittiche, Kanarienhähne oder Exoten. Bei Anfr. Rückp. beifügen.

Willy Rath, Rudolstadt (Thür.),

96] Schillerstr. 22.

Goldene Damenuhr

mit Sprungdeckel, 10 Steine, sowie 2 Gedenkmünzen, 3 M. „Völkerschlachtdenkmal", 3 M. „Der König rief und alle kamen" gegen jungen fehlerfreien Graupapagei z. tauschen ges. Kein Schreier. Angaben Garantie.

E. Schleicher, Frankfurt a. Main,
Freiligrathstraße 38. [97

Zu verkaufen

Flöricke, Vogelbuch, gebd.,
Ruß, Die einheim. Stubenvögel,
„ Die fremdl. Stubenvögel,
alles gebund. u. fast neu, geg. Höchstgeb.

Enno Keilwerth, Plauen (Vgtl.),

98] Theumaerstr. 8 I.

Verkaufe Naumann Bd. I, II, III, IV u. V. Tausche auch gegen gebr. Fahrrad. Ferner gebe ich ab Liebe, Ornithol. Schriften, Bechstein, Stubenvögel, Brehm, Gef. Vögel Bd. II. Tausche evtl. gegen ♂ Zuchtkanarien. **Karl Edel,**

Würzburg, Augustinerstr. 13. [99

Wir haben für die **„Gefiederte Welt"** wieder

Einbanddecken

anfertigen lassen, jedoch ohne Jahreszahl, damit dieselben für alle Jahrgänge, eventl. auch für zwei zusammen, verwendet werden können. Die Herstellungskosten sind aber bedauerlicherweise so bedeutend gestiegen, daß wir die Einbanddecken nur für 1200 M. zuzüglich Porto und Versendungsspesen (nach dem Ausland für 3 Schweizer Francs) liefern können. Preis und Lieferbarkeit freibleibend! Zusendung kann durch jede Buchhandlung erfolgen, direkt vom Verlage nur gegen vorherige Einsendung von zurzeit 1300 Mk. (Ausland 3 Frcs. Schweiz. Währ. zuzüglich Ausland-Paket-Porto).

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg

Postscheckkonto: Magdeburg 3148. **Postschließfach 148.**

Inserate

für das am 1. Februar 1923 zur Ausgabe gelangende Heft 3 der Gefiederten Welt erbitten bis 26. Januar früh.

Der Insertionspreis beträgt für die viergespaltene Nonpareillezeile od. deren Raum 10 M.

Seltene Bücher!

Gebe ab:

Heuglin, Ornithol. Nordostafrika, 2 Bände, gebunden,
Finsch & Hartlaub, Ornithol. der Vita-Samoa-Tonga-Inseln,
Reichenow, Die Vögel Afrikas, 3. Bd. (Prachtfinken),
Reichenow, Die Vögel d. Bismarckinseln.
Catalogue of Birds in the British Museum, Vol. XIII,
V. Wiese, Tropefuglenes Liv i Fangenskab, 3 Bände.

Nehme in Tausch Klassiker:
Reuter, Heine, Hoffmann, Lessing
100] **usw.**

Wagner,
Bruchmühle (Niederbarnim),
Lindenstraße 32.

Verkaufe

Gefiederte Welt Jahrg. 1894, 1895, 1896, 1897 u. 1898, alle 5 Bände sehr sauber in Originalband gebund., Preis zus. 15 000. **Gefiederte Welt** 1897, geb. 3000. **Ornithol. Monatsschrift** des Vereins z. Schutze der Vogelwelt, Jahrg. 1895, 1896, 1897, 1898 in Orig.-Einband, 1900 in Halbleder geb., alle 5 Bände reich illust. mit viel. bunten Tafeln, Preis zus. 15 000. **Ornith. Monatsschrift** Jahrgang 1910 (vollständig), 1911 (fehlt 1 Heft), 1912 (vollständig), diese 3 Jahrg. ungeb., **Preis** zus. 5000. Mehrgebot erhält Vorzug. **Tausche Vögel, spez. Exoten.** Sende nicht zuerst, da mein Angebot klar. [101

Ernst Schmidt,
Leipzig-Sellerh., Wurzner Str. 195.

Gefiederte Welt

Jahrgänge 1874 und 1890, Monatsschrift des Vereins z. Schutze der Vogelwelt Jahrg. 1876 und 1877 (auch mit kurzer Reihe anderer Jahrg.) zu kaufen gesucht. [102

Otto Bretschneider, Neustadt i. Sa.

Tausche

eine gute Violine m. Bogen gegen zwei gesunde Kanarienhähne.

H. Geisel, Wiesbaden,
103] Hellmundstr.

Suche zu kaufen

verschiedene Jahrg. d. Gef. Welt, gebunden und ungebunden. [104

Otto Schmidt, Wittenberg (Bz.-Halle), Grünstr. 28.

Im Interesse unserer verehrl. Abonnenten bitten wir das

Abonnement auf die „Gefiederte Welt" rechtzeitig erneuern

zu wollen. Die Gefiederte Welt kann sowohl **durch den Buchhandel** als auch **beim Postamt für 45 Mk. für das Vierteljahr** bestellt werden.

Direkte Zusendung vom Verlage kann nur noch ausnahmsweise und **nur gegen vorherige Einsendung von 185.— Mk.** für das I. Vierteljahr — Postscheckkonto Magdeburg 3148 — erfolgen, **nach dem Ausland nur gegen Voreinsendung von 2 Schweizer Francs** (bezw. in entsprechender Umrechnung in anderer Währung).

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg
Postfach 148

Bitte!

In eigenem Interesse wollen die pp. Einsender beachten, daß
a) **alle für die Redaktion** der „Gefiederten Welt" bestimmten **Zuschriften** (Sprechsaal-Anfragen und -Antworten, Vereinsnachrichten usw.) und **Sendungen** (tote Vögel, Manuskripte) nur an **Herrn Karl Neunzig, Hermsdorf bei Berlin,** Neue Bismarckstr.,
b) **alle Bestellungen** auf **Abonnements, Inserate** und dergl. Geschäftliches nur an die **Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg,** Postschließfach 148,
zu richten sind.

In der Zeit vom

2. Oktober bis 28. Februar

ist der An- und Verkauf wie das Feilbieten von **in Europa einheimischen Vögeln — mit Ausnahme der Meisen, Kleiber, Baumläufer und Spechte** — zulässig, es können daher in dieser Zeit derartige Inserate in der „Gefiederten Welt" zum Abdruck gelangen! Der Insertionspreis für die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum beträgt vom 1. Januar 1923 an **10** Mark. Aufträge erbeten an

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg.
Postschließfach 148.

Steinkauz

in gute Hände zu kaufen gesucht.

W. Thiem, Kiel,
Dorfstraße 33. [120

1,0 Nachtigall
1,0 Steinrötel

Ia Sänger mit Ia Gefieder, zu kaufen gesucht. [121

H. Gareis, Erfurt,
Augustinerstraße 13.

Suche

1,0 Rotkehlchen, 1,0 Schwarzplättchen, Ia Sänger mit Ia Gefieder, Preisoff. an [122
Friedr. Weick, Mörstadt b. Worms.

Graue u. grüne Papageien
1,0 rottöpfig. Inseparables

sowie

Stieglitze, Dompfaffen, Hänflinge, Zeisige, Kreuzschnäbel [123

kauft zu höchsten Preisen

Zoologische Handlung
Willy Klein,
Kiel, Muhliusstraße 96.

Gebe 5-Dollar-Goldstück

für einen

roten Arara

selbiger muß gesund u. gut befiedert sein.

Suche

zahmen Tukan

gebe ungarische Valuta.

A. Nindl,
Eisenstadt (Burgenland). [124

Suche [125

Schamadrossel (Männchen) zu kaufen.
Götze, Wiesbaden, Lothringerstr. 23.

Wir kaufen laufend zu konkurrenzlos höchsten Preisen:

Kanarienhähne und -weibchen

sowie alle Arten **Sing-** und **Ziervögel,** speziell **Seltenheiten,** als **Sumpf-** und **Wasserläufer, Blaukehlchen, Sprosser, Steinrötel, Blaudrosseln, Bienenfresser, Schwarzplatten, Stieglitze, Zeisige, Exoten aller Art, Papageien.** [126

Kühn & Muschter, Borna b. Leipzig,

Käfigfabrik und Vogelhandel en gros und en detail

Import. **Export.**

Anfragen Rückporto beifügen.

Papageien
Kanarienhähne
Bastarde

kauft höchstzahlend und tauscht auch auf Exoten

Willy Odenwald, Fulda.

Eigner Export und Import. [127

Aufbewahren!

Suche bessere Weichfresser ♂, mögl. Frühj.-Wildf. Gebe dafür 3 Sorten friedensmäß. Mischfutter für a) Erdsänger, b) Grasmücken, c) Drosseln. Gegen Angabe der Tauschvögel versende Probe des gewünschten Futters.
Angebote unter F. H. 26 an die „Gef. Welt". [128

Papageien
und Käfige

dazu, sowie

zahme Dohle

nur Ia Tiere mit guten Eigenschaften, suche im Tausch gegen seltene ornitholog. Literatur. Angebote erbittet

Rolf Kretschmann
i. Fa.: Creutz'sche Verlagsbuchhandlung
Magdeburg
129] Postschließfach 148.

130] **Kaufe**

gesundes Männchen 1 Dompfaff, 1 Gartengrasmücke, 1 Stieglitz u. zahle guten Preis. Angeb mit Preis an
E. Duve, Hamburg 26, Wolfshagen IIa

Suche Papageien

graue oder grüne, fehlerfreie Tiere, mögl. sprechend. Zahle guten Preis, Tiere kommen in Liebhaberhand. Kaufe auch noch einige Zuchtpaare **Wellensittiche** sowie **Araras, Kakadus** u. **Zwergpapageien** sowie **ornithol. Literatur.** [131

E. Schmidt, Leipzig-Sellerh.,
Wurzner Straße 195.

Suche

2,0 große Alpenstieglitze,
2,0 Rothänflinge.

Nur festeingewöhnte Vögel und Ia Sänger anbieten. [132

Bruno Zacher, Kamenz i. Sa.,
Am Hutberg.

Suchen Sie
Wellensittiche!

dann wenden Sie sich gefl. an die anerkannten Züchter der „A.-Z.". Jahrbuch II 1922 ℳ 200.—; III 1923 ℳ 800.— franko. Hochval. Ausland dreifach. Inhalt: Zuchtberichte, Illust., sämtliche Verzeichnisse. Postscheckkonto Berlin 80731. [133

A. Krabbe, Anklam,
Demminer Str. 10.

Wellensittiche, [134

junge, gesunde Ware, bezahle pro Stück 2500.— Mk.
Bitte um Angabe der Stückzahl ohne Rückporto.

Beck, Tierimport, Stuttgart.

Kaufe
und zahle für

Kanarienweibchen	3000 M
Stieglitzmännchen	1500 „
Zeisigmännchen	1000 „
Dompfaffmännchen	1500 „
Hänflingmännchen	1000 „
Buchfinkmännchen	500 „
Schwarzplattmännchen	2000 „

Eilangebote erbeten an

Dornbach, Köln-Sülz,
58 Aegidiusstraße 58. [135

Rotes Dompfaff-Männchen gesucht,

vollständig gesund und einwandfrei im Gefieder. Angebote erbittet [136

Ernst Marx, Chemnitz, Bernsdorferstraße 14.

Suche zu kaufen zu höchstem Preise

(zahle in belgischen Franken. Voreinsendung des Betrages bei der Geschäftsstelle der „Gefiederten Welt"):

verschiedene ♂ und ♀ **Schneeammer, Spornammer, Zwergammer, Zipp- oder Bartammer, Zaun- oder Zirlammer, Grauammer, Schneefink, Linden-, Fichten- und Kiefernkreuzschnabel, Hakengimpel, Karmingimpel** (Carpodacus erythrinus), **Großer Gimpel, Girlitz, Berghänfling** (Acanthis flavirostris), **Zitronenzeisig, Kirschkernbeißer, Rosenstar, Ringdrossel, Stein- und Blaudrossel und Seidenschwanz.**

Genaue Angebote mit Preisangabe an [137

J. Van Baeten, 21, Rue Basse Ville,
Courtrai (Belgien).

Suche

etliche Paare **Tigerfinken** und **Webervögel** im **Tausch** gegen **Ia Weizenmehl.** Angebote an

Gerhard Halm, Gohlsdorf,
Post Brochendorf, Bez. Liegnitz. [138

Absolut zahmes, laut singendes

Rotkehlchen

in sorgsamste Hand gesucht. Angebot mit Preisangabe an [139

Freiherr v. Berlepsch,
Burg Seebach (Kreis Langensalza).

Prima Singlerchen

garantiert Männchen hat abzugeben zum Preise von 1000 Mk. zuzüglich Porto und Verpackung

Christ. Denz, Köln-Sülz,
Beyenstr. 19 II. [140

Prima

Nachtigallenweibchen

kerngesund und sehr zahm, bestens geeignet für Zuchtversuche, hat abzugeben [141

Lentze, Osnabrück,
Struckmannstraße 7.

Auf

Weichfresser

wie:

Nachtigall, Gelbspötter, Schwarzplättchen, Sumpf-, Teich-, Schilfrohrsänger, Rohrammern, Garten-, Dorn-, Zaungrasmücken, Rotschwänze, Rot-, Weiß-, Blaukehlchen, Fliegenschnäpper, Fitis-, Wald-, Weidenlaubvogel, Bachstelzen, Pieper, Schwätzer und Würger

nehme schon Bestellungen entgegen.

Zoologische Handlung

Willy Klein, Kiel,

Muhliusstraße 96. [142

Bei Anfrage bitte Rückporto beifügen.

Eierwerke

von **Bädecker u. Thienemann** gut erh. zu kaufen gesucht. Off. mit **Preis**angabe an [143

M. Kaltofen, Gleisberg,
Amtsh. Döbeln (Sachsen).

Zeisig, Stieglitze, Dompfaffen

(Männchen), gesunde schöne Vögel, bezahle per Stück 1000 Mark. Angebote mit Stückzahl. [144

Beck, Tierimport, Stuttgart.

Inserate

für das am 15. Februar 1923 zur Ausgabe gelangende Heft 4 der Gefiederten Welt erbitten bis 9. Februar früh.

Der Insertionspreis beträgt für die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum

100 M.

Zur gefälligen Beachtung!

§ 8 des am 1. September 1908 in Kraft getretenen „Vogelschutzgesetzes" lautet:

In **der Zeit vom ersten März bis zum ersten Oktober** ist das Fangen und die Erlegung von Vögeln sowie der Ankauf, der Verkauf und das **Feilbieten,** die **Vermittlung** eines hiernach verbotenen An- und Verkaufs, die Ein-, Aus- und Durchfuhr von lebenden sowie toten Vögeln der **in Europa einheimischen** Arten überhaupt, ebenso der Transport solcher Vögel zu Handelszwecken untersagt.

Dieses Verbot erstreckt sich für **Meisen, Kleiber, Baumläufer, Spechte, Eulen** und **verschied. Falken** für das **ganze Jahr.**

Auf Grund dieses können wir vom **1. März an** Inserate betreffend **Kauf** und **Verkauf einheimischer** Vögel nicht mehr zum Abdruck bringen und bitten, dies bei Aufgabe von Inseraten berücksichtigen zu wollen.

Unter Feilbieten ist das Anbieten zum Kaufe oder zu **sonstigem Erwerbe** zu verstehen. Somit ist ein strafbares Feilbieten auch dann anzunehmen, wenn in einer Anzeige zwar dem Wortlaut nach ein **Tausch** angeboten wird, der Anbietende aber tatsächlich zu kaufen bzw. zu tauschen beabsichtigt und die Form des Tauschangebots nur wählt, um sich gegen strafrechtliche Verfolgung zu sichern. In solchen Fällen machen sich sowohl die anzeigenden Personen wegen verbotenen Feilbietens als auch die die Anzeigen veröffentlichenden Zeitungsunternehmer der verbotenen Vermittlung eines An- und Verkaufs strafbar.

Bei Tauschanzeigen ist ausdrücklich anzugeben, was als Gegenleistung geboten oder gesucht wird. Eine Angabe des Wertes der zum Tausch angebotenen Vögel darf nicht erfolgen! Unter Chiffre können derartige Anzeigen nicht aufgenommen werden!

Die Geschäftsstelle der „Gefiederten Welt"

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Tausche [145

Goldene Bibliothek der Bildung und des Wissens, 3 große Prachtbände mit 2700 Textseiten u. 722 Textillustrationen, zahlreichen bunten und einfarb. Tafeln, sowie einem großen geographischen Atlas mit 52 farbigen Landkarten aller Länder der Erde pp. gegen **1 Zuchtpaar Ia grüne Wellensittiche** oder **1,3 Kanarien** St. Seiffert.

Anfrage nur gegen Rückporto an

C. Hunold,
Hersfeld, Lutherstr. 2.

Zu verkaufen

Indische Damadrossel gegen Höchstgebot. [146

Joseph Riesel, Karlsruhe i. Baden, Klauprechtstr. 47, IV.

Gebe ab in Tausch

4 Jahrgänge „Gefiederte Welt", Jahrgänge 99, 98, 95, 94, gebunden, sehr gut erhalten, gegen je 1 Distelfink, 1 Bluthänfling, 1 Zeisig, 1 Birkenzeisig, mindestens 1 Jahr gekäfigt. [147

Karl Scholderer,
Degerloch b. Stuttgart, Kirchstr. 28.

Wegen zu teuren Futters gebe noch folgende sehr gute Vögel ab:

1,0 Schwarzkopf Mk. 10000.—
1,0 Nachtigall . „ 16000.—
1,0 Heidelerche . „ 25000.—

In Tausch nehme erstklassige Nürnberger Bagdettentäubinnen, aber nur sehr gute Ware anbieten. [148

Pfarrer Schwabe,
Großenbehringen b. Gotha.

---

1 zahmes Rebhuhn ♂ M. 2000.—
1 Alpenlerche . . „ 1500.—
Goldhähnchen Stck. „ 1500.—
1 Grauammer ♂ . „ 1500,—

E. Schöndube, Berlin
Elisabethkirchstraße 1. [149

Vertausche

einige prachtvolle Schwarzplatten gegen nur gute **Garten-, Dorngrasmücke, Bluthänflinge.** [150

G. Zeiß, Bayreuth III.

Nuß, Handbuch Bd. I geb. Einh. Vögel
„ „ „ II geh. Exot. Vögel
vertausche gegen Browning nicht unter Kaliber 7,65. [151

W. Lind, Berlin, Lennéstr. 6.

Gefiederte Welt

Jahrgänge 1874 und 1890, Monatsschrift des Vereins z. Schutze der Vogelwelt Jahrg. 1876 und 1877 (auch mit kurzer Reihe anderer Jahrg.) zu kaufen gesucht. [152

Otto Bretschneider, Neustadt i. Sa.

Wir haben für die **„Gefiederte Welt"** wieder

Einbanddecken

ansertigen lassen, jedoch ohne Jahreszahl, damit dieselben für alle Jahrgänge, eventl. auch für zwei zusammen, verwendet werden können. Die Herstellungskosten sind aber bedauerlicherweise so bedeutend gestiegen, daß wir die Einbanddecken nur für 1200 M. zuzüglich Porto und Versendungsspesen (nach dem Ausland für 3 Schweizer Francs) liefern können. Preis und Lieferbarkeit freibleibend! Zusendung kann durch jede Buchhandlung erfolgen, direkt vom Verlage nur gegen vorherige Einsendung von zurzeit 1300 Mk. (Ausland 3 Frcs. Schweiz. Währ. zuzüglich Ausland-Paket-Porto).

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg

Postscheckkonto: Magdeburg 3148. **Postschließfach 148.**

Wir suchen Gefiederte Welt

1897, 1900, 1904, 1910, 1911, 1916—1921, am liebsten ungebunden, einzeln oder im ganzen und zahlen dafür gute Preise. Angeboten **mit Preisberechnung** sehen wir entgegen. [153

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg,
Postschließfach 148.

Bitte!

In eigenem Interesse wollen die pp. Einsender beachten, daß

a) **alle für die Redaktion** der „Gefiederten Welt" bestimmten **Zuschriften** (Sprechsaal-Anfragen und -Antworten, Vereinsnachrichten usw.) und **Sendungen** (tote Vögel, Manuskripte) nur an **Herrn Karl Neunzig, Hermsdorf bei Berlin,** Neue Bismarckstr.,

b) **alle Bestellungen** auf **Abonnements, Inserate** und dergl. Geschäftliches nur an die **Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg,** Postschließfach 148,

zu richten sind.

Kaufe

zu höchsten Preisen
3 bis 4 Weibchen
jap. Möwchen
und ein Männchen
Zebrafink,
wenn möglich Zucht 1922.
Wagner, Bruchmühle (Niederbarnim).
Lindenstraße Nr. 32. [174

Suche zu kaufen

1,0 Graudelsänger, 1,0 gut eingewöhnten Sonnenvogel. Off. an [175
Th. Vandenhoff, Köln, Gereonshof 20.

Suche sofort

Wellensittiche,
3 Weibchen, 1 Männchen.
Angebote an **F. Roesch, Rathenow,**
Kl. Hagenstr. 8 II. [176

Wellensittiche,

gar. blutsfremd, **erprobtes** Zuchtpaar, gelb od. grün, zu kaufen gesucht. Angebote mit Preisangabe an [177
Dr. Hans Krösl, Innsbruck Tirol),
Maria-Theresien-Str. 8/III.

Suche sofort zu kaufen

nur Zuchtpaare
Wellensittiche
und alle anderen Sittiche.
Zahle sehr gute Preise. Preisangebote an
Erich Richter, Berufstadt (Sachsen),
178] Troggasse. A. Z. 235.

Mehrere Zuchtpaare
Wellensittiche,
blutsfremd, gelb od. grün, auch einzelne ♂ u. ♀, nur tadellose gesunde Vögel, möglichst 21er Brut, zur Zucht von Liebhaber gesucht. Zahle gute Preise. [179
Bretschneider, Zwickau (Sachsen),
Werdauerstr., Kaserne E.

Suche

1,0 Steinrötel, 1,0 Schwarzplättchen, 1,0 Rotkehlchen.
Ia Sänger mit gutem Gefieder.
180] **Friedr. Weick,**
Mörstadt bei Worms am Rhein.

Suche

Ruß, Die fremdländischen Stubenvögel und ähnliche Literatur. Angebote mit Preisangabe an **W. Kinast,** Prof.,
181] **Überlingen am Bodensee.**

Zeisig, Stieglitze, Dompfaffen

(Männchen), gesunde schöne Vögel, bezahle per Stück 1000 Mark. Angebote mit Stückzahl. [182
Beck, Tierimport, Stuttgart.

Zur gefälligen Beachtung!

§ 3 des am 1. September 1908 in Kraft getretenen „Vogelschutzgesetzes" lautet:

In **der Zeit vom ersten März bis zum ersten Oktober** ist das Fangen und die Erlegung von Vögeln sowie der Ankauf, der Verkauf und das **Feilbieten,** die **Vermittlung** eines hiernach verbotenen An- und Verkaufs, die Ein-, Aus- und Durchfuhr von lebenden sowie toten Vögeln der **in Europa einheimischen** Arten überhaupt, ebenso der Transport solcher Vögel zu Handelszwecken untersagt.

Dieses Verbot erstreckt sich für **Meisen, Kleiber, Baumläufer, Spechte, Eulen** und **verschied. Falken** für das **ganze Jahr.**

Auf Grund dieses können wir vom **1. März an** Inserate betreffend **Kauf** und **Verkauf einheimischer** Vögel nicht mehr zum Abdruck bringen und bitten, dies bei Aufgabe von Inseraten berücksichtigen zu wollen.

Unter Feilbieten ist das Anbieten zum Kaufe oder zu **sonstigem Erwerbe** zu verstehen. Somit ist ein strafbares Feilbieten auch dann anzunehmen, wenn in einer Anzeige zwar dem Wortlaut nach ein **Tausch** angeboten wird, der Anbietende aber tatsächlich zu kaufen bzw. zu tauschen beabsichtigt und die Form des Tauschangebots nur wählt, um sich gegen strafrechtliche Verfolgung zu sichern. In solchen Fällen machen sich sowohl die anzeigenden Personen wegen verbotenen Feilbietens als auch die die Anzeigen veröffentlichenden Zeitungsunternehmer der verbotenen Vermittlung eines An- und Verkaufs strafbar.

Bei Tauschanzeigen ist ausdrücklich anzugeben, was als Gegenleistung geboten oder gesucht wird. Eine Angabe des Wertes der zum Tausch angebotenen Vögel darf nicht erfolgen! Unter Chiffre können derartige Anzeigen nicht aufgenommen werden!

Die Geschäftsstelle der „Gefiederten Welt"
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Kaufe Ia vorjährige Zuchtpaare:
Jap. Möwchen
Kleine Elsterchen
Angebote mit Preisangabe in tschechosl. Kr. (inkl. Porto und Packung) erbittet [183
J. Hála, Motol bei Prag, R.Č.S.

1 Dompfaff, 1 Stieglitz,

1 Flugbauer 100×50×50. [184
Ing. **A. Wetter,** Oberkirch (Baden).

Senegalfinken

sind wieder eingetroffen und gebe solche im Tausch gegen Exoten ab. [185
Für **Wellensittiche** zahle 2 ℳ pro Stück zum Goldkurs der Reichsbank.
Für **Blaustirn-Amazonen** fehlerfrei zahle **80000 ℳ, Graupapageien 180000 ℳ,** wenn fehlerfrei u. gesund. Anfrager wollen genügend Rückporto beifügen.
E. W. Lenger, Berlin N 58,
Schönhauser Allee 70a.
Tel. Humbold 5730.

Singsittiche,

Nymphensittiche, gelbe **Wellensittiche** oder auch andere Sittichearten, einzeln oder paarweise, evtl. auch Jungtiere, sowie Schmetterlingsfinken, **Estrilde, Weber** zu kaufen gesucht. Desgleichen suche für meine Gartenvoliere kleinere Sumpf- oder Strandvögl. [186
Erlemann, Wiesbaden.

Suche

weiße od. Isabellkanarien
Hahn oder Weibchen, zu kaufen oder zu tauschen. Zahle hohen Preis! [187
Richard Heydenreich,
Bad Suderode (Harz).
Größte Harzer-Kanarien-Feinzucht.

Verkaufe oder vertausche auf Wellensittiche **1,0 Heidelerche, 1,0 Rotkehlchen, 1,0 Schwarzdrossel, 1,0 Buchfink, 1,0 Distelfink.**
M. Lehmann, Seidenberg O.-L.,
Wilkaerstraße 12 [188

Papageien

und Käfige
dazu, sowie
zahme Dohle
nur Ia Tiere mit guten Eigenschaften, suche im Tausch gegen seltene ornitholog. Literatur. Angebote erbittet
Rolf Kretschmann
i. Fa.: Creutz'sche Verlagsbuchhandlung
Magdeburg
189] Postschließfach 148.

Papageien
Kanarienhähne
Bastarde

kauft höchstzahlend und tauscht auch auf Exoten
Willy Odenwald, Fulda.
Eigner Export und Import. [190

Wir kaufen laufend zu konkurrenzlos höchsten Preisen:
Kanarienhähne und -weibchen

sowie alle Arten **Sing-** und **Ziervögel,** speziell **Seltenheiten,** als **Sumpf-** und **Wasserläufer, Blaukehlchen, Sprosser, Steinrötel, Blaudrosseln, Bienenfresser, Schwarzplatten, Stieglitze, Zeisige, Exoten aller Art, Papageien.** [191
Kühn & Muschter, Borna b. Leipzig,
Käfigfabrik und Vogelhandel en gros und en detail
Import. **Export.**
Anfragen Rückporto beifügen.

Grüne Wellensittiche

12 Stück, 1922, gar. blutsfr., in Freivoliere gez., am liebsten in Tausch zwecks Blutsauffrischung, wenn nicht, gegen Gebot. Bei Anfragen Rückporto. — Möchte 12 Pfd. Hanf und 3 Pfd. Rübsen eintauschen gegen Spitzsaat, gleiches Quantum. [192

R. Huth, Perleberg

Suchen Sie **Wellensittiche!**

dann wenden Sie sich gefl. an die anerkannten Züchter der „A.-Z.". Jahrbuch II 1922 ℳ 200.—; III 1923 ℳ 800.— franko. Hochval. Ausland dreifach. Inhalt: Zuchtberichte, Illust., sämtliche Verzeichnisse. Postscheckkonto Berlin 80731. [193

A. Krabbe, Anklam,
Demminer Str. 10.

Für Liebhaber.

Verkaufe wegen Futtermangels meinen prima nordischen David-Sprosser, tiefschallig und tourenreich, aalglatt im Gefieder, das Beste, was es gibt, und eine prima Schwarzplatte, Überschläger, Ia im Gefieder und Gesang, gegen Höchstgebot. [194

Severin Niegemann,
Köln-Sülz, Aegidiusstr. 52.

Kaufe in schönen Exemplaren

1,1 Wiedehopf, 1,1 Trauerfliegenfänger, 1,0 Halsbandfliegenfänger, 1,0 Zwergfliegenschnäpper. Zahle Liebhaberpreis! Offerten unter L. O. an die Exped. der Gefiederten Welt. [195

Kirschkernbeißer

Ia Männchen, zu kaufen gesucht.
Gefl. Angebote an [196
Herm. Bösel, Lübeck, Adolfstr. 13.

Gebe ab:

Gef. Welt ungebunden 1920, 21, 22. Rausch, Sängerfürsten (neu gebunden) und gut erhalten. Metallkäfig, grün lackiert, 50×38×28, im Tausch gegen Dompfaffen, rotrück. Würger, Sonnenvogel oder Wellensittich.
H. Eberhardt,
Nordhausen-Altendorf 36. [197

Gebe 0,2 Dompfaffen in Tausch gegen **1,0 Stieglitz** frei gegen frei.
198] **Apotheker Pistor,**
Oberaula, Bezirk Kassel.

Kanarienhähne und Weibchen, Bastarde, Papageien, Kakadus, Sittiche, Dompfaffen, Stieglitze, Weichfresser, Affen, Ameiseneier, Mehlwürmer

und ähnliches kaufe ständig höchstzahlend und erbitte Angebote mit Preis. [199

H. Behrke vorm. H. Mätje Nachf.,
Braunschweig, Sophienstraße 35.
Tierexport gegr. 1874. Fernruf 1281.

Inserate

für das am 1. März 1923 zur Ausgabe gelangende Heft 5 der Gefiederten Welt erbitten bis 23. Februar früh.

Der Insertionspreis beträgt für die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum 100 M.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg

Postscheckkonto: Magdeburg 3148 / Postschließfach 148

Die angeführten Preise sind Grundpreise, die mit der vom Börsenverein der Deutschen Buchhänder von Zeit zu Zeit bestimmten Teuerungszahl (Schlüsselzahl) zu multiplizieren sind. Die jeweilige Schlüsselzahl ist vom Verlage oder in jeder Buchhandlung zu erfahren. Beispiel: Grundpreis 2.— ℳ, Schlüsselzahl 1400 = 2800 ℳ Ladenpreis.

Für Kanarienzüchter.

Der Kanarienvogel, seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht. Von Dr. Karl Ruß. 14. Auflage mit 3 Farbentafeln und zahlreichen Textbildern. Bearbeitet und herausgegeben von Karl Neunzig. Kart. 2.40 M.

Die Farben- und Gestaltskanarien nebst Beschreibung aller verschiedenen Kanarienrassen, deren Entstehung, Form und Farbenveränderung, Bastardzucht und Farbenfütterung von C. L. W. Noorduijn-Groningen. Mit 22 stichhaltigen Abbildungen. Kart. 2.40 M.

Der Kanariengesang. Allgemeinverständliche sowie musikalische und phonetische Darstellung von W. Kluhs. 1.20 M.

Für Auslandslieferungen: Nach dem hochvalutigen Ausland 200% Zuschlag. Nach dem mittelvalutigen Ausland 120 % Zuschlag.

Aufheben! [200

Die Vereinigung der Einheimischen Waldvogelliebhaber von Görlitz sucht zum Frühjahr bessere Weichfresser wie: **Sprosser, Nachtigallen, Gelbspötter, Schwarzplättchen, Rohrsänger, Rohrammern, Grasmücken, Blaukehlchen usw.** und bittet um Angebote an den Vorstand **W. Lücker, Görlitz,** Mühlweg 15a.

Achtung Liebhaber!

Folgende Ia Vögel gebe ab:
1,1 Tigerfinken, zahme Rebhühner, 2,0 Stieglitze, 5,0 Zeisige, Lerchen, Goldhähnchen, Nachtigall, Blau-, Rot-, Weißkehlchen, Grasmücken, Schwarzplatten, Würger usw. Es handelt sich um garant. gute Vögel. 4 Dompfaffen, fingerzahm. Auf vergriffene Vögel nehme Auftrag auf Beschaffung entgegen.
M. Wohlers, Hamburg 35, Normannenweg 5, III. [201

Gefiederte Welt

Jahrgänge 1874 und 1890, Monatsschrift des Vereins z. Schutze der Vogelwelt Jahrg. 1876 und 1877 (auch mit kurzer Reihe anderer Jahrg.) zu kaufen gesucht. [202
Otto Bretschneider, Neustadt i. Sa.

Gefiederte Welt

verschiedene Jahrgänge, am liebsten in Originaleinband, zu kaufen gesucht. Angebote mit Preisangabe an [203
Hans Lohmar, Ing., Köln,
Blumenstr. 1.

Gefied. Welt 1922 Heft 5

zu kaufen gesucht. [204
Dr. H. Krösl, Arzt, Innsbruck (Tirol), Maria-Theresien-Str. 8/III.

Naumann, Vögel Bd. II—VII gegen Höchstgebot zu verkaufen. Off. unter H. B. 4 an die „Gef. Welt" erb. [205

Voranzeige.

Offeriere für die bevorstehende Saison alle Arten Weichfresser, wie Nachtigallen, Schwarzplatten, diverse Arten Grasmücken, Laubsänger usw. und bitte um Vorbestellungen. Anfragen Rückporto beifügen.
Louis Reith, Wiesbaden, Helenenstraße 24 [206

Naturfreund [207

und Vogelliebhaber in Schweden wünscht mit edeldenkendem deutschen Mädchen Gedanken und Ansichtskarten zu wechseln zur Vervollkommnung in der deutschen Sprache. Für Lektionen und Korrespondenz gebe Vergütung in bar. Gefällige Antwort mit „Liebhaber 30" **Poste restante Nynäsgård, Schweden.**

Wir haben für die **„Gefiederte Welt"** wieder

Einbanddecken

anfertigen lassen, jedoch ohne Jahreszahl, damit dieselben für alle Jahrgänge, eventl. auch für zwei zusammen, verwendet werden können. Die Herstellungskosten sind aber bedauerlicherweise so bedeutend gestiegen, daß wir die Einbanddecken nur für 1200 M. zuzüglich Porto und Versendungsspesen (nach dem Ausland für 3 Schweizer Francs) liefern können. Preis und Lieferbarkeit freibleibend! Zusendung kann durch jede Buchhandlung erfolgen, direkt vom Verlage nur gegen vorherige Einsendung von zurzeit 1300 Mk. (Ausland 3 Frcs. Schweizerische Währung in Kassenscheinen zuzüglich Ausland-Paket-Porto).

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg

Postscheckkonto: Magdeburg 3148. Postschließfach 148.

Wir suchen Gefiederte Welt

1897, 1900, 1904, 1910, 1911, 1916—1921, am liebsten ungebunden, einzeln oder im ganzen und zahlen dafür gute Preise. Angeboten **mit Preisberechnung** sehen wir entgegen. [208

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg,
Postschließfach 148.

Bitte!

In eigenem Interesse wollen die pp. Einsender beachten, daß

a) **alle für die Redaktion** der „Gefiederten Welt" bestimmten **Zuschriften** (Sprechsaal-Anfragen und -Antworten, Vereinsnachrichten usw.) und **Sendungen** (tote Vögel, Manuskripte) nur an **Herrn Karl Neunzig, Hermsdorf bei Berlin,** Neue Bismarckstr.,

b) **alle Bestellungen** auf **Abonnements, Inserate** und dergl. Geschäftliches nur an die **Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg,** Postschließfach 148,

zu richten sind.

Suche noch einige gelbe und prima

Wellensittiche

nd andere leicht züchtbare Exoten. ahle sehr guten Liebhaberpreis.

Wisniewsky, Leipzig-Eu.,
Görlitzer Str. 8. [225

Liebhaber kauft folgende prima änger: amerik. Spottdrossel, Schamaossel. Zahle höchsten Preis, müssen er erstkl. Sänger u. gut i. Gefieder sein. ilangebote mit Preis an
J. Hochholzer, Leopoldskron 100,
Salzburg I (Österreich). [226

Belcher **Liebhaber** tauscht mir eine **Feldlerche** (seit Zeihnachten im lauten Gesang) gegen u **Schwarzplättchen** (guter Sänger) m. Ehrliche Angebote an [227
Otto Schickhaus,
Vogelsang (Kr. Schwelm) **i. Westf.**

kaufe Vögel, Tiere aller Arten, zahle ehr als meine Konkurrenz. [227a
Beck, Tierimport, **Stuttgart.**

Habe
-3 Wellensittich-Männchen
egen **Weibchen** zu vertauschen. Es ommen nur **junge ausgefärbte uchttiere** in Frage. Vertrauen gegen ertrauen. [228
Artur Zielowski, Köppelsdorf
. Sonneberg i. Thür., Kurgarten.

Abzugeben:
ebrafinken, Wellensittichmännchen, anarien. Bevorzugt Tausch geg. Exoten.
Gesucht:
,0 Indigo (brütlustiges Weibchen voranden), 0,1 Weißkehlpfäffchen, 0,1 Grauidelsänger. Wellensittichtausch: Gebe ,0 gegen 0,2. [229
Stefani, Neuß (Rhein).

Tausche

,2 Ia **Amseln** gegen 1,1 Ia **Dompfaffen.** Tausche auch einzeln. [230
F. Reck, Sulingen i. Hannover.

Vertausche 30 Stück Farbentafeln der Gef. Welt egen Zebrafinken oder Wellensittiche.
D. Döhle, Loccum
(Kr. Stolzenau). A. Z. 6. [231

„Die Gefiederte Welt ist viel zu billig!"

das wird uns nicht allein von vielen Seiten gesagt, das ist leider auch tatsächlich der Fall! Wir mußten den Postbestimmungen zufolge den Abonnementspreis schon im Laufe des Oktober auf Grund der damaligen Herstellungskosten festsetzen, inzwischen sind diese aber auf das Zwanzigfache gestiegen, so daß wir die „Gefiederte Welt" geradezu verschenken und dabei ganz katastrophal zusetzen.

Daß dies nicht so weiter gehen kann, werden unsere Leser selbst einsehen müssen! — Eine Abonnementserhöhung seitens der Post kann aus postalischen Gründen nicht erfolgen; wir müssen daher unsere verehrlichen Abonnenten, denen doch auch an einem Fortbestand ihrer „Gefiederten Welt" gelegen ist, um eine Nachzahlung von M. 700,— bitten, damit wir die Zeitschrift über Wasser halten können. Diese verhältnismäßig niedrige Nachzahlung — erhält man doch für M. 700.— noch nicht einmal ein Pfund Vogelfutter und noch nicht ein Brot — werden unsere verehrlichen Leser für die ihnen liebgewordene Fachzeitschrift wohl auch gern leisten! — Auch diese würde für uns noch keinen Nutzen in Aussicht stellen, aber doch den Verlust einigermaßen verringern. **Jedenfalls würde von dieser Bereitwilligkeit der Bestand der Zeitschrift abhängen!**

Wir bitten daher freundlichst den Verhältnissen Rechnung zu tragen und uns umgehend den erforderlichen Betrag einzusenden — Postscheckkonto: Magdeburg 3148. — Inserate kosten von jetzt ab M. 100.— die viergespaltene Nonpareillezeile.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung
Magdeburg, Postschließfach 148

Suche **ausländische Vögel** und **Kanarien.**
Preisangebote erbeten an [232
Dornbach, Köln-Sülz,
58 Aegidiusstraße 58.

Wer überläßt mir 1,1 Kanarien zu zahlbarem Preis. Gebe evtl. Draht-Flugkäfig, 85×35×47 cm, oder gute Konzertflöte mit in Zahlung. [233
Karl Wagner, Konstanz, Hussenstr. 8.

Verkaufe od. vertausche

9 Bände Gefiederte Welt, tadellos erh., 1907—1915, Die gefiederten Sängerfürsten von Math. Rausch, Dr. Karl Ruß, Die Prachtfinken, Schäff, Unsere Singvögel für Meistgebot oder 2 Paar Wellensittiche (zuchtf.). [234
W. Isaaks, Oberpostschaffner,
Harburg (Elbe).

Tausche

Grammophon mit 7 Platten, darunter Nachtigallplatte zum Anlernen junger Kanarienvögel, gegen Papagei ein.
Fritz Keller, Steglitz,
Rheinstraße 43. [235

Gebe ab:

Gefiederte Welt Jahrg. 1908, 1911 gebunden, 1911, 1914, 1919, 1920, 1921 und 1922 ungeb., Ruß, Einh. Stubenvögel, 5. Aufl., Ruß, Die Webervögel, geh., Otto, Die Schamadrossel. **Suche** gut erh. Schindler- oder Reform-Weichfresserkäfig (Sprossergröße). [236
H. Beißner, Düsseldorf,
Bilkerallee 129.

Suche

Gefiederte Welt Jahrgänge 1874 und 1890, Monatsschrift des Vereins zum Schutze der Vogelwelt Jahrgänge 1876 und 1877, Ornitholog. Monatsberichte Jahrg. 1922 (auch mit kurzer Reihe anderer Jahrgänge). [237
Otto Bretschneider, Neustadt i. Sa.

Suche

Ruß, Die fremdländischen Stubenvögel und ähnliche Literatur. Angebote mit Preisangabe an **W. Kinast,** Prof., 238] **Überlingen am Bodensee.**

Naturfreund [239

und Vogelliebhaber in Schweden wünscht mit edeldenkendem deutschen Mädchen Gedanken und Ansichtskarten zu wechseln zur Vervollkommnung in der deutschen Sprache. Für Lektionen durch Korrespondenz gebe Vergütung in bar. Gefällige Antwort unt. **„Liebhaber 30" Poste restante Nynäsgård, Schweden.**

Tauschgesuch. „Die einheim. Stubenvögel" von K. Neunzig, 1922, neu, gegen K. Neunzig, „Fremdländ. Stubenvögel" tauscht **H. Mehring, Hildesheim,** Hinterm Brühl 5. [240

Zur gefälligen Beachtung!

§ 3 des am 1. September 1908 in Kraft getretenen „Vogelschutzgesetzes" lautet:

In **der Zeit vom ersten März bis zum ersten Oktober** ist das Fangen und die Erlegung von Vögeln sowie der Ankauf, der Verkauf und das **Feilbieten,** die **Vermittlung** eines hiernach verbotenen An- und Verkaufs, die Ein-, Aus- und Durchfuhr von lebenden sowie toten Vögeln der **in Europa einheimischen** Arten überhaupt, ebenso der Transport solcher Vögel zu Handelszwecken untersagt.

Dieses Verbot erstreckt sich für **Meisen, Kleiber, Baumläufer, Spechte, Eulen** und **verschied. Falken** für das **ganze Jahr.**

Auf Grund dieses können wir vom **1. März an** Inserate betreffend **Kauf** und **Verkauf einheimischer** Vögel nicht mehr zum Abdruck bringen und bitten, dies bei Aufgabe von Inseraten berücksichtigen zu wollen.

Unter Feilbieten ist das Anbieten zum Käufe oder zu **sonstigem Erwerbe** zu verstehen. Somit ist ein strafbares Feilbieten auch dann anzunehmen, wenn in einer Anzeige zwar dem Wortlaut nach ein **Tausch** angeboten wird, der Anbietende aber tatsächlich zu kaufen bzw. zu tauschen beabsichtigt und die Form des Tauschangebots nur wählt, um sich gegen strafrechtliche Verfolgung zu sichern. In solchen Fällen machen sich sowohl die anzeigenden Personen wegen verbotenen Feilbietens als auch die die Anzeigen veröffentlichenden Zeitungsunternehmer der verbotenen Vermittlung eines An- und Verkaufs strafbar.

Bei Tauschanzeigen ist ausdrücklich anzugeben, was als Gegenleistung geboten oder gesucht wird. Eine Angabe des Wertes der zum Tausch angebotenen Vögel darf nicht erfolgen! Unter Chiffre können derartige Anzeigen nicht aufgenommen werden!

Die Geschäftsstelle der „Gefiederten Welt"
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Inserate

für das am 15. März 1923 zur Ausgabe gelangende Heft 6 der Gefiederten Welt erbitten bis 9. März früh.

Der Insertionspreis beträgt für die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum 100 M.

Naturwissensch. Antiquariat

insbesondere Ornithologie, Kleintierzucht u. Gartenbau kauft laufend zu angemessenem Preis

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg,
Postschließfach 148 [241

Empfehlenswerte Bücher für Vogelfreunde

Preis und Lieferbarkeit freibleibend!

Für Freunde der heimischen Vogelwelt.

Die deutsche Vogelwelt nach ihrem Standort. Ein Beitrag zur Zoogeographie Deutschlands und zugleich ein Exkursionsbuch zum Kennenlernen der Vögel. Von Werner Hagen. Mit 74 Abbildungen u. 4 Schwarzdrucktafeln. Kart. 3.60 M.

Die einheimischen Stubenvögel, ihre Naturgeschichte und Zucht. Von Karl Neunzig (zugleich 6. Auflage des Dr. Karl Ruß'schen Handbuchs für Vogelliebhaber, Band II). Mit 22 Farbentafeln u. 188 Textabbildungen. Geh. 14.70, geb. 18.40 M.

Die gefiederten Sängerfürsten des europäischen Festlandes, ihre Naturgeschichte, sachgemäße Käfigung, Behandlung und Pflege als Stubenvögel. Von Mathias Rausch. 2. Auflage. Mit 3 Farbendrucktafeln und 16 Textabbildungen. Kart. 2.40 M.

Die Hauptregeln der Sprosserpflege. Scherzreime von Oskar M. Kisch. Mit 2 Abbild. 1.20 M.

Der Dompfaff, seine Naturgeschichte, Pflege, Abrichtung u. Zucht. Auf Grund 54jähr. Erfahrung v. F. Schlag. 8.—10. Aufl. Mit 2 Schwarzdrucktafeln. Kart. 1.20 M.

Die deutschen Sumpf- und Strandvögel. Von Dr. Curt Floericke. Mit 44 Abbildungen auf 15 Tafeln in Schwarzdruck. Kart. 5.40 M.

Die deutschen Schwimm- und Wasservögel. Von Dr. Curt Floericke. Mit ca. 45 Abbildungen auf 15 Tafeln in Schwarzdruck. Kart. 5.40 M.

Die mitteleuropäischen Vögel. Von Dr. E. Bade. Band I. Singvögel. Mit 1 Farbentafel, 4 Schwarzdrucktafeln, 31 Taf. in Photographiedruck, fast ausschl. nach Aufnahmen lebender Vögel und 144 Textabbildungen von Nestern, Eiern und Vogelteilen. Geh. 3.60 M., geb. 4.80 M.

Allerlei sprechendes gefiedertes Volk. (Raben und Krähenvögel, Starvögel usw.) Ein Hand- und Lehrbuch von Dr. Karl Ruß. Mit 5 Vollbildern in Schwarzdruck. Kart. 3.60 M.

Gefiederte Hausfreunde I. Von Karl Neunzig. Kurze Unterweisung über die Pflege heimischer Stubenvögel. Kart. 1.20 M.

Für Liebhaber fremdländischer Vögel.

Die fremdländischen Stubenvögel, ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht. Von Karl Neunzig (zugleich 5. Auflage des Dr. Karl Ruß'schen Handbuchs für Vogelliebhaber Band I). Mit 42 Farbentafeln und 400 Textabbildungen. Geh. 33.—, geb. 38.50 M.

Neunzigs fremdländische Vogeltypen. Eine Farbentafel in Größe 38×27 cm mit Erläuterungen. 1.80 M.

Gefiederte Hausfreunde II. Von Karl Neunzig. Kurze Unterweisung über die Pflege fremdländischer Stubenvögel. Mit 51 Abbildungen. Kart. 1.20 M.

Dr. Karl Ruß, Die fremdländischen Stubenvögel, ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.
Bd. I—IV. Geh. od. in Halbleder geb. Preis n. Anfrage.
Bd. I. Körnerfresser ist einzeln nicht käuflich.

Die Prachtfinken, ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht. Von Dr. Karl Ruß. Zweite, illustrierte Aufl. mit 1 Farbendruckbilde. Geheftet 2.40 M.

Webervögel und Widafinken, ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht. Von Dr. Karl Ruß. Kart. 3.60 M.

Bilder aus der Vogelstube. Schilderungen aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel. Von Dr. Karl Ruß. Kart. 4.80 M.

Für Papageien-Pfleger.

Der Wellensittich, seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht. Von Dr. Karl Ruß. Sechste, von Karl Neunzig gänzlich umgearbeitete und vermehrte Auflage. Mit 1 Farbentafel und 31 Textabbildungen. Kart. 2.40 M.

Sprechende Papageien. Ein Hand- und Lehrbuch von Dr. Karl Ruß. 3. verb. Aufl. Mit 2 Farbendruck- u. 32 Schwarzdrucktafeln. Kart. 5.40 M.

Der Graupapagei, seine Naturgeschichte, Pflege, Abrichtung und Züchtung. Von Dr. Karl Ruß. Zweite, von Karl Neunzig bearbeitete Auflage. Mit einem buntfarbigen Aquarelldruck, 16 Textabbildungen und 1 Verbreitungskarte. Kart. 2.40 M.

Der Graupapagei in der Freiheit und in der Gefangenschaft. Von Dr. Carl R. Hennicke. Mit 1 Buntbild. Geheftet 1.80 M.

Die Amazonen-Papageien, ihre Naturgeschichte, Pflege, Abrichtung und Züchtung. Von Dr. Karl Ruß. Zweite, von Karl Neunzig bearbeitete und vermehrte Auflage. Mit 1 buntfarbigen Aquarelldruck und 21 Textabbildungen. Kart. 2.40 M.

Behandlung und Heilung der Krankheiten von grauen und grünen Papageien. Von O. Majewski. Geheftet 1.80 M.

Für Kanarienzüchter.

Der Kanarienvogel, seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht. Von Dr. Karl Ruß. 14. Auflage mit 3 Farbentafeln und zahlreichen Textbildern. Bearbeitet und herausgegeben von Karl Neunzig. Kart. 2.40 M.

Die Farben- und Gestaltskanarien nebst Beschreibung aller verschiedenen Kanarienrassen, deren Entstehung, Form und Farbenveränderung, Bastardzucht und Farbenfütterung von C. L. W. Noorduijn-Groningen. Mit 22 stichhaltigen Abbildungen. Kart. 2.40 M.

Der Kanariengesang. Allgemeinverständliche sowie musikalische und phonetische Darstellung von W. Kluhs. 1.20 M.

Vogelschutz.

Handbuch des Vogelschutzes. Von Prof. Dr. C. Hennicke. Mit 9 Tafeln in Doppelton, 1 Karte und mehr als 200 Textabbildungen. Geh. 8.80 M.

Für Geflügelzüchter.

Der Brutapparat in der Geflügelzucht. Darstellung der Herkunft, Bauart, Nutzanwendung und Herstellung des Brutapparates von Max Schwarzlose. Mit 10 Abbildungen im Text. 1.20 M.

Für Sammler.

Der Präparator und Konservator. Eine praktische Anleitung zum Erlernen des Ausstopfens, Konservierens und Skelettierens von Vögeln und Säugetieren. Für Naturfreunde herausgegeben von Rob. Voegler. 4. verbesserte und erweiterte Auflage. Mit 38 Abbildungen im Text. 2.40 M.

Der philosophische Bauer oder Anleitung, die Natur durch Beobachtung und Versuche zu erforschen von Johann Andreas Naumann. Neudruck nach der ersten Original-Ausgabe von 1791, besorgt und herausgegeben von Paul Leverkühn. Geh. —.60 M.

Die angeführten Preise sind Grundpreise, die mit der vom Börsenverein der Deutschen Buchhändler von Zeit zu Zeit bestimmten Teuerungszahl (Schlüsselzahl) zu multiplizieren sind. Die jeweilige Schlüsselzahl ist vom Verlage oder in jeder Buchhandlung zu erfahren! Beispiel: Grundpreis 2.— ℳ, Schlüsselzahl 2000 = 4000 ℳ Ladenpreis.

Für Auslandslieferungen: Nach dem hochvalutigen Ausland 200% Zuschlag. Nach dem mittelvalutigen Ausland 120% Zuschlag.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg

Postscheckkonto: Magdeburg 3148 Postschließfach 148

Suche

Gefiederte Welt Jahrgänge 1874 und 1890, Monatsschrift des Vereins zum Schutze der Vogelwelt Jahrgänge 1876 und 1877, Ornitholog. Monatsberichte Jahrg. 1922 (auch mit kurzer Reihe anderer Jahrgänge). [264
Otto Bretschneider, Neustadt i. Sa.

Tausche 14 Jhrg. Gef. Welt ungeb. m. Farbentaf. geg. Zuchtp. Wellensitt. o. Jf.-Kan. 265] **G. Feddern, Lübeck, Arnimstr. 11.**

Suche 1,0 Zebrafink. 0,1 Möwchen, zuchtfähig, ev. leihweise gegen Abgabe von Jungen. [266
Frau von Zeschau, Buchschlag (Hessen).

Vertausche [267
nachstehende Bücher
gegen jede Art einheimische Körner- und Weichfresser:
„Ruß" Vogelzuchtbuch, geb., neu;
„ Weber vögel und Widafinken, geb., neu;
„ Die Prachtfinken, geb., neu;
Jahrgang 22 der Gef. Welt, ungeb.
Valentin Bohrer, Lorsch (Hessen), Wormser Straße 29.

Zu verkaufen

2 Glaskasten
mit 20 exotischen Vögeln

künstlerisch zusammengestellt, enthaltend **2 Papua-Paradiesvögel, 1 Allfarblori, 1 Prachtparadiesvogel, 2 Königsparadiesvögel, 2 Edelpapageien, 2 Paradiesdrosseln, 2 Fächertauben, 1 Fruchttaube, 1 Seidenlist, 2 Gelbnackenlist, 1 Schwarzkopf-Pitter, 1 Pitter, 1 Vogel unbekannt.** [268
Zu besichtigen und Offerten erbeten.

G. Landmann,
Oberlahnstein a. Rhein,
Villa Rheineck.

Im Interesse unserer verehrl. Abonnenten bitten wir das

Abonnement auf die „Gefiederte Welt"

rechtzeitig erneuern

zu wollen. Die Gefiederte Welt kann sowohl **durch den Buchhandel** als auch **beim Postamt für 750 Mk. für den Monat April** bestellt werden.

Direkte Zusendung vom Verlage kann nur noch ausnahmsweise und **nur gegen vorherige Einsendung von 850.— Mk.** für Monat April — Postscheckkonto Magdeburg 3148 — erfolgen, nach dem **Ausland** nur gegen Einsendung von **2 Schweizer Franken** (bzw. in entsprechender Umrechnung in anderer Währung zum Tageskurs) in Kassenscheinen für das **Vierteljahr.**

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg
Postfach 148

Bitte!

In eigenem Interesse wollen die pp. Einsender beachten, daß
a) **alle für die Redaktion** der „Gefiederten Welt" bestimmten **Zuschriften** (Sprechsaal-Anfragen und -Antworten, Vereinsnachrichten usw.) und **Sendungen** (tote Vögel, Manuskripte) nur an **Herrn Karl Neunzig, Hermsdorf bei Berlin,** Neue Bismarckstr.,
b) **alle Bestellungen** auf **Abonnements, Inserate** und dergl. Geschäftliches nur an die **Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg,** Postschließfach 148,
zu richten sind.

Gebe ab:

Dr. K. Ruß: Vogelzuchtbuch, 3. neubearb. Aufl., geb., neu;
„ „ „ Der Kanarienvogel, 13. Aufl., geh.;
„ „ „ Der Wellensittich, 6. Aufl., geh.;
M. Rausch: Sängerfürsten, geb., neu;
W. Noorduijn: Farben und Gestaltskanarien, geh.;
K. Neunzig, Gefied. Hausfreunde (II. Fremdl. Stubenvögel);
F. Schlag: Der Dompfaff [269

geg. 1 Zuchtpaar Wellensittiche Prachtfinken od. 1,0 Papagei.

Bücher alle wie neu. Wert 50—60 000 *M.*
Sende zuerst, da Angebot reell.
Fr. Krüger, Berlin-Lichtenberg, Tasdorfer Straße 54 II.

Vertausche Amsel, Buchfink, Flug-Weichfresser-Käfig, Gef. Welt 1922 **gegen** Mönch-, Sperber-, Dorngrasmücke, Singdrossel, Braunelle, Hänfling-Stieglitz-Bastard, Ameiseneier, Weißw., Mehlwürmer.
270] **Galle, Forst L., Trieblerstraße 60.**

1,1 Nymphensittich, 1,0 Alpenlerche, tadellos, vertausche gegen Naumann oder Brehm, letzte Auflage. Dr. Kayser, Magdeburg, Landesfrauenklinik. [271

Suche 0,1 Schama, 0,6 Rotkopfamandinen, 0,1 Zebra gegen bar od. Tausch aus m. Beständen, siehe Jahrb. 1923.
272] **Pracht, Düsseldorf-Gerresheim.**

Junger Mann (18), [273
Vogelliebhaber,
sucht Anschluß an Gleichgesinnten.
Gefl. Zuschriften erbeten an
A. Haberecht, Berlin W 15, Pariser Straße 15.

Zur gefälligen Beachtung!

§ 3 des am 1. September 1908 in Kraft getretenen „Vogelschutzgesetzes" lautet:

In **der Zeit vom ersten März bis zum ersten Oktober** ist das Fangen und die Erlegung von Vögeln sowie der Ankauf, der Verkauf und das **Feilbieten,** die **Vermittlung** eines hiernach verbotenen An- und Verkaufs, die Ein-, Aus- und Durchfuhr von lebenden sowie toten Vögeln der **in Europa einheimischen** Arten überhaupt, ebenso der Transport solcher Vögel zu Handelszwecken untersagt.

Dieses Verbot erstreckt sich für **Meisen, Kleiber, Baumläufer, Spechte, Eulen** und **verschied. Falken** für das **ganze Jahr.**

Auf Grund dieses können wir vom **1. März an** Inserate betreffend **Kauf** und **Verkauf einheimischer** Vögel nicht mehr zum Abdruck bringen und bitten, dies bei Aufgabe von Inseraten berücksichtigen zu wollen.

Unter Feilbieten ist das Anbieten zum Kaufe oder zu **sonstigem Erwerbe** zu verstehen. Somit ist ein strafbares Feilbieten auch dann anzunehmen, wenn in einer Anzeige zwar dem Wortlaut nach ein **Tausch** angeboten wird, der Anbietende aber tatsächlich zu kaufen bzw. zu tauschen beabsichtigt und die Form des Tauschangebots nur wählt, um sich gegen strafrechtliche Verfolgung zu sichern. In solchen Fällen machen sich sowohl die anzeigenden Personen wegen verbotenen Feilbietens als auch die die Anzeigen veröffentlichenden Zeitungsunternehmer der verbotenen Vermittlung eines An- und Verkaufs strafbar.

Bei Tauschanzeigen ist ausdrücklich anzugeben, was als Gegenleistung geboten oder gesucht wird. Eine Angabe des Wertes der zum Tausch angebotenen Vögel darf nicht erfolgen! Unter Chiffre können derartige Anzeigen nicht aufgenommen werden!

Die Geschäftsstelle der „Gefiederten Welt"
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Inserate

für das am 5. April 1923 zur Ausgabe gelangende Heft 7 der Gefiederten Welt erbitten bis 29. März früh.

Die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit **10 Pfg. Grundpreis** berechnet, der mit der vom „Börsenverein der Deutschen Buchhändler" bestimmten Teurungszahl — zurzeit „2000" — zu multiplizieren ist. — Auslandspreis —,10 Schweizer Franken.

Naturwissensch. Antiquariat

insbesondere **Ornithologie, Kleintierzucht** u. **Gartenbau** kauft laufend zu **angemessenem Preis**

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg,
Postschließfach 148

Empfehlenswerte Bücher für Vogelfreunde

Preis und Lieferbarkeit freibleibend!

Für Freunde der heimischen Vogelwelt.

Die deutsche Vogelwelt nach ihrem Standort. Ein Beitrag zur Zoogeographie Deutschlands und zugleich ein Exkursionsbuch zum Kennenlernen der Vögel. Von Werner Hagen. Mit 74 Abbildungen u. 4 Schwarzdrucktafeln. Kart. 3.60 M.

Die einheimischen Stubenvögel, ihre Naturgeschichte und Zucht. Von Karl Neunzig (zugleich 6. Auflage des Dr. Karl Ruß'schen Handbuchs für Vogelliebhaber, Band II). Mit 22 Farbentafeln u. 188 Textabbildungen. Geh. 14.70, geb. 18.40 M.

Die gefiederten Sängerfürsten des europäischen Festlandes, ihre Naturgeschichte, sachgemäße Käfigung, Behandlung und Pflege als Stubenvögel. Von Mathias Rausch. 2. Auflage. Mit 3 Farbendrucktafeln und 16 Textabbildungen. Kart. 2.40 M.

Die Hauptregeln der Sprosserpflege. Scherzreime von Oskar M. Kisch. Mit 2 Abbild. 1.20 M.

Der Dompfaff, seine Naturgeschichte, Pflege, Abrichtung u. Zucht. Auf Grund 54jähr. Erfahrung v. F. Schlag. 8.—10. Aufl. Mit 2 Schwarzdrucktafeln. Kart. 1.20 M.

Die deutschen Sumpf- und Strandvögel. Von Dr. Curt Floericke. Mit 44 Abbildungen auf 15 Tafeln in Schwarzdruck. Kart. 5.40 M.

Die deutschen Schwimm- und Wasservögel. Von Dr. Curt Floericke. Mit ca. 45 Abbildungen auf 15 Tafeln in Schwarzdruck. Kart. 5.40 M.

Die mitteleuropäischen Vögel. Von Dr. E. Bade. Band I. Singvögel. Mit 1 Farbentafel, 4 Schwarzdrucktafeln, 31 Taf. in Photographiedruck, fast ausschl. nach Aufnahmen lebender Vögel und 144 Textabbildungen von Nestern, Eiern und Vogelteilen. Geh. 3.60 M., geb. 4.80 M.

Allerlei sprechendes gefiedertes Volk. (Raben und Krähenvögel, Starvögel usw.) Ein Hand- und Lehrbuch von Dr. Karl Ruß. Mit 5 Vollbildern in Schwarzdruck. Kart. 3.60 M.

Gefiederte Hausfreunde I. Von Karl Neunzig. Kurze Unterweisung über die Pflege heimischer Stubenvögel. Kart. 1.20 M.

Für Liebhaber fremdländischer Vögel.

Die fremdländischen Stubenvögel, ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht. Von Karl Neunzig (zugleich 5. Auflage des Dr. Karl Ruß'schen Handbuchs für Vogelliebhaber Band I). Mit 42 Farbentafeln und 400 Textabbildungen. Geh. 33.—, geb. 38.50 M.

Neunzigs fremdländische Vogeltypen. Eine Farbentafel in Größe 38×27 cm mit Erläuterungen. 1.80 M.

Gefiederte Hausfreunde II. Von Karl Neunzig. Kurze Unterweisung über die Pflege fremdländischer Stubenvögel. Mit 51 Abbildungen. Kart. 1.20 M.

Dr. Karl Ruß, Die fremdländischen Stubenvögel, ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.
Bd. I—IV. Geh. od. in Halbleder geb. Preis n. Anfrage.
Bd. I. Körnerfresser ist einzeln nicht käuflich.

Die Prachtfinken, ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht. Von Dr. Karl Ruß. Zweite, illustrierte Aufl. mit 1 Farbendruckbilde. Geheftet 2.40 M.

Webervögel und Widafinken, ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht. Von Dr. Karl Ruß. Kart. 3.60 M.

Bilder aus der Vogelstube. Schilderungen aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel. Von Dr. Karl Ruß. Kart. 4.80 M.

Für Papageien-Pfleger.

Der Wellensittich, seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht. Von Dr. Karl Ruß. Sechste, von Karl Neunzig gänzlich umgearbeitete und vermehrte Auflage. Mit 1 Farbentafel und 31 Textabbildungen. Kart. 2.40 M.

Sprechende Papageien. Ein Hand- und Lehrbuch von Dr. Karl Ruß. 3. verb. Aufl. Mit 2 Farbendruck- u. 32 Schwarzdrucktafeln. Kart. 5.40 M.

Der Graupapagei, seine Naturgeschichte, Pflege, Abrichtung und Züchtung. Von Dr. Karl Ruß. Zweite, von Karl Neunzig bearbeitete Auflage. Mit einem buntfarbigen Aquarelldruck, 16 Textabbildungen und 1 Verbreitungskarte. Kart. 2.40 M.

Der Graupapagei in der Freiheit und in der Gefangenschaft. Von Dr. Carl R. Hennicke. Mit 1 Buntbild. Geheftet 1.80 M.

Die Amazonen-Papageien, ihre Naturgeschichte, Pflege, Abrichtung und Züchtung. Von Dr. Karl Ruß. Zweite, von Karl Neunzig bearbeitete und vermehrte Auflage. Mit 1 buntfarbigen Aquarelldruck und 21 Textabbildungen. Kart. 2.40 M.

Behandlung und Heilung der Krankheiten von grauen und grünen Papageien. Von O. Majewski. Geheftet 1.80 M.

Für Kanarienzüchter.

Der Kanarienvogel, seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht. Von Dr. Karl Ruß. 14. Auflage mit 3 Farbentafeln und zahlreichen Textbildern. Bearbeitet und herausgegeben von Karl Neunzig. Kart. 2.40 M.

Die Farben- und Gestaltskanarien nebst Beschreibung aller verschiedenen Kanarienrassen, deren Entstehung, Form und Farbenveränderung, Bastardzucht und Farbenfütterung von C. L. W. Noorduijn-Groningen. Mit 22 stichhaltigen Abbildungen. Kart. 2.40 M.

Der Kanariengesang. Allgemeinverständliche sowie musikalische und phonetische Darstellung von W. Kluhs. 1.20 M.

Vogelschutz.

Handbuch des Vogelschutzes. Von Prof. Dr. C. Hennicke. Mit 9 Tafeln in Doppelton, 1 Karte und mehr als 200 Textabbildungen. Geh. 8.80 M.

Für Geflügelzüchter.

Der Brutapparat in der Geflügelzucht. Darstellung der Herkunft, Bauart, Nutzanwendung und Herstellung des Brutapparates von Max Schwarzlose. Mit 10 Abbildungen im Text. 1.20 M.

Für Sammler.

Der Präparator und Konservator. Eine praktische Anleitung zum Erlernen des Ausstopfens, Konservierens und Skelettierens von Vögeln und Säugetieren. Für Naturfreunde herausgegeben von Rob. Voegler. 4. verbesserte und erweiterte Auflage. Mit 38 Abbildungen im Text. 2.40 M.

Der philosophische Bauer oder Anleitung, die Natur durch Beobachtung und Versuche zu erforschen von Johann Andreas Naumann. Neudruck nach der ersten Original-Ausgabe von 1791, besorgt und herausgegeben von Paul Leverkühn. Geh. —.60 M.

Die angeführten Preise sind Grundpreise, die mit der vom Börsenverein der Deutschen Buchhändler von Zeit zu Zeit bestimmten Teuerungszahl (Schlüsselzahl) zu multiplizieren sind. Die jeweilige Schlüsselzahl ist in jeder Buchhandlung oder vom Verlage zu erfahren! Beispiel: Grundpreis 2.— ℳ×Schlüsselzahl 2000 = 4000 ℳ Ladenpreis. Anfragen ist das Porto für die Antwort beizufügen.
Für Auslandslieferungen: Nach dem hochvalutigen Ausland 200% Zuschlag. Nach dem mittelvalutigen Ausland 120% Zuschlag.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg

Postscheckkonto: Magdeburg 3148 Postschließfach 148

Vögel

Graupapagei
zu kaufen gesucht,
auch Kakadu oder Ara. Nach Schönheit und Leistungen wird **allerhöchster** Preis geboten. Ausführliches Angebot an **Eduard Albrecht, Mülheim (Ruhr), postlagernd.** [281

Tiere u. Vögel
aller Zonen
kauft zu höchsten Preisen
Zoolog. Import u. Export
Carl Frank, Hamburg 27,
Bill. Röhrendamm 52. [282

Gebe ab
1,0 Bandfink, 1,0 Astrild, 1,0 Tigerfink.
Suche
1,0 Zebrafink und Zuchtpaar japan. Möwchen. [283
Syré, Lehrer, **Viernau i. Thür.**

Vertausche 3 Paar Wellensittiche auf ein gebr. Damen- oder Herrenfahrrad. Zahle noch etwas zu.
Syré, Lehrer, **Viernau i. Thür.** [284

Tausche und suche!
Tausche 1,1 Goldstirnsittiche, 1,1 Turtel-, Hohl- und Ringeltauben mit Königsfasanhähnen und anderen Exoten. **Kaufe auch!** Angebote an [285
Albert Hüsken,
Meerbeck b. Mörs, Bismarckstr. 43.

Dorngrasmücke, Gartengrasmücke, Sperbergrasmücke u. Laubvögel in Tausch gegen Nützliches gesucht. [286
Weber, Raboisen 56, **Hamburg 1.**

1,1 Graudelsänger,
1,1 graue Kardinäle,
1,1 Silberschnäbel,
1,1 Paradieswitwen,
1,1 Weber
gegen andere Exoten (Wellensittiche, Zebrafinken oder Papagei) zu tauschen.
Hans Miehe, [287
Magdeburg, Lüneburger Str. 7, II.

Verkaufe oder tausche
Grünpapagei gegen Kanarien oder Nützliches. **Julius Pfeffer,**
Kassel, Judenbrunnen 11. [288

Tausche Wellensittich 1,0, grün, 11 Monate, schön großes Tierchen, gegen Steinrötel 1,0 oder Pirol oder Singdrossel und Sperbergrasmücke. Düsseldorfer oder Cölner Umgegend bevorzugt. **Jean Kuypers,** Rheydt, Moltkestraße 147. [289

la chin. Nachtigall,
Singdrossel u. deutsche Nachtigall, Wildfänge 21 gegen **Distelfinken, Hänflinge, Dompfaffen** oder **Bastarde** zu vertauschen. [290
St. Welter, Drogerie, Merzig.

Nymphensittiche!
Kaufe 1 Weibchen, gebe ab 1 Männchen.
E. Stümcke, Bauvorsteher,
Vegesack (Bremen). A. Z 258. [291

1 Paar Zebrafinken
oder andere leicht brütende Exoten zu kaufen gesucht. [292
Thilo Becker,
Schwerin i. M., Helenenstr. 1.

Rote Kardinäle, verschiedene Trupiale, Zwergdrossel, Elsterstar, Tukan, Kernbeißer, Schwarzgimpelfinken, Papstfinken, Orangeblaufinken, Indigofinken, Kubafinken, Schuppenwachteln, Goldstirnsittiche, Kakadusittiche, chin. Nachtigallen, blaue Reisfinken, Schwarzkopfnonnen. Antwort nur gegen Rückporto. [293
E. W. Lenger, Berlin, Schönhauser Allee 70 a.

Verkaufe od. vertausche
ff. große Werke für Jäger und Liebhaber gegen Höchstgebot. 3 Bände „Wild und Hund", Jahrg. 08, 09, 10 und 6 Bände St. Hubertus, Jahrg. 05, 06, 07, 08, 09, 10. Sämtliche Bücher ff. gebunden, wie neu erhalten, mit Illustrationen und kolor. Kunstbeilagen. In Tausch nehme Kanarien, Zuchtpaare Exoten, Waldv., Körnerfr., Grammoph., Fahrrad, Nähmaschine od. sonst Nützl.
Franz Edlhofer, München,
Dachauer Str. 147/II, l. 2. A. [294

Suche
Gefiederte Welt Jahrgänge 1874 und 1890, Monatsschrift des Vereins zum Schutze der Vogelwelt Jahrgänge 1876 und 1877, Ornitholog. Monatsberichte Jahrg. 1922 (auch mit kurzer Reihe anderer Jahrgänge). [295
Otto Bretschneider, Neustadt i. Sa.

Vertausche:
prima Heidelerche u. **Rotkehlchen** gegen **prima Singdrossel.** [296
F. Zschau, Frankenberg i. Sa., Markt 15.

Wir suchen laufend
nur vollständige Jahrgänge und ganze Reihen, gebunden oder in Heften mit Titel, Inhaltsverzeichnis u. Farbentafeln
Gefiederte Welt
Journal für Ornithologie
Blätter für Aquarien- u. Terrarienfreunde
zu angemessenen Preisen.
Angebote nur **mit** Preisen erbeten.
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg
Postschließfach 148.

Verkaufe gegen Höchstgebot
2 garant. Zuchtpaare **jap. Möwchen,** schon 2 mal brütend,
3 Prachtfinkenkäfige,
2 Wellensittichkäfige mit je 2 Nistkästen,
8 Pfund Prachtfinkenfutter, Hirse aller Art usw., diverse Futternäpfe, Badehäuschen. [297
Offerten unter **„Gut Zucht"** an die Expedition der „Gefiederten Welt".

Inserate

für das am 19. April 1923 zur Ausgabe gelangende Heft 8 der Gefiederten Welt erbitten bis 13. April früh.

Die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit **10 Pfg. Grundpreis** berechnet, der mit der vom „Börsenverein der Deutschen Buchhändler" bestimmten Teurungszahl — zurzeit „2000" — zu multiplizieren ist. — Auslandspreis —,10 Schweizer Franken.

Naturwissensch. Antiquariat
insbesondere **Ornithologie, Kleintierzucht** u. **Gartenbau** kauft laufend zu **angemessenem Preis**
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg,
Postschließfach 148

Für Beobachtungs-Ausflüge in Mitteldeutschland das beste Buch: Schacht's Vogelwelt (des Teutob. Waldes). 270 Seiten, 30 farb. Tafeln nach den „Naumann-Bildern", feiner Leinenband. Nur noch 2400 *M.* Porto und Verpackung besonders. Enthält eigene Beobachtungen und gute Schilderungen. Vorzügliche Ausstattung. **Äußerst billiger Preis.** Vorrat knapp. Sofortige Bestellung ratsam.
A. Troschütz, Hannover,
Gr. Aegidienstraße 4. [298

„Ornis" [299
Freie Bezugs-Vereinigung der Waldvogel-Liebhaber Deutschlands
bestand von 1912 bis 1. Oktober 1920. Durch sachgemäße und reelle Belieferung der Mitglieder mit Vogelfutter u. Bedarfsartikeln erwarb sie sich einen Ruf, der noch fortbesteht. — Auf vielseitigen Wunsch bringe ich diese Tatsache in Erinnerung, auch allen denjenigen, die von dem Bestehen derselben noch keine Kenntnis haben. — Ein **Benachrichtigungsblatt** kann leider **nicht** mehr erscheinen, doch ist das Ornis-Haus nach wie vor bestrebt, die besten von allen am Markte erhältlichen Artikeln zu liefern; das mir geschenkte Vertrauen werde ich weiter zu erhalten wissen. — Über meine Tätigkeit gibt das „Ornis-Buch" Auskunft. Rabatt kann **nicht** mehr gewährt werden, doch kommen nur brauchbare Mischungen zum Versand. Bei Anfragen erbitte ausreichendes Rückporto und Angabe der vorhandenen Vogelarten. — Auskunft bereitwilligst. Bücher und Blätter sende für 800 Mk. frei (Ausland 2400 Mk.)
Ornis-Haus, Halle a. S.
Fernruf 4198
„Reform · Normal"-Weichfutter nach Angabe des Herrn Apotheker Adalbert Jena-Biberach-Riß. Moderner elektr Betrieb. Gleichmäßige Körnung, restloser Verbrauch garantiert.

Suche 1,1 Zebrafink, 1,1 japan. Möwchen, gar. zuchtfähig. Ang. m. Preis an **A.-G. v. Zitzewitz,** Berlin W 50, Kurfürstendamm 243. [300

Voliere,
1 m hoch, 0,70 m tief, 1,10 m lang, geeignet als Flug- und Heckkäfig, verkauft **F. Keller,** Berlin-Steglitz, Rheinstraße 43. [301

Gefiederte Welt
verschiedene Jahrgänge, am liebsten in Originaleinband, zu kaufen gesucht. Angebote mit Preisangabe an [302
Hans Lohmar, Ing., Köln,
Blumenstraße 1.

Im Auftrage einer Beamtenwitwe zu verkaufen: **Naumann,** 2 Orig.-Bände, gegen Höchstgebot. [303
E. Albrecht, Bischofswerda (Sachsen).

Naumann, Vögel ges. Bd. 1, 6, 8, 9, 10, 11. Obl. **Günther,** Lommatzsch (Sa.). [304

Tausche
folgende Bücher, alle gut erhalten: Geschichte der deutschen Literatur von Emil Brenning, 800 Seiten stark; Lamberts Schmetterlingsbuch, 200 Seiten, 20 Farbentafeln; Der Wellensittich von Karl Ruß; Der Dompfaff von F. Schlag; Einheimische Stubenvögel von K. Neunzig; Fremdländische Stubenvögel von K. Neunzig gegen Wellensittiche oder leicht züchtbare Exoten. [305
Paul Ruschka, Rübeland (Harz).

Suche
für längere Zeit (2—3 Monate) Landaufenthalt in gesunder waldr. Gegend. Gute, kräftige Kost, Ruhe. Angebote an Studienrat **Grabel, Essen (Ruhr),** Ginsterweg 43, I. [306

Empfehlenswerte Bücher für Vogelfreunde

Preis und Lieferbarkeit freibleibend!

Für Freunde der heimischen Vogelwelt.

Die deutsche Vogelwelt nach ihrem Standort. Ein Beitrag zur Zoogeographie Deutschlands und zugleich ein Exkursionsbuch zum Kennenlernen der Vögel. Von Werner Hagen. Mit 74 Abbildungen u. 4 Schwarzdrucktafeln. Kart. 3.60 M.

Die einheimischen Stubenvögel, ihre Naturgeschichte und Zucht. Von Karl Neunzig (zugleich 6. Auflage des Dr. Karl Ruß'schen Handbuchs für Vogelliebhaber, Band II). Mit 22 Farbentafeln u. 188 Textabbildungen. Geh. 14.70, geb. 18.40 M.

Die gefiederten Sängerfürsten des europäischen Festlandes, ihre Naturgeschichte, sachgemäße Käfigung, Behandlung und Pflege als Stubenvögel. Von Mathias Rausch. 2. Auflage. Mit 3 Farbendrucktafeln und 16 Textabbildungen. Kart. 2.40 M.

Die Hauptregeln der Sprosserpflege. Scherzreime von Oskar M. Kisch. Mit 2 Abbild. 1.20 M.

Der Dompfaff, seine Naturgeschichte, Pflege, Abrichtung u. Zucht. Auf Grund 54jähr. Erfahrung v. F. Schlag. 8.—10. Aufl. Mit 2 Schwarzdrucktafeln. Kart. 1.20 M.

Die deutschen Sumpf- und Strandvögel. Von Dr. Curt Floericke. Mit 44 Abbildungen auf 15 Tafeln in Schwarzdruck. Kart. 5.40 M.

Die deutschen Schwimm- und Wasservögel. Von Dr. Curt Floericke. Mit ca. 45 Abbildungen auf 15 Tafeln in Schwarzdruck. Kart. 5.40 M.

Die mitteleuropäischen Vögel. Von Dr. E. Bade. Band I. Singvögel. Mit 1 Farbentafel, 4 Schwarzdrucktafeln, 31 Taf. in Photographiedruck, fast ausschl. nach Aufnahmen lebender Vögel und 144 Textabbildungen von Nestern, Eiern und Vogelteilen. Geh. 3.60 M., geb. 4.80 M.

Allerlei sprechendes gefiedertes Volk. (Raben und Krähenvögel, Starvögel usw.) Ein Hand- und Lehrbuch von Dr. Karl Ruß. Mit 5 Vollbildern in Schwarzdruck. Kart. 3.60 M.

Gefiederte Hausfreunde I. Von Karl Neunzig. Kurze Unterweisung über die Pflege heimischer Stubenvögel. Kart. 1.20 M.

Für Liebhaber fremdländischer Vögel.

Die fremdländischen Stubenvögel, ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht. Von Karl Neunzig (zugleich 5. Auflage des Dr. Karl Ruß'schen Handbuchs für Vogelliebhaber Band I). Mit 42 Farbentafeln und 400 Textabbildungen. Geh. 33.—, geb. 38.50 M.

Neunzigs fremdländische Vogeltypen. Eine Farbentafel in Größe 38×27 cm mit Erläuterungen. 1.80 M.

Gefiederte Hausfreunde II. Von Karl Neunzig. Kurze Unterweisung über die Pflege fremdländischer Stubenvögel. Mit 51 Abbildungen. Kart. 1.20 M.

Dr. Karl Ruß, Die fremdländischen Stubenvögel, ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.
Bd. I—IV. Geh. od. in Halbleder geb. Preis n. Anfrage.
Bd. I. Körnerfresser ist einzeln nicht käuflich.

Die Prachtfinken, ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht. Von Dr. Karl Ruß. Zweite, illustrierte Aufl. mit 1 Farbendruckbilde. Geheftet 2.40 M.

Webervögel und Widafinken, ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht. Von Dr. Karl Ruß. Kart. 3.60 M.

Bilder aus der Vogelstube. Schilderungen aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel. Von Dr. Karl Ruß. Kart. 4.80 M.

Für Papageien-Pfleger.

Der Wellensittich, seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht. Von Dr. Karl Ruß. Sechste, von Karl Neunzig gänzlich umgearbeitete und vermehrte Auflage. Mit 1 Farbentafel und 31 Textabbildungen. Kart. 2.40 M.

Sprechende Papageien. Ein Hand- und Lehrbuch von Dr. Karl Ruß. 3. verb. Aufl. Mit 2 Farbendruck- u. 32 Schwarzdrucktafeln. Kart. 5.40 M.

Der Graupapagei, seine Naturgeschichte, Pflege, Abrichtung und Züchtung. Von Dr. Karl Ruß. Zweite von Karl Neunzig bearbeitete Auflage. Mit einem buntfarbigen Aquarelldruck, 16 Textabbildungen und 1 Verbreitungskarte. Kart. 2.40 M.

Der Graupapagei in der Freiheit und in der Gefangenschaft. Von Dr. Carl R. Hennicke. Mit 1 Buntbild. Geheftet 1.80 M.

Die Amazonen-Papageien, ihre Naturgeschichte, Pflege, Abrichtung und Züchtung. Von Dr. Karl Ruß. Zweite, von Karl Neunzig bearbeitete und vermehrte Auflage. Mit 1 buntfarbigen Aquarelldruck und 21 Textabbildungen. Kart. 2.40 M.

Behandlung und Heilung der Krankheiten von grauen und grünen Papageien. Von O. Majewski. Geheftet 1.80 M.

Für Kanarienzüchter.

Der Kanarienvogel, seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht. Von Dr. Karl Ruß. 14. Auflage mit 3 Farbentafeln und zahlreichen Textbildern. Bearbeitet und erausgegeben von Karl Neunzig. Kart. 2.40 M.

Die Farben- und Gestaltskanarien nebst Beschreibung aller verschiedenen Kanarienrassen, deren Entstehung, Form und Farbenveränderung, Bastardzucht und Farbenfütterung von C. L. W. Noorduijn-Groningen. Mit 22 stichhaltigen Abbildungen. Kart. 2.40 M.

Der Kanariengesang. Allgemeinverständliche sowie musikalische und phonetische Darstellung von W. Kluhs. 1.20 M.

Vogelschutz.

Handbuch des Vogelschutzes. Von Prof. Dr. C. Hennicke. Mit 9 Tafeln in Doppelton, 1 Karte und mehr als 200 Textabbildungen. Geh. 8.80 M.

Für Geflügelzüchter.

Der Brutapparat in der Geflügelzucht. Darstellung der Herkunft, Bauart, Nutzanwendung und Herstellung des Brutapparates von Max Schwarzlose. Mit 10 Abbildungen im Text. 1.20 M.

Für Sammler.

Der Präparator und Konservator. Eine praktische Anleitung zum Erlernen des Ausstopfens, Konservierens und Skelettierens von Vögeln und Säugetieren. Für Naturfreunde herausgegeben von Rob. Voegler. 4. verbesserte und erweiterte Auflage. Mit 38 Abbildungen im Text. 2.40 M.

Der philosophische Bauer oder Anleitung, die Natur durch Beobachtung und Versuche zu erforschen von Johann Andreas Naumann. Neudruck nach der ersten Original-Ausgabe von 1791, besorgt und herausgegeben von Paul Leverkühn. Geh. —.60 M.

Die angeführten Preise sind Grundpreise, die mit der vom Börsenverein der Deutschen Buchhändler von Zeit zu Zeit bestimmten Teuerungszahl (Schlüsselzahl) zu multiplizieren sind. Die jeweilige Schlüsselzahl ist in jeder Buchhandlung oder vom Verlage zu erfahren! Beispiel: Grundpreis 2.— ℳ×Schlüsselzahl 2000 = 4000 ℳ Ladenpreis. Anfragen ist das Porto für die Antwort beizufügen.
Für Auslandslieferungen: Nach dem hochvalutigen Ausland 200% Zuschlag. Nach dem mittelvalutigen Ausland 120% Zuschlag.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg

Postscheckkonto: Magdeburg 3148 Postschließfach 148

Naumanns Naturgeschichte der Vögel

Wieder verfandbereit:
Band IX, a Tafeln, Schnepfenvögel II und Entenvögel I, mit 87 Vogel- und 108 Eierabbildungen. Beschränkte Vorräte! Bei Anfragen Rückporto anfügen!

Koehler's Verlag,
Dr. W. Koehler, Gera-R. [323

Billig zu verkaufen:

Brehm, Leben der Vögel, 3 Hefte 1000 ℳ und Porto; Diezel, Niederjagd 6. A. 1887, Lederrücken, mit Holzschnitten und farbigen Tafeln, gut erhalten 30 000 ℳ postfrei; Dombrowsky, Jagd-A-B-C., gut erhalten 7000 ℳ postfrei; Nordenflycht, Weidwerk, gut erhalten 2200 ℳ postfrei. Versand gegen Nachnahme oder Voreinsendung. [324
Hans Zieß, Fulda, Langebrücke 1, I.

Erbitte Offerten in Vogelfutter (Packung und lose) sowie Utensilien der Vogelliebhaberei zum Wiederverkauf. **Gust. Sichting,** Mücheln, Bez. Halle. [325

Vertausche 3 Paar Wellensittiche auf ein gebr. Damen- oder Herrenfahrrad. Zahle noch etwas zu.
Syré, Lehrer, Viernau i. Thür. [326

Im Auftrage einer Beamtenwitwe zu verkaufen: **Naumann,** 12 Orig.-Bände, gegen Höchstgebot. [327
E. Albrecht, Bischofswerda (Sachsen).

Verkaufe

Dr. Ruß, „Einh. Stubenvögel", geb., 1904, 13 Farbentafeln, für 10 000 ℳ und **Dr. Floericke,** „Der Vogelliebhaber", fast neu, für 1000 ℳ. [328
H. Eberhardt,
Nordhausen-Altendorf 36.

Kaufe oder tausche

2 Paar grüne Wellensittiche oder ein Paar irgendwelcher Großsittiche gegen einen neuen **Ia engl. Tennisschläger** oder gegen bar. [329
Julius Sauer, Leipzig,
Neumarkt 16, Sporthaus.

Ia Nachtigall,

zahm, im Gesang, gegen nur **Ia chin. Nachtigall** oder Gelbspötter zu vertauschen gesucht. [330
M. von der Acht,
Köln-Zollstock, Höningerweg 330.

Wir können zurzeit liefern:

Ornithologische Monatsschrift

1878, 1879, 1883, 1884, 1886—1906, 1908—1913, 1915—1920. Index I (1876—1887), Index II (1888—1899). Preis für den Jahrgang zurzeit 3000 M. — Ausland 2 Schweizer Franken — zuzüglich Porto und Verpackung. Zusendung erfolgt nur gegen Voreinsendung des Betrages oder unter Nachnahme. Versendungsspesen und Porto werden, wenn nicht beigefügt, durch Nachnahme erhoben.

Preis und Lieferbarkeit freibleibend!

Wir bitten sofort zu bestellen, da von mehreren Jahrgängen nur einzelne Exemplare vorhanden!

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg
Postscheckkonto: Magdeburg 3148 Postschließfach 148

Inserate

für das am 3. Mai 1923 zur Ausgabe gelangende Heft 9 der Gefiederten Welt erbitten bis 27. April früh.

Die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit **10 Pfg. Grundpreis** berechnet, der mit der vom „Börsenverein der Deutschen Buchhändler" bestimmten Teurungszahl — zurzeit „2500" — zu multiplizieren ist. — Auslandspreis —,10 Schweizer Franken.

Wir suchen laufend

nur vollständige Jahrgänge und ganze Reihen, gebunden oder in Heften mit Titel, Inhaltsverzeichnis u. Farbentafeln

Gefiederte Welt
Journal für Ornithologie
Blätter für Aquarien- u. Terrarienfreunde

zu angemessenen Preisen.
Angebote nur **mit** Preisen erbeten.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg
Postschließfach 148.

Von folgenden **Farbentafeln** der **„Gefiederten Welt"** sind noch einige Exemplare vorrätig, welche wir, solange der geringe Vorrat reicht, zum Preise von **1000 Mk. für die Tafel** zuzügl. **150 Mk.** Porto u. Verpackung **für jede Sendung** bei vorheriger Einsendung des Betrages auf unser Postscheckkonto **Magdeburg 3148** abgeben. Nach dem Ausland liefern wir nur mit Valutazuschlag nach vorheriger Vereinbarung.

1898 Tafel III: Schwarzspecht. (Schwarzdrucktafel.)
1899 Tafel I: Rotkehlchen, Blaukehlchen, Gelbspötter, Sumpfrohrsänger, Orpheusgrasmücke.
1899 Tafel IV: Nest des Gartenrotschwänzchens mit Weibchen, Jungem und Ei. (Schwarzdruck.)
1900 Tafel I: Madagaskar-, Napoleons-, dottergelber, Samt-, Blutschnabelweber.
1900 Tafel II: Kl. Alexander-, Bunt-, Wellensittich, Rosenpapagei, kl. Gelbhaubenkakadu.
1900 Tafel III: Sonnenvogel, blauer Hüttensänger, Rosenstar, Schamadrossel, weißohriger Bülbül.
1900 Tafel IV: Paradieswitwe, Mozambikzeisig, Grauer Kardinal, Safranfink, Papstfink.
1901 Tafel III: Kleinspecht, Kleiber, Wendehals.
1902 Tafel I: Kohl-, Schwanz-, Hauben-, Tannenmeise.
1902 Tafel II: Goldammer, Baumpieper, Feldlerche.
1902 Tafel IV: Diamant-, weißbäckige Gürtel-, Masken-, Gürtelamandine.
1903 Tafel I: Hausrotschwanz, Sprosser, Nachtigall, Rotkehlchen.
1903 Tafel II: Bluthänfling, Grünling, Kernbeißer, Buchfink.
1903 Tafel III: Mistel-, Wacholder-, Wein-, Singdrossel.
1903 Tafel IV: Zwergstrandläufer, Wachtel, weißflüglige Seeschwalbe, Sandregenpfeifer.
1904 Tafel I: Zaun-, Garten-, Dorn-, Mönchgrasmücke.
1904 Tafel II: Schneefink, Steindrossel, Alpenbraunelle, Steinsperling.
1904 Tafel III: Binden-, Kiefern-, Fichtenkreuzschnabel.
1904 Tafel IV: Bartmeise, Rohrammer, weiße Bachstelze, Sumpfrohrsänger.
1905 Tafel I: Schwarzbürzel-, Spitzschwanzbronzemännchen, weißes, gelbbuntes, braunbuntes jap. Mövchen.
1905 Tafel II: Grau-, Orange-, Erz- und Schmuckpfäffchen.
1905 Tafel IV: Schwarzkehl-, Dreifarben-, Weißkopf- und Schwarzkopfnonne.
1906 Tafel II: Lein-, Erlenzeisig, Berghänfling, Stieglitz.
1906 Tafel III: Stein-, braunkehliger und schwarzkehliger Wiesenschmätzer.
1907 Tafel II: Weißsterniges, rotsterniges, Wolfsches Blaukehlchen, Blaukehlchen ♀.
1907 Tafel III: Kleines, Zwerg-, Glanz-, Riesen-, rotrückiges und Gitterflügel-Elsterchen.
1907 Tafel IV: Karmin- und Hakengimpel, Gimpel.
1908 Tafel II: Braunrückengold- ♂♀, Schwarzkopf- u. Goldsperling ♂♀.
1908 Tafel IV: Pünktchenastrild, Amarant ♂♀, dunkelroter Astrild, Tigerfink ♂♀.
1909 Tafel I: Orangegesichtiger Unzertrennlicher, Rosenpapagei, Rußköpfchen, Tarantinischer Unzertrennlicher, Grauköpfchen.
1909 Tafel II: Klarinetten- und Mennigvogel, braunkehliger Blauschnäpper.
1909 Tafel III: Schwarzbäckchen-, Elfen-, Bunt- und Granatastrild, gemalter Astrild.
1909 Tafel IV: Orange-, Rotkopf-, Blutschnabel-, Napoleons- und Madagaskarweber.
1910 Tafel I: Grauer, Trauer-, Halsband-, Zwergfliegenschnäpper.
1910 Tafel IV: Zipp-, Garten-, Zaun-, Kappenammer.
1911 Tafel I: Rotrücken-, Raub-, Schwarzstirn-, Rotkopfwürger.
1911 Tafel II: Zeresastrild, Malabarfasänchen, Muskatfink, Silberschnäbelchen.
1911 Tafel III: Gartensänger, Fitislaub-, Weidenlaub- und Waldlaubvogel.
1911 Tafel IV: Goldköpfiges ♂♀, feuerköpfiges Goldhähnchen, Zaunkönig.
1912 Tafel I: Schönbürzel, Orangebäckchen, Helenafasänchen, Schmetterlingsfink, Goldbrüstchen, Grauastrild.
1912 Tafel II: Wieners, Aurora-, Tropfen-, Wachtel- und Rebhuhnastrild.
1912 Tafel III: Magellan-, Kapuzen-, mexikanischer, Yarells und Trauerzeisig.
1912 Tafel IV: Dorn-, Sonnen-, Binsen- und Gitterflügelastrild, Zebrafink.
1913 Tafel I: Gould- ♂♀, rotköpfige ♂♀ Amandine.
1913 Tafel II: Violettblauer u. Rotbauchorganist, Purpur-, Dreifarben- und schwarzblaue Tangare.
1913 Tafel III: Paradies-, Dominikaner-, Königs-, Fischers, Rotscheitel- und Gelbrückenwidafink.
1913 Tafel IV: Goldschulter-, Fein-, Sing-, Browns Singsittich.
1914 Tafel I: Schwarzkopf-, Rosenbrust- u. mexik. Gelbkernbeißer, dunkelblauer Bischof, roter Kardinal.
1914 Tafel II: Rote, Grott-, ♂ Cubadrossel.
1914 Tafel III: Diuka-, Grau-, Kron- und Morgenammerfink, Graukardinal.
1914 Tafel IV: Pikui-, Kap-, Diamant-, Tamborin- u. Friedenstäubchen, chinesische Zwergwachtel.
1915 Tafel I: Sammetköpfchen, Sperber-, Orpheus- und Bartgrasmücke.
1915 Tafel III: Diamantfink-, Masken-, Weißwangen- und Spitzschwanzamandine, Gürtelgrasfink.
1915 Tafel IV: Star, Pirol, Rosenstar.
1920 Tafel I: Nandy-, Jendaja-, Guajakil- und Goldstirnsittich.
1920 Tafel II: Schuppenköpfchen, Schnurrbärtchen, dottergelber, Zwergmasken- und Textorweber.
1920 Tafel III: Tui-, Ziegen-, Mönch-, Tuipara- u. Katharinasittich.
1920 Tafel IV: Reisfink, weißer Reisfink.
1921 Tafel I: Gelber Wellensittich und Wellensittich.
1921 Tafel II: Kleiner Gelbhaubenkakadu.
1921 Tafel III: Kleiner Alexandersittich.
1921 Tafel IV: Domingo-, Cuba- und Rotbugamazone.

Da die Nachfrage nach Farbentafeln sehr groß ist, bitten wir sofort zu bestellen.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
Postschließfach 148.

Empfehlenswerte Bücher für Vogelfreunde

Preis und Lieferbarkeit freibleibend!

Für Freunde der heimischen Vogelwelt.

Die deutsche Vogelwelt nach ihrem Standort. Ein Beitrag zur Zoogeographie Deutschlands und zugleich ein Exkursionsbuch zum Kennenlernen der Vögel. Von Werner Hagen. Mit 74 Abbildungen u. 4 Schwarzdrucktafeln. Kart. 3.-- M.

Die einheimischen Stubenvögel, ihre Naturgeschichte und Zucht. Von Karl Neunzig (zugleich 6. Auflage des Dr. Karl Ruß'schen Handbuchs für Vogelliebhaber, Band II). Mit 22 Farbentafeln u. 188 Textabbildungen. Geh. 14.—, geb. 17.— M.

Die gefiederten Sängerfürsten des europäischen Festlandes, ihre Naturgeschichte, sachgemäße Käfigung, Behandlung und Pflege als Stubenvögel. Von Mathias Rausch. 2. Auflage. Mit 3 Farbendrucktafeln und 16 Textabbildungen. Kart. 3.— M.

Die Hauptregeln der Sprosserpflege. Scherzreime von Oskar M. Kisch. Mit 2 Abbild. 1.— M.

Der Dompfaff, seine Naturgeschichte, Pflege, Abrichtung u. Zucht. Auf Grund 54jähr. Erfahrung v. F. Schlag. 8.—10. Aufl. Mit 2 Schwarzdrucktafeln. Kart. 1.— M.

Die deutschen Sumpf- und Strandvögel. Von Dr. Curt Floericke. Mit 44 Abbildungen auf 15 Tafeln in Schwarzdruck. Kart. 4.50 M.

Die deutschen Schwimm- und Wasservögel. Von Dr. Curt Floericke. Mit ca. 45 Abbildungen auf 15 Tafeln in Schwarzdruck. Kart. 4.50 M.

Die mitteleuropäischen Vögel. Von Dr. E. Bade. Band I. Singvögel. Mit 1 Farbentafel, 4 Schwarzdrucktafeln, 31 Taf. in Photographiedruck, fast ausschl. nach Aufnahmen lebender Vögel und 144 Textabbildungen von Nestern, Eiern und Vogelteilen. Geb. 5.— M.

Allerlei sprechendes gefiedertes Volk. (Raben und Krähenvögel, Starvögel usw.) Ein Hand- und Lehrbuch von Dr. Karl Ruß. Mit 5 Vollbildern in Schwarzdruck. Kart. 3.— M.

Gefiederte Hausfreunde I. Von Karl Neunzig. Kurze Unterweisung über die Pflege heimischer Stubenvögel. Kart. 1.— M.

Für Liebhaber fremdländischer Vögel.

Die fremdländischen Stubenvögel, ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht. Von Karl Neunzig (zugleich 5. Auflage des Dr. Karl Ruß'schen Handbuchs für Vogelliebhaber Band I). Mit 42 Farbentafeln und 400 Textabbildungen. Geh. 30.—, geb. 35.— M.

Gefiederte Hausfreunde II. Von Karl Neunzig. Kurze Unterweisung über die Pflege fremdländischer Stubenvögel. Mit 51 Abbildungen. Kart. 1.— M.

Dr. Karl Ruß, Die fremdländischen Stubenvögel, ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.
Bd. I—IV. Geh. 150.— M., in Halbleder geb. 175.— M.
Bd. I. Körnerfresser ist einzeln nicht käuflich.

Die Prachtfinken, ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht. Von Dr. Karl Ruß. Zweite, illustrierte Aufl. mit 1 Farbendruckbilde. Geheftet 2.— M.

Webervögel und Widafinken, ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht. Von Dr. Karl Ruß. Kart. 3.— M.

Bilder aus der Vogelstube. Schilderungen aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel. Von Dr. Karl Ruß. Kart. 3.— M.

Für Papageien-Pfleger.

Der Wellensittich, seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht. Von Dr. Karl Ruß. Sechste, von Karl Neunzig gänzlich umgearbeitete und vermehrte Auflage. Mit 1 Farbentafel und 31 Textabbildungen. Kart. 2.50 M.

Sprechende Papageien. Ein Hand- und Lehrbuch von Dr. Karl Ruß. 3. verb. Aufl. Mit 2 Farbendruck- u. 32 Schwarzdrucktafeln. Kart. 4.50 M.

Der Graupapagei, seine Naturgeschichte, Pflege, Abrichtung und Züchtung. Von Dr. Karl Ruß. Zweite, von Karl Neunzig bearbeitete Auflage. Mit einem buntfarbigen Aquarelldruck, 16 Textabbildungen und 1 Verbreitungskarte. Kart. 2.50 M.

Der Graupapagei in der Freiheit und in der Gefangenschaft. Von Dr. Carl R. Hennicke. Mit 1 Buntbild. Geheftet 1.50 M.

Die Amazonen-Papageien, ihre Naturgeschichte, Pflege, Abrichtung und Züchtung. Von Dr. Karl Ruß. Zweite, von Karl Neunzig bearbeitete und vermehrte Auflage. Mit 1 buntfarbigen Aquarelldruck und 21 Textabbildungen. Kart. 2.50 M.

Behandlung und Heilung der Krankheiten von grauen und grünen Papageien. Von O. Majewski. Geheftet 1.— M.

Für Kanarienzüchter.

Der Kanarienvogel, seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht. Von Dr. Karl Ruß. 14. Auflage mit 3 Farbentafeln und zahlreichen Textbildern. Bearbeitet und erausgegeben von Karl Neunzig. Kart. 2.50 M.

Die Farben- und Gestaltskanarien nebst Beschreibung aller verschiedenen Kanarienrassen, deren Entstehung, Form und Farbenveränderung, Bastardzucht und Farbenfütterung von C. L. W. Noorduijn-Groningen. Mit 22 stichhaltigen Abbildungen. Kart. 2.— M.

Der Kanariengesang. Allgemeinverständliche sowie musikalische und phonetische Darstellung von W. Kluhs. 1.— M.

Vogelschutz.

Handbuch des Vogelschutzes. Von Prof. Dr. C. Hennicke. Mit 9 Tafeln in Doppelton, 1 Karte und mehr als 200 Textabbildungen. Geh. 8.— M.

Für Geflügelzüchter.

Der Brutapparat in der Geflügelzucht. Darstellung der Herkunft, Bauart, Nutzanwendung und Herstellung des Brutapparates von Max Schwarzlose. Mit 10 Abbildungen im Text. 1.— M.

Für Sammler.

Der Präparator und Konservator. Eine praktische Anleitung zum Erlernen des Ausstopfens, Konservierens und Skelettierens von Vögeln und Säugetieren. Für Naturfreunde herausgegeben von Rob. Voegler. 4. verbesserte und erweiterte Auflage. Mit 38 Abbildungen im Text. 2.— M.

Der philosophische Bauer oder Anleitung, die Natur durch Beobachtung und Versuche zu erforschen von Johann Andreas Naumann. Neudruck nach der ersten Original-Ausgabe von 1791, besorgt und herausgegeben von Paul Leverkühn. Geh. —.50 M.

Die angeführten Preise sind Grundpreise, die mit der vom Börsenverein der Deutschen Buchhändler von Zeit zu Zeit bestimmten Teuerungszahl (Schlüsselzahl) zu multiplizieren sind. Die jeweilige Schlüsselzahl ist in jeder Buchhandlung oder vom Verlage zu erfahren! Beispiel: Grundpreis 2.— ℳ × Schlüsselzahl 2500 = 5000 ℳ Ladenpreis. Anfragen ist das Porto für die Antwort beizufügen.
Für Auslandslieferungen: Nach dem hochvalutigen Ausland 200% Zuschlag. Nach dem mittelvalutigen Ausland 120% Zuschlag.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg

Postscheckkonto: Magdeburg 3148 Postschließfach 148

UNIVERSITY OF ILLINOIS-URBANA
3 0112 101732573